

# Anais do **26º**

## **Congresso de Iniciação Científica da Unisa**

**26ª** Mostra de Pós-Graduação

**20ª** Web conferência Internacional de Pesquisa da Universidade Santo Amaro - Unisa



#### **COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO**

**Presidente:** Prof. Dr. Renato Brito Sanchez

**Vice-Presidente:** Profa. Dra. Ana Paula Ribeiro

**Secretaria Científica:** Profa. Dra. Adriana Cortez

#### **COMISSÃO CIENTÍFICA**

Ariana Aline da Silva – Coordenadora de Extensão

Arlei Marcili – Mestrado e Doutorado em Saúde Única

Carolina Nunes Franca – Coordenadora do Mestrado em Ciências da Saúde

Clara Rodrigues – Curso de Nutrição

Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira – Curso de Engenharia Ambiental

Daniele Maria Pilla Junqueira – Curso de Engenharia Civil

Debora Driemeyer Wilbert – Coordenadora da Residência Multidisciplinar

Georghio Alessandro Tomelin – Mestrado em Direito Médico

Gerson Heidrich da Silva – Curso de Psicologia

Henrique Mantoan – Diretor do Curso de Medicina

Herbert Sousa Soares – Mestrado e Doutorado em Saúde Única

Ivan Cardoso Sá – Coordenador adjunto dos Cursos de Engenharia Química e de Produção

João Henrique De Moraes Ribeiro – Curso de Enfermagem

Maria Auxiliadora Fontana Baseio - Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas

Marcelo Andreetta Corral - Curso de Medicina

Olinda Nogueira Paes Rizzo – Coordenadora dos Cursos da área de Tecnologia da Informação

Patrícia Colombo de Souza – Mestrado em Ciências da Saúde

Patrícia Farias Coelho – Coordenadora Mestrado em Ciências Humanas

Paula Yuri Sugishita Kanikadan – Curso de Medicina

Renato Watanabe de Moraes – Curso de Direito e Coordenador dos Tecnológicos em Direito

Sergio Eduardo Migliorini – Curso de Odontologia

Silvia Gonçalves de Almeida – Curso de Pedagogia

Silvia Helena Modenesi Pucci – Curso de Psicologia

Equipe Técnica:

Gisele Nunes – Gerente Administrativo de Registros e Controles Acadêmicos;

Cintia Palhano Rodrigues – Coordenadora de Operações;

Sonia Beatriz de Sousa Esselin – Gerente de Eventos;

Valter Fabiano Soldati – Coordenador de Eventos;

Hélida Deliane da Costa – Secretária da Pesquisa e Internacionalização

#### **CORPO DIRETIVO**

Reitor – Prof. Dr. Eloi Francisco Rosa

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – Prof. Dr. Rafael Garabet Agopian

Pró-Reitoria de Graduação e Inovação – Profa. Dra. Fernanda Aurora Stabile Gonnelli

Diretor de Estratégias para a Aprendizagem - Prof. Me. Carlos Pereira Araújo de Melo

Diretor de Tecnologias Educacionais - Prof. Dr. Renato de Brito Sanchez

Diretora de Pesquisa e Internacionalização – Profa. Dra. Ana Paula Ribeiro

Diretor do Curso de Medicina: Prof. Dr. Henrique Mantoan

Diretora de Extensão e Responsabilidade Social: Profa. Me. Lis Lakeis Bertan

Diretora de Relações Institucionais em Saúde: Profa. Dra. Jane de Eston Ammond

C759

Congresso de Iniciação Científica da UNISA (26.:2023).

Anais do 26º Congresso de Iniciação Científica: 20ª Amostra de Pós-Graduação: 7ª Webconferência Internacional de Pesquisa / organizador por Renato de Brito Sanchez, Ana Paula Ribeiro, Adriana Cortez. — São Paulo, 2023.

1.214 p.

1. Trabalho acadêmico. 2. Iniciação científica. 3. Webconferência. I. Sanches, Renato Brito. org. II. Ribeiro, Ana Paulo, org. III. Cortez, Adriana, org. IV. Universidade Santo Amaro. V. Título.



**26º Congresso de Iniciação Científica / 20ª Mostra de Pós-Graduação / 7ª**

**Webconferência Internacional de Pesquisa**

**08 DE NOVEMBRO DE 2023 – MODALIDADE HÍBRIDO**

**TEMA CENTRAL: *Tecnologias digitais aplicadas à formação acadêmica e profissional***

## **NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS**

Este documento apresenta orientações sobre os procedimentos para inscrição e participação em palestras, bem como, instruções aos interessados em submeter trabalhos científicos para apresentação durante o 26º Congresso de Iniciação Científica, 20ª Mostra de Pós-Graduação e 7ª Webconferência Internacional de Pesquisa.

### **1. APRESENTAÇÃO E PROPOSTA DO CONGRESSO**

O Congresso de Iniciação Científica da Universidade Santo Amaro - UNISA - é dedicado ao compartilhamento e discussão de experiências e inovações no âmbito do desenvolvimento científico e do ensino de graduação e de pós-graduação. Essa iniciativa da Universidade chega à sua 26ª edição e a repercussão dos anos anteriores demonstra crescimento e o incentivo para realização de pesquisa nas diversas áreas de conhecimento. O congresso permite trocas de experiência entre os discentes e pesquisadores, e tem se mostrado importante ferramenta para debater, explorar e aprimorar o ensino de graduação e pós-graduação em nossa universidade.

O tema abordado na 26ª edição está em alta nos dias atuais: “***Tecnologias digitais aplicadas à formação acadêmica e profissional***” e discutirá as relações entre os avanços tecnológicos digitais e a formação seguindo o desenvolvimento da era digital aplicada à ciência, à educação e ao mercado de trabalho. Mais informações sobre o evento podem ser acessadas em [https://www.unisa.br/pesquisa sobre o tópico Evento Científico – 26º Congresso de Iniciação Científica](https://www.unisa.br/pesquisa_sobre_o_tópico_Evento_Científico_-_26º_Congresso_de_Iniciação_Científica).



## Local do Congresso:

O 26º Congresso de Iniciação Científica da UNISA será realizado na modalidade híbrida com **atividades presenciais (Campi Interlagos e Adolfo Pinheiro) e a distância em plataformas digitais.**

## 2. DATAS IMPORTANTES

- **Submissão de trabalhos:** 04 de setembro a 13 de outubro de 2023.
- **Inscrições para minicursos e palestras:** de 04 de setembro a 31 de outubro de 2023.
- **Avaliação de trabalhos:** 04 de setembro a 16 de outubro de 2023.
- **Divulgação das apresentações (salas e horários):** 31 de outubro de 2023.

## 3. INSCRIÇÃO PARA MINICURSOS E PALESTRAS

Além da participação com a apresentação de trabalhos, todos os discentes e docentes da UNISA estão convidados a participar do Congresso, frequentando os minicursos e as palestras ofertadas durante o evento.

Aos alunos, vale lembrar que a presença nessas atividades do Congresso dará direito a certificados de participação, sendo **2 (duas) horas complementares para cada atividade. Será necessário acessar a plataforma digital para palestra de abertura e os minicursos para que seja emitido o certificado de participação (RA e nome completo).**

O período de **inscrições será do dia 04/09/2023 até o dia 31/10/2023.** Para realizar sua inscrição, basta acessar o link: [http://w2.unisa.br/pls/prd/pw\\_evento\\_congresso\\_n.eventos?pcodpag=9014](http://w2.unisa.br/pls/prd/pw_evento_congresso_n.eventos?pcodpag=9014) e selecionar a palestra ou minicurso desejado no item 26º Congresso de Iniciação Científica da UNISA.

**Serão oferecidos 3 minicursos na modalidade à distância via plataformas digitais com vagas limitadas (300 para cada minicurso). As inscrições serão encerradas quando o número máximo de participantes for atingido por atividade.**



#### 4. SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Os alunos serão muito bem-vindos ao Congresso e poderão submeter seus trabalhos para apresentação desde que o desenvolvimento da pesquisa tenha sido realizado sob orientação de um professor da UNISA.

Os trabalhos submetidos podem ter sido desenvolvidos com a colaboração de outros alunos, professores e de orientador externo, desde que o total de autores, excluindo o(s) orientador(es) e colaboração externa, não exceda o número de 6 (seis) pessoas.

O aluno interessado em participar deve elaborar um resumo de seu trabalho, de acordo com as normas presentes neste documento e sob orientação de um professor da UNISA.

A submissão do resumo deverá ser realizada pelo professor orientador que deverá acessar o ambiente logado do portal da UNISA na aba "INSCRIÇÃO".

O período de submissão dos trabalhos será de **04 setembro a 13 de outubro de 2023**. **As apresentações dos trabalhos no congresso corresponderão a 20 (vinte) horas de atividade complementar** (somente um certificado será emitido com o nome de todos os autores envolvidos).

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

- a. Título do trabalho
- b. Número de parecer de aprovação no CEP, para pesquisas envolvendo seres humanos (CEP) e para pesquisas envolvendo animais (CEUA), se necessário.
- c. **Tipo de trabalho, de acordo com as seguintes opções:**
  - **Iniciação Científica** PIBIC/UNISA/CNPq e sem bolsa (apenas para projetos aprovados no Edital PIBIC) e Agências Fomentos (FAPESP, CNPq e CAPES).
  - **Trabalhos Científicos:** projeto de pesquisa cadastrados junto à Comissão de Pesquisa da UNISA (com apresentação de resultados).
  - **Trabalhos de Conclusão de Curso** - TCC presencial ou EAD.
  - **Trabalhos de Extensão** – com resultados.



- **Trabalhos de Pós-Graduação Especialização Presencial** - trabalhos desenvolvidos em programas de especialização *Lato Sensu* da Instituição.
- **Trabalhos de Pós-graduação Especialização EAD** - trabalhos desenvolvidos em programa de especialização *Lato Sensu* da instituição.
- **Trabalhos de Pós-Graduação Mestrado ou Doutorado** - trabalhos desenvolvidos em programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu* da Instituição.

d. Forma de apresentação:

- **Comunicação Oral:** cursos presenciais e EAD.
- **Comunicação Pôster (impresso):** cursos presenciais e EAD.
- **Comunicação E-Pôster (digital):** cursos presenciais e EAD.

e. Iniciação Científica:

- Com bolsa UNISA
- Com bolsa CNPq
- Com bolsa CAPES
- Com bolsa FAPESP
- Sem bolsa

f. **Cadastro dos autores (alunos), no máximo 6 (seis), na seguinte sequência: o apresentador principal do trabalho deve ser inserido como “autor principal”** (necessário RA para cadastramento). Os **demais autores** devem ser cadastrados **como coautores** com número do RA.

g. Orientador (es) - docente UNISA

h. Orientador(es) externo - se houver

i. **Área do conhecimento (disponível em <https://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>, acesso 30 de agosto de**

**2023):**

- Ciências Exatas e da Terra
- Ciências Biológicas
- Engenharias



- Ciências da Saúde
- Ciências Agrárias
- Ciências Sociais Aplicadas
- Ciências Humanas
- Linguística, Letras e Artes
- Outro

Após a submissão, que deverá ser realizada pelo professor (orientador), o aluno e o professor deverão aguardar a divulgação dos trabalhos aceitos pelo Comitê Científico do Congresso, a qual estará disponível até o dia 31 de outubro de 2023, exclusivamente no *site* da pesquisa ([https://www.unisa.br/pesquisa/ sobre o tópico Evento Científico](https://www.unisa.br/pesquisa/sobre_o_tópico_Evento_Científico)).

#### **INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

A apresentação dos trabalhos ocorrerá de forma presencial nos Campi Interlagos e Adolfo Pinheiros (oral e pôster) e em plataformas digitais (e-pôster). Os horários e períodos das apresentações em cada campus serão divulgados pela Comissão Organizadora no dia 31 de outubro de 2023 na página do congresso.

A apresentação do trabalho, tanto na modalidade **oral, pôster e e-pôster, deverá, obrigatoriamente, seguir o modelo do *template*, disponível no *site* da pesquisa, no item **Trabalhos Aprovados: ([https://www.unisa.br/pesquisa/ sobre o tópico Evento Científico](https://www.unisa.br/pesquisa/sobre_o_tópico_Evento_Científico))**.**

#### **5. NORMAS DE FORMATAÇÃO PARA SUBMISSÃO DO RESUMO**

O trabalho deverá ter **título** e **resumo** (de 250 a 500 palavras, contemplando introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusão) e **referências bibliográficas principais** (no mínimo 3 (três) em normativas Vancouver ou ABNT). Um modelo de resumo está disponível no final deste item.

#### **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**

Os resumos encaminhados fora dos padrões propostos pelo EDITAL, por exemplo, que não apresentarem resultados (parciais ou totais), não contiverem o



número de aprovação do processo no CEP (seres humanos) ou CEUA (animais) quando necessário e/ou inscritos por alunos, serão automaticamente DESCLASSIFICADOS. Trabalhos aprovados em Comitês de Ética em Pesquisas em Seres Humanos -CEP e/ou Animais- CEUA de outras Instituições, mas realizados na UNISA, também deverão informar o número de aprovação e a instituição avaliadora (número de aprovação).

Os trabalhos DESCLASSIFICADOS poderão ser corrigidos e re-submetidos no portal da UNISA até o prazo final de submissão.

### MODELO DO RESUMO

<p><b>INTRODUÇÃO:</b> A fase da vida entre os 6 aos 9 anos é caracterizado por várias transformações corpóreas do sistema musculoesquelético, que podem resultar em alterações posturais no complexo tornozelo-pé e perturbações do apoio dos pés e equilíbrio corporal. Atualmente, pesquisas vêm ressaltando a importância de compreender as alterações posturais dos pés na fase infantil de escolares devido a suas implicações sobre as mudanças na oscilação</p>
<p><b>OBJETIVO:</b> Verificar a influência do índice de massa corporal sobre a postura dos pés de crianças escolares.</p>
<p><b>METODOLOGIA:</b> Participaram do estudo 197 crianças de 6 a 9 anos de idade de uma escola pública do município de Santo Amaro (Capela do Socorro, São Paulo). As crianças foram alocadas em três grupos: 79 crianças no Grupo Eutrófico (GE), 65 crianças no Grupo Sobrepeso (GSP) e 53 crianças no grupo Obeso (GO). A postura dos pés foi avaliada pelo Foot Posture Index - IPP-6.</p>
<p><b>RESULTADO E DISCUSSÃO:</b> O GE apresentou 79% de pés pronados, 14% pés supinados e 7,5% pés normais; o GSP 71% pés pronados, 13% pés supinados e 17% pés normais e o GO 66% pés pronados, 13,5% pés supinados e 14% pés normais. Os itens palpação da cabeça do talus direita (<math>p=0,157</math>) e esquerda (<math>p=0,085</math>); curva maleolar direita (<math>p=0,784</math>) e esquerda (<math>p=0,537</math>); inversão/eversão do calcâneo direita (<math>p=0,236</math>) e esquerda (<math>p=0,310</math>); proeminência da articulação talonavicular direita (<math>p=0,569</math>) e esquerda (<math>p=0,853</math>); arco plantar direito (<math>p=0,293</math>) e esquerdo (<math>p=0,227</math>); abdução/adução do antepé direito (<math>p=0,738</math>) e esquerdo (<math>p=0,358</math>) e escore total (<math>p=0,180</math>), todos sem diferenças estatísticas entre os grupos: GE, GSP e GO.</p>
<p><b>CONCLUSÃO:</b> As crianças escolares com idade entre 6 a 9 anos com diferentes índices de massa corporal (eutrófico, sobrepeso e obeso) não apresentaram diferenças na postura dos pés, porém, todos com predominância de pés pronados.</p>
<p><b>REFERÊNCIAS:</b></p>



1. Neal BS, Griffiths IB, Dowling GJ, Murley GS, Munteanu SE, Smith MMF, Collins NJ, Barton CJ. Foot posture as a risk factor for lower limb overuse injury: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle 2014; 7:55.
2. Halabchi F, Mazaheri R, Mirshahi M, Abbasian L. Pediatric Flexible Flatfoot; Clinical Aspects and Algorithmic Approach. Iran J Pediatr 2013; 23(3): 247–260.
3. Pauk J, Ezerskiy V, Raso JV, Rogalski M. Epidemiologic factors affecting plantar arch development in children with flat feet. J Am Podiatr Med Assoc. 2012;102 (2):114–21.

## **6. NORMAS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS**

Ao inscrever o trabalho, o autor, automaticamente, aceita todos os critérios utilizados pela Comissão Científica para aprovação, não cabendo nenhum tipo de recurso das decisões da Comissão divulgadas na data estabelecida.

### **6.1. Dos critérios para seleção de trabalhos para apresentação**

A Comissão Científica selecionará os trabalhos para apresentação oral ou pôster, seguindo os critérios:

- I. Inserção de todos os quesitos necessários: título, introdução, objetivo, metodologia, resultados/discussão, conclusão e referências bibliográficas;
- II. Embasamento e relevância científica da proposta do trabalho;
- III. Descrição e adequação da metodologia para o alcance dos objetivos propostos;
- IV. Apresentação clara e sucinta dos resultados com os principais pontos de discussão;
- V. Conclusão correspondente aos objetivos propostos.

## **7. NORMAS DE APRESENTAÇÃO PARA TRABALHOS APROVADOS**

### **7.1. Sessão Iniciação Científica – 7ª Webconferência Internacional de Pesquisa.**

Conforme definido pela Comissão Organizadora do presente Congresso, **12 trabalhos de comunicação oral** serão selecionados pela Comissão Interna e avaliados pela Comissão Externa proveniente da Universidade Estrangeira, denominada de 7ª



Webconferência Internacional de Pesquisa, realizada das **14h00 às 16h00, no dia 08/11/23 por meio da Plataforma digital.**

**ATENÇÃO:** Os trabalhos não selecionados para apresentação na Webconferência Internacional de Pesquisa serão apresentados no 26º Congresso de Iniciação Científica.

## 7.2. Apresentação dos trabalhos

As apresentações de trabalhos dos alunos ocorrerão de forma presencial, dividindo-se entre o campus Interlagos (diurno) e campus Adolfo Pinheiros (noturno). **As apresentações orais serão divididas por salas (específicas em acordo com a temática)**, onde participarão o Coordenador da banca, a Comissão Avaliadora de Professores e os alunos envolvidos na apresentação, e deverão seguir o *template* ([https://www.unisa.br/pesquisa/sobre o tópico Evento Científico](https://www.unisa.br/pesquisa/sobre_o_tópico_Evento_Científico)). Já as apresentações em pôster, seguirão os locais direcionados para colocação dos painéis impressos, onde participarão a Comissão Avaliadora de Professores e os alunos envolvidos na apresentação.

As apresentações de **forma oral, pôster e e-pôster**, deverão ser colocadas no dia da apresentação com antecedência de 15 minutos, de acordo com a programação do congresso, a qual será disponibilizada no *site* do Congresso na data do dia 31 de outubro de 2023.

**No caso de o apresentador do trabalho não poder comparecer no dia programado** para sua apresentação, **apenas um coautor** (que conste no resumo enviado) **poderá substituí-lo.**

A **não presença do autor ou de um coautor** implicará **desclassificação do trabalho** e não será emitido certificado ou declaração de apresentação.

### 7.2.1 Apresentação dos trabalhos na forma de **COMUNICAÇÃO ORAL**

As apresentações orais dos trabalhos ocorrerão, de forma presencial, em salas específicas. A ordem de apresentação obedecerá à numeração definida pela Comissão



Organizadora, dentro de cada categoria indicada pelos autores. **Fique atento à definição de inscrição do seu trabalho, pois ela implica a sala designada para a apresentação.**

As apresentações deverão ser nos períodos e horários determinados pela Comissão Organizadora, devendo o autor estar disponível na sala determinada durante todo o período designado e postar a aula com 15 minutos de antecedência. **O cronograma de apresentação será disponibilizado na página da UNISA a partir de 31 de outubro de 2023.**

A apresentação deverá ter **no máximo 10 minutos**, com a quantidade de *slides* necessária para seu cumprimento, seguindo as orientações do *template* ([https://www.unisa.br/pesquisa/ sobre o tópico Evento Científico](https://www.unisa.br/pesquisa/sobre_o_tópico_Evento_Científico)). A banca avaliadora terá **5 minutos** para fazer suas considerações e perguntas.

#### **7.2.2 Apresentação na forma de PÔSTER (impresso) e E-PÔSTER (digital)**

As apresentações dos trabalhos na forma de pôster (banner físico) e e-pôster (banner digital) ocorrerão, de **forma presencial, em locais direcionados (identificados) para colocação dos painéis impressos ou digitais.**

A apresentação terá **duração de 5 minutos**, com as orientações do *template* ([https://www.unisa.br/pesquisa/ sobre o tópico Evento Científico](https://www.unisa.br/pesquisa/sobre_o_tópico_Evento_Científico)). A banca avaliadora terá **5 minutos** para fazer suas considerações e perguntas.

#### **7.2.3 Apresentação dos trabalhos na forma Comunicação Oral, Pôster e E-Pôster para os alunos da modalidade EaD (todos os polos) e para os discentes dos Campi onde não estão previstas atividades presenciais**

As apresentações dos trabalhos tanto na forma de pôster como comunicação oral, deverão ser apresentados em salas virtuais que serão previamente montadas, nos períodos e horários determinados pela Comissão Organizadora, devendo o autor estar disponível na sala determinada durante todo o período designado e postar a aula/apresentação com 15 minutos de antecedência. **O cronograma de apresentação será disponibilizado na página da UNISA a partir de 31 de outubro de 2023.**



A apresentação deverá ter **no máximo 10 minutos**, com a quantidade de *slides* necessária para seu cumprimento, seguindo as orientações do *template* ([https://www.unisa.br/pesquisa/ sobre o tópico Evento Científico](https://www.unisa.br/pesquisa/sobre_o_tópico_Evento_Científico)). A banca avaliadora terá, no máximo, **10 minutos para a modalidade “comunicação oral” e 5 minutos para a modalidade “pôster e e-pôster”**, para fazer suas considerações e perguntas.

## 8. AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES

Para apreciar as apresentações orais, pôster e e-pôster, haverá uma comissão de avaliadores, com agendamento por escala de horários, a qual será disponibilizada a todos os alunos com trabalhos inscritos. O(s) autor(es) deverá(ão) permanecer na sala ou ao lado do pôster e responder aos avaliadores as arguições feitas após a apresentação. Caso o(s) autor(es) não esteja(m) presente(s) no dia e horário estabelecidos, o trabalho não será computado para certificação.

Em casos de dúvidas entrar em contato com a Comissão do Congresso pelo e- mail: [iniciacaocientifica@unisa.br](mailto:iniciacaocientifica@unisa.br)

### Equipe Técnica:

Gisele Nunes – Gerente Administrativo de Registros e Controles Acadêmicos;

Cintia Palhano Rodrigues – Coordenadora de Operações;

Sonia Beatriz de Sousa Esselin – Gerente de Eventos;

Valter Fabiano Soldati – Coordenador de Eventos;

Hélida Deliane da Costa – Secretária da Pesquisa e Internacionalização



**26º Congresso de Iniciação Científica / 20ª Mostra de Pós-Graduação / 7ª  
Webconferência Internacional de Pesquisa**

**08 DE NOVEMBRO DE 2023 – MODALIDADE HÍBRIDO**

**TEMA CENTRAL: *Tecnologias digitais aplicadas à formação acadêmica e profissional***

**PROGRAMAÇÃO PALESTRAS E MINICURSOS**

**\*9h00 - Palestra de Abertura ONLINE (Plataforma Digital):**

**Prof. Dr. Jones Oliveira de Albuquerque** com o tema: ***Máquinas, computadores, Inteligência Artificial - deveríamos aprender mais Geometrias com a Natureza para sermos mais saudáveis***

Professor Dr. Jones Oliveira de Albuquerque é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE em 1994, mas transitou durante toda a graduação pela Matemática e pela Física. Fez mestrado em Computação na UFPE e Doutorado, também em Computação, na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (2002). Foi “Visiting Staff – Research Scientist” na “BarcelonaTech - Universitat Politècnica de Catalunya – UPC”, Barcelona – Espanha (2011-2012). E também na “Life and Medical School of University College of London – UCL” (2017-2018) onde frequentou o “Alan Turing Institute” e o “Francis Crick Institute” com as credenciais da UCL em Medicina Molecular no Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami – LIKA, hoje Instituto Keizo Asami – iLIKA na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Desde dezembro de 2022 está novamente “Visiting Staff – Research Scientist” no Departamento de Física do “BarcelonaTech - Universitat Politècnica de Catalunya – UPC”, Barcelona – Espanha (2022- 2024).



## MINI-CURSOS DO 26º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**\*13h - Minicurso 1 (modalidade on-line – 300 vagas):** Profa. **Kátia Galvane** com o tema: ***“Tecnologia em Saúde: Como a tecnologia tem garantido mais eficiência para prestadores e fontes pagadoras, bem como a inteligência artificial versus humanização da saúde-convergentes ou não”*** moderado pelas professoras: Jane de Eston Armond e Ana Paula Ribeiro.

Professora Kátia Galvane é Diretora Executiva Insurance - Health na NTT Data Company. NTTDATA Brasil IESE - Universidade de Navarra - Responsável pela estratégia de posicionamento, expansão e gestão da vertical de saúde da Nttdata para o Brasil. Experiência profissional extensa de 20 anos em administração de gestão de recursos de saúde, operadoras e seguradoras de saúde. Formada e especializada pela Unisa em Cirurgia Facial (BMF), e em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas (PROAHSA). MBA em HMO's Management pela Faculdade São Camilo, especialização em Estratégia pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, MBA (MBA Global Management, Project Management, Global New Business Management) pelo IESE - Universidade de Navarra – Espanha.

**\*14h - Minicurso 2 (modalidade online – 300 vagas):** Prof. Dr. **Thiago Valentim Martins** com o tema: ***“Utilizando Inteligência Artificial como ferramenta de aprendizado e produtividade”*** moderado pelas professoras: Sílvia Gonçalves de Almeida e Sílvia Helena Modenesi Pucci.

Professor Thiago Valentim Martins é bacharel em Engenharia de Software Sênior na Trilon e Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo-UFES. Além disso, trabalha como consultor profissional em tecnologias digitais para empresas multinacionais.

**\*15h - Minicurso 3 (modalidade online – 300 vagas):** Prof. **João Carlos Lopes Fernandes e Prof. Glen Ferreira** com o tema: ***“Os extremos e as possibilidades da inteligência artificial e a produção científica”***, moderado pelos professores: Renato de Brito Sanchez e Renato Watanabe de Moraes

Professor João Carlos Lopes Fernandes é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (1990), Mestre em Engenharia de Computação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2006) e



pesquisador e Professor IV na UNIP, Coordenador da Formação Continuada do Centro Paula Souza e Professor da pós-graduação da Universidade Mackenzie. Possui vasta experiência na área de Ciência da Computação. Atua nas seguintes áreas de pesquisa: Tecnologia e educação, reabilitação motora, segurança da informação, inteligência artificial e redes de computação.

Professor Glen Ferreira é qualificado em Inteligência Artificial, com uma sólida formação acadêmica em Engenharia da Computação, MBA de de IA e Machine Learning pela FIAP e uma base técnica sólida em Mecatrônica pela Martin Luther King. Sua paixão por tecnologia e inovação o levou a se especializar em IA, e ao longo de sua carreira, ele tem dedicado-se a transmitir seus conhecimentos e experiência para inspirar e capacitar a próxima geração de profissionais nesta área em rápida expansão.



**26º Congresso de Iniciação Científica / 20ª Mostra de Pós-Graduação /**

**7ª Webconferência Internacional de Pesquisa**

**08 DE NOVEMBRO DE 2023 – MODALIDADE HÍBRIDO**

**TEMA CENTRAL: *Tecnologias digitais aplicadas à formação acadêmica e profissional***

### **PROGRAMAÇÃO PALESTRA E MINICURSOS**

#### **\*9h00 – Abertura Oficial do Evento com a Reitoria**

- **Reitor:** Prof. Dr. Elói Francisco Rosa
- **Pró-Reitoria de Graduação e Inovação:** Profa. Dra. Fernanda A. Stabile Gonnelli
- **Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa:** Prof. Dr. Rafael Garabet Agopian
- **Presidente do 26º Congresso de Iniciação Científica:** Prof. Dr. Renato de Brito Sanchez
- **Diretora de Pesquisa e Internacionalização:** Profa. Dra. Ana Paula Ribeiro

#### **\*9h15 - Palestra de Abertura ONLINE (Plataforma Digital):**

**Prof. Dr. Jones Oliveira de Albuquerque** com o tema: ***Máquinas, computadores, Inteligência Artificial - deveríamos aprender mais Geometrias com a Natureza para sermos mais saudáveis***”

<https://us02web.zoom.us/j/86768543394?pwd=TzVzOWFDV0MvaEF4bTBVT29oZ0RWQT0>



## MINI-CURSOS DO 26º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**\*13h - Minicurso 1 (modalidade on-line – 300 vagas):** Profa. Kátia Galvane com o tema: *“Tecnologia em Saúde: Como a tecnologia tem garantido mais eficiência para prestadores e fontes pagadoras, bem como a inteligência artificial versus humanização da saúde-convergentes ou não”* moderado pelas professoras: Jane de Eston Armond e

<https://us02web.zoom.us/j/84172680345?pwd=dXZHMUZPaVdYanozNWWueklwTIE2dz09>

**\*14h - Minicurso 2 (modalidade online – 300 vagas):** Prof. Dr. Thiago Valentim Martins com o tema: *“Utilizando Inteligência Artificial como ferramenta de aprendizado e produtividade”* moderado pelas professoras: Sílvia Gonçalves de Almeida e Sílvia Helena

<https://us02web.zoom.us/j/84080995984?pwd=TkQ4cHkyeWZocXFMTjRodEhpNUJYZz09>

**\*15h - Minicurso 3 (modalidade online – 300 vagas):** Prof. João Carlos Lopes Fernandes e Prof. Glen Ferreira com o tema: *“Os extremos e as possibilidades da inteligência artificial e a produção científica”*, moderado pelos professores: Renato de Brito Sanchez e Renato Watanabe de Moraes.

<https://us02web.zoom.us/j/84796244743?pwd=M2RuR0ZQT1JRdTRhNHVPUzVCTVA3Zz09>

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14133	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4631234 - LUIZ FILIPE CUNHA MARCIANO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CAFEÍNA NA MELHORA DA PERFORMANCE ESPORTIVA: UM ESTUDO DE REVISÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A cafeína é a substância psicoativa de elevado consumo em todo o mundo. A cafeína é absorvida pelo estômago e intestino delgado em 45 minutos, e é metabolizada no fígado pelo sistema citocromo P450 oxidase (CYP1A2) em três dimetilxantinas metabólicas: paraxantina, teobromina e teofilina. Após a digestão e absorção, uma xícara de café leva a um pico de concentração sérica de 0,25-2 mg/L de cafeína. No SNC, a cafeína possui distintos efeitos tais como aumentar a atenção, melhorar o estado de humor e liberação de catecolaminas que podem contribuir para performance esportiva. Por conta disso, a cafeína tem sido amplamente utilizada como recurso ergogênico. Neste cenário, é crucial entender os potenciais efeitos ergogênicos da cafeína, dosagens e os principais mecanismos envolvidos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi revisar os efeitos da suplementação de cafeína na melhora da performance esportiva em modalidades esportivas.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Este estudo consiste em uma revisão narrativa. Foi realizada uma busca considerando estudos publicados a partir do ano de 2013 e indexados na MedlinePubMed e Scielo-LILACS nos idiomas português e inglês utilizando os descritores: 1) em português cafeína - performance, suplementação e exercício; 2) em inglês - caffeine, performance, supplementation and exercise. Para a pesquisa utilizou-se a técnica booleana com os operadores booleanos and (e), or (ou), not (menos). Outros artigos foram adicionados para complementar o desenvolvimento e discussão do presente estudo.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A suplementação de cafeína, em cápsulas ou como bebidas energéticas, parece melhorar a performance em diversas modalidades esportivas. Com relação aos mecanismos envolvidos parece que a suplementação de cafeína aumenta o influxo de cálcio dentro das células musculares e, desta maneira, aumenta a formação de pontes cruzadas e produção de força muscular. No entanto, apesar do robusto corpo de conhecimento demonstrando o potencial efeito ergogênico da cafeína no desempenho esportivo, os mecanismos relacionados ainda precisam ser melhor estudados. Quando a dosagem, a suplementação de cafeína por meio de doses agudas de 3-6mg/kg/dia a partir de uma hora antes do exercício parece ser a melhor opção para que o efeito ergogênico seja observado.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>O presente estudo de revisão narrativa demonstrou que a suplementação de cafeína em doses de 3-6mg/kg/dia, antecedente a uma hora de certa prática esportiva, pode promover aumento da performance esportiva. O principal mecanismo envolvido no efeito ergogênico da cafeína na melhora da performance esportiva parece ser a ação da cafeína no sistema nervoso central.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>ANNUNCIATO, Rafael. et al. Suplementação aguda de cafeína relacionada ao aumento de força. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 3, n. 18, p. 508-517, 2009. APOSTOLIDIS, A. et al. Caffeine Supplementation: Ergogenic in Both High and Low Caffeine Responders. International Journal of Sports Physiology and Performance, v. 14, n. 5, p. 650-657, 2019. BARCELOS, Rômulo P. et. al. Caffeine effects on systemic metabolism, oxidative-inflammatory pathways, and exercise performance. Nutrition Research, [s.l.], v. 80, p. 1-17, ago. 2020.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14135	Neurologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3916006 - ROBERTA MOLAZ DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	ESTUDANTES DE MEDICINA COM MAIORES PONTUAÇÕES NA ESCALA DE AUTOAVALIAÇÃO DE TDAH REALIZAM MAIOR TEMPO DE TELA E APRESENTAM MAIOR SINTOMAS DE ANSIEDADE: UM ESTUDO TRANSVERSAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Estudos mostram a ligação entre o uso prolongado de dispositivos eletrônicos e os sintomas de transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A principal razão para essa ligação é incerta, mas pode ser atribuída a mudanças repetitivas de atenção e multitarefa, prejudicando a função executiva. Estudantes de medicina estão entre os grupos com maior carga horária no contexto universitário. Além disso, a tecnologia pode tornar essa demanda ainda mais significativa. No entanto, pouco foi estudado sobre o assunto até o momento, podendo este colaborar no entendimento de comportamentos comuns no estudante de medicina.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar se estudantes de medicina com maior pontuação na escala de autoavaliação de sintomas de TDAH, apresentam maior tempo de exposição à tela, sintomas de ansiedade e menor tempo de atividade física.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal, realizado com estudantes de Medicina, com idade (#38)#8805;18 anos. Pessoas com diagnóstico prévio de TDAH foram excluídas. Um questionário online, o qual continha perguntas quanto a características demográficas, acadêmicas e médicas, tempo de tela diário, escala para autoavaliação de sintomas de TDAH (ASRS), sintomas de ansiedade (BAI) e atividade física (IPAQ). A análise estatística foi realizada com o software SPSS22 e o nível de significância adotado foi p(#60)0,05. Dados paramétricos são apresentados em média±desvio padrão, enquanto os dados não paramétricos em mediana interquartil.			
<b>RESULTADOS</b>	Noventa e nove estudantes de Medicina participaram da presente pesquisa. Alocamos os dados em dois grupos distintos (escores ASRS menores ou maiores). Em resumo, o grupo com menor pontuação ASRS demonstra menor tempo de tela (9,0 vs 11,5 horas por dia - p=0,0135) e menores sintomas de ansiedade (8,0 vs 15,5 pontos - p = 0,0003). Para as variáveis Tempo de Caminhada (120 x 70 minutos por dia - p = 0,11), Tempo de Atividade Física Vigorosa Moderada (135 x 90 minutos por dia - p = 0,34) e Tempo em comportamento Sedentário (7,1 x 8,0 horas por dia - p = 0,15), não houve diferenças entre os grupos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os insights obtidos a partir da análise comparativa aqui apresentada elucidam a intrincada relação entre uso de tecnologia e bem-estar físico e mental. Essas descobertas destacam a importância da implementação de intervenções destinadas à promoção de hábitos tecnológicos e de estilo de vida mais saudáveis entre estudantes universitários, principalmente aqueles em programas de alta demanda, como a Medicina.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Padovani RdC, Neufeld CB, Maltoni J, Barbosa LNF, et al. Vulnerability and psychological well-being of college student. Rev Bras Ter Cogn. 2014;10(1):02-10. Small GW, Lee J, Kaufman A, Jallil J, et al. Brain health consequences of digital technology use. Med Teach. 2020;22(2):179-187. Hewitt JK, Li X, Vanderloo LM, Keown-Stoneman CDG, et al. Screen Use and Mental Health Symptoms in Canadian Children and Youth During the COVID-19 Pandemic. PLoS One. 2021;4(12):e2140875. Belton S, Issartel J, Behan S, Goss H, Peers C. The Differential Impact of Screen Time on Children's Wellbeing. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(17):9143.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14135	Neurologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4276906 - JULIA SADER NEVES FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	ESTUDANTES DE MEDICINA COM MAIORES PONTUAÇÕES NA ESCALA DE AUTOAVALIAÇÃO DE TDAH REALIZAM MAIOR TEMPO DE TELA E APRESENTAM MAIOR SINTOMAS DE ANSIEDADE: UM ESTUDO TRANSVERSAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Estudos mostram a ligação entre o uso prolongado de dispositivos eletrônicos e os sintomas de transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A principal razão para essa ligação é incerta, mas pode ser atribuída a mudanças repetitivas de atenção e multitarefa, prejudicando a função executiva. Estudantes de medicina estão entre os grupos com maior carga horária no contexto universitário. Além disso, a tecnologia pode tornar essa demanda ainda mais significativa. No entanto, pouco foi estudado sobre o assunto até o momento, podendo este colaborar no entendimento de comportamentos comuns no estudante de medicina.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar se estudantes de medicina com maior pontuação na escala de autoavaliação de sintomas de TDAH, apresentam maior tempo de exposição à tela, sintomas de ansiedade e menor tempo de atividade física.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal, realizado com estudantes de Medicina, com idade (#38)#8805;18 anos. Pessoas com diagnóstico prévio de TDAH foram excluídas. Um questionário online, o qual continha perguntas quanto a características demográficas, acadêmicas e médicas, tempo de tela diário, escala para autoavaliação de sintomas de TDAH (ASRS), sintomas de ansiedade (BAI) e atividade física (IPAQ). A análise estatística foi realizada com o software SPSS22 e o nível de significância adotado foi p(#60)0,05. Dados paramétricos são apresentados em média±desvio padrão, enquanto os dados não paramétricos em mediana interquartil.			
<b>RESULTADOS</b>	Noventa e nove estudantes de Medicina participaram da presente pesquisa. Alocamos os dados em dois grupos distintos (scores ASRS menores ou maiores). Em resumo, o grupo com menor pontuação ASRS demonstra menor tempo de tela (9,0 vs 11,5 horas por dia - p=0,0135) e menores sintomas de ansiedade (8,0 vs 15,5 pontos - p = 0,0003). Para as variáveis Tempo de Caminhada (120 x 70 minutos por dia - p = 0,11), Tempo de Atividade Física Vigorosa Moderada (135 x 90 minutos por dia - p = 0,34) e Tempo em comportamento Sedentário (7,1 x 8,0 horas por dia - p = 0,15), não houve diferenças entre os grupos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os insights obtidos a partir da análise comparativa aqui apresentada elucidam a intrincada relação entre uso de tecnologia e bem-estar físico e mental. Essas descobertas destacam a importância da implementação de intervenções destinadas à promoção de hábitos tecnológicos e de estilo de vida mais saudáveis entre estudantes universitários, principalmente aqueles em programas de alta demanda, como a Medicina.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Padovani RdC, Neufeld CB, Maltoni J, Barbosa LNF, et al. Vulnerability and psychological well-being of college student. Rev Bras Ter Cogn. 2014;10(1):02-10. Small GW, Lee J, Kaufman A, Jallil J, et al. Brain health consequences of digital technology use. Med Teach. 2020;22(2):179-187. Hewitt JK, Li X, Vanderloo LM, Keown-Stoneman CDG, et al. Screen Use and Mental Health Symptoms in Canadian Children and Youth During the COVID-19 Pandemic. PLoS One. 2021;4(12):e2140875. Belton S, Issartel J, Behan S, Goss H, Peers C. The Differential Impact of Screen Time on Children's Wellbeing. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(17):9143.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14138	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128561 - LUANA ANDRADE ARAGÃO MADUREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana Figueira da Hora		
<b>TITULO</b>	MUSEUS UNIVERSITÁRIOS EM SÃO PAULO E SEUS DESAFIOS SOCIAIS, OS CASOS DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – (MAE-USP) E DO MUSEU PAULISTA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A presente comunicação é parte de minha pesquisa de mestrado, ( que desenvolvo no Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas da Unisa). A pesquisa versa sobre a museologia social, isto é, sobre como esta Área do Conhecimento está vinculada à múltiplas vertentes sociais, a partir de uma metodologia interdisciplinar e plural.			
<b>OBJETIVOS</b>	Isto posto, busca apresentar ainda, quais são os principais pontos que viabilizam o desenvolvimento da sociedade por meio de inúmeras iniciativas promovidas pelos museus na atualidade. Portanto, o objetivo principal é mostrar as transformações ocorridas nestes locais ao longo de uma década e então, partindo de tal problemática, compreender os impactos deste período para estas instituições, bem como entender as tipologias dos museus, ou seja, se as práticas educacionais dos museus universitários e não universitários são similares ou em que aspecto se diferenciam.			
<b>METODOLOGIA</b>	Nesse sentido, a metodologia utilizada é de caráter qualitativo, pois se fundamenta nas pesquisas de Mário Chagas (2015), Camilo Vasconcellos (2019) e Ulpiano Bezerra de Meneses (1993), dentre outros, que discorrem fundamentalmente sobre a importância dos Museus, no que concerne tanto a formação das pessoas, quanto no que se associa ao progresso de uma determinada comunidade, (independentemente destas instituições serem de caráter universitário ou não). Em vista disso, se faz necessário evidenciarmos ainda, que as instituições museais não são mais como eram, pois fundamentam suas ações na Sociomuseologia, sendo assim, possibilitam práticas voltadas às dimensões culturais e históricas, por isso, é preponderante levar em conta que o museu do presente está centrado em ações que despertam nas pessoas uma consciência cultural.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSÕES</b>	Desta maneira, esta pesquisa é essencial, por que sem ela não é possível perceber como a museologia está estabelecida no cotidiano, no dia a dia das pessoas e como os museus se projetam na sociedade para apresentar ao público sua relevância em termos históricos, culturais e educacionais, afinal, o museu é feito por pessoas e para pessoas. Sem as instituições museológicas perdemos a noção de identidade, coletividade e de historicidade, ou seja, não podemos encontrar no passado a compreensão de quem somos no presente e principalmente de quem desejamos ser no futuro.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	CHAGAS, M. Há uma gota de sangue em cada museu. Chapecó, (SC): Argos, 2015. 139 p. MENESES, U. T. B. de. A problemática da identidade cultural nos museus: de objetivo (de ação) a objeto (de conhecimento). Anais do Museu Paulista Nova Série. Vol.1, 1993, 207 – 309. VASCONCELLOS, C. de M. Arqueologia e Educação Patrimonial: A experiência do MAE-USP. São Paulo: Revista CPC, n.27, 2019, 255 - 279			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14141	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4961706 - RENATA GOMES DOS REIS ALMEIDA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO E SEUS DESAFIOS NOS DIAS ATUAIS			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se tem discutido nos últimos tempos em relação ao Treinamento Desenvolvimento, atualmente, as grandes empresas investem nesta área dentro dos Recursos Humanos, pois é a melhor forma de melhorar o clima organizacional, já os treinamentos de liderança, por exemplo, podem ser um ótimo diferencial para líderes conduzirem melhor uma equipe, estabelecendo uma comunicação assertiva e humanizada. Sabe-se que recursos e estruturas adequadas são alguns dos desafios para criar programas de treinamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é elucidar a importância do treinamento e desenvolvimento de pessoas afim de reduzir problemas comportamentais na organização, extraindo potencialmente o melhor de cada um. O intuito é trazer excelentes resultados através do treinamento e desenvolvimento, mostrando que foram elevados a qualidade e produtividade mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se pesquisas bibliográficas e informações aprofundadas sobre o tema em questão, bem como consulta a sites e artigos da área.			
<b>RESULTADOS</b>	A falta de investimento no treinamento e desenvolvimento gera conflitos e até mesmo prejuízo para a empresa com perda de competitividade, não mantendo a empresa atualizada no mercado. Segundo Alves (2019), "Profissionais de qualidade, preparados, motivados e alinhados com a empresa, dedicados a conquistas de resultados e à construção de carreiras sólidas em parceria com as organizações onde atuam.". Sabendo-se que para ter sucesso em todo programa de Treinamento e Desenvolvimento o correto a se fazer é, avaliar cada colaborador e direcioná-lo conforme os resultados e interesses apresentados, trazendo assim melhor relacionamento e desenvolvimento da equipe em um modo geral. Segundo Slack (1997, p.667), afirma que: "Não é coincidência que muitos programas bem sucedidos têm um gerente de treinamento como um dos principais impulsionadores.". A importância do Treinamento e Desenvolvimento, para trazer aos funcionários oportunidade de adquirir conhecimentos, habilidades e desenvolve-las em prol do conhecimento da empresa, retornando em resultados competitivos para a organização.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se, portanto, que o treinamento e desenvolvimento é essencial para alcançar resultados positivos, como a redução de prejuízos e o aprimoramento da qualidade e entrega de resultados. Isso melhora o relacionamento geral, o desempenho em equipe e os resultados a longo prazo para a organização. O investimento em treinamento e desenvolvimento impulsiona carreiras sólidas em benefício da empresa, mantendo sempre a qualidade e os resultados desejados.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALVES, Flora "Associação Americana para o desenvolvimento de Talentos.". Disponível em: <a href="https://itforum.com.br/">https://itforum.com.br/</a> Acesso em: 07 de novembro de 2019. SLACK, Nigel - Administração da produção: "A Importância do Treinamento e Desenvolvimento na Empresa.". 1 ed. São Paulo, 1997. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14141	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4978595 - CAMILA PEREIRA DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO E SEUS DESAFIOS NOS DIAS ATUAIS			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se tem discutido nos últimos tempos em relação ao Treinamento Desenvolvimento, atualmente, as grandes empresas investem nesta área dentro dos Recursos Humanos, pois é a melhor forma de melhorar o clima organizacional, já os treinamentos de liderança, por exempli, podem ser um ótimo diferencial para líderes conduzirem melhor uma equipe, estabelecendo uma comunicação assertiva e humanizada. Sabe-se que recursos e estruturas adequadas são alguns dos desafios para criar programas de treinamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é elucidar a importância do treinamento e desenvolvimento de pessoas afim de reduzir problemas comportamentais na organização, extraindo potencialmente o melhor de cada um. O intuito é trazer excelentes resultados através do treinamento e desenvolvimento, mostrando que foram elevados a qualidade e produtividade mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se pesquisas bibliográficas e informações aprofundadas sobre o tema em questão, bem como consulta a sites e artigos da área.			
<b>RESULTADOS</b>	A falta de investimento no treinamento e desenvolvimento gera conflitos e até mesmo prejuízo para a empresa com perda de competitividade, não mantendo a empresa atualizada no mercado. Segundo Alves (2019), "Profissionais de qualidade, preparados, motivados e alinhados com a empresa, dedicados a conquistas de resultados e à construção de carreiras sólidas em parceria com as organizações onde atuam.". Sabendo-se que para ter sucesso em todo programa de Treinamento e Desenvolvimento o correto a se fazer é, avaliar cada colaborador e direcioná-lo conforme os resultados e interesses apresentados, trazendo assim melhor relacionamento e desenvolvimento da equipe em um modo geral. Segundo Slack (1997, p.667), afirma que: "Não é coincidência que muitos programas bem sucedidos têm um gerente de treinamento como um dos principais impulsionadores.". A importância do Treinamento e Desenvolvimento, para trazer aos funcionários oportunidade de adquirir conhecimentos, habilidades e desenvolve-las em prol do conhecimento da empresa, retornando em resultados competitivos para a organização.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se, portanto, que o treinamento e desenvolvimento é essencial para alcançar resultados positivos, como a redução de prejuízos e o aprimoramento da qualidade e entrega de resultados. Isso melhora o relacionamento geral, o desempenho em equipe e os resultados a longo prazo para a organização. O investimento em treinamento e desenvolvimento impulsiona carreiras sólidas em benefício da empresa, mantendo sempre a qualidade e os resultados desejados.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALVES, Flora "Associação Americana para o desenvolvimento de Talentos.". Disponível em: <a href="https://itforum.com.br/">https://itforum.com.br/</a> Acesso em: 07 de novembro de 2019. SLACK, Nigel - Administração da produção: "A Importância do Treinamento e Desenvolvimento na Empresa.". 1 ed. São Paulo, 1997. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14141	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4993667 - IGOR HAJ TACIANO MOUSSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO E SEUS DESAFIOS NOS DIAS ATUAIS			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se tem discutido nos últimos tempos em relação ao Treinamento Desenvolvimento, atualmente, as grandes empresas investem nesta área dentro dos Recursos Humanos, pois é a melhor forma de melhorar o clima organizacional, já os treinamentos de liderança, por exempli, podem ser um ótimo diferencial para líderes conduzirem melhor uma equipe, estabelecendo uma comunicação assertiva e humanizada. Sabe-se que recursos e estruturas adequadas são alguns dos desafios para criar programas de treinamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é elucidar a importância do treinamento e desenvolvimento de pessoas afim de reduzir problemas comportamentais na organização, extraindo potencialmente o melhor de cada um. O intuito é trazer excelentes resultados através do treinamento e desenvolvimento, mostrando que foram elevados a qualidade e produtividade mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se pesquisas bibliográficas e informações aprofundadas sobre o tema em questão, bem como consulta a sites e artigos da área.			
<b>RESULTADOS</b>	A falta de investimento no treinamento e desenvolvimento gera conflitos e até mesmo prejuízo para a empresa com perda de competitividade, não mantendo a empresa atualizada no mercado. Segundo Alves (2019), "Profissionais de qualidade, preparados, motivados e alinhados com a empresa, dedicados a conquistas de resultados e à construção de carreiras sólidas em parceria com as organizações onde atuam.". Sabendo-se que para ter sucesso em todo programa de Treinamento e Desenvolvimento o correto a se fazer é, avaliar cada colaborador e direcioná-lo conforme os resultados e interesses apresentados, trazendo assim melhor relacionamento e desenvolvimento da equipe em um modo geral. Segundo Slack (1997, p.667), afirma que: "Não é coincidência que muitos programas bem sucedidos têm um gerente de treinamento como um dos principais impulsionadores.". A importância do Treinamento e Desenvolvimento, para trazer aos funcionários oportunidade de adquirir conhecimentos, habilidades e desenvolve-las em prol do conhecimento da empresa, retornando em resultados competitivos para a organização.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se, portanto, que o treinamento e desenvolvimento é essencial para alcançar resultados positivos, como a redução de prejuízos e o aprimoramento da qualidade e entrega de resultados. Isso melhora o relacionamento geral, o desempenho em equipe e os resultados a longo prazo para a organização. O investimento em treinamento e desenvolvimento impulsiona carreiras sólidas em benefício da empresa, mantendo sempre a qualidade e os resultados desejados.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALVES, Flora "Associação Americana para o desenvolvimento de Talentos.". Disponível em: <a href="https://itforum.com.br/">https://itforum.com.br/</a> Acesso em: 07 de novembro de 2019. SLACK, Nigel - Administração da produção: "A Importância do Treinamento e Desenvolvimento na Empresa.". 1 ed. São Paulo, 1997. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14141	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5011841 - EVELLYN DAHANNE CAMARGO DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO E SEUS DESAFIOS NOS DIAS ATUAIS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Muito se tem discutido nos últimos tempos em relação ao Treinamento Desenvolvimento, atualmente, as grandes empresas investem nesta área dentro dos Recursos Humanos, pois é a melhor forma de melhorar o clima organizacional, já os treinamentos de liderança, por exemplo, podem ser um ótimo diferencial para líderes conduzirem melhor uma equipe, estabelecendo uma comunicação assertiva e humanizada. Sabe-se que recursos e estruturas adequadas são alguns dos desafios para criar programas de treinamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é elucidar a importância do treinamento e desenvolvimento de pessoas afim de reduzir problemas comportamentais na organização, extraindo potencialmente o melhor de cada um. O intuito é trazer excelentes resultados através do treinamento e desenvolvimento, mostrando que foram elevados a qualidade e produtividade mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se pesquisas bibliográficas e informações aprofundadas sobre o tema em questão, bem como consulta a sites e artigos da área.			
<b>RESULTADOS</b>	A falta de investimento no treinamento e desenvolvimento gera conflitos e até mesmo prejuízo para a empresa com perda de competitividade, não mantendo a empresa atualizada no mercado. Segundo Alves (2019), "Profissionais de qualidade, preparados, motivados e alinhados com a empresa, dedicados a conquistas de resultados e à construção de carreiras sólidas em parceria com as organizações onde atuam.". Sabendo-se que para ter sucesso em todo programa de Treinamento e Desenvolvimento o correto a se fazer é, avaliar cada colaborador e direcioná-lo conforme os resultados e interesses apresentados, trazendo assim melhor relacionamento e desenvolvimento da equipe em um modo geral. Segundo Slack (1997, p.667), afirma que: "Não é coincidência que muitos programas bem sucedidos têm um gerente de treinamento como um dos principais impulsionadores.". A importância do Treinamento e Desenvolvimento, para trazer aos funcionários oportunidade de adquirir conhecimentos, habilidades e desenvolve-las em prol do conhecimento da empresa, retornando em resultados competitivos para a organização.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se, portanto, que o treinamento e desenvolvimento é essencial para alcançar resultados positivos, como a redução de prejuízos e o aprimoramento da qualidade e entrega de resultados. Isso melhora o relacionamento geral, o desempenho em equipe e os resultados a longo prazo para a organização. O investimento em treinamento e desenvolvimento impulsiona carreiras sólidas em benefício da empresa, mantendo sempre a qualidade e os resultados desejados.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALVES, Flora "Associação Americana para o desenvolvimento de Talentos.". Disponível em: <a href="https://itforum.com.br/">https://itforum.com.br/</a> Acesso em: 07 de novembro de 2019. SLACK, Nigel - Administração da produção: "A Importância do Treinamento e Desenvolvimento na Empresa.". 1 ed. São Paulo, 1997. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14142	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4988621 - LUANA SILVA LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Importância do Treinamento e Desenvolvimento no Ambiente Corporativo			
<b>INTRODUCA O</b>	Este trabalho tem como argumento o treinamento e desenvolvimento e a sua importância para que não haja nenhum conflito entre a empresa e seus colaboradores. Todavia, será apresentada a importância do treinamento dos colaboradores e como seus desempenhos podem ser aprimorados, com foco principal no treinamento dos novos colaboradores.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é apresentar a importância do Treinamento e Desenvolvimento no ambiente corporativo e os benefícios para as organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a realização deste trabalho foram utilizadas fontes de pesquisa como artigos de Gestão de Pessoas e pesquisas bibliográficas.			
<b>RESULTADO S</b>	Durante o andamento desta pesquisa, observou-se que para maior adaptação e desenvolvimento dos colaboradores nas organizações é necessário aplicação do Treinamento e Desenvolvimento, não somente aprimorando os conhecimentos e habilidades dos colaboradores antigos, como também dos novos colaboradores. Para entender como o desenvolvimento é necessário nas organizações Chiavenato (2010, p. 362) aponta que "Desenvolver pessoas não é apenas dar-lhes informações para que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais eficientes naquilo que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação, ideias, conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficazes naquilo que fazem". Adquirir o treinamento como fonte de aprendizagem dos novos colaboradores é uma ferramenta importante para as organizações, trazendo qualidade nas funções e produtividade, também auxiliando que não ocorram conflitos de rivalidade, competitividade, estresse, pressão e falta de conhecimento sobre a empresa. Segundo Chiavenato (2014, p. 245) "O programa de desenvolvimento requer avaliação do desempenho e dos resultados alcançados e a identificação do potencial para fundamentar o treinamento". Para os colaboradores que se iniciam nas organizações, receber treinamentos definidos para suas funções é um recurso para o aperfeiçoamento de seus conhecimentos e para bom desempenho.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Neste trabalho abordou-se o tema de Treinamento e Desenvolvimento e a sua importância para que não haja nenhum tipo de conflito entre a empresa e seus colaboradores. Em resumo, o Treinamento e Desenvolvimento de novos colaboradores desempenha um papel crucial na prevenção de conflitos entre a empresa e seus funcionários. Ao fornecer orientação adequada, capacitação e integração, a empresa cria uma base sólida para novos membros da equipe. Isso não apenas aprimora as habilidades necessárias para o desempenho eficaz das funções, mas também estabelece expectativas claras e promove a compreensão do conhecimento sobre a organização.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração – 9ª Edição Barueri – SP: 2014. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas, 3ª Edição, totalmente revista e atualizada Rio de Janeiro: 2010. ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional, 11ª Edição – SP: 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14142	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4992903 - VITORIA CLARINDA BATISTA DOS SANTOS CARMO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Importância do Treinamento e Desenvolvimento no Ambiente Corporativo			
<b>INTRODUCAO</b>	Este trabalho tem como argumento o treinamento e desenvolvimento e a sua importância para que não haja nenhum conflito entre a empresa e seus colaboradores. Todavia, será apresentada a importância do treinamento dos colaboradores e como seus desempenhos podem ser aprimorados, com foco principal no treinamento dos novos colaboradores.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é apresentar a importância do Treinamento e Desenvolvimento no ambiente corporativo e os benefícios para as organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a realização deste trabalho foram utilizadas fontes de pesquisa como artigos de Gestão de Pessoas e pesquisas bibliográficas.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o andamento desta pesquisa, observou-se que para maior adaptação e desenvolvimento dos colaboradores nas organizações é necessária aplicação do Treinamento e Desenvolvimento, não somente aprimorando os conhecimentos e habilidades dos colaboradores antigos, como também dos novos colaboradores. Para entender como o desenvolvimento é necessário nas organizações Chiavenato (2010, p. 362) aponta que "Desenvolver pessoas não é apenas dar-lhes informações para que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais eficientes naquilo que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação, ideias, conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficazes naquilo que fazem". Adquirir o treinamento como fonte de aprendizagem dos novos colaboradores é uma ferramenta importante para as organizações, trazendo qualidade nas funções e produtividade, também auxiliando que não ocorram conflitos de rivalidade, competitividade, estresse, pressão e falta de conhecimento sobre a empresa. Segundo Chiavenato (2014, p. 245) "O programa de desenvolvimento requer avaliação do desempenho e dos resultados alcançados e a identificação do potencial para fundamentar o treinamento". Para os colaboradores que se iniciam nas organizações, receber treinamentos definidos para suas funções é um recurso para o aperfeiçoamento de seus conhecimentos e para bom desempenho.			
<b>CONCLUSOES</b>	Neste trabalho abordou-se o tema de Treinamento e Desenvolvimento e a sua importância para que não haja nenhum tipo de conflito entre a empresa e seus colaboradores. Em resumo, o Treinamento e Desenvolvimento de novos colaboradores desempenha um papel crucial na prevenção de conflitos entre a empresa e seus funcionários. Ao fornecer orientação adequada, capacitação e integração, a empresa cria uma base sólida para novos membros da equipe. Isso não apenas aprimora as habilidades necessárias para o desempenho eficaz das funções, mas também estabelece expectativas claras e promove a compreensão do conhecimento sobre a organização.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração – 9ª Edição Barueri – SP: 2014. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas, 3ª Edição, totalmente revista e atualizada Rio de Janeiro: 2010. ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional, 11ª Edição – SP: 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14143	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3815871 - BRUNA SILVA MESSIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O PAPEL DO LÍDER MENTOR NO ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES			
<b>INTRODUCAO</b>	O principal prejuízo que uma liderança ruim pode causar a uma empresa é o comprometimento do alcance dos resultados. Sem uma equipe suficientemente motivada, com baixa produtividade, conflitos e falta de comunicação e alinhamento, torna-se difícil entregar o que foi exigido e manter a empresa sustentável ou em crescimento. Por isso uma liderança ruim precisa ser combatida rapidamente antes que cause danos irreparáveis à empresa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é demonstrar a importância que uma boa liderança traz para a empresa financeiramente, ocasionando um clima organizacional mais agradável. Como objetivo específico com a análise dos fatores que levam a rotatividade de colaboradores por falta de uma boa liderança, e desmotivação aos colaboradores, buscam-se estratégias para melhorar a liderança implantando cursos, avaliações nas empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Neste artigo realizou-se uma pesquisa bibliográfica qualitativa, utilizando também artigos relacionados à área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	É essencial investir em treinamentos para os líderes, através desses treinamentos irá melhorar o relacionamento interpessoal entre os líderes e seus subordinados. Assim será automático o direcionamento de seus subordinados para resultados positivos. Segundo Lacombe (2008, p.349) "Liderança é conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações, para atingir objetivos e metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num conjunto coerente de ideias e princípios". Percebe-se que uma boa conduta na liderança faz com que os colaboradores tenham uma visão do futuro baseada num conjunto de ideias e princípios, atingindo os objetivos e metas das empresas. Chiavenato (2003, p. 122) define liderança como sendo um "processo que influencia e induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade e situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos". Observa-se que a necessidade de uma boa liderança para os colaboradores, faz com que os colaboradores se influenciam em seus líderes de forma positiva, fazendo com que o clima organizacional seja adequado e satisfatório para a produtividade e metas a serem atingidas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que uma boa liderança influencia no comportamento dos colaboradores, ampliando a visão de onde a equipe almeja chegar. Em suma a utilização de treinamentos servem para ajudar os líderes a trazerem resultados positivos, após os treinamentos os líderes começam a dar a devida atenção aos colaboradores, assim a produtividade da empresa começa a aumentar novamente e a rotatividade de colaboradores diminui, consequentemente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração, 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração princípios e tendências: Liderança e cultura organizacional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14143	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4870778 - MIRELLE RODRIGUES ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O PAPEL DO LÍDER MENTOR NO ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES			
<b>INTRODUCA O</b>	O principal prejuízo que uma liderança ruim pode causar a uma empresa é o comprometimento do alcance dos resultados. Sem uma equipe suficientemente motivada, com baixa produtividade, conflitos e falta de comunicação e alinhamento, torna-se difícil entregar o que foi exigido e manter a empresa sustentável ou em crescimento. Por isso uma liderança ruim precisa ser combatida rapidamente antes que cause danos irreparáveis à empresa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é demonstrar a importância que uma boa liderança traz para a empresa financeiramente, ocasionando um clima organizacional mais agradável. Como objetivo específico com a análise dos fatores que levam a rotatividade de colaboradores por falta de uma boa liderança, e desmotivação aos colaboradores, buscam-se estratégias para melhorar a liderança implantando cursos, avaliações nas empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Neste artigo realizou-se uma pesquisa bibliográfica qualitativa, utilizando também artigos relacionados à área de recursos humanos.			
<b>RESULTADO S</b>	É essencial investir em treinamentos para os líderes, através desses treinamentos irá melhorar o relacionamento interpessoal entre os líderes e seus subordinados. Assim será automático o direcionamento de seus subordinados para resultados positivos. Segundo Lacombe (2008, p.349) "Liderança é conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações, para atingir objetivos e metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num conjunto coerente de ideias e princípios". Percebe-se que uma boa conduta na liderança faz com que os colaboradores tenham uma visão do futuro baseada num conjunto de ideias e princípios, atingindo os objetivos e metas das empresas. Chiavenato (2003, p. 122) define liderança como sendo um "processo que influência e induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade e situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos". Observa-se que a necessidade de uma boa liderança para os colaboradores, faz com que os colaboradores se influenciam em seus líderes de forma positiva, fazendo com que o clima organizacional seja adequado e satisfatório para a produtividade e metas a serem atingidas.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que uma boa liderança influencia no comportamento dos colaboradores, ampliando a visão de onde a equipe almeja chegar. Em suma a utilização de treinamentos servem para ajudar os líderes a trazerem resultados positivos, após os treinamentos os líderes começam a dar a devida atenção aos colaboradores, assim a produtividade da empresa começa a aumentar novamente e a rotatividade de colaboradores diminui, conseqüentemente.			
<b>REFERENCIA S</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração, 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração princípios e tendências: Liderança e cultura organizacional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14143	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4886232 - FERNANDA CARDOSO SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O PAPEL DO LÍDER MENTOR NO ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES			
<b>INTRODUCAO</b>	O principal prejuízo que uma liderança ruim pode causar a uma empresa é o comprometimento do alcance dos resultados. Sem uma equipe suficientemente motivada, com baixa produtividade, conflitos e falta de comunicação e alinhamento, torna-se difícil entregar o que foi exigido e manter a empresa sustentável ou em crescimento. Por isso uma liderança ruim precisa ser combatida rapidamente antes que cause danos irreparáveis à empresa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é demonstrar a importância que uma boa liderança traz para a empresa financeiramente, ocasionando um clima organizacional mais agradável. Como objetivo específico com a análise dos fatores que levam a rotatividade de colaboradores por falta de uma boa liderança, e desmotivação aos colaboradores, buscam-se estratégias para melhorar a liderança implantando cursos, avaliações nas empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Neste artigo realizou-se uma pesquisa bibliográfica qualitativa, utilizando também artigos relacionados à área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	É essencial investir em treinamentos para os líderes, através desses treinamentos irá melhorar o relacionamento interpessoal entre os líderes e seus subordinados. Assim será automático o direcionamento de seus subordinados para resultados positivos. Segundo Lacombe (2008, p.349) "Liderança é conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações, para atingir objetivos e metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num conjunto coerente de ideias e princípios". Percebe-se que uma boa conduta na liderança faz com que os colaboradores tenham uma visão do futuro baseada num conjunto de ideias e princípios, atingindo os objetivos e metas das empresas. Chiavenato (2003, p. 122) define liderança como sendo um "processo que influencia e induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade e situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos". Observa-se que a necessidade de uma boa liderança para os colaboradores, faz com que os colaboradores se influenciam em seus líderes de forma positiva, fazendo com que o clima organizacional seja adequado e satisfatório para a produtividade e metas a serem atingidas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que uma boa liderança influencia no comportamento dos colaboradores, ampliando a visão de onde a equipe almeja chegar. Em suma a utilização de treinamentos servem para ajudar os líderes a trazerem resultados positivos, após os treinamentos os líderes começam a dar a devida atenção aos colaboradores, assim a produtividade da empresa começa a aumentar novamente e a rotatividade de colaboradores diminui, conseqüentemente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração, 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração princípios e tendências: Liderança e cultura organizacional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14144	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4697863 - VITORIA DA SILVA COUTINHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Plano de Cargos e Salários: Influências e Resultados			
<b>INTRODUCAO</b>	O plano de cargos e salários é um conjunto de diretrizes e políticas que define a estrutura de cargos e suas respectivas faixas salariais dentro de uma organização. Ele tem como objetivo estabelecer uma hierarquia e equilíbrio interno entre os cargos, garantindo a remuneração justa e adequada de acordo com as responsabilidades, competências e níveis hierárquicos. Portanto, é contudente analisar como este processo pode ser utilizado estrategicamente para atrair, reter e motivar os colaboradores, reduzindo o alto índice de turnover.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é realizar uma análise de como a falta de um plano de cargos e salários influencia na retenção, motivação e produtividade dos colaboradores. Como objetivos específicos é avaliado os fatores que levam a desmotivação e ao turnover, buscando soluções, estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para sua redução em benefício das organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração deste projeto, buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica e consultas a artigos, revistas da área .			
<b>RESULTADOS</b>	Durante as pesquisas, identificou-se que a falta de uma política clara de cargos e salários leva à um alto índice de turnover, prejudicando a produtividade e a competitividade das empresas. Verifica-se a necessidade de implementar um plano de cargos e salários para reter e motivar os talentos reduzindo a rotatividade de colaboradores. Chiavenato (1996), define a descrição de cargo, como o processo de relacionar o que o funcionário faz, como ele faz, sob quais condições ele faz e por que ele faz. Descrição de cargo é um documento escrito que identifica, descreve e definem um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. Entende-se que os colaboradores se desmotivam e procuram novas possibilidades de ocupação em outras empresas, a começar do momento que não se tem expectativa e/ou perspectiva dentro da organização. "Dentro deste grupo (segurança) da pirâmide da teoria de Maslow, encontram-se todas as necessidades que nos fornecem uma segurança e que nos fazem sentir protegidos, ao nos dar independência e autossuficiência." (GLOVER,2020). Logo, a motivação do colaborador está intimamente relacionada à sua segurança, portanto se não há, estabilidade, há risco da perda da produtividade, ou até mesmo o turnover.			
<b>CONCLUSOES</b>	Portanto, é possível concluir que os fatores que influenciam a desmotivação e o alto índice de turnover, estão relacionadas a insatisfação dos colaboradores diante da falta de expectativa ou perspectiva decorrido da falta de um plano definido de cargos e salários. Um alto índice de turnover, gera prejuízos financeiros e operacionais para as organizações uma vez que dificulta no cumprimento do planejamento estratégico, financeiro e operacional da empresa. Por outro lado, quando as empresas passam a estabelecer planos de carreira e salários justos, os colaboradores voltam-se a se sentir motivados tornando em atitudes de produtividade e consequentemente, em resultados.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATTO, I.: Recursos humanos. São Paulo: Atlas, 1996. GLOVER, Marina. Teoria motivacional Maslow. Disponível em: <a href="https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html">https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html</a> . Acesso em 19/08/2023 PIERRE, J. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Futura, 2007.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14144	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4858531 - RENATO DE OLIVEIRA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Plano de Cargos e Salários: Influências e Resultados			
<b>INTRODUCAO</b>	O plano de cargos e salários é um conjunto de diretrizes e políticas que define a estrutura de cargos e suas respectivas faixas salariais dentro de uma organização. Ele tem como objetivo estabelecer uma hierarquia e equilíbrio interno entre os cargos, garantindo a remuneração justa e adequada de acordo com as responsabilidades, competências e níveis hierárquicos. Portanto, é contudente analisar como este processo pode ser utilizado estrategicamente para atrair, reter e motivar os colaboradores, reduzindo o alto índice de turnover.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é realizar uma análise de como a falta de um plano de cargos e salários influencia na retenção, motivação e produtividade dos colaboradores. Como objetivos específicos é avaliado os fatores que levam a desmotivação e ao turnover, buscando soluções, estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para sua redução em benefício das organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração deste projeto, buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica e consultas a artigos, revistas da área .			
<b>RESULTADOS</b>	Durante as pesquisas, identificou-se que a falta de uma política clara de cargos e salários leva à um alto índice de turnover, prejudicando a produtividade e a competitividade das empresas. Verifica-se a necessidade de implementar um plano de cargos e salários para reter e motivar os talentos reduzindo a rotatividade de colaboradores. Chiavenato (1996), define a descrição de cargo, como o processo de relacionar o que o funcionário faz, como ele faz, sob quais condições ele faz e por que ele faz. Descrição de cargo é um documento escrito que identifica, descreve e definem um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. Entende-se que os colaboradores se desmotivam e procuram novas possibilidades de ocupação em outras empresas, a começar do momento que não se tem expectativa e/ou perspectiva dentro da organização. "Dentro deste grupo (segurança) da pirâmide da teoria de Maslow, encontram-se todas as necessidades que nos fornecem uma segurança e que nos fazem sentir protegidos, ao nos dar independência e autossuficiência." (GLOVER,2020). Logo, a motivação do colaborador está intimamente relacionada à sua segurança, portanto se não há, estabilidade, há risco da perda da produtividade, ou até mesmo o turnover.			
<b>CONCLUSOES</b>	Portanto, é possível concluir que os fatores que influenciam a desmotivação e o alto índice de turnover, estão relacionadas a insatisfação dos colaboradores diante da falta de expectativa ou perspectiva decorrido da falta de um plano definido de cargos e salários. Um alto índice de turnover, gera prejuízos financeiros e operacionais para as organizações uma vez que dificulta no cumprimento do planejamento estratégico, financeiro e operacional da empresa. Por outro lado, quando as empresas passam a estabelecer planos de carreira e salários justos, os colaboradores voltam-se a se sentir motivados tornando em atitudes de produtividade e consequentemente, em resultados.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATTO, I.: Recursos humanos. São Paulo: Atlas, 1996. GLOVER, Marina. Teoria motivacional Maslow. Disponível em: <a href="https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html">https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html</a> . Acesso em 19/08/2023 PIERRE, J. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Futura, 2007.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14144	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4860764 - MIRIAN NASCIMENTO MARCONDES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Plano de Cargos e Salários: Influências e Resultados			
<b>INTRODUCAO</b>	O plano de cargos e salários é um conjunto de diretrizes e políticas que define a estrutura de cargos e suas respectivas faixas salariais dentro de uma organização. Ele tem como objetivo estabelecer uma hierarquia e equilíbrio interno entre os cargos, garantindo a remuneração justa e adequada de acordo com as responsabilidades, competências e níveis hierárquicos. Portanto, é contudente analisar como este processo pode ser utilizado estrategicamente para atrair, reter e motivar os colaboradores, reduzindo o alto índice de turnover.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é realizar uma análise de como a falta de um plano de cargos e salários influencia na retenção, motivação e produtividade dos colaboradores. Como objetivos específicos é avaliado os fatores que levam a desmotivação e ao turnover, buscando soluções, estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para sua redução em benefício das organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração deste projeto, buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica e consultas a artigos, revistas da área .			
<b>RESULTADOS</b>	Durante as pesquisas, identificou-se que a falta de uma política clara de cargos e salários leva à um alto índice de turnover, prejudicando a produtividade e a competitividade das empresas. Verifica-se a necessidade de implementar um plano de cargos e salários para reter e motivar os talentos reduzindo a rotatividade de colaboradores. Chiavenato (1996), define a descrição de cargo, como o processo de relacionar o que o funcionário faz, como ele faz, sob quais condições ele faz e por que ele faz. Descrição de cargo é um documento escrito que identifica, descreve e definem um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. Entende-se que os colaboradores se desmotivam e procuram novas possibilidades de ocupação em outras empresas, a começar do momento que não se tem expectativa e/ou perspectiva dentro da organização. "Dentro deste grupo (segurança) da pirâmide da teoria de Maslow, encontram-se todas as necessidades que nos fornecem uma segurança e que nos fazem sentir protegidos, ao nos dar independência e autossuficiência." (GLOVER,2020). Logo, a motivação do colaborador está intimamente relacionada à sua segurança, portanto se não há, estabilidade, há risco da perda da produtividade, ou até mesmo o turnover.			
<b>CONCLUSOES</b>	Portanto, é possível concluir que os fatores que influenciam a desmotivação e o alto índice de turnover, estão relacionadas a insatisfação dos colaboradores diante da falta de expectativa ou perspectiva decorrido da falta de um plano definido de cargos e salários. Um alto índice de turnover, gera prejuízos financeiros e operacionais para as organizações uma vez que dificulta no cumprimento do planejamento estratégico, financeiro e operacional da empresa. Por outro lado, quando as empresas passam a estabelecer planos de carreira e salários justos, os colaboradores voltam-se a se sentir motivados tornando em atitudes de produtividade e consequentemente, em resultados.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATTO, I.: Recursos humanos. São Paulo: Atlas, 1996. GLOVER, Marina. Teoria motivacional Maslow. Disponível em: <a href="https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html">https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html</a> . Acesso em 19/08/2023 PIERRE, J. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Futura, 2007.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14144	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4975154 - MARIA EDUARDA SILVA DE SOUSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Plano de Cargos e Salários: Influências e Resultados			
<b>INTRODUCAO</b>	O plano de cargos e salários é um conjunto de diretrizes e políticas que define a estrutura de cargos e suas respectivas faixas salariais dentro de uma organização. Ele tem como objetivo estabelecer uma hierarquia e equilíbrio interno entre os cargos, garantindo a remuneração justa e adequada de acordo com as responsabilidades, competências e níveis hierárquicos. Portanto, é contudente analisar como este processo pode ser utilizado estrategicamente para atrair, reter e motivar os colaboradores, reduzindo o alto índice de turnover.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é realizar uma análise de como a falta de um plano de cargos e salários influencia na retenção, motivação e produtividade dos colaboradores. Como objetivos específicos é avaliado os fatores que levam a desmotivação e ao turnover, buscando soluções, estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para sua redução em benefício das organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração deste projeto, buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica e consultas a artigos, revistas da área .			
<b>RESULTADOS</b>	Durante as pesquisas, identificou-se que a falta de uma política clara de cargos e salários leva à um alto índice de turnover, prejudicando a produtividade e a competitividade das empresas. Verifica-se a necessidade de implementar um plano de cargos e salários para reter e motivar os talentos reduzindo a rotatividade de colaboradores. Chiavenato (1996), define a descrição de cargo, como o processo de relacionar o que o funcionário faz, como ele faz, sob quais condições ele faz e por que ele faz. Descrição de cargo é um documento escrito que identifica, descreve e definem um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. Entende-se que os colaboradores se desmotivam e procuram novas possibilidades de ocupação em outras empresas, a começar do momento que não se tem expectativa e/ou perspectiva dentro da organização. "Dentro deste grupo (segurança) da pirâmide da teoria de Maslow, encontram-se todas as necessidades que nos fornecem uma segurança e que nos fazem sentir protegidos, ao nos dar independência e autossuficiência." (GLOVER,2020). Logo, a motivação do colaborador está intimamente relacionada à sua segurança, portanto se não há, estabilidade, há risco da perda da produtividade, ou até mesmo o turnover.			
<b>CONCLUSOES</b>	Portanto, é possível concluir que os fatores que influenciam a desmotivação e o alto índice de turnover, estão relacionadas a insatisfação dos colaboradores diante da falta de expectativa ou perspectiva decorrido da falta de um plano definido de cargos e salários. Um alto índice de turnover, gera prejuízos financeiros e operacionais para as organizações uma vez que dificulta no cumprimento do planejamento estratégico, financeiro e operacional da empresa. Por outro lado, quando as empresas passam a estabelecer planos de carreira e salários justos, os colaboradores voltam-se a se sentir motivados tornando em atitudes de produtividade e consequentemente, em resultados.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATTO, I.: Recursos humanos. São Paulo: Atlas, 1996. GLOVER, Marina. Teoria motivacional Maslow. Disponível em: <a href="https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html">https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html</a> . Acesso em 19/08/2023 PIERRE, J. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Futura, 2007.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14144	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5002052 - LAURA BEATRIZ CARDOSO SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Plano de Cargos e Salários: Influências e Resultados			
<b>INTRODUCAO</b>	O plano de cargos e salários é um conjunto de diretrizes e políticas que define a estrutura de cargos e suas respectivas faixas salariais dentro de uma organização. Ele tem como objetivo estabelecer uma hierarquia e equilíbrio interno entre os cargos, garantindo a remuneração justa e adequada de acordo com as responsabilidades, competências e níveis hierárquicos. Portanto, é contudente analisar como este processo pode ser utilizado estrategicamente para atrair, reter e motivar os colaboradores, reduzindo o alto índice de turnover.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal deste projeto é realizar uma análise de como a falta de um plano de cargos e salários influencia na retenção, motivação e produtividade dos colaboradores. Como objetivos específicos é avaliado os fatores que levam a desmotivação e ao turnover, buscando soluções, estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para sua redução em benefício das organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração deste projeto, buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica e consultas a artigos, revistas da área .			
<b>RESULTADOS</b>	Durante as pesquisas, identificou-se que a falta de uma política clara de cargos e salários leva à um alto índice de turnover, prejudicando a produtividade e a competitividade das empresas. Verifica-se a necessidade de implementar um plano de cargos e salários para reter e motivar os talentos reduzindo a rotatividade de colaboradores. Chiavenato (1996), define a descrição de cargo, como o processo de relacionar o que o funcionário faz, como ele faz, sob quais condições ele faz e por que ele faz. Descrição de cargo é um documento escrito que identifica, descreve e definem um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. Entende-se que os colaboradores se desmotivam e procuram novas possibilidades de ocupação em outras empresas, a começar do momento que não se tem expectativa e/ou perspectiva dentro da organização. "Dentro deste grupo (segurança) da pirâmide da teoria de Maslow, encontram-se todas as necessidades que nos fornecem uma segurança e que nos fazem sentir protegidos, ao nos dar independência e autossuficiência." (GLOVER,2020). Logo, a motivação do colaborador está intimamente relacionada à sua segurança, portanto se não há, estabilidade, há risco da perda da produtividade, ou até mesmo o turnover.			
<b>CONCLUSOES</b>	Portanto, é possível concluir que os fatores que influenciam a desmotivação e o alto índice de turnover, estão relacionadas a insatisfação dos colaboradores diante da falta de expectativa ou perspectiva decorrido da falta de um plano definido de cargos e salários. Um alto índice de turnover, gera prejuízos financeiros e operacionais para as organizações uma vez que dificulta no cumprimento do planejamento estratégico, financeiro e operacional da empresa. Por outro lado, quando as empresas passam a estabelecer planos de carreira e salários justos, os colaboradores voltam-se a se sentir motivados tornando em atitudes de produtividade e consequentemente, em resultados.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATTO, I.: Recursos humanos. São Paulo: Atlas, 1996. GLOVER, Marina. Teoria motivacional Maslow. Disponível em: <a href="https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html">https://br.psicologia-online.com/teoria-motivacional-de-maslow-478.html</a> . Acesso em 19/08/2023 PIERRE, J. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Futura, 2007.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14145	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4853679 - ANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e desenvolvimento de pessoas: potencializando o crescimento e a performance organizacional			
<b>INTRODUCAO</b>	O treinamento é uma ferramenta essencial no mundo empresarial, permitindo que as organizações alcancem soluções eficazes para os problemas enfrentados diariamente. Por meio de um planejamento cuidadoso e direcionado, o treinamento se torna um recurso valioso para lidar com questões como faltas e atrasos no trabalho, falta de atualização tecnológica e lentidão na execução das tarefas. Anteriormente, o treinamento era visto apenas como o desenvolvimento de habilidades motoras individuais para uma tarefa específica. No entanto, atualmente, o treinamento se tornou uma responsabilidade gerencial de suma importância na busca pela rentabilidade das empresas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o impacto do treinamento e desenvolvimento nas organizações, avaliar as estratégias utilizadas pela empresa, investigar as necessidades dos colaboradores e as vantagens do treinamento para as organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa e consulta de artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica.			
<b>RESULTADOS</b>	Percebe-se durante a pesquisa que a falta de treinamento e desenvolvimento na empresa tem impactado negativamente o desempenho dos funcionários. De acordo com Macian (1987) "É importante destacar o levantamento das necessidades de treinamento, pois a partir do diagnóstico do mesmo será possível identificar qual o melhor programa de treinamento para desenvolver as habilidades, corrigir falhas e melhorar o desempenho." Esse trecho ressalta a importância de realizar um diagnóstico das necessidades de treinamento para elaborar um programa adequado, visando aprimorar habilidades e otimizar o desempenho dos indivíduos. Milkovich e Boudreau (2000) "Relatam o desenvolvimento como o processo de treinamento em longo prazo para aperfeiçoamento das habilidades e aptidões pessoais e profissionais." Diante dessas constatações verifica-se a importância do desenvolvimento dos empregados de uma organização como um processo de longo prazo para melhorar suas habilidades e motivações, visando torná-los membros valiosos da equipe no futuro, trazendo resultados profícuos para as organizações.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, este trabalho destacou a importância do treinamento no contexto organizacional, enfatizando sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento e sucesso das empresas. Ao investir em treinamentos adequados, as organizações garantem uma equipe qualificada, motivada e capaz de fornecer um atendimento de qualidade aos clientes, aumentando a produtividade. Além disso, o treinamento melhora o desempenho dos colaboradores, aumenta o conhecimento e ajuda no cumprimento eficiente das funções. Em síntese, a administração de recursos humanos e o investimento no desenvolvimento dos colaboradores são fundamentais para obter resultados satisfatórios e garantir o crescimento da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 MACIAN Disponível em : (#60) <a href="http://www.fanap.br/Repositorio/254.pdf">http://www.fanap.br/Repositorio/254.pdf</a> (#62) Acesso em : 28/08/2023 MILKOVICH e BOUDREAU Disponível em: (#60) <a href="https://administradores.com.br/artigos/a-importancia-do-treinamento-e-desenvolvimento-na-empresa">https://administradores.com.br/artigos/a-importancia-do-treinamento-e-desenvolvimento-na-empresa</a> (#62) Acesso em : 28/08/2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14145	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4865642 - MARIA HELOISA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e desenvolvimento de pessoas: potencializando o crescimento e a performance organizacional			
<b>INTRODUCAO</b>	O treinamento é uma ferramenta essencial no mundo empresarial, permitindo que as organizações alcancem soluções eficazes para os problemas enfrentados diariamente. Por meio de um planejamento cuidadoso e direcionado, o treinamento se torna um recurso valioso para lidar com questões como faltas e atrasos no trabalho, falta de atualização tecnológica e lentidão na execução das tarefas. Anteriormente, o treinamento era visto apenas como o desenvolvimento de habilidades motoras individuais para uma tarefa específica. No entanto, atualmente, o treinamento se tornou uma responsabilidade gerencial de suma importância na busca pela rentabilidade das empresas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o impacto do treinamento e desenvolvimento nas organizações, avaliar as estratégias utilizadas pela empresa, investigar as necessidades dos colaboradores e as vantagens do treinamento para as organizações.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa e consulta de artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica.			
<b>RESULTADOS</b>	Percebe-se durante a pesquisa que a falta de treinamento e desenvolvimento na empresa tem impactado negativamente o desempenho dos funcionários. De acordo com Macian (1987) "É importante destacar o levantamento das necessidades de treinamento, pois a partir do diagnóstico do mesmo será possível identificar qual o melhor programa de treinamento para desenvolver as habilidades, corrigir falhas e melhorar o desempenho." Esse trecho ressalta a importância de realizar um diagnóstico das necessidades de treinamento para elaborar um programa adequado, visando aprimorar habilidades e otimizar o desempenho dos indivíduos. Milkovich e Boudreau (2000) "Relatam o desenvolvimento como o processo de treinamento em longo prazo para aperfeiçoamento das habilidades e aptidões pessoais e profissionais." Diante dessas constatações verifica-se a importância do desenvolvimento dos empregados de uma organização como um processo de longo prazo para melhorar suas habilidades e motivações, visando torná-los membros valiosos da equipe no futuro, trazendo resultados profícuos para as organizações.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, este trabalho destacou a importância do treinamento no contexto organizacional, enfatizando sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento e sucesso das empresas. Ao investir em treinamentos adequados, as organizações garantem uma equipe qualificada, motivada e capaz de fornecer um atendimento de qualidade aos clientes, aumentando a produtividade. Além disso, o treinamento melhora o desempenho dos colaboradores, aumenta o conhecimento e ajuda no cumprimento eficiente das funções. Em síntese, a administração de recursos humanos e o investimento no desenvolvimento dos colaboradores são fundamentais para obter resultados satisfatórios e garantir o crescimento da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 MACIAN Disponível em : (#60) <a href="http://www.fanap.br/Repositorio/254.pdf">http://www.fanap.br/Repositorio/254.pdf</a> (#62) Acesso em : 28/08/2023 MILKOVICH e BOUDREAU Disponível em: (#60) <a href="https://administradores.com.br/artigos/a-importancia-do-treinamento-e-desenvolvimento-na-empresa">https://administradores.com.br/artigos/a-importancia-do-treinamento-e-desenvolvimento-na-empresa</a> (#62) Acesso em : 28/08/2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14146	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4964934 - EUGENIA CARLA SILVA DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	MÁ COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: SUPERANDO DESAFIOS E POTENCIALIZANDO RESULTADOS			
<b>INTRODUCAO</b>	A má comunicação entre gestores e funcionários vêm sendo motivo de grandes problemas dentro da organização, é possível identificar causas para esse problema, dentre eles falta de sistema eficiente para comunicar informações e pouca habilidade de comunicação dos gestores. Nesse contexto, torna-se essencial analisar o processo de comunicação, como ocorre e quais medidas podem ser implementadas para mitigar os desafios associados à essa comunicação inadequada.			
<b>OBJETIVOS</b>	O Objetivo do projeto é analisar e apresentar a má comunicação entre gestores e colaboradores, analisando também o que causa a má comunicação, verificando também o que pode ser realizado para minimizar este problema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se estabelecer a Base Teórica por meio da análise Bibliográfica qualitativa, incluindo também a revisão de periódicos eletrônicos relacionados ao campo de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao longo desse estudo, constatou-se que a carência de comunicação entre gestores e funcionários pode ter impactos negativos na produtividade, motivação e satisfação no trabalho. Ao entender as desvantagens da comunicação e garantir que as informações sejam compartilhadas de forma clara e eficaz. Segundo Oliveira (2016), "a comunicação é essencial para garantir que a informação certa chegue aos tomadores de decisão no momento certo". A medida que a tecnologia avança, cresce o número de organizações que adotam ferramentas tecnológicas para aprimorar a comunicação entre gestores e funcionários. De acordo com Ferreira (2017), "os Softwares de gestão de projetos permitem que gestores e funcionários trabalhem em conjunto em um mesmo projeto, compartilhando informações e atualizações em tempo real". Segundo a pesquisa conduzida em 2022 pela Associação Brasileira de comunicação Empresarial (Aberje,2023), 70% das empresas identificaram que engajar os gestores como comunicadores é a tarefa mais desafiadora em relação a comunicação interna. Com base nesses dados, fica evidente a relevância de envolver os colaboradores no cotidiano das organizações, o que sua vez, leva a um aumento na melhoria da comunicação dos colaboradores. Nesse contexto, o investimento em ferramentas de comunicação interna emerge como um aliado poderoso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Após a análise teórica e metodológica, fica claro que a ausência de comunicação eficaz entre gestores e funcionários é um problema que prejudica a eficiência e a produtividade das organizações. Espera-se que seja possível identificar as melhores práticas de comunicação com base em tecnologias e sugerir soluções. A ideia subjacente é contribuir para o desenvolvimento de organizações mais eficientes e produtivas, onde a comunicação seja melhorada, promovendo assim, ambientes de trabalho mais colaborativo e saudável.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABERJE, Publicação de artigos científicos. Prática de pesquisa, Abril. 2023 Disponível em <a href="http://rhpravoce.com.br/falhas-na-comunicacao-assombram-nas-relacoes-nas-empresas">http://rhpravoce.com.br/falhas-na-comunicacao-assombram-nas-relacoes-nas-empresas</a> . Acesso em 04/09/2023. FERREIRA, Lucas. 7 ferramentas de gestão de projetos para melhorar a produtividade da sua equipe. Jornal do empreendedor, 2017 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração de sistemas de informações: uma abordagem interdisciplinar. Atlas,2016			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14146	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4970578 - GABRIELA SACRAMENTO MORAIS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	MÁ COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: SUPERANDO DESAFIOS E POTENCIALIZANDO RESULTADOS			
<b>INTRODUCAO</b>	A má comunicação entre gestores e funcionários vêm sendo motivo de grandes problemas dentro da organização, é possível identificar causas para esse problema, dentre eles falta de sistema eficiente para comunicar informações e pouca habilidade de comunicação dos gestores. Nesse contexto, torna-se essencial analisar o processo de comunicação, como ocorre e quais medidas podem ser implementadas para mitigar os desafios associados à essa comunicação inadequada.			
<b>OBJETIVOS</b>	O Objetivo do projeto é analisar e apresentar a má comunicação entre gestores e colaboradores, analisando também o que causa a má comunicação, verificando também o que pode ser realizado para minimizar este problema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se estabelecer a Base Teórica por meio da análise Bibliográfica qualitativa, incluindo também a revisão de periódicos eletrônicos relacionados ao campo de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao longo desse estudo, constatou-se que a carência de comunicação entre gestores e funcionários pode ter impactos negativos na produtividade, motivação e satisfação no trabalho. Ao entender as desvantagens da comunicação e garantir que as informações sejam compartilhadas de forma clara e eficaz. Segundo Oliveira (2016), "a comunicação é essencial para garantir que a informação certa chegue aos tomadores de decisão no momento certo". A medida que a tecnologia avança, cresce o número de organizações que adotam ferramentas tecnológicas para aprimorar a comunicação entre gestores e funcionários. De acordo com Ferreira (2017), "os Softwares de gestão de projetos permitem que gestores e funcionários trabalhem em conjunto em um mesmo projeto, compartilhando informações e atualizações em tempo real". Segundo a pesquisa conduzida em 2022 pela Associação Brasileira de comunicação Empresarial (Aberje,2023), 70% das empresas identificaram que engajar os gestores como comunicadores é a tarefa mais desafiadora em relação a comunicação interna. Com base nesses dados, fica evidente a relevância de envolver os colaboradores no cotidiano das organizações, o que sua vez, leva a um aumento na melhoria da comunicação dos colaboradores. Nesse contexto, o investimento em ferramentas de comunicação interna emerge como um aliado poderoso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Após a análise teórica e metodológica, fica claro que a ausência de comunicação eficaz entre gestores e funcionários é um problema que prejudica a eficiência e a produtividade das organizações. Espera-se que seja possível identificar as melhores práticas de comunicação com base em tecnologias e sugerir soluções. A ideia subjacente é contribuir para o desenvolvimento de organizações mais eficientes e produtivas, onde a comunicação seja melhorada, promovendo assim, ambientes de trabalho mais colaborativo e saudável.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABERJE, Publicação de artigos científicos. Prática de pesquisa, Abril. 2023 Disponível em <a href="http://rhpravoce.com.br/falhas-na-comunicacao-assombram-nas-relacoes-nas-empresas">http://rhpravoce.com.br/falhas-na-comunicacao-assombram-nas-relacoes-nas-empresas</a> . Acesso em 04/09/2023. FERREIRA, Lucas. 7 ferramentas de gestão de projetos para melhorar a produtividade da sua equipe. Jornal do empreendedor, 2017 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração de sistemas de informações: uma abordagem interdisciplinar. Atlas,2016			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14146	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4993357 - JESSICA AMORIM DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	MÁ COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: SUPERANDO DESAFIOS E POTENCIALIZANDO RESULTADOS			
<b>INTRODUCAO</b>	A má comunicação entre gestores e funcionários vêm sendo motivo de grandes problemas dentro da organização, é possível identificar causas para esse problema, dentre eles falta de sistema eficiente para comunicar informações e pouca habilidade de comunicação dos gestores. Nesse contexto, torna-se essencial analisar o processo de comunicação, como ocorre e quais medidas podem ser implementadas para mitigar os desafios associados à essa comunicação inadequada.			
<b>OBJETIVOS</b>	O Objetivo do projeto é analisar e apresentar a má comunicação entre gestores e colaboradores, analisando também o que causa a má comunicação, verificando também o que pode ser realizado para minimizar este problema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se estabelecer a Base Teórica por meio da análise Bibliográfica qualitativa, incluindo também a revisão de periódicos eletrônicos relacionados ao campo de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao longo desse estudo, constatou-se que a carência de comunicação entre gestores e funcionários pode ter impactos negativos na produtividade, motivação e satisfação no trabalho. Ao entender as desvantagens da comunicação e garantir que as informações sejam compartilhadas de forma clara e eficaz. Segundo Oliveira (2016), "a comunicação é essencial para garantir que a informação certa chegue aos tomadores de decisão no momento certo". A medida que a tecnologia avança, cresce o número de organizações que adotam ferramentas tecnológicas para aprimorar a comunicação entre gestores e funcionários. De acordo com Ferreira (2017), "os Softwares de gestão de projetos permitem que gestores e funcionários trabalhem em conjunto em um mesmo projeto, compartilhando informações e atualizações em tempo real". Segundo a pesquisa conduzida em 2022 pela Associação Brasileira de comunicação Empresarial (Aberje,2023), 70% das empresas identificaram que engajar os gestores como comunicadores é a tarefa mais desafiadora em relação a comunicação interna. Com base nesses dados, fica evidente a relevância de envolver os colaboradores no cotidiano das organizações, o que sua vez, leva a um aumento na melhoria da comunicação dos colaboradores. Nesse contexto, o investimento em ferramentas de comunicação interna emerge como um aliado poderoso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Após a análise teórica e metodológica, fica claro que a ausência de comunicação eficaz entre gestores e funcionários é um problema que prejudica a eficiência e a produtividade das organizações. Espera-se que seja possível identificar as melhores práticas de comunicação com base em tecnologias e sugerir soluções. A ideia subjacente é contribuir para o desenvolvimento de organizações mais eficientes e produtivas, onde a comunicação seja melhorada, promovendo assim, ambientes de trabalho mais colaborativo e saudável.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABERJE, Publicação de artigos científicos. Prática de pesquisa, Abril. 2023 Disponível em <a href="http://rhpravoce.com.br/falhas-na-comunicacao-assombram-nas-relacoes-nas-empresas">http://rhpravoce.com.br/falhas-na-comunicacao-assombram-nas-relacoes-nas-empresas</a> . Acesso em 04/09/2023. FERREIRA, Lucas. 7 ferramentas de gestão de projetos para melhorar a produtividade da sua equipe. Jornal do empreendedor, 2017 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração de sistemas de informações: uma abordagem interdisciplinar. Atlas,2016			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14147	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4834682 - WELTON EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Recrutamento e seleção: A chave para o sucesso ou declínio das organizações			
<b>INTRODUCAO</b>	Diante do cenário cada vez mais competitivo, a chave de sucesso de uma empresa passa inevitavelmente pela qualidade de sua equipe, logo o recrutamento e seleção se apresenta como um processo fundamental, que serve como ponte entre os talentos disponíveis no mercado e as vagas abertas na organização.			
<b>OBJETIVOS</b>	Busca-se como objetivo principal deste trabalho, a conscientização da importância de recrutar e selecionar pessoas da forma correta, e como esse processo pode influenciar diretamente o desempenho de uma organização, levando a mesma ao sucesso ou ao declínio.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho consiste em um estudo de revisão da literatura, sobre recrutamento e seleção, baseando-se, nos dados bibliográficos e pesquisas em artigos e revistas da área.			
<b>RESULTADOS</b>	O ponto de partida de uma empresa para alcançar o sucesso ou seu declínio passa pelo processo de recrutamento e seleção. O recrutamento é um processo organizacional que convida pessoas que se encontram no mercado de mão-de-obra para participarem de um processo de seleção na empresa, já a seleção tem como objetivo escolher, entre os candidatos atraídos pelo recrutamento, aqueles que correspondam ao perfil do cargo desejado pela empresa. "É preciso muita estratégia e planejamento para encontrar ótimas pessoas para ingressar na empresa na hora de preencher uma vaga. Isso significa que processos falhos de recrutamento e seleção podem ter sérias consequências. Além de criar uma situação desagradável para os novos profissionais e para a organização, contratações erradas podem gerar despesas desnecessárias e custos de tempo que não devem ser desconsiderados" (DORNELES 2022). Tudo isso nos traz a consciência de como um processo de recrutamento e seleção tem influência direta no desempenho da empresa, trazendo consequências boas ou ruins. Por fim, Chiavenato (2010, p.41) afirma que "as pessoas constituem o principal ativo de uma organização, por este motivo, faz-se necessário às empresas estarem mais conscientes e atentas para os seus funcionários. "levando em conta que são as pessoas que levam a organização ao sucesso ou ao declínio por intermédio de suas habilidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	De acordo com as informações levantadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho, pode-se concluir que, ao se tomar as pessoas como ponto de partida de sucesso de toda e qualquer organização, torna-se fundamental conhecer profundamente, termos definidos e padronizados de recrutamento e seleção. O profissional de RH, de Recrutamento e seleção, entre outras diversas nomenclaturas existentes para esse cargo, deve ter em mãos e saber como utilizar as inúmeras ferramentas e os instrumentos para poder adequar a pessoa certa ao lugar certo.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. DORNELES, Gessica. Quais os impactos negativos em um recrutamento e seleção. 2022. PERRONI- consultoria em recursos humanos. Disponível em: <a href="https://perroniconsultoria.com/blog/quais-os-1-impactos-negativos-em-um-recrutamento-e-selecao-falho/">https://perroniconsultoria.com/blog/quais-os-1-impactos-negativos-em-um-recrutamento-e-selecao-falho/</a> . Acesso em: 19 ago. 2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14148	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4934318 - LETICIA DE SOUZA MACHADO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Falta do departamento de Recursos Humanos: Causas e Consequências			
<b>INTRODUCAO</b>	Ao longo do tempo, a área de Recursos Humanos passou por diversas mudanças quanto ao seu papel nas empresas, liderando e gerenciando grandes projetos que se fazem necessários, ajudando também as empresas a crescerem. A falta do departamento de Recursos Humanos na corporação traz consequências negativas, pois impacta diretamente nos funcionários e clientes, resultando em queda na lucratividade ou no crescimento da empresa. Para que isso não ocorra, são necessárias atitudes de inovação, visão e condutas diferenciadas por parte dos gestores, diante dos processos de qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoas, pois dessa forma, a criação de um departamento de Recursos humanos ajudará na redução de problemas a serem resolvidos a curto, médio e longo prazo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal é analisar a importância da área de Recursos Humanos para a relação empresa e empregado, principalmente na definição de política organizacional. Como objetivos específicos há de orientar sobre a relevância da área, implantação e demonstrar o poder de engajamento e a melhoria do clima organizacional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procuramos prover a fundamentação teórica por meio de pesquisas bibliográficas qualitativas e consultas a artigos na área de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ter uma pequena empresa não impede o microempresário de investir em oferecer o melhor ambiente de trabalho para os colaboradores. E nesse sentido, pensar em um departamento de Recursos Humanos para atender às demandas de gestão de pessoas deixou de ser privilégio apenas nas grandes corporações. Este tipo de investimento na área, reflete diretamente no sucesso e na longevidade da empresa. Isso acontece porque uma das principais características de um bom administrador é levar em consideração que a empresa é composta por pessoas. Segundo Chiavenato (2004) "Separar o trabalho da existência das pessoas é muito difícil, senão quase impossível, em face da importância e do impacto que provoca nelas. Assim, as pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais." Percebe-se que a gestão de pessoas é pautada pela preocupação e o cuidado na relação entre o empregador e seus empregados. Em uma matéria no site Segs (2023) "Harvard Business comprova que em relação aos resultados econômicos, empresas que contam com boas práticas de Recursos Humanos apresentam um desempenho de 51% à frente de outras instituições". Compreendemos assim que a ação do Recursos Humanos na instituição pode alcançar objetivos que consigam melhoria no engajamento, além da relevância da área de Recursos Humanos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A função estratégica da área de Recursos Humanos é a de assegurar o engajamento da empresa através de pessoas. Qualquer empresa que necessite de pessoas empenhadas em suas funções deve ter o apoio do Recursos Humanos no desenvolvimento estrutural de todas as áreas necessárias na empresa. Este processo, quando bem conduzido, reduz a probabilidade de contratações questionáveis, pessoas desmotivadas e saídas inesperadas, além de prejuízos a empresa de curto e longo prazo.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. SEGS. disponível em: <a href="https://www.segs.com.br/seguros">https://www.segs.com.br/seguros</a> acesso em: 03 set 2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14148	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4990765 - JULIANA GODOI DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Falta do departamento de Recursos Humanos: Causas e Consequências			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Ao longo do tempo, a área de Recursos Humanos passou por diversas mudanças quanto ao seu papel nas empresas, liderando e gerenciando grandes projetos que se fazem necessários, ajudando também as empresas a crescerem. A falta do departamento de Recursos Humanos na corporação traz consequências negativas, pois impacta diretamente nos funcionários e clientes, resultando em queda na lucratividade ou no crescimento da empresa. Para que isso não ocorra, são necessárias atitudes de inovação, visão e condutas diferenciadas por parte dos gestores, diante dos processos de qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoas, pois dessa forma, a criação de um departamento de Recursos humanos ajudará na redução de problemas a serem resolvidos a curto, médio e longo prazo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal é analisar a importância da área de Recursos Humanos para a relação empresa e empregado, principalmente na definição de política organizacional. Como objetivos específicos há de orientar sobre a relevância da área, implantação e demonstrar o poder de engajamento e a melhoria do clima organizacional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procuramos prover a fundamentação teórica por meio de pesquisas bibliográficas qualitativas e consultas a artigos na área de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ter uma pequena empresa não impede o microempresário de investir em oferecer o melhor ambiente de trabalho para os colaboradores. E nesse sentido, pensar em um departamento de Recursos Humanos para atender às demandas de gestão de pessoas deixou de ser privilégio apenas nas grandes corporações. Este tipo de investimento na área, reflete diretamente no sucesso e na longevidade da empresa. Isso acontece porque uma das principais características de um bom administrador é levar em consideração que a empresa é composta por pessoas. Segundo Chiavenato (2004) "Separar o trabalho da existência das pessoas é muito difícil, senão quase impossível, em face da importância e do impacto que provoca nelas. Assim, as pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais." Percebe-se que a gestão de pessoas é pautada pela preocupação e o cuidado na relação entre o empregador e seus empregados. Em uma matéria no site Segs (2023) "Harvard Business comprova que em relação aos resultados econômicos, empresas que contam com boas práticas de Recursos Humanos apresentam um desempenho de 51% à frente de outras instituições". Compreendemos assim que a ação do Recursos Humanos na instituição pode alcançar objetivos que consigam melhoria no engajamento, além da relevância da área de Recursos Humanos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A função estratégica da área de Recursos Humanos é a de assegurar o engajamento da empresa através de pessoas. Qualquer empresa que necessite de pessoas empenhadas em suas funções deve ter o apoio do Recursos Humanos no desenvolvimento estrutural de todas as áreas necessárias na empresa. Este processo, quando bem conduzido, reduz a probabilidade de contratações questionáveis, pessoas desmotivadas e saídas inesperadas, além de prejuízos a empresa de curto e longo prazo.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. SEGS. disponível em: <a href="https://www.segs.com.br/seguros">https://www.segs.com.br/seguros</a> acesso em: 03 set 2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14148	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4999517 - AMANDA LOPES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Falta do departamento de Recursos Humanos: Causas e Consequências			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p> Ao longo do tempo, a área de Recursos Humanos passou por diversas mudanças quanto ao seu papel nas empresas, liderando e gerenciando grandes projetos que se fazem necessários, ajudando também as empresas a crescerem. A falta do departamento de Recursos Humanos na corporação traz consequências negativas, pois impacta diretamente nos funcionários e clientes, resultando em queda na lucratividade ou no crescimento da empresa. Para que isso não ocorra, são necessárias atitudes de inovação, visão e condutas diferenciadas por parte dos gestores, diante dos processos de qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoas, pois dessa forma, a criação de um departamento de Recursos humanos ajudará na redução de problemas a serem resolvidos a curto, médio e longo prazo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p> O objetivo principal é analisar a importância da área de Recursos Humanos para a relação empresa e empregado, principalmente na definição de política organizacional. Como objetivos específicos há de orientar sobre a relevância da área, implantação e demonstrar o poder de engajamento e a melhoria do clima organizacional.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p> Procuramos prover a fundamentação teórica por meio de pesquisas bibliográficas qualitativas e consultas a artigos na área de Recursos Humanos.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p> Ter uma pequena empresa não impede o microempresário de investir em oferecer o melhor ambiente de trabalho para os colaboradores. E nesse sentido, pensar em um departamento de Recursos Humanos para atender às demandas de gestão de pessoas deixou de ser privilégio apenas nas grandes corporações. Este tipo de investimento na área, reflete diretamente no sucesso e na longevidade da empresa. Isso acontece porque uma das principais características de um bom administrador é levar em consideração que a empresa é composta por pessoas. Segundo Chiavenato (2004) "Separar o trabalho da existência das pessoas é muito difícil, senão quase impossível, em face da importância e do impacto que provoca nelas. Assim, as pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais." Percebe-se que a gestão de pessoas é pautada pela preocupação e o cuidado na relação entre o empregador e seus empregados. Em uma matéria no site Segs (2023) "Harvard Business comprova que em relação aos resultados econômicos, empresas que contam com boas práticas de Recursos Humanos apresentam um desempenho de 51% à frente de outras instituições". Compreendemos assim que a ação do Recursos Humanos na instituição pode alcançar objetivos que consigam melhoria no engajamento, além da relevância da área de Recursos Humanos.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p> A função estratégica da área de Recursos Humanos é a de assegurar o engajamento da empresa através de pessoas. Qualquer empresa que necessite de pessoas empenhadas em suas funções deve ter o apoio do Recursos Humanos no desenvolvimento estrutural de todas as áreas necessárias na empresa. Este processo, quando bem conduzido, reduz a probabilidade de contratações questionáveis, pessoas desmotivadas e saídas inesperadas, além de prejuízos a empresa de curto e longo prazo.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p> ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. SEGS. disponível em: <a href="https://www.segs.com.br/seguros">https://www.segs.com.br/seguros</a> acesso em: 03 set 2023</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14148	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5025389 - BIANCA PARTEZANI OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Falta do departamento de Recursos Humanos: Causas e Consequências			
<b>INTRODUCAO</b>	Ao longo do tempo, a área de Recursos Humanos passou por diversas mudanças quanto ao seu papel nas empresas, liderando e gerenciando grandes projetos que se fazem necessários, ajudando também as empresas a crescerem. A falta do departamento de Recursos Humanos na corporação traz consequências negativas, pois impacta diretamente nos funcionários e clientes, resultando em queda na lucratividade ou no crescimento da empresa. Para que isso não ocorra, são necessárias atitudes de inovação, visão e condutas diferenciadas por parte dos gestores, diante dos processos de qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoas, pois dessa forma, a criação de um departamento de Recursos humanos ajudará na redução de problemas a serem resolvidos a curto, médio e longo prazo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal é analisar a importância da área de Recursos Humanos para a relação empresa e empregado, principalmente na definição de política organizacional. Como objetivos específicos há de orientar sobre a relevância da área, implantação e demonstrar o poder de engajamento e a melhoria do clima organizacional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procuramos prover a fundamentação teórica por meio de pesquisas bibliográficas qualitativas e consultas a artigos na área de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ter uma pequena empresa não impede o microempresário de investir em oferecer o melhor ambiente de trabalho para os colaboradores. E nesse sentido, pensar em um departamento de Recursos Humanos para atender às demandas de gestão de pessoas deixou de ser privilégio apenas nas grandes corporações. Este tipo de investimento na área, reflete diretamente no sucesso e na longevidade da empresa. Isso acontece porque uma das principais características de um bom administrador é levar em consideração que a empresa é composta por pessoas. Segundo Chiavenato (2004) "Separar o trabalho da existência das pessoas é muito difícil, senão quase impossível, em face da importância e do impacto que provoca nelas. Assim, as pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais." Percebe-se que a gestão de pessoas é pautada pela preocupação e o cuidado na relação entre o empregador e seus empregados. Em uma matéria no site Segs (2023) "Harvard Business comprova que em relação aos resultados econômicos, empresas que contam com boas práticas de Recursos Humanos apresentam um desempenho de 51% à frente de outras instituições". Compreendemos assim que a ação do Recursos Humanos na instituição pode alcançar objetivos que consigam melhoria no engajamento, além da relevância da área de Recursos Humanos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A função estratégica da área de Recursos Humanos é a de assegurar o engajamento da empresa através de pessoas. Qualquer empresa que necessite de pessoas empenhadas em suas funções deve ter o apoio do Recursos Humanos no desenvolvimento estrutural de todas as áreas necessárias na empresa. Este processo, quando bem conduzido, reduz a probabilidade de contratações questionáveis, pessoas desmotivadas e saídas inesperadas, além de prejuízos a empresa de curto e longo prazo.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. SEGS. disponível em: <a href="https://www.segs.com.br/segueros">https://www.segs.com.br/segueros</a> acesso em: 03 set 2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14149	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4083741 - RAFAELA NOGUEIRA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Gestão de conflitos interpessoais: causas e soluções			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de clareza e comunicação quanto às funções e o que se espera de colaboradores e lideranças gera improdutividade, desorganização e muitos conflitos interpessoais, fazendo do ambiente organizacional um lugar de competição, atritos e rivalidades, às vezes chegando a adoecer as pessoas. Diante desta problemática, é importante analisar as relações entre colaboradores e gestores e colaboradores e empresa, possibilitando assim, a compreensão mais aprofundada das queixas comuns a todos nas relações interpessoais éticas e organizacionais.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo norteador da pesquisa é identificar possíveis falhas na política organizacional e propor soluções associadas a integração de novos colaboradores, suas relações interpessoais e desenvolvimento ativo em suas funções.			
<b>METODOLOGIA</b>	A Fundamentação teórica foi baseada em pesquisa bibliográfica qualitativa, através de livros, revistas especializadas e artigos eletrônicos relacionados a ética empresarial e comportamento organizacional			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam conflitos no ambiente corporativo é a falta de clareza quanto as funções a serem realizadas de acordo com o cargo estabelecido, suas atribuições e responsabilidades. Segundo Toffler (1993 p. 22), responsabilidade "é um conceito crítico relacionado à tomada de decisões gerenciais. É a ligação entre gerente, trabalho e organização (...) mas nenhum gerente é responsável por tudo". Percebe-se que os colaboradores precisam ter claro e específico suas atribuições e responsabilidades já no momento da contratação para poder exercer o seu papel com zelo e serenidade para trabalhar, sem negligenciar o que é seu dever e sem invadir o espaço dos outros. Cada colaborador tem responsabilidade no trabalho desenvolvido; não é somente o gerente responsável por tudo. Segundo Chiavenato (1999), "A Gestão de Pessoas nas organizações é função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer outra denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais". O ambiente organizacional deve ser um ambiente colaborativo (e não competitivo), onde cada um, no exercício da própria atribuição, colabora de forma ativa nos resultados da equipe inteira. Isso evita conflitos interpessoais, rivalidade, e problemas de conduta ética.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos apontados é possível concluir que o ambiente de trabalho deve ser organizado de forma colaborativa. Saber exatamente suas atribuições e a quem prestar contas do próprio trabalho minimiza conflitos, rivalidades e tantos pequenos e grandes problemas dentro de uma organização. Investir na confecção de um regulamento de pessoal, na construção de um código de ética e na formação dos líderes é o caminho para construir um clima organizacional mais sereno, colaborativo e engajado com os valores da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. TOFFLER, Barbara Ley. Ética no trabalho: Tomando decisões difíceis no mundo competitiva dos negócios. Ed. Willey. 1ª edição, 1993.			

Ano	Cód.	Area	Typo	Modalidade
2023	14149	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4945310 - JAYALA ALEXANDRE DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Gestão de conflitos interpessoais: causas e soluções			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de clareza e comunicação quanto às funções e o que se espera de colaboradores e lideranças gera improdutividade, desorganização e muitos conflitos interpessoais, fazendo do ambiente organizacional um lugar de competição, atritos e rivalidades, às vezes chegando a adoecer as pessoas. Diante desta problemática, é importante analisar as relações entre colaboradores e gestores e colaboradores e empresa, possibilitando assim, a compreensão mais aprofundada das queixas comuns a todos nas relações interpessoais éticas e organizacionais.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo norteador da pesquisa é identificar possíveis falhas na política organizacional e propor soluções associadas a integração de novos colaboradores, suas relações interpessoais e desenvolvimento ativo em suas funções.			
<b>METODOLOGIA</b>	A Fundamentação teórica foi baseada em pesquisa bibliográfica qualitativa, através de livros, revistas especializadas e artigos eletrônicos relacionados a ética empresarial e comportamento organizacional			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam conflitos no ambiente corporativo é a falta de clareza quanto as funções a serem realizadas de acordo com o cargo estabelecido, suas atribuições e responsabilidades. Segundo Toffler (1993 p. 22), responsabilidade "é um conceito crítico relacionado à tomada de decisões gerenciais. É a ligação entre gerente, trabalho e organização (...) mas nenhum gerente é responsável por tudo". Percebe-se que os colaboradores precisam ter claro e específico suas atribuições e responsabilidades já no momento da contratação para poder exercer o seu papel com zelo e serenidade para trabalhar, sem negligenciar o que é seu dever e sem invadir o espaço dos outros. Cada colaborador tem responsabilidade no trabalho desenvolvido; não é somente o gerente responsável por tudo. Segundo Chiavenato (1999), "A Gestão de Pessoas nas organizações é função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer outra denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais". O ambiente organizacional deve ser um ambiente colaborativo (e não competitivo), onde cada um, no exercício da própria atribuição, colabora de forma ativa nos resultados da equipe inteira. Isso evita conflitos interpessoais, rivalidade, e problemas de conduta ética.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos apontados é possível concluir que o ambiente de trabalho deve ser organizado de forma colaborativa. Saber exatamente suas atribuições e a quem prestar contas do próprio trabalho minimiza conflitos, rivalidades e tantos pequenos e grandes problemas dentro de uma organização. Investir na confecção de um regulamento de pessoal, na construção de um código de ética e na formação dos líderes é o caminho para construir um clima organizacional mais sereno, colaborativo e engajado com os valores da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. TOFFLER, Barbara Ley. Ética no trabalho: Tomando decisões difíceis no mundo competitiva dos negócios. Ed. Willey. 1ª edição, 1993.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14149	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4945352 - NATHAYS FERREIRA DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Gestão de conflitos interpessoais: causas e soluções			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de clareza e comunicação quanto às funções e o que se espera de colaboradores e lideranças gera improdutividade, desorganização e muitos conflitos interpessoais, fazendo do ambiente organizacional um lugar de competição, atritos e rivalidades, às vezes chegando a adoecer as pessoas. Diante desta problemática, é importante analisar as relações entre colaboradores e gestores e colaboradores e empresa, possibilitando assim, a compreensão mais aprofundada das queixas comuns a todos nas relações interpessoais éticas e organizacionais.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo norteador da pesquisa é identificar possíveis falhas na política organizacional e propor soluções associadas a integração de novos colaboradores, suas relações interpessoais e desenvolvimento ativo em suas funções.			
<b>METODOLOGIA</b>	A Fundamentação teórica foi baseada em pesquisa bibliográfica qualitativa, através de livros, revistas especializadas e artigos eletrônicos relacionados a ética empresarial e comportamento organizacional			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam conflitos no ambiente corporativo é a falta de clareza quanto as funções a serem realizadas de acordo com o cargo estabelecido, suas atribuições e responsabilidades. Segundo Toffler (1993 p. 22), responsabilidade "é um conceito crítico relacionado à tomada de decisões gerenciais. É a ligação entre gerente, trabalho e organização (...) mas nenhum gerente é responsável por tudo". Percebe-se que os colaboradores precisam ter claro e específico suas atribuições e responsabilidades já no momento da contratação para poder exercer o seu papel com zelo e serenidade para trabalhar, sem negligenciar o que é seu dever e sem invadir o espaço dos outros. Cada colaborador tem responsabilidade no trabalho desenvolvido; não é somente o gerente responsável por tudo. Segundo Chiavenato (1999), "A Gestão de Pessoas nas organizações é função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer outra denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais". O ambiente organizacional deve ser um ambiente colaborativo (e não competitivo), onde cada um, no exercício da própria atribuição, colabora de forma ativa nos resultados da equipe inteira. Isso evita conflitos interpessoais, rivalidade, e problemas de conduta ética.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos apontados é possível concluir que o ambiente de trabalho deve ser organizado de forma colaborativa. Saber exatamente suas atribuições e a quem prestar contas do próprio trabalho minimiza conflitos, rivalidades e tantos pequenos e grandes problemas dentro de uma organização. Investir na confecção de um regulamento de pessoal, na construção de um código de ética e na formação dos líderes é o caminho para construir um clima organizacional mais sereno, colaborativo e engajado com os valores da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. TOFFLER, Barbara Ley. Ética no trabalho: Tomando decisões difíceis no mundo competitiva dos negócios. Ed. Willey. 1ª edição, 1993.			

Ano	Cód.	Area	Titulo	Modalidade
2023	14149	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4972562 - EDNALVA MOREIRA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Gestão de conflitos interpessoais: causas e soluções			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de clareza e comunicação quanto às funções e o que se espera de colaboradores e lideranças gera improdutividade, desorganização e muitos conflitos interpessoais, fazendo do ambiente organizacional um lugar de competição, atritos e rivalidades, às vezes chegando a adoecer as pessoas. Diante desta problemática, é importante analisar as relações entre colaboradores e gestores e colaboradores e empresa, possibilitando assim, a compreensão mais aprofundada das queixas comuns a todos nas relações interpessoais éticas e organizacionais.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo norteador da pesquisa é identificar possíveis falhas na política organizacional e propor soluções associadas a integração de novos colaboradores, suas relações interpessoais e desenvolvimento ativo em suas funções.			
<b>METODOLOGIA</b>	A Fundamentação teórica foi baseada em pesquisa bibliográfica qualitativa, através de livros, revistas especializadas e artigos eletrônicos relacionados a ética empresarial e comportamento organizacional			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam conflitos no ambiente corporativo é a falta de clareza quanto as funções a serem realizadas de acordo com o cargo estabelecido, suas atribuições e responsabilidades. Segundo Toffler (1993 p. 22), responsabilidade "é um conceito crítico relacionado à tomada de decisões gerenciais. É a ligação entre gerente, trabalho e organização (...) mas nenhum gerente é responsável por tudo". Percebe-se que os colaboradores precisam ter claro e específico suas atribuições e responsabilidades já no momento da contratação para poder exercer o seu papel com zelo e serenidade para trabalhar, sem negligenciar o que é seu dever e sem invadir o espaço dos outros. Cada colaborador tem responsabilidade no trabalho desenvolvido; não é somente o gerente responsável por tudo. Segundo Chiavenato (1999), "A Gestão de Pessoas nas organizações é função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer outra denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais". O ambiente organizacional deve ser um ambiente colaborativo (e não competitivo), onde cada um, no exercício da própria atribuição, colabora de forma ativa nos resultados da equipe inteira. Isso evita conflitos interpessoais, rivalidade, e problemas de conduta ética.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos apontados é possível concluir que o ambiente de trabalho deve ser organizado de forma colaborativa. Saber exatamente suas atribuições e a quem prestar contas do próprio trabalho minimiza conflitos, rivalidades e tantos pequenos e grandes problemas dentro de uma organização. Investir na confecção de um regulamento de pessoal, na construção de um código de ética e na formação dos líderes é o caminho para construir um clima organizacional mais sereno, colaborativo e engajado com os valores da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. TOFFLER, Barbara Ley. Ética no trabalho: Tomando decisões difíceis no mundo competitiva dos negócios. Ed. Willey. 1ª edição, 1993.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14149	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4993225 - SABRINA SORRANY FERREIRA DE ARAUJO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Gestão de conflitos interpessoais: causas e soluções			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de clareza e comunicação quanto às funções e o que se espera de colaboradores e lideranças gera improdutividade, desorganização e muitos conflitos interpessoais, fazendo do ambiente organizacional um lugar de competição, atritos e rivalidades, às vezes chegando a adoecer as pessoas. Diante desta problemática, é importante analisar as relações entre colaboradores e gestores e colaboradores e empresa, possibilitando assim, a compreensão mais aprofundada das queixas comuns a todos nas relações interpessoais éticas e organizacionais.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo norteador da pesquisa é identificar possíveis falhas na política organizacional e propor soluções associadas a integração de novos colaboradores, suas relações interpessoais e desenvolvimento ativo em suas funções.			
<b>METODOLOGIA</b>	A Fundamentação teórica foi baseada em pesquisa bibliográfica qualitativa, através de livros, revistas especializadas e artigos eletrônicos relacionados a ética empresarial e comportamento organizacional			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam conflitos no ambiente corporativo é a falta de clareza quanto as funções a serem realizadas de acordo com o cargo estabelecido, suas atribuições e responsabilidades. Segundo Toffler (1993 p. 22), responsabilidade "é um conceito crítico relacionado à tomada de decisões gerenciais. É a ligação entre gerente, trabalho e organização (...) mas nenhum gerente é responsável por tudo". Percebe-se que os colaboradores precisam ter claro e específico suas atribuições e responsabilidades já no momento da contratação para poder exercer o seu papel com zelo e serenidade para trabalhar, sem negligenciar o que é seu dever e sem invadir o espaço dos outros. Cada colaborador tem responsabilidade no trabalho desenvolvido; não é somente o gerente responsável por tudo. Segundo Chiavenato (1999), "A Gestão de Pessoas nas organizações é função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer outra denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais". O ambiente organizacional deve ser um ambiente colaborativo (e não competitivo), onde cada um, no exercício da própria atribuição, colabora de forma ativa nos resultados da equipe inteira. Isso evita conflitos interpessoais, rivalidade, e problemas de conduta ética.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos apontados é possível concluir que o ambiente de trabalho deve ser organizado de forma colaborativa. Saber exatamente suas atribuições e a quem prestar contas do próprio trabalho minimiza conflitos, rivalidades e tantos pequenos e grandes problemas dentro de uma organização. Investir na confecção de um regulamento de pessoal, na construção de um código de ética e na formação dos líderes é o caminho para construir um clima organizacional mais sereno, colaborativo e engajado com os valores da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006</p> <p>CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.</p> <p>TOFFLER, Barbara Ley. Ética no trabalho: Tomando decisões difíceis no mundo competitiva dos negócios. Ed. Willey. 1ª edição, 1993.</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14150	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4830105 - YASMIN CRUZ FERNANDES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	HOME OFFICE: TRABALHO COM QUALIDADE DE VIDA			
<b>INTRODUCAO</b>	Home office é o trabalho realizado em casa não havendo a necessidade do colaborador comparecer na organização. Assim, as atividades podem ser realizadas de qualquer lugar em que tenha disponibilidade de ferramentas tecnológicas necessárias à execução das atividades. Já a qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações que promove melhorias e indicações dentro e fora do ambiente organizacional, propondo melhores condições de desenvolvimento humano durante a realização do trabalho. Unindo os conceitos acima, podemos dizer que para manter a qualidade da vida no trabalho é necessário que a implantação do home office seja realizada de forma correta.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo principal analisar os benefícios do home office e como essa modalidade impacta na qualidade de vida no trabalho. Como objetivo específico há de confrontar os benefícios apontados com os possíveis riscos do teletrabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas com abordagem na Qualidade de Vida, Gestão de Pessoas e o Home Office.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao decorrer deste projeto verificou-se que o home office trouxe aos colaboradores uma forma de unir a vida pessoal e profissional. Com isso melhora qualidade de vida, com a redução do tempo de descolamento, passando mais tempo com a família e tendo a possibilidade de trabalhar com maior conforto. Por outro lado, o home office sem a devida motivação e supervisão pode causar danos ao colaborador e para organização. De acordo com Hara (2011), tendência ao isolamento, possibilidade de excesso de trabalho com a indefinição de horário, podem ser alguns fatores que prejudiquem a qualidade de vida no trabalho. Para realizar a implantação do home office é um desafio, tanto para a empresa quanto para o colaborador, porém, se aplicados de forma correta os resultados podem ser surpreendentes, já que para as organizações os benefícios se destacam na melhoria da produtividade com o maior foco no trabalho e menores distrações trazendo assim maiores resultados (ADERALDO et al., 2017). Já para o colaborador, benefícios como, maior autonomia para organizar seu dia, tempo habil para realizar um novo curso, arquitetar seu plano de carreira, ser mais produtivo, pontual e criativo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos é possível concluir que o home office e a qualidade de vida estão inteiramente ligados. Todos os passos da implantação dessa nova modalidade devem ser cautelosos e pensados para que não haja limitações no suporte que a empresa deve fornecer para que o colaborador tenha uma estadia de trabalho digna e confortável. Já o colaborador deve ter em mente sua saúde (física e mental) e seu bem-estar, sem deixar de lado seu papel dentro da organização. Com a interação destes dois conceitos, podemos utilizar a tecnologia e suas ferramentas a favor das organizações.			
<b>REFERENCIAS</b>	ADERALDO, I. L.; Aderaldo, C. V. L.; Lima, A. C. Aspectos críticos do teletrabalho em uma companhia multinacional. Cadernos EBAPE.BR, v. 15, n. spe, p. 511-533, set. 2017. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 HARA, Caroline Lumi. Home Office e as Tecnologias de Acesso Remoto. São Paulo 2011.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14150	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888154 - ANNA FLAVIA SANTOS DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	HOME OFFICE: TRABALHO COM QUALIDADE DE VIDA			
<b>INTRODUCAO</b>	Home office é o trabalho realizado em casa não havendo a necessidade do colaborador comparecer na organização. Assim, as atividades podem ser realizadas de qualquer lugar em que tenha disponibilidade de ferramentas tecnológicas necessárias à execução das atividades. Já a qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações que promove melhorias e indicações dentro e fora do ambiente organizacional, propondo melhores condições de desenvolvimento humano durante a realização do trabalho. Unindo os conceitos acima, podemos dizer que para manter a qualidade de vida no trabalho é necessário que a implantação do home office seja realizada de forma correta.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo principal analisar os benefícios do home office e como essa modalidade impacta na qualidade de vida no trabalho. Como objetivo específico há de confrontar os benefícios apontados com os possíveis riscos do teletrabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas com abordagem na Qualidade de Vida, Gestão de Pessoas e o Home Office.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao decorrer deste projeto verificou-se que o home office trouxe aos colaboradores uma forma de unir a vida pessoal e profissional. Com isso melhora qualidade de vida, com a redução do tempo de deslocamento, passando mais tempo com a família e tendo a possibilidade de trabalhar com maior conforto. Por outro lado, o home office sem a devida motivação e supervisão pode causar danos ao colaborador e para organização. De acordo com Hara (2011), tendência ao isolamento, possibilidade de excesso de trabalho com a indefinição de horário, podem ser alguns fatores que prejudiquem a qualidade de vida no trabalho. Para realizar a implantação do home office é um desafio, tanto para a empresa quanto para o colaborador, porém, se aplicados de forma correta os resultados podem ser surpreendentes, já que para as organizações os benefícios se destacam na melhoria da produtividade com o maior foco no trabalho e menores distrações trazendo assim maiores resultados (ADERALDO et al., 2017). Já para o colaborador, benefícios como, maior autonomia para organizar seu dia, tempo habil para realizar um novo curso, arquitetar seu plano de carreira, ser mais produtivo, pontual e criativo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos é possível concluir que o home office e a qualidade de vida estão inteiramente ligados. Todos os passos da implantação dessa nova modalidade devem ser cautelosos e pensados para que não haja limitações no suporte que a empresa deve fornecer para que o colaborador tenha uma estadia de trabalho digna e confortável. Já o colaborador deve ter em mente sua saúde (física e mental) e seu bem-estar, sem deixar de lado seu papel dentro da organização. Com a interação destes dois conceitos, podemos utilizar a tecnologia e suas ferramentas a favor das organizações.			
<b>REFERENCIAS</b>	ADERALDO, I. L.; Aderaldo, C. V. L.; Lima, A. C. Aspectos críticos do teletrabalho em uma companhia multinacional. Cadernos EBAPE.BR, v. 15, n. spe, p. 511-533, set. 2017. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 HARA, Caroline Lumi. Home Office e as Tecnologias de Acesso Remoto. São Paulo 2011.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14150	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888251 - YORRANA MAYARA SILVA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	HOME OFFICE: TRABALHO COM QUALIDADE DE VIDA			
<b>INTRODUCAO</b>	Home office é o trabalho realizado em casa não havendo a necessidade do colaborador comparecer na organização. Assim, as atividades podem ser realizadas de qualquer lugar em que tenha disponibilidade de ferramentas tecnológicas necessárias à execução das atividades. Já a qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações que promove melhorias e indicações dentro e fora do ambiente organizacional, propondo melhores condições de desenvolvimento humano durante a realização do trabalho. Unindo os conceitos acima, podemos dizer que para manter a qualidade da vida no trabalho é necessário que a implantação do home office seja realizada de forma correta.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo principal analisar os benefícios do home office e como essa modalidade impacta na qualidade de vida no trabalho. Como objetivo específico há de confrontar os benefícios apontados com os possíveis riscos do teletrabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas com abordagem na Qualidade de Vida, Gestão de Pessoas e o Home Office.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao decorrer deste projeto verificou-se que o home office trouxe aos colaboradores uma forma de unir a vida pessoal e profissional. Com isso melhora qualidade de vida, com a redução do tempo de deslocamento, passando mais tempo com a família e tendo a possibilidade de trabalhar com maior conforto. Por outro lado, o home office sem a devida motivação e supervisão pode causar danos ao colaborador e para organização. De acordo com Hara (2011), tendência ao isolamento, possibilidade de excesso de trabalho com a indefinição de horário, podem ser alguns fatores que prejudiquem a qualidade de vida no trabalho. Para realizar a implantação do home office é um desafio, tanto para a empresa quanto para o colaborador, porém, se aplicados de forma correta os resultados podem ser surpreendentes, já que para as organizações os benefícios se destacam na melhoria da produtividade com o maior foco no trabalho e menores distrações trazendo assim maiores resultados (ADERALDO et al., 2017). Já para o colaborador, benefícios como, maior autonomia para organizar seu dia, tempo habil para realizar um novo curso, arquitetar seu plano de carreira, ser mais produtivo, pontual e criativo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos é possível concluir que o home office e a qualidade de vida estão inteiramente ligados. Todos os passos da implantação dessa nova modalidade devem ser cautelosos e pensados para que não haja limitações no suporte que a empresa deve fornecer para que o colaborador tenha uma estadia de trabalho digna e confortável. Já o colaborador deve ter em mente sua saúde (física e mental) e seu bem-estar, sem deixar de lado seu papel dentro da organização. Com a interação destes dois conceitos, podemos utilizar a tecnologia e suas ferramentas a favor das organizações.			
<b>REFERENCIAS</b>	ADERALDO, I. L.; Aderaldo, C. V. L.; Lima, A. C. Aspectos críticos do teletrabalho em uma companhia multinacional. Cadernos EBAPE.BR, v. 15, n. spe, p. 511-533, set. 2017. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 HARA, Caroline Lumi. Home Office e as Tecnologias de Acesso Remoto. São Paulo 2011.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14151	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4690109 - ISABELLE OLIVEIRA SIQUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O Impacto da Comunicação Interna na Gestão de Recursos Humanos			
<b>INTRODUCAO</b>	A comunicação interna é vital para o sucesso administrativo, mas muitas vezes é mal utilizada ou negligenciada. Pode-se observar a deterioração da comunicação interna nas Corporações, afetando o clima organizacional e o desempenho. A falta de eficácia dos canais internos é um desafio comum nas empresas, hoje em dia. Os ruídos dentro da comunicação geram conflitos e falta de alinhamento. Diante do que foi descrito é categórico analisar as principais causas, e solução para termos o sucesso dentro das organizações.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este projeto visa analisar e melhorar a comunicação interna, alinhando setores e apresentando soluções acessíveis. A implantação é viável de acordo com a análise de custos e interesse dos gestores. O principal objetivo é identificar os problemas originados pela falta de comunicação, e apresentar o alinhamento entre setores oferecendo soluções acessíveis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a base teórica através da pesquisa bibliográfica qualitativa, foram utilizados capítulos de livros e portais especializados da área.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao realizar o aprofundamento nesta pesquisa, identificou-se que um dos fatores que ocasionam a falta de comunicação interna, é a gestão informal da empresa. Verificou-se ainda que, a ausência de um treinamento eficaz com os colaboradores, acaba resultando em diversas dúvidas geradas e conflitos de pontos de vista. Segundo Almeida (2007) "as funções de treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações adquire um papel de preparação de indivíduos para o exercício satisfatório de suas atividades". Entende-se que uma vez tendo o contato com um bom treinamento o colaborador se sente preparado e motivado para fazer suas funções de forma eficaz, tendo assim certeza de suas atividades e não havendo necessidade de buscar algum outro caminho de execução duvidoso. É descrito por Nassar (2005) "a comunicação interna é muito importante, pois aproxima a empresa de seus colaboradores, que passam a executar suas atividades de maneira agregada aos objetivos e negócios da empresa e agindo de forma coletiva". Portanto quando os colaboradores se sentem preparados para os processos da organização, há uma maior socialização e é criado um elo que liga a empresa aos colaboradores, incentivando o diálogo e troca de informações positivas entre os setores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em conclusão, foi revelado que a gestão informal e treinamento deficiente afetam a comunicação interna. De acordo com as citações, a capacitação desempenha um papel crucial na preparação dos indivíduos, gerando motivação e confiança nas atividades, além de enfatizar a importância da comunicação interna na aproximação entre empresa e colaboradores, conduzindo a uma execução coletiva alinhada aos objetivos organizacionais. Ao aprimorar os fatores cria-se um ambiente de maior coesão, impulsionando o diálogo e a troca de informações entre os setores.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Percepção de Gestores e Técnicos sobre o processo de Gestão por Competências em Organizações no Brasil. Dissertação mestrado em Administração. Brasília, 2007. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 NASSAR, Paulo. Comunicação interna e a força das empresas. São Paulo: ABERJE, 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14151	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4841239 - JEOVANA LUIZA GALDINO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O Impacto da Comunicação Interna na Gestão de Recursos Humanos			
<b>INTRODUCA O</b>	A comunicação interna é vital para o sucesso administrativo, mas muitas vezes é mal utilizada ou negligenciada. Pode-se observar a deterioração da comunicação interna nas Corporações, afetando o clima organizacional e o desempenho. A falta de eficácia dos canais internos é um desafio comum nas empresas, hoje em dia. Os ruídos dentro da comunicação geram conflitos e falta de alinhamento. Diante do que foi descrito é categórico analisar as principais causas, e solução para termos o sucesso dentro das organizações.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este projeto visa analisar e melhorar a comunicação interna, alinhando setores e apresentando soluções acessíveis. A implantação é viável de acordo com a análise de custos e interesse dos gestores. O principal objetivo é identificar os problemas originados pela falta de comunicação, e apresentar o alinhamento entre setores oferecendo soluções acessíveis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a base teórica através da pesquisa bibliográfica qualitativa, foram utilizados capítulos de livros e portais especializados da área.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao realizar o aprofundamento nesta pesquisa, identificou-se que um dos fatores que ocasionam a falta de comunicação interna, é a gestão informal da empresa. Verificou-se ainda que, a ausência de um treinamento eficaz com os colaboradores, acaba resultando em diversas dúvidas geradas e conflitos de pontos de vista. Segundo Almeida (2007) "as funções de treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações adquire um papel de preparação de indivíduos para o exercício satisfatório de suas atividades". Entende-se que uma vez tendo o contato com um bom treinamento o colaborador se sente preparado e motivado para fazer suas funções de forma eficaz, tendo assim certeza de suas atividades e não havendo necessidade de buscar algum outro caminho de execução duvidoso. É descrito por Nassar (2005) "a comunicação interna é muito importante, pois aproxima a empresa de seus colaboradores, que passam a executar suas atividades de maneira agregada aos objetivos e negócios da empresa e agindo de forma coletiva". Portanto quando os colaboradores se sentem preparados para os processos da organização, há uma maior socialização e é criado um elo que liga a empresa aos colaboradores, incentivando o diálogo e troca de informações positivas entre os setores.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em conclusão, foi revelado que a gestão informal e treinamento deficiente afetam a comunicação interna. De acordo com as citações, a capacitação desempenha um papel crucial na preparação dos indivíduos, gerando motivação e confiança nas atividades, além de enfatizar a importância da comunicação interna na aproximação entre empresa e colaboradores, conduzindo a uma execução coletiva alinhada aos objetivos organizacionais. Ao aprimorar os fatores cria-se um ambiente de maior coesão, impulsionando o diálogo e a troca de informações entre os setores.			
<b>REFERENCIA S</b>	ALMEIDA, Percepção de Gestores e Técnicos sobre o processo de Gestão por Competências em Organizações no Brasil. Dissertação mestrado em Administração. Brasília, 2007. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 NASSAR, Paulo. Comunicação interna e a força das empresas. São Paulo: ABERJE, 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14152	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2866137 - JESSICA DO SACRAMENTO MOURA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Potencializando a Organização através do Feedback			
<b>INTRODUCA O</b>	O retorno de desempenho dos colaboradores, conhecido como feedback, auxilia na melhoria da produtividade e desenvolvimento do colaborador. Já sua aplicação deficiente pode levar a desmotivação e redução do lucro da empresa. Diante disso, é essencial preparar os colaboradores para uma comunicação assertiva e promover o sucesso da organização.			
<b>OBJETIVOS</b>	O artigo tem como objetivo elaborar um planejamento para a aplicação de um treinamento, com foco no feedback da organização de forma adequada. A razão para isso é que, quando o retorno é bem aplicado, melhora a comunicação interna, o engajamento dos colaboradores e a qualidade de vida no trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se alcançar a fundamentação teórica por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas a artigos eletrônicos na área de recursos humanos.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao longo da pesquisa para este artigo, constatou-se que o desgaste emocional e a falta de reconhecimento ocorrem devido a deficiências na aplicação do feedback. Os colaboradores não possuem alinhamento nas tarefas e, quando há retorno, este se mostra insatisfatório, frequentemente tomando a forma de repreensões, o que constrange o profissional que o recebe perante todos. De acordo com Williams (2013, p. 33) "As pessoas normais obviamente preferem receber retorno positivo, mas quando seu balde está vazio elas aceitam até mesmo o negativo. A razão é simples: o sofrimento emocional gerado por um balde vazio é maior do que o desconforto de receber um feedback negativo." É crucial obter um retorno construtivo, seja ele positivo ou negativo. No entanto, quando fornecido de forma desmotivadora, impede os ajustes necessários nas abordagens do colaborador, resultando em baixa autoestima, desmotivação, conflitos, mal-entendidos, baixa produtividade, aumento da rotatividade, comunicação deficiente e falta de inovação. Segundo os dados da pesquisa da empresa Indeeep (2019), "mostram que 70% dos profissionais ao redor do mundo não estão envolvidos com o trabalho. A situação pode gerar uma série de consequências e ter impacto direto nos resultados". A desmotivação causa um impacto direto na produtividade da organização, refletindo-se no absenteísmo, que é resultado da falta de disposição para comparecer ao trabalho, na queda da produtividade originada por funcionários desestimulados e nos conflitos ocasionados por desgastes emocionais e estresses constantes.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em resumo, a aplicação adequada do feedback surge como fator crítico para otimizar a organização. A pesquisa revela que a falta de reconhecimento e a falha na entrega do retorno causam desgaste emocional, desalinhamento nas tarefas e desmotivação entre os colaboradores. A subutilização desse processo gera baixa autoestima, conflitos, queda de produtividade e aumento da rotatividade. Portanto, é crucial focar em um ambiente com comunicação aberta, proporcionando feedback construtivo para melhorar o engajamento, a qualidade de vida no trabalho e o desempenho geral da organização.			
<b>REFERENCIA S</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 INDEEP, Quais as consequências de ter funcionários desmotivados na empresa. 24 nov. 2019 Disponível em: <a href="https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/">https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/</a> . Acesso em: 20 ago. 2023 WILLIAMS, Richard L. Preciso saber se estou indo bem! [tradução de Antonio Evangelista de Moura Filho]. Rio de Janeiro: Sextante, 2013			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14152	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4859031 - HELLEN SILVA TRAJANO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Potencializando a Organização através do Feedback			
<b>INTRODUCAO</b>	O retorno de desempenho dos colaboradores, conhecido como feedback, auxilia na melhoria da produtividade e desenvolvimento do colaborador. Já sua aplicação deficiente pode levar a desmotivação e redução do lucro da empresa. Diante disso, é essencial preparar os colaboradores para uma comunicação assertiva e promover o sucesso da organização.			
<b>OBJETIVOS</b>	O artigo tem como objetivo elaborar um planejamento para a aplicação de um treinamento, com foco no feedback da organização de forma adequada. A razão para isso é que, quando o retorno é bem aplicado, melhora a comunicação interna, o engajamento dos colaboradores e a qualidade de vida no trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se alcançar a fundamentação teórica por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas a artigos eletrônicos na área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao longo da pesquisa para este artigo, constatou-se que o desgaste emocional e a falta de reconhecimento ocorrem devido a deficiências na aplicação do feedback. Os colaboradores não possuem alinhamento nas tarefas e, quando há retorno, este se mostra insatisfatório, frequentemente tomando a forma de repreensões, o que constrange o profissional que o recebe perante todos. De acordo com Williams (2013, p. 33) "As pessoas normais obviamente preferem receber retorno positivo, mas quando seu balde está vazio elas aceitam até mesmo o negativo. A razão é simples: o sofrimento emocional gerado por um balde vazio é maior do que o desconforto de receber um feedback negativo." É crucial obter um retorno construtivo, seja ele positivo ou negativo. No entanto, quando fornecido de forma desmotivadora, impede os ajustes necessários nas abordagens do colaborador, resultando em baixa autoestima, desmotivação, conflitos, mal-entendidos, baixa produtividade, aumento da rotatividade, comunicação deficiente e falta de inovação. Segundo os dados da pesquisa da empresa Indeeep (2019), "mostram que 70% dos profissionais ao redor do mundo não estão envolvidos com o trabalho. A situação pode gerar uma série de consequências e ter impacto direto nos resultados". A desmotivação causa um impacto direto na produtividade da organização, refletindo-se no absenteísmo, que é resultado da falta de disposição para comparecer ao trabalho, na queda da produtividade originada por funcionários desestimulados e nos conflitos ocasionados por desgastes emocionais e estresses constantes.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, a aplicação adequada do feedback surge como fator crítico para otimizar a organização. A pesquisa revela que a falta de reconhecimento e a falha na entrega do retorno causam desgaste emocional, desalinhamento nas tarefas e desmotivação entre os colaboradores. A subutilização desse processo gera baixa autoestima, conflitos, queda de produtividade e aumento da rotatividade. Portanto, é crucial focar em um ambiente com comunicação aberta, proporcionando feedback construtivo para melhorar o engajamento, a qualidade de vida no trabalho e o desempenho geral da organização.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 INDEEP, Quais as consequências de ter funcionários desmotivados na empresa. 24 nov. 2019 Disponível em: <a href="https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/">https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/</a> . Acesso em: 20 ago. 2023 WILLIAMS, Richard L. Preciso saber se estou indo bem! [tradução de Antonio Evangelista de Moura Filho]. Rio de Janeiro: Sextante, 2013			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14152	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4879007 - CRISTIANA PEREIRA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Potencializando a Organização através do Feedback			
<b>INTRODUCA O</b>	O retorno de desempenho dos colaboradores, conhecido como feedback, auxilia na melhoria da produtividade e desenvolvimento do colaborador. Já sua aplicação deficiente pode levar a desmotivação e redução do lucro da empresa. Diante disso, é essencial preparar os colaboradores para uma comunicação assertiva e promover o sucesso da organização.			
<b>OBJETIVOS</b>	O artigo tem como objetivo elaborar um planejamento para a aplicação de um treinamento, com foco no feedback da organização de forma adequada. A razão para isso é que, quando o retorno é bem aplicado, melhora a comunicação interna, o engajamento dos colaboradores e a qualidade de vida no trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se alcançar a fundamentação teórica por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas a artigos eletrônicos na área de recursos humanos.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao longo da pesquisa para este artigo, constatou-se que o desgaste emocional e a falta de reconhecimento ocorrem devido a deficiências na aplicação do feedback. Os colaboradores não possuem alinhamento nas tarefas e, quando há retorno, este se mostra insatisfatório, frequentemente tomando a forma de repreensões, o que constrange o profissional que o recebe perante todos. De acordo com Williams (2013, p. 33) "As pessoas normais obviamente preferem receber retorno positivo, mas quando seu balde está vazio elas aceitam até mesmo o negativo. A razão é simples: o sofrimento emocional gerado por um balde vazio é maior do que o desconforto de receber um feedback negativo." É crucial obter um retorno construtivo, seja ele positivo ou negativo. No entanto, quando fornecido de forma desmotivadora, impede os ajustes necessários nas abordagens do colaborador, resultando em baixa autoestima, desmotivação, conflitos, mal-entendidos, baixa produtividade, aumento da rotatividade, comunicação deficiente e falta de inovação. Segundo os dados da pesquisa da empresa Indeeep (2019), "mostram que 70% dos profissionais ao redor do mundo não estão envolvidos com o trabalho. A situação pode gerar uma série de consequências e ter impacto direto nos resultados". A desmotivação causa um impacto direto na produtividade da organização, refletindo-se no absenteísmo, que é resultado da falta de disposição para comparecer ao trabalho, na queda da produtividade originada por funcionários desestimulados e nos conflitos ocasionados por desgastes emocionais e estresses constantes.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em resumo, a aplicação adequada do feedback surge como fator crítico para otimizar a organização. A pesquisa revela que a falta de reconhecimento e a falha na entrega do retorno causam desgaste emocional, desalinhamento nas tarefas e desmotivação entre os colaboradores. A subutilização desse processo gera baixa autoestima, conflitos, queda de produtividade e aumento da rotatividade. Portanto, é crucial focar em um ambiente com comunicação aberta, proporcionando feedback construtivo para melhorar o engajamento, a qualidade de vida no trabalho e o desempenho geral da organização.			
<b>REFERENCIA S</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 INDEEP, Quais as consequências de ter funcionários desmotivados na empresa. 24 nov. 2019 Disponível em: <a href="https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/">https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/</a> . Acesso em: 20 ago. 2023 WILLIAMS, Richard L. Preciso saber se estou indo bem! [tradução de Antonio Evangelista de Moura Filho]. Rio de Janeiro: Sextante, 2013			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14152	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4887221 - STEPHANIE FRANCINE CARVALHO COSTA MARTINS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Potencializando a Organização através do Feedback			
<b>INTRODUCAO</b>	O retorno de desempenho dos colaboradores, conhecido como feedback, auxilia na melhoria da produtividade e desenvolvimento do colaborador. Já sua aplicação deficiente pode levar a desmotivação e redução do lucro da empresa. Diante disso, é essencial preparar os colaboradores para uma comunicação assertiva e promover o sucesso da organização.			
<b>OBJETIVOS</b>	O artigo tem como objetivo elaborar um planejamento para a aplicação de um treinamento, com foco no feedback da organização de forma adequada. A razão para isso é que, quando o retorno é bem aplicado, melhora a comunicação interna, o engajamento dos colaboradores e a qualidade de vida no trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se alcançar a fundamentação teórica por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas a artigos eletrônicos na área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao longo da pesquisa para este artigo, constatou-se que o desgaste emocional e a falta de reconhecimento ocorrem devido a deficiências na aplicação do feedback. Os colaboradores não possuem alinhamento nas tarefas e, quando há retorno, este se mostra insatisfatório, frequentemente tomando a forma de repreensões, o que constrange o profissional que o recebe perante todos. De acordo com Williams (2013, p. 33) "As pessoas normais obviamente preferem receber retorno positivo, mas quando seu balde está vazio elas aceitam até mesmo o negativo. A razão é simples: o sofrimento emocional gerado por um balde vazio é maior do que o desconforto de receber um feedback negativo." É crucial obter um retorno construtivo, seja ele positivo ou negativo. No entanto, quando fornecido de forma desmotivadora, impede os ajustes necessários nas abordagens do colaborador, resultando em baixa autoestima, desmotivação, conflitos, mal-entendidos, baixa produtividade, aumento da rotatividade, comunicação deficiente e falta de inovação. Segundo os dados da pesquisa da empresa Indeeep (2019), "mostram que 70% dos profissionais ao redor do mundo não estão envolvidos com o trabalho. A situação pode gerar uma série de consequências e ter impacto direto nos resultados". A desmotivação causa um impacto direto na produtividade da organização, refletindo-se no absenteísmo, que é resultado da falta de disposição para comparecer ao trabalho, na queda da produtividade originada por funcionários desestimulados e nos conflitos ocasionados por desgastes emocionais e estresses constantes.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, a aplicação adequada do feedback surge como fator crítico para otimizar a organização. A pesquisa revela que a falta de reconhecimento e a falha na entrega do retorno causam desgaste emocional, desalinhamento nas tarefas e desmotivação entre os colaboradores. A subutilização desse processo gera baixa autoestima, conflitos, queda de produtividade e aumento da rotatividade. Portanto, é crucial focar em um ambiente com comunicação aberta, proporcionando feedback construtivo para melhorar o engajamento, a qualidade de vida no trabalho e o desempenho geral da organização.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 INDEEP, Quais as consequências de ter funcionários desmotivados na empresa. 24 nov. 2019 Disponível em: <a href="https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/">https://blog.indeeph.com.br/funcionario-desmotivado/</a> . Acesso em: 20 ago. 2023 WILLIAMS, Richard L. Preciso saber se estou indo bem! [tradução de Antonio Evangelista de Moura Filho]. Rio de Janeiro: Sextante, 2013			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14152	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4896203 - ROSALI LIMA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Potencializando a Organização através do Feedback			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O retorno de desempenho dos colaboradores, conhecido como feedback, auxilia na melhoria da produtividade e desenvolvimento do colaborador. Já sua aplicação deficiente pode levar a desmotivação e redução do lucro da empresa. Diante disso, é essencial preparar os colaboradores para uma comunicação assertiva e promover o sucesso da organização.			
<b>OBJETIVOS</b>	O artigo tem como objetivo elaborar um planejamento para a aplicação de um treinamento, com foco no feedback da organização de forma adequada. A razão para isso é que, quando o retorno é bem aplicado, melhora a comunicação interna, o engajamento dos colaboradores e a qualidade de vida no trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se alcançar a fundamentação teórica por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas a artigos eletrônicos na área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao longo da pesquisa para este artigo, constatou-se que o desgaste emocional e a falta de reconhecimento ocorrem devido a deficiências na aplicação do feedback. Os colaboradores não possuem alinhamento nas tarefas e, quando há retorno, este se mostra insatisfatório, frequentemente tomando a forma de repreensões, o que constrange o profissional que o recebe perante todos. De acordo com Williams (2013, p. 33) "As pessoas normais obviamente preferem receber retorno positivo, mas quando seu balde está vazio elas aceitam até mesmo o negativo. A razão é simples: o sofrimento emocional gerado por um balde vazio é maior do que o desconforto de receber um feedback negativo." É crucial obter um retorno construtivo, seja ele positivo ou negativo. No entanto, quando fornecido de forma desmotivadora, impede os ajustes necessários nas abordagens do colaborador, resultando em baixa autoestima, desmotivação, conflitos, mal-entendidos, baixa produtividade, aumento da rotatividade, comunicação deficiente e falta de inovação. Segundo os dados da pesquisa da empresa Indeep (2019), "mostram que 70% dos profissionais ao redor do mundo não estão envolvidos com o trabalho. A situação pode gerar uma série de consequências e ter impacto direto nos resultados". A desmotivação causa um impacto direto na produtividade da organização, refletindo-se no absenteísmo, que é resultado da falta de disposição para comparecer ao trabalho, na queda da produtividade originada por funcionários desestimulados e nos conflitos ocasionados por desgastes emocionais e estresses constantes.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Em resumo, a aplicação adequada do feedback surge como fator crítico para otimizar a organização. A pesquisa revela que a falta de reconhecimento e a falha na entrega do retorno causam desgaste emocional, desalinhamento nas tarefas e desmotivação entre os colaboradores. A subutilização desse processo gera baixa autoestima, conflitos, queda de produtividade e aumento da rotatividade. Portanto, é crucial focar em um ambiente com comunicação aberta, proporcionando feedback construtivo para melhorar o engajamento, a qualidade de vida no trabalho e o desempenho geral da organização.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 INDEEP. Quais as consequências de ter funcionários desmotivados na empresa. 24 nov. 2019 Disponível em: <a href="https://blog.indeepdh.com.br/funcionario-desmotivado/">https://blog.indeepdh.com.br/funcionario-desmotivado/</a> . Acesso em: 20 ago. 2023 WILLIAMS, Richard L. Preciso saber se estou indo bem! [tradução de Antonio Evangelista de Moura Filho]. Rio de Janeiro: Sextante, 2013			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14153	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3623611 - EDUARDO NEVES BUENO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Programas de Qualidade de Vida: os benefícios da implantação nas empresas			
<b>INTRODUCAO</b>	O programa de Qualidade de vida visa possibilitar um ambiente corporativo saudável incluindo ações relacionadas a saúde física e mental de todos os colaboradores. Os investimentos neste programa impacta diretamente no engajamento, nas competências, na proatividade e no alcance de metas, além de melhorar o clima organizacional da empresa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é evidenciar o quanto a implantação dos programas que visam a qualidade de vida podem trazer benefícios para a empresa, tanto para os empregadores quanto para os seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se da fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como consultas em artigos e sites da internet.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, foi identificado que as empresas que investem na implantação de programas de qualidade de vida no trabalho conseguem melhorar a retenção de talentos, pois diminui os pedidos de demissão, reduz as taxas de absenteísmo e turnover, aumenta a produtividade, fortalece a cultura organizacional e melhora o clima organizacional. Chiavenato (2008) relata que a qualidade de vida implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho, seja em suas condições físicas, psicológicas e sociais. Tais ações podem resultar em melhor desempenho pessoal e profissional do colaborador dentro da empresa. França (2004) afirma que "Programas de promoção de saúde e qualidade de vida vêm sendo cada vez mais adotados pelas organizações, mobilizando os profissionais de recursos humanos, para tornar o ambiente de trabalho mais produtivo e saudável" Assim fica evidenciado que as empresas devem se preocupar no desenvolvimento de programas que visam a melhora da qualidade de vida de seus colaboradores, para assim obterem resultados positivos na qualidade e produtividade da empresa como um todo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos dispostos aqui é possível concluir que a implantação de programas de Qualidade de Vida dentro das empresas pode trazer grandes benefícios de qualidade de vida física e mental para os colaboradores. Com a implantação desses programas o desempenho dos colaboradores tende a melhorar e aumentar, acarretando também uma evolução nos resultados da empresa, além de melhorar substancialmente o clima organizacional da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 FRANÇA, Limongi. Qualidade de vida no trabalho-QVT: conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14153	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4961170 - EDLIN CREYCI PEREIRA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Programas de Qualidade de Vida: os benefícios da implantação nas empresas			
<b>INTRODUCAO</b>	O programa de Qualidade de vida visa possibilitar um ambiente corporativo saudável incluindo ações relacionadas a saúde física e mental de todos os colaboradores. Os investimentos neste programa impacta diretamente no engajamento, nas competências, na proatividade e no alcance de metas, além de melhorar o clima organizacional da empresa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é evidenciar o quanto a implantação dos programas que visam a qualidade de vida podem trazer benefícios para a empresa, tanto para os empregadores quanto para os seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se da fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como consultas em artigos e sites da internet.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, foi identificado que as empresas que investem na implantação de programas de qualidade de vida no trabalho conseguem melhorar a retenção de talentos, pois diminui os pedidos de demissão, reduz as taxas de absenteísmo e turnover, aumenta a produtividade, fortalece a cultura organizacional e melhora o clima organizacional. Chiavenato (2008) relata que a qualidade de vida implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho, seja em suas condições físicas, psicológicas e sociais. Tais ações podem resultar em melhor desempenho pessoal e profissional do colaborador dentro da empresa. França (2004) afirma que "Programas de promoção de saúde e qualidade de vida vêm sendo cada vez mais adotados pelas organizações, mobilizando os profissionais de recursos humanos, para tornar o ambiente de trabalho mais produtivo e saudável!" Assim fica evidenciado que as empresas devem se preocupar no desenvolvimento de programas que visam a melhora da qualidade de vida de seus colaboradores, para assim obterem resultados positivos na qualidade e produtividade da empresa como um todo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos dispostos aqui é possível concluir que a implantação de programas de Qualidade de Vida dentro das empresas pode trazer grandes benefícios de qualidade de vida física e mental para os colaboradores. Com a implantação desses programas o desempenho dos colaboradores tende a melhorar e aumentar, acarretando também uma evolução nos resultados da empresa, além de melhorar substancialmente o clima organizacional da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 FRANÇA, Limongi. Qualidade de vida no trabalho-QVT: conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14153	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5009308 - FERNANDA MATOS DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Programas de Qualidade de Vida: os benefícios da implantação nas empresas			
<b>INTRODUCAO</b>	O programa de Qualidade de vida visa possibilitar um ambiente corporativo saudável incluindo ações relacionadas a saúde física e mental de todos os colaboradores. Os investimentos neste programa impacta diretamente no engajamento, nas competências, na proatividade e no alcance de metas, além de melhorar o clima organizacional da empresa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é evidenciar o quanto a implantação dos programas que visam a qualidade de vida podem trazer benefícios para a empresa, tanto para os empregadores quanto para os seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se da fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como consultas em artigos e sites da internet.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, foi identificado que as empresas que investem na implantação de programas de qualidade de vida no trabalho conseguem melhorar a retenção de talentos, pois diminui os pedidos de demissão, reduz as taxas de absenteísmo e turnover, aumenta a produtividade, fortalece a cultura organizacional e melhora o clima organizacional. Chiavenato (2008) relata que a qualidade de vida implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho, seja em suas condições físicas, psicológicas e sociais. Tais ações podem resultar em melhor desempenho pessoal e profissional do colaborador dentro da empresa. França (2004) afirma que "Programas de promoção de saúde e qualidade de vida vêm sendo cada vez mais adotados pelas organizações, mobilizando os profissionais de recursos humanos, para tornar o ambiente de trabalho mais produtivo e saudável!" Assim fica evidenciado que as empresas devem se preocupar no desenvolvimento de programas que visam a melhora da qualidade de vida de seus colaboradores, para assim obterem resultados positivos na qualidade e produtividade da empresa como um todo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos dispostos aqui é possível concluir que a implantação de programas de Qualidade de Vida dentro das empresas pode trazer grandes benefícios de qualidade de vida física e mental para os colaboradores. Com a implantação desses programas o desempenho dos colaboradores tende a melhorar e aumentar, acarretando também uma evolução nos resultados da empresa, além de melhorar substancialmente o clima organizacional da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 FRANÇA, Limongi. Qualidade de vida no trabalho-QVT: conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14153	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5028612 - AMANDA RAMOS DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Programas de Qualidade de Vida: os benefícios da implantação nas empresas			
<b>INTRODUCAO</b>	O programa de Qualidade de vida visa possibilitar um ambiente corporativo saudável incluindo ações relacionadas a saúde física e mental de todos os colaboradores. Os investimentos neste programa impacta diretamente no engajamento, nas competências, na proatividade e no alcance de metas, além de melhorar o clima organizacional da empresa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é evidenciar o quanto a implantação dos programas que visam a qualidade de vida podem trazer benefícios para a empresa, tanto para os empregadores quanto para os seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se da fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como consultas em artigos e sites da internet.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, foi identificado que as empresas que investem na implantação de programas de qualidade de vida no trabalho conseguem melhorar a retenção de talentos, pois diminui os pedidos de demissão, reduz as taxas de absenteísmo e turnover, aumenta a produtividade, fortalece a cultura organizacional e melhora o clima organizacional. Chiavenato (2008) relata que a qualidade de vida implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho, seja em suas condições físicas, psicológicas e sociais. Tais ações podem resultar em melhor desempenho pessoal e profissional do colaborador dentro da empresa. França (2004) afirma que "Programas de promoção de saúde e qualidade de vida vêm sendo cada vez mais adotados pelas organizações, mobilizando os profissionais de recursos humanos, para tornar o ambiente de trabalho mais produtivo e saudável!" Assim fica evidenciado que as empresas devem se preocupar no desenvolvimento de programas que visam a melhora da qualidade de vida de seus colaboradores, para assim obterem resultados positivos na qualidade e produtividade da empresa como um todo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos dispostos aqui é possível concluir que a implantação de programas de Qualidade de Vida dentro das empresas pode trazer grandes benefícios de qualidade de vida física e mental para os colaboradores. Com a implantação desses programas o desempenho dos colaboradores tende a melhorar e aumentar, acarretando também uma evolução nos resultados da empresa, além de melhorar substancialmente o clima organizacional da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 FRANÇA, Limongi. Qualidade de vida no trabalho-QVT: conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14155	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4864166 - GABRIELA DINIZ DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimentos na Liderança			
<b>INTRODUCAO</b>	No decorrer desta pesquisa são explorados alguns aspectos teóricos relacionados com a formação e desenvolvimento de líderes, incluindo as competências necessárias à sua formação e à formação das empresas. Sabendo que o aperfeiçoamento das habilidades e capacidades é um diferencial. Onde há responsabilidade direta do líder para que haja mudanças dentro da organização, em relação ao crescimento da empresa e motivação de funcionários.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo primordial do atual projeto é analisar a capacitação que se pode obter para desenvolver os líderes da organização, buscando aprimorar habilidades necessárias para conduzir uma equipe no ambiente de trabalho mantendo a comunicação assertiva, métodos de motivação e resiliência, elevando os resultados e performance da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica de qualidade, incluindo a análise de artigos e livros na área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica do treinamento e desenvolvimento.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que geram rotatividade e desequilíbrio é a falta de Treinamento e Desenvolvimento. Liderança, quando exercida corretamente, pode gerar ótimas influências no comportamento organizacional, uma boa liderança ajuda a motivar os funcionários a serem mais engajados, motivados e auxilia a chegar nos objetivos estabelecidos pela empresa. Araújo (2006, p. 92) diz "Note que treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) podem enfatizar tanto a tarefa quanto a pessoa que vai executá-la, buscando um aprendizado ou aprimoramento como resultado final". Chiavenato (2010, p. 367) complementa afirmando que "Ambos, treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) constituem processo de aprendizagem" Em uma pesquisa realizada pelo Martins (2023). "A Hay Group realizou um estudo que constata que 63% dos líderes é fator de desmotivação dos colaboradores, onde apenas 12% tem habilidade de promover um ambiente saudável de trabalho para o alto desempenho da equipe;". Sem dúvida, um planejamento de treinamento eficaz é crucial para o desenvolvimento da equipe e para o sucesso da empresa. Líderes bem capacitados podem influenciar positivamente o desempenho e a motivação dos membros da equipe, impactando diretamente nos resultados organizacionais. A capacitação contínua dos líderes é uma peça fundamental para garantir uma liderança eficiente e orientada para o crescimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que, as capacitações são ajustadas às necessidades da empresa, e a mensuração dos resultados também oferece argumentos para que ela obtenha capacidade em realizar treinamentos que efetivamente lhe tragam bons resultados. Desta forma, o treinamento e o desenvolvimento da liderança devem ser vistos cada vez mais como investimento, pois é a base para elevar o desempenho organizacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações: 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 MARTINS, Rômulo. Treinamento de liderança: como desenvolver talentos ao cargo de líder? Gupy Blog, Maranhão, 04 de maio de 2023. Disponível em (#60)/https://www.gupy.io/blog/treinamento-de-lideranca(#62). Acesso em 25 de agosto de 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14155	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4872746 - MILLENA TAVARES DOS REIS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimentos na Liderança			
<b>INTRODUCAO</b>	No decorrer desta pesquisa são explorados alguns aspectos teóricos relacionados com a formação e desenvolvimento de líderes, incluindo as competências necessárias à sua formação e à formação das empresas. Sabendo que o aperfeiçoamento das habilidades e capacidades é um diferencial. Onde há responsabilidade direta do líder para que haja mudanças dentro da organização, em relação ao crescimento da empresa e motivação de funcionários.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo primordial do atual projeto é analisar a capacitação que se pode obter para desenvolver os líderes da organização, buscando aprimorar habilidades necessárias para conduzir uma equipe no ambiente de trabalho mantendo a comunicação assertiva, métodos de motivação e resiliência, elevando os resultados e performance da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica de qualidade, incluindo a análise de artigos e livros na área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica do treinamento e desenvolvimento.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que geram rotatividade e desequilíbrio é a falta de Treinamento e Desenvolvimento. Liderança, quando exercida corretamente, pode gerar ótimas influências no comportamento organizacional, uma boa liderança ajuda a motivar os funcionários a serem mais engajados, motivados e auxilia a chegar nos objetivos estabelecidos pela empresa. Araújo (2006, p. 92) diz "Note que treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) podem enfatizar tanto a tarefa quanto a pessoa que vai executá-la, buscando um aprendizado ou aprimoramento como resultado final". Chiavenato (2010, p. 367) complementa afirmando que "Ambos, treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) constituem processo de aprendizagem" Em uma pesquisa realizada pelo Martins (2023). "A Hay Group realizou um estudo que constata que 63% dos líderes é fator de desmotivação dos colaboradores, onde apenas 12% tem habilidade de promover um ambiente saudável de trabalho para o alto desempenho da equipe;". Sem dúvida, um planejamento de treinamento eficaz é crucial para o desenvolvimento da equipe e para o sucesso da empresa. Líderes bem capacitados podem influenciar positivamente o desempenho e a motivação dos membros da equipe, impactando diretamente nos resultados organizacionais. A capacitação contínua dos líderes é uma peça fundamental para garantir uma liderança eficiente e orientada para o crescimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que, as capacitações são ajustadas às necessidades da empresa, e a mensuração dos resultados também oferece argumentos para que ela obtenha capacidade em realizar treinamentos que efetivamente lhe tragam bons resultados. Desta forma, o treinamento e o desenvolvimento da liderança devem ser vistos cada vez mais como investimento, pois é a base para elevar o desempenho organizacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações: 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 MARTINS, Rômulo. Treinamento de liderança: como desenvolver talentos ao cargo de líder? Gupy Blog, Maranhão, 04 de maio de 2023. Disponível em (#60)/https://www.gupy.io/blog/treinamento-de-lideranca(#62). Acesso em 25 de agosto de 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14155	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4909861 - IRANI DE OLIVEIRA VIEIRA BEZERRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimentos na Liderança			
<b>INTRODUCAO</b>	No decorrer desta pesquisa são explorados alguns aspectos teóricos relacionados com a formação e desenvolvimento de líderes, incluindo as competências necessárias à sua formação e à formação das empresas. Sabendo que o aperfeiçoamento das habilidades e capacidades é um diferencial. Onde há responsabilidade direta do líder para que haja mudanças dentro da organização, em relação ao crescimento da empresa e motivação de funcionários.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo primordial do atual projeto é analisar a capacitação que se pode obter para desenvolver os líderes da organização, buscando aprimorar habilidades necessárias para conduzir uma equipe no ambiente de trabalho mantendo a comunicação assertiva, métodos de motivação e resiliência, elevando os resultados e performance da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica de qualidade, incluindo a análise de artigos e livros na área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica do treinamento e desenvolvimento.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que geram rotatividade e desequilíbrio é a falta de Treinamento e Desenvolvimento. Liderança, quando exercida corretamente, pode gerar ótimas influências no comportamento organizacional, uma boa liderança ajuda a motivar os funcionários a serem mais engajados, motivados e auxilia a chegar nos objetivos estabelecidos pela empresa. Araújo (2006, p. 92) diz "Note que treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) podem enfatizar tanto a tarefa quanto a pessoa que vai executá-la, buscando um aprendizado ou aprimoramento como resultado final". Chiavenato (2010, p. 367) complementa afirmando que "Ambos, treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) constituem processo de aprendizagem" Em uma pesquisa realizada pelo Martins (2023). "A Hay Group realizou um estudo que constata que 63% dos líderes é fator de desmotivação dos colaboradores, onde apenas 12% tem habilidade de promover um ambiente saudável de trabalho para o alto desempenho da equipe;". Sem dúvida, um planejamento de treinamento eficaz é crucial para o desenvolvimento da equipe e para o sucesso da empresa. Líderes bem capacitados podem influenciar positivamente o desempenho e a motivação dos membros da equipe, impactando diretamente nos resultados organizacionais. A capacitação contínua dos líderes é uma peça fundamental para garantir uma liderança eficiente e orientada para o crescimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que, as capacitações são ajustadas às necessidades da empresa, e a mensuração dos resultados também oferece argumentos para que ela obtenha capacidade em realizar treinamentos que efetivamente lhe tragam bons resultados. Desta forma, o treinamento e o desenvolvimento da liderança devem ser vistos cada vez mais como investimento, pois é a base para elevar o desempenho organizacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações: 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 MARTINS, Rômulo. Treinamento de liderança: como desenvolver talentos ao cargo de líder? Gupy Blog, Maranhão, 04 de maio de 2023. Disponível em (#60)/https://www.gupy.io/blog/treinamento-de-lideranca(#62). Acesso em 25 de agosto de 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14155	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4923634 - CAMILA CRISOSTOMO SALES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimentos na Liderança			
<b>INTRODUCAO</b>	No decorrer desta pesquisa são explorados alguns aspectos teóricos relacionados com a formação e desenvolvimento de líderes, incluindo as competências necessárias à sua formação e à formação das empresas. Sabendo que o aperfeiçoamento das habilidades e capacidades é um diferencial. Onde há responsabilidade direta do líder para que haja mudanças dentro da organização, em relação ao crescimento da empresa e motivação de funcionários.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo primordial do atual projeto é analisar a capacitação que se pode obter para desenvolver os líderes da organização, buscando aprimorar habilidades necessárias para conduzir uma equipe no ambiente de trabalho mantendo a comunicação assertiva, métodos de motivação e resiliência, elevando os resultados e performance da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica de qualidade, incluindo a análise de artigos e livros na área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica do treinamento e desenvolvimento.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que geram rotatividade e desequilíbrio é a falta de Treinamento e Desenvolvimento. Liderança, quando exercida corretamente, pode gerar ótimas influências no comportamento organizacional, uma boa liderança ajuda a motivar os funcionários a serem mais engajados, motivados e auxilia a chegar nos objetivos estabelecidos pela empresa. Araújo (2006, p. 92) diz "Note que treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) podem enfatizar tanto a tarefa quanto a pessoa que vai executá-la, buscando um aprendizado ou aprimoramento como resultado final". Chiavenato (2010, p. 367) complementa afirmando que "Ambos, treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) constituem processo de aprendizagem" Em uma pesquisa realizada pelo Martins (2023). "A Hay Group realizou um estudo que constata que 63% dos líderes é fator de desmotivação dos colaboradores, onde apenas 12% tem habilidade de promover um ambiente saudável de trabalho para o alto desempenho da equipe;". Sem dúvida, um planejamento de treinamento eficaz é crucial para o desenvolvimento da equipe e para o sucesso da empresa. Líderes bem capacitados podem influenciar positivamente o desempenho e a motivação dos membros da equipe, impactando diretamente nos resultados organizacionais. A capacitação contínua dos líderes é uma peça fundamental para garantir uma liderança eficiente e orientada para o crescimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que, as capacitações são ajustadas às necessidades da empresa, e a mensuração dos resultados também oferece argumentos para que ela obtenha capacidade em realizar treinamentos que efetivamente lhe tragam bons resultados. Desta forma, o treinamento e o desenvolvimento da liderança devem ser vistos cada vez mais como investimento, pois é a base para elevar o desempenho organizacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações: 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 MARTINS, Rômulo. Treinamento de liderança: como desenvolver talentos ao cargo de líder? Gupy Blog, Maranhão, 04 de maio de 2023. Disponível em (#60)/https://www.gupy.io/blog/treinamento-de-lideranca(#62). Acesso em 25 de agosto de 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14155	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4934326 - TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimentos na Liderança			
<b>INTRODUCAO</b>	No decorrer desta pesquisa são explorados alguns aspectos teóricos relacionados com a formação e desenvolvimento de líderes, incluindo as competências necessárias à sua formação e à formação das empresas. Sabendo que o aperfeiçoamento das habilidades e capacidades é um diferencial. Onde há responsabilidade direta do líder para que haja mudanças dentro da organização, em relação ao crescimento da empresa e motivação de funcionários.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo primordial do atual projeto é analisar a capacitação que se pode obter para desenvolver os líderes da organização, buscando aprimorar habilidades necessárias para conduzir uma equipe no ambiente de trabalho mantendo a comunicação assertiva, métodos de motivação e resiliência, elevando os resultados e performance da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica de qualidade, incluindo a análise de artigos e livros na área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica do treinamento e desenvolvimento.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que geram rotatividade e desequilíbrio é a falta de Treinamento e Desenvolvimento. Liderança, quando exercida corretamente, pode gerar ótimas influências no comportamento organizacional, uma boa liderança ajuda a motivar os funcionários a serem mais engajados, motivados e auxilia a chegar nos objetivos estabelecidos pela empresa. Araújo (2006, p. 92) diz "Note que treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) podem enfatizar tanto a tarefa quanto a pessoa que vai executá-la, buscando um aprendizado ou aprimoramento como resultado final". Chiavenato (2010, p. 367) complementa afirmando que "Ambos, treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) constituem processo de aprendizagem" Em uma pesquisa realizada pelo Martins (2023). "A Hay Group realizou um estudo que constata que 63% dos líderes é fator de desmotivação dos colaboradores, onde apenas 12% tem habilidade de promover um ambiente saudável de trabalho para o alto desempenho da equipe;". Sem dúvida, um planejamento de treinamento eficaz é crucial para o desenvolvimento da equipe e para o sucesso da empresa. Líderes bem capacitados podem influenciar positivamente o desempenho e a motivação dos membros da equipe, impactando diretamente nos resultados organizacionais. A capacitação contínua dos líderes é uma peça fundamental para garantir uma liderança eficiente e orientada para o crescimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que, as capacitações são ajustadas às necessidades da empresa, e a mensuração dos resultados também oferece argumentos para que ela obtenha capacidade em realizar treinamentos que efetivamente lhe tragam bons resultados. Desta forma, o treinamento e o desenvolvimento da liderança devem ser vistos cada vez mais como investimento, pois é a base para elevar o desempenho organizacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARAÚJO, Luis César G. De. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações: 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 MARTINS, Rômulo. Treinamento de liderança: como desenvolver talentos ao cargo de líder? Gupy Blog, Maranhão, 04 de maio de 2023. Disponível em (#60)/https://www.gupy.io/blog/treinamento-de-lideranca(#62). Acesso em 25 de agosto de 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14156	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4917758 - LAWREN RODRIGUES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Significância do Processo Seletivo na Seleção de Candidatos			
<b>INTRODUCAO</b>	A dificuldade de contratação de pessoas qualificadas e preparadas, com perfil comportamental para determinados cargos nas organizações, podem se tornar problemas de difícil solução. Caso não possuam um sistema de inteligência artificial, para rastreamento de candidatos e perfis comportamental a empresa terá dificuldade no processo de Recrutamento e Seleção.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é aprimorar os sistemas que podem ser usados dentro das empresas, e entender a necessidade de investimento na área de Recrutamento e Seleção para melhorar o processo de atrair e reter talentos nas organizações sendo mais assertivos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica, bem como a consultas a artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Para aprimorar a forma como a empresa recruta seus funcionários, é necessário desenvolver uma estratégia bem planejada. Isso implica em garantir que o processo de recrutamento e seleção seja cuidadosamente estruturado e alinhado com a situação atual da organização. Atualmente uma das plataformas mais utilizadas no mercado é a ATS (Applicant Tracking System) em português, "Sistema de Rastreamento de Candidatos" que otimiza e oferece várias vantagens, como a melhoria da eficiência no processo de triagem. Pesquisa realizada pelo PANDAPÉ (2015). "Uma melhor gestão implica diretamente em um melhor desempenho. Ou seja, ao recrutar com um ATS a equipe de recursos humanos consegue atingir um desempenho mais qualificado após: automatizar os processos, usar Inteligência Artificial e padronizar a comunicação entre recrutadores e gestores." Além disso a capacidade de rastrear palavras-chave relevantes nos currículos dos candidatos através do ATS ajuda a garantir que os candidatos atendam aos critérios essenciais da vaga, contribuindo para a eficácia do processo de seleção. Segundo Chiavenato (2000) "O recrutamento consiste na procura e atração de candidatos para uma determinada função e a seleção na escolha e tomada de decisão do candidato que ocupará o cargo disponível" Tanto o recrutamento quanto a seleção são partes essenciais do processo de gestão de pessoas em uma organização. O recrutamento envolve atrair candidatos qualificados para as vagas disponíveis, enquanto a seleção envolve a escolha dos candidatos mais adequados para preencher essas vagas. Ambos são fundamentais para garantir que a organização tenha as competências necessárias para prosperar em um ambiente dinâmico e competitivo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos supramencionados é possível analisar que no processo de recrutamento e seleção, o perfil comportamental e o sistema ATS (Applicant Tracking System) em português, "Sistema de Rastreamento de Candidatos" é essencial, porque ajuda a encontrar candidatos que se encaixam na cultura da empresa, melhoram o desempenho no trabalho, aumentam a motivação e o engajamento, facilitam a comunicação, minimizam conflitos e reduzem o turnover, contribuindo ainda para formar equipes mais eficazes e satisfeitas.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto, Recursos Humanos, São Paulo: Atlas. 2000. CHIAVENATO, Idalberto, Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal, 7ed, Barueri, SP: Manole, 2009. PANDAPÉ- Saiba o que é ATS e como esse sistema transforma o processo de recrutamento e seleção. <a href="https://www.pandape.com/br/blog/saiba-o-que-e-ats/">https://www.pandape.com/br/blog/saiba-o-que-e-ats/</a> . Acesso em 19 de setembro de 2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14156	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4963288 - YASMIN RODRIGUES DOS REIS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Significância do Processo Seletivo na Seleção de Candidatos			
<b>INTRODUCAO</b>	A dificuldade de contratação de pessoas qualificadas e preparadas, com perfil comportamental para determinados cargos nas organizações, podem se tornar problemas de difícil solução. Caso não possuam um sistema de inteligência artificial, para rastreamento de candidatos e perfis comportamental a empresa terá dificuldade no processo de Recrutamento e Seleção.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é aprimorar os sistemas que podem ser usados dentro das empresas, e entender a necessidade de investimento na área de Recrutamento e Seleção para melhorar o processo de atrair e reter talentos nas organizações sendo mais assertivos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica, bem como a consultas a artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Para aprimorar a forma como a empresa recruta seus funcionários, é necessário desenvolver uma estratégia bem planejada. Isso implica em garantir que o processo de recrutamento e seleção seja cuidadosamente estruturado e alinhado com a situação atual da organização. Atualmente uma das plataformas mais utilizadas no mercado é a ATS (Applicant Tracking System) em português, "Sistema de Rastreamento de Candidatos" que otimiza e oferece várias vantagens, como a melhoria da eficiência no processo de triagem. Pesquisa realizada pelo PANDAPÉ (2015). "Uma melhor gestão implica diretamente em um melhor desempenho. Ou seja, ao recrutar com um ATS a equipe de recursos humanos consegue atingir um desempenho mais qualificado após: automatizar os processos, usar Inteligência Artificial e padronizar a comunicação entre recrutadores e gestores." Além disso a capacidade de rastrear palavras-chave relevantes nos currículos dos candidatos através do ATS ajuda a garantir que os candidatos atendam aos critérios essenciais da vaga, contribuindo para a eficácia do processo de seleção. Segundo Chiavenato (2000) "O recrutamento consiste na procura e atração de candidatos para uma determinada função e a seleção na escolha e tomada de decisão do candidato que ocupará o cargo disponível" Tanto o recrutamento quanto a seleção são partes essenciais do processo de gestão de pessoas em uma organização. O recrutamento envolve atrair candidatos qualificados para as vagas disponíveis, enquanto a seleção envolve a escolha dos candidatos mais adequados para preencher essas vagas. Ambos são fundamentais para garantir que a organização tenha as competências necessárias para prosperar em um ambiente dinâmico e competitivo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos supramencionados é possível analisar que no processo de recrutamento e seleção, o perfil comportamental e o sistema ATS (Applicant Tracking System) em português, "Sistema de Rastreamento de Candidatos" é essencial, porque ajuda a encontrar candidatos que se encaixam na cultura da empresa, melhoram o desempenho no trabalho, aumentam a motivação e o engajamento, facilitam a comunicação, minimizam conflitos e reduzem o turnover, contribuindo ainda para formar equipes mais eficazes e satisfeitas.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto, Recursos Humanos, São Paulo: Atlas. 2000. CHIAVENATO, Idalberto, Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal, 7ed, Barueri, SP: Manole, 2009. PANDAPÉ- Saiba o que é ATS e como esse sistema transforma o processo de recrutamento e seleção. <a href="https://www.pandape.com/br/blog/saiba-o-que-e-ats/">https://www.pandape.com/br/blog/saiba-o-que-e-ats/</a> . Acesso em 19 de setembro de 2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14156	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4993152 - FERNANDA MARTINS LEITE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Significância do Processo Seletivo na Seleção de Candidatos			
<b>INTRODUCAO</b>	A dificuldade de contratação de pessoas qualificadas e preparadas, com perfil comportamental para determinados cargos nas organizações, podem se tornar problemas de difícil solução. Caso não possuam um sistema de inteligência artificial, para rastreamento de candidatos e perfis comportamental a empresa terá dificuldade no processo de Recrutamento e Seleção.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é aprimorar os sistemas que podem ser usados dentro das empresas, e entender a necessidade de investimento na área de Recrutamento e Seleção para melhorar o processo de atrair e reter talentos nas organizações sendo mais assertivos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica, bem como a consultas á artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	Para aprimorar a forma como a empresa recruta seus funcionários, é necessário desenvolver uma estratégia bem planejada. Isso implica em garantir que o processo de recrutamento e seleção seja cuidadosamente estruturado e alinhado com a situação atual da organização. Atualmente uma das plataformas mais utilizadas no mercado é a ATS (Applicant Tracking System) em português, "Sistema de Rastreamento de Candidatos" que otimiza e oferece várias vantagens, como a melhoria da eficiência no processo de triagem. Pesquisa realizada pelo PANDAPÉ (2015). "Uma melhor gestão implica diretamente em um melhor desempenho. Ou seja, ao recrutar com um ATS a equipe de recursos humanos consegue atingir um desempenho mais qualificado após: automatizar os processos, usar Inteligência Artificial e padronizar a comunicação entre recrutadores e gestores." Além disso a capacidade de rastrear palavras-chave relevantes nos currículos dos candidatos através do ATS ajuda a garantir que os candidatos atendam aos critérios essenciais da vaga, contribuindo para a eficácia do processo de seleção. Segundo Chiavenato (2000) "O recrutamento consiste na procura e atração de candidatos para uma determinada função e a seleção na escolha e tomada de decisão do candidato que ocupará o cargo disponível" Tanto o recrutamento quanto a seleção são partes essenciais do processo de gestão de pessoas em uma organização. O recrutamento envolve atrair candidatos qualificados para as vagas disponíveis, enquanto a seleção envolve a escolha dos candidatos mais adequados para preencher essas vagas. Ambos são fundamentais para garantir que a organização tenha as competências necessárias para prosperar em um ambiente dinâmico e competitivo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos argumentos supramencionados é possível analisar que no processo de recrutamento e seleção, o perfil comportamental e o sistema ATS (Applicant Tracking System) em português, "Sistema de Rastreamento de Candidatos" é essencial, porque ajuda a encontrar candidatos que se encaixam na cultura da empresa, melhoram o desempenho no trabalho, aumentam a motivação e o engajamento, facilitam a comunicação, minimizam conflitos e reduzem o turnover, contribuindo ainda para formar equipes mais eficazes e satisfeitas.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto, Recursos Humanos, São Paulo: Atlas. 2000. CHIAVENATO, Idalberto, Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal, 7ed, Barueri, SP: Manole, 2009. PANDAPÉ- Saiba o que é ATS e como esse sistema transforma o processo de recrutamento e seleção. <a href="https://www.pandape.com/br/blog/saiba-o-que-e-ats/">https://www.pandape.com/br/blog/saiba-o-que-e-ats/</a> . Acesso em 19 de setembro de 2023			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14157	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3066703 - ROBERTA NOGUEIRA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O DESGASTE PROFISSIONAL POR FALTA DE RECONHECIMENTO			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de reconhecimento do profissional no trabalho afeta os colaboradores e a empresa, impactando em seus resultados, causando a rotatividade e desmotivação dos colaboradores, sendo assim a empresa acaba perdendo bons colaboradores que vão sempre em busca de novas oportunidades de trabalho visando reconhecimento profissional.			
<b>OBJETIVOS</b>	O principal objetivo do trabalho é encontrar soluções que possam influenciar na rotatividade frequente que afetam nos resultados e produtividade nas empresas. Como objetivo específico com a análise dos fatores que levam a rotatividade de colaboradores por falta de reconhecimento, desmotivação, buscam-se estratégias como plano de carreira para a motivação dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	A busca teórica foi realizada através de buscas em sites, pesquisa bibliográfica, visando a busca pela solução para a falta de reconhecimento do profissional.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa, verificou-se que com a falta de reconhecimento profissional, as empresas tendem a ter rotatividade de colaboradores muito expressiva, e isso impacta nos resultados e na produtividade. Segundo Chiavenato (2010), "A rotatividade de pessoal influência muito nos processos e resultados das empresas, com o aumento de competitividade no mercado as empresas acabam conservando seus talentos humanos e procuram evitar que aconteça a rotatividade dos funcionários". Percebe-se que sem a valorização e reconhecimento ao colaborador por parte da empresa, o colaborador começa a se desmotivar e buscar novas oportunidades melhores e que reconheçam o seu valor e empenho no mercado de trabalho. Segundo Chiavenato (2001, p.375), "O desenvolvimento de carreira é um processo formalizado e sequencial que focaliza o planejamento da carreira futura dos funcionários que tem potencial para ocupar cargos mais elevados". Observa-se que a importância do reconhecimento profissional nas empresas é essencial para motivar, desenvolver, engajar os funcionários, minimizando a rotatividade dos colaboradores e mais produtividade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do desenvolvimento do trabalho é possível concluir que a rotatividade de colaboradores acontece de fato, por falta de reconhecimento profissional e desmotivação, pois a empresa não estimula o colaborador a crescer e se dedicar para subir de cargo, ou motivando-o a permanecer na empresa por mais tempo. Sendo assim, quando as empresas passam a implantar planos de carreiras, engajamentos, atividades participativas aos colaboradores, a rotatividade por falta de reconhecimento da empresa, acaba não sendo mais um problema.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral de Administração. 9. ed. Barueri: Manole, 2014. KAMIA, Meiry. A importância da motivação no ambiente de trabalho. 2014. Disponível em: (#60)http://www.empregoerenda.com.br/editorias/entrevistas/2218-a-importancia-da-motivacao-no-ambiente-de-trabalho/#62. Acesso em: 06 set. 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14157	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4872312 - ANA CAROLINA TIMOTEO VIVEIROS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O DESGASTE PROFISSIONAL POR FALTA DE RECONHECIMENTO			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de reconhecimento do profissional no trabalho afeta os colaboradores e a empresa, impactando em seus resultados, causando a rotatividade e desmotivação dos colaboradores, sendo assim a empresa acaba perdendo bons colaboradores que vão sempre em busca de novas oportunidades de trabalho visando reconhecimento profissional.			
<b>OBJETIVOS</b>	O principal objetivo do trabalho é encontrar soluções que possam influenciar na rotatividade frequente que afetam nos resultados e produtividade nas empresas. Como objetivo específico com a análise dos fatores que levam a rotatividade de colaboradores por falta de reconhecimento, desmotivação, buscam-se estratégias como plano de carreira para a motivação dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	A busca teórica foi realizada através de buscas em sites, pesquisa bibliográfica, visando a busca pela solução para a falta de reconhecimento do profissional.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa, verificou-se que com a falta de reconhecimento profissional, as empresas tendem a ter rotatividade de colaboradores muito expressiva, e isso impacta nos resultados e na produtividade. Segundo Chiavenato (2010), "A rotatividade de pessoal influência muito nos processos e resultados das empresas, com o aumento de competitividade no mercado as empresas acabam conservando seus talentos humanos e procuram evitar que aconteça a rotatividade dos funcionários". Percebe-se que sem a valorização e reconhecimento ao colaborador por parte da empresa, o colaborador começa a se desmotivar e buscar novas oportunidades melhores e que reconheçam o seu valor e empenho no mercado de trabalho. Segundo Chiavenato (2001, p.375), "O desenvolvimento de carreira é um processo formalizado e sequencial que focaliza o planejamento da carreira futura dos funcionários que tem potencial para ocupar cargos mais elevados". Observa-se que a importância do reconhecimento profissional nas empresas é essencial para motivar, desenvolver, engajar os funcionários, minimizando a rotatividade dos colaboradores e mais produtividade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do desenvolvimento do trabalho é possível concluir que a rotatividade de colaboradores acontece de fato, por falta de reconhecimento profissional e desmotivação, pois a empresa não estimula o colaborador a crescer e se dedicar para subir de cargo, ou motivando-o a permanecer na empresa por mais tempo. Sendo assim, quando as empresas passam a implantar planos de carreiras, engajamentos, atividades participativas aos colaboradores, a rotatividade por falta de reconhecimento da empresa, acaba não sendo mais um problema.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral de Administração. 9. ed. Barueri: Manole, 2014. KAMIA, Meiry. A importância da motivação no ambiente de trabalho. 2014. Disponível em: (#60)http://www.empregoerenda.com.br/editorias/entrevistas/2218-a-importancia-da-motivacao-no-ambiente-de-trabalho/#62. Acesso em: 06 set. 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14157	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4886810 - KARLA MAIUMI DE OLIVEIRA KATO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	O DESGASTE PROFISSIONAL POR FALTA DE RECONHECIMENTO			
<b>INTRODUCAO</b>	A falta de reconhecimento do profissional no trabalho afeta os colaboradores e a empresa, impactando em seus resultados, causando a rotatividade e desmotivação dos colaboradores, sendo assim a empresa acaba perdendo bons colaboradores que vão sempre em busca de novas oportunidades de trabalho visando reconhecimento profissional.			
<b>OBJETIVOS</b>	O principal objetivo do trabalho é encontrar soluções que possam influenciar na rotatividade frequente que afetam nos resultados e produtividade nas empresas. Como objetivo específico com a análise dos fatores que levam a rotatividade de colaboradores por falta de reconhecimento, desmotivação, buscam-se estratégias como plano de carreira para a motivação dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	A busca teórica foi realizada através de buscas em sites, pesquisa bibliográfica, visando a busca pela solução para a falta de reconhecimento do profissional.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa, verificou-se que com a falta de reconhecimento profissional, as empresas tendem a ter rotatividade de colaboradores muito expressiva, e isso impacta nos resultados e na produtividade. Segundo Chiavenato (2010), "A rotatividade de pessoal influência muito nos processos e resultados das empresas, com o aumento de competitividade no mercado as empresas acabam conservando seus talentos humanos e procuram evitar que aconteça a rotatividade dos funcionários". Percebe-se que sem a valorização e reconhecimento ao colaborador por parte da empresa, o colaborador começa a se desmotivar e buscar novas oportunidades melhores e que reconheçam o seu valor e empenho no mercado de trabalho. Segundo Chiavenato (2001, p.375), "O desenvolvimento de carreira é um processo formalizado e sequencial que focaliza o planejamento da carreira futura dos funcionários que tem potencial para ocupar cargos mais elevados". Observa-se que a importância do reconhecimento profissional nas empresas é essencial para motivar, desenvolver, engajar os funcionários, minimizando a rotatividade dos colaboradores e mais produtividade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do desenvolvimento do trabalho é possível concluir que a rotatividade de colaboradores acontece de fato, por falta de reconhecimento profissional e desmotivação, pois a empresa não estimula o colaborador a crescer e se dedicar para subir de cargo, ou motivando-o a permanecer na empresa por mais tempo. Sendo assim, quando as empresas passam a implantar planos de carreiras, engajamentos, atividades participativas aos colaboradores, a rotatividade por falta de reconhecimento da empresa, acaba não sendo mais um problema.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral de Administração. 9. ed. Barueri: Manole, 2014. KAMIA, Meiry. A importância da motivação no ambiente de trabalho. 2014. Disponível em: (#60)http://www.empregoerenda.com.br/editorias/entrevistas/2218-a-importancia-da-motivacao-no-ambiente-de-trabalho/#62. Acesso em: 06 set. 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14163	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4374193 - RICARDO VERINALDO DE JESUS DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES SEGUNDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL (PES) PARA O BAIXO PESO AO NASCER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	Segundo a Organização Mundial da Saúde o baixo peso ao nascer é definido como o peso inferior a 2.500g em Nascidos Vivos (NV) <sup>1</sup> . Esta condição está relacionada a maiores taxas de mortalidade infantil <sup>2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem na construção de propostas de intervenções segundo o PES para o baixo peso ao nascer.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência desenvolvido com base na disciplina de Gestão em Saúde, no 7º semestre da graduação em Enfermagem, elaborado durante o período de março a abril de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O PES possibilitou a elaboração de intervenções para os NV com baixo peso. No momento explicativo, onde ocorre a caracterização do problema, de acordo com a matriz GUT o principal problema levantado frente à ocorrência dos NV com baixo peso era a ausência do pré-natal, pois este se configura como um importante fator de proteção <sup>3</sup> . Porém, com base no diagrama de Ishikawa, foram elencados outros 4 nós críticos que potencializam a ocorrência do baixo peso ao nascer, sendo: as infecções congênitas, Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU), Doenças Hipertensivas Gestacionais e gravidez na adolescência. Baseados nestes problemas foram elaboradas propostas de intervenções. Para melhoria na cobertura ao pré-natal foi proposto realizar ações de vigilância, fazer levantamento das gestantes faltosas, mapear e realizar visitas domiciliares, acompanhar assiduidade e ações no pré-natal e captar precocemente novas gestantes. Para este e os outros nós críticos foram propostas ações com jus ao Ministério da Saúde para um pré-natal com qualidade e um olhar a vivência em saúde pública, vista as especificidades da pesquisa. As reuniões de equipe se mostraram essenciais para alinhamento e acompanhamento das ações. A troca de informações se fez primordial, seja nas reuniões ou por meio de sistemas informacionais compartilhados. Algumas ações requeriram a participação multidisciplinar e colaboração de atores sociais, como na RCIU induzida pela drogadição e condições alimentares e na gravidez na adolescência. As vistas domiciliares possuíram destaque como fonte de contato nas ações. O enfermeiro foi citado em 46,34% das ações como responsável principal, mostrando sua potencialidade na gestão em Saúde Pública.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao elaborar esta pesquisa observa-se a real noção dos problemas de saúde pública, a necessidade de agir sobre as causas dos problemas e a importância do método do Planejamento Estratégico Situacional para auxiliar nas intervenções sobre os problemas de saúde			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Moreira AIM, Sousa PRM, Sarno F. Baixo peso ao nascer e seus fatores associados. <i>einstein</i> (São Paulo). 2018;16(4):eAO4251. [Acesso em 2023 abr 08] Disponível em: <a href="https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2018AO4251">https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2018AO4251</a> 2. Gaiva MAM; Fujimori E; Sato APS. Mortalidade neonatal em crianças com baixo peso ao nascer. [internet]. <i>Rev Esc Enferm USP</i> . 2014. 48(5): 778-786. [acesso em 2023 mar 20]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rreusp/a/6FdL3Rk7BK9SkpNbGFQkk4TF/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/rreusp/a/6FdL3Rk7BK9SkpNbGFQkk4TF/?format=pdf(#38)lang=pt</a> 3. 11. ALVES, J.M. et al. Causas associadas ao baixo peso ao nascer: Uma revisão integrativa. [internet]. <i>Revista Uningá</i> , v.56, n. S6, p. 85-102, 2019.[acesso 2023 abr 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/csp/a/CGMbDP4r4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/j/csp/a/CGMbDP4r4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14163	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4380223 - RAPHAELA SOARES DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES SEGUNDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL (PES) PARA O BAIXO PESO AO NASCER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	Segundo a Organização Mundial da Saúde o baixo peso ao nascer é definido como o peso inferior a 2.500g em Nascidos Vivos (NV) <sup>1</sup> . Esta condição está relacionada a maiores taxas de mortalidade infantil <sup>2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem na construção de propostas de intervenções segundo o PES para o baixo peso ao nascer.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência desenvolvido com base na disciplina de Gestão em Saúde, no 7º semestre da graduação em Enfermagem, elaborado durante o período de março a abril de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O PES possibilitou a elaboração de intervenções para os NV com baixo peso. No momento explicativo, onde ocorre a caracterização do problema, de acordo com a matriz GUT o principal problema levantado frente à ocorrência dos NV com baixo peso era a ausência do pré-natal, pois este se configura como um importante fator de proteção <sup>3</sup> . Porém, com base no diagrama de Ishikawa, foram elencados outros 4 nós críticos que potencializam a ocorrência do baixo peso ao nascer, sendo: as infecções congênitas, Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU), Doenças Hipertensivas Gestacionais e gravidez na adolescência. Baseados nestes problemas foram elaboradas propostas de intervenções. Para melhoria na cobertura ao pré-natal foi proposto realizar ações de vigilância, fazer levantamento das gestantes faltosas, mapear e realizar visitas domiciliares, acompanhar assiduidade e ações no pré-natal e captar precocemente novas gestantes. Para este e os outros nós críticos foram propostas ações com jus ao Ministério da Saúde para um pré-natal com qualidade e um olhar a vivência em saúde pública, vista as especificidades da pesquisa. As reuniões de equipe se mostraram essenciais para alinhamento e acompanhamento das ações. A troca de informações se fez primordial, seja nas reuniões ou por meio de sistemas informacionais compartilhados. Algumas ações requeriram a participação multidisciplinar e colaboração de atores sociais, como na RCIU induzida pela drogadição e condições alimentares e na gravidez na adolescência. As vistas domiciliares possuíram destaque como fonte de contato nas ações. O enfermeiro foi citado em 46,34% das ações como responsável principal, mostrando sua potencialidade na gestão em Saúde Pública.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao elaborar esta pesquisa observa-se a real noção dos problemas de saúde pública, a necessidade de agir sobre as causas dos problemas e a importância do método do Planejamento Estratégico Situacional para auxiliar nas intervenções sobre os problemas de saúde			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Moreira AIM, Sousa PRM, Sarno F. Baixo peso ao nascer e seus fatores associados. <i>einstein</i> (São Paulo). 2018;16(4):eAO4251. [Acesso em 2023 abr 08] Disponível em: <a href="https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2018AO4251">https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2018AO4251</a> 2. Gaiva MAM; Fujimori E; Sato APS. Mortalidade neonatal em crianças com baixo peso ao nascer. [internet]. <i>Rev Esc Enferm USP</i> . 2014. 48(5): 778-786. . [acesso em 2023 mar 20]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rj/reeusp/a/6FdL3Rk7BK9SkpNbGFQkk4TF/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/rj/reeusp/a/6FdL3Rk7BK9SkpNbGFQkk4TF/?format=pdf(#38)lang=pt</a> 3. 11. ALVES, J.M. et al. Causas associadas ao baixo peso ao nascer: Uma revisão integrativa. [internet]. <i>Revista Uningá</i> , v.56, n. S6, p. 85-102, 2019.[acesso 2023 abr 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/csp/a/CGMbDP4r4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/j/csp/a/CGMbDP4r4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14163	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4416350 - MARIA RITA MOURA SALES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseil de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES SEGUNDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL (PES) PARA O BAIXO PESO AO NASCER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	Segundo a Organização Mundial da Saúde o baixo peso ao nascer é definido como o peso inferior a 2.500g em Nascidos Vivos (NV) <sup>1</sup> . Esta condição está relacionada a maiores taxas de mortalidade infantil <sup>2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem na construção de propostas de intervenções segundo o PES para o baixo peso ao nascer.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência desenvolvido com base na disciplina de Gestão em Saúde, no 7º semestre da graduação em Enfermagem, elaborado durante o período de março a abril de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O PES possibilitou a elaboração de intervenções para os NV com baixo peso. No momento explicativo, onde ocorre a caracterização do problema, de acordo com a matriz GUT o principal problema levantado frente à ocorrência dos NV com baixo peso era a ausência do pré-natal, pois este se configura como um importante fator de proteção <sup>3</sup> . Porém, com base no diagrama de Ishikawa, foram elencados outros 4 nós críticos que potencializam a ocorrência do baixo peso ao nascer, sendo: as infecções congênitas, Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU), Doenças Hipertensivas Gestacionais e gravidez na adolescência. Baseados nestes problemas foram elaboradas propostas de intervenções. Para melhoria na cobertura ao pré-natal foi proposto realizar ações de vigilância, fazer levantamento das gestantes faltosas, mapear e realizar visitas domiciliares, acompanhar assiduidade e ações no pré-natal e captar precocemente novas gestantes. Para este e os outros nós críticos foram propostas ações com jus ao Ministério da Saúde para um pré-natal com qualidade e um olhar a vivência em saúde pública, vista as especificidades da pesquisa. As reuniões de equipe se mostraram essenciais para alinhamento e acompanhamento das ações. A troca de informações se fez primordial, seja nas reuniões ou por meio de sistemas informacionais compartilhados. Algumas ações requeriram a participação multidisciplinar e colaboração de atores sociais, como na RCIU induzida pela drogadição e condições alimentares e na gravidez na adolescência. As vistas domiciliares possuíram destaque como fonte de contato nas ações. O enfermeiro foi citado em 46,34% das ações como responsável principal, mostrando sua potencialidade na gestão em Saúde Pública.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao elaborar esta pesquisa observa-se a real noção dos problemas de saúde pública, a necessidade de agir sobre as causas dos problemas e a importância do método do Planejamento Estratégico Situacional para auxiliar nas intervenções sobre os problemas de saúde			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Moreira AIM, Sousa PRM, Sarno F. Baixo peso ao nascer e seus fatores associados. <i>einstein</i> (São Paulo). 2018;16(4):eAO4251. [Acesso em 2023 abr 08] Disponível em: <a href="https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2018AO4251">https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2018AO4251</a> 2. Gaiva MAM; Fujimori E; Sato APS. Mortalidade neonatal em crianças com baixo peso ao nascer. [internet]. <i>Rev Esc Enferm USP</i> . 2014. 48(5): 778-786. . [acesso em 2023 mar 20]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/r/reeusp/a/6FdL3Rk7BK9SkpNbGFQkk4TF/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/r/reeusp/a/6FdL3Rk7BK9SkpNbGFQkk4TF/?format=pdf(#38)lang=pt</a> 3. 11. ALVES, J.M. et al. Causas associadas ao baixo peso ao nascer: Uma revisão integrativa. [internet]. <i>Revista Uningá</i> , v.56, n. S6, p. 85-102, 2019.[acesso 2023 abr 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/csp/a/CGMbDP4r4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/j/csp/a/CGMbDP4r4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14164	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4378709 - NATHALIA VITÓRIA ALVES NOVAES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	INCIDÊNCIA DO BAIXO PESO AO NASCER: UM COMPARATIVO DOS DADOS DO BRASIL COM O ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2010-2020			
<b>INTRODUCAO</b>	O baixo peso ao nascer é um problema de saúde pública relacionado com maior morbimortalidade e um indicativo de desigualdade socioeconômica e assistência materno-infantil ineficaz 1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar a incidência epidemiológica do baixo peso ao nascer no Brasil com o Estado de São Paulo no período de 2010 a 2020.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal no qual utilizou-se dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), com recorte no período de 2010 a 2020.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Houve um total de 31.887.329 NV no Brasil, isto de acordo com o SINASC, desses, 8,5% nasceram com baixo peso (n=2.709.352). Nestes 10 anos de análise, o estado de São Paulo se manteve em primeiro lugar em relação aos outros estados, representando 20,87% dos nascimentos de bebês com baixo peso. Em relação às taxas anuais, o ano no qual o Brasil possuiu o maior número de nascimentos de crianças com baixo peso foi 2015, representando cerca de 9,4% dos nascidos nesta década, coincidentemente, no Estado de São Paulo também, configurando 9,42% dos nascimentos com baixo peso. Acerca das taxas de incidência, tanto no Brasil quanto em São Paulo as tendências são semelhantes, sendo o ano de 2019 o que obteve as maiores incidências em ambos, apresentando 8,70% e 9,37%. As análises demonstraram que as incidências apresentadas no Brasil foram menores que as presentes em São Paulo. Do início do período de análise ao final, as taxas de incidência do Brasil aumentaram em cerca de 0,18% e em São Paulo diminuíram em cerca de 0,12%. A diferença das taxas de incidência do Brasil e de São Paulo mostraram que, no estado, houve 0,80% a mais de incidência de nascidos com baixo peso ao nascer em relação ao Brasil, isto no ano de 2010. Esta diferença reduziu para 0,77% no ano de 2011, aumentou nos anos seguintes representando 0,83% e 0,80% em 2012 e 2013, reduzindo e mantendo constância nos próximos anos representando 0,76% e 0,66% nos anos de 2014 e 2015, 0,65% e 0,66% nos anos de 2016 e 2017. Se manteve estável nos anos de 2018 e 2019 representando 0,67% e em 2020 reduziu para a menor taxa de diferença no período analisado, cerca de 0,50%, sendo esse o ano onde as incidências apresentaram menor diferença em relação às suas taxas.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Identifica-se que nascidos vivos de baixo peso, apresentam um problema de saúde pública com necessidade de intervenções formuladas por equipe multidisciplinar sobre a causa.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1. Datasus Brasil. Sistema de informação sobre nascidos vivos. [internet]. [acesso em 2023 mar 26]. Disponível em: <a href="https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/">https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/</a></p> <p>2. ALVES, J.M. et al. Causas associadas ao baixo peso ao nascer: Uma revisão integrativa. [internet]. Revista Uningá, v.56, n. S6, p. 85-102, 2019. [acesso 2023 abr 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt</a></p> <p>3. Ferraz, T. da R. (#38) Neves, E. T. Fatores de risco para baixo peso ao nascer em maternidades públicas: um estudo transversal. Rev. Gaúcha Enferm. 32, 86–92 (2011). Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ij/genf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#">https://www.scielo.br/ij/genf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14164	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4378725 - JULIA CUNARRO LOPES PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	INCIDÊNCIA DO BAIXO PESO AO NASCER: UM COMPARATIVO DOS DADOS DO BRASIL COM O ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2010-2020			
<b>INTRODUCAO</b>	O baixo peso ao nascer é um problema de saúde pública relacionado com maior morbimortalidade e um indicativo de desigualdade socioeconômica e assistência materno-infantil ineficaz 1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar a incidência epidemiológica do baixo peso ao nascer no Brasil com o Estado de São Paulo no período de 2010 a 2020.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal no qual utilizou-se dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), com recorte no período de 2010 a 2020.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Houve um total de 31.887.329 NV no Brasil, isto de acordo com o SINASC, desses, 8,5% nasceram com baixo peso (n=2.709.352). Nestes 10 anos de análise, o estado de São Paulo se manteve em primeiro lugar em relação aos outros estados, representando 20,87% dos nascimentos de bebês com baixo peso. Em relação às taxas anuais, o ano no qual o Brasil possuiu o maior número de nascimentos de crianças com baixo peso foi 2015, representando cerca de 9,4% dos nascidos nesta década, coincidentemente, no Estado de São Paulo também, configurando 9,42% dos nascimentos com baixo peso. Acerca das taxas de incidência, tanto no Brasil quanto em São Paulo as tendências são semelhantes, sendo o ano de 2019 o que obteve as maiores incidências em ambos, apresentando 8,70% e 9,37%. As análises demonstraram que as incidências apresentadas no Brasil foram menores que as presentes em São Paulo. Do início do período de análise ao final, as taxas de incidência do Brasil aumentaram em cerca de 0,18% e em São Paulo diminuíram em cerca de 0,12%. A diferença das taxas de incidência do Brasil e de São Paulo mostraram que, no estado, houve 0,80% a mais de incidência de nascidos com baixo peso ao nascer em relação ao Brasil, isto no ano de 2010. Esta diferença reduziu para 0,77% no ano de 2011, aumentou nos anos seguintes representando 0,83% e 0,80% em 2012 e 2013, reduzindo e mantendo constância nos próximos anos representando 0,76% e 0,66% nos anos de 2014 e 2015, 0,65% e 0,66% nos anos de 2016 e 2017. Se manteve estável nos anos de 2018 e 2019 representando 0,67% e em 2020 reduziu para a menor taxa de diferença no período analisado, cerca de 0,50%, sendo esse o ano onde as incidências apresentaram menor diferença em relação às suas taxas.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Identifica-se que nascidos vivos de baixo peso, apresentam um problema de saúde pública com necessidade de intervenções formuladas por equipe multidisciplinar sobre a causa.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1. Datasus Brasil. Sistema de informação sobre nascidos vivos. [internet]. [acesso em 2023 mar 26]. Disponível em: <a href="https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/">https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/</a></p> <p>2. ALVES, J.M. et al. Causas associadas ao baixo peso ao nascer: Uma revisão integrativa. [internet]. Revista Uningá, v.56, n. S6, p. 85-102, 2019. [acesso 2023 abr 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt</a></p> <p>3. Ferraz, T. da R. (#38) Neves, E. T. Fatores de risco para baixo peso ao nascer em maternidades públicas: um estudo transversal. Rev. Gaúcha Enferm. 32, 86–92 (2011). Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rgenf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#">https://www.scielo.br/rgenf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14164	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4415833 - LUANA NASH RUTSCHKA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	INCIDÊNCIA DO BAIXO PESO AO NASCER: UM COMPARATIVO DOS DADOS DO BRASIL COM O ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2010-2020			
<b>INTRODUCAO</b>	O baixo peso ao nascer é um problema de saúde pública relacionado com maior morbimortalidade e um indicativo de desigualdade socioeconômica e assistência materno-infantil ineficaz 1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar a incidência epidemiológica do baixo peso ao nascer no Brasil com o Estado de São Paulo no período de 2010 a 2020.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal no qual utilizou-se dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), com recorte no período de 2010 a 2020.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Houve um total de 31.887.329 NV no Brasil, isto de acordo com o SINASC, desses, 8,5% nasceram com baixo peso (n=2.709.352). Nestes 10 anos de análise, o estado de São Paulo se manteve em primeiro lugar em relação aos outros estados, representando 20,87% dos nascimentos de bebês com baixo peso. Em relação às taxas anuais, o ano no qual o Brasil possuiu o maior número de nascimentos de crianças com baixo peso foi 2015, representando cerca de 9,4% dos nascidos nesta década, coincidentemente, no Estado de São Paulo também, configurando 9,42% dos nascimentos com baixo peso. Acerca das taxas de incidência, tanto no Brasil quanto em São Paulo as tendências são semelhantes, sendo o ano de 2019 o que obteve as maiores incidências em ambos, apresentando 8,70% e 9,37%. As análises demonstraram que as incidências apresentadas no Brasil foram menores que as presentes em São Paulo. Do início do período de análise ao final, as taxas de incidência do Brasil aumentaram em cerca de 0,18% e em São Paulo diminuíram em cerca de 0,12%. A diferença das taxas de incidência do Brasil e de São Paulo mostraram que, no estado, houve 0,80% a mais de incidência de nascidos com baixo peso ao nascer em relação ao Brasil, isto no ano de 2010. Esta diferença reduziu para 0,77% no ano de 2011, aumentou nos anos seguintes representando 0,83% e 0,80% em 2012 e 2013, reduzindo e mantendo constância nos próximos anos representando 0,76% e 0,66% nos anos de 2014 e 2015, 0,65% e 0,66% nos anos de 2016 e 2017. Se manteve estável nos anos de 2018 e 2019 representando 0,67% e em 2020 reduziu para a menor taxa de diferença no período analisado, cerca de 0,50%, sendo esse o ano onde as incidências apresentaram menor diferença em relação às suas taxas.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Identifica-se que nascidos vivos de baixo peso, apresentam um problema de saúde pública com necessidade de intervenções formuladas por equipe multidisciplinar sobre a causa.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Datasus Brasil. Sistema de informação sobre nascidos vivos. [internet]. [acesso em 2023 mar 26]. Disponível em: <a href="https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/">https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/</a></p> <p>2. ALVES, J.M. et al. Causas associadas ao baixo peso ao nascer: Uma revisão integrativa. [internet]. Revista Uningá, v.56, n. S6, p. 85-102, 2019. [acesso 2023 abr 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt</a></p> <p>3. Ferraz, T. da R. (#38) Neves, E. T. Fatores de risco para baixo peso ao nascer em maternidades públicas: um estudo transversal. Rev. Gaúcha Enferm. 32, 86–92 (2011). Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ij/genf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#">https://www.scielo.br/ij/genf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14164	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4439261 - CINTIA APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	INCIDÊNCIA DO BAIXO PESO AO NASCER: UM COMPARATIVO DOS DADOS DO BRASIL COM O ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2010-2020			
<b>INTRODUCAO</b>	O baixo peso ao nascer é um problema de saúde pública relacionado com maior morbimortalidade e um indicativo de desigualdade socioeconômica e assistência materno-infantil ineficaz 1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar a incidência epidemiológica do baixo peso ao nascer no Brasil com o Estado de São Paulo no período de 2010 a 2020.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal no qual utilizou-se dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), com recorte no período de 2010 a 2020.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Houve um total de 31.887.329 NV no Brasil, isto de acordo com o SINASC, desses, 8,5% nasceram com baixo peso (n=2.709.352). Nestes 10 anos de análise, o estado de São Paulo se manteve em primeiro lugar em relação aos outros estados, representando 20,87% dos nascimentos de bebês com baixo peso. Em relação às taxas anuais, o ano no qual o Brasil possuiu o maior número de nascimentos de crianças com baixo peso foi 2015, representando cerca de 9,4% dos nascidos nesta década, coincidentemente, no Estado de São Paulo também, configurando 9,42% dos nascimentos com baixo peso. Acerca das taxas de incidência, tanto no Brasil quanto em São Paulo as tendências são semelhantes, sendo o ano de 2019 o que obteve as maiores incidências em ambos, apresentando 8,70% e 9,37%. As análises demonstraram que as incidências apresentadas no Brasil foram menores que as presentes em São Paulo. Do início do período de análise ao final, as taxas de incidência do Brasil aumentaram em cerca de 0,18% e em São Paulo diminuíram em cerca de 0,12%. A diferença das taxas de incidência do Brasil e de São Paulo mostraram que, no estado, houve 0,80% a mais de incidência de nascidos com baixo peso ao nascer em relação ao Brasil, isto no ano de 2010. Esta diferença reduziu para 0,77% no ano de 2011, aumentou nos anos seguintes representando 0,83% e 0,80% em 2012 e 2013, reduzindo e mantendo constância nos próximos anos representando 0,76% e 0,66% nos anos de 2014 e 2015, 0,65% e 0,66% nos anos de 2016 e 2017. Se manteve estável nos anos de 2018 e 2019 representando 0,67% e em 2020 reduziu para a menor taxa de diferença no período analisado, cerca de 0,50%, sendo esse o ano onde as incidências apresentaram menor diferença em relação às suas taxas.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Identifica-se que nascidos vivos de baixo peso, apresentam um problema de saúde pública com necessidade de intervenções formuladas por equipe multidisciplinar sobre a causa.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Datasus Brasil. Sistema de informação sobre nascidos vivos. [internet]. [acesso em 2023 mar 26]. Disponível em: <a href="https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/">https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/</a></p> <p>2. ALVES, J.M. et al. Causas associadas ao baixo peso ao nascer: Uma revisão integrativa. [internet]. Revista Uningá, v.56, n. S6, p. 85-102, 2019. [acesso 2023 abr 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/ij/csp/a/CGMbDP4FL5qYQCpPKSVQpC/?format=pdf(#38)lang=pt</a></p> <p>3. Ferraz, T. da R. (#38) Neves, E. T. Fatores de risco para baixo peso ao nascer em maternidades públicas: um estudo transversal. Rev. Gaúcha Enferm. 32, 86–92 (2011). Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ij/genf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#">https://www.scielo.br/ij/genf/a/CVGmYZy45Lty3XdTBvzVdN?lang=pt#</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14165	Enfermagem de Saúde Pública	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		4374193 - RICARDO VERINALDO DE JESUS DA SILVA		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Roseli de Lana Moreira		
TITULO	PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM CRIANÇAS DE 0 A 9 ANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			
INTRODUÇÃO	As Condições Sensíveis da Atenção Primária (CSAP) são um conjunto de 19 grupos de diagnósticos presentes no CID-10, que partilham a característica de serem condições de enfrentamento no nível primário de atenção à Saúde. As internações por estas causas em crianças refletem geralmente condições agudas. Estudos vêm sendo desenvolvidos em todo território nacional acerca das Internações por CSAP no público pediátrico, auxiliando a elaboração de estratégias para garantir acesso a saúde da criança e diminuir as Internações por CSAP1,2.			
OBJETIVOS	Descrever o perfil das Internações em crianças de 0 a 9 anos por Condições Sensíveis da Atenção Primária no Município de São Paulo no período de 2012 a 2022.			
METODOLOGIA	Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, retrospectivo a qual utilizou dados secundários do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) coletados mediante TABNET3. As variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária, raça/cor e Tempo de permanência.			
RESULTADOS	Durante o período de 10 anos, houve 216.021 Internações por Condições Sensíveis da Atenção Primária em crianças de 0 a 9 anos no Município (média=19.638 internações). As internações estiveram em ascendência em grande parte do período analisado e a Coordenadoria Regional Sul obteve o maior percentual de internações (22,80%). As crianças hospitalizadas em grande maioria pertenciam ao sexo masculino (54,14%), menores de 1 ano de idade (44,09%) e autodeclaradas brancas (37,41%). As ICSAP obtiveram como causa principal as Doenças Pulmonares, configurando 33,25% das internações, seguido por Asma com 16,40% e Gastroenterites infecciosas e complicações com 10,66%. No período analisado, as doenças Imunopreveníveis configuraram as maiores reduções no percentual de internações no comparativo no início e final da análise (redução de 77,4%). Do grupo de Doenças Pulmonares, a Bronquiolite Aguda foi responsável pelo maior percentual de internações (89,78%) e o tempo de permanência no ambiente hospitalar perdurou o período de até 7 dias de internação (83,74%).			
CONCLUSÕES	Foram denotados aumentos em relação as ICSAP em crianças de 0 a 9 anos no Município de São Paulo, o que pode enfatizar lacunas na assistência ofertada pela Atenção Primária à Saúde. Contudo, cabe a criação de políticas que proporcionem melhorias na cobertura e fortalecimento da APS, além de um árduo trabalho dos profissionais atuantes na Atenção Primária para proporcionar melhorias a acessibilidade e resolutividade, visando a diminuição nas ICSAP.			
REFERÊNCIAS	1. Santos BV, Lima DS, Fontes CJF. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de Rondônia: estudo descritivo do período 2012-2016. [internet]. Epidemiol. Serv. Saúde. 2019; 28(1):1-12. [acesso em 2023 jul 24]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/ress/a/afxDCSZHjY7LYdmvYBRP4qx/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/j/ress/a/afxDCSZHjY7LYdmvYBRP4qx/?format=pdf(#38)lang=pt</a> 2. FREITAS GL, et al. Tendências temporais de internações de crianças por condições sensíveis à atenção primária em Minas Gerais, Brasil. [internet]. Rev Min Enferm. 2022; 26:e-1431. [acesso em 2023 jul 26]. Disponível em: <a href="http://www.revenf.bvs.br/pdf/reme/v26/1415-2762-reme-26-e-1431.pdf">http://www.revenf.bvs.br/pdf/reme/v26/1415-2762-reme-26-e-1431.pdf</a> . DOI: 10.35699/2316-9389.2022.38797 3. TABNET. Ministério da Saúde/ DATASUS/ Sistema de Informação Hospitalar- SIH/SUS. Internações hospitalares. [internet]. Abr 2012. [acesso em 2023 jul 29]. Disponível em: <a href="http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def">http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14166	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4326938 - THAISY AMORIM DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Cristina Micchelucci Malanga	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Estudo dos benefícios federais ao Microempreendedor			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O Brasil tem aproximadamente 15,1 milhões de microempreendedores<sup>1</sup>. O governo federal fomenta a economia por vários meios, dentre estes, o fomento aos microempreendedores. Tais informações são divulgadas no site da Receita Federal do Brasil. Ocorre que boa parte deste público alvo não tem acesso ou as vezes qualificações respalde a obtenção das informações relacionadas aos benefícios do MEI (Microempreendedor). O governo incentiva o uso do Programa MEI para a regularização das atividades dos microempreendedores elevando a arrecadação de impostos, acompanhar os indicadores e a sustentabilidade da economia do país determinando e monitorando as Políticas Públicas Financeiras, impactando no número de empregos, na qualidade da saúde do trabalhador e também na movimentação da oferta e demanda de produtos e serviços.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar um estudo qualitativo sobre os benefícios oferecidos pelo MEI providos pela Governo Federal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e um estudo dirigido no no site da Receita Federal do Brasil listando os benefícios providos aos microempreendedores no Programa MEI. Também foram realizadas abordagens a microempreendedores que atuam em escolas, universidades, terminais de ônibus, além de proprietários de lojas no Marketing Digital da cidade de São Paulo.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O estudo do Programa MEI demonstrou que o governo provê benefícios voltados a possibilidade de auxílios previdenciários como a aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e pensão por morte além do fomento de crédito a taxas mais atrativas que as do setor bancário, cobrança única de impostos variando entre 8% até 32%, conforme faturamento mensal. Os créditos e financiamentos podem ser destinados a compra ou troca de maquinário e equipamentos (imobilizado em geral), reformas, contratações de funcionários, acesso a convênios de saúde com baixo custo em relação aos valores individuais da pessoa física. O estudo observa que apesar dos benefícios serem atrativos e darem maior segurança ao microempreendedor, ainda há um passo relacionado ao acesso as informações a serem trabalhados em razão de boa parte destes, não terem facilidade ao uso da internet, ou mesmo recursos suficientes para o uso dos benefícios concedidos via digital. A problemática desta pesquisa envolveu microempreendedores atuando com a venda de alimentos (pipoca, "hot dog", hamburguer, milho, churrasco) na porta de Universidade, marketing de multinível (lojas on line).</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>O estudo apresentou uma lacuna entre o conhecimento dos microempreendedores que participaram da pesquisa (pipoqueiro, milheiro, dono de loja on line) em razão da falta de acesso aos benefícios oferecidos pelo Governo por meio do Programa MEI (disponível no site da Receita Federal do Brasil). Uma proposta de intervenção poderia ser, como relatado na abordagem da amostra a produção de materiais impressos (folders) com divulgação in loco ou mesmo por meio da estrutura dos Núcleo de Apoio Financeiro (postos da Receita Federal) junto às Universidades.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Receita Federal do Brasil. Disponível em <a href="http://mei.receita.economia.gov.br">mei.receita.economia.gov.br</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14166	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4422201 - PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Cristina Micchelucci Malanga	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Estudo dos benefícios federais ao Microempreendedor			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O Brasil tem aproximadamente 15,1 milhões de microempreendedores<sup>1</sup>. O governo federal fomenta a economia por vários meios, dentre estes, o fomento aos microempreendedores. Tais informações são divulgadas no site da Receita Federal do Brasil. Ocorre que boa parte deste público alvo não tem acesso ou as vezes qualificações respalde a obtenção das informações relacionadas aos benefícios do MEI (Microempreendedor). O governo incentiva o uso do Programa MEI para a regularização das atividades dos microempreendedores elevando a arrecadação de impostos, acompanhar os indicadores e a sustentabilidade da economia do país determinando e monitorando as Políticas Públicas Financeiras, impactando no número de empregos, na qualidade da saúde do trabalhador e também na movimentação da oferta e demanda de produtos e serviços.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar um estudo qualitativo sobre os benefícios oferecidos pelo MEI providos pela Governo Federal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e um estudo dirigido no no site da Receita Federal do Brasil listando os benefícios providos aos microempreendedores no Programa MEI. Também foram realizadas abordagens a microempreendedores que atuam em escolas, universidades, terminais de ônibus, além de proprietários de lojas no Marketing Digital da cidade de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O estudo do Programa MEI demonstrou que o governo provê benefícios voltados a possibilidade de auxílios previdenciários como a aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e pensão por morte além do fomento de crédito a taxas mais atrativas que as do setor bancário, cobrança única de impostos variando entre 8% até 32%, conforme faturamento mensal. Os créditos e financiamentos podem ser destinados a compra ou troca de maquinário e equipamentos (imobilizado em geral), reformas, contratações de funcionários, acesso a convênios de saúde com baixo custo em relação aos valores individuais da pessoa física. O estudo observa que apesar dos benefícios serem atrativos e darem maior segurança ao microempreendedor, ainda há um passo relacionado ao acesso as informações a serem trabalhados em razão de boa parte destes, não terem facilidade ao uso da internet, ou mesmo recursos suficientes para o uso dos benefícios concedidos via digital. A problemática desta pesquisa envolveu microempreendedores atuando com a venda de alimentos (pipoca, "hot dog", hamburguer, milho, churrasco) na porta de Universidade, marketing de multinível (lojas on line).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O estudo apresentou uma lacuna entre o conhecimento dos microempreendedores que participaram da pesquisa (pipoqueiro, milheiro, dono de loja on line) em razão da falta de acesso aos benefícios oferecidos pelo Governo por meio do Programa MEI (disponível no site da Receita Federal do Brasil). Uma proposta de intervenção poderia ser, como relatado na abordagem da amostra a produção de materiais impressos (folders) com divulgação in loco ou mesmo por meio da estrutura dos Núcleo de Apoio Financeiro (postos da Receita Federal) junto às Universidades.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Receita Federal do Brasil. Disponível em <a href="http://mei.receita.economia.gov.br">mei.receita.economia.gov.br</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14166	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4425618 - LUIZ GUSTAVO BAPTISTA PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Cristina Micchelucci Malanga	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Estudo dos benefícios federais ao Microempreendedor			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O Brasil tem aproximadamente 15,1 milhões de microempreendedores<sup>1</sup>. O governo federal fomenta a economia por vários meios, dentre estes, o fomento aos microempreendedores. Tais informações são divulgadas no site da Receita Federal do Brasil. Ocorre que boa parte deste público alvo não tem acesso ou as vezes qualificações respalde a obtenção das informações relacionadas aos benefícios do MEI (Microempreendedor). O governo incentiva o uso do Programa MEI para a regularização das atividades dos microempreendedores elevando a arrecadação de impostos, acompanhar os indicadores e a sustentabilidade da economia do país determinando e monitorando as Políticas Públicas Financeiras, impactando no número de empregos, na qualidade da saúde do trabalhador e também na movimentação da oferta e demanda de produtos e serviços.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar um estudo qualitativo sobre os benefícios oferecidos pelo MEI providos pela Governo Federal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e um estudo dirigido no no site da Receita Federal do Brasil listando os benefícios providos aos microempreendedores no Programa MEI. Também foram realizadas abordagens a microempreendedores que atuam em escolas, universidades, terminais de ônibus, além de proprietários de lojas no Marketing Digital da cidade de São Paulo.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O estudo do Programa MEI demonstrou que o governo provê benefícios voltados a possibilidade de auxílios previdenciários como a aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e pensão por morte além do fomento de crédito a taxas mais atrativas que as do setor bancário, cobrança única de impostos variando entre 8% até 32%, conforme faturamento mensal. Os créditos e financiamentos podem ser destinados a compra ou troca de maquinário e equipamentos (imobilizado em geral), reformas, contratações de funcionários, acesso a convênios de saúde com baixo custo em relação aos valores individuais da pessoa física. O estudo observa que apesar dos benefícios serem atrativos e darem maior segurança ao microempreendedor, ainda há um passo relacionado ao acesso as informações a serem trabalhados em razão de boa parte destes, não terem facilidade ao uso da internet, ou mesmo recursos suficientes para o uso dos benefícios concedidos via digital. A problemática desta pesquisa envolveu microempreendedores atuando com a venda de alimentos (pipoca, "hot dog", hamburguer, milho, churrasco) na porta de Universidade, marketing de multinível (lojas on line).</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>O estudo apresentou uma lacuna entre o conhecimento dos microempreendedores que participaram da pesquisa (pipoqueiro, milheiro, dono de loja on line) em razão da falta de acesso aos benefícios oferecidos pelo Governo por meio do Programa MEI (disponível no site da Receita Federal do Brasil). Uma proposta de intervenção poderia ser, como relatado na abordagem da amostra a produção de materiais impressos (folders) com divulgação in loco ou mesmo por meio da estrutura dos Núcleo de Apoio Financeiro (postos da Receita Federal) junto às Universidades.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Receita Federal do Brasil. Disponível em <a href="http://mei.receita.economia.gov.br">mei.receita.economia.gov.br</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14166	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4431171 - LETICIA FRANCO SIQUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Cristina Micchelucci Malanga	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Estudo dos benefícios federais ao Microempreendedor			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O Brasil tem aproximadamente 15,1 milhões de microempreendedores<sup>1</sup>. O governo federal fomenta a economia por vários meios, dentre estes, o fomento aos microempreendedores. Tais informações são divulgadas no site da Receita Federal do Brasil. Ocorre que boa parte deste público alvo não tem acesso ou as vezes qualificações respalde a obtenção das informações relacionadas aos benefícios do MEI (Microempreendedor). O governo incentiva o uso do Programa MEI para a regularização das atividades dos microempreendedores elevando a arrecadação de impostos, acompanhar os indicadores e a sustentabilidade da economia do país determinando e monitorando as Políticas Públicas Financeiras, impactando no número de empregos, na qualidade da saúde do trabalhador e também na movimentação da oferta e demanda de produtos e serviços.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar um estudo qualitativo sobre os benefícios oferecidos pelo MEI providos pela Governo Federal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e um estudo dirigido no no site da Receita Federal do Brasil listando os benefícios providos aos microempreendedores no Programa MEI. Também foram realizadas abordagens a microempreendedores que atuam em escolas, universidades, terminais de ônibus, além de proprietários de lojas no Marketing Digital da cidade de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O estudo do Programa MEI demonstrou que o governo provê benefícios voltados a possibilidade de auxílios previdenciários como a aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e pensão por morte além do fomento de crédito a taxas mais atrativas que as do setor bancário, cobrança única de impostos variando entre 8% até 32%, conforme faturamento mensal. Os créditos e financiamentos podem ser destinados a compra ou troca de maquinário e equipamentos (imobilizado em geral), reformas, contratações de funcionários, acesso a convênios de saúde com baixo custo em relação aos valores individuais da pessoa física. O estudo observa que apesar dos benefícios serem atrativos e darem maior segurança ao microempreendedor, ainda há um passo relacionado ao acesso as informações a serem trabalhados em razão de boa parte destes, não terem facilidade ao uso da internet, ou mesmo recursos suficientes para o uso dos benefícios concedidos via digital. A problemática desta pesquisa envolveu microempreendedores atuando com a venda de alimentos (pipoca, "hot dog", hamburguer, milho, churrasco) na porta de Universidade, marketing de multinível (lojas on line).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O estudo apresentou uma lacuna entre o conhecimento dos microempreendedores que participaram da pesquisa (pipoqueiro, milheiro, dono de loja on line) em razão da falta de acesso aos benefícios oferecidos pelo Governo por meio do Programa MEI (disponível no site da Receita Federal do Brasil). Uma proposta de intervenção poderia ser, como relatado na abordagem da amostra a produção de materiais impressos (folders) com divulgação in loco ou mesmo por meio da estrutura dos Núcleo de Apoio Financeiro (postos da Receita Federal) junto às Universidades.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Receita Federal do Brasil. Disponível em <a href="http://mei.receita.economia.gov.br">mei.receita.economia.gov.br</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14166	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442717 - LUANA PEREIRA MENDES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Cristina Micchelucci Malanga	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Estudo dos benefícios federais ao Microempreendedor			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O Brasil tem aproximadamente 15,1 milhões de microempreendedores<sup>1</sup>. O governo federal fomenta a economia por vários meios, dentre estes, o fomento aos microempreendedores. Tais informações são divulgadas no site da Receita Federal do Brasil. Ocorre que boa parte deste público alvo não tem acesso ou as vezes qualificações respalde a obtenção das informações relacionadas aos benefícios do MEI (Microempreendedor). O governo incentiva o uso do Programa MEI para a regularização das atividades dos microempreendedores elevando a arrecadação de impostos, acompanhar os indicadores e a sustentabilidade da economia do país determinando e monitorando as Políticas Públicas Financeiras, impactando no número de empregos, na qualidade da saúde do trabalhador e também na movimentação da oferta e demanda de produtos e serviços.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar um estudo qualitativo sobre os benefícios oferecidos pelo MEI providos pela Governo Federal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e um estudo dirigido no no site da Receita Federal do Brasil listando os benefícios providos aos microempreendedores no Programa MEI. Também foram realizadas abordagens a microempreendedores que atuam em escolas, universidades, terminais de ônibus, além de proprietários de lojas no Marketing Digital da cidade de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O estudo do Programa MEI demonstrou que o governo provê benefícios voltados a possibilidade de auxílios previdenciários como a aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e pensão por morte além do fomento de crédito a taxas mais atrativas que as do setor bancário, cobrança única de impostos variando entre 8% até 32%, conforme faturamento mensal. Os créditos e financiamentos podem ser destinados a compra ou troca de maquinário e equipamentos (imobilizado em geral), reformas, contratações de funcionários, acesso a convênios de saúde com baixo custo em relação aos valores individuais da pessoa física. O estudo observa que apesar dos benefícios serem atrativos e darem maior segurança ao microempreendedor, ainda há um passo relacionado ao acesso as informações a serem trabalhados em razão de boa parte destes, não terem facilidade ao uso da internet, ou mesmo recursos suficientes para o uso dos benefícios concedidos via digital. A problemática desta pesquisa envolveu microempreendedores atuando com a venda de alimentos (pipoca, "hot dog", hamburguer, milho, churrasco) na porta de Universidade, marketing de multinível (lojas on line).</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>O estudo apresentou uma lacuna entre o conhecimento dos microempreendedores que participaram da pesquisa (pipoqueiro, milheiro, dono de loja on line) em razão da falta de acesso aos benefícios oferecidos pelo Governo por meio do Programa MEI (disponível no site da Receita Federal do Brasil). Uma proposta de intervenção poderia ser, como relatado na abordagem da amostra a produção de materiais impressos (folders) com divulgação in loco ou mesmo por meio da estrutura dos Núcleo de Apoio Financeiro (postos da Receita Federal) junto às Universidades.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Receita Federal do Brasil. Disponível em <a href="http://mei.receita.economia.gov.br">mei.receita.economia.gov.br</a>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14168	Enfermagem de Saúde Pública	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4229177 - GABRIELLA MAYUMI TANAKA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	EQUIDADE DE SEXO NA SAÚDE: PARA QUEM SÃO AS SALAS E LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL? ANÁLISE DESCRITIVA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo todos estar amparados sem qualquer distinção. Para isso, sistemas de saúde são necessários para uma prestação de serviço eficaz e eficiente. A equidade na saúde é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável partilhados por 193 nações. Em particular, a equidade de sexo na saúde refere-se a uma prestação de serviço igualitária independentemente do sexo e, embora seu papel seja fundamental para um atendimento universal, a equidade de sexo na saúde ainda é um importante desafio para as nações, inclusive para o Brasil, devendo esta ser cuidadosamente monitorada para que possamos alcançar a almejada meta de cobertura universal.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo é descrever a quantidade de consultórios de atendimento, salas e leitos de repouso/observação em serviço de urgência/emergência para mulheres, homens e indiferenciado nos sistema de saúde público brasileiro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo consiste em um estudo transversal. As quantidades de salas/ consultórios, salas de repouso/observação e a quantidade de leitos de repouso observação em unidades de emergência/urgência indiferenciado e exclusivo para homens e mulheres foram obtidas por meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Para aquisição das estimativas do total da população das Unidades da Federação brasileiras foi utilizada a base de dados da população brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de leitos por estado foi relativizado pelo tamanho da população do estudo e estão expressos em número de salas ou leitos por 100.000 mil habitantes $((n/população)*100.000)$ .			
<b>RESULTADOS</b>	Em geral, o Brasil tem 1.916, 2.091 e 7.451 salas/consultórios, salas de repouso/observação e a quantidade de leitos de repouso/observação em unidades de emergência/urgência para cada 100.000 mil habitantes, respectivamente. O Brasil apresenta 204 e 175 salas/consultórios em unidades de emergência/urgência exclusivos para homens e mulheres para cada 100.000 habitantes. Com relação as salas de repouso em unidades de emergência/urgência, há 385 e 427 unidades para cada 100.000 habitantes exclusivas para homens e mulheres. Por fim, a quantidade de leitos de repouso/observação em unidades de emergência/urgência exclusivos para homens e mulheres são 1.636 e 1.738 para cada 100.000 habitantes, respectivamente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os principais resultados do presente estudo indicam uma equidade de sexo na distribuição de consultórios de atendimento, salas e leitos de repouso/observação em serviço de urgência/emergência.			
<b>REFERENCIAS</b>	Weber AM, Cislighi B, Meausoone V, Abdalla S, Mejia-Guevara I, Loftus P, et al. Gender norms and health: insights from global survey data. Lancet. 2019;393(10189):2455-68. Heise L, Greene ME, Opper N, Stavropoulou M, Harper C, Nascimento M, et al. Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. Lancet. 2019;393(10189):2440-54. Manandhar M, Hawkes S, Buse K, Nosrati E, Magar V. Gender, health and the 2030 agenda for sustainable development. Bulletin of the World Health Organization. 2018;96(9):644-53.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14168	Enfermagem de Saúde Pública	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128790 - ANDERSON FORTUNATO DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	EQUIDADE DE SEXO NA SAÚDE: PARA QUEM SÃO AS SALAS E LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL? ANÁLISE DESCRITIVA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo todos estar amparados sem qualquer distinção. Para isso, sistemas de saúde são necessários para uma prestação de serviço eficaz e eficiente. A equidade na saúde é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável partilhados por 193 nações. Em particular, a equidade de sexo na saúde refere-se a uma prestação de serviço igualitária independentemente do sexo e, embora seu papel seja fundamental para um atendimento universal, a equidade de sexo na saúde ainda é um importante desafio para as nações, inclusive para o Brasil, devendo esta ser cuidadosamente monitorada para que possamos alcançar a almejada meta de cobertura universal.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo é descrever a quantidade de consultórios de atendimento, salas e leitos de repouso/observação em serviço de urgência/emergência para mulheres, homens e indiferenciado nos sistema de saúde público brasileiro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo consiste em um estudo transversal. As quantidades de salas/ consultórios, salas de repouso/observação e a quantidade de leitos de repouso observação em unidades de emergência/urgência indiferenciado e exclusivo para homens e mulheres foram obtidas por meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Para aquisição das estimativas do total da população das Unidades da Federação brasileiras foi utilizada a base de dados da população brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de leitos por estado foi relativizado pelo tamanho da população do estudo e estão expressos em número de salas ou leitos por 100.000 mil habitantes $([n/população]*100.000)$ .			
<b>RESULTADOS</b>	Em geral, o Brasil tem 1.916, 2.091 e 7.451 salas/consultórios, salas de repouso/observação e a quantidade de leitos de repouso/observação em unidades de emergência/urgência para cada 100.000 mil habitantes, respectivamente. O Brasil apresenta 204 e 175 salas/consultórios em unidades de emergência/urgência exclusivos para homens e mulheres para cada 100.000 habitantes. Com relação as salas de repouso em unidades de emergência/urgência, há 385 e 427 unidades para cada 100.000 habitantes exclusivas para homens e mulheres. Por fim, a quantidade de leitos de repouso/observação em unidades de emergência/urgência exclusivos para homens e mulheres são 1.636 e 1.738 para cada 100.000 habitantes, respectivamente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os principais resultados do presente estudo indicam uma equidade de sexo na distribuição de consultórios de atendimento, salas e leitos de repouso/observação em serviço de urgência/emergência.			
<b>REFERENCIAS</b>	Weber AM, Cislighi B, Meausoone V, Abdalla S, Mejia-Guevara I, Loftus P, et al. Gender norms and health: insights from global survey data. Lancet. 2019;393(10189):2455-68. Heise L, Greene ME, Opper N, Stavropoulou M, Harper C, Nascimento M, et al. Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. Lancet. 2019;393(10189):2440-54. Manandhar M, Hawkes S, Buse K, Nosrati E, Magar V. Gender, health and the 2030 agenda for sustainable development. Bulletin of the World Health Organization. 2018;96(9):644-53.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14171	Doenças Infecciosas e Parasitárias	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441401 - GUILHERME GALDINO DE SOUZA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata Tonhosolo		
<b>TITULO</b>	OCORRÊNCIA DAS DIFERENTES ESPÉCIES DE PLASMODIUM PRESENTES EM HUMANOS, OUTROS PRIMATAS E INSETOS VETORES NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No Brasil, 99,7% dos casos de malária se concentram na região Norte. Nas áreas fora da região Amazônica existe transmissão residual de malária em estados com áreas remanescentes de Mata Atlântica. No Estado de São Paulo os casos autóctones estão predominantemente em municípios do Litoral Norte, Litoral Sul, Vale do Ribeira e em áreas metropolitanas de São Paulo rodeadas pela Serra do Mar, no extremo da zona Sul. Sérios problemas socioeconômicos surgiram nessas áreas como resultado da ocupação humana e desmatamento, que em algumas áreas pode ser um fator crítico para o aumento do número de casos.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente trabalho objetivou verificar a participação de símios, insetos vetores e humanos portadores assintomáticos na transmissão da malária no Estado de São Paulo, correlacionando à ocorrência de diferentes espécies de Plasmodium circulantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se revisão sistemática da literatura seguindo os critérios PRISMA. A busca dos artigos científicos foi realizada nas bases de dados MEDLINE via PubMed, LILACS via BIREME e Scielo entre 2010 e 2022; disponíveis online em texto completo nos idiomas inglês e/ou português.			
<b>RESULTADOS</b>	Estudos mostraram que apesar da predominância do Plasmodium vivax nas infecções humanas, também foi observada a presença de Plasmodium falciparum em algumas regiões, evidenciando a importância de estratégias de controle abrangentes para ambas as espécies. Diante disso, recomenda-se a detecção de casos assintomáticos para identificar potenciais reservatórios da doença, sendo isso ainda mais necessário em áreas não endêmicas, como o estado de São Paulo, onde pacientes não imunes podem estar vulneráveis. Além disso, os estudos também sugerem a relevância da ecologia na transmissão, sendo o desmatamento associado à manutenção da malária.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os achados podem auxiliar pesquisas futuras, bem como direcionar políticas de controle da malária em São Paulo, fornecendo embasamento para estratégias para enfrentar essa doença na região.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. de Alencar FEC, Malafronte RDS, Cerutti Junior C, Natal Fernandes L, Buery JC, Fux B, Rezende HR, Duarte AMRC, Medeiros-Sousa AR, Miranda AE. Assessment of asymptomatic Plasmodium spp. infection by detection of parasite DNA in residents of an extra-Amazonian region of Brazil. Malar J. 2018 Mar 14;17(1):113. 2. Duarte AM, Malafronte Rdos S, Cerutti C Jr, Curado I, de Paiva BR, Maeda AY, Yamasaki T, Summa ME, Neves Ddo V, de Oliveira SG, Gomes Ade C. Natural Plasmodium infections in Brazilian wild monkeys: reservoirs for human infections? Acta Trop. 2008 Aug;107(2):179-85. 3. Ribeiro de Castro Duarte AM, Fernandes LN, Silva FS, Sicchi IL, Mucci LF, Curado I, Fernandes A, Medeiros-Sousa AR, Ceretti-Junior W, Marrelli MT, Evangelista E, Teixeira R, Summa JL, Nardi MS, Garnica MR, Loss AC, Buery JC, Cerutti C Jr, Pacheco MA, Escalante AA, Mureb Sallum MA, Laporta GZ. Complexity of malaria transmission dynamics in the Brazilian Atlantic Forest. Curr Res Parasitol Vector Borne Dis. 2021 May 31;1:100032.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14174	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2292262 - PALOMA ALEXANDRE DINIZ DE ALMEIDA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Principais impactos da pandemia no setor financeiro e econômico da Gol Linhas Aéreas e como a empresa lidou com esses desafios.			
<b>INTRODUCAO</b>	O setor de transporte aéreo foi um dos mais impactados com a pandemia do Covid-19, nesse contexto, a empresa Gol Linhas Aéreas apesar de ser uma das líderes do mercado destacando-se por apresentar um ótimo custo-benefício e conforto para seus passageiros, também não deixou de ser afetada. O presente trabalho discorre sobre os principais impactos financeiros e econômicos causados durante essa crise global e como a empresa tem lidado com esses desafios para continuidade de seu negócio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar conforme EBITDA o impacto no lucro antes das despesas financeiras e amortização das empresas no período da pandemia			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa, que demonstra a variação em porcentagens dos resultados de financiamentos, operacionais e de investimentos utilizando de fontes bibliográficas e documentais obtidos nos sites Gol Linhas aéreas e B3 (Bolsa de Valores)			
<b>RESULTADOS</b>	A redução na demanda por viagens devido às restrições sanitárias, operacionais e o receio dos passageiros durante a pandemia, gerou preocupações em seus gestores, fornecedores e investidores. Analisaremos os indicadores operacionais da Gol Linhas Aéreas, para compreender qual foi o impacto da pandemia no negócio e quais as estratégias adotadas para superar o maior período de retração do setor aéreo no Mundo			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclusão: A partir das análises demonstradas nesse trabalho será possível identificar o impacto significativo do COVID-19 na empresa Gol Linhas Aéreas. A relação com o cenário financeiro-econômico pós pandemia, e os números que embasam a compreensão da normalização a partir de 2022 em comparação com o período anterior à pandemia, demonstrando se houve a retomada da capacidade financeira e sua importância no setor de atuação.			
<b>REFERENCIAS</b>	Site: Gol Linhas aéreas <a href="https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA">https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: B3 Link: <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm">http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: Gol Linhas aéreas			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14174	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4234898 - MICHELLE SANTOS MACIEL	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Principais impactos da pandemia no setor financeiro e econômico da Gol Linhas Aéreas e como a empresa lidou com esses desafios.			
<b>INTRODUCAO</b>	O setor de transporte aéreo foi um dos mais impactados com a pandemia do Covid-19, nesse contexto, a empresa Gol Linhas Aéreas apesar de ser uma das líderes do mercado destacando-se por apresentar um ótimo custo-benefício e conforto para seus passageiros, também não deixou de ser afetada. O presente trabalho discorre sobre os principais impactos financeiros e econômicos causados durante essa crise global e como a empresa tem lidado com esses desafios para continuidade de seu negócio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar conforme EBITDA o impacto no lucro antes das despesas financeiras e amortização das empresas no período da pandemia			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa, que demonstra a variação em porcentagens dos resultados de financiamentos, operacionais e de investimentos utilizando de fontes bibliográficas e documentais obtidos nos sites Gol Linhas aéreas e B3 (Bolsa de Valores)			
<b>RESULTADOS</b>	A redução na demanda por viagens devido às restrições sanitárias, operacionais e o receio dos passageiros durante a pandemia, gerou preocupações em seus gestores, fornecedores e investidores. Analisaremos os indicadores operacionais da Gol Linhas Aéreas, para compreender qual foi o impacto da pandemia no negócio e quais as estratégias adotadas para superar o maior período de retração do setor aéreo no Mundo			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclusão: A partir das análises demonstradas nesse trabalho será possível identificar o impacto significativo do COVID-19 na empresa Gol Linhas Aéreas. A relação com o cenário financeiro-econômico pós pandemia, e os números que embasam a compreensão da normalização a partir de 2022 em comparação com o período anterior à pandemia, demonstrando se houve a retomada da capacidade financeira e sua importância no setor de atuação.			
<b>REFERENCIAS</b>	Site: Gol Linhas aéreas <a href="https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA">https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: B3 Link: <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm">http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: Gol Linhas aéreas			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14174	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4325591 - TATIANE FELIX TERCIANO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Principais impactos da pandemia no setor financeiro e econômico da Gol Linhas Aéreas e como a empresa lidou com esses desafios.			
<b>INTRODUCAO</b>	O setor de transporte aéreo foi um dos mais impactados com a pandemia do Covid-19, nesse contexto, a empresa Gol Linhas Aéreas apesar de ser uma das líderes do mercado destacando-se por apresentar um ótimo custo-benefício e conforto para seus passageiros, também não deixou de ser afetada. O presente trabalho discorre sobre os principais impactos financeiros e econômicos causados durante essa crise global e como a empresa tem lidado com esses desafios para continuidade de seu negócio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar conforme EBITDA o impacto no lucro antes das despesas financeiras e amortização das empresas no período da pandemia			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa, que demonstra a variação em porcentagens dos resultados de financiamentos, operacionais e de investimentos utilizando de fontes bibliográficas e documentais obtidos nos sites Gol Linhas aéreas e B3 (Bolsa de Valores)			
<b>RESULTADOS</b>	A redução na demanda por viagens devido às restrições sanitárias, operacionais e o receio dos passageiros durante a pandemia, gerou preocupações em seus gestores, fornecedores e investidores. Analisaremos os indicadores operacionais da Gol Linhas Aéreas, para compreender qual foi o impacto da pandemia no negócio e quais as estratégias adotadas para superar o maior período de retração do setor aéreo no Mundo			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclusão: A partir das análises demonstradas nesse trabalho será possível identificar o impacto significativo do COVID-19 na empresa Gol Linhas Aéreas. A relação com o cenário financeiro-econômico pós pandemia, e os números que embasam a compreensão da normalização a partir de 2022 em comparação com o período anterior à pandemia, demonstrando se houve a retomada da capacidade financeira e sua importância no setor de atuação.			
<b>REFERENCIAS</b>	Site: Gol Linhas aéreas <a href="https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA">https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: B3 Link: <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm">http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: Gol Linhas aéreas			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14174	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4368096 - THIAGO BOMFIM DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Principais impactos da pandemia no setor financeiro e econômico da Gol Linhas Aéreas e como a empresa lidou com esses desafios.			
<b>INTRODUCAO</b>	O setor de transporte aéreo foi um dos mais impactados com a pandemia do Covid-19, nesse contexto, a empresa Gol Linhas Aéreas apesar de ser uma das líderes do mercado destacando-se por apresentar um ótimo custo-benefício e conforto para seus passageiros, também não deixou de ser afetada. O presente trabalho discorre sobre os principais impactos financeiros e econômicos causados durante essa crise global e como a empresa tem lidado com esses desafios para continuidade de seu negócio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar conforme EBITDA o impacto no lucro antes das despesas financeiras e amortização das empresas no período da pandemia			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa, que demonstra a variação em porcentagens dos resultados de financiamentos, operacionais e de investimentos utilizando de fontes bibliográficas e documentais obtidos nos sites Gol Linhas aéreas e B3 (Bolsa de Valores)			
<b>RESULTADOS</b>	A redução na demanda por viagens devido às restrições sanitárias, operacionais e o receio dos passageiros durante a pandemia, gerou preocupações em seus gestores, fornecedores e investidores. Analisaremos os indicadores operacionais da Gol Linhas Aéreas, para compreender qual foi o impacto da pandemia no negócio e quais as estratégias adotadas para superar o maior período de retração do setor aéreo no Mundo			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclusão: A partir das análises demonstradas nesse trabalho será possível identificar o impacto significativo do COVID-19 na empresa Gol Linhas Aéreas. A relação com o cenário financeiro-econômico pós pandemia, e os números que embasam a compreensão da normalização a partir de 2022 em comparação com o período anterior à pandemia, demonstrando se houve a retomada da capacidade financeira e sua importância no setor de atuação.			
<b>REFERENCIAS</b>	Site: Gol Linhas aéreas <a href="https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA">https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: B3 Link: <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm">http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: Gol Linhas aéreas			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14174	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4416465 - VIVIANE INÁCIO DE MELO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Principais impactos da pandemia no setor financeiro e econômico da Gol Linhas Aéreas e como a empresa lidou com esses desafios.			
<b>INTRODUCA O</b>	O setor de transporte aéreo foi um dos mais impactados com a pandemia do Covid-19, nesse contexto, a empresa Gol Linhas Aéreas apesar de ser uma das líderes do mercado destacando-se por apresentar um ótimo custo-benefício e conforto para seus passageiros, também não deixou de ser afetada. O presente trabalho discorre sobre os principais impactos financeiros e econômicos causados durante essa crise global e como a empresa tem lidado com esses desafios para continuidade de seu negócio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar conforme EBITDA o impacto no lucro antes das despesas financeiras e amortização das empresas no período da pandemia			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa, que demonstra a variação em porcentagens dos resultados de financiamentos, operacionais e de investimentos utilizando de fontes bibliográficas e documentais obtidos nos sites Gol Linhas aéreas e B3 (Bolsa de Valores)			
<b>RESULTADO S</b>	A redução na demanda por viagens devido às restrições sanitárias, operacionais e o receio dos passageiros durante a pandemia, gerou preocupações em seus gestores, fornecedores e investidores. Analisaremos os indicadores operacionais da Gol Linhas Aéreas, para compreender qual foi o impacto da pandemia no negócio e quais as estratégias adotadas para superar o maior período de retração do setor aéreo no Mundo			
<b>CONCLUSOE S</b>	Conclusão: A partir das análises demonstradas nesse trabalho será possível identificar o impacto significativo do COVID-19 na empresa Gol Linhas Aéreas. A relação com o cenário financeiro-econômico pós pandemia, e os números que embasam a compreensão da normalização a partir de 2022 em comparação com o período anterior à pandemia, demonstrando se houve a retomada da capacidade financeira e sua importância no setor de atuação.			
<b>REFERENCIAS</b>	Site: Gol Linhas aéreas <a href="https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA">https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: B3 Link: <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm">http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: Gol Linhas aéreas			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14174	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4426738 - JULIANA CARDOSO CAMÉLO COSTA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Principais impactos da pandemia no setor financeiro e econômico da Gol Linhas Aéreas e como a empresa lidou com esses desafios.			
<b>INTRODUCAO</b>	O setor de transporte aéreo foi um dos mais impactados com a pandemia do Covid-19, nesse contexto, a empresa Gol Linhas Aéreas apesar de ser uma das líderes do mercado destacando-se por apresentar um ótimo custo-benefício e conforto para seus passageiros, também não deixou de ser afetada. O presente trabalho discorre sobre os principais impactos financeiros e econômicos causados durante essa crise global e como a empresa tem lidado com esses desafios para continuidade de seu negócio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar conforme EBITDA o impacto no lucro antes das despesas financeiras e amortização das empresas no período da pandemia			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em pesquisa descritiva de natureza quanti-qualitativa, que demonstra a variação em porcentagens dos resultados de financiamentos, operacionais e de investimentos utilizando de fontes bibliográficas e documentais obtidos nos sites Gol Linhas aéreas e B3 (Bolsa de Valores)			
<b>RESULTADOS</b>	A redução na demanda por viagens devido às restrições sanitárias, operacionais e o receio dos passageiros durante a pandemia, gerou preocupações em seus gestores, fornecedores e investidores. Analisaremos os indicadores operacionais da Gol Linhas Aéreas, para compreender qual foi o impacto da pandemia no negócio e quais as estratégias adotadas para superar o maior período de retração do setor aéreo no Mundo			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclusão: A partir das análises demonstradas nesse trabalho será possível identificar o impacto significativo do COVID-19 na empresa Gol Linhas Aéreas. A relação com o cenário financeiro-econômico pós pandemia, e os números que embasam a compreensão da normalização a partir de 2022 em comparação com o período anterior à pandemia, demonstrando se houve a retomada da capacidade financeira e sua importância no setor de atuação.			
<b>REFERENCIAS</b>	Site: Gol Linhas aéreas <a href="https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA">https://ri.voegol.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=1E499-044-FB90-40BC-9008-AA1F07DB43FA</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: B3 Link: <a href="http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm">http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm</a> . (Acessado em 06/05/2022) Site: Gol Linhas aéreas			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14177	História das Ciências	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4625579 - CLEIZE DE SOUZA BAZANI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paulo Fernando de Souza Campos	Claudia Polubriaginof	
<b>TITULO</b>	WANDA DE AGUIAR HORTA: UMA INTELECTUAL DA ENFERMAGEM BRASILEIRA			
<b>INTRODUCAO</b>	Wanda Horta (1926-1981) é considerada pela história da enfermagem brasileira como uma das principais referências na formação profissional, cujo legado intelectual inaugura a reflexão em torno da humanização na assistência de enfermagem a partir da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar a influência da obra de Wanda Horta na formação profissional em enfermagem no Brasil, ontem e hoje.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa bibliográfica realizada no acervo da Biblioteca da Universidade Santo Amaro – UNISA seguido de fichamento da leitura do livro Processo de Enfermagem.			
<b>RESULTADOS</b>	O livro Processo de Enfermagem, uma das mais importantes obras acadêmicas da enfermagem brasileira, publicado em 1979, demarca a atuação de Wanda Horta na arte e ciência do cuidado. Por esse motivo, a enfermeira é considerada como teórica ao preconizar, na década de 1960, a importância em dimensionar a ciência do cuidado a partir da teoria de Motivação Humana de Abraham Maslow (1908-1970). Para a autora, deve-se distinguir seis fases ou passos que compreendem o histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o plano assistencial, o plano de cuidados diários ou prescrição de enfermagem, a evolução de enfermagem e o prognóstico de enfermagem que se inter-relacionam, desconstruindo o viés puramente tecnicista que desconsiderava o humano na assistência ao hipervalorizar a técnica.			
<b>CONCLUSOES</b>	Humanizar o cuidado ou tornar a enfermagem uma profissão de "gente que cuida de gente" ainda hoje se apresenta como um dos desafios da formação profissional.			
<b>REFERENCIAS</b>	GOULART, Vanessa Alves. Wanda Horta. Uma referência intelectual feminina na humanização da Enfermagem do Século XX. Pluralistas, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 8-21, 2018. Disponível em: <a href="https://cisges.wordpress.com/revista-pluralistas/edicoes/">https://cisges.wordpress.com/revista-pluralistas/edicoes/</a> Acesso em: 21 set 2023. HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU, 1979. SECAF, Vitória. Enfermeiras Diplomadas. São Paulo: Martinari, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14179	Ciências Sociais Aplicadas	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3815501 - ALESSANDRA DA ROCHA RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva		
<b>TITULO</b>	SEGURANÇA CIBERNÉTICA NO BRASIL: ESTRATÉGIAS DE DEFESA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O Avanço da tecnologia no Brasil nos trouxe inúmeros benefícios a partir do uso de softwares e aplicativos que contribuem no desenvolvimento da comunicação entre empresas e pessoas, a partir do uso de mensagens; na agilidade para realização de operações financeiras, como é o caso do PIX. Deve-se considerar que em meio a inúmeros benefícios, há também pessoas que tentam burlar os aspectos de segurança que envolvem o ambiente da tecnologia, praticando ataques cibernéticos, tornando organizações públicas e privadas vulneráveis a divulgação de dados sigilosos, segredos industriais, transferência de recursos financeiros. O Brasil sofreu mais de 31,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2021, representando um aumento de 94% em relação ao ano anterior. (FORTLABS, 2022). Aproximadamente um 25% das companhias brasileiras relataram perdas financeiras devido a esse tipo de ataque digitais em 2022, com a maioria relatando casos de roubo de dados (PROOFPOINT, 2023). A rede varejista Americanas, informou que sofreu um ataque que acarretou um prejuízo financeiro de aproximadamente R\$1 bilhão. Em uma pesquisa realizada pela Deloitte em 2022, com 122 empresas que operam no Brasil, cerca de 90% dessas empresas declararam que realizariam investimentos em segurança cibernética (DELOITTE, 2023).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Objetiva-se demonstrar a importância em investir em segurança cibernética. Objetiva-se ainda, apresentar as principais soluções que tem sido utilizada pelas organizações empresárias para mitigar os potenciais riscos sobre esses ataques.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e organizações especializadas no setor em questão.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O presente estudo, identificou os benefícios sobre a evolução da tecnologia da informação em diversas perspectivas. Apresentou também, as dificuldades que tem existido sobre a contenção do número de ataques cibernéticos em base de dados de órgãos públicos e empresas privadas como objetivos de obterem o recebimento de vultosas quantias financeiras como resgate, para a não divulgação dos dados subtraídos. Verificou-se também, que as áreas de segurança cibernética que receberão mais investimentos dos empresários em 2023, em respostas múltiplas dos entrevistados, são: infraestrutura tecnológica (32%), aplicações aos clientes (23%), gestão de documentos (21%), intranet da empresa (18%), canais de venda e pagamento (17%), gestão de CRM (15%), site da empresa (15%) e aplicações com fornecedores (13%) (DELOITTE, 2023).</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Conclui-se que as organizações públicas e privadas deverão realizar investimentos significativos e constantes em segurança cibernética, a fim de se protegerem contra os ataques, e atenderem a Lei Geral de Proteção de dados, Sugere-se a partir da leitura das bibliográfica pesquisada, que ocorra separação entre a área de segurança da informação e de Tecnologia da Informação, onde os profissionais envolvidos analisem e criem ações internas com os funcionários mantendo o ambiente mais atualizado com o ambiente externo para uma maior segurança e assim manter a organização trabalhando corretamente.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>SILVA, M. B. Cibersegurança, Freitas Bastos, 2023. PECK, P. Proteção de Dados Pessoais. 4ª ed. São Paulo, 2023. DELOITTE. Segurança cibernética. 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14179	Ciências Sociais Aplicadas	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4005228 - FAGNER GUIMARÃES ARAÚJO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva		
<b>TITULO</b>	SEGURANÇA CIBERNÉTICA NO BRASIL: ESTRATÉGIAS DE DEFESA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O Avanço da tecnologia no Brasil nos trouxe inúmeros benefícios a partir do uso de softwares e aplicativos que contribuem no desenvolvimento da comunicação entre empresas e pessoas, a partir do uso de mensagens; na agilidade para realização de operações financeiras, como é o caso do PIX. Deve-se considerar que em meio a inúmeros benefícios, há também pessoas que tentam burlar os aspectos de segurança que envolvem o ambiente da tecnologia, praticando ataques cibernéticos, tornando organizações públicas e privadas vulneráveis a divulgação de dados sigilosos, segredos industriais, transferência de recursos financeiros. O Brasil sofreu mais de 31,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2021, representando um aumento de 94% em relação ao ano anterior. (FORTLABS, 2022). Aproximadamente um 25% das companhias brasileiras relataram perdas financeiras devido a esse tipo de ataque digitais em 2022, com a maioria relatando casos de roubo de dados (PROOFPOINT, 2023). A rede varejista Americanas, informou que sofreu um ataque que acarretou um prejuízo financeiro de aproximadamente R\$1 bilhão. Em uma pesquisa realizada pela Deloitte em 2022, com 122 empresas que operam no Brasil, cerca de 90% dessas empresas declararam que realizariam investimentos em segurança cibernética (DELOITTE, 2023).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Objetiva-se demonstrar a importância em investir em segurança cibernética. Objetiva-se ainda, apresentar as principais soluções que tem sido utilizada pelas organizações empresárias para mitigar os potenciais riscos sobre esses ataques.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e organizações especializadas no setor em questão.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O presente estudo, identificou os benefícios sobre a evolução da tecnologia da informação em diversas perspectivas. Apresentou também, as dificuldades que tem existido sobre a contenção do número de ataques cibernéticos em base de dados de órgãos públicos e empresas privadas como objetivos de obterem o recebimento de vultosas quantias financeiras como resgate, para a não divulgação dos dados subtraídos. Verificou-se também, que as áreas de segurança cibernética que receberão mais investimentos dos empresários em 2023, em respostas múltiplas dos entrevistados, são: infraestrutura tecnológica (32%), aplicações aos clientes (23%), gestão de documentos (21%), intranet da empresa (18%), canais de venda e pagamento (17%), gestão de CRM (15%), site da empresa (15%) e aplicações com fornecedores (13%) (DELOITTE, 2023).</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Conclui-se que as organizações públicas e privadas deverão realizar investimentos significativos e constantes em segurança cibernética, a fim de se protegerem contra os ataques, e atenderem a Lei Geral de Proteção de dados, Sugere-se a partir da leitura das bibliográfica pesquisada, que ocorra separação entre a área de segurança da informação e de Tecnologia da Informação, onde os profissionais envolvidos analisem e criem ações internas com os funcionários mantendo o ambiente mais atualizado com o ambiente externo para uma maior segurança e assim manter a organização trabalhando corretamente.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>SILVA, M. B. Cibersegurança, Freitas Bastos, 2023. PECK, P. Proteção de Dados Pessoais. 4ª ed. São Paulo, 2023. DELOITTE. Segurança cibernética. 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14180	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor	Status	Apresentação
		4819951 - JOSEMI BATISTA DIAS	2 - Aprovado	1 - Poster
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DOS INDICES FINANCEIROS: O CASO TENDA			
<b>INTRODUCAO</b>	A Tenda pertence ao ramo da construção civil de habitações populares. O setor no ano de 2022 teve um faturamento de R\$ 207,4 bilhões, onde houve um crescimento de 2,5% com relação ao ano anterior (IBRE, 2023). A empresa passou por dificuldades financeiras, decorrentes da alta dos juros e inflação elevada, que impactaram no custo da dívida contratada, no aumento da inadimplência de clientes, queda nas vendas, no aumento dos insumos para construção e entrega de novas moradias comercializadas anteriormente ao cenário descrito. Ainda sobre a dívida, a empresa encerrou o ano de 2021, total de R\$1,4 bilhão, duração de aproximadamente 30 meses, e com custo médio nominal de 11% a.a.. Já em 2022, a dívida atingiu aproximadamente R\$ 1,5 bilhão, duração de aproximadamente 22 meses e com custo médio nominal de 18,72% a.a.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetiva-se com o presente estudo compreender o processo de reestruturação financeira da empresa, a partir do uso de ferramentas e técnicas da administração financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudo, identificou que no exercício de reorganização da estrutura financeira, a empresa renegociou o prazo de sua dívida com seus respectivos credores, e obtiveram autorização para captar mais recursos de terceiros, sem o pagamento de multa por terem já ultrapassado o limite de crédito previamente estabelecido, para o desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários para obterem aumento da receita de vendas. A partir da efetivação dessas medidas, a empresa espera melhorar sua eficiência operacional, reduzir o pagamento de despesas financeiras, diminuir pagamento de multas por entregas em atraso de habitações já comercializadas, aumentar a receita líquida de vendas. Os primeiros dados apresentados nos demonstrativos financeiros da empresa indicam pequena melhora, tendo registrado no primeiro trimestre de 2023, uma redução de R\$ 41,9 milhões no seu prejuízo. A vendas líquidas apresentaram resultado de R\$ 600,3 milhões no mesmo período, representando uma alta de 3,8% na base anual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verificou-se a partir do presente estudo, que a empresa apesar das dificuldades apresentadas, estruturou um plano de recuperação e diversas vertentes, e já tem dado sinais de melhora. Com o atual movimento de queda na taxa básica de juros, com uma operação mais eficiente, aumento do volume de negócios em decorrência do aumento dos investimentos de programas de habitações populares do atual governo, a empresa poderá atingir a estabilização financeira em prazo menor do que o planejado.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATARAZZO, D. Análise Financeira de Balanços. 7ª Ed. 2010. LAKATOS, E. Fundamentos de metodologia científica. 7ª Ed. 2010. Marion, J. Contabilidade Básica. 10ª. Ed.2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14180	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4916549 - JOSÉ LUIS MOLINA BISO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DOS INDICES FINANCEIROS: O CASO TENDA			
<b>INTRODUCAO</b>	A Tenda pertence ao ramo da construção civil de habitações populares. O setor no ano de 2022 teve um faturamento de R\$ 207,4 bilhões, onde houve um crescimento de 2,5% com relação ao ano anterior (IBRE, 2023). A empresa passou por dificuldades financeiras, decorrentes da alta dos juros e inflação elevada, que impactaram no custo da dívida contratada, no aumento da inadimplência de clientes, queda nas vendas, no aumento dos insumos para construção e entrega de novas moradias comercializadas anteriormente ao cenário descrito. Ainda sobre a dívida, a empresa encerrou o ano de 2021, total de R\$1,4 bilhão, duração de aproximadamente 30 meses, e com custo médio nominal de 11% a.a.. Já em 2022, a dívida atingiu aproximadamente R\$ 1,5 bilhão, duração de aproximadamente 22 meses e com custo médio nominal de 18,72% a.a.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetiva-se com o presente estudo compreender o processo de reestruturação financeira da empresa, a partir do uso de ferramentas e técnicas da administração financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudo, identificou que no exercício de reorganização da estrutura financeira, a empresa renegociou o prazo de sua dívida com seus respectivos credores, e obtiveram autorização para captar mais recursos de terceiros, sem o pagamento de multa por terem já ultrapassado o limite de crédito previamente estabelecido, para o desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários para obterem aumento da receita de vendas. A partir da efetivação dessas medidas, a empresa espera melhorar sua eficiência operacional, reduzir o pagamento de despesas financeiras, diminuir pagamento de multas por entregas em atraso de habitações já comercializadas, aumentar a receita líquida de vendas. Os primeiros dados apresentados nos demonstrativos financeiros da empresa indicam pequena melhora, tendo registrado no primeiro trimestre de 2023, uma redução de R\$ 41,9 milhões no seu prejuízo. A vendas líquidas apresentaram resultado de R\$ 600,3 milhões no mesmo período, representando uma alta de 3,8% na base anual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verificou-se a partir do presente estudo, que a empresa apesar das dificuldades apresentadas, estruturou um plano de recuperação e diversas vertentes, e já tem dado sinais de melhora. Com o atual movimento de queda na taxa básica de juros, com uma operação mais eficiente, aumento do volume de negócios em decorrência do aumento dos investimentos de programas de habitações populares do atual governo, a empresa poderá atingir a estabilização financeira em prazo menor do que o planejado.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATARAZZO, D. Análise Financeira de Balanços. 7ª Ed. 2010. LAKATOS, E. Fundamentos de metodologia científica. 7ª Ed. 2010. Marion, J. Contabilidade Básica. 10ª. Ed.2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14180	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4916824 - CÁTIA SANTOS COUTO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DOS INDICES FINANCEIROS: O CASO TENDA			
<b>INTRODUCAO</b>	A Tenda pertence ao ramo da construção civil de habitações populares. O setor no ano de 2022 teve um faturamento de R\$ 207,4 bilhões, onde houve um crescimento de 2,5% com relação ao ano anterior (IBRE, 2023). A empresa passou por dificuldades financeiras, decorrentes da alta dos juros e inflação elevada, que impactaram no custo da dívida contratada, no aumento da inadimplência de clientes, queda nas vendas, no aumento dos insumos para construção e entrega de novas moradias comercializadas anteriormente ao cenário descrito. Ainda sobre a dívida, a empresa encerrou o ano de 2021, total de R\$1,4 bilhão, duração de aproximadamente 30 meses, e com custo médio nominal de 11% a.a.. Já em 2022, a dívida atingiu aproximadamente R\$ 1,5 bilhão, duração de aproximadamente 22 meses e com custo médio nominal de 18,72% a.a.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetiva-se com o presente estudo compreender o processo de reestruturação financeira da empresa, a partir do uso de ferramentas e técnicas da administração financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudo, identificou que no exercício de reorganização da estrutura financeira, a empresa renegociou o prazo de sua dívida com seus respectivos credores, e obtiveram autorização para captar mais recursos de terceiros, sem o pagamento de multa por terem já ultrapassado o limite de crédito previamente estabelecido, para o desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários para obterem aumento da receita de vendas. A partir da efetivação dessas medidas, a empresa espera melhorar sua eficiência operacional, reduzir o pagamento de despesas financeiras, diminuir pagamento de multas por entregas em atraso de habitações já comercializadas, aumentar a receita líquida de vendas. Os primeiros dados apresentados nos demonstrativos financeiros da empresa indicam pequena melhora, tendo registrado no primeiro trimestre de 2023, uma redução de R\$ 41,9 milhões no seu prejuízo. A vendas líquidas apresentaram resultado de R\$ 600,3 milhões no mesmo período, representando uma alta de 3,8% na base anual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verificou-se a partir do presente estudo, que a empresa apesar das dificuldades apresentadas, estruturou um plano de recuperação e diversas vertentes, e já tem dado sinais de melhora. Com o atual movimento de queda na taxa básica de juros, com uma operação mais eficiente, aumento do volume de negócios em decorrência do aumento dos investimentos de programas de habitações populares do atual governo, a empresa poderá atingir a estabilização financeira em prazo menor do que o planejado.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATARAZZO, D. Análise Financeira de Balanços. 7ª Ed. 2010. LAKATOS, E. Fundamentos de metodologia científica. 7ª Ed. 2010. Marion, J. Contabilidade Básica. 10ª. Ed.2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14180	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4968174 - CAROLINE MELO VIEIRA E SOUSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DOS INDICES FINANCEIROS: O CASO TENDA			
<b>INTRODUCAO</b>	A Tenda pertence ao ramo da construção civil de habitações populares. O setor no ano de 2022 teve um faturamento de R\$ 207,4 bilhões, onde houve um crescimento de 2,5% com relação ao ano anterior (IBRE, 2023). A empresa passou por dificuldades financeiras, decorrentes da alta dos juros e inflação elevada, que impactaram no custo da dívida contratada, no aumento da inadimplência de clientes, queda nas vendas, no aumento dos insumos para construção e entrega de novas moradias comercializadas anteriormente ao cenário descrito. Ainda sobre a dívida, a empresa encerrou o ano de 2021, total de R\$1,4 bilhão, duração de aproximadamente 30 meses, e com custo médio nominal de 11% a.a.. Já em 2022, a dívida atingiu aproximadamente R\$ 1,5 bilhão, duração de aproximadamente 22 meses e com custo médio nominal de 18,72% a.a.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetiva-se com o presente estudo compreender o processo de reestruturação financeira da empresa, a partir do uso de ferramentas e técnicas da administração financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudo, identificou que no exercício de reorganização da estrutura financeira, a empresa renegociou o prazo de sua dívida com seus respectivos credores, e obtiveram autorização para captar mais recursos de terceiros, sem o pagamento de multa por terem já ultrapassado o limite de crédito previamente estabelecido, para o desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários para obterem aumento da receita de vendas. A partir da efetivação dessas medidas, a empresa espera melhorar sua eficiência operacional, reduzir o pagamento de despesas financeiras, diminuir pagamento de multas por entregas em atraso de habitações já comercializadas, aumentar a receita líquida de vendas. Os primeiros dados apresentados nos demonstrativos financeiros da empresa indicam pequena melhora, tendo registrado no primeiro trimestre de 2023, uma redução de R\$ 41,9 milhões no seu prejuízo. A vendas líquidas apresentaram resultado de R\$ 600,3 milhões no mesmo período, representando uma alta de 3,8% na base anual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verificou-se a partir do presente estudo, que a empresa apesar das dificuldades apresentadas, estruturou um plano de recuperação e diversas vertentes, e já tem dado sinais de melhora. Com o atual movimento de queda na taxa básica de juros, com uma operação mais eficiente, aumento do volume de negócios em decorrência do aumento dos investimentos de programas de habitações populares do atual governo, a empresa poderá atingir a estabilização financeira em prazo menor do que o planejado.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATARAZZO, D. Análise Financeira de Balanços. 7ª Ed. 2010. LAKATOS, E. Fundamentos de metodologia científica. 7ª Ed. 2010. Marion, J. Contabilidade Básica. 10ª. Ed.2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14181	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4794508 - RAIANE FERNANDES ALVES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva		
<b>TITULO</b>	O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL: O CASO CVC			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A CVC é uma empresa brasileira que atua no setor de turismo, oferecendo serviços de viagens, hospedagem, transporte e entretenimento para seus clientes. A principal fonte de receita da empresa é a venda de pacotes turísticos, que incluem desde passagens aéreas e hospedagem até passeios e atividades durante a viagem. Durante a pandemia, com as restrições e queda nas viagens devido ao isolamento social a empresa acumulou dívidas que somam atualmente um valor de R\$750 milhões. "A dívida pode ser uma alternativa para o financiamento de investimentos, mas é importante que seja feita uma análise criteriosa da capacidade de pagamento e dos custos envolvidos" Assaf Neto e Lima (2019). Além das dificuldades financeiras impostas a empresa pelo cenário já apresentado, identifica-se a necessidade de um aprimoramento sobre o funcionamento de sua estrutura organizacional e o aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos, reestruturação financeira e a governança corporativa. Landriscina (2020) pontua que os princípios de governança corporativa estabelecem maior confiança dentro da organização e em suas interações com terceiros.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender o processo de formação e os impactos do endividamento da empresa objeto de estudo, e analisar alternativas apresentadas como melhoria de sua estrutura financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise quantitativa e qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	O endividamento da CVC tem impactado negativamente suas finanças e sua capacidade de investimento. Foram analisados os principais indicadores financeiros da empresa, bem como as estratégias adotadas pela gestão para lidar com o endividamento e diante desse cenário, foram estudadas alternativas de reestruturação financeira e de captação de recursos, visando garantir a sustentabilidade e a competitividade da empresa. Entre as possíveis soluções, destacam-se a renegociação de dívidas, a atualização e investimento tecnológico e estratégias financeiras como o hedge cambial, que segundo Gitman e Joehnk (2017, p. 738), refere-se a uma "forma de seguro contra o risco financeiro".			
<b>CONCLUSOES</b>	A empresa de turismo CVC enfrentou desafios significativos devido à variação do dólar, à pandemia de COVID-19 e sua lacuna financeira, impactando seus resultados. Soluções propostas incluem reescalonamento de dívidas, hedge cambial e integração de IA para oferecer serviços personalizados e melhorar a saúde financeira. Este projeto revelou a importância da gestão financeira e organizacional para manter os serviços da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ASSAF NETO, A., (#38) LIMA, F. G. Curso de administração financeira. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2019. LANDRISCINA, Giulia. Conheça os quatro princípios da governança corporativa: 27 jan. 2020. Disponível em: <a href="https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa">https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa</a> . Acesso em: 5 set. 2023. GITMAN, L. J.; JOEHNK, M. D. Princípios de administração financeira. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14181	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4820185 - NUBIA PEREIRA MARTINS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva		
<b>TITULO</b>	O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL: O CASO CVC			
<b>INTRODUCA O</b>	A CVC é uma empresa brasileira que atua no setor de turismo, oferecendo serviços de viagens, hospedagem, transporte e entretenimento para seus clientes. A principal fonte de receita da empresa é a venda de pacotes turísticos, que incluem desde passagens aéreas e hospedagem até passeios e atividades durante a viagem. Durante a pandemia, com as restrições e queda nas viagens devido ao isolamento social a empresa acumulou dívidas que somam atualmente um valor de R\$750 milhões. "A dívida pode ser uma alternativa para o financiamento de investimentos, mas é importante que seja feita uma análise criteriosa da capacidade de pagamento e dos custos envolvidos" Assaf Neto e Lima (2019). Além das dificuldades financeiras impostas a empresa pelo cenário já apresentado, identifica-se a necessidade de um aprimoramento sobre o funcionamento de sua estrutura organizacional e o aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos, reestruturação financeira e a governança corporativa. Landriscina (2020) pontua que os princípios de governança corporativa estabelecem maior confiança dentro da organização e em suas interações com terceiros.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender o processo de formação e os impactos do endividamento da empresa objeto de estudo, e analisar alternativas apresentadas como melhoria de sua estrutura financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise quantitativa e qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADO S</b>	O endividamento da CVC tem impactado negativamente suas finanças e sua capacidade de investimento. Foram analisados os principais indicadores financeiros da empresa, bem como as estratégias adotadas pela gestão para lidar com o endividamento e diante desse cenário, foram estudadas alternativas de reestruturação financeira e de captação de recursos, visando garantir a sustentabilidade e a competitividade da empresa. Entre as possíveis soluções, destacam-se a renegociação de dívidas, a atualização e investimento tecnológico e estratégias financeiras como o hedge cambial, que segundo Gitman e Joehnk (2017, p. 738), refere-se a uma " forma de seguro contra o risco financeiro".			
<b>CONCLUSOE S</b>	A empresa de turismo CVC enfrentou desafios significativos devido à variação do dólar, à pandemia de COVID-19 e sua lacuna financeira, impactando seus resultados. Soluções propostas incluem reescalonamento de dívidas, hedge cambial e integração de IA para oferecer serviços personalizados e melhorar a saúde financeira. Este projeto revelou a importância da gestão financeira e organizacional para manter os serviços da empresa.			
<b>REFERENCIA S</b>	ASSAF NETO, A., (#38) LIMA, F. G. Curso de administração financeira. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2019. LANDRISCINA, Giulia. Conheça os quatro princípios da governança corporativa: 27 jan. 2020. Disponível em: <a href="https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa">https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa</a> . Acesso em: 5 set. 2023. GITMAN, L. J.; JOEHNK, M. D. Princípios de administração financeira. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14181	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4882792 - LEYA KADYNE GOMES SOUZA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva		
<b>TITULO</b>	O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL: O CASO CVC			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A CVC é uma empresa brasileira que atua no setor de turismo, oferecendo serviços de viagens, hospedagem, transporte e entretenimento para seus clientes. A principal fonte de receita da empresa é a venda de pacotes turísticos, que incluem desde passagens aéreas e hospedagem até passeios e atividades durante a viagem. Durante a pandemia, com as restrições e queda nas viagens devido ao isolamento social a empresa acumulou dívidas que somam atualmente um valor de R\$750 milhões. "A dívida pode ser uma alternativa para o financiamento de investimentos, mas é importante que seja feita uma análise criteriosa da capacidade de pagamento e dos custos envolvidos" Assaf Neto e Lima (2019). Além das dificuldades financeiras impostas a empresa pelo cenário já apresentado, identifica-se a necessidade de um aprimoramento sobre o funcionamento de sua estrutura organizacional e o aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos, reestruturação financeira e a governança corporativa. Landriscina (2020) pontua que os princípios de governança corporativa estabelecem maior confiança dentro da organização e em suas interações com terceiros.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender o processo de formação e os impactos do endividamento da empresa objeto de estudo, e analisar alternativas apresentadas como melhoria de sua estrutura financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise quantitativa e qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	O endividamento da CVC tem impactado negativamente suas finanças e sua capacidade de investimento. Foram analisados os principais indicadores financeiros da empresa, bem como as estratégias adotadas pela gestão para lidar com o endividamento e diante desse cenário, foram estudadas alternativas de reestruturação financeira e de captação de recursos, visando garantir a sustentabilidade e a competitividade da empresa. Entre as possíveis soluções, destacam-se a renegociação de dívidas, a atualização e investimento tecnológico e estratégias financeiras como o hedge cambial, que segundo Gitman e Joehnk (2017, p. 738), refere-se a uma "forma de seguro contra o risco financeiro".			
<b>CONCLUSOES</b>	A empresa de turismo CVC enfrentou desafios significativos devido à variação do dólar, à pandemia de COVID-19 e sua lacuna financeira, impactando seus resultados. Soluções propostas incluem reescalonamento de dívidas, hedge cambial e integração de IA para oferecer serviços personalizados e melhorar a saúde financeira. Este projeto revelou a importância da gestão financeira e organizacional para manter os serviços da empresa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ASSAF NETO, A., (#38) LIMA, F. G. Curso de administração financeira. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2019. LANDRISCINA, Giulia. Conheça os quatro princípios da governança corporativa: 27 jan. 2020. Disponível em: <a href="https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa">https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa</a> . Acesso em: 5 set. 2023. GITMAN, L. J.; JOEHNK, M. D. Princípios de administração financeira. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14181	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4915313 - GABRIEL ALVES SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva		
<b>TITULO</b>	O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL: O CASO CVC			
<b>INTRODUCA O</b>	A CVC é uma empresa brasileira que atua no setor de turismo, oferecendo serviços de viagens, hospedagem, transporte e entretenimento para seus clientes. A principal fonte de receita da empresa é a venda de pacotes turísticos, que incluem desde passagens aéreas e hospedagem até passeios e atividades durante a viagem. Durante a pandemia, com as restrições e queda nas viagens devido ao isolamento social a empresa acumulou dívidas que somam atualmente um valor de R\$750 milhões. "A dívida pode ser uma alternativa para o financiamento de investimentos, mas é importante que seja feita uma análise criteriosa da capacidade de pagamento e dos custos envolvidos" Assaf Neto e Lima (2019). Além das dificuldades financeiras impostas a empresa pelo cenário já apresentado, identifica-se a necessidade de um aprimoramento sobre o funcionamento de sua estrutura organizacional e o aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos, reestruturação financeira e a governança corporativa. Landriscina (2020) pontua que os princípios de governança corporativa estabelecem maior confiança dentro da organização e em suas interações com terceiros.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender o processo de formação e os impactos do endividamento da empresa objeto de estudo, e analisar alternativas apresentadas como melhoria de sua estrutura financeira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise quantitativa e qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADO S</b>	O endividamento da CVC tem impactado negativamente suas finanças e sua capacidade de investimento. Foram analisados os principais indicadores financeiros da empresa, bem como as estratégias adotadas pela gestão para lidar com o endividamento e diante desse cenário, foram estudadas alternativas de reestruturação financeira e de captação de recursos, visando garantir a sustentabilidade e a competitividade da empresa. Entre as possíveis soluções, destacam-se a renegociação de dívidas, a atualização e investimento tecnológico e estratégias financeiras como o hedge cambial, que segundo Gitman e Joehnk (2017, p. 738), refere-se a uma " forma de seguro contra o risco financeiro".			
<b>CONCLUSOE S</b>	A empresa de turismo CVC enfrentou desafios significativos devido à variação do dólar, à pandemia de COVID-19 e sua lacuna financeira, impactando seus resultados. Soluções propostas incluem reescalonamento de dívidas, hedge cambial e integração de IA para oferecer serviços personalizados e melhorar a saúde financeira. Este projeto revelou a importância da gestão financeira e organizacional para manter os serviços da empresa.			
<b>REFERENCIA S</b>	ASSAF NETO, A., (#38) LIMA, F. G. Curso de administração financeira. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2019. LANDRISCINA, Giulia. Conheça os quatro princípios da governança corporativa: 27 jan. 2020. Disponível em: <a href="https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa">https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa</a> . Acesso em: 5 set. 2023. GITMAN, L. J.; JOEHNK, M. D. Princípios de administração financeira. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14182	Administração de Empresas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4803183 - CHRISTIANO RYAN FERREIRA DE LIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
<b>TITULO</b>	PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA OI TELECOM			
<b>INTRODUCAO</b>	Fundada em 1998, a Oi é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. A empresa enfrentou desafios significativos, relacionados ao atraso nas vendas das UPIs; não recebimento de uma parte da venda da UPI Ativos Móveis, avaliada em R\$ 1,4 bilhão; impacto da pandemia da Covid-19; instabilidade nos indicadores econômicos, como aumentos nas taxas de juros domésticas e piora no ambiente de crédito; flutuações na cotação do dólar, que afetam obrigações assumidas; declínio rápido das receitas da telefonia fixa devido a mudanças tecnológicas; custos contínuos de contratos com obrigações mínimas e baixo consumo de serviços; e manutenção de obrigações regulatórias na concessão de telefonia fixa. Tais problemas resultaram em um acúmulo de dívidas da ordem de R\$44 bilhões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo, descrever o processo de recuperação judicial da empresa objeto de estudo e analisar impactos aos respectivos credores.			
<b>METODOLOGIA</b>	No desenvolvimento do referido estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir da consulta de livros artigos científicos e revistas especializadas.			
<b>RESULTADOS</b>	Verificou-se como parte da solução à condição de endividamento da empresa, a solicitação de recuperação judicial, seguida de uma ampla reestruturação financeira, dado o longo e complexo processo de individualização e restrição que a empresa enfrentou ao longo dos anos. É necessário injetar capital novo para que a empresa possa cumprir suas obrigações, realizar os investimentos necessários e buscar mais liquidez no cumprimento das responsabilidades assumidas com seus credores, enquanto se busca uma solução definitiva para os ajustes relacionados à concessão dos serviços de telefonia fixa e suas obrigações.			
<b>CONCLUSOES</b>	A partir do cenário analisado, identificou-se um grande esforço dos gestores e reestruturar o endividamento da empresa e manter a operação em funcionamento. Diante dos desafios enfrentados pela organização, evidenciou-se a necessidade de reestruturação financeira, injeção de capital, realização de investimentos e a busca por maior liquidez.			
<b>REFERENCIAS</b>	NEGRÃO, R. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. Editora Saraiva, 1ª ed., 2005, 220 p. TEIXEIRA, T. A recuperação judicial de empresas. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 106, p. 181-214, jan./dez., 2012. Disponível em: <a href="https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943">https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943</a> . Acesso em 14 set. 2023. BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm</a> . Acesso em 20 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14182	Administração de Empresas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4857542 - SAMARA TRINDADE DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
<b>TITULO</b>	PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA OI TELECOM			
<b>INTRODUCA O</b>	Fundada em 1998, a Oi é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. A empresa enfrentou desafios significativos, relacionados ao atraso nas vendas das UPIs; não recebimento de uma parte da venda da UPI Ativos Móveis, avaliada em R\$ 1,4 bilhão; impacto da pandemia da Covid-19; instabilidade nos indicadores econômicos, como aumentos nas taxas de juros domésticas e piora no ambiente de crédito; flutuações na cotação do dólar, que afetam obrigações assumidas; declínio rápido das receitas da telefonia fixa devido a mudanças tecnológicas; custos contínuos de contratos com obrigações mínimas e baixo consumo de serviços; e manutenção de obrigações regulatórias na concessão de telefonia fixa. Tais problemas resultaram em um acúmulo de dívidas da ordem de R\$44 bilhões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo, descrever o processo de recuperação judicial da empresa objeto de estudo e analisar impactos aos respectivos credores.			
<b>METODOLOGIA</b>	No desenvolvimento do referido estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir da consulta de livros artigos científicos e revistas especializadas.			
<b>RESULTADO S</b>	Verificou-se como parte da solução à condição de endividamento da empresa, a solicitação de recuperação judicial, seguida de uma ampla reestruturação financeira, dado o longo e complexo processo de individualização e restrição que a empresa enfrentou ao longo dos anos. É necessário injetar capital novo para que a empresa possa cumprir suas obrigações, realizar os investimentos necessários e buscar mais liquidez no cumprimento das responsabilidades assumidas com seus credores, enquanto se busca uma solução definitiva para os ajustes relacionados à concessão dos serviços de telefonia fixa e suas obrigações.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A partir do cenário analisado, identificou-se um grande esforço dos gestores e reestruturar o endividamento da empresa e manter a operação em funcionamento. Diante dos desafios enfrentados pela organização, evidenciou-se a necessidade de reestruturação financeira, injeção de capital, realização de investimentos e a busca por maior liquidez.			
<b>REFERENCIA S</b>	NEGRÃO, R. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. Editora Saraiva, 1ª ed., 2005, 220 p. TEIXEIRA, T. A recuperação judicial de empresas. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 106, p. 181-214, jan./dez., 2012. Disponível em: <a href="https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943">https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943</a> . Acesso em 14 set. 2023. BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm</a> . Acesso em 20 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade	
2023	14182	Administração de Empresas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares	
		Autor		Status	Apresentação
		4857739 - LUCIANA CORREIA DOS SANTOS		2 - Aprovado	1 - Poster
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo	
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos		
TITULO	PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA OI TELECOM				
INTRODUCA O	Fundada em 1998, a Oi é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. A empresa enfrentou desafios significativos, relacionados ao atraso nas vendas das UPIs; não recebimento de uma parte da venda da UPI Ativos Móveis, avaliada em R\$ 1,4 bilhão; impacto da pandemia da Covid-19; instabilidade nos indicadores econômicos, como aumentos nas taxas de juros domésticas e piora no ambiente de crédito; flutuações na cotação do dólar, que afetam obrigações assumidas; declínio rápido das receitas da telefonia fixa devido a mudanças tecnológicas; custos contínuos de contratos com obrigações mínimas e baixo consumo de serviços; e manutenção de obrigações regulatórias na concessão de telefonia fixa. Tais problemas resultaram em um acúmulo de dívidas da ordem de R\$44 bilhões.				
OBJETIVOS	Temos como objetivo, descrever o processo de recuperação judicial da empresa objeto de estudo e analisar impactos aos respectivos credores.				
METODOLOGIA	No desenvolvimento do referido estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir da consulta de livros artigos científicos e revistas especializadas.				
RESULTADO S	Verificou-se como parte da solução à condição de endividamento da empresa, a solicitação de recuperação judicial, seguida de uma ampla reestruturação financeira, dado o longo e complexo processo de individualização e restrição que a empresa enfrentou ao longo dos anos. É necessário injetar capital novo para que a empresa possa cumprir suas obrigações, realizar os investimentos necessários e buscar mais liquidez no cumprimento das responsabilidades assumidas com seus credores, enquanto se busca uma solução definitiva para os ajustes relacionados à concessão dos serviços de telefonia fixa e suas obrigações.				
CONCLUSOE S	A partir do cenário analisado, identificou-se um grande esforço dos gestores e reestruturar o endividamento da empresa e manter a operação em funcionamento. Diante dos desafios enfrentados pela organização, evidenciou-se a necessidade de reestruturação financeira, injeção de capital, realização de investimentos e a busca por maior liquidez.				
REFERENCIA S	NEGRÃO, R. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. Editora Saraiva, 1ª ed., 2005, 220 p. TEIXEIRA, T. A recuperação judicial de empresas. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 106, p. 181-214, jan./dez., 2012. Disponível em: <a href="https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943">https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943</a> . Acesso em 14 set. 2023. BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm</a> . Acesso em 20 set. 2023.				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14182	Administração de Empresas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4912284 - PAULO RICARDO SOARES DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
<b>TITULO</b>	PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA OI TELECOM			
<b>INTRODUCA O</b>	Fundada em 1998, a Oi é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. A empresa enfrentou desafios significativos, relacionados ao atraso nas vendas das UPIs; não recebimento de uma parte da venda da UPI Ativos Móveis, avaliada em R\$ 1,4 bilhão; impacto da pandemia da Covid-19; instabilidade nos indicadores econômicos, como aumentos nas taxas de juros domésticas e piora no ambiente de crédito; flutuações na cotação do dólar, que afetam obrigações assumidas; declínio rápido das receitas da telefonia fixa devido a mudanças tecnológicas; custos contínuos de contratos com obrigações mínimas e baixo consumo de serviços; e manutenção de obrigações regulatórias na concessão de telefonia fixa. Tais problemas resultaram em um acúmulo de dívidas da ordem de R\$44 bilhões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo, descrever o processo de recuperação judicial da empresa objeto de estudo e analisar impactos aos respectivos credores.			
<b>METODOLOGIA</b>	No desenvolvimento do referido estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir da consulta de livros artigos científicos e revistas especializadas.			
<b>RESULTADO S</b>	Verificou-se como parte da solução à condição de endividamento da empresa, a solicitação de recuperação judicial, seguida de uma ampla reestruturação financeira, dado o longo e complexo processo de individualização e restrição que a empresa enfrentou ao longo dos anos. É necessário injetar capital novo para que a empresa possa cumprir suas obrigações, realizar os investimentos necessários e buscar mais liquidez no cumprimento das responsabilidades assumidas com seus credores, enquanto se busca uma solução definitiva para os ajustes relacionados à concessão dos serviços de telefonia fixa e suas obrigações.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A partir do cenário analisado, identificou-se um grande esforço dos gestores e reestruturar o endividamento da empresa e manter a operação em funcionamento. Diante dos desafios enfrentados pela organização, evidenciou-se a necessidade de reestruturação financeira, injeção de capital, realização de investimentos e a busca por maior liquidez.			
<b>REFERENCIA S</b>	NEGRÃO, R. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. Editora Saraiva, 1ª ed., 2005, 220 p. TEIXEIRA, T. A recuperação judicial de empresas. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 106, p. 181-214, jan./dez., 2012. Disponível em: <a href="https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943">https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943</a> . Acesso em 14 set. 2023. BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm</a> . Acesso em 20 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14182	Administração de Empresas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		5078423 - GABRIELLA VALENÇA DE SOUZA		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Marcelo Cerqueira Silva	Alberto dos Santos	
TITULO	PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA OI TELECOM			
INTRODUCA O	Fundada em 1998, a Oi é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. A empresa enfrentou desafios significativos, relacionados ao atraso nas vendas das UPIs; não recebimento de uma parte da venda da UPI Ativos Móveis, avaliada em R\$ 1,4 bilhão; impacto da pandemia da Covid-19; instabilidade nos indicadores econômicos, como aumentos nas taxas de juros domésticas e piora no ambiente de crédito; flutuações na cotação do dólar, que afetam obrigações assumidas; declínio rápido das receitas da telefonia fixa devido a mudanças tecnológicas; custos contínuos de contratos com obrigações mínimas e baixo consumo de serviços; e manutenção de obrigações regulatórias na concessão de telefonia fixa. Tais problemas resultaram em um acúmulo de dívidas da ordem de R\$44 bilhões.			
OBJETIVOS	Temos como objetivo, descrever o processo de recuperação judicial da empresa objeto de estudo e analisar impactos aos respectivos credores.			
METODOLOGIA	No desenvolvimento do referido estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir da consulta de livros artigos científicos e revistas especializadas.			
RESULTADO S	Verificou-se como parte da solução à condição de endividamento da empresa, a solicitação de recuperação judicial, seguida de uma ampla reestruturação financeira, dado o longo e complexo processo de individualização e restrição que a empresa enfrentou ao longo dos anos. É necessário injetar capital novo para que a empresa possa cumprir suas obrigações, realizar os investimentos necessários e buscar mais liquidez no cumprimento das responsabilidades assumidas com seus credores, enquanto se busca uma solução definitiva para os ajustes relacionados à concessão dos serviços de telefonia fixa e suas obrigações.			
CONCLUSOE S	A partir do cenário analisado, identificou-se um grande esforço dos gestores e reestruturar o endividamento da empresa e manter a operação em funcionamento. Diante dos desafios enfrentados pela organização, evidenciou-se a necessidade de reestruturação financeira, injeção de capital, realização de investimentos e a busca por maior liquidez.			
REFERENCIA S	NEGRÃO, R. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. Editora Saraiva, 1ª ed., 2005, 220 p. TEIXEIRA, T. A recuperação judicial de empresas. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 106, p. 181-214, jan./dez., 2012. Disponível em: <a href="https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943">https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67943</a> . Acesso em 14 set. 2023. BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.043 de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/13043.htm</a> . Acesso em 20 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14183	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor	Status	Apresentação
		4571347 - KAROLINE SOUZA REIS	2 - Aprovado	1 - Poster
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
TITULO	A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS: O CASO GOL			
INTRODUÇÃO	<p>A GOL Linhas Aéreas é a maior companhia aérea da América Latina. Foi criada inicialmente para operar com o conceito de baixo custo. Atualmente opera com aproximadamente 900 voos diários para 63 destinos domésticos e 13 internacionais na América do Sul e Caribe. Nos últimos anos a empresa vem convivendo com um cenário de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19, que ocasionou queda da economia mundial, a desvalorização do Real, aumento dos custos de combustíveis e dificuldades com dívidas contratadas anteriormente. A queda da atividade econômica, alterou as condições de mercado e impactou não só a empresa objeto de estudo, mas a indústria de aviação em todo o mundo. A queda na demanda por viagens aéreas para negócios e entretenimento, devido as preocupações com a saúde pública resultaram em uma redução drástica no número de passageiros voando, ocasionando queda nas receitas de vendas da empresa e o aumento do endividamento.</p>			
OBJETIVOS	Este artigo tem como objetivo compreender as variáveis que levaram a empresa objeto de estudo passar por um desequilíbrio em sua estrutura financeira, e analisar as medidas que foram aplicadas para sua recuperação.			
METODOLOGIA	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.			
RESULTADOS	Devido a magnitude do problema enfrentado pela empresa, houve a necessidade de aplicar diversas medidas para a melhoria dos resultados financeiros. As medidas implementadas tiveram início com a renegociação de dívidas, alongando o prazo de pagamentos; adoção de hedge cambial, como forma de melhorar a gestão de riscos frente as frequentes oscilações do câmbio; uma reorganização sobre o funcionamento da operação, com o objetivo de melhorar a eficiência na gestão de custos, e contribuir na melhoria da saúde financeira da organização empresarial. Cabe ressaltar ainda, a realização de investimentos em tecnologia, contribuindo na modernização da gestão de diversas áreas da organização.			
CONCLUSÕES	Concluímos que as empresas devem ter ferramentas adequadas para gerir riscos pertinentes ao seu modelo de negócio, afim de possibilitar a convivência de forma mais estável em cenários adversos. Verificou-se também, que as aplicações de conceitos da administração financeira são de grande importância para buscar alternativas que viabilizem a continuidade da operação, enquanto ocorrem mudanças no cenário econômico que favoreçam a melhoria do desempenho do negócio. A realização da atividade, possibilitou melhorar nossa compreensão sobre conceitos estudados no curso de Gestão Financeira, nos proporcionando desenvolvimento e adequação para atuação profissional e incentivo a desenvolver outras pesquisas relacionadas com a área.			
REFERÊNCIAS	<p>GOL. Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 2023. Disponível em: <a href="https://www.voegol.com.br/">https://www.voegol.com.br/</a>. Acesso em 09 set. 2023. MARTINS, E. Contabilidade de Custos. Editora Atlas, 11ª ed., 2018, 408 p. MARTINS JÚNIOR, C.; PETRI, S. M. Aviação Civil no Brasil e a crise da Covid-19: Análise dos Indicadores Financeiros das Empresas de Aviação da B3. VII CONGRESSO DE GESTÃO E CONTROLADORIA DA UOCHAPECÓ. Anais. 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14183	Ciências Sociais Aplicadas	B - Trabalhos científicos	D - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4849248 - BIANCA LIMA DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS: O CASO GOL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A GOL Linhas Aéreas é a maior companhia aérea da América Latina. Foi criada inicialmente para operar com o conceito de baixo custo. Atualmente opera com aproximadamente 900 voos diários para 63 destinos domésticos e 13 internacionais na América do Sul e Caribe. Nos últimos anos a empresa vem convivendo com um cenário de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19, que ocasionou queda da economia mundial, a desvalorização do Real, aumento dos custos de combustíveis e dificuldades com dívidas contratadas anteriormente. A queda da atividade econômica, alterou as condições de mercado e impactou não só a empresa objeto de estudo, mas a indústria de aviação em todo o mundo. A queda na demanda por viagens aéreas para negócios e entretenimento, devido as preocupações com a saúde pública resultaram em uma redução drástica no número de passageiros voando, ocasionando queda nas receitas de vendas da empresa e o aumento do endividamento.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como objetivo compreender as variáveis que levaram a empresa objeto de estudo passar por um desequilíbrio em sua estrutura financeira, e analisar as medidas que foram aplicadas para sua recuperação.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Devido a magnitude do problema enfrentado pela empresa, houve a necessidade de aplicar diversas medidas para a melhoria dos resultados financeiros. As medidas implementadas tiveram início com a renegociação de dívidas, alongando o prazo de pagamentos; adoção de hedge cambial, como forma de melhorar a gestão de riscos frente as frequentes oscilações do câmbio; uma reorganização sobre o funcionamento da operação, com o objetivo de melhorar a eficiência na gestão de custos, e contribuir na melhoria da saúde financeira da organização empresarial. Cabe ressaltar ainda, a realização de investimentos em tecnologia, contribuindo na modernização da gestão de diversas áreas da organização.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Concluímos que as empresas devem ter ferramentas adequadas para gerir riscos pertinentes ao seu modelo de negócio, afim de possibilitar a convivência de forma mais estável em cenários adversos. Verificou-se também, que as aplicações de conceitos da administração financeira são de grande importância para buscar alternativas que viabilizem a continuidade da operação, enquanto ocorrem mudanças no cenário econômico que favoreçam a melhoria do desempenho do negócio. A realização da atividade, possibilitou melhorar nossa compreensão sobre conceitos estudados no curso de Gestão Financeira, nos proporcionando desenvolvimento e adequação para atuação profissional e incentivo a desenvolver outras pesquisas relacionadas com a área.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>GOL. Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 2023. Disponível em: <a href="https://www.voegol.com.br/">https://www.voegol.com.br/</a>. Acesso em 09 set. 2023. MARTINS, E. Contabilidade de Custos. Editora Atlas, 11ª ed., 2018, 408 p. MARTINS JÚNIOR, C.; PETRI, S. M. Aviação Civil no Brasil e a crise da Covid-19: Análise dos Indicadores Financeiros das Empresas de Aviação da B3. VII CONGRESSO DE GESTÃO E CONTROLADORIA DA UOCHAPECÓ. Anais. 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14183	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4853865 - LARISSA DE JESUS MACEDO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS: O CASO GOL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A GOL Linhas Aéreas é a maior companhia aérea da América Latina. Foi criada inicialmente para operar com o conceito de baixo custo. Atualmente opera com aproximadamente 900 voos diários para 63 destinos domésticos e 13 internacionais na América do Sul e Caribe. Nos últimos anos a empresa vem convivendo com um cenário de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19, que ocasionou queda da economia mundial, a desvalorização do Real, aumento dos custos de combustíveis e dificuldades com dívidas contratadas anteriormente. A queda da atividade econômica, alterou as condições de mercado e impactou não só a empresa objeto de estudo, mas a indústria de aviação em todo o mundo. A queda na demanda por viagens aéreas para negócios e entretenimento, devido as preocupações com a saúde pública resultaram em uma redução drástica no número de passageiros voando, ocasionando queda nas receitas de vendas da empresa e o aumento do endividamento.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como objetivo compreender as variáveis que levaram a empresa objeto de estudo passar por um desequilíbrio em sua estrutura financeira, e analisar as medidas que foram aplicadas para sua recuperação.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Devido a magnitude do problema enfrentado pela empresa, houve a necessidade de aplicar diversas medidas para a melhoria dos resultados financeiros. As medidas implementadas tiveram início com a renegociação de dívidas, alongando o prazo de pagamentos; adoção de hedge cambial, como forma de melhorar a gestão de riscos frente as frequentes oscilações do câmbio; uma reorganização sobre o funcionamento da operação, com o objetivo de melhorar a eficiência na gestão de custos, e contribuir na melhoria da saúde financeira da organização empresarial. Cabe ressaltar ainda, a realização de investimentos em tecnologia, contribuindo na modernização da gestão de diversas áreas da organização.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Concluímos que as empresas devem ter ferramentas adequadas para gerir riscos pertinentes ao seu modelo de negócio, afim de possibilitar a convivência de forma mais estável em cenários adversos. Verificou-se também, que as aplicações de conceitos da administração financeira são de grande importância para buscar alternativas que viabilizem a continuidade da operação, enquanto ocorrem mudanças no cenário econômico que favoreçam a melhoria do desempenho do negócio. A realização da atividade, possibilitou melhorar nossa compreensão sobre conceitos estudados no curso de Gestão Financeira, nos proporcionando desenvolvimento e adequação para atuação profissional e incentivo a desenvolver outras pesquisas relacionadas com a área.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>GOL. Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 2023. Disponível em: <a href="https://www.voegol.com.br/">https://www.voegol.com.br/</a>. Acesso em 09 set. 2023. MARTINS, E. Contabilidade de Custos. Editora Atlas, 11ª ed., 2018, 408 p. MARTINS JÚNIOR, C.; PETRI, S. M. Aviação Civil no Brasil e a crise da Covid-19: Análise dos Indicadores Financeiros das Empresas de Aviação da B3. VII CONGRESSO DE GESTÃO E CONTROLADORIA DA UOCHAPECÓ. Anais. 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14183	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4875125 - KARINA BUENO DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS: O CASO GOL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A GOL Linhas Aéreas é a maior companhia aérea da América Latina. Foi criada inicialmente para operar com o conceito de baixo custo. Atualmente opera com aproximadamente 900 voos diários para 63 destinos domésticos e 13 internacionais na América do Sul e Caribe. Nos últimos anos a empresa vem convivendo com um cenário de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19, que ocasionou queda da economia mundial, a desvalorização do Real, aumento dos custos de combustíveis e dificuldades com dívidas contratadas anteriormente. A queda da atividade econômica, alterou as condições de mercado e impactou não só a empresa objeto de estudo, mas a indústria de aviação em todo o mundo. A queda na demanda por viagens aéreas para negócios e entretenimento, devido as preocupações com a saúde pública resultaram em uma redução drástica no número de passageiros voando, ocasionando queda nas receitas de vendas da empresa e o aumento do endividamento.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como objetivo compreender as variáveis que levaram a empresa objeto de estudo passar por um desequilíbrio em sua estrutura financeira, e analisar as medidas que foram aplicadas para sua recuperação.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Devido a magnitude do problema enfrentado pela empresa, houve a necessidade de aplicar diversas medidas para a melhoria dos resultados financeiros. As medidas implementadas tiveram início com a renegociação de dívidas, alongando o prazo de pagamentos; adoção de hedge cambial, como forma de melhorar a gestão de riscos frente as frequentes oscilações do câmbio; uma reorganização sobre o funcionamento da operação, com o objetivo de melhorar a eficiência na gestão de custos, e contribuir na melhoria da saúde financeira da organização empresarial. Cabe ressaltar ainda, a realização de investimentos em tecnologia, contribuindo na modernização da gestão de diversas áreas da organização.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Concluímos que as empresas devem ter ferramentas adequadas para gerir riscos pertinentes ao seu modelo de negócio, afim de possibilitar a convivência de forma mais estável em cenários adversos. Verificou-se também, que as aplicações de conceitos da administração financeira são de grande importância para buscar alternativas que viabilizem a continuidade da operação, enquanto ocorrem mudanças no cenário econômico que favoreçam a melhoria do desempenho do negócio. A realização da atividade, possibilitou melhorar nossa compreensão sobre conceitos estudados no curso de Gestão Financeira, nos proporcionando desenvolvimento e adequação para atuação profissional e incentivo a desenvolver outras pesquisas relacionadas com a área.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>GOL. Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 2023. Disponível em: <a href="https://www.voegol.com.br/">https://www.voegol.com.br/</a>. Acesso em 09 set. 2023. MARTINS, E. Contabilidade de Custos. Editora Atlas, 11ª ed., 2018, 408 p. MARTINS JÚNIOR, C.; PETRI, S. M. Aviação Civil no Brasil e a crise da Covid-19: Análise dos Indicadores Financeiros das Empresas de Aviação da B3. VII CONGRESSO DE GESTÃO E CONTROLADORIA DA UOCHAPECÓ. Anais. 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14183	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5015839 - DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS		2 - Aprovado
				1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS: O CASO GOL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A GOL Linhas Aéreas é a maior companhia aérea da América Latina. Foi criada inicialmente para operar com o conceito de baixo custo. Atualmente opera com aproximadamente 900 voos diários para 63 destinos domésticos e 13 internacionais na América do Sul e Caribe. Nos últimos anos a empresa vem convivendo com um cenário de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19, que ocasionou queda da economia mundial, a desvalorização do Real, aumento dos custos de combustíveis e dificuldades com dívidas contratadas anteriormente. A queda da atividade econômica, alterou as condições de mercado e impactou não só a empresa objeto de estudo, mas a indústria de aviação em todo o mundo. A queda na demanda por viagens aéreas para negócios e entretenimento, devido as preocupações com a saúde pública resultaram em uma redução drástica no número de passageiros voando, ocasionando queda nas receitas de vendas da empresa e o aumento do endividamento.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como objetivo compreender as variáveis que levaram a empresa objeto de estudo passar por um desequilíbrio em sua estrutura financeira, e analisar as medidas que foram aplicadas para sua recuperação.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Devido a magnitude do problema enfrentado pela empresa, houve a necessidade de aplicar diversas medidas para a melhoria dos resultados financeiros. As medidas implementadas tiveram início com a renegociação de dívidas, alongando o prazo de pagamentos; adoção de hedge cambial, como forma de melhorar a gestão de riscos frente as frequentes oscilações do câmbio; uma reorganização sobre o funcionamento da operação, com o objetivo de melhorar a eficiência na gestão de custos, e contribuir na melhoria da saúde financeira da organização empresarial. Cabe ressaltar ainda, a realização de investimentos em tecnologia, contribuindo na modernização da gestão de diversas áreas da organização.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Concluímos que as empresas devem ter ferramentas adequadas para gerir riscos pertinentes ao seu modelo de negócio, afim de possibilitar a convivência de forma mais estável em cenários adversos. Verificou-se também, que as aplicações de conceitos da administração financeira são de grande importância para buscar alternativas que viabilizem a continuidade da operação, enquanto ocorrem mudanças no cenário econômico que favoreçam a melhoria do desempenho do negócio. A realização da atividade, possibilitou melhorar nossa compreensão sobre conceitos estudados no curso de Gestão Financeira, nos proporcionando desenvolvimento e adequação para atuação profissional e incentivo a desenvolver outras pesquisas relacionadas com a área.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>GOL. Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 2023. Disponível em: <a href="https://www.voegol.com.br/">https://www.voegol.com.br/</a>. Acesso em 09 set. 2023. MARTINS, E. Contabilidade de Custos. Editora Atlas, 11ª ed., 2018, 408 p. MARTINS JÚNIOR, C.; PETRI, S. M. Aviação Civil no Brasil e a crise da Covid-19: Análise dos Indicadores Financeiros das Empresas de Aviação da B3. VII CONGRESSO DE GESTÃO E CONTROLADORIA DA UOCHAPECÓ. Anais. 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14185	História das Ciências	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1575830 - LUIZ FERNANDO PEREIRA GARUPE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paulo Fernando de Souza Campos		
<b>TITULO</b>	O desejo negado: o homoerotismo na obra Bom Crioulo de 1895			
<b>INTRODUCAO</b>	Esse trabalho visa analisar a representação do desejo homoerótico na obra Bom Crioulo de Adolfo Caminha, publicada em 1895. O protagonista desse romance é negro, ex-escravizado, homossexual e marinheiro exercendo trabalho braçal, apresentando uma diversidade que provoca um incômodo, uma perturbação na sociedade e no cenário literário e cultural do final do século XIX.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a patologização do desejo homoerótico na obra Bom Crioulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Como material de análise o estudo utiliza a obra literária Bom Crioulo e como método a Análise do Discurso embasado pela Teoria Queer.			
<b>RESULTADOS</b>	A obra apresenta o desejo homoerótico, esse desejo entre indivíduos do mesmo sexo é exposto como abjeto perante uma heterossexualidade normativa, regulando os diferentes discursos, os modos de viver e principalmente as experiências sexuais. O relacionamento homoerótico de Amaro e Aleixo é abordado a partir de uma perspectiva patológica, presente na visão da ciência médica da época fortemente marcada pelo determinismo. Na obra Bom Crioulo, um exemplar do discurso naturalista a homossexualidade é apresentada numa perspectiva vexatória dentro de um processo de marginalização da relação homoerótica entre dois homens, cujo desejo é condenável na sociedade finissecular. Nesse contexto, a heterossexualidade compulsória, a heteronormatividade nega a subjetividades dos corpos que destoam da normatividade, tais corpos são passíveis de serem excluídos, extintos e expurgados da sociedade.			
<b>CONCLUSOES</b>	O controle dos corpos eróticos pode ser analisado como um mecanismo de poder que impõe valores, condutas e comportamentos sociais imposto a todas as pessoas. A obra Bom Crioulo de Adolfo Caminha explora de forma patológica, a relação entre literatura e homoerotismo na qual podemos pensar na configuração de uma sociedade, ainda hoje, marcadamente conservadora estabelece normas, valores e condutas excludentes e preconceituosas em relação às questões de gênero e principalmente as questões relacionadas as relações homoeróticas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BUTLER, J. Corpos que importam. São Paulo: N-1 Edições, 2019 CAMINHA, A. Bom Crioulo. São Paulo: Todavia, 2019. FOUCAULT. M. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2010. GREEN, J. N. Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XIX. São Paulo: UNESP, 2000.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14186	História do Brasil República	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1005502 - PRISCILA LOURENÇO SOARES SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paulo Fernando de Souza Campos		
<b>TITULO</b>	ENSINO DE HISTÓRIA NO CURRÍCULO PAULISTA: POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O presente trabalho apresenta a culminação da pesquisa destinada a investigar o ensino da disciplina História em escolas públicas estaduais de São Paulo com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018 e no Currículo Paulista (CP) de 2019. O problema de pesquisa reside na análise das políticas de Relações Étnico Raciais nesses documentos e como eles promovem uma educação antirracista no ensino fundamental.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a aplicabilidade dos conteúdos que tratam os negros na história do Brasil enquanto geradores de conhecimentos e práticas exigidas no Currículo Paulista.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa documental, de cunho qualitativo e comparativo dos documentos BNCC e CP com abordagem exploratória e analítica por intermédio do método Análise de Conteúdo a partir das categorias de análise: escravos, escravizados, escravidão, africano, negro, racismo e resistências. Os pressupostos decoloniais propostos por Boaventura de Sousa Santos embasam a pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao explorar as habilidades e competências utilizadas pelo CP os resultados apontam a necessidade de reconfigurar e consolidar narrativas sobre a história dos negros no Brasil e sobre o discurso presente nas habilidades propostas pelo currículo em alusivos às Relações Étnico Raciais. Com o foco a educação antirracista, os documentos desvelam estratégias de reconfiguração de narrativas e de discursos subjacentes às habilidades do currículo em relação à educação antirracista. As discussões no âmbito acadêmico explicitam a importância em fomentar o combate de práticas racistas visando a valorização da experiência negra na História na educação básica.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Considera-se que a aplicabilidade dos conteúdos sobre a questão da história e cultura africana e afro-brasileira que constam nos documentos BNCC e CP implicam em um permanente debate.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALMEIDA, Sílvia Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandira, 2020. FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador. Saberes construídos na luta por emancipação. Petrópolis, RJ: vozes, 2017. OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Opção Decolonial e Antirracismo na Educação em Tempos Neofacistas. Revista ABPN, Uberlândia, v. 12, n. 32, 2020. p. 11-29. SANTOS, Boaventura de Sousa. Descolonizar: abrindo a história do presente. Belo Horizonte: Autêntica Editora; São Paulo: Boitempo, 2022.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14187	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4854292 - VANESSA SANTOS VILAS BOAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A ROTATIVIDADE DOS FUNCIONARIOS E A SUA PROBLEMÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES			
<b>INTRODUCAO</b>	A rotatividade de funcionários, também conhecida como turnover, é um fenômeno comum nas organizações, que envolve a entrada e saída contínua de colaboradores. Suas consequências podem ser profundas e abrangentes, afetando desde a estabilidade financeira da empresa até o moral dos funcionários e a qualidade do trabalho.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar e discutir a importância do departamento de Recursos Humanos para evitar uma alta taxa de rotatividade de funcionários e assim minimizar suas consequências na organização			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa sobre a rotatividade dos funcionários nas empresas			
<b>RESULTADOS</b>	Rotatividade ou mais conhecido em inglês como turnover, diz respeito ao número de admissões e demissões em um determinado prazo. Em suma, se refere ao interesse dos profissionais em estar na empresa e a falta de retenção de talentos. A rotatividade dos colaboradores pode ser causada por fatores externos ligados a economia, mas também internos, relacionados a cultura da organização. Chiavenato (2010), aduz que, quando o desligamento parte da iniciativa da empresa, um dos motivos é em relação à redução de custos ou para modificar o quadro de recursos humanos, com o intuito de melhorar o desenvolvimento das tarefas. Quando a empresa lida com uma alta taxa de rotatividade pode sofrer consequências na produtividade e o engajamento da equipe. A perda de funcionários pode impactar negativamente nos processos, na qualidade do atendimento e a continuidade dos negócios, além de gerar instabilidade emocional e diminuir a confiança nos funcionários que permaneceram. "A saída de pessoas implica a perda de conhecimento e, às vezes, atraso na produção e perda de qualidade. Se o demitido ou demissionário for trabalhar para um competidor, a perda é ainda maior, por meio da transferência de conhecimento e por poupar ao concorrente o custo da formação de um profissional" (LACOMBE, 2005, p. 259). Por isso, há a importância das estratégias de retenção de talentos e desenvolvimento de lideranças, visando além de atrair profissionais qualificados, garantir seu engajamento e satisfação no trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com esse trabalho pode-se concluir que, presente no cotidiano das organizações e sem a devida atenção dos gestores, a alta rotatividade pode gerar prejuízos às empresas e trabalhadores pois gera baixa produtividade e entrega insatisfatória, baixos salários e perda de talentos, cultura e clima organizacional tóxicos, má qualidade de serviços e custos com contratação e dispensa. Por isso a retenção de talentos é essencial para diminuir a rotatividade, promovendo uma maior estabilidade e eficiência na empresa. Ao investir em estratégias de retenção, as organizações podem se beneficiar de um quadro de funcionários mais estável, comprometido e produtivo.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas,2002. CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração de Recursos Humanos, 4ª edição. São Paulo: Manole, 2010. LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.			

Ano	Cód.	Area	Typo	Modalidade
2023	14187	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4855876 - AGATHA CAROLINE AMORIM DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A ROTATIVIDADE DOS FUNCIONARIOS E A SUA PROBLEMÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES			
<b>INTRODUCAO</b>	A rotatividade de funcionários, também conhecida como turnover, é um fenômeno comum nas organizações, que envolve a entrada e saída contínua de colaboradores. Suas consequências podem ser profundas e abrangentes, afetando desde a estabilidade financeira da empresa até o moral dos funcionários e a qualidade do trabalho.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar e discutir a importância do departamento de Recursos Humanos para evitar uma alta taxa de rotatividade de funcionários e assim minimizar suas consequências na organização			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa sobre a rotatividade dos funcionários nas empresas			
<b>RESULTADOS</b>	Rotatividade ou mais conhecido em inglês como turnover, diz respeito ao número de admissões e demissões em um determinado prazo. Em suma, se refere ao interesse dos profissionais em estar na empresa e a falta de retenção de talentos. A rotatividade dos colaboradores pode ser causada por fatores externos ligados a economia, mas também internos, relacionados a cultura da organização. Chiavenato (2010), aduz que, quando o desligamento parte da iniciativa da empresa, um dos motivos é em relação à redução de custos ou para modificar o quadro de recursos humanos, com o intuito de melhorar o desenvolvimento das tarefas. Quando a empresa lida com uma alta taxa de rotatividade pode sofrer consequências na produtividade e o engajamento da equipe. A perda de funcionários pode impactar negativamente nos processos, na qualidade do atendimento e a continuidade dos negócios, além de gerar instabilidade emocional e diminuir a confiança nos funcionários que permaneceram. "A saída de pessoas implica a perda de conhecimento e, às vezes, atraso na produção e perda de qualidade. Se o demitido ou demissionário for trabalhar para um competidor, a perda é ainda maior, por meio da transferência de conhecimento e por poupar ao concorrente o custo da formação de um profissional" (LACOMBE, 2005, p. 259). Por isso, há a importância das estratégias de retenção de talentos e desenvolvimento de lideranças, visando além de atrair profissionais qualificados, garantir seu engajamento e satisfação no trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com esse trabalho pode-se concluir que, presente no cotidiano das organizações e sem a devida atenção dos gestores, a alta rotatividade pode gerar prejuízos às empresas e trabalhadores pois gera baixa produtividade e entrega insatisfatória, baixos salários e perda de talentos, cultura e clima organizacional tóxicos, má qualidade de serviços e custos com contratação e dispensa. Por isso a retenção de talentos é essencial para diminuir a rotatividade, promovendo uma maior estabilidade e eficiência na empresa. Ao investir em estratégias de retenção, as organizações podem se beneficiar de um quadro de funcionários mais estável, comprometido e produtivo.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas,2002. CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração de Recursos Humanos, 4ª edição. São Paulo: Manole, 2010. LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14187	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4881524 - PAULO GABRIEL GOMES SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A ROTATIVIDADE DOS FUNCIONARIOS E A SUA PROBLEMÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES			
<b>INTRODUCAO</b>	A rotatividade de funcionários, também conhecida como turnover, é um fenômeno comum nas organizações, que envolve a entrada e saída contínua de colaboradores. Suas consequências podem ser profundas e abrangentes, afetando desde a estabilidade financeira da empresa até o moral dos funcionários e a qualidade do trabalho.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar e discutir a importância do departamento de Recursos Humanos para evitar uma alta taxa de rotatividade de funcionários e assim minimizar suas consequências na organização			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa sobre a rotatividade dos funcionários nas empresas			
<b>RESULTADOS</b>	Rotatividade ou mais conhecido em inglês como turnover, diz respeito ao número de admissões e demissões em um determinado prazo. Em suma, se refere ao interesse dos profissionais em estar na empresa e a falta de retenção de talentos. A rotatividade dos colaboradores pode ser causada por fatores externos ligados a economia, mas também internos, relacionados a cultura da organização. Chiavenato (2010), aduz que, quando o desligamento parte da iniciativa da empresa, um dos motivos é em relação à redução de custos ou para modificar o quadro de recursos humanos, com o intuito de melhorar o desenvolvimento das tarefas. Quando a empresa lida com uma alta taxa de rotatividade pode sofrer consequências na produtividade e o engajamento da equipe. A perda de funcionários pode impactar negativamente nos processos, na qualidade do atendimento e a continuidade dos negócios, além de gerar instabilidade emocional e diminuir a confiança nos funcionários que permaneceram. "A saída de pessoas implica a perda de conhecimento e, às vezes, atraso na produção e perda de qualidade. Se o demitido ou demissionário for trabalhar para um competidor, a perda é ainda maior, por meio da transferência de conhecimento e por poupar ao concorrente o custo da formação de um profissional" (LACOMBE, 2005, p. 259). Por isso, há a importância das estratégias de retenção de talentos e desenvolvimento de lideranças, visando além de atrair profissionais qualificados, garantir seu engajamento e satisfação no trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com esse trabalho pode-se concluir que, presente no cotidiano das organizações e sem a devida atenção dos gestores, a alta rotatividade pode gerar prejuízos às empresas e trabalhadores pois gera baixa produtividade e entrega insatisfatória, baixos salários e perda de talentos, cultura e clima organizacional tóxicos, má qualidade de serviços e custos com contratação e dispensa. Por isso a retenção de talentos é essencial para diminuir a rotatividade, promovendo uma maior estabilidade e eficiência na empresa. Ao investir em estratégias de retenção, as organizações podem se beneficiar de um quadro de funcionários mais estável, comprometido e produtivo.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas,2002. CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração de Recursos Humanos, 4ª edição. São Paulo: Manole, 2010. LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14187	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5001293 - ANA CELIA MELO BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A ROTATIVIDADE DOS FUNCIONARIOS E A SUA PROBLEMÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES			
<b>INTRODUCAO</b>	A rotatividade de funcionários, também conhecida como turnover, é um fenômeno comum nas organizações, que envolve a entrada e saída contínua de colaboradores. Suas consequências podem ser profundas e abrangentes, afetando desde a estabilidade financeira da empresa até o moral dos funcionários e a qualidade do trabalho.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar e discutir a importância do departamento de Recursos Humanos para evitar uma alta taxa de rotatividade de funcionários e assim minimizar suas consequências na organização			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa sobre a rotatividade dos funcionários nas empresas			
<b>RESULTADOS</b>	Rotatividade ou mais conhecido em inglês como turnover, diz respeito ao número de admissões e demissões em um determinado prazo. Em suma, se refere ao interesse dos profissionais em estar na empresa e a falta de retenção de talentos. A rotatividade dos colaboradores pode ser causada por fatores externos ligados a economia, mas também internos, relacionados a cultura da organização. Chiavenato (2010), aduz que, quando o desligamento parte da iniciativa da empresa, um dos motivos é em relação à redução de custos ou para modificar o quadro de recursos humanos, com o intuito de melhorar o desenvolvimento das tarefas. Quando a empresa lida com uma alta taxa de rotatividade pode sofrer consequências na produtividade e o engajamento da equipe. A perda de funcionários pode impactar negativamente nos processos, na qualidade do atendimento e a continuidade dos negócios, além de gerar instabilidade emocional e diminuir a confiança nos funcionários que permaneceram. "A saída de pessoas implica a perda de conhecimento e, às vezes, atraso na produção e perda de qualidade. Se o demitido ou demissionário for trabalhar para um competidor, a perda é ainda maior, por meio da transferência de conhecimento e por poupar ao concorrente o custo da formação de um profissional" (LACOMBE, 2005, p. 259). Por isso, há a importância das estratégias de retenção de talentos e desenvolvimento de lideranças, visando além de atrair profissionais qualificados, garantir seu engajamento e satisfação no trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com esse trabalho pode-se concluir que, presente no cotidiano das organizações e sem a devida atenção dos gestores, a alta rotatividade pode gerar prejuízos às empresas e trabalhadores pois gera baixa produtividade e entrega insatisfatória, baixos salários e perda de talentos, cultura e clima organizacional tóxicos, má qualidade de serviços e custos com contratação e dispensa. Por isso a retenção de talentos é essencial para diminuir a rotatividade, promovendo uma maior estabilidade e eficiência na empresa. Ao investir em estratégias de retenção, as organizações podem se beneficiar de um quadro de funcionários mais estável, comprometido e produtivo.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração de Recursos Humanos, 4ª edição. São Paulo: Manole, 2010. LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14187	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5005663 - TAIANE LOPES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A ROTATIVIDADE DOS FUNCIONARIOS E A SUA PROBLEMÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES			
<b>INTRODUCAO</b>	A rotatividade de funcionários, também conhecida como turnover, é um fenômeno comum nas organizações, que envolve a entrada e saída contínua de colaboradores. Suas consequências podem ser profundas e abrangentes, afetando desde a estabilidade financeira da empresa até o moral dos funcionários e a qualidade do trabalho.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar e discutir a importância do departamento de Recursos Humanos para evitar uma alta taxa de rotatividade de funcionários e assim minimizar suas consequências na organização			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa sobre a rotatividade dos funcionários nas empresas			
<b>RESULTADOS</b>	Rotatividade ou mais conhecido em inglês como turnover, diz respeito ao número de admissões e demissões em um determinado prazo. Em suma, se refere ao interesse dos profissionais em estar na empresa e a falta de retenção de talentos. A rotatividade dos colaboradores pode ser causada por fatores externos ligados a economia, mas também internos, relacionados a cultura da organização. Chiavenato (2010), aduz que, quando o desligamento parte da iniciativa da empresa, um dos motivos é em relação à redução de custos ou para modificar o quadro de recursos humanos, com o intuito de melhorar o desenvolvimento das tarefas. Quando a empresa lida com uma alta taxa de rotatividade pode sofrer consequências na produtividade e o engajamento da equipe. A perda de funcionários pode impactar negativamente nos processos, na qualidade do atendimento e a continuidade dos negócios, além de gerar instabilidade emocional e diminuir a confiança nos funcionários que permaneceram. "A saída de pessoas implica a perda de conhecimento e, às vezes, atraso na produção e perda de qualidade. Se o demitido ou demissionário for trabalhar para um competidor, a perda é ainda maior, por meio da transferência de conhecimento e por poupar ao concorrente o custo da formação de um profissional" (LACOMBE, 2005, p. 259). Por isso, há a importância das estratégias de retenção de talentos e desenvolvimento de lideranças, visando além de atrair profissionais qualificados, garantir seu engajamento e satisfação no trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com esse trabalho pode-se concluir que, presente no cotidiano das organizações e sem a devida atenção dos gestores, a alta rotatividade pode gerar prejuízos às empresas e trabalhadores pois gera baixa produtividade e entrega insatisfatória, baixos salários e perda de talentos, cultura e clima organizacional tóxicos, má qualidade de serviços e custos com contratação e dispensa. Por isso a retenção de talentos é essencial para diminuir a rotatividade, promovendo uma maior estabilidade e eficiência na empresa. Ao investir em estratégias de retenção, as organizações podem se beneficiar de um quadro de funcionários mais estável, comprometido e produtivo.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração de Recursos Humanos, 4ª edição. São Paulo: Manole, 2010. LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14188	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4841727 - RAFAELE FELICIANO NANAN	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: MELHORIAS E TRANSFORMAÇÕES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O treinamento e desenvolvimento (T(#38)D), estão entre as ações mais satisfatórias do RH, visando atingir metas da organização, melhorar seus resultados e ambiente de trabalho, desempenho de pessoas e criar uma cultura de engajamento e motivação. Em contrapartida a falta de treinamento e capacitação podem ocasionar problemas internos dentro da empresa. Diante disso entende-se que o sucesso da empresa está ligado à capacidade de execução das pessoas que a compõem.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal do artigo é analisar o processo de treinamento e desenvolvimento visando diminuir as lacunas existentes em profissionais e fazer com que possa ser extraído o melhor do potencial de cada um, assim obtendo um padrão de qualidade e resultados mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativa, bem como consultas a artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam os problemas internos é a falta de treinamento. O treinamento e desenvolvimento deve ser visto como parte essencial da estratégia da empresa e está sempre o com recursos humanos assim buscando formas de aprimorar os conhecimentos e habilidades de colaboradores, auxiliar no crescimento e melhorar suas competências. Segundo Dutra (2001) " As competências nas organizações tendem a ser caracterizadas como a contribuição das pessoas para a capacidade da empresa de interagir com seu ambiente, mantendo ou ampliando suas vantagens competitivas". Desta forma, para que o conhecimento técnico e comportamental adquirido pelos profissionais contribuem para o aumento da senioridade dos times, trazendo ainda mais benefícios e resultados mais eficientes. Para Chiavenato (2020) " treinamento é uma metodologia com objetivo no curto prazo e deve ser idealizada de maneira sistemática e organizada para que os indivíduos aprendam conhecimentos habilidades e competências com a finalidade de atender objetivos organizacionais previamente definidos". Mas, para que o treinamento seja eficiente, eficaz e efetivo e necessário um planejamento bem elaborado. Faz-se necessário investir em pessoas e nas suas competências. A medida que colaboradores se tornam mais competentes, a organização como um todo se torna mais ágil, inovadora e preparada para o futuro.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante disto é possível concluir que empresas deverá investir mais no treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores, assim garantindo o aumento da produtividade e motivação, além de obter, por parte dos funcionários, soluções e inovações referentes ao problema do dia a dia.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª ed, São Paulo, Atlas, (2002). CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O Novo Papel da Gestão do Talento Humano. 5ª ed, São Paulo, Atlas (2020) DUTRA, Joel Souza. Gestão por Competências. 11ª ed, São Paulo (2001).			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14188	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4847253 - LETÍCIA DE SOUZA CRUZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: MELHORIAS E TRANSFORMAÇÕES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O treinamento e desenvolvimento (T(#38)D), estão entre as ações mais satisfatórias do RH, visando atingir metas da organização, melhorar seus resultados e ambiente de trabalho, desempenho de pessoas e criar uma cultura de engajamento e motivação. Em contrapartida a falta de treinamento e capacitação podem ocasionar problemas internos dentro da empresa. Diante disso entende-se que o sucesso da empresa está ligado à capacidade de execução das pessoas que a compõem.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal do artigo é analisar o processo de treinamento e desenvolvimento visando diminuir as lacunas existentes em profissionais e fazer com que possa ser extraído o melhor do potencial de cada um, assim obtendo um padrão de qualidade e resultados mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativa, bem como consultas a artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam os problemas internos é a falta de treinamento. O treinamento e desenvolvimento deve ser visto como parte essencial da estratégia da empresa e está sempre o com recursos humanos assim buscando formas de aprimorar os conhecimentos e habilidades de colaboradores, auxiliar no crescimento e melhorar suas competências. Segundo Dutra (2001) " As competências nas organizações tendem a ser caracterizadas como a contribuição das pessoas para a capacidade da empresa de interagir com seu ambiente, mantendo ou ampliando suas vantagens competitivas". Desta forma, para que o conhecimento técnico e comportamental adquirido pelos profissionais contribuam para o aumento da senioridade dos times, trazendo ainda mais benefícios e resultados mais eficientes. Para Chiavenato (2020) " treinamento é uma metodologia com objetivo no curto prazo e deve ser idealizada de maneira sistemática e organizada para que os indivíduos aprendam conhecimentos habilidades e competências com a finalidade de atender objetivos organizacionais previamente definidos". Mas, para que o treinamento seja eficiente, eficaz e efetivo e necessário um planejamento bem elaborado. Faz-se necessário investir em pessoas e nas suas competências. A medida que colaboradores se tornam mais competentes, a organização como um todo se torna mais ágil, inovadora e preparada para o futuro.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante disto é possível concluir que empresas deverá investir mais no treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores, assim garantindo o aumento da produtividade e motivação, além de obter, por parte dos funcionários, soluções e inovações referentes ao problema do dia a dia.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª ed, São Paulo, Atlas, (2002). CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O Novo Papel da Gestão do Talento Humano. 5ª ed, São Paulo, Atlas (2020) DUTRA, Joel Souza. Gestão por Competências. 11ª ed, São Paulo (2001).			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14188	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4874269 - DANIEL CALHAU PINHEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: MELHORIAS E TRANSFORMAÇÕES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O treinamento e desenvolvimento (T(#38)D), estão entre as ações mais satisfatórias do RH, visando atingir metas da organização, melhorar seus resultados e ambiente de trabalho, desempenho de pessoas e criar uma cultura de engajamento e motivação. Em contrapartida a falta de treinamento e capacitação podem ocasionar problemas internos dentro da empresa. Diante disso entende-se que o sucesso da empresa está ligado à capacidade de execução das pessoas que a compõem.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal do artigo é analisar o processo de treinamento e desenvolvimento visando diminuir as lacunas existentes em profissionais e fazer com que possa ser extraído o melhor do potencial de cada um, assim obtendo um padrão de qualidade e resultados mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativa, bem como consultas a artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam os problemas internos é a falta de treinamento. O treinamento e desenvolvimento deve ser visto como parte essencial da estratégia da empresa e está sempre o com recursos humanos assim buscando formas de aprimorar os conhecimentos e habilidades de colaboradores, auxiliar no crescimento e melhorar suas competências. Segundo Dutra (2001) " As competências nas organizações tendem a ser caracterizadas como a contribuição das pessoas para a capacidade da empresa de interagir com seu ambiente, mantendo ou ampliando suas vantagens competitivas". Desta forma, para que o conhecimento técnico e comportamental adquirido pelos profissionais contribuam para o aumento da senioridade dos times, trazendo ainda mais benefícios e resultados mais eficientes. Para Chiavenato (2020) " treinamento é uma metodologia com objetivo no curto prazo e deve ser idealizada de maneira sistemática e organizada para que os indivíduos aprendam conhecimentos habilidades e competências com a finalidade de atender objetivos organizacionais previamente definidos". Mas, para que o treinamento seja eficiente, eficaz e efetivo e necessário um planejamento bem elaborado. Faz-se necessário investir em pessoas e nas suas competências. A medida que colaboradores se tornam mais competentes, a organização como um todo se torna mais ágil, inovadora e preparada para o futuro.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante disto é possível concluir que empresas deverá investir mais no treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores, assim garantindo o aumento da produtividade e motivação, além de obter, por parte dos funcionários, soluções e inovações referentes ao problema do dia a dia.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª ed, São Paulo, Atlas, (2002). CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O Novo Papel da Gestão do Talento Humano. 5ª ed, São Paulo, Atlas (2020) DUTRA, Joel Souza. Gestão por Competências. 11ª ed, São Paulo (2001).			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14188	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4894286 - ASHILEY RIBEIRO OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: MELHORIAS E TRANSFORMAÇÕES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O treinamento e desenvolvimento (T(#38)D), estão entre as ações mais satisfatórias do RH, visando atingir metas da organização, melhorar seus resultados e ambiente de trabalho, desempenho de pessoas e criar uma cultura de engajamento e motivação. Em contrapartida a falta de treinamento e capacitação podem ocasionar problemas internos dentro da empresa. Diante disso entende-se que o sucesso da empresa está ligado à capacidade de execução das pessoas que a compõem.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal do artigo é analisar o processo de treinamento e desenvolvimento visando diminuir as lacunas existentes em profissionais e fazer com que possa ser extraído o melhor do potencial de cada um, assim obtendo um padrão de qualidade e resultados mais eficientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Buscou-se realizar a fundamentação teórica através de pesquisas bibliográficas qualitativa, bem como consultas a artigos e revistas eletrônicas da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam os problemas internos é a falta de treinamento. O treinamento e desenvolvimento deve ser visto como parte essencial da estratégia da empresa e está sempre o com recursos humanos assim buscando formas de aprimorar os conhecimentos e habilidades de colaboradores, auxiliar no crescimento e melhorar suas competências. Segundo Dutra (2001) " As competências nas organizações tendem a ser caracterizadas como a contribuição das pessoas para a capacidade da empresa de interagir com seu ambiente, mantendo ou ampliando suas vantagens competitivas". Desta forma, para que o conhecimento técnico e comportamental adquirido pelos profissionais contribuam para o aumento da senioridade dos times, trazendo ainda mais benefícios e resultados mais eficientes. Para Chiavenato (2020) " treinamento é uma metodologia com objetivo no curto prazo e deve ser idealizada de maneira sistemática e organizada para que os indivíduos aprendam conhecimentos habilidades e competências com a finalidade de atender objetivos organizacionais previamente definidos". Mas, para que o treinamento seja eficiente, eficaz e efetivo e necessário um planejamento bem elaborado. Faz-se necessário investir em pessoas e nas suas competências. A medida que colaboradores se tornam mais competentes, a organização como um todo se torna mais ágil, inovadora e preparada para o futuro.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante disto é possível concluir que empresas deverá investir mais no treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores, assim garantindo o aumento da produtividade e motivação, além de obter, por parte dos funcionários, soluções e inovações referentes ao problema do dia a dia.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª ed, São Paulo, Atlas, (2002). CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O Novo Papel da Gestão do Talento Humano. 5ª ed, São Paulo, Atlas (2020) DUTRA, Joel Souza. Gestão por Competências. 11ª ed, São Paulo (2001).			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14189	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1292579 - PRISCILA SANTANA DE ANDRADE MENDES FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Avaliação de Desempenho Enquanto Veículo Importante à Produtividade Empresarial na Contemporaneidade.			
<b>INTRODUCAO</b>	A Avaliação de Desempenho, teve sua origem voltada à preocupação de mensurar o desempenho e potencialidade do empregado, Por esse caminho, a avaliação de desempenho é uma importante ferramenta para as empresas por diversas razões, dentre tantas, a identificação de pontos fracos, de cada colaborador e da equipe como um todo. Isso possibilita a elaboração de planos de desenvolvimento e treinamento para melhorar o desempenho e a produtividade.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a importância da Avaliação de Desempenho com vistas ao aperfeiçoamento dos colaboradores. Avaliando ainda a possibilidade de, medir, melhorar e confiar no desempenho dos funcionários, garantindo que a empresa esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos estratégicos			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica com abordagem qualitativa decorrentes da Avaliação de Desempenho.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudioso Gil (2001), refuta sobre a importância às empresa, que não desvie seu olhar de uma Avaliação de Desempenho tecnicamente aperfeiçoada. Tal exercício, em sua definição comum, é inseparável à natureza humana bem como, a base para tomada de decisão que está presente em toda escolha. A avaliação de desempenho define metas e objetivos, porque ao avaliar o desempenho dos colaboradores, é possível ter um olhar alinhado com as necessidades empresariais. Segundo Chiavenato (1981), a Avaliação podem ser notadas às capacidades individuais, delegação, tomada de decisão, visão estratégica, organização, acompanhamento, responsabilidade, dentre outros. E ainda, permite identificar as necessidades de capacitação e treinamento dos colaboradores. Portanto, a empresa pode investir em programas internos de desenvolvimento profissional, que contribuem para o crescimento dos colaboradores e, conseqüentemente, da empresa. Outra variante importante diz respeito ao clima organizacional, isso considerando que quando os colaboradores percebem que seu desempenho é valorizado, eles se sentem mais engajados e motivados. (SAMPAIO, 2000) Logo, a avaliação de desempenho é uma ferramenta indispensável às empresas, pois ajuda na identificação de pontos fracos, reconhecimento de talentos, estabelecimento de metas, melhoria do clima organizacional e identificação de necessidades de capacitação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do exposto, conclui-se que o Departamento de Recursos Humanos, precisa participar ativamente da busca e aplicação de ferramentas para a obtenção da produtividade. Portanto a Avaliação de Desempenho mostra-se atual e necessária, em busca de estratégias que aumente a produtividade por meio de talentos, satisfação e qualidade no serviço prestado dentro da organização bem como por seus clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto, Administração de Recursos humanos, São Paulo, 2ª Edição; Editora Atlas, 1981. GIL, Antonio Carlos. Administração de Recursos Humanos: um enfoque profissional. São Paulo: Atlas, 1994. SAMPAIO, Getúlio Pinto. Relações humanas: a toda hora. São Paulo: Nobel, 2000			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14189	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4581431 - ISaura Castaldi Castaldi	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Avaliação de Desempenho Enquanto Veículo Importante à Produtividade Empresarial na Contemporaneidade.			
<b>INTRODUCAO</b>	A Avaliação de Desempenho, teve sua origem voltada à preocupação de mensurar o desempenho e potencialidade do empregado, Por esse caminho, a avaliação de desempenho é uma importante ferramenta para as empresas por diversas razões, dentre tantas, a identificação de pontos fracos, de cada colaborador e da equipe como um todo. Isso possibilita a elaboração de planos de desenvolvimento e treinamento para melhorar o desempenho e a produtividade.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a importância da Avaliação de Desempenho com vistas ao aperfeiçoamento dos colaboradores. Avaliando ainda a possibilidade de, medir, melhorar e confiar no desempenho dos funcionários, garantindo que a empresa esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos estratégicos			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica com abordagem qualitativa decorrentes da Avaliação de Desempenho.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudioso Gil (2001), refuta sobre a importância às empresa, que não desvie seu olhar de uma Avaliação de Desempenho tecnicamente aperfeiçoada. Tal exercício, em sua definição comum, é inseparável à natureza humana bem como, a base para tomada de decisão que está presente em toda escolha. A avaliação de desempenho define metas e objetivos, porque ao avaliar o desempenho dos colaboradores, é possível ter um olhar alinhado com as necessidades empresariais. Segundo Chiavenato (1981), a Avaliação podem ser notadas às capacidades individuais, delegação, tomada de decisão, visão estratégica, organização, acompanhamento, responsabilidade, dentre outros. E ainda, permite identificar as necessidades de capacitação e treinamento dos colaboradores. Portanto, a empresa pode investir em programas internos de desenvolvimento profissional, que contribuem para o crescimento dos colaboradores e, conseqüentemente, da empresa. Outra variante importante diz respeito ao clima organizacional, isso considerando que quando os colaboradores percebem que seu desempenho é valorizado, eles se sentem mais engajados e motivados. (SAMPALIO, 2000) Logo, a avaliação de desempenho é uma ferramenta indispensável às empresas, pois ajuda na identificação de pontos fracos, reconhecimento de talentos, estabelecimento de metas, melhoria do clima organizacional e identificação de necessidades de capacitação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do exposto, conclui-se que o Departamento de Recursos Humanos, precisa participar ativamente da busca e aplicação de ferramentas para a obtenção da produtividade. Portanto a Avaliação de Desempenho mostra-se atual e necessária, em busca de estratégias que aumente a produtividade por meio de talentos, satisfação e qualidade no serviço prestado dentro da organização bem como por seus clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto, Administração de Recursos humanos, São Paulo, 2ª Edição; Editora Atlas, 1981. GIL, Antonio Carlos. Administração de Recursos Humanos: um enfoque profissional. São Paulo: Atlas, 1994. SAMPALIO, Getúlio Pinto. Relações humanas: a toda hora. São Paulo: Nobel, 2000			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14189	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4958365 - VITORIA FIALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Avaliação de Desempenho Enquanto Veículo Importante à Produtividade Empresarial na Contemporaneidade.			
<b>INTRODUCAO</b>	A Avaliação de Desempenho, teve sua origem voltada à preocupação de mensurar o desempenho e potencialidade do empregado, Por esse caminho, a avaliação de desempenho é uma importante ferramenta para as empresas por diversas razões, dentre tantas, a identificação de pontos fracos, de cada colaborador e da equipe como um todo. Isso possibilita a elaboração de planos de desenvolvimento e treinamento para melhorar o desempenho e a produtividade.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a importância da Avaliação de Desempenho com vistas no aperfeiçoamento dos colaboradores. Avaliando ainda a possibilidade de, medir, melhorar e confiar no desempenho dos funcionários, garantindo que a empresa esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos estratégicos			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica com abordagem qualitativa decorrentes da Avaliação de Desempenho.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudioso Gil (2001), refuta sobre a importância às empresa, que não desvie seu olhar de uma Avaliação de Desempenho tecnicamente aperfeiçoada. Tal exercício, em sua definição comum, é inseparável à natureza humana bem como, a base para tomada de decisão que está presente em toda escolha. A avaliação de desempenho define metas e objetivos, porque ao avaliar o desempenho dos colaboradores, é possível ter um olhar alinhado com as necessidades empresariais. Segundo Chiavenato (1981), a Avaliação podem ser notadas às capacidades individuais, delegação, tomada de decisão, visão estratégica, organização, acompanhamento, responsabilidade, dentre outros. E ainda, permite identificar as necessidades de capacitação e treinamento dos colaboradores. Portanto, a empresa pode investir em programas internos de desenvolvimento profissional, que contribuem para o crescimento dos colaboradores e, conseqüentemente, da empresa. Outra variante importante diz respeito ao clima organizacional, isso considerando que quando os colaboradores percebem que seu desempenho é valorizado, eles se sentem mais engajados e motivados. (SAMPAIO, 2000) Logo, a avaliação de desempenho é uma ferramenta indispensável às empresas, pois ajuda na identificação de pontos fracos, reconhecimento de talentos, estabelecimento de metas, melhoria do clima organizacional e identificação de necessidades de capacitação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do exposto, conclui-se que o Departamento de Recursos Humanos, precisa participar ativamente da busca e aplicação de ferramentas para a obtenção da produtividade. Portanto a Avaliação de Desempenho mostra-se atual e necessária, em busca de estratégias que aumente a produtividade por meio de talentos, satisfação e qualidade no serviço prestado dentro da organização bem como por seus clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO. Idalberto, Administração de Recursos humanos, São Paulo, 2ª Edição; Editora Atlas, 1981. GIL, Antonio Carlos. Administração de Recursos Humanos: um enfoque profissional. São Paulo: Atlas, 1994. SAMPAIO, Getúlio Pinto. Relações humanas: a toda hora. São Paulo: Nobel, 2000			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14189	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5001498 - CAMILA SANTANA DE ANDRADE MENDES FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	A Avaliação de Desempenho Enquanto Veículo Importante à Produtividade Empresarial na Contemporaneidade.			
<b>INTRODUCAO</b>	A Avaliação de Desempenho, teve sua origem voltada à preocupação de mensurar o desempenho e potencialidade do empregado, Por esse caminho, a avaliação de desempenho é uma importante ferramenta para as empresas por diversas razões, dentre tantas, a identificação de pontos fracos, de cada colaborador e da equipe como um todo. Isso possibilita a elaboração de planos de desenvolvimento e treinamento para melhorar o desempenho e a produtividade.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a importância da Avaliação de Desempenho com vistas ao aperfeiçoamento dos colaboradores. Avaliando ainda a possibilidade de, medir, melhorar e confiar no desempenho dos funcionários, garantindo que a empresa esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos estratégicos			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica com abordagem qualitativa decorrentes da Avaliação de Desempenho.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudioso Gil (2001), refuta sobre a importância às empresa, que não desvie seu olhar de uma Avaliação de Desempenho tecnicamente aperfeiçoada. Tal exercício, em sua definição comum, é inseparável à natureza humana bem como, a base para tomada de decisão que está presente em toda escolha. A avaliação de desempenho define metas e objetivos, porque ao avaliar o desempenho dos colaboradores, é possível ter um olhar alinhado com as necessidades empresariais. Segundo Chiavenato (1981), a Avaliação podem ser notadas às capacidades individuais, delegação, tomada de decisão, visão estratégica, organização, acompanhamento, responsabilidade, dentre outros. E ainda, permite identificar as necessidades de capacitação e treinamento dos colaboradores. Portanto, a empresa pode investir em programas internos de desenvolvimento profissional, que contribuem para o crescimento dos colaboradores e, conseqüentemente, da empresa. Outra variante importante diz respeito ao clima organizacional, isso considerando que quando os colaboradores percebem que seu desempenho é valorizado, eles se sentem mais engajados e motivados. (SAMPAIO, 2000) Logo, a avaliação de desempenho é uma ferramenta indispensável às empresas, pois ajuda na identificação de pontos fracos, reconhecimento de talentos, estabelecimento de metas, melhoria do clima organizacional e identificação de necessidades de capacitação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do exposto, conclui-se que o Departamento de Recursos Humanos, precisa participar ativamente da busca e aplicação de ferramentas para a obtenção da produtividade. Portanto a Avaliação de Desempenho mostra-se atual e necessária, em busca de estratégias que aumente a produtividade por meio de talentos, satisfação e qualidade no serviço prestado dentro da organização bem como por seus clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto, Administração de Recursos humanos, São Paulo, 2ª Edição; Editora Atlas, 1981. GIL, Antonio Carlos. Administração de Recursos Humanos: um enfoque profissional. São Paulo: Atlas, 1994. SAMPAIO, Getúlio Pinto. Relações humanas: a toda hora. São Paulo: Nobel, 2000			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14191	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4856902 - KARINA DE SOUZA MORAES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimento a chave para o sucesso			
<b>INTRODUCAO</b>	Pode se observar que as empresas sempre estão em busca de sucesso, logo obter pessoas qualificadas é de extrema importância para o desenvolvimento da organização como um todo, com isso o treinamento e desenvolvimento passa a ser um processo crucial, a chave para desenvolver pessoas e torna-los profissionais qualificados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste artigo é demonstrar a importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, e como esse processo pode influenciar diretamente a empresa como o todo trazendo bons resultados no desenvolvimento de pessoas levando assim a empresa ao sucesso.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho consiste em um estudo da revisão da literatura sobre treinamento e Desenvolvimento, baseando se nos dados bibliográficos e pesquisas em artigos de revistas eletrônicas relacionadas à área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com a pesquisa, como resultado de treinamento pode-se observar que o desenvolvimento e as habilidades andam lado a lado e com isso a absorção a informação é o que se busca alcançar, para que assim estejam capacitando para desempenhar seus papéis de forma efetiva e eficaz. O treinamento aumenta a produtividade, ou seja, há um aumento na qualidade do trabalho, redução de erros e evita-se o desperdício de tempo fazendo um retrabalho. "Se ter êxito no processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é preciso estabelecer alguns passos que estão diretamente ligados a política de remuneração da empresa, e que passa por vários setores. Dando dinamismo e possibilitando assim a gestão do conhecimento do capital intelectual." CHIAVENATO (2010) Os resultados da implementação do treinamento incluem o desenvolvimento de competências nas pessoas, tornando – as mais produtivas, criativas e inovadoras, o que ajuda a organização a se tornar mais competitiva e lucrativa. Além disso o treinamento e desenvolvimento é uma maneira eficaz de agregar valor as pessoas. "O treinamento é o processo sistemático que envolve uma mudança de habilidades, conhecimento, atitudes ou comportamento dos empregados, estimulando-os a serem mais produtivos na direção do alcance dos objetivos organizacionais." CHIAVENATO (2010, p. 367) Treinamento e desenvolvimento se torna uma ferramenta com alto poder de retenção de talentos e aumento da produtividade. Um profissional que já passou por vários treinamentos torna-se peça-chave, com grande conhecimento em diversas técnicas e atividades que a empresa necessita.			
<b>CONCLUSOES</b>	Para o sucesso de um projeto de treinamento é importante contar com equipes capacitadas e abertas para algumas mudanças, agregando valores e gerando no funcionário e na empresa um compromisso mútuo com sucesso organizacional. Porém, só trarão vantagens para a empresa e funcionário, se forem bem planejados, que seus resultados sejam avaliados e mensurados. As empresas que não avaliam os resultados dos treinamentos perdem dinheiro por investir em cursos de aperfeiçoamento que não são bem aproveitados pela equipe ou são inadequados ao objetivo final da organização.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010. CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos- 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. CHIAVENATO, Idalberto. Treinamentos e desenvolvimento de recursos humanos: como incrementar talentos na empresa. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 1999.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14191	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4897501 - MÔNICA SANTO NASCIMENTO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimento a chave para o sucesso			
<b>INTRODUCAO</b>	Pode se observar que as empresas sempre estão em busca de sucesso, logo obter pessoas qualificadas é de extrema importância para o desenvolvimento da organização como um todo, com isso o treinamento e desenvolvimento passa a ser um processo crucial, a chave para desenvolver pessoas e torna-los profissionais qualificados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste artigo é demonstrar a importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, e como esse processo pode influenciar diretamente a empresa como o todo trazendo bons resultados no desenvolvimento de pessoas levando assim a empresa ao sucesso.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho consiste em um estudo da revisão da literatura sobre treinamento e Desenvolvimento, baseando se nos dados bibliográficos e pesquisas em artigos de revistas eletrônicas relacionadas à área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com a pesquisa, como resultado de treinamento pode-se observar que o desenvolvimento e as habilidades andam lado a lado e com isso a absorção a informação é o que se busca alcançar, para que assim estejam capacitando para desempenhar seus papéis de forma efetiva e eficaz. O treinamento aumenta a produtividade, ou seja, há um aumento na qualidade do trabalho, redução de erros e evita-se o desperdício de tempo fazendo um retrabalho. "Se ter êxito no processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é preciso estabelecer alguns passos que estão diretamente ligados a política de remuneração da empresa, e que passa por vários setores. Dando dinamismo e possibilitando assim a gestão do conhecimento do capital intelectual." CHIAVENATO (2010) Os resultados da implementação do treinamento incluem o desenvolvimento de competências nas pessoas, tornando – as mais produtivas, criativas e inovadoras, o que ajuda a organização a se tornar mais competitiva e lucrativa. Além disso o treinamento e desenvolvimento é uma maneira eficaz de agregar valor as pessoas. "O treinamento é o processo sistemático que envolve uma mudança de habilidades, conhecimento, atitudes ou comportamento dos empregados, estimulando-os a serem mais produtivos na direção do alcance dos objetivos organizacionais." CHIAVENATO (2010, p. 367) Treinamento e desenvolvimento se torna uma ferramenta com alto poder de retenção de talentos e aumento da produtividade. Um profissional que já passou por vários treinamentos torna-se peça-chave, com grande conhecimento em diversas técnicas e atividades que a empresa necessita.			
<b>CONCLUSOES</b>	Para o sucesso de um projeto de treinamento é importante contar com equipes capacitadas e abertas para algumas mudanças, agregando valores e gerando no funcionário e na empresa um compromisso mútuo com sucesso organizacional. Porém, só trarão vantagens para a empresa e funcionário, se forem bem planejados, que seus resultados sejam avaliados e mensurados. As empresas que não avaliam os resultados dos treinamentos perdem dinheiro por investir em cursos de aperfeiçoamento que não são bem aproveitados pela equipe ou são inadequados ao objetivo final da organização.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010. . CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos- 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. CHIAVENATO, Idalberto. Treinamentos e desenvolvimento de recursos humanos: como incrementar talentos na empresa. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 1999.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14191	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4916182 - GESIVALDO MARTINS DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento e Desenvolvimento a chave para o sucesso			
<b>INTRODUCAO</b>	Pode se observar que as empresas sempre estão em busca de sucesso, logo obter pessoas qualificadas é de extrema importância para o desenvolvimento da organização como um todo, com isso o treinamento e desenvolvimento passa a ser um processo crucial, a chave para desenvolver pessoas e torna-los profissionais qualificados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste artigo é demonstrar a importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, e como esse processo pode influenciar diretamente a empresa como o todo trazendo bons resultados no desenvolvimento de pessoas levando assim a empresa ao sucesso.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho consiste em um estudo da revisão da literatura sobre treinamento e Desenvolvimento, baseando se nos dados bibliográficos e pesquisas em artigos de revistas eletrônicas relacionadas à área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com a pesquisa, como resultado de treinamento pode-se observar que o desenvolvimento e as habilidades andam lado a lado e com isso a absorção a informação é o que se busca alcançar, para que assim estejam capacitando para desempenhar seus papéis de forma efetiva e eficaz. O treinamento aumenta a produtividade, ou seja, há um aumento na qualidade do trabalho, redução de erros e evita-se o desperdício de tempo fazendo um retrabalho. "Se ter êxito no processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é preciso estabelecer alguns passos que estão diretamente ligados a política de remuneração da empresa, e que passa por vários setores. Dando dinamismo e possibilitando assim a gestão do conhecimento do capital intelectual." CHIAVENATO (2010) Os resultados da implementação do treinamento incluem o desenvolvimento de competências nas pessoas, tornando – as mais produtivas, criativas e inovadoras, o que ajuda a organização a se tornar mais competitiva e lucrativa. Além disso o treinamento e desenvolvimento é uma maneira eficaz de agregar valor as pessoas. "O treinamento é o processo sistemático que envolve uma mudança de habilidades, conhecimento, atitudes ou comportamento dos empregados, estimulando-os a serem mais produtivos na direção do alcance dos objetivos organizacionais." CHIAVENATO (2010, p. 367) Treinamento e desenvolvimento se torna uma ferramenta com alto poder de retenção de talentos e aumento da produtividade. Um profissional que já passou por vários treinamentos torna-se peça-chave, com grande conhecimento em diversas técnicas e atividades que a empresa necessita.			
<b>CONCLUSOES</b>	Para o sucesso de um projeto de treinamento é importante contar com equipes capacitadas e abertas para algumas mudanças, agregando valores e gerando no funcionário e na empresa um compromisso mútuo com sucesso organizacional. Porém, só trarão vantagens para a empresa e funcionário, se forem bem planejados, que seus resultados sejam avaliados e mensurados. As empresas que não avaliam os resultados dos treinamentos perdem dinheiro por investir em cursos de aperfeiçoamento que não são bem aproveitados pela equipe ou são inadequados ao objetivo final da organização.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010. CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos- 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. CHIAVENATO, Idalberto. Treinamentos e desenvolvimento de recursos humanos: como incrementar talentos na empresa. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 1999.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14192	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4866550 - LETICIA MENEZES COLARES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Comunicação Interna Estratégica: Alinhamento e Eficiência Organizacional			
<b>INTRODUCAO</b>	A eficácia da comunicação interna é altamente essencial para o sucesso administrativo. No entanto, muitas empresas tem enfrentado desafios procedentes deste fator, como conflitos, excesso de informações e desalinhamento entre equipes. Ao ser analisado o clima organizacional, surge um problema crítico de desvio na comunicação interna, com potencial para impactar negativamente o desempenho da equipe.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é analisar soluções para suprir as deficiências nas ferramentas de comunicação interna. O propósito final é fomentar o alinhamento estratégico e profissional entre os diversos setores, gerando um impacto positivo na eficiência das equipes e, por consequência, na performance da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A base teórica deste estudo foi desenvolvida através de pesquisas em fontes bibliográficas, análise de artigos e e-books especializados na área de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	A comunicação estratégica aplicada nas organizações, resulta a manutenção de um ambiente organizacional saudável. A implementação de um sistema de comunicação interna, aliado ao uso adequado das ferramentas de comunicação, amplifica o valor dessa ferramenta e ressalta sua significância. Para Chiavenato (2004, p.133) "A troca de informações entre pessoas, significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal (ar, fios, papel) a um receptor da mensagem que a decodifica e interpreta seu significado". Ou seja, o processo de comunicação é essencial para estabelecer a compreensão e conexões entre as pessoas, sendo um elemento crucial na interação, colaboração e organização dentro da sociedade. Para Kunsch (2009, p.150) "A disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus diversos públicos" Para Brum (2017, p.208) "A administração eficaz da comunicação interna emerge como um pilar fundamental para o sucesso de qualquer organização". Não importando a terminologia empregada, é essencial encarar o conceito de comunicação interna de forma estratégica e dedicar esforços regulares para assegurar sua efetividade contínua.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em suma, os resultados destacam a necessidade de estratégias que promovam o alinhamento, a compreensão mútua e a colaboração entre as equipes. A implementação de um sistema de comunicação interna bem estruturado, aliado à aplicação adequada das ferramentas de comunicação, potencializa o valor dessa ferramenta e enfatiza seu impacto positivo na eficiência organizacional, fica evidente que a comunicação interna estratégica é essencial para promover uma interação harmoniosa, uma colaboração eficaz e um ambiente saudável no ambiente organizacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Campus, 2004. KUNSCH, Margarida M. Krohling (Org.) - Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e processos, volume 1 – São Paulo: Saraiva, 2009. BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing de A a Z. Primeira edição digital – São Paulo - Integrare Editora - 2017.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14192	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4900791 - ISABELA BAPTISTA PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Comunicação Interna Estratégica: Alinhamento e Eficiência Organizacional			
<b>INTRODUCAO</b>	A eficácia da comunicação interna é altamente essencial para o sucesso administrativo. No entanto, muitas empresas tem enfrentado desafios procedentes deste fator, como conflitos, excesso de informações e desalinhamento entre equipes. Ao ser analisado o clima organizacional, surge um problema crítico de desvio na comunicação interna, com potencial para impactar negativamente o desempenho da equipe.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é analisar soluções para suprir as deficiências nas ferramentas de comunicação interna. O propósito final é fomentar o alinhamento estratégico e profissional entre os diversos setores, gerando um impacto positivo na eficiência das equipes e, por consequência, na performance da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A base teórica deste estudo foi desenvolvida através de pesquisas em fontes bibliográficas, análise de artigos e e-books especializados na área de Recursos Humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	A comunicação estratégica aplicada nas organizações, resulta a manutenção de um ambiente organizacional saudável. A implementação de um sistema de comunicação interna, aliado ao uso adequado das ferramentas de comunicação, amplifica o valor dessa ferramenta e ressalta sua significância. Para Chiavenato (2004, p.133) "A troca de informações entre pessoas, significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal (ar, fios, papel) a um receptor da mensagem que a decodifica e interpreta seu significado". Ou seja, o processo de comunicação é essencial para estabelecer a compreensão e conexões entre as pessoas, sendo um elemento crucial na interação, colaboração e organização dentro da sociedade. Para Kunsch (2009, p.150) "A disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus diversos públicos" Para Brum (2017, p.208) "A administração eficaz da comunicação interna emerge como um pilar fundamental para o sucesso de qualquer organização". Não importando a terminologia empregada, é essencial encarar o conceito de comunicação interna de forma estratégica e dedicar esforços regulares para assegurar sua efetividade contínua.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em suma, os resultados destacam a necessidade de estratégias que promovam o alinhamento, a compreensão mútua e a colaboração entre as equipes. A implementação de um sistema de comunicação interna bem estruturado, aliado à aplicação adequada das ferramentas de comunicação, potencializa o valor dessa ferramenta e enfatiza seu impacto positivo na eficiência organizacional, fica evidente que a comunicação interna estratégica é essencial para promover uma interação harmoniosa, uma colaboração eficaz e um ambiente saudável no ambiente organizacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Campus, 2004. KUNSCH, Margarida M. Krohling (Org.) - Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e processos, volume 1 – São Paulo: Saraiva, 2009. BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing de A a Z. Primeira edição digital – São Paulo - Integrare Editora - 2017.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14193	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4912438 - MILENA ALESSANDRA SOUSA DE CARVALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b> CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS PARA O SUCESSO ATRAVÉS DO TREINAMENTO				
<b>INTRODUCAO</b> A motivação dos funcionários é um fator crítico para o sucesso das organizações. Este estudo destaca como o alinhamento de expectativas, o desenvolvimento de habilidades e o reconhecimento podem otimizar o desempenho e reduzir a desmotivação.				
<b>OBJETIVOS</b> O objetivo principal visa analisar fatores influenciadores no treinamento de colaboradores com foco no aumento da produtividade com o propósito de identificar os elementos de desmotivação e elencar possíveis estratégias para alcançar a excelência empresarial.				
<b>METODOLOGIA</b> Realizada pesquisa bibliográfica qualitativa e revisão de artigos e revistas eletrônicas na área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica deste estudo.				
<b>RESULTADO S</b> Esta pesquisa ressalta a relevância da motivação dos funcionários como um fator crucial no contexto de treinamento. O alinhamento das expectativas da empresa com as dos colaboradores e a implementação de planos de desenvolvimento de habilidades de longo prazo a curto prazo onde podem aprimorar a qualidade do trabalho e visando o alcance de sucesso da organização. "As necessidades de treinamento são as carências de preparo profissional das pessoas. A necessidade de treinamento é uma área de informação ou de habilidades que um indivíduo ou grupo precisa desenvolver para melhorar ou aumentar a sua eficiência, eficácia e produtividade no trabalho." (CHIAVENATO, 2006, p. 373). A desmotivação e a busca por novas oportunidades de emprego frequentemente ocorrem quando os colaboradores não se sentem valorizados, engajados ou quando seu potencial não é reconhecido pela empresa. Diante dessa realidade, torna-se evidente a importância de implementar processos que promovam o engajamento, o reconhecimento e o desenvolvimento dos colaboradores, com o objetivo de mantê-los motivados e produtivos, o que, por sua vez, é alcançado pelos projetos de treinamento. Esse esforço visa otimizar o potencial humano e garantir o sucesso a curto prazo das empresas. "Treinamento como um processo de assimilação cultural em curto prazo que recicla esses conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho" (MARRAS, 2007). Diante dessas constatações, destaca-se a importância de implementar processos de treinamento, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, com o objetivo de mantê-los e produtivos, e assim reduzindo assim as taxas de desmotivação.				
<b>CONCLUSOES</b> A importância do treinamento de colaboradores como um fator essencial para o sucesso organizacional, e que a motivação desempenha um papel fundamental no contexto do treinamento, influenciando diretamente a eficiência e a produtividade dos colaboradores. Ao alinhar as expectativas da empresa com as dos colaboradores e implementar estratégias de desenvolvimento de habilidades a longo prazo, podemos melhorar a qualidade do trabalho e buscar o sucesso a curto prazo da organização.				
<b>REFERENCIAS</b> FREIRE, D. A. L. Treinamento e desenvolvimento em recursos humanos: encenando e efetivando resultados. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2014. CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da administração: o essencial em teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2006 MARRAS, JP. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 12ª edição. São Paulo, editora Futura, 2007.				

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14193	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4928229 - DANIELLE SILVA NASCIMENTO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b> CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS PARA O SUCESSO ATRAVÉS DO TREINAMENTO				
<b>INTRODUCAO</b> A motivação dos funcionários é um fator crítico para o sucesso das organizações. Este estudo destaca como o alinhamento de expectativas, o desenvolvimento de habilidades e o reconhecimento podem otimizar o desempenho e reduzir a desmotivação.				
<b>OBJETIVOS</b> O objetivo principal visa analisar fatores influenciadores no treinamento de colaboradores com foco no aumento da produtividade com o propósito de identificar os elementos de desmotivação e elencar possíveis estratégias para alcançar a excelência empresarial.				
<b>METODOLOGIA</b> Realizada pesquisa bibliográfica qualitativa e revisão de artigos e revistas eletrônicas na área de recursos humanos para embasar a fundamentação teórica deste estudo.				
<b>RESULTADO S</b> Esta pesquisa ressaltar a relevância da motivação dos funcionários como um fator crucial no contexto de treinamento. O alinhamento das expectativas da empresa com as dos colaboradores e a implementação de planos de desenvolvimento de habilidades de longo prazo a curto prazo onde podem aprimorar a qualidade do trabalho e visando o alcance de sucesso da organização. "As necessidades de treinamento são as carências de preparo profissional das pessoas. A necessidade de treinamento é uma área de informação ou de habilidades que um indivíduo ou grupo precisa desenvolver para melhorar ou aumentar a sua eficiência, eficácia e produtividade no trabalho." (CHIAVENATO, 2006, p. 373). A desmotivação e a busca por novas oportunidades de emprego frequentemente ocorrem quando os colaboradores não se sentem valorizados, engajados ou quando seu potencial não é reconhecido pela empresa. Diante dessa realidade, torna-se evidente a importância de implementar processos que promovam o engajamento, o reconhecimento e o desenvolvimento dos colaboradores, com o objetivo de mantê-los motivados e produtivos, o que, por sua vez, é alcançado pelos projetos de treinamento. Esse esforço visa otimizar o potencial humano e garantir o sucesso a curto prazo das empresas. "Treinamento como um processo de assimilação cultural em curto prazo que recicla esses conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho" (MARRAS, 2007). Diante dessas constatações, destaca-se a importância de implementar processos de treinamento, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, com o objetivo de mantê-los e produtivos, e assim reduzindo assim as taxas de desmotivação.				
<b>CONCLUSOES</b> A importância do treinamento de colaboradores como um fator essencial para o sucesso organizacional, e que a motivação desempenha um papel fundamental no contexto do treinamento, influenciando diretamente a eficiência e a produtividade dos colaboradores. Ao alinhar as expectativas da empresa com as dos colaboradores e implementar estratégias de desenvolvimento de habilidades a longo prazo, podemos melhorar a qualidade do trabalho e buscar o sucesso a curto prazo da organização.				
<b>REFERENCIAS</b> FREIRE, D. A. L. Treinamento e desenvolvimento em recursos humanos: encenando e efetivando resultados. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2014. CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da administração: o essencial em teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2006 MARRAS, JP. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 12ª edição. São Paulo, editora Futura, 2007.				

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14194	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4419707 - BEATRIZ PALMA TONHATO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento para atingir objetivos e alcançar resultados			
<b>INTRODUCAO</b>	A área de treinamento e desenvolvimento é a área responsável por estruturar o crescimento do conhecimento interno. O departamento analisa, desse modo, quais as necessidades da empresa ao nível de educação corporativa e quais as melhorias que podem ser adotadas em gestão do conhecimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste artigo é demonstrar a importância do treinamento em organização, o foco é na importância de novas habilidades, conhecimentos e competências necessárias para desempenhar suas funções de maneira eficaz.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se embasar teoricamente o estudo por meio de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, incluindo a análise de artigos e revistas eletrônicas a área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	A área de treinamento contribui para gerar um clima organizacional mais positivo, a respeito do quanto as pessoas buscam por desenvolvimento e oportunidades de carreira. "O treinamento e desenvolvimento de pessoas constituem-se em um investimento fundamental para a organização e um processo contínuo de aprendizagem." (CHIAVENATO, 2021) Já o desenvolvimento também traz benefícios à rotina, na medida em que promove a agilidade e a inovação. "O treinamento é um tipo de educação especializada que, aplicada no âmbito organizacional, busca dar competências profissionais aos indivíduos." (CHIAVENATO, 2021) É necessário que os colaboradores sejam pessoas motivadas, proativas, flexíveis e capazes de lidar com desafios e mudanças, pois serão considerados exemplos e fontes de inspiração para os demais colaboradores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Após o tema abordado no projeto, conclui-se que o desenvolvimento contínuo dos colaboradores é fundamental para o sucesso da empresa. Isso não apenas melhora o desenvolvimento individual, mas também fortalece a capacidade da organização de atingir seus objetivos estratégicos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – Atlas; 9ª edição, 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal – Atlas; 9ª edição, 2021.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14194	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4863313 - CAROLINE PORTO DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Treinamento para atingir objetivos e alcançar resultados			
<b>INTRODUCAO</b>	A área de treinamento e desenvolvimento é a área responsável por estruturar o crescimento do conhecimento interno. O departamento analisa, desse modo, quais as necessidades da empresa ao nível de educação corporativa e quais as melhorias que podem ser adotadas em gestão do conhecimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste artigo é demonstrar a importância do treinamento em organização, o foco é na importância de novas habilidades, conhecimentos e competências necessárias para desempenhar suas funções de maneira eficaz.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procurou-se embasar teoricamente o estudo por meio de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, incluindo a análise de artigos e revistas eletrônicas a área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	A área de treinamento contribui para gerar um clima organizacional mais positivo, a respeito do quanto as pessoas buscam por desenvolvimento e oportunidades de carreira. "O treinamento e desenvolvimento de pessoas constituem-se em um investimento fundamental para a organização e um processo contínuo de aprendizagem." (CHIAVENATO, 2021) Já o desenvolvimento também traz benefícios à rotina, na medida em que promove a agilidade e a inovação. "O treinamento é um tipo de educação especializada que, aplicada no âmbito organizacional, busca dar competências profissionais aos indivíduos." (CHIAVENATO, 2021) É necessário que os colaboradores sejam pessoas motivadas, proativas, flexíveis e capazes de lidar com desafios e mudanças, pois serão considerados exemplos e fontes de inspiração para os demais colaboradores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Após o tema abordado no projeto, conclui-se que o desenvolvimento contínuo dos colaboradores é fundamental para o sucesso da empresa. Isso não apenas melhora o desenvolvimento individual, mas também fortalece a capacidade da organização de atingir seus objetivos estratégicos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – Atlas; 9ª edição, 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal – Atlas; 9ª edição, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14196	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		843610 - THAIS REIMBERG DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNCIONALIDADE E SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Embora estudos indiquem que a funcionalidade é um preditor de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa ideia e, portanto, estudos ainda são necessários.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre a funcionalidade (avaliada pelo teste de sentar e levantar [i.e., time-stands test]) com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e teste de funcionalidade, como teste de sentar e levantar (i.e., time-stands test). Os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores obtidos no teste de levantar e sentar (grupo baixa funcionalidade e elevada funcionalidade) e todas as variáveis dependentes foram comparadas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo baixa funcionalidade apresentou valores elevados no Inventário de Ansiedade de Beck. (9,9 vs. 5,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,42 a -2,22; P = 0,0030) e Inventário Depressivo de Beck em comparação com o grupo elevada funcionalidade (11,2 vs. 7,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,12 a -1,26; P (#60) 0,0001). Modelos de regressão ajustados revelaram uma associação inversa entre os resultados dos testes de levantar e sentar foram associados à ansiedade ((#38)#946; = -0,33; IC95% -0,54 a -0,13; P = 0,002) e depressão ((#38)#946; = -0,32; IC95% -0,56 a -0,09; P = 0,008).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados do presente estudo revelam que a funcionalidade é um preditor significativo de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91. Ishii S, Chang C, Tanaka T, Kuroda A, Tsuji T, Akishita M, et al. The Association between Sarcopenic Obesity and Depressive Symptoms in Older Japanese Adults. PLoS One. 2016;11(9):e0162898.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14196	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4229177 - GABRIELLA MAYUMI TANAKA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNCIONALIDADE E SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Embora estudos indiquem que a funcionalidade é um preditor de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa ideia e, portanto, estudos ainda são necessários.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre a funcionalidade (avaliada pelo teste de sentar e levantar [i.e., time-stands test]) com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e teste de funcionalidade, como teste de sentar e levantar (i.e., time-stands test). Os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores obtidos no teste de levantar e sentar (grupo baixa funcionalidade e elevada funcionalidade) e todas as variáveis dependentes foram comparadas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo baixa funcionalidade apresentou valores elevados no Inventário de Ansiedade de Beck. (9,9 vs. 5,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,42 a -2,22; P = 0,0030) e Inventário Depressivo de Beck em comparação com o grupo elevada funcionalidade (11,2 vs. 7,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,12 a -1,26; P (#60) 0,0001). Modelos de regressão ajustados revelaram uma associação inversa entre os resultados dos testes de levantar e sentar foram associados à ansiedade ((#38)#946; = -0,33; IC95% -0,54 a -0,13; P = 0,002) e depressão ((#38)#946; = -0,32; IC95% -0,56 a -0,09; P = 0,008).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados do presente estudo revelam que a funcionalidade é um preditor significativo de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91. Ishii S, Chang C, Tanaka T, Kuroda A, Tsuji T, Akishita M, et al. The Association between Sarcopenic Obesity and Depressive Symptoms in Older Japanese Adults. PLoS One. 2016;11(9):e0162898.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14196	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4366158 - CRISTIANE MARIA GONCALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNCIONALIDADE E SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Embora estudos indiquem que a funcionalidade é um preditor de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa ideia e, portanto, estudos ainda são necessários.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre a funcionalidade (avaliada pelo teste de sentar e levantar [i.e., time-stands test]) com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e teste de funcionalidade, como teste de sentar e levantar (i.e., time-stands test). Os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores obtidos no teste de levantar e sentar (grupo baixa funcionalidade e elevada funcionalidade) e todas as variáveis dependentes foram comparadas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo baixa funcionalidade apresentou valores elevados no Inventário de Ansiedade de Beck. (9,9 vs. 5,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,42 a -2,22; P = 0,0030) e Inventário Depressivo de Beck em comparação com o grupo elevada funcionalidade (11,2 vs. 7,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,12 a -1,26; P (#60) 0,0001). Modelos de regressão ajustados revelaram uma associação inversa entre os resultados dos testes de levantar e sentar foram associados à ansiedade ((#38)#946; = -0,33; IC95% -0,54 a -0,13; P = 0,002) e depressão ((#38)#946; = -0,32; IC95% -0,56 a -0,09; P = 0,008).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados do presente estudo revelam que a funcionalidade é um preditor significativo de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91. Ishii S, Chang C, Tanaka T, Kuroda A, Tsuji T, Akishita M, et al. The Association between Sarcopenic Obesity and Depressive Symptoms in Older Japanese Adults. PLoS One. 2016;11(9):e0162898.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14196	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382161 - GUILHERME ARAUJO RASQUINHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNCIONALIDADE E SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Embora estudos indiquem que a funcionalidade é um preditor de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa ideia e, portanto, estudos ainda são necessários.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre a funcionalidade (avaliada pelo teste de sentar e levantar [i.e., time-stands test]) com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e teste de funcionalidade, como teste de sentar e levantar (i.e., time-stands test). Os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores obtidos no teste de levantar e sentar (grupo baixa funcionalidade e elevada funcionalidade) e todas as variáveis dependentes foram comparadas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo baixa funcionalidade apresentou valores elevados no Inventário de Ansiedade de Beck. (9,9 vs. 5,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,42 a -2,22; P = 0,0030) e Inventário Depressivo de Beck em comparação com o grupo elevada funcionalidade (11,2 vs. 7,5 unidades arbitrárias; IC95%: -6,12 a -1,26; P (#60) 0,0001). Modelos de regressão ajustados revelaram uma associação inversa entre os resultados dos testes de levantar e sentar foram associados à ansiedade ((#38)#946; = -0,33; IC95% -0,54 a -0,13; P = 0,002) e depressão ((#38)#946; = -0,32; IC95% -0,56 a -0,09; P = 0,008).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados do presente estudo revelam que a funcionalidade é um preditor significativo de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91. Ishii S, Chang C, Tanaka T, Kuroda A, Tsuji T, Akishita M, et al. The Association between Sarcopenic Obesity and Depressive Symptoms in Older Japanese Adults. PLoS One. 2016;11(9):e0162898.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14197	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		843610 - THAIS REIMBERG DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E SIMTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Enquanto alguns estudos mostram que a força muscular pode ser uma medida preditiva de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa assunção. Sendo assim, estudos ainda são necessários para elucidar essa questão.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre força de preensão manual com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e força de preensão manual. Em seguida, os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores de força de preensão manual (grupo baixa força e grupos elevada força) e todas as variáveis dependentes foram comparadas			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo de baixa força apresentou valores mais elevados no Inventário de Ansiedade de Beck (9,5 vs. 5,9 unidades arbitrárias; P = 0,0008) e no Inventário de Depressão de Beck do que o grupo de alta força (10,8 vs. 7,9 unidades arbitrárias; P = 0,0214). Adicionalmente, o modelo de regressão ajustado mostrou associação inversa entre força de preensão manual com os escores de ansiedade e depressão (escores de ansiedade: (#38)#946; = -0,22; IC95% -0,38 a -0,07; P = 0,005; escores de depressão: (#38)#946; = -0,25; IC95% -0,42 a -0,07; P = 0,006).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os principais achados deste estudo revelam que a força de preensão manual é um preditor independente de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Typo	Modalidade
2023	14197	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4229177 - GABRIELLA MAYUMI TANAKA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E SIMTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUCAO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Enquanto alguns estudos mostram que a força muscular pode ser uma medida preditiva de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa assunção. Sendo assim, estudos ainda são necessários para elucidar essa questão.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre força de preensão manual com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e força de preensão manual. Em seguida, os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores de força de preensão manual (grupo baixa força e grupos elevada força) e todas as variáveis dependentes foram comparadas			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo de baixa força apresentou valores mais elevados no Inventário de Ansiedade de Beck (9,5 vs. 5,9 unidades arbitrárias; P = 0,0008) e no Inventário de Depressão de Beck do que o grupo de alta força (10,8 vs. 7,9 unidades arbitrárias; P = 0,0214). Adicionalmente, o modelo de regressão ajustado mostrou associação inversa entre força de preensão manual com os escores de ansiedade e depressão (escores de ansiedade: (#38)#946; = -0,22; IC95% -0,38 a -0,07; P = 0,005; escores de depressão: (#38)#946; = -0,25; IC95% -0,42 a -0,07; P = 0,006).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os principais achados deste estudo revelam que a força de preensão manual é um preditor independente de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14197	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4366158 - CRISTIANE MARIA GONCALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E SIMTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Enquanto alguns estudos mostram que a força muscular pode ser uma medida preditiva de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa assunção. Sendo assim, estudos ainda são necessários para elucidar essa questão.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre força de preensão manual com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e força de preensão manual. Em seguida, os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores de força de preensão manual (grupo baixa força e grupos elevada força) e todas as variáveis dependentes foram comparadas			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo de baixa força apresentou valores mais elevados no Inventário de Ansiedade de Beck (9,5 vs. 5,9 unidades arbitrárias; P = 0,0008) e no Inventário de Depressão de Beck do que o grupo de alta força (10,8 vs. 7,9 unidades arbitrárias; P = 0,0214). Adicionalmente, o modelo de regressão ajustado mostrou associação inversa entre força de preensão manual com os escores de ansiedade e depressão (escores de ansiedade: (#38)#946; = -0,22; IC95% -0,38 a -0,07; P = 0,005; escores de depressão: (#38)#946; = -0,25; IC95% -0,42 a -0,07; P = 0,006).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os principais achados deste estudo revelam que a força de preensão manual é um preditor independente de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14197	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382161 - GUILHERME ARAUJO RASQUINHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil		
<b>TITULO</b>	ASSOCIAÇÃO ENTRE FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E SIMTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade estão entre os principais problemas de saúde mundial. Nesse cenário, identificar potenciais preditores de sinais e sintomas precoces de depressão e ansiedade é de fundamental importância para evitar o agravamento desses quadros. Enquanto alguns estudos mostram que a força muscular pode ser uma medida preditiva de transtornos mentais, outros estudos não suportam essa assunção. Sendo assim, estudos ainda são necessários para elucidar essa questão.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo investigou as associações entre força de preensão manual com sintomas de depressão e ansiedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde participantes foram recrutados por meio das redes sociais. Os participantes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada para registro de características sociodemográficas, comorbidades, uso de tabaco e medicamentos, sintomas de ansiedade e depressão e qualidade de vida. Em seguida, foram avaliadas características antropométricas (isto é, peso e altura) e força de preensão manual. Em seguida, os indivíduos foram estratificados pela mediana dos escores de força de preensão manual (grupo baixa força e grupos elevada força) e todas as variáveis dependentes foram comparadas			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados duzentos e dezesseis indivíduos. O grupo de baixa força apresentou valores mais elevados no Inventário de Ansiedade de Beck (9,5 vs. 5,9 unidades arbitrárias; P = 0,0008) e no Inventário de Depressão de Beck do que o grupo de alta força (10,8 vs. 7,9 unidades arbitrárias; P = 0,0214). Adicionalmente, o modelo de regressão ajustado mostrou associação inversa entre força de preensão manual com os escores de ansiedade e depressão (escores de ansiedade: (#38)#946; = -0,22; IC95% -0,38 a -0,07; P = 0,005; escores de depressão: (#38)#946; = -0,25; IC95% -0,42 a -0,07; P = 0,006).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os principais achados deste estudo revelam que a força de preensão manual é um preditor independente de sintomas de ansiedade e depressão.			
<b>REFERENCIAS</b>	Collaborators GBDMD. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The lancet Psychiatry. 2022;9(2):137-50. Diseases GBD, Injuries C. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. Collaborators C-MD. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021;398(10312):1700-12. Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clinical interventions in aging. 2019;14:1681-91.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14198	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1473930 - PAULA RAMOS VIANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	IMPACTOS DA COVID-19 NA IMAGEM CORPORAL, POSSÍVEIS EFEITOS DA HIPERCONNECTIVIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	No ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma declaração oficial classificando o Sars-Cov-2, mais conhecido como Covid-19, como uma pandemia global. O isolamento social emergiu como uma ferramenta crucial para frear a disseminação voraz do vírus. Este isolamento trouxe consigo uma reconfiguração de nossos padrões tradicionais de trabalho e interação social, gerando um ambiente onde a interconexão digital tornou-se indispensável. Segundo Moreno (2020), a hiperconectividade, pode desencadear danos físicos e problemas psicossociais. Nesse cenário emerge uma nova preocupação: a notória distorção na percepção da autoimagem relacionada ao aumento do número de procedimentos cirúrgicos estéticos, fenômeno este conhecido como 'efeito zoom'.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa objetivou avaliar como a conexão tecnológica acentuada durante a pandemia afetou a percepção da autoimagem.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa baseou-se numa Metodologia de Revisão de Literatura Integrativa, contemplando os artigos publicados na íntegra e na língua portuguesa no período de 2020 a 2023, nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. As palavras-chave utilizadas foram: transtorno dismórfico corporal, efeito zoom, cirurgias plásticas e covid 19. Com base nos critérios selecionados, 6 artigos foram utilizados na construção dos resultados.			
<b>RESULTADOS</b>	Na análise e interpretação dos artigos selecionados, observou-se um crescimento no interesse por cirurgias plásticas e protocolos estéticos, que podem estar associados à hiperconectividade durante a pandemia. Barros (2005) afirma que vivemos em um mundo cheio de representações corporais que influenciam nossas vidas. Essas representações são moldadas através de experiências, desafios e atitudes em busca do corpo ideal. De acordo com os artigos selecionados, essa demasiada observação da própria imagem, pode ter interferido na concepção que o indivíduo tem de si, agravando o número de casos de TDC e causando o aumento na procura por procedimentos cirúrgicos estéticos. Tendo como base a Abordagem Centrada na Pessoa, entende-se que o indivíduo é inerentemente orientado para uma progressiva evolução, possuindo uma diretriz interna para o desenvolvimento de suas capacidades. Rogers (2009) postulou a personalidade como elemento central para o entendimento do campo perceptual e do comportamento dos clientes submetidos a sua proposta, de modo que o (des)ajustamento psicológico tem uma relação com a organização do self e a terapia centrada no cliente visa a compreensão da dinâmica da personalidade de quem é atendido.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados embasados nas pesquisas apontam que a hiperconectividade, intensificada durante a pandemia, impactou a percepção da autoimagem, desencadeando uma busca por procedimentos estéticos como uma forma de aumentar a autoestima, trazendo agravos a pacientes com TDC que buscam o procedimento por insatisfação com a autoimagem.			
<b>REFERENCIAS</b>	BARROS, D.. Imagem corporal: a descoberta de si mesmo. Rev. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, n. 2: p. 547-54, maio-ago, 2005. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/hicsm/a/xF33tqFH3s4MnxJDR35MwCCL/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/hicsm/a/xF33tqFH3s4MnxJDR35MwCCL/?format=pdf(#38)lang=pt</a> . MORENO, A. et al. Tecnoestrés laboral derivado de la virtualidad obligatoria por prevención del Covid-19 en docentes Universitarios de Medellín. Rev. Trabajo (En)Cena, Palmas/TO, 2020. Disponível em: <a href="https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena/article/view/9673/18157">https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena/article/view/9673/18157</a> . ROGERS, C.R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14198	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4080271 - VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	IMPACTOS DA COVID-19 NA IMAGEM CORPORAL, POSSÍVEIS EFEITOS DA HIPERCONNECTIVIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	No ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma declaração oficial classificando o Sars-Cov-2, mais conhecido como Covid-19, como uma pandemia global. O isolamento social emergiu como uma ferramenta crucial para frear a disseminação voraz do vírus. Este isolamento trouxe consigo uma reconfiguração de nossos padrões tradicionais de trabalho e interação social, gerando um ambiente onde a interconexão digital tornou-se indispensável. Segundo Moreno (2020), a hiperconnectividade, pode desencadear danos físicos e problemas psicossociais. Nesse cenário emerge uma nova preocupação: a notória distorção na percepção da autoimagem relacionada ao aumento do número de procedimentos cirúrgicos estéticos, fenômeno este conhecido como 'efeito zoom'.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa objetivou avaliar como a conexão tecnológica acentuada durante a pandemia afetou a percepção da autoimagem.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa baseou-se numa Metodologia de Revisão de Literatura Integrativa, contemplando os artigos publicados na íntegra e na língua portuguesa no período de 2020 a 2023, nas bases de dados LILACS, MEDLINE e Scielo. As palavras-chave utilizadas foram: transtorno dismórfico corporal, efeito zoom, cirurgias plásticas e covid 19. Com base nos critérios selecionados, 6 artigos foram utilizados na construção dos resultados.			
<b>RESULTADOS</b>	Na análise e interpretação dos artigos selecionados, observou-se um crescimento no interesse por cirurgias plásticas e protocolos estéticos, que podem estar associados à hiperconnectividade durante a pandemia. Barros (2005) afirma que vivemos em um mundo cheio de representações corporais que influenciam nossas vidas. Essas representações são moldadas através de experiências, desafios e atitudes em busca do corpo ideal. De acordo com os artigos selecionados, essa demasiada observação da própria imagem, pode ter interferido na concepção que o indivíduo tem de si, agravando o número de casos de TDC e causando o aumento na procura por procedimentos cirúrgicos estéticos. Tendo como base a Abordagem Centrada na Pessoa, entende-se que o indivíduo é inerentemente orientado para uma progressiva evolução, possuindo uma diretriz interna para o desenvolvimento de suas capacidades. Rogers (2009) postulou a personalidade como elemento central para o entendimento do campo perceptual e do comportamento dos clientes submetidos a sua proposta, de modo que o (des)ajustamento psicológico tem uma relação com a organização do self e a terapia centrada no cliente visa a compreensão da dinâmica da personalidade de quem é atendido.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados embasados nas pesquisas apontam que a hiperconnectividade, intensificada durante a pandemia, impactou a percepção da autoimagem, desencadeando uma busca por procedimentos estéticos como uma forma de aumentar a autoestima, trazendo agravos a pacientes com TDC que buscam o procedimento por insatisfação com a autoimagem.			
<b>REFERENCIAS</b>	BARROS, D.. Imagem corporal: a descoberta de si mesmo. Rev. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, n. 2: p. 547-54, maio-ago, 2005. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/hcsm/a/xF33tqFH3s4MnxJDR35MwCLU?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/hcsm/a/xF33tqFH3s4MnxJDR35MwCLU?format=pdf(#38)lang=pt</a> . MORENO, A. et al. Tecnoestrés laboral derivado de la virtualidad obligatoria por prevención del Covid-19 en docentes Universitarios de Medellín. Rev. Trabajo (En)Cena, Palmas/TO, 2020. Disponível em: <a href="https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena/article/view/9673/18157">https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena/article/view/9673/18157</a> . ROGERS, C.R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14198	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4093585 - JAQUELINE GOUVEA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	IMPACTOS DA COVID-19 NA IMAGEM CORPORAL, POSSÍVEIS EFEITOS DA HIPERCONNECTIVIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	No ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma declaração oficial classificando o Sars-Cov-2, mais conhecido como Covid-19, como uma pandemia global. O isolamento social emergiu como uma ferramenta crucial para frear a disseminação voraz do vírus. Este isolamento trouxe consigo uma reconfiguração de nossos padrões tradicionais de trabalho e interação social, gerando um ambiente onde a interconexão digital tornou-se indispensável. Segundo Moreno (2020), a hiperconectividade, pode desencadear danos físicos e problemas psicossociais. Nesse cenário emerge uma nova preocupação: a notória distorção na percepção da autoimagem relacionada ao aumento do número de procedimentos cirúrgicos estéticos, fenômeno este conhecido como 'efeito zoom'.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa objetivou avaliar como a conexão tecnológica acentuada durante a pandemia afetou a percepção da autoimagem.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa baseou-se numa Metodologia de Revisão de Literatura Integrativa, contemplando os artigos publicados na íntegra e na língua portuguesa no período de 2020 a 2023, nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. As palavras-chave utilizadas foram: transtorno dismórfico corporal, efeito zoom, cirurgias plásticas e covid 19. Com base nos critérios selecionados, 6 artigos foram utilizados na construção dos resultados.			
<b>RESULTADOS</b>	Na análise e interpretação dos artigos selecionados, observou-se um crescimento no interesse por cirurgias plásticas e protocolos estéticos, que podem estar associados à hiperconectividade durante a pandemia. Barros (2005) afirma que vivemos em um mundo cheio de representações corporais que influenciam nossas vidas. Essas representações são moldadas através de experiências, desafios e atitudes em busca do corpo ideal. De acordo com os artigos selecionados, essa demasiada observação da própria imagem, pode ter interferido na concepção que o indivíduo tem de si, agravando o número de casos de TDC e causando o aumento na procura por procedimentos cirúrgicos estéticos. Tendo como base a Abordagem Centrada na Pessoa, entende-se que o indivíduo é inerentemente orientado para uma progressiva evolução, possuindo uma diretriz interna para o desenvolvimento de suas capacidades. Rogers (2009) postulou a personalidade como elemento central para o entendimento do campo perceptual e do comportamento dos clientes submetidos a sua proposta, de modo que o (des)ajustamento psicológico tem uma relação com a organização do self e a terapia centrada no cliente visa a compreensão da dinâmica da personalidade de quem é atendido.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados embasados nas pesquisas apontam que a hiperconectividade, intensificada durante a pandemia, impactou a percepção da autoimagem, desencadeando uma busca por procedimentos estéticos como uma forma de aumentar a autoestima, trazendo agravos a pacientes com TDC que buscam o procedimento por insatisfação com a autoimagem.			
<b>REFERENCIAS</b>	BARROS, D.. Imagem corporal: a descoberta de si mesmo. Rev. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, n. 2: p. 547-54, maio-ago, 2005. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/hicsm/a/xF33tqFH3s4MnxJDR35MwCCL/?format=pdf(#38)lang=pt">https://www.scielo.br/hicsm/a/xF33tqFH3s4MnxJDR35MwCCL/?format=pdf(#38)lang=pt</a> . MORENO, A. et al. Tecnoestrés laboral derivado de la virtualidad obligatoria por prevención del Covid-19 en docentes Universitarios de Medellín. Rev. Trabajo (En)Cena, Palmas/TO, 2020. Disponível em: <a href="https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena/article/view/9673/18157">https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena/article/view/9673/18157</a> . ROGERS, C.R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14201	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4020979 - CRISTIANE SALGADO BETZIOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	O luto pelo animal de estimação: um sofrimento real que precisa ser reconhecido			
<b>INTRODUCA O</b>	Este estudo aborda a relação entre seres humanos e animais de estimação, destacando o impacto psicológico do luto após a perda desses companheiros. A presença de animais de estimação é reconhecida por proporcionar benefícios emocionais. Lapa e Nogueira (2022) evidenciam que as relações entre humanos e animais de estimação assumiram nova dimensão, com esses animais desempenhando papel integral na dinâmica familiar. No entanto, o luto pela perda desses companheiros é frequentemente subestimado, não sendo reconhecido pela sociedade como forma válida de sofrimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o papel dos animais de estimação na vida das pessoas e investigar as consequências psicológicas do luto não reconhecido após a perda desses animais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um estudo de revisão bibliográfica, por meio de rastreamento de artigos científicos no Google Acadêmico, disponível em português e na íntegra, publicados a partir de 2013. As palavras-chave utilizadas foram: "luto", "animal de estimação", "morte do animal de estimação" e "validação do luto". Foram selecionados 8 artigos para a realização desta pesquisa. Os artigos selecionados foram analisados qualitativamente, com base no referencial teórico estudado.			
<b>RESULTADO S</b>	O estudo examinou a interação entre humanos e animais de estimação, explorando os impactos psicológicos, analisando os processos e fatores do luto por animais de estimação, e investigando as consequências psicológicas de um luto não reconhecido. Nos artigos selecionados, destacaram-se aspectos relacionados a importância da qualidade dessa interação, proporcionando bem-estar físico, mental e emocional, a perda de animais de estimação provoca sofrimentos parecidos com a perda de seres humanos, a falta de reconhecimento do luto gera maior impacto sobre o sujeito, dificultando a expressão das suas emoções. Lapa e Nogueira (2022) ressaltam que a falta de reconhecimento social do luto e a ausência de empatia por parte da sociedade, geram comportamentos e sentimentos de isolamento, tristeza, culpa, sofrimento e dificuldade para se expressar. Os resultados ressaltam a complexidade e a relevância do tema indicando a necessidade de intervenções para reduzir os impactos psicológicos negativos associados a essa experiência.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O estudo enfatiza a importância do reconhecimento social do luto pela perda de animais de estimação e suas consequências psicológicas negativas, tornando-se importante o apoio e compreensão a quem enfrenta essa perda. Reconhecer o luto pelos animais de estimação como uma experiência válida é fundamental para promover o bem-estar emocional das pessoas que enfrentam essa situação.			
<b>REFERENCIA S</b>	- LAPA, R. A.; NOGUEIRA, C. M. Luto pela Perda de animais de estimação e o desafio do não reconhecimento social: um estudo qualitativo. Revista de Psicologia Clínica, São Paulo, 29, n. 1, p. 28-43, 2022. - OLIVEIRA, L. G. Luto pelo animal de estimação: a Sociedade contemporânea e suas Implicações. Psicologia (#38) Sociedade, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 625-635, 2013. - VIEIRA, M. N. Quando morre o animal de estimação: um estudo sobre o luto. Psicologia em Revista, São Paulo, 25, n. 1, p. 239-257, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14201	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4062256 - ANGELA FATIMA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	O luto pelo animal de estimação: um sofrimento real que precisa ser reconhecido			
<b>INTRODUCAO</b>	Este estudo aborda a relação entre seres humanos e animais de estimação, destacando o impacto psicológico do luto após a perda desses companheiros. A presença de animais de estimação é reconhecida por proporcionar benefícios emocionais. Lapa e Nogueira (2022) evidenciam que as relações entre humanos e animais de estimação assumiram nova dimensão, com esses animais desempenhando papel integral na dinâmica familiar. No entanto, o luto pela perda desses companheiros é frequentemente subestimado, não sendo reconhecido pela sociedade como forma válida de sofrimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o papel dos animais de estimação na vida das pessoas e investigar as consequências psicológicas do luto não reconhecido após a perda desses animais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um estudo de revisão bibliográfica, por meio de rastreamento de artigos científicos no Google Acadêmico, disponível em português e na íntegra, publicados a partir de 2013. As palavras-chave utilizadas foram: "luto", "animal de estimação", "morte do animal de estimação" e "validação do luto". Foram selecionados 8 artigos para a realização desta pesquisa. Os artigos selecionados foram analisados qualitativamente, com base no referencial teórico estudado.			
<b>RESULTADOS</b>	O estudo examinou a interação entre humanos e animais de estimação, explorando os impactos psicológicos, analisando os processos e fatores do luto por animais de estimação, e investigando as consequências psicológicas de um luto não reconhecido. Nos artigos selecionados, destacaram-se aspectos relacionados a importância da qualidade dessa interação, proporcionando bem-estar físico, mental e emocional, a perda de animais de estimação provoca sofrimentos parecidos com a perda de seres humanos, a falta de reconhecimento do luto gera maior impacto sobre o sujeito, dificultando a expressão das suas emoções. Lapa e Nogueira (2022) ressaltam que a falta de reconhecimento social do luto e a ausência de empatia por parte da sociedade, geram comportamentos e sentimentos de isolamento, tristeza, culpa, sofrimento e dificuldade para se expressar. Os resultados ressaltam a complexidade e a relevância do tema indicando a necessidade de intervenções para reduzir os impactos psicológicos negativos associados a essa experiência.			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo enfatiza a importância do reconhecimento social do luto pela perda de animais de estimação e suas consequências psicológicas negativas, tornando-se importante o apoio e compreensão a quem enfrenta essa perda. Reconhecer o luto pelos animais de estimação como uma experiência válida é fundamental para promover o bem-estar emocional das pessoas que enfrentam essa situação.			
<b>REFERENCIAS</b>	- LAPA, R. A.; NOGUEIRA, C. M. Luto pela Perda de animais de estimação e o desafio do não reconhecimento social: um estudo qualitativo. Revista de Psicologia Clínica, São Paulo, 29, n. 1, p. 28-43, 2022. - OLIVEIRA, L. G. Luto pelo animal de estimação: a Sociedade contemporânea e suas Implicações. Psicologia (#38) Sociedade, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 625-635, 2013. - VIEIRA, M. N. Quando morre o animal de estimação: um estudo sobre o luto. Psicologia em Revista, São Paulo, 25, n. 1, p. 239-257, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14202	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4092708 - SIDNEI JOSE DE PAULA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	ESTUDO SOBRE AS ALTAS HABILIDADES E SUAS INTERSEÇÕES COM OUTRAS EXCEPCIONALIDADES E A PERSPECTIVA FAMILIAR			
<b>INTRODUCAO</b>	A escolha do tema altas habilidades e dupla excepcionalidade é emergente de uma área de estudo da educação e da psicologia, em sua abordagem na complexidade de habilidades intelectuais e uma característica de crianças que não se encaixam nas categorias tradicionais de talentos e deficiência. Afamília, nesse contexto, é fundamental no desenvolvimento e apoio para essas crianças, sob a perspectiva de Winnicott(2005)			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender as necessidades educacionais e sociais das crianças que apresentam características de altas habilidades intelectuais combinadas com algumas formas de deficiências e desafios. Compreender ainda como a família lida com esses aspectos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se a revisão bibliográfica narrativa de artigos nas bases eletrônicas: SciELO, Capes, Ass. Paulista Para Altas Habilidades, Projeto de Ext. Enriquecimento da Aprendizagem para Desenvolvimento de Habilidades da PUC (MG), Instituto Alpha Lumen. Foram sintetizados conhecimentos existentes sobre as dificuldades, pesquisas, redes de apoios e busca por aprendizagens existentes sobre altas habilidades e dupla excepcionalidade para uma visão abrangente sobre o tema.			
<b>RESULTADOS</b>	As altas habilidades referem-se a crianças que demonstrem habilidades excepcionais em áreas como intelecto, criatividade, liderança ou artes, podem aprender rápido, reter informações com facilidade e abordar problemas complexos de forma criativa. A dupla excepcionalidade tem como referência crianças excepcionais tanto em habilidades intelectuais quanto em necessidades especiais como autismo, TDAH ou dislexia, o que podem trazer desafios diferenciados, sendo que suas habilidades são mascaradas por meio de suas dificuldades. Discute-se essas questões por meio de um estudo de caso da literatura. Identificou-se que a família desempenha papel essencial no desenvolvimento e apoio a estas crianças, e que procurem informações e busquem recursos e suportes adequados, e tratem essas crianças de forma realistas e equilibradas, em conjunto com a educação disponibilizando ambientes que atendam às necessidades individuais de forma personalizadas de acordo com as habilidades de cada uma. Com isso elas podem prosperar a partir de suas habilidades excepcionais e ao mesmo tempo lidar com os desafios que podem surgir devido as necessidades especiais, através da promoção de ambientes inclusivos e sensíveis que possam garantir o bem-estar e ao desenvolvimento destas crianças.			
<b>CONCLUSOES</b>	Essas crianças tem talentos extraordinários em uma ou mais áreas, porem também enfrentam desafios significativos em outras áreas do desenvolvimento como: transtornos de aprendizagem, TDAH, ou outras, afetando o desempenho acadêmico ou social. A identificação de dupla excepcionalidade em crianças pode ser complicada, pois as altas habilidades mascaram suas conclusões, sendo de grande importância a ciência dos profissionais de saúde e educadores. Leva-se em consideração, o suporte educacional personalizado, o papel dos responsáveis, centrar seu potencial, e não apenas em sua limitação, não generalizar,			
<b>REFERENCIAS</b>	Hakim, C (2016) Superdotação e Dupla Excepcionalidade - Contribuições da Neurociência, Psicologia, Pedagogia e Direito Aplicado ao Tema editora Juruá. Winnicott, D. W. (2005) A Família e o Desenvolvimento Individual (3ª Edição) de Martins fontes. Winnicott, D. W. (1999). O conceito de indivíduo saudável. Tudo começa em casa, Disponível em: <a href="https://felipevillapsicologia.files.wordpress.com/2015/01/o-conceito-de-indivc3adduo-saudc3a1vel-d-w-winnicott.pdf">https://felipevillapsicologia.files.wordpress.com/2015/01/o-conceito-de-indivc3adduo-saudc3a1vel-d-w-winnicott.pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14203	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3433366 - MARCIA CORRALERO ROSA RODRIGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	Despertando os aspectos saudáveis da psique feminina por meio das etapas de iniciação propostas no conto Vasalisa em "Mulheres que correm com os lobos"			
<b>INTRODUCAO</b>	Este estudo é uma contribuição para a área da Psicologia Analítica Junguiana sobre o conceito de individuação proposto por Jung(2006) em que a psique feminina (na cultura patriarcal), tem a possibilidade de percorrer uma jornada de iniciação com o propósito de despertar o "Arquétipo da Mulher Selvagem" que representa a integração "Ego-Self" (individuação), cujas características são a criatividade, espontaneidade e liberdade de ser e estar no mundo, por meio do conto Vasalisa.			
<b>OBJETIVOS</b>	Refletir sobre a representação e expressão do feminino inserido em uma cultura patriarcal, com vistas a resgatar o arquétipo da mulher selvagem.			
<b>METODOLOGIA</b>	É a análise documental do "Conto Vasalisa" de Mulheres que correm com os lobos (Éstes 2014), onde são categorizados os aspectos saudáveis do feminino e suas etapas de iniciação. São elencadas 9 categorias que, em um plano crescente, vão construindo a jornada da psique feminina na busca da integração do Ego-Self (Individuação).			
<b>RESULTADOS</b>	Tendo a Contoterapia como ferramenta, foi possível viabilizar um percurso que veio favorecer a expansão da consciência quanto ao despertar dos aspectos saudáveis da psique feminina. Nove categorias foram elencadas no Conto Vasalisa: a) Mãe boa demais (representação arquetípica do percurso de desenvolvimento da psique feminina tendo em consideração a intuição como recurso da Mulher Selvagem; b) Denunciar piores partes de si mesmo (representada pela imagem arquetípica da madrasta e suas filhas simbolizando o relacionamento com os aspectos negativos da psique); c) Sair de casa e se lançar nas trevas (tendo como instrumento de apoio a intuição. Tal percurso propiciará um relacionamento intuitivo com o raciocínio, percepções, habilidade de raciocínio, experiências e aprendizagem de vida); d) Baba Yaga – Megera Selvagem. Representação da honestidade. Não recua. Enquanto Vasalisa a respeita, ela entrega o que foi prometido. Como uma segunda mãe para Vasalisa, apresenta-lhe os aspectos saudáveis da psique por meio da realização de tarefas; e) Servir o não racional; f) Separar isso daquilo; g) Perguntar sobre os mistérios; h) De pé nas quatro patas; i) Reformular a sombra. O conto apresentou as etapas de iniciação e foram discutidas como categorias à luz da abordagem Junguiana para o despertar do "Arquétipo da Mulher Selvagem". Assim, foi possível revisitar os aspectos do feminino sombrio de modo a integrar a sombra no eixo Ego-Self (Si-Mesmo) e, assim, possibilitar à psique feminina respostas criativas às suas demandas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Considerando-se as etapas de iniciação propostas por Éstes (2014), pôde-se, sim, verificar ser possível, à mulher da contemporaneidade, fruto de uma cultura patriarcal, revisitar sua jornada com o propósito de resgatar o arquétipo da mulher selvagem cujas características são a criatividade, espontaneidade e liberdade de ser e estar no mundo de forma integrada com o eixo Ego-Self.			
<b>REFERENCIAS</b>	Éstes, C.P.(2014). Mulheres que correm com os Lobos, Rio de Janeiro, Ed. Rocco Jung, E. (2006). Animus e anima. São Paulo: Ed. Cultrix Jung, C.G. (2008). O homem e seus símbolos. 2ª ed. Especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14206	Educação	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4331842 - SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Sílvia Gonçalves de Almeida	Olga Maria Lodi Rizzini	
<b>TITULO</b>	O papel das emoções no processo de ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental			
<b>INTRODUCAO</b>	O papel das emoções no processo de ensino e aprendizagem precisa de um olhar sensível para mediar novas aprendizagens de forma significativa. Ao potencializar os aspectos socioemocionais contribui-se na formação de sujeitos críticos e reflexivos para proporcionar em seu desenvolvimento como um ser social e com novas possibilidades, respeitando a singularidade de cada um.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender até que ponto as emoções interferem no processo de ensino e aprendizagem de crianças, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental, com foco na aprendizagem socioemocional. A pesquisa bibliográfica foi feita em artigos e livros que abordam as temáticas aprendizagem socioemocional e emoção e aprendizagem. A pesquisa documental foi realizada na legislação em diretrizes oficiais que abordam a aprendizagem socioemocional.			
<b>RESULTADOS</b>	Wallon (2007) explica que a primeira emoção da criança se dá a partir do medo, que consiste num sistema de atitudes que uma situação exige, por isso podemos afirmar que as emoções se fazem presente desde a concepção do sujeito. A literatura nos mostra que a demonstração de afeto durante as práticas pedagógicas influencia no aspecto emocional da criança, não somente na autoestima distanciando-se do tradicionalismo das carteiras enfileiradas e na imobilidade do corpo, mas também na relação que o docente mantém com o professor e com o grupo. As emoções exercem influência no desenvolvimento cognitivo e psicomotor. É por meio das emoções se despertam a motivação e o desejo de aprender. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Brasil destaca a importância das competências socioemocionais no desenvolvimento integral dos estudantes. Ela reconhece que além do aprendizado acadêmico, é fundamental cultivar habilidades como empatia, resolução de conflitos, colaboração e autoconhecimento para preparar os alunos para a vida pessoal, social e profissional. As competências socioemocionais são abordadas ao longo de diversos componentes curriculares, promovendo uma educação mais holística e voltada para o desenvolvimento de habilidades que vão além do conhecimento cognitivo. Segundo a BNCC (2017), o professor pode ajudar os estudantes a desenvolver as competências socioemocionais em sala de aula. Portanto, sugerem que os educadores tenham atitudes que favoreçam o desenvolvimento das competências socioemocionais, como: intencionalidade e reciprocidade, transcendência, competência, regulação e controle de comportamento, individualização e diferenciação psicológica, planejamento e busca por objetivos, procura pelo novo e pela complexidade, consciência da modificabilidade, sentimento de pertença e construção do vínculo. Com essas atitudes, busca-se trabalhar as competências socioemocionais de maneira assertiva, por meio da mediação do professor.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este trabalho apresenta a necessidade continua de integrar o aspecto emocional no processo educacional das crianças. Isso não apenas fortalece sua capacidade de aprendizado, mas também contribui para o desenvolvimento de indivíduos emocionalmente inteligentes e resilientes, preparando-os para enfrentar os desafios futuros com confiança e equilíbrio emocional.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Ministério da Educação. BNCC - Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017. Disponível em: <a href="http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implimentacao/praticas/cademo-de-praticas/aprofundamentos/195-competencias-socioemocionais-como-fator-de-a-saude-mental-e-ao-bullying">http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implimentacao/praticas/cademo-de-praticas/aprofundamentos/195-competencias-socioemocionais-como-fator-de-a-saude-mental-e-ao-bullying</a> . WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2020. protecao-			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14208	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3169324 - YARA PINHEIRO MARQUES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	A Idealização da Maternidade e os efeitos na Saúde mental da Mãe			
<b>INTRODUCAO</b>	A maternidade representa grandes mudanças na vida da mulher, física e emocionalmente, bem como nos papéis até então exercidos e refletindo em sua identidade. A maternidade contemporânea é cercada por idealização social sobre como dever ser e o modelo construído na mulher mãe desde sua infância. As transformações que afetam o organismo da mulher e seu bem-estar, acabam por alterar seu psiquismo, seu papel social, vida profissional entre outras. Diante de tantas transições, a maternidade pode ser um período em que se observam aumentos de sintomatologias, ou mesmo, o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Refletir sobre as representações sociais da maternidade e os efeitos na saúde mental da mãe.			
<b>METODOLOGIA</b>	É um estudo de revisão de literatura narrativa nas bases de dados da Scielo e PubMed com as palavras chaves: representação social de maternidade e saúde mental da mãe.			
<b>RESULTADOS</b>	Um estudo sobre uma das participantes de um grupo de apoio a mães com depressão pós-parto, por Arrais (2006) que demonstrou ter tido depressão na vida, estresse, ansiedade e depressão na gestação, baixo suporte social, familiar e do pai, bem como no puerpério, potencializam a depressão pós-parto. Ter um pré-natal com base numa abordagem psicológica, uma relação saudável com suas próprias mães, suporte social na gestação e no puerpério e manter relações sociais positivas podem proteger a gestante contra a depressão pós-parto e minimizar os fatores de risco no puerpério, bem como, estimular a expressão de sentimentos negativos, de hostilidade e rejeição, das ansiedades, temores e dúvidas, para emergir os sentimentos de amor e ternura. Outro estudo por Rapoport (#38) Piccinini (2011) onde participaram 39 mães, primíparas, que residiam com seus companheiros. Estas foram entrevistadas quando os bebês tinham um ano de vida e mostrou que durante esse primeiro ano, as mães vivenciaram diversas situações estressantes e houve maior solicitação de apoio social durante essas situações, e quando receberam apoio social, foi satisfatório tanto do ponto de vista emocional como prático. Os resultados sugerem que apoio social prestado à mãe se mostra primordial tanto para ela como para a sua relação com a criança.			
<b>CONCLUSOES</b>	As representações sociais da maternidade refletem na saúde mental da mãe que se vê cercada de idealizações de como deve ser seu maternar. Estudos apontam que a rede de apoio, participação ativa do pai, apoio psicológico, amenizam o adoecimento psíquico da mãe.			
<b>REFERENCIAS</b>	Alvarenga, P., Paixão, C., Soares, Z. F., (#38) da Silva, A. C. S. (2018). Impacto da saúde mental materna na interação mãe-bebê e seus efeitos sobre o desenvolvimento infantil. (#38)#8239;Revista.Disponível em Psico.https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/28475/pdf Arrais, A. R., (#38) Araujo, T. C. C. F. (2017). Depressão pós-parto: uma revisão sobre fatores de risco e de proteção. Revista Psicologia, Saúde (#38) doenças. Disponível em:https://www.redalyc.org/pdf/362/36254714016.pdf Rapoport, A., (#38) Piccinini, C. A. (2011). Maternidade e situações estressantes no primeiro ano de vida do bebê. Psico-usf. Disponível em:https://doi.org/10.1590/S1413-82712011000200010			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14208	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3794920 - PALOMA INGRID DA SILVA TAVARES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	A Idealização da Maternidade e os efeitos na Saúde mental da Mãe			
<b>INTRODUCAO</b>	A maternidade representa grandes mudanças na vida da mulher, física e emocionalmente, bem como nos papéis até então exercidos e refletindo em sua identidade. A maternidade contemporânea é cercada por idealização social sobre como dever ser e o modelo construído na mulher mãe desde sua infância. As transformações que afetam o organismo da mulher e seu bem-estar, acabam por alterar seu psiquismo, seu papel social, vida profissional entre outras. Diante de tantas transições, a maternidade pode ser um período em que se observam aumentos de sintomatologias, ou mesmo, o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Refletir sobre as representações sociais da maternidade e os efeitos na saúde mental da mãe.			
<b>METODOLOGIA</b>	É um estudo de revisão de literatura narrativa nas bases de dados da Scielo e PubMed com as palavras chaves: representação social de maternidade e saúde mental da mãe.			
<b>RESULTADOS</b>	Um estudo sobre uma das participantes de um grupo de apoio a mães com depressão pós-parto, por Arrais (2006) que demonstrou ter tido depressão na vida, estresse, ansiedade e depressão na gestação, baixo suporte social, familiar e do pai, bem como no puerpério, potencializam a depressão pós-parto. Ter um pré-natal com base numa abordagem psicológica, uma relação saudável com suas próprias mães, suporte social na gestação e no puerpério e manter relações sociais positivas podem proteger a gestante contra a depressão pós-parto e minimizar os fatores de risco no puerpério, bem como, estimular a expressão de sentimentos negativos, de hostilidade e rejeição, das ansiedades, temores e dúvidas, para emergir os sentimentos de amor e ternura. Outro estudo por Rapoport (#38) Piccinini (2011) onde participaram 39 mães, primíparas, que residiam com seus companheiros. Estas foram entrevistadas quando os bebês tinham um ano de vida e mostrou que durante esse primeiro ano, as mães vivenciaram diversas situações estressantes e houve maior solicitação de apoio social durante essas situações, e quando receberam apoio social, foi satisfatório tanto do ponto de vista emocional como prático. Os resultados sugerem que apoio social prestado à mãe se mostra primordial tanto para ela como para a sua relação com a criança.			
<b>CONCLUSOES</b>	As representações sociais da maternidade refletem na saúde mental da mãe que se vê cercada de idealizações de como deve ser seu maternar. Estudos apontam que a rede de apoio, participação ativa do pai, apoio psicológico, amenizam o adoecimento psíquico da mãe.			
<b>REFERENCIAS</b>	Alvarenga, P., Paixão, C., Soares, Z. F., (#38) da Silva, A. C. S. (2018). Impacto da saúde mental materna na interação mãe-bebê e seus efeitos sobre o desenvolvimento infantil. (#38)#8239;Revista.Disponível em Psico.https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/28475/pdf Arrais, A. R., (#38) Araujo, T. C. C. F. (2017). Depressão pós-parto: uma revisão sobre fatores de risco e de proteção. Revista Psicologia, Saúde (#38) doenças. Disponível em:https://www.redalyc.org/pdf/362/36254714016.pdf Rapoport, A., (#38) Piccinini, C. A. (2011). Maternidade e situações estressantes no primeiro ano de vida do bebê. Psico-usf. Disponível em:https://doi.org/10.1590/S1413-82712011000200010			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14208	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4067631 - SARA DOS SANTOS SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	A Idealização da Maternidade e os efeitos na Saúde mental da Mãe			
<b>INTRODUCAO</b>	A maternidade representa grandes mudanças na vida da mulher, física e emocionalmente, bem como nos papéis até então exercidos e refletindo em sua identidade. A maternidade contemporânea é cercada por idealização social sobre como dever ser e o modelo construído na mulher mãe desde sua infância. As transformações que afetam o organismo da mulher e seu bem-estar, acabam por alterar seu psiquismo, seu papel social, vida profissional entre outras. Diante de tantas transições, a maternidade pode ser um período em que se observam aumentos de sintomatologias, ou mesmo, o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Refletir sobre as representações sociais da maternidade e os efeitos na saúde mental da mãe.			
<b>METODOLOGIA</b>	É um estudo de revisão de literatura narrativa nas bases de dados da Scielo e PubMed com as palavras chaves: representação social de maternidade e saúde mental da mãe.			
<b>RESULTADOS</b>	Um estudo sobre uma das participantes de um grupo de apoio a mães com depressão pós-parto, por Arrais (2006) que demonstrou ter tido depressão na vida, estresse, ansiedade e depressão na gestação, baixo suporte social, familiar e do pai, bem como no puerpério, potencializam a depressão pós-parto. Ter um pré-natal com base numa abordagem psicológica, uma relação saudável com suas próprias mães, suporte social na gestação e no puerpério e manter relações sociais positivas podem proteger a gestante contra a depressão pós-parto e minimizar os fatores de risco no puerpério, bem como, estimular a expressão de sentimentos negativos, de hostilidade e rejeição, das ansiedades, temores e dúvidas, para emergir os sentimentos de amor e ternura. Outro estudo por Rapoport (#38) Piccinini (2011) onde participaram 39 mães, primíparas, que residiam com seus companheiros. Estas foram entrevistadas quando os bebês tinham um ano de vida e mostrou que durante esse primeiro ano, as mães vivenciaram diversas situações estressantes e houve maior solicitação de apoio social durante essas situações, e quando receberam apoio social, foi satisfatório tanto do ponto de vista emocional como prático. Os resultados sugerem que apoio social prestado à mãe se mostra primordial tanto para ela como para a sua relação com a criança.			
<b>CONCLUSOES</b>	As representações sociais da maternidade refletem na saúde mental da mãe que se vê cercada de idealizações de como deve ser seu maternar. Estudos apontam que a rede de apoio, participação ativa do pai, apoio psicológico, amenizam o adoecimento psíquico da mãe.			
<b>REFERENCIAS</b>	Alvarenga, P., Paixão, C., Soares, Z. F., (#38) da Silva, A. C. S. (2018). Impacto da saúde mental materna na interação mãe-bebê e seus efeitos sobre o desenvolvimento infantil. (#38)#8239;Revista.Disponível em Psico.https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/28475/pdf Arrais, A. R., (#38) Araujo, T. C. C. F. (2017). Depressão pós-parto: uma revisão sobre fatores de risco e de proteção. Revista Psicologia, Saúde (#38) doenças. Disponível em:https://www.redalyc.org/pdf/362/36254714016.pdf Rapoport, A., (#38) Piccinini, C. A. (2011). Maternidade e situações estressantes no primeiro ano de vida do bebê. Psico-usf. Disponível em:https://doi.org/10.1590/S1413-82712011000200010			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14209	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4351991 - ANDERSON FARIAS DINIZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	A logística reversa como ferramenta para auxiliar na redução do lixo eletrônico de aparelhos celulares			
<b>INTRODUCAO</b>	Diante da mudança no comportamento de consumo da população e da rápida obsolescência dos bens produzidos, estes tem contribuído para o aumento da geração de resíduos, principalmente dos equipamentos de informática, que possuem elementos contaminantes em suas composições, podendo ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana se descartados inadequadamente. A Logística Reversa é uma das ferramentas estratégicas que se utiliza corretamente pelas empresas tem como finalidade a preservação ambiental, além de grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Através da lei 12.305/2010, a qual estabelece a responsabilidade compartilhada do descarte de resíduos, a política nacional de resíduos prevê a redução na geração de resíduos, com uma proposta prática de hábitos de consumo sustentável e com conjuntos de instrumentos para proporcionar um aumento na reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e a destinação ambientalmente de maneira adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados (BRASIL, 2010).			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo tem como objetivo fomentar a importância da logística reversa aplicada ao uso dos eletroeletrônicos e em especial aos aparelhos celulares, visto que este item é frequente na vida das pessoas.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo caracteriza-se como exploratório conforme Gil (2000), foi realizado por meio de avaliação de dados, foram buscados materiais tanto em bibliografia predominantemente acadêmica, como livros, periódicos e anais de eventos, bem como em publicações de organizações vinculadas com a indústria.			
<b>RESULTADOS</b>	Estima-se que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados por ano no mundo. E entre os países emergentes, o Brasil lidera o ranking da produção, pois cada brasileiro descarta em torno de meio quilo de lixo eletrônico (UNEP, 2009). Os telefones celulares representam quase 17% do desperdício eletrônico, enquanto apenas 3% dos celulares globais são reciclados. Os íons de lítio são considerados o material mais valioso disponível nas baterias de Smartphones. Segundo a empresa ECO-CEL (2023), 4 mil aparelhos são jogados no lixo por hora no Brasil, totalizando 2,2 mil toneladas de celulares jogados no lixo por ano, fato considerado um recorde entre países emergentes.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que diante dos dados apresentados, haja uma conscientização dos consumidores e responsabilidade das empresas quanto ao ciclo de vida dos produtos e, além disso, uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais para que seja cumprida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que seus impactos ambientais são de grande extensão.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <a href="http://planalto.gov.br">http://planalto.gov.br</a> . ECO-CEL, Reciclagem Sustentável. Disponível em: <a href="http://eco-cel.com/quem-somos/">http://eco-cel.com/quem-somos/</a> Gil, A. C. (2000). Metodologia Do Ensino Superior. Editora Atlas SA. UNEP, R. O. W. A. El Maghara scenario a search for sustainability and equity: An Egyptian case study. Journal of Futures Studies, v. 14, n. 2, p. 55-90, 2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14209	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4440200 - EDUARDO TEIXEIRA DE CERQUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	A logística reversa como ferramenta para auxiliar na redução do lixo eletrônico de aparelhos celulares			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Diante da mudança no comportamento de consumo da população e da rápida obsolescência dos bens produzidos, estes tem contribuído para o aumento da geração de resíduos, principalmente dos equipamentos de informática, que possuem elementos contaminantes em suas composições, podendo ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana se descartados inadequadamente. A Logística Reversa é uma das ferramentas estratégicas que se utiliza corretamente pelas empresas tem como finalidade a preservação ambiental, além de grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Através da lei 12.305/2010, a qual estabelece a responsabilidade compartilhada do descarte de resíduos, a política nacional de resíduos prevê a redução na geração de resíduos, com uma proposta prática de hábitos de consumo sustentável e com conjuntos de instrumentos para proporcionar um aumento na reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e a destinação ambientalmente de maneira adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados (BRASIL, 2010).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo tem como objetivo fomentar a importância da logística reversa aplicada ao uso dos eletroeletrônicos e em especial aos aparelhos celulares, visto que este item é frequente na vida das pessoas.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo caracteriza-se como exploratório conforme Gil (2000), foi realizado por meio de avaliação de dados, foram buscados materiais tanto em bibliografia predominantemente acadêmica, como livros, periódicos e anais de eventos, bem como em publicações de organizações vinculadas com a indústria.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Estima-se que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados por ano no mundo. E entre os países emergentes, o Brasil lidera o ranking da produção, pois cada brasileiro descarta em torno de meio quilo de lixo eletrônico (UNEP, 2009). Os telefones celulares representam quase 17% do desperdício eletrônico, enquanto apenas 3% dos celulares globais são reciclados. Os íons de lítio são considerados o material mais valioso disponível nas baterias de Smartphones. Segundo a empresa ECO-CEL (2023), 4 mil aparelhos são jogados no lixo por hora no Brasil, totalizando 2,2 mil toneladas de celulares jogados no lixo por ano, fato considerado um recorde entre países emergentes.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que diante dos dados apresentados, haja uma conscientização dos consumidores e responsabilidade das empresas quanto ao ciclo de vida dos produtos e, além disso, uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais para que seja cumprida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que seus impactos ambientais são de grande extensão.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <a href="http://planalto.gov.br">http://planalto.gov.br</a>. ECO-CEL, Reciclagem Sustentável. Disponível em: <a href="http://eco-cel.com/quem-somos/">http://eco-cel.com/quem-somos/</a> Gil, A. C. (2000). Metodologia Do Ensino Superior. Editora Atlas SA. UNEP, R. O. W. A. El Maghara scenario a search for sustainability and equity: An Egyptian case study. Journal of Futures Studies, v. 14, n. 2, p. 55-90, 2009.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14209	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4447042 - GUILHERME RODRIGUES TENORIO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	A logística reversa como ferramenta para auxiliar na redução do lixo eletrônico de aparelhos celulares			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Diante da mudança no comportamento de consumo da população e da rápida obsolescência dos bens produzidos, estes tem contribuído para o aumento da geração de resíduos, principalmente dos equipamentos de informática, que possuem elementos contaminantes em suas composições, podendo ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana se descartados inadequadamente. A Logística Reversa é uma das ferramentas estratégicas que se utiliza corretamente pelas empresas tem como finalidade a preservação ambiental, além de grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Através da lei 12.305/2010, a qual estabelece a responsabilidade compartilhada do descarte de resíduos, a política nacional de resíduos prevê a redução na geração de resíduos, com uma proposta prática de hábitos de consumo sustentável e com conjuntos de instrumentos para proporcionar um aumento na reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e a destinação ambientalmente de maneira adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados (BRASIL, 2010).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo tem como objetivo fomentar a importância da logística reversa aplicada ao uso dos eletroeletrônicos e em especial aos aparelhos celulares, visto que este item é frequente na vida das pessoas.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo caracteriza-se como exploratório conforme Gil (2000), foi realizado por meio de avaliação de dados, foram buscados materiais tanto em bibliografia predominantemente acadêmica, como livros, periódicos e anais de eventos, bem como em publicações de organizações vinculadas com a indústria.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Estima-se que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados por ano no mundo. E entre os países emergentes, o Brasil lidera o ranking da produção, pois cada brasileiro descarta em torno de meio quilo de lixo eletrônico (UNEP, 2009). Os telefones celulares representam quase 17% do desperdício eletrônico, enquanto apenas 3% dos celulares globais são reciclados. Os íons de lítio são considerados o material mais valioso disponível nas baterias de Smartphones. Segundo a empresa ECO-CEL (2023), 4 mil aparelhos são jogados no lixo por hora no Brasil, totalizando 2,2 mil toneladas de celulares jogados no lixo por ano, fato considerado um recorde entre países emergentes.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que diante dos dados apresentados, haja uma conscientização dos consumidores e responsabilidade das empresas quanto ao ciclo de vida dos produtos e, além disso, uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais para que seja cumprida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que seus impactos ambientais são de grande extensão.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <a href="http://planalto.gov.br">http://planalto.gov.br</a>. ECO-CEL, Reciclagem Sustentável. Disponível em: <a href="http://eco-cel.com/quem-somos/">http://eco-cel.com/quem-somos/</a> Gil, A. C. (2000). Metodologia Do Ensino Superior. Editora Atlas SA. UNEP, R. O. W. A. El Maghara scenario a search for sustainability and equity: An Egyptian case study. Journal of Futures Studies, v. 14, n. 2, p. 55-90, 2009.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14209	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4541081 - ESTER OLIVEIRA DE SOUZA RODRIGUES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	A logística reversa como ferramenta para auxiliar na redução do lixo eletrônico de aparelhos celulares			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Diante da mudança no comportamento de consumo da população e da rápida obsolescência dos bens produzidos, estes tem contribuído para o aumento da geração de resíduos, principalmente dos equipamentos de informática, que possuem elementos contaminantes em suas composições, podendo ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana se descartados inadequadamente. A Logística Reversa é uma das ferramentas estratégicas que se utiliza corretamente pelas empresas tem como finalidade a preservação ambiental, além de grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Através da lei 12.305/2010, a qual estabelece a responsabilidade compartilhada do descarte de resíduos, a política nacional de resíduos prevê a redução na geração de resíduos, com uma proposta prática de hábitos de consumo sustentável e com conjuntos de instrumentos para proporcionar um aumento na reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e a destinação ambientalmente de maneira adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados (BRASIL, 2010).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo tem como objetivo fomentar a importância da logística reversa aplicada ao uso dos eletroeletrônicos e em especial aos aparelhos celulares, visto que este item é frequente na vida das pessoas.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo caracteriza-se como exploratório conforme Gil (2000), foi realizado por meio de avaliação de dados, foram buscados materiais tanto em bibliografia predominantemente acadêmica, como livros, periódicos e anais de eventos, bem como em publicações de organizações vinculadas com a indústria.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Estima-se que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados por ano no mundo. E entre os países emergentes, o Brasil lidera o ranking da produção, pois cada brasileiro descarta em torno de meio quilo de lixo eletrônico (UNEP, 2009). Os telefones celulares representam quase 17% do desperdício eletrônico, enquanto apenas 3% dos celulares globais são reciclados. Os íons de lítio são considerados o material mais valioso disponível nas baterias de Smartphones. Segundo a empresa ECO-CEL (2023), 4 mil aparelhos são jogados no lixo por hora no Brasil, totalizando 2,2 mil toneladas de celulares jogados no lixo por ano, fato considerado um recorde entre países emergentes.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que diante dos dados apresentados, haja uma conscientização dos consumidores e responsabilidade das empresas quanto ao ciclo de vida dos produtos e, além disso, uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais para que seja cumprida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que seus impactos ambientais são de grande extensão.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <a href="http://planalto.gov.br">http://planalto.gov.br</a>. ECO-CEL, Reciclagem Sustentável. Disponível em: <a href="http://eco-cel.com/quem-somos/">http://eco-cel.com/quem-somos/</a> Gil, A. C. (2000). Metodologia Do Ensino Superior. Editora Atlas SA. UNEP, R. O. W. A. El Maghara scenario a search for sustainability and equity: An Egyptian case study. Journal of Futures Studies, v. 14, n. 2, p. 55-90, 2009.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14209	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4546971 - VITORIA SILVA DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	A logística reversa como ferramenta para auxiliar na redução do lixo eletrônico de aparelhos celulares			
<b>INTRODUCAO</b>	Diante da mudança no comportamento de consumo da população e da rápida obsolescência dos bens produzidos, estes tem contribuído para o aumento da geração de resíduos, principalmente dos equipamentos de informática, que possuem elementos contaminantes em suas composições, podendo ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana se descartados inadequadamente. A Logística Reversa é uma das ferramentas estratégicas que se utiliza corretamente pelas empresas tem como finalidade a preservação ambiental, além de grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Através da lei 12.305/2010, a qual estabelece a responsabilidade compartilhada do descarte de resíduos, a política nacional de resíduos prevê a redução na geração de resíduos, com uma proposta prática de hábitos de consumo sustentável e com conjuntos de instrumentos para proporcionar um aumento na reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e a destinação ambientalmente de maneira adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados (BRASIL, 2010).			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo tem como objetivo fomentar a importância da logística reversa aplicada ao uso dos eletroeletrônicos e em especial aos aparelhos celulares, visto que este item é frequente na vida das pessoas.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo caracteriza-se como exploratório conforme Gil (2000), foi realizado por meio de avaliação de dados, foram buscados materiais tanto em bibliografia predominantemente acadêmica, como livros, periódicos e anais de eventos, bem como em publicações de organizações vinculadas com a indústria.			
<b>RESULTADOS</b>	Estima-se que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados por ano no mundo. E entre os países emergentes, o Brasil lidera o ranking da produção, pois cada brasileiro descarta em torno de meio quilo de lixo eletrônico (UNEP, 2009). Os telefones celulares representam quase 17% do desperdício eletrônico, enquanto apenas 3% dos celulares globais são reciclados. Os íons de lítio são considerados o material mais valioso disponível nas baterias de Smartphones. Segundo a empresa ECO-CEL (2023), 4 mil aparelhos são jogados no lixo por hora no Brasil, totalizando 2,2 mil toneladas de celulares jogados no lixo por ano, fato considerado um recorde entre países emergentes.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que diante dos dados apresentados, haja uma conscientização dos consumidores e responsabilidade das empresas quanto ao ciclo de vida dos produtos e, além disso, uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais para que seja cumprida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que seus impactos ambientais são de grande extensão.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <a href="http://planalto.gov.br">http://planalto.gov.br</a> . ECO-CEL, Reciclagem Sustentável. Disponível em: <a href="http://eco-cel.com/quem-somos/">http://eco-cel.com/quem-somos/</a> Gil, A. C. (2000). Metodologia Do Ensino Superior. Editora Atlas SA. UNEP, R. O. W. A. El Maghara scenario a search for sustainability and equity: An Egyptian case study. Journal of Futures Studies, v. 14, n. 2, p. 55-90, 2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14210	Educação	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442512 - LETICIA APARECIDA GONÇALVES DE LARA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Gonçalves de Almeida	Olga Maria Lodi Rizzini	
<b>TITULO</b>	Interdisciplinaridade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental			
<b>INTRODUCAO</b>	A interdisciplinaridade pode contribuir para uma formação mais ampla, correlacionando os saberes de diferentes disciplinas e promovendo o desenvolvimento dos alunos. É preciso analisar todos os benefícios que o modelo interdisciplinar traz, pois a abordagem interdisciplinar impacta diretamente no aprendizado nas diferentes áreas do conhecimento. Essa pesquisa é relevante para identificar e analisar as estratégias que podem auxiliar na adoção efetiva da interdisciplinaridade, como a formação contínua dos professores, a utilização de projetos e atividades integradas, para desenvolver melhores práticas pedagógicas, que favoreçam a adoção bem-sucedida da interdisciplinaridade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender quais os desafios e estratégias para adoção da abordagem interdisciplinar na prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi desenvolvida pesquisa bibliográfica em artigos e livros que versam sobre o tema práticas pedagógicas interdisciplinares e interdisciplinaridade na formação dos professores. A pesquisa documental foi realizada em legislação e documentos educacionais vigentes, que tragam diretrizes para inserção de práticas interdisciplinares na escola. A pesquisa de campo é composta por observação, registrada em caderno, no formato diário de bordo, de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental.			
<b>RESULTADOS</b>	A Interdisciplinaridade é a integração de matérias, não junção, ela caminha entre as disciplinas. Por que trabalhar apenas matemática, ou só português? Por que não trabalhar utilizando mais de uma disciplina? Alinhando os objetos de estudo de acordo com o que vem sendo trabalhado. A Interdisciplinaridade é a abertura a compreensão de aspectos ocultos no ato de aprender. Segundo Fazenda (2001), cinco princípios subsidiam uma prática interdisciplinar: humildade, coerência, espera, respeito e desapego. A prática interdisciplinar analisa com criticidade padrões tradicionais, que priorizam a construção do conhecimento de maneira fragmentada. Nesse sentido, romper paradigmas é necessário. A interdisciplinaridade é uma ferramenta que facilita a compreensão. Ainda existem diversas limitações para que a interdisciplinaridade seja desenvolvida em sua plenitude. Ao analisar a interdisciplinaridade, observamos que esta deveria estar presente na construção de ensino e aprendizagem, de modo que seja imprescindível que o(a) professor(a) esteja em constante movimento, sempre reinventando e acompanhando as mudanças do mundo que está cada vez mais interconectado. Entretanto, é possível observar resistência para a adesão de práticas interdisciplinares por parte da professora. Os conhecimentos são trabalhados nas suas especificidades. Não se observa atuação prática nas regiões de diálogo entre as áreas de conhecimento ou adoção de projetos que priorizem práticas interdisciplinares.			
<b>CONCLUSOES</b>	A prática interdisciplinar pode apresentar benefícios na prática pedagógica, mas há desafios enfrentados pelos educadores que dificultam a uma implantação significativa dessa abordagem, estabelecendo conexões e relações com as áreas do conhecimento. A resistência observada aparece relacionada a atividades que priorizam a especificidade do conhecimento, trabalhado isoladamente, com ausência de diálogo entre as diferentes áreas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. FAZENDA, Ivani C. A. Dicionário em construção: interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2001. FAZENDA, Ivani C.A. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. EDIÇÕES LOYOLA, São Paulo, Brasil, 1991. JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14212	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4824717 - LAURA DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	Análise Financeira e Gestão de Riscos: O Caso Natura			
<b>INTRODUCAO</b>	A Natura, uma proeminente corporação brasileira no setor de produtos cosméticos, notabiliza-se tanto por suas iniciativas de sustentabilidade quanto por seu compromisso socioambiental. Fundada em 1969, empresa consolidou sua posição de destaque em um mercado global caracterizado por feroz concorrência. No entanto, o ano de 2022 registrou um revés financeiro significativo para a Natura, com uma perda de receita avaliada em R\$200 milhões, o que suscita questionamentos sobre sua habilidade em gerenciar riscos em um ambiente empresarial em constante mutação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo visa compreender os fatores que contribuíram para a queda da receita financeira da empresa em 2022 e discutir as principais estratégias utilizadas para sua recuperação e aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos em um ambiente empresarial dinâmico.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa utilizada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise dos resultados revelou que a perda de receita da Natura em 2022 pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, a acirrada competição no setor de cosméticos desempenhou um papel significativo. Outras empresas competidoras intensificaram suas estratégias de marketing e lançaram novos produtos, o que afetou a participação de mercado da Natura. Entraves logísticos relacionados à distribuição de produtos também contribuíram para a perda de receita. A pandemia de COVID-19 impactou as cadeias de suprimentos globais, causando atrasos na entrega e aumentando os custos operacionais. Isso afetou negativamente a capacidade da Natura de atender à demanda do mercado de maneira eficiente. Fatores macroeconômicos, como a desvalorização da moeda brasileira, também tiveram um impacto adverso, minando o poder de compra dos consumidores e afetando as margens de lucro da empresa. Porém, a Natura demonstrou resiliência ao enfrentar esses desafios econômicos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A empresa buscou um empréstimo substancial do BNDES para liquidar suas obrigações junto a fornecedores e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, adotou estratégias de hedge para proteger-se contra flutuações indesejadas no preço de ativos financeiros, minimizando os riscos relacionados às oscilações cambiais.			
<b>REFERENCIAS</b>	HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004a. NEVES, Edmo Colnaghi. Fundamentos de governança corporativa: riscos, direito e compliance. 1. ed. Curitiba JENSEN, Michael; MECKLING, Willian. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Journal os Financial Economics, 1976.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14212	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4855337 - JESSICA DA SILVA BENTO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	Análise Financeira e Gestão de Riscos: O Caso Natura			
<b>INTRODUCAO</b>	A Natura, uma proeminente corporação brasileira no setor de produtos cosméticos, notabiliza-se tanto por suas iniciativas de sustentabilidade quanto por seu compromisso socioambiental. Fundada em 1969, empresa consolidou sua posição de destaque em um mercado global caracterizado por feroz concorrência. No entanto, o ano de 2022 registrou um revés financeiro significativo para a Natura, com uma perda de receita avaliada em R\$200 milhões, o que suscita questionamentos sobre sua habilidade em gerenciar riscos em um ambiente empresarial em constante mutação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo visa compreender os fatores que contribuíram para a queda da receita financeira da empresa em 2022 e discutir as principais estratégias utilizadas para sua recuperação e aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos em um ambiente empresarial dinâmico.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa utilizada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise dos resultados revelou que a perda de receita da Natura em 2022 pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, a acirrada competição no setor de cosméticos desempenhou um papel significativo. Outras empresas competidoras intensificaram suas estratégias de marketing e lançaram novos produtos, o que afetou a participação de mercado da Natura. Entraves logísticos relacionados à distribuição de produtos também contribuíram para a perda de receita. A pandemia de COVID-19 impactou as cadeias de suprimentos globais, causando atrasos na entrega e aumentando os custos operacionais. Isso afetou negativamente a capacidade da Natura de atender à demanda do mercado de maneira eficiente. Fatores macroeconômicos, como a desvalorização da moeda brasileira, também tiveram um impacto adverso, minando o poder de compra dos consumidores e afetando as margens de lucro da empresa. Porém, a Natura demonstrou resiliência ao enfrentar esses desafios econômicos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A empresa buscou um empréstimo substancial do BNDES para liquidar suas obrigações junto a fornecedores e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, adotou estratégias de hedge para proteger-se contra flutuações indesejadas no preço de ativos financeiros, minimizando os riscos relacionados às oscilações cambiais.			
<b>REFERENCIAS</b>	HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004a. NEVES, Edmo Colnaghi. Fundamentos de governança corporativa: riscos, direito e compliance. 1. ed. Curitiba JENSEN, Michael; MECKLING, Willian. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Journal os Financial Economics, 1976.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14212	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4914724 - RAFAELLA COELHO BESSA DE OLIVEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	Análise Financeira e Gestão de Riscos: O Caso Natura			
<b>INTRODUCAO</b>	A Natura, uma proeminente corporação brasileira no setor de produtos cosméticos, notabiliza-se tanto por suas iniciativas de sustentabilidade quanto por seu compromisso socioambiental. Fundada em 1969, empresa consolidou sua posição de destaque em um mercado global caracterizado por feroz concorrência. No entanto, o ano de 2022 registrou um revés financeiro significativo para a Natura, com uma perda de receita avaliada em R\$200 milhões, o que suscita questionamentos sobre sua habilidade em gerenciar riscos em um ambiente empresarial em constante mutação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo visa compreender os fatores que contribuíram para a queda da receita financeira da empresa em 2022 e discutir as principais estratégias utilizadas para sua recuperação e aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos em um ambiente empresarial dinâmico.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa utilizada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise dos resultados revelou que a perda de receita da Natura em 2022 pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, a acirrada competição no setor de cosméticos desempenhou um papel significativo. Outras empresas competidoras intensificaram suas estratégias de marketing e lançaram novos produtos, o que afetou a participação de mercado da Natura. Entraves logísticos relacionados à distribuição de produtos também contribuíram para a perda de receita. A pandemia de COVID-19 impactou as cadeias de suprimentos globais, causando atrasos na entrega e aumentando os custos operacionais. Isso afetou negativamente a capacidade da Natura de atender à demanda do mercado de maneira eficiente. Fatores macroeconômicos, como a desvalorização da moeda brasileira, também tiveram um impacto adverso, minando o poder de compra dos consumidores e afetando as margens de lucro da empresa. Porém, a Natura demonstrou resiliência ao enfrentar esses desafios econômicos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A empresa buscou um empréstimo substancial do BNDES para liquidar suas obrigações junto a fornecedores e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, adotou estratégias de hedge para proteger-se contra flutuações indesejadas no preço de ativos financeiros, minimizando os riscos relacionados às oscilações cambiais.			
<b>REFERENCIAS</b>	HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004a. NEVES, Edmo Colnaghi. Fundamentos de governança corporativa: riscos, direito e compliance. 1. ed. Curitiba JENSEN, Michael; MECKLING, Willian. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Journal os Financial Economics, 1976.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14212	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4986300 - MONIQUE BEZERRA DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	Análise Financeira e Gestão de Riscos: O Caso Natura			
<b>INTRODUCAO</b>	A Natura, uma proeminente corporação brasileira no setor de produtos cosméticos, notabiliza-se tanto por suas iniciativas de sustentabilidade quanto por seu compromisso socioambiental. Fundada em 1969, empresa consolidou sua posição de destaque em um mercado global caracterizado por feroz concorrência. No entanto, o ano de 2022 registrou um revés financeiro significativo para a Natura, com uma perda de receita avaliada em R\$200 milhões, o que suscita questionamentos sobre sua habilidade em gerenciar riscos em um ambiente empresarial em constante mutação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo visa compreender os fatores que contribuíram para a queda da receita financeira da empresa em 2022 e discutir as principais estratégias utilizadas para sua recuperação e aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos em um ambiente empresarial dinâmico.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa utilizada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise dos resultados revelou que a perda de receita da Natura em 2022 pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, a acirrada competição no setor de cosméticos desempenhou um papel significativo. Outras empresas competidoras intensificaram suas estratégias de marketing e lançaram novos produtos, o que afetou a participação de mercado da Natura. Entraves logísticos relacionados à distribuição de produtos também contribuíram para a perda de receita. A pandemia de COVID-19 impactou as cadeias de suprimentos globais, causando atrasos na entrega e aumentando os custos operacionais. Isso afetou negativamente a capacidade da Natura de atender à demanda do mercado de maneira eficiente. Fatores macroeconômicos, como a desvalorização da moeda brasileira, também tiveram um impacto adverso, minando o poder de compra dos consumidores e afetando as margens de lucro da empresa. Porém, a Natura demonstrou resiliência ao enfrentar esses desafios econômicos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A empresa buscou um empréstimo substancial do BNDES para liquidar suas obrigações junto a fornecedores e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, adotou estratégias de hedge para proteger-se contra flutuações indesejadas no preço de ativos financeiros, minimizando os riscos relacionados às oscilações cambiais.			
<b>REFERENCIAS</b>	HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004a. NEVES, Edmo Colnaghi. Fundamentos de governança corporativa: riscos, direito e compliance. 1. ed. Curitiba JENSEN, Michael; MECKLING, Willian. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Journal os Financial Economics, 1976.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14212	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		5028680 - JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES SILVA		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
TITULO	Análise Financeira e Gestão de Riscos: O Caso Natura			
INTRODUCAO	A Natura, uma proeminente corporação brasileira no setor de produtos cosméticos, notabiliza-se tanto por suas iniciativas de sustentabilidade quanto por seu compromisso socioambiental. Fundada em 1969, empresa consolidou sua posição de destaque em um mercado global caracterizado por feroz concorrência. No entanto, o ano de 2022 registrou um revés financeiro significativo para a Natura, com uma perda de receita avaliada em R\$200 milhões, o que suscita questionamentos sobre sua habilidade em gerenciar riscos em um ambiente empresarial em constante mutação.			
OBJETIVOS	Este estudo visa compreender os fatores que contribuíram para a queda da receita financeira da empresa em 2022 e discutir as principais estratégias utilizadas para sua recuperação e aperfeiçoamento do seu modelo de gestão de riscos em um ambiente empresarial dinâmico.			
METODOLOGIA	A metodologia de pesquisa utilizada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos, revistas científicas, e portais especializados.			
RESULTADOS	A análise dos resultados revelou que a perda de receita da Natura em 2022 pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, a acirrada competição no setor de cosméticos desempenhou um papel significativo. Outras empresas competidoras intensificaram suas estratégias de marketing e lançaram novos produtos, o que afetou a participação de mercado da Natura. Entraves logísticos relacionados à distribuição de produtos também contribuíram para a perda de receita. A pandemia de COVID-19 impactou as cadeias de suprimentos globais, causando atrasos na entrega e aumentando os custos operacionais. Isso afetou negativamente a capacidade da Natura de atender à demanda do mercado de maneira eficiente. Fatores macroeconômicos, como a desvalorização da moeda brasileira, também tiveram um impacto adverso, minando o poder de compra dos consumidores e afetando as margens de lucro da empresa. Porém, a Natura demonstrou resiliência ao enfrentar esses desafios econômicos.			
CONCLUSOES	A empresa buscou um empréstimo substancial do BNDES para liquidar suas obrigações junto a fornecedores e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, adotou estratégias de hedge para proteger-se contra flutuações indesejadas no preço de ativos financeiros, minimizando os riscos relacionados às oscilações cambiais.			
REFERENCIAS	HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004a. NEVES, Edmo Colnaghi. Fundamentos de governança corporativa: riscos, direito e compliance. 1. ed. Curitiba JENSEN, Michael; MECKLING, Willian. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Journal os Financial Economics, 1976.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14213	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4862864 - DIOGO HIROYUKI CALHEIROS DA SILVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	Processo de Terceirização como estratégia empresarial na indústria metalúrgica			
<b>INTRODUCA O</b>	A terceirização é uma estratégia empresarial amplamente adotada para otimizar recursos, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional em diversos setores industriais, incluindo a indústria metalúrgica. No entanto, essa prática apresenta desafios específicos quando aplicada a esse setor, que é responsável pela produção de ligas metálicas, peças de alta precisão e componentes críticos para diversas indústrias. O setor metalúrgico vem convivendo com algumas dificuldades que tem promovido uma necessidade de reorganização. Entre as dificuldades apresentadas destacam-se a crescente dependência da terceirização que tem afetado os aspectos da qualidade, inovação, conformidade regulatória e controle sobre os processos de produção. Segundo Silva (2018, p. 33), "a terceirização pode comprometer a qualidade e a conformidade dos produtos metalúrgicos quando não há uma seleção criteriosa de fornecedores e auditorias regulares".			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é compreender como o processo de terceirização impacta o resultado financeiro das empresas metalúrgicas no Brasil e identificar estratégias financeiras que possam otimizar recursos, garantir a continuidade operacional, manter a competitividade e minimizar os riscos financeiros.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada para elaboração do artigo será a pesquisa bibliográfica de forma exploratória, fazendo uso de fontes tais como livros, artigos científicos, relatórios de pesquisa e documentos governamentais relacionados à terceirização na metalurgia e à gestão financeira.			
<b>RESULTADO S</b>	Verificou-se a partir do estudo que a terceirização tem promovido impactos na qualidade, inovação e conformidade; verificou-se também que a implementação de um sistema de gestão da terceirização é fundamental para obter a mitigação de riscos e garantir o controle da qualidade na metalurgia; e que a diversificação de fornecedores e o gerenciamento de riscos financeiros são estratégias cruciais para otimizar recursos financeiros na metalurgia.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A terceirização na indústria metalúrgica brasileira é uma estratégia essencial para otimizar recursos e manter a competitividade. No entanto, sua implementação requer uma abordagem estratégica e cuidadosa, especialmente do ponto de vista financeiro. As empresas que adotam estratégias financeiras adequadas podem enfrentar os desafios da terceirização, manter padrões rigorosos e contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil. A flexibilidade nas estratégias financeiras e a avaliação contínua são cruciais para o sucesso a longo prazo das empresas metalúrgicas no país.			
<b>REFERENCIA S</b>	Silva, J. A. Terceirização na Indústria Metalúrgica: Desafios e Estratégias. Editora MetalBrasil. 2018. Oliveira, M. S. Gestão da Terceirização na Indústria Metalúrgica Brasileira. Revista de Metalurgia, 2020. Santos, A. R. Estratégias Financeiras na Terceirização: Um Estudo de Caso na Indústria Metalúrgica. Revista Brasileira de Economia e Finanças, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14213	Ciências Sociais Aplicadas	B - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4863917 - VALMIR DA SILVA SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	Processo de Terceirização como estratégia empresarial na indústria metalúrgica			
<b>INTRODUCA O</b>	A terceirização é uma estratégia empresarial amplamente adotada para otimizar recursos, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional em diversos setores industriais, incluindo a indústria metalúrgica. No entanto, essa prática apresenta desafios específicos quando aplicada a esse setor, que é responsável pela produção de ligas metálicas, peças de alta precisão e componentes críticos para diversas indústrias. O setor metalúrgico vem convivendo com algumas dificuldades que tem promovido uma necessidade de reorganização. Entre as dificuldades apresentadas destacam-se a crescente dependência da terceirização que tem afetado os aspectos da qualidade, inovação, conformidade regulatória e controle sobre os processos de produção. Segundo Silva (2018, p. 33), "a terceirização pode comprometer a qualidade e a conformidade dos produtos metalúrgicos quando não há uma seleção criteriosa de fornecedores e auditorias regulares".			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é compreender como o processo de terceirização impacta o resultado financeiro das empresas metalúrgicas no Brasil e identificar estratégias financeiras que possam otimizar recursos, garantir a continuidade operacional, manter a competitividade e minimizar os riscos financeiros.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada para elaboração do artigo será a pesquisa bibliográfica de forma exploratória, fazendo uso de fontes tais como livros, artigos científicos, relatórios de pesquisa e documentos governamentais relacionados à terceirização na metalurgia e à gestão financeira.			
<b>RESULTADO S</b>	Verificou-se a partir do estudo que a terceirização tem promovido impactos na qualidade, inovação e conformidade; verificou-se também que a implementação de um sistema de gestão da terceirização é fundamental para obter a mitigação de riscos e garantir o controle da qualidade na metalurgia; e que a diversificação de fornecedores e o gerenciamento de riscos financeiros são estratégias cruciais para otimizar recursos financeiros na metalurgia.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A terceirização na indústria metalúrgica brasileira é uma estratégia essencial para otimizar recursos e manter a competitividade. No entanto, sua implementação requer uma abordagem estratégica e cuidadosa, especialmente do ponto de vista financeiro. As empresas que adotam estratégias financeiras adequadas podem enfrentar os desafios da terceirização, manter padrões rigorosos e contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil. A flexibilidade nas estratégias financeiras e a avaliação contínua são cruciais para o sucesso a longo prazo das empresas metalúrgicas no país.			
<b>REFERENCIA S</b>	Silva, J. A. Terceirização na Indústria Metalúrgica: Desafios e Estratégias. Editora MetalBrasil. 2018. Oliveira, M. S. Gestão da Terceirização na Indústria Metalúrgica Brasileira. Revista de Metalurgia, 2020. Santos, A. R. Estratégias Financeiras na Terceirização: Um Estudo de Caso na Indústria Metalúrgica. Revista Brasileira de Economia e Finanças, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14213	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		4886721 - LUCAS AUGUSTO DE MOURA		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
TITULO	Processo de Terceirização como estratégia empresarial na indústria metalúrgica			
INTRODUCAO	A terceirização é uma estratégia empresarial amplamente adotada para otimizar recursos, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional em diversos setores industriais, incluindo a indústria metalúrgica. No entanto, essa prática apresenta desafios específicos quando aplicada a esse setor, que é responsável pela produção de ligas metálicas, peças de alta precisão e componentes críticos para diversas indústrias. O setor metalúrgico vem convivendo com algumas dificuldades que tem promovido uma necessidade de reorganização. Entre as dificuldades apresentadas destacam-se a crescente dependência da terceirização que tem afetado os aspectos da qualidade, inovação, conformidade regulatória e controle sobre os processos de produção. Segundo Silva (2018, p. 33), "a terceirização pode comprometer a qualidade e a conformidade dos produtos metalúrgicos quando não há uma seleção criteriosa de fornecedores e auditorias regulares".			
OBJETIVOS	O objetivo deste projeto é compreender como o processo de terceirização impacta o resultado financeiro das empresas metalúrgicas no Brasil e identificar estratégias financeiras que possam otimizar recursos, garantir a continuidade operacional, manter a competitividade e minimizar os riscos financeiros.			
METODOLOGIA	A metodologia adotada para elaboração do artigo será a pesquisa bibliográfica de forma exploratória, fazendo uso de fontes tais como livros, artigos científicos, relatórios de pesquisa e documentos governamentais relacionados à terceirização na metalurgia e à gestão financeira.			
RESULTADOS	Verificou-se a partir do estudo que a terceirização tem promovido impactos na qualidade, inovação e conformidade; verificou-se também que a implementação de um sistema de gestão da terceirização é fundamental para obter a mitigação de riscos e garantir o controle da qualidade na metalurgia; e que a diversificação de fornecedores e o gerenciamento de riscos financeiros são estratégias cruciais para otimizar recursos financeiros na metalurgia.			
CONCLUSOES	A terceirização na indústria metalúrgica brasileira é uma estratégia essencial para otimizar recursos e manter a competitividade. No entanto, sua implementação requer uma abordagem estratégica e cuidadosa, especialmente do ponto de vista financeiro. As empresas que adotam estratégias financeiras adequadas podem enfrentar os desafios da terceirização, manter padrões rigorosos e contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil. A flexibilidade nas estratégias financeiras e a avaliação contínua são cruciais para o sucesso a longo prazo das empresas metalúrgicas no país.			
REFERENCIAS	Silva, J. A. Terceirização na Indústria Metalúrgica: Desafios e Estratégias. Editora MetalBrasil. 2018. Oliveira, M. S. Gestão da Terceirização na Indústria Metalúrgica Brasileira. Revista de Metalurgia, 2020. Santos, A. R. Estratégias Financeiras na Terceirização: Um Estudo de Caso na Indústria Metalúrgica. Revista Brasileira de Economia e Finanças, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14213	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4905539 - NÍCOLAS CARLOS DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Antonio Roberto da Costa	
<b>TITULO</b>	Processo de Terceirização como estratégia empresarial na indústria metalúrgica			
<b>INTRODUCAO</b>	A terceirização é uma estratégia empresarial amplamente adotada para otimizar recursos, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional em diversos setores industriais, incluindo a indústria metalúrgica. No entanto, essa prática apresenta desafios específicos quando aplicada a esse setor, que é responsável pela produção de ligas metálicas, peças de alta precisão e componentes críticos para diversas indústrias. O setor metalúrgico vem convivendo com algumas dificuldades que tem promovido uma necessidade de reorganização. Entre as dificuldades apresentadas destacam-se a crescente dependência da terceirização que tem afetado os aspectos da qualidade, inovação, conformidade regulatória e controle sobre os processos de produção. Segundo Silva (2018, p. 33), "a terceirização pode comprometer a qualidade e a conformidade dos produtos metalúrgicos quando não há uma seleção criteriosa de fornecedores e auditorias regulares".			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto é compreender como o processo de terceirização impacta o resultado financeiro das empresas metalúrgicas no Brasil e identificar estratégias financeiras que possam otimizar recursos, garantir a continuidade operacional, manter a competitividade e minimizar os riscos financeiros.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia adotada para elaboração do artigo será a pesquisa bibliográfica de forma exploratória, fazendo uso de fontes tais como livros, artigos científicos, relatórios de pesquisa e documentos governamentais relacionados à terceirização na metalurgia e à gestão financeira.			
<b>RESULTADOS</b>	Verificou-se a partir do estudo que a terceirização tem promovido impactos na qualidade, inovação e conformidade; verificou-se também que a implementação de um sistema de gestão da terceirização é fundamental para obter a mitigação de riscos e garantir o controle da qualidade na metalurgia; e que a diversificação de fornecedores e o gerenciamento de riscos financeiros são estratégias cruciais para otimizar recursos financeiros na metalurgia.			
<b>CONCLUSOES</b>	A terceirização na indústria metalúrgica brasileira é uma estratégia essencial para otimizar recursos e manter a competitividade. No entanto, sua implementação requer uma abordagem estratégica e cuidadosa, especialmente do ponto de vista financeiro. As empresas que adotam estratégias financeiras adequadas podem enfrentar os desafios da terceirização, manter padrões rigorosos e contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil. A flexibilidade nas estratégias financeiras e a avaliação contínua são cruciais para o sucesso a longo prazo das empresas metalúrgicas no país.			
<b>REFERENCIAS</b>	Silva, J. A. Terceirização na Indústria Metalúrgica: Desafios e Estratégias. Editora MetalBrasil. 2018. Oliveira, M. S. Gestão da Terceirização na Indústria Metalúrgica Brasileira. Revista de Metalurgia, 2020. Santos, A. R. Estratégias Financeiras na Terceirização: Um Estudo de Caso na Indústria Metalúrgica. Revista Brasileira de Economia e Finanças, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14215	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4014375 - CINTIA SODRÉ MEIRELLES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	A INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO COMPORTAMENTO ESCOLAR DE ADOLESCENTES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O transtorno de ansiedade está afetando, segundo pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Juventude (2018) 6 em cada 10 jovens de 15 a 25 anos. O reflexo da ansiedade em ambiente escolar ocasiona o baixo desempenho escolar, cognitivo e social. Esta ansiedade pode acarretar irritações, dificuldades com a atenção, preocupações excessivas, dificuldades em socialização, baixa autoestima, pensamentos negativos, choros constantes, crises de ansiedade e ataques de pânico. Logo, a partir da ansiedade podem surgir impactos comportamentais em ambientes escolares e no processo de aprendizagem e socialização.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os possíveis impactos comportamentais que a ansiedade pode causar em adolescentes no âmbito escolar			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão Bibliográfica Integrativa. Foram consultados 27 artigos nas plataformas Scielo, Pepsic, Redalyc. Como critério de exclusão alguns artigos foram desconsiderados por não se adequarem ao tema. Como inclusão, foram selecionados 16 artigos que evidenciavam questões atuais e abordaram o tema. Dessa forma, foram utilizados apenas 2 artigos atuais na discussão de resultados. (#38)#8239; (#38)#8239; (#38)#8239;			
<b>RESULTADOS</b>	Eleutério (2023) realizou pesquisa e concluiu que a adolescência é um momento privilegiado para o desenvolvimento da autoconsciência e questionar quem ele é, sua identidade e qual seu papel diante a sociedade. Para Freud (citado em Coutinho, 2015a) na adolescência temos a fase que o sujeito não é mais uma criança, em que tinha como exemplo seus pais (conceito de castração). O adolescente consegue ver nos professores, um novo objeto de transferência, onde é necessário ter esse guia e identificar-se para que, assim, possa "matar" essa figura paterna ao absorver seus conhecimentos e forças para que possa se fortalecer. Motta et al. (2015) encontrou resultados que, dentre 3.538 jovens entre 10 e 19 anos, cerca de 72.7% dos participantes apresentavam sinais de ansiedade. Com o medo que a ansiedade provém, é possível que a personalidade desse jovem seja afetada e assim, alterar os comportamentos causando o afastamento do sujeito de grupos sociais e da família, trazendo sentimentos de não pertencimento e de menos valia. Segundo Papalia et al. (citado em Soares, 2020) faz a relação destes jovens, onde muitos destes adolescentes estão mais sujeitos a serem agressores ou possíveis vítimas no ambiente escolar.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os sintomas da ansiedade comprometem a vida escolar do estudante ao se contrapor ao esperado de um "bom aluno". Conclui-se que a influência da ansiedade no comportamento escolar de adolescentes é prejudicial ao seu rendimento escolar e é indicado que alunos que passem por isso sejam encaminhados a atendimentos psicológicos para que possam ser orientados no processo.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Coutinho, L. G. (2015). O adolescente e a educação no contemporâneo: o que a psicanálise tem a dizer. Cadernos de psicanálise (Rio de Janeiro), 37(33), 155-174. (#38)#8239; Motta L. J., Bussadori S. K., Goddoy C. L. H., Gonzalez D. A. B., Martins M. D., Silva R. S. (2015). Disfunção Temporomandibular segundo o Nível de Ansiedade em Adolescentes. Disponível em: <a 429="" 477="" 540="" 550"="" data-label="Page-Footer" href="https://www.scielo.br/j/ptp/a/5XLHqK7syndm8cb396gb7Q/?lang=pt#(#38)#8239;(#38)#8239; Soares, G. G. (2020). Sofrimento psíquico e adolescência: reflexões acerca dos sentidos atribuídos à adolescência. Boletim de Conjuntura (BOCA), 4(10), 100-107. (#38)#8239; (#38)#8239;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>Página 160</p> </a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14215	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4052994 - DANIELLI ALVES RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	A INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO COMPORTAMENTO ESCOLAR DE ADOLESCENTES			
<b>INTRODUCAO</b>	O transtorno de ansiedade está afetando, segundo pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Juventude (2018) 6 em cada 10 jovens de 15 a 25 anos. O reflexo da ansiedade em ambiente escolar ocasiona o baixo desempenho escolar, cognitivo e social. Esta ansiedade pode acarretar irritações, dificuldades com a atenção, preocupações excessivas, dificuldades em socialização, baixa autoestima, pensamentos negativos, choros constantes, crises de ansiedade e ataques de pânico. Logo, a partir da ansiedade podem surgir impactos comportamentais em ambientes escolares e no processo de aprendizagem e socialização.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os possíveis impactos comportamentais que a ansiedade pode causar em adolescentes no âmbito escolar			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão Bibliográfica Integrativa. Foram consultados 27 artigos nas plataformas Scielo, Pepsic, Redalyc. Como critério de exclusão alguns artigos foram desconsiderados por não se adequarem ao tema. Como inclusão, foram selecionados 16 artigos que evidenciavam questões atuais e abordaram o tema. Dessa forma, foram utilizados apenas 2 artigos atuais na discussão de resultados. (#38)#8239; (#38)#8239; (#38)#8239;			
<b>RESULTADOS</b>	Eleutério (2023) realizou pesquisa e concluiu que a adolescência é um momento privilegiado para o desenvolvimento da autoconsciência e questionar quem ele é, sua identidade e qual seu papel diante a sociedade. Para Freud (citado em Coutinho, 2015a) na adolescência temos a fase que o sujeito não é mais uma criança, em que tinha como exemplo seus pais (conceito de castração). O adolescente consegue ver nos professores, um novo objeto de transferência, onde é necessário ter esse guia e identificar-se para que, assim, possa "matar" essa figura paterna ao absorver seus conhecimentos e forças para que possa se fortalecer. Motta et al. (2015) encontrou resultados que, dentre 3.538 jovens entre 10 e 19 anos, cerca de 72.7% dos participantes apresentavam sinais de ansiedade. Com o medo que a ansiedade provém, é possível que a personalidade desse jovem seja afetada e assim, alterar os comportamentos causando o afastamento do sujeito de grupos sociais e da família, trazendo sentimentos de não pertencimento e de menos valia. Segundo Papalia et al. (citado em Soares, 2020) faz a relação destes jovens, onde muitos destes adolescentes estão mais sujeitos a serem agressores ou possíveis vítimas no ambiente escolar.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os sintomas da ansiedade comprometem a vida escolar do estudante ao se contrapor ao esperado de um "bom aluno". Conclui-se que a influência da ansiedade no comportamento escolar de adolescentes é prejudicial ao seu rendimento escolar e é indicado que alunos que passem por isso sejam encaminhados a atendimentos psicológicos para que possam ser orientados no processo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Coutinho, L. G. (2015). O adolescente e a educação no contemporâneo: o que a psicanálise tem a dizer. Cadernos de psicanálise (Rio de Janeiro), 37(33), 155-174. (#38)#8239; Motta L. J, Bussadori S. K, Goddoy C. L. H, Gonzalez D. A. B, Martins M. D, Silva R. S (2015). Disfunção Temporomandibular segundo o Nível de Ansiedade em Adolescentes. Disponível em: <a 429="" 477="" 540="" 550"="" data-label="Page-Footer" href="https://www.scielo.br/j/ptp/a/5XLHqK7syndm8cb396gb7Q/?lang=pt#(#38)#8239;(#38)#8239; Soares, G. G. (2020). Sofrimento psíquico e adolescência: reflexões acerca dos sentidos atribuídos à adolescência. Boletim de Conjuntura (BOCA), 4(10), 100-107. (#38)#8239; (#38)#8239;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>Página 161</p> </a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14215	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4110889 - MARCO AURELIO ALVES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	A INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO COMPORTAMENTO ESCOLAR DE ADOLESCENTES			
<b>INTRODUCAO</b>	O transtorno de ansiedade está afetando, segundo pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Juventude (2018) 6 em cada 10 jovens de 15 a 25 anos. O reflexo da ansiedade em ambiente escolar ocasiona o baixo desempenho escolar, cognitivo e social. Esta ansiedade pode acarretar irritações, dificuldades com a atenção, preocupações excessivas, dificuldades em socialização, baixa autoestima, pensamentos negativos, choros constantes, crises de ansiedade e ataques de pânico. Logo, a partir da ansiedade podem surgir impactos comportamentais em ambientes escolares e no processo de aprendizagem e socialização.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os possíveis impactos comportamentais que a ansiedade pode causar em adolescentes no âmbito escolar			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão Bibliográfica Integrativa. Foram consultados 27 artigos nas plataformas Scielo, Pepsic, Redalyc. Como critério de exclusão alguns artigos foram desconsiderados por não se adequarem ao tema. Como inclusão, foram selecionados 16 artigos que evidenciavam questões atuais e abordaram o tema. Dessa forma, foram utilizados apenas 2 artigos atuais na discussão de resultados. (#38)#8239; (#38)#8239; (#38)#8239;			
<b>RESULTADOS</b>	Eleutério (2023) realizou pesquisa e concluiu que a adolescência é um momento privilegiado para o desenvolvimento da autoconsciência e questionar quem ele é, sua identidade e qual seu papel diante a sociedade. Para Freud (citado em Coutinho, 2015a) na adolescência temos a fase que o sujeito não é mais uma criança, em que tinha como exemplo seus pais (conceito de castração). O adolescente consegue ver nos professores, um novo objeto de transferência, onde é necessário ter esse guia e identificar-se para que, assim, possa "matar" essa figura paterna ao absorver seus conhecimentos e forças para que possa se fortalecer. Motta et al. (2015) encontrou resultados que, dentre 3.538 jovens entre 10 e 19 anos, cerca de 72.7% dos participantes apresentavam sinais de ansiedade. Com o medo que a ansiedade provém, é possível que a personalidade desse jovem seja afetada e assim, alterar os comportamentos causando o afastamento do sujeito de grupos sociais e da família, trazendo sentimentos de não pertencimento e de menos valia. Segundo Papalia et al. (citado em Soares, 2020) faz a relação destes jovens, onde muitos destes adolescentes estão mais sujeitos a serem agressores ou possíveis vítimas no ambiente escolar.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os sintomas da ansiedade comprometem a vida escolar do estudante ao se contrapor ao esperado de um "bom aluno". Conclui-se que a influência da ansiedade no comportamento escolar de adolescentes é prejudicial ao seu rendimento escolar e é indicado que alunos que passem por isso sejam encaminhados a atendimentos psicológicos para que possam ser orientados no processo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Coutinho, L. G. (2015). O adolescente e a educação no contemporâneo: o que a psicanálise tem a dizer. Cadernos de psicanálise (Rio de Janeiro), 37(33), 155-174. (#38)#8239; Motta L. J., Bussadori S. K., Goddoy C. L. H., Gonzalez D. A. B., Martins M. D., Silva R. S. (2015). Disfunção Temporomandibular segundo o Nível de Ansiedade em Adolescentes. Disponível em: <a 429="" 477="" 540="" 550"="" data-label="Page-Footer" href="https://www.scielo.br/j/ptp/a/5XLHqK7syndm8cb396gb7Q/?lang=pt#(#38)#8239;(#38)#8239; Soares, G. G. (2020). Sofrimento psíquico e adolescência: reflexões acerca dos sentidos atribuídos à adolescência. Boletim de Conjuntura (BOCA), 4(10), 100-107. (#38)#8239; (#38)#8239;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>Página 162</p> </a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14216	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4086686 - ADRIANO ALVES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Helena Modenesi Pucci		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM AMBIENTE DE INTERNAÇÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A dependência química se tornou uma questão de saúde pública e conforme a OMS (2023), cerca de 0,5 milhões de mortes por ano são causadas pelo abuso de substâncias. Uma das formas de tratamento para o transtorno são as Comunidades Terapêuticas (CT) e Centros de Internação. A realização da ressocialização deve proporcionar a superação da insegurança quanto ao retorno ao convívio familiar e à disponibilização de acesso a programas voltados para a geração de renda, profissionalização e participação comunitária. Contudo, nem sempre o dependente de substâncias psicoativas tem acesso a ressocialização por falta de políticas públicas que apoiem projetos focados nessa iniciativa (Souza et al, 2016).			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar se existem e quais são as ações identificadas que contemplam o preparo para ressocialização de pacientes internados dentro das Comunidades Terapêuticas e Centros de Internação/Reabilitação.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica, com o foco em artigos científicos, pois neles se encontram o conhecimento científico atualizado (Marconi e Lakatos, 2017). Foram utilizadas as bases de dados LILACS, PePSIC, SciELO-Brasil e localizados descritores no DeSC/MeSH, juntamente aos operadores booleanos para pesquisa de resultado do presente trabalho. Além disto, foram utilizados critérios de inclusão e exclusão para auxiliar na seleção dos artigos, realizando-se em três etapas: busca de resultados com descritores, 2ª etapa critérios de inclusão e exclusão e leitura de títulos e 3ª etapa a leitura dos resumos.			
<b>RESULTADOS</b>	A presente pesquisa verificou como resultado o artigo de Kowalski et al. (2021), no qual descreveu sobre a reinserção social de dependentes internados através de oficinas de boas práticas de manipulação de alimentos e oficina de panificação e laticínios para inclusão destes no mercado de trabalho. Ferreira et al. (2020) e Silva (2018) verificaram que parte do tratamento realizado com pacientes em internação, prepara os pacientes para ressocialização e reinserção social com técnicas baseadas numa estrutura cognitiva comportamental. Santos (2020) apontou que o projeto de internações voluntárias também possui preparo para a reinserção social, com intensificação dos vínculos familiares, e quando possível aprofundamento da capacitação profissional. Nunes e Marcomim (2020) descreveram acerca de um projeto que trabalha a possibilidade de um olhar individual para cada paciente o que facilita o processo de ressocialização pensando e planejando projetos de vida ainda dentro do processo de internação.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Identificou-se que existem alguns locais de internação que preconizam pelo desenvolvimento de ressocialização, e este faz parte do tratamento do dependente químico em uma fase do tratamento, seja através de oficinas ou de ações que se baseiam na estrutura da terapia cognitiva comportamental. Salienta-se a escassez de produção científica acerca deste tema e a necessidade de mais trabalhos que relatem o que está sendo preconizado nos tratamentos de internação e preparo para a pós-internação.			
<b>REFERENCIAS</b>	DIEHL, A. et al. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas Editora, 2010. WHO - World Health Organization. Drugs (psychoactive), 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14216	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135920 - VANESKA MESQUITA TEIXEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Helena Modenesi Pucci		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM AMBIENTE DE INTERNAÇÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A dependência química se tornou uma questão de saúde pública e conforme a OMS (2023), cerca de 0,5 milhões de mortes por ano são causadas pelo abuso de substâncias. Uma das formas de tratamento para o transtorno são as Comunidades Terapêuticas (CT) e Centros de Internação. A realização da ressocialização deve proporcionar a superação da insegurança quanto ao retorno ao convívio familiar e à disponibilização de acesso a programas voltados para a geração de renda, profissionalização e participação comunitária. Contudo, nem sempre o dependente de substâncias psicoativas tem acesso a ressocialização por falta de políticas públicas que apoiem projetos focados nessa iniciativa (Souza et al, 2016).			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar se existem e quais são as ações identificadas que contemplam o preparo para ressocialização de pacientes internados dentro das Comunidades Terapêuticas e Centros de Internação/Reabilitação.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica, com o foco em artigos científicos, pois neles se encontram o conhecimento científico atualizado (Marconi e Lakatos, 2017). Foram utilizadas as bases de dados LILACS, PePSIC, SciELO-Brasil e localizados descritores no DeSC/MeSH, juntamente aos operadores booleanos para pesquisa de resultado do presente trabalho. Além disto, foram utilizados critérios de inclusão e exclusão para auxiliar na seleção dos artigos, realizando-se em três etapas: busca de resultados com descritores, 2ª etapa critérios de inclusão e exclusão e leitura de títulos e 3ª etapa a leitura dos resumos.			
<b>RESULTADOS</b>	A presente pesquisa verificou como resultado o artigo de Kowalski et al. (2021), no qual descreveu sobre a reinserção social de dependentes internados através de oficinas de boas práticas de manipulação de alimentos e oficina de panificação e laticínios para inclusão destes no mercado de trabalho. Ferreira et al. (2020) e Silva (2018) verificaram que parte do tratamento realizado com pacientes em internação, prepara os pacientes para ressocialização e reinserção social com técnicas baseadas numa estrutura cognitiva comportamental. Santos (2020) apontou que o projeto de internações voluntárias também possui preparo para a reinserção social, com intensificação dos vínculos familiares, e quando possível aprofundamento da capacitação profissional. Nunes e Marcomim (2020) descreveram acerca de um projeto que trabalha a possibilidade de um olhar individual para cada paciente o que facilita o processo de ressocialização pensando e planejando projetos de vida ainda dentro do processo de internação.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Identificou-se que existem alguns locais de internação que preconizam pelo desenvolvimento de ressocialização, e este faz parte do tratamento do dependente químico em uma fase do tratamento, seja através de oficinas ou de ações que se baseiam na estrutura da terapia cognitiva comportamental. Salienta-se a escassez de produção científica acerca deste tema e a necessidade de mais trabalhos que relatem o que está sendo preconizado nos tratamentos de internação e preparo para a pós-internação.			
<b>REFERENCIAS</b>	DIEHL, A. et al. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas Editora, 2010. WHO - World Health Organization. Drugs (psychoactive), 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14221	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3818624 - WAGNER SOBRAL SALES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luiz Januario	
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Enquadramento Tributário			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos. Uma estratégia tributária eficaz é vital para o sucesso planejamento financeiro, uma vez que o pagamento de impostos reduz a renda disponível dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância do planejamento tributário através da temática Planejamento Tributário e seu enquadramento tributário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Brasil vive sucessivas tentativas de reformas para que haja uma simplificação do modelo de tributação que foi instituído em 1960 e modificado em 1988 com a Constituição. Após mais de 30 anos de discussão, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. A tributação sobre as empresas é uma forma inteligente de garantir recursos ao Estado, uma vez que se a tributação incidisse apenas ao nível das pessoas físicas, a pulverização tornaria mais onerosos os custos de administração. Nota-se, portanto, que as razões mais fortes estão baseadas em argumentos de conveniência e simplicidade administrativa. Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três formas: 1. Lucro Real; 2. Lucro Presumido e Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)..</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Concluímos que essas informações vão contribuir aos gestores empresarias que busquem informações com seus contadores sobre o melhor enquadramento tributário para as organizações..</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. ANDRADE, Maria Margarida de Andrade. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2018. SIQUEIRA, E. B.; CURY, L. K. P.; GOMES, T. S. Planejamento Tributário. Revista CEPPG – CESUC, n. 25, v.2, p.184-196, 2011. MARTINS, Luis Marcelo. Artigo A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO SUCESSO DAS EMPRESAS. 2018. ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial para tomada de decisão. Editora Saraiva, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14221	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4305272 - VINICIUS AUGUSTO DA SILVA AMARAL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luiz Januario	
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Enquadramento Tributário			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos. Uma estratégia tributária eficaz é vital para o sucesso planejamento financeiro, uma vez que o pagamento de impostos reduz a renda disponível dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância do planejamento tributário através da temática Planejamento Tributário e seu enquadramento tributário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Brasil vive sucessivas tentativas de reformas para que haja uma simplificação do modelo de tributação que foi instituído em 1960 e modificado em 1988 com a Constituição. Após mais de 30 anos de discussão, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. A tributação sobre as empresas é uma forma inteligente de garantir recursos ao Estado, uma vez que se a tributação incidisse apenas ao nível das pessoas físicas, a pulverização tornaria mais onerosos os custos de administração. Nota-se, portanto, que as razões mais fortes estão baseadas em argumentos de conveniência e simplicidade administrativa. Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três formas: 1. Lucro Real; 2. Lucro Presumido e Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Concluímos que essas informações vão contribuir aos gestores empresarias que busquem informações com seus contadores sobre o melhor enquadramento tributário para as organizações..</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. ANDRADE, Maria Margarida de Andrade. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2018. SIQUEIRA, E. B.; CURY, L. K. P.; GOMES, T. S. Planejamento Tributário. Revista CEPPG – CESUC, n. 25, v.2, p.184-196, 2011. MARTINS, Luis Marcelo. Artigo A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO SUCESSO DAS EMPRESAS. 2018. ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial para tomada de decisão. Editora Saraiva, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14221	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4309316 - THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luiz Januario	
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Enquadramento Tributário			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos. Uma estratégia tributária eficaz é vital para o sucesso planejamento financeiro, uma vez que o pagamento de impostos reduz a renda disponível dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância do planejamento tributário através da temática Planejamento Tributário e seu enquadramento tributário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Brasil vive sucessivas tentativas de reformas para que haja uma simplificação do modelo de tributação que foi instituído em 1960 e modificado em 1988 com a Constituição. Após mais de 30 anos de discussão, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. A tributação sobre as empresas é uma forma inteligente de garantir recursos ao Estado, uma vez que se a tributação incidisse apenas ao nível das pessoas físicas, a pulverização tornaria mais onerosos os custos de administração. Nota-se, portanto, que as razões mais fortes estão baseadas em argumentos de conveniência e simplicidade administrativa. Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três formas: 1. Lucro Real; 2. Lucro Presumido e Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Concluímos que essas informações vão contribuir aos gestores empresarias que busquem informações com seus contadores sobre o melhor enquadramento tributário para as organizações..</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. ANDRADE, Maria Margarida de Andrade. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2018. SIQUEIRA, E. B.; CURY, L. K. P.; GOMES, T. S. Planejamento Tributário. Revista CEPPG – CESUC, n. 25, v.2, p.184-196, 2011. MARTINS, Luis Marcelo. Artigo A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO SUCESSO DAS EMPRESAS. 2018. ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial para tomada de decisão. Editora Saraiva, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14221	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4324871 - RODRIGO DA ROCHA OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luiz Januario	
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Enquadramento Tributário			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos. Uma estratégia tributária eficaz é vital para o sucesso planejamento financeiro, uma vez que o pagamento de impostos reduz a renda disponível dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância do planejamento tributário através da temática Planejamento Tributário e seu enquadramento tributário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Brasil vive sucessivas tentativas de reformas para que haja uma simplificação do modelo de tributação que foi instituído em 1960 e modificado em 1988 com a Constituição. Após mais de 30 anos de discussão, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. A tributação sobre as empresas é uma forma inteligente de garantir recursos ao Estado, uma vez que se a tributação incidisse apenas ao nível das pessoas físicas, a pulverização tornaria mais onerosos os custos de administração. Nota-se, portanto, que as razões mais fortes estão baseadas em argumentos de conveniência e simplicidade administrativa. Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três formas: 1. Lucro Real; 2. Lucro Presumido e Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)..</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Concluímos que essas informações vão contribuir aos gestores empresarias que busquem informações com seus contadores sobre o melhor enquadramento tributário para as organizações..</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. ANDRADE, Maria Margarida de Andrade. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2018. SIQUEIRA, E. B.; CURY, L. K. P.; GOMES, T. S. Planejamento Tributário. Revista CEPPG – CESUC, n. 25, v.2, p.184-196, 2011. MARTINS, Luis Marcelo. Artigo A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO SUCESSO DAS EMPRESAS. 2018. ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial para tomada de decisão. Editora Saraiva, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14221	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4339185 - MAÍRA SILVA DA ANUNCIACÃO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luiz Januario	
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Enquadramento Tributário			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos. Uma estratégia tributária eficaz é vital para o sucesso planejamento financeiro, uma vez que o pagamento de impostos reduz a renda disponível dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância do planejamento tributário através da temática Planejamento Tributário e seu enquadramento tributário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Brasil vive sucessivas tentativas de reformas para que haja uma simplificação do modelo de tributação que foi instituído em 1960 e modificado em 1988 com a Constituição. Após mais de 30 anos de discussão, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. A tributação sobre as empresas é uma forma inteligente de garantir recursos ao Estado, uma vez que se a tributação incidisse apenas ao nível das pessoas físicas, a pulverização tornaria mais onerosos os custos de administração. Nota-se, portanto, que as razões mais fortes estão baseadas em argumentos de conveniência e simplicidade administrativa. Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três formas: 1. Lucro Real; 2. Lucro Presumido e Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Concluímos que essas informações vão contribuir aos gestores empresarias que busquem informações com seus contadores sobre o melhor enquadramento tributário para as organizações..</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. ANDRADE, Maria Margarida de Andrade. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2018. SIQUEIRA, E. B.; CURY, L. K. P.; GOMES, T. S. Planejamento Tributário. Revista CEPPG – CESUC, n. 25, v.2, p.184-196, 2011. MARTINS, Luis Marcelo. Artigo A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO SUCESSO DAS EMPRESAS. 2018. ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial para tomada de decisão. Editora Saraiva, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14221	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4436946 - RONAN DOS SANTOS LIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luiz Januario	
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Enquadramento Tributário			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos. Uma estratégia tributária eficaz é vital para o sucesso planejamento financeiro, uma vez que o pagamento de impostos reduz a renda disponível dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância do planejamento tributário através da temática Planejamento Tributário e seu enquadramento tributário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Brasil vive sucessivas tentativas de reformas para que haja uma simplificação do modelo de tributação que foi instituído em 1960 e modificado em 1988 com a Constituição. Após mais de 30 anos de discussão, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. A tributação sobre as empresas é uma forma inteligente de garantir recursos ao Estado, uma vez que se a tributação incidisse apenas ao nível das pessoas físicas, a pulverização tornaria mais onerosos os custos de administração. Nota-se, portanto, que as razões mais fortes estão baseadas em argumentos de conveniência e simplicidade administrativa. Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três formas: 1. Lucro Real; 2. Lucro Presumido e Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)..</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Concluímos que essas informações vão contribuir aos gestores empresarias que busquem informações com seus contadores sobre o melhor enquadramento tributário para as organizações..</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. ANDRADE, Maria Margarida de Andrade. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2018. SIQUEIRA, E. B.; CURY, L. K. P.; GOMES, T. S. Planejamento Tributário. Revista CEPPG – CESUC, n. 25, v.2, p.184-196, 2011. MARTINS, Luis Marcelo. Artigo A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO SUCESSO DAS EMPRESAS. 2018. ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial para tomada de decisão. Editora Saraiva, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14221	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4536746 - LUANA SENA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luiz Januario	
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Enquadramento Tributário			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos. Uma estratégia tributária eficaz é vital para o sucesso planejamento financeiro, uma vez que o pagamento de impostos reduz a renda disponível dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância do planejamento tributário através da temática Planejamento Tributário e seu enquadramento tributário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Brasil vive sucessivas tentativas de reformas para que haja uma simplificação do modelo de tributação que foi instituído em 1960 e modificado em 1988 com a Constituição. Após mais de 30 anos de discussão, foi aprovada a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. A tributação sobre as empresas é uma forma inteligente de garantir recursos ao Estado, uma vez que se a tributação incidisse apenas ao nível das pessoas físicas, a pulverização tornaria mais onerosos os custos de administração. Nota-se, portanto, que as razões mais fortes estão baseadas em argumentos de conveniência e simplicidade administrativa. Para fins tributários federais, a apuração dos impostos, no Brasil, pode ser feita de três formas: 1. Lucro Real; 2. Lucro Presumido e Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Concluímos que essas informações vão contribuir aos gestores empresarias que busquem informações com seus contadores sobre o melhor enquadramento tributário para as organizações.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. ANDRADE, Maria Margarida de Andrade. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2018. SIQUEIRA, E. B.; CURY, L. K. P.; GOMES, T. S. Planejamento Tributário. Revista CEPPG – CESUC, n. 25, v.2, p.184-196, 2011. MARTINS, Luis Marcelo. Artigo A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO SUCESSO DAS EMPRESAS. 2018. ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial para tomada de decisão. Editora Saraiva, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14222	Enfermagem Pediátrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441524 - THAYNÁ ALVES FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mariano Chinaia Junior		
<b>TITULO</b>	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PORTADORES DE ANOMALIA CONGÊNITA IRREPARÁVEL.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>INTRODUÇÃO: A anomalia congênita irreparável é um acometimento a saúde visível no público pediátrico, majoritariamente nos recém-nascidos. Tal doença ocorre em meio intrauterino e pode ser identificada antes, durante ou após o nascimento e caracteriza-se por dificultar ou até mesmo impossibilitar a manutenção e existência da vida, levando alguns dos pacientes acometidos a óbito. Tem como classificação básica deformidades no organismo, sejam elas neurológicas ou físicas em grau elevado e por isso com altas taxas de mortalidade neonatal, onde se vê necessário implementar ações específicas de saúde, podendo entrar em contextos cirúrgicos para tentativas de reversão e até mesmo cuidados paliativos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>OBJETIVO: Ratificar a importância da atuação do enfermeiro em casos de anomalia congênita irreparável e sua influência no bem-estar do paciente e da família.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>METODOLOGIA: Revisão da literatura com fontes embasadas em artigos científicos com tempo de expedição de no máximo 10 anos, nos idiomas inglês, espanhol e português, retirados das seguintes bases de dados: PubMed, SciELO e BVS, palavras-chave: enfermagem, assistência, anomalia congênita. As buscas foram realizadas no período de novembro de 2022 a abril de 2023.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>RESULTADO E DISCUSSÃO: Evidencia-se a percepção da anomalia congênita irreparável, como um desafio para os serviços e profissionais de saúde devido sua frequência notória e ainda subnotificada graças ao seu difícil diagnóstico preciso antes da perda fetal/neonatal, elevando assim o número de mortalidade infantil em todo o mundo. Concomitante a isso, a existência de diversos fatores para possível surgimento de anomalia congênita fazem com que as ações voltadas à sua prevenção necessariamente sejam generalizadas na tentativa de abarcar todas as lacunas possíveis, considerando: idade, condição socioeconômica e psicológica, hábitos de vida, vícios, doenças pré-existentes, histórico familiar e até mesmo fatores genéticos. Ademais, os estigmas, preconceitos e visões pessoais dos profissionais de saúde e familiares torna-se um empecilho na manutenção da vida do paciente, onde encontram-se divergências de profissionais sobre a conduta de cuidado que se deve prestar, ficando estes divididos em: prestar os cuidados, mesmo que estes sejam paliativos para que se possa garantir conforto e dignidade; e não prestar cuidados, sobretudo medicamentosos, devido ao gasto "desnecessário" de tempo, recurso e mão de obra.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>CONCLUSÃO: Apesar destas barreiras, alguns profissionais têm interesse de evoluir em suas práticas e conhecimentos assistenciais e psicológicos para uma melhor prestação de seus serviços, de forma que um paciente assistido por um enfermeiro e sua equipe, possui chances de tratamento adequado, diminuição dos riscos de complicações, de seus sinais e sintomas e uma melhor qualidade de vida ou fim de vida dignos, além do aporte psicológico para inserção em meio familiar e social.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>REFERÊNCIAS: 1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasil. Anomalias Congênitas. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/anomalias-congenitas">https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/anomalias-congenitas</a>. 2. Ayse ST, Ayse G, Sevinç P. Nurse's Perceptions of the Palliative Care Needs of Neonates With Multiple Congenital Anomalies. Journal of Hospice (#38) Palliative Nursing. 2020. Disponível em: <a href="https://www.jhpn.com">https://www.jhpn.com</a>. 3. Nicki L. Potts, Bárbara L Mandleco. Pediatric Nursing: Caring For Children And Their Families. Delmar. 3ª edição. 2011. Disponível em: <a href="https://vdoc.pub/documents/pediatric-nursing-caring-for-children-and-their-families-7sims61ng80">https://vdoc.pub/documents/pediatric-nursing-caring-for-children-and-their-families-7sims61ng80</a>.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14225	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3024148 - LETICIA DE ARAUJO FARIAS DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A adesão à lavagem das mãos é a forma adequada na prevenção de infecções e propagação de contaminação, sendo ela a condição de fácil acesso a todos. O termo "higiene das mãos" foi adotado recentemente no Brasil, a iniciativa é assegurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias estaduais/DF/Municipais e com a constante parceria da Organização Pan-Americana da Saúde(OPAS/OMS).			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a adesão da técnica correta de higienização das mãos mensurada pelo treinamento aplicado e a postura diante dos 5 passos, implementado no Hospital Municipal Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo descritivo com relatos de experiências vividas e ações aplicadas no campo de estágio de Gestão hospitalar pelos alunos do 8º semestre de Enfermagem da Universidade Santo Amaro. Participaram do estudo 35 profissionais da enfermagem do Hospital Municipal Capela Do Socorro, em São Paulo. Os profissionais foram categorizados de acordo com seu setor de atuação, sendo identificados como enfermarias A, B e C e Acolhimento. Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos, através do uso da caixa de luz específica e creme de proteção visível à luz.			
<b>RESULTADOS</b>	Após a implementação do estudo, foi concluído que apesar da técnica de lavagem das mãos apresentar evidências científicas bem estabelecidas, seu uso correto ainda é subestimado. O acolhimento foi o setor com maior adesão ao treinamento dinâmico, no entanto, obteve a maior taxa de técnica incorreta em comparação aos demais setores. As enfermarias apresentaram uma taxa mais equilibrada, uma vez que a não adesão à técnica neste setor, característico de um cuidado mais íntimo, acarretará maiores chances de infecções. No geral, 51,4% (n=18) obteve um resultado satisfatório e contemplou todos os passos propostos pela técnica. Assim, 48,6% (n=17) apresentou em um ou mais passos, alguma falha no processo, levando assim à técnica incompleta			
<b>CONCLUSÕES</b>	A prática da higiene das mãos é de suma importância na prevenção de enfermidades. Este ato, aparentemente simples, desempenha um papel crucial no processo de cuidado, não apenas removendo sujidades visíveis, mas também combatendo microrganismos que podem ocasionar diversas patologias. Para efetuarmos uma lavagem efetiva, é fundamental seguir a técnica correta de higienização e os 5 momentos de higienizar as mãos. Além disso, ao removermos os microrganismos das mãos, a lavagem correta impossibilita e interrompe a possibilidade de transmissão para outras pessoas ou superfícies, contribuindo significativamente para a quebra da cadeia de transmissão de doenças.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12º de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834-6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14225	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4378288 - RAYSSA VESTRI SAMPAIO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A adesão à lavagem das mãos é a forma adequada na prevenção de infecções e propagação de contaminação, sendo ela a condição de fácil acesso a todos. O termo "higiene das mãos" foi adotado recentemente no Brasil, a iniciativa é assegurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias estaduais/DF/Municipais e com a constante parceria da Organização Pan-Americana da Saúde(OPAS/OMS).			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a adesão da técnica correta de higienização das mãos mensurada pelo treinamento aplicado e a postura diante dos 5 passos, implementado no Hospital Municipal Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo descritivo com relatos de experiências vividas e ações aplicadas no campo de estágio de Gestão hospitalar pelos alunos do 8º semestre de Enfermagem da Universidade Santo Amaro. Participaram do estudo 35 profissionais da enfermagem do Hospital Municipal Capela Do Socorro, em São Paulo. Os profissionais foram categorizados de acordo com seu setor de atuação, sendo identificados como enfermarias A, B e C e Acolhimento. Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos, através do uso da caixa de luz específica e creme de proteção visível à luz.			
<b>RESULTADOS</b>	Após a implementação do estudo, foi concluído que apesar da técnica de lavagem das mãos apresentar evidências científicas bem estabelecidas, seu uso correto ainda é subestimado. O acolhimento foi o setor com maior adesão ao treinamento dinâmico, no entanto, obteve a maior taxa de técnica incorreta em comparação aos demais setores. As enfermarias apresentaram uma taxa mais equilibrada, uma vez que a não adesão à técnica neste setor, característico de um cuidado mais íntimo, acarretará maiores chances de infecções. No geral, 51,4% (n=18) obteve um resultado satisfatório e contemplou todos os passos propostos pela técnica. Assim, 48,6% (n=17) apresentou em um ou mais passos, alguma falha no processo, levando assim à técnica incompleta			
<b>CONCLUSÕES</b>	A prática da higiene das mãos é de suma importância na prevenção de enfermidades. Este ato, aparentemente simples, desempenha um papel crucial no processo de cuidado, não apenas removendo sujidades visíveis, mas também combatendo microrganismos que podem ocasionar diversas patologias. Para efetuarmos uma lavagem efetiva, é fundamental seguir a técnica correta de higienização e os 5 momentos de higienizar as mãos. Além disso, ao removermos os microrganismos das mãos, a lavagem correta impossibilita e interrompe a possibilidade de transmissão para outras pessoas ou superfícies, contribuindo significativamente para a quebra da cadeia de transmissão de doenças.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsm.s.saude.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12 de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834-6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14225	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4395182 - WESLEY DA SILVA LAUREANO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A adesão à lavagem das mãos é a forma adequada na prevenção de infecções e propagação de contaminação, sendo ela a condição de fácil acesso a todos. O termo "higiene das mãos" foi adotado recentemente no Brasil, a iniciativa é assegurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias estaduais/DF/Municipais e com a constante parceria da Organização Pan-Americana da Saúde(OPAS/OMS).			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a adesão da técnica correta de higienização das mãos mensurada pelo treinamento aplicado e a postura diante dos 5 passos, implementado no Hospital Municipal Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo descritivo com relatos de experiências vividas e ações aplicadas no campo de estágio de Gestão hospitalar pelos alunos do 8º semestre de Enfermagem da Universidade Santo Amaro. Participaram do estudo 35 profissionais da enfermagem do Hospital Municipal Capela Do Socorro, em São Paulo. Os profissionais foram categorizados de acordo com seu setor de atuação, sendo identificados como enfermarias A, B e C e Acolhimento. Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos, através do uso da caixa de luz específica e creme de proteção visível à luz.			
<b>RESULTADOS</b>	Após a implementação do estudo, foi concluído que apesar da técnica de lavagem das mãos apresentar evidências científicas bem estabelecidas, seu uso correto ainda é subestimado. O acolhimento foi o setor com maior adesão ao treinamento dinâmico, no entanto, obteve a maior taxa de técnica incorreta em comparação aos demais setores. As enfermarias apresentaram uma taxa mais equilibrada, uma vez que a não adesão à técnica neste setor, característico de um cuidado mais íntimo, acarretará maiores chances de infecções. No geral, 51,4% (n=18) obteve um resultado satisfatório e contemplou todos os passos propostos pela técnica. Assim, 48,6% (n=17) apresentou em um ou mais passos, alguma falha no processo, levando assim à técnica incompleta			
<b>CONCLUSÕES</b>	A prática da higiene das mãos é de suma importância na prevenção de enfermidades. Este ato, aparentemente simples, desempenha um papel crucial no processo de cuidado, não apenas removendo sujidades visíveis, mas também combatendo microrganismos que podem ocasionar diversas patologias. Para efetuarmos uma lavagem efetiva, é fundamental seguir a técnica correta de higienização e os 5 momentos de higienizar as mãos. Além disso, ao removermos os microrganismos das mãos, a lavagem correta impossibilita e interrompe a possibilidade de transmissão para outras pessoas ou superfícies, contribuindo significativamente para a quebra da cadeia de transmissão de doenças.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsm.s.saude.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12 de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834-6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14225	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4412222 - GIOVANNA MAXIMIANO SANTOS		2 - Aprovado
				<b>Apresentação</b>
				1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A adesão à lavagem das mãos é a forma adequada na prevenção de infecções e propagação de contaminação, sendo ela a condição de fácil acesso a todos. O termo "higiene das mãos" foi adotado recentemente no Brasil, a iniciativa é assegurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias estaduais/DF/Municipais e com a constante parceria da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a adesão da técnica correta de higienização das mãos mensurada pelo treinamento aplicado e a postura diante dos 5 passos, implementado no Hospital Municipal Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo descritivo com relatos de experiências vividas e ações aplicadas no campo de estágio de Gestão hospitalar pelos alunos do 8º semestre de Enfermagem da Universidade Santo Amaro. Participaram do estudo 35 profissionais da enfermagem do Hospital Municipal Capela Do Socorro, em São Paulo. Os profissionais foram categorizados de acordo com seu setor de atuação, sendo identificados como enfermarias A, B e C e Acolhimento. Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos, através do uso da caixa de luz específica e creme de proteção visível à luz.			
<b>RESULTADOS</b>	Após a implementação do estudo, foi concluído que apesar da técnica de lavagem das mãos apresentar evidências científicas bem estabelecidas, seu uso correto ainda é subestimado. O acolhimento foi o setor com maior adesão ao treinamento dinâmico, no entanto, obteve a maior taxa de técnica incorreta em comparação aos demais setores. As enfermarias apresentaram uma taxa mais equilibrada, uma vez que a não adesão à técnica neste setor, característico de um cuidado mais íntimo, acarretará maiores chances de infecções. No geral, 51,4% (n=18) obteve um resultado satisfatório e contemplou todos os passos propostos pela técnica. Assim, 48,6% (n=17) apresentou em um ou mais passos, alguma falha no processo, levando assim à técnica incompleta			
<b>CONCLUSÕES</b>	A prática da higiene das mãos é de suma importância na prevenção de enfermidades. Este ato, aparentemente simples, desempenha um papel crucial no processo de cuidado, não apenas removendo sujidades visíveis, mas também combatendo microrganismos que podem ocasionar diversas patologias. Para efetuarmos uma lavagem efetiva, é fundamental seguir a técnica correta de higienização e os 5 momentos de higienizar as mãos. Além disso, ao removermos os microrganismos das mãos, a lavagem correta impossibilita e interrompe a possibilidade de transmissão para outras pessoas ou superfícies, contribuindo significativamente para a quebra da cadeia de transmissão de doenças.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsms.saude.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsms.saude.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12 de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834-6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14226	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4284640 - LUZINETE NUNES DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O termo "lavagem das mãos" foi substituído por "higienização das mãos" porque este procedimento é mais abrangente. Este termo abrange tudo, desde a simples higiene das mãos até antissepsia cirúrgica das mãos. Sendo assim, foi realizado uma dinâmica interativa com o intuito de conscientização da importância da higienização das mãos de forma correta e como pode impactar em nosso dia a dia a não realização eficaz tanto do passo a passo quanto dos cinco momentos da higienização das mãos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência do índice de higienização das mãos aderida ao treinamento e a orientar os participantes de acordo com os 5 passos, implementado no Hospital da Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do estudo profissionais da equipe Multiprofissional totalizando 27 colaboradores da instituição Hospital Municipal Capela Do Socorro, São Paulo. Os profissionais foram categorizados em nove setores: profissionais das Enfermarias A e C, sala de gesso, farmácia, acolhimento central, administração, recepção, EMAD, SCIH, Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos proposto pelo Ministério da Saúde, através do uso da caixa de luz e creme específicos.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a aplicação da dinâmica foi constatado que a maioria dos participantes não se recordava do passo a passo da higienização das mãos necessitando relembrar a forma mais eficiente de realizar esse procedimento e mesmo que os indivíduos realizassem o passo a passo e não atingisse todas as áreas das mãos era notificado ao mesmo os maiores pontos de oportunidades de melhoria. Contudo, houve uma grande adesão a dinâmica com uma alta taxa de higienização das mãos eficaz.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Diante dos fatos supracitados conclui-se que a adequada higienização das mãos deve ser conscientizada e reafirmada como principal método profilático contra infecções associadas a assistência à saúde, sendo que, em âmbito hospitalar a higienização deve ser criteriosa com o intuito de diminuir o início das infecções cruzadas, todavia, o compromisso e a responsabilidade ética está concedida aos profissionais responsáveis no cuidado ao paciente no qual a deficiência da execução da técnica correta pode conferir o aumento das infecções hospitalares necessitando da fiscalização mais rigorosa quanto a realização desta conduta em ambiente hospitalar. Portanto, foi observado que a higienização das mãos correta foi de 69,2% e incorretas 30,8% da equipe multidisciplinar já na equipe administrativa foi o índice de 71,4 % correto e incorreto foram 28,6 %, deste modo, é necessário uma maior atenção para a equipe multidisciplinar já que possui um maior contato beira leito com o paciente propiciando um maior índice de contaminação cruzada, mesmo sendo uma atitude simples, rotineira, todavia é preciso salutar a participação de todos os profissionais para o controle e prevenção das infecções no qual é indispensável repensar a prática profissional, enquanto facilitadores do controle de infecção, nos processos de educação permanente, visando à profilaxia e controle de infecção em serviços de saúde. É preciso mudança no foco e estratégias, para aumentar as taxas de aderências à higienização das mãos para atingir a ação esperada,			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsm.sau.de.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsm.sau.de.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Brito LSC. Evidências à intervenção de enfermagem "Controle de Infecção" da Classificação das Intervenções de Enfermagem: orientação e ensino sobre a lavagem das mãos. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO. [Internet]. 2015. [acesso:em 25 mar.2023] Disponível em: <a href="https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132011/000850589.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y">https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132011/000850589.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y</a> 3. Da M, Padrão C, Monteiro M, Maciel N, Freitas F, Fazoleli Viana C, et al. Prevalência de infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva* Prevalence of nosocomial infection in intensive care unit ARTIGO ORIGINAL [Internet]. Available from: <a href="http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf">http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf</a> 4. Silveira Siqueira D, da Silva Lemos K, Franco da Silva E. INFECÇÃO DE CORRENTE SANGÜÍNEA ASSOCIADA A MANUSEIO DE CATETER VENOSO CENTRAL: REVISÃO INTEGRATIVA. RECISATEC [Internet]. 2º de março de 2023 [citado 4º de setembro de 2023];3(3):e33257. Disponível em: <a href="https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257">https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257</a> 5. Torre FPFL, Baldanzi G, Troster EJ. Fatores de risco para infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateter em unidades de terapia intensiva pediátrica. Rev bras ter intensiva [Internet]. 2023 [citado 12º de setembro de 2023];2018Oct;30(4):436–42. Available from: <a href="https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066">https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066</a> 6. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12º de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834–6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> 7. Azi LMT de A, Fonseca NM, Linard LG. SBA 2020: Regional anesthesia safety recommendations update(#38)#9734;. Rev Bras Anestesiol [Internet]. [citado 12º de setembro de 2023] 2020Jul;70(4):398–418. Available from: <a href="https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01">https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14226	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4363019 - MARIA DO ROSARIO SILVA COELHO DE LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O termo "lavagem das mãos" foi substituído por "higienização das mãos" porque este procedimento é mais abrangente. Este termo abrange tudo, desde a simples higiene das mãos até antisepsia cirúrgica das mãos. Sendo assim, foi realizado uma dinâmica interativa com o intuito de conscientização da importância da higienização das mãos de forma correta e como pode impactar em nosso dia a dia a não realização eficaz tanto do passo a passo quanto dos cinco momentos da higienização das mãos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência do índice de higienização das mãos aderida ao treinamento e a orientar os participantes de acordo com os 5 passos, implementado no Hospital da Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do estudo profissionais da equipe Multiprofissional totalizando 27 colaboradores da instituição Hospital Municipal Capela Do Socorro, São Paulo. Os profissionais foram categorizados em nove setores: profissionais das Enfermarias A e C, sala de gesso, farmácia, acolhimento central, administração, recepção, EMAD, SCIH, Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos proposto pelo Ministério da Saúde, através do uso da caixa de luz e creme específicos.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a aplicação da dinâmica foi constatado que a maioria dos participantes não se recordava do passo a passo da higienização das mãos necessitando relembrar a forma mais eficiente de realizar esse procedimento e mesmo que os indivíduos realizassem o passo a passo e não atingisse todas as áreas das mãos era notificado ao mesmo os maiores pontos de oportunidades de melhoria. Contudo, houve uma grande adesão a dinâmica com uma alta taxa de higienização das mãos eficaz.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Diante dos fatos supracitados conclui-se que a adequada higienização das mãos deve ser conscientizada e reafirmada como principal método profilático contra infecções associadas a assistência à saúde, sendo que, em âmbito hospitalar a higienização deve ser criteriosa com o intuito de dirimir o início das infecções cruzadas, todavia, o compromisso e a responsabilidade ética está concedida aos profissionais responsáveis no cuidado ao paciente no qual a deficiência da execução da técnica correta pode conferir o aumento das infecções hospitalares necessitando da fiscalização mais rigorosa quanto a realização desta conduta em ambiente hospitalar. Portanto, foi observado que a higienização das mãos correta foi de 69,2% e incorretas 30,8% da equipe multidisciplinar já na equipe administrativa foi o índice de 71,4 % correto e incorreto foram 28,6 %, deste modo, é necessário uma maior atenção para a equipe multidisciplinar já que possui um maior contato beira leito com o paciente propiciando um maior índice de contaminação cruzada, mesmo sendo uma atitude simples, rotineira, todavia é preciso salutar a participação de todos os profissionais para o controle e prevenção das infecções no qual é indispensável repensar a prática profissional, enquanto facilitadores do controle de infecção, nos processos de educação permanente, visando à profilaxia e controle de infecção em serviços de saúde. É preciso mudança no foco e estratégias, para aumentar as taxas de aderências à higienização das mãos para atingir a ação esperada,			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Brito LSC. Evidências à intervenção de enfermagem "Controle de Infecção" da Classificação das Intervenções de Enfermagem: orientação e ensino sobre a lavagem das mãos. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO. [Internet]. 2015. [acesso:em 25 mar.2023] Disponível em: <a href="https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132011/000850589.pdf?sequence=1">#38</a> )isAllowed=y 3. 1. Da M, Padrão C, Monteiro M, Maciel N, Freitas F, Fazoli Viana C, et al. Prevalência de infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva" Prevalence of nosocomial infection in intensive care unit ARTIGO ORIGINAL [Internet]. Available from: <a href="http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf">http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf</a> 4. . Silveira Siqueira D, da Silva Lemos K, Franco da Silva E. INFECÇÃO DE CORRENTE SANGÜÍNEA ASSOCIADA A MANUSEIO DE CATETER VENOSO CENTRAL: REVISÃO INTEGRATIVA. RECISATEC [Internet]. 2º de março de 2023 [citado 4º de setembro de 2023];3(3):e33257. Disponível em: <a href="https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257">https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257</a> 5. Torre FPFL, Baldanzi G, Troster E.J. Fatores de risco para infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateter em unidades de terapia intensiva pediátrica. Rev bras ter intensiva [Internet]. 2023 [citado 12º de setembro de 2023];2018Oct;30(4):436–42. Available from: <a href="https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066">https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066</a> 6. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12º de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834–6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> . 7. Azi LMT de A, Fonseca NM, Linard LG. SBA 2020: Regional anesthesia safety recommendations update(#38)#9734;. Rev Bras Anestesiol [Internet]. [citado 12º de setembro de 2023] 2020Jul;70(4):398–418. Available from: <a href="https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01">https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14226	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4409779 - NICOLE VITORIA SANTANA MIRANDA BATISTA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O termo "lavagem das mãos" foi substituído por "higienização das mãos" porque este procedimento é mais abrangente. Este termo abrange tudo, desde a simples higiene das mãos até antisepsia cirúrgica das mãos. Sendo assim, foi realizado uma dinâmica interativa com o intuito de conscientização da importância da higienização das mãos de forma correta e como pode impactar em nosso dia a dia a não realização eficaz tanto do passo a passo quanto dos cinco momentos da higienização das mãos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência do índice de higienização das mãos aderida ao treinamento e a orientar os participantes de acordo com os 5 passos, implementado no Hospital da Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do estudo profissionais da equipe Multiprofissional totalizando 27 colaboradores da instituição Hospital Municipal Capela Do Socorro, São Paulo. Os profissionais foram categorizados em nove setores: profissionais das Enfermarias A e C, sala de gesso, farmácia, acolhimento central, administração, recepção, EMAD, SCIH, Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos proposto pelo Ministério da Saúde, através do uso da caixa de luz e creme específicos.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a aplicação da dinâmica foi constatado que a maioria dos participantes não se recordava do passo a passo da higienização das mãos necessitando relembrar a forma mais eficiente de realizar esse procedimento e mesmo que os indivíduos realizassem o passo a passo e não atingisse todas as áreas das mãos era notificado ao mesmo os maiores pontos de oportunidades de melhoria. Contudo, houve uma grande adesão a dinâmica com uma alta taxa de higienização das mãos eficaz.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Diante dos fatos supracitados conclui-se que a adequada higienização das mãos deve ser conscientizada e reafirmada como principal método profilático contra infecções associadas a assistência à saúde, sendo que, em âmbito hospitalar a higienização deve ser criteriosa com o intuito de dirimir o início das infecções cruzadas, todavia, o compromisso e a responsabilidade ética está concedida aos profissionais responsáveis no cuidado ao paciente no qual a deficiência da execução da técnica correta pode conferir o aumento das infecções hospitalares necessitando da fiscalização mais rigorosa quanto a realização desta conduta em ambiente hospitalar. Portanto, foi observado que a higienização das mãos correta foi de 69,2% e incorretas 30,8% da equipe multidisciplinar já na equipe administrativa foi o índice de 71,4 % correto e incorreto foram 28,6 %, deste modo, é necessário uma maior atenção para a equipe multidisciplinar já que possui um maior contato beira leito com o paciente propiciando um maior índice de contaminação cruzada, mesmo sendo uma atitude simples, rotineira, todavia é preciso salutar a participação de todos os profissionais para o controle e prevenção das infecções no qual é indispensável repensar a prática profissional, enquanto facilitadores do controle de infecção, nos processos de educação permanente, visando à profilaxia e controle de infecção em serviços de saúde. É preciso mudança no foco e estratégias, para aumentar as taxas de aderências à higienização das mãos para atingir a ação esperada,			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Brito LSC. Evidências à intervenção de enfermagem "Controle de Infecção" da Classificação das Intervenções de Enfermagem: orientação e ensino sobre a lavagem das mãos. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO. [Internet]. 2015. [acesso:em 25 mar.2023] Disponível em: <a href="https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132011/000850589.pdf?sequence=1">#38</a> )isAllowed=y 3. 1. Da M, Padrão C, Monteiro M, Maciel N, Freitas F, Fazoli Viana C, et al. Prevalência de infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva" Prevalence of nosocomial infection in intensive care unit ARTIGO ORIGINAL [Internet]. Available from: <a href="http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf">http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf</a> 4. . Silveira Siqueira D, da Silva Lemos K, Franco da Silva E. INFECÇÃO DE CORRENTE SANGÜÍNEA ASSOCIADA A MANUSEIO DE CATETER VENOSO CENTRAL: REVISÃO INTEGRATIVA. RECISATEC [Internet]. 2º de março de 2023 [citado 4º de setembro de 2023];3(3):e33257. Disponível em: <a href="https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257">https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257</a> 5. Torre FPFL, Baldanzi G, Troster E.J. Fatores de risco para infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateter em unidades de terapia intensiva pediátrica. Rev bras ter intensiva [Internet]. 2023 [citado 12º de setembro de 2023];2018Oct;30(4):436–42. Available from: <a href="https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066">https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066</a> 6. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12º de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834–6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> . 7. Azi LMT de A, Fonseca NM, Linard LG. SBA 2020: Regional anesthesia safety recommendations update(#38)#9734;. Rev Bras Anestesiol [Internet]. [citado 12º de setembro de 2023] 2020Jul;70(4):398–418. Available from: <a href="https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01">https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14226	Enfermagem Médico-Cirúrgica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441541 - ALEXIA LEANDRO SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ellen Maria Hagopian		
<b>TITULO</b>	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO À TÉCNICA CORRETA PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O termo "lavagem das mãos" foi substituído por "higienização das mãos" porque este procedimento é mais abrangente. Este termo abrange tudo, desde a simples higiene das mãos até antissepsia cirúrgica das mãos. Sendo assim, foi realizado uma dinâmica interativa com o intuito de conscientização da importância da higienização das mãos de forma correta e como pode impactar em nosso dia a dia a não realização eficaz tanto do passo a passo quanto dos cinco momentos da higienização das mãos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência do índice de higienização das mãos aderida ao treinamento e a orientar os participantes de acordo com os 5 passos, implementado no Hospital da Capela do Socorro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do estudo profissionais da equipe Multiprofissional totalizando 27 colaboradores da instituição Hospital Municipal Capela Do Socorro, São Paulo. Os profissionais foram categorizados em nove setores: profissionais das Enfermarias A e C, sala de gesso, farmácia, acolhimento central, administração, recepção, EMAD, SCIH, Foram avaliados quanto ao uso correto da técnica de lavagem das mãos proposto pelo Ministério da Saúde, através do uso da caixa de luz e creme específicos.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a aplicação da dinâmica foi constatado que a maioria dos participantes não se recordava do passo a passo da higienização das mãos necessitando relembrar a forma mais eficiente de realizar esse procedimento e mesmo que os indivíduos realizassem o passo a passo e não atingisse todas as áreas das mãos era notificado ao mesmo os maiores pontos de oportunidades de melhoria. Contudo, houve uma grande adesão a dinâmica com uma alta taxa de higienização das mãos eficaz.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Diante dos fatos supracitados conclui-se que a adequada higienização das mãos deve ser conscientizada e reafirmada como principal método profilático contra infecções associadas a assistência à saúde, sendo que, em âmbito hospitalar a higienização deve ser criteriosa com o intuito de diminuir o início das infecções cruzadas, todavia, o compromisso e a responsabilidade ética está concedida aos profissionais responsáveis no cuidado ao paciente no qual a deficiência da execução da técnica correta pode conferir o aumento das infecções hospitalares necessitando da fiscalização mais rigorosa quanto a realização desta conduta em ambiente hospitalar. Portanto, foi observado que a higienização das mãos correta foi de 69,2% e incorretas 30,8% da equipe multidisciplinar já na equipe administrativa foi o índice de 71,4 % correto e incorreto foram 28,6 %, deste modo, é necessário uma maior atenção para a equipe multidisciplinar já que possui um maior contato beira leito com o paciente propiciando um maior índice de contaminação cruzada, mesmo sendo uma atitude simples, rotineira, todavia é preciso salutar a participação de todos os profissionais para o controle e prevenção das infecções no qual é indispensável repensar a prática profissional, enquanto facilitadores do controle de infecção, nos processos de educação permanente, visando à profilaxia e controle de infecção em serviços de saúde. É preciso mudança no foco e estratégias, para aumentar as taxas de aderências à higienização das mãos para atingir a ação esperada,			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Alves B / O / OM. Higienização das mãos na assistência à saúde   Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Available from: <a href="https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os">https://bvsm.sau.gov.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/#:~:text=Para%20que%20higienizar%20as%20m%C3%A3os</a> 2. Brito LSC. Evidências à intervenção de enfermagem "Controle de Infecção" da Classificação das Intervenções de Enfermagem: orientação e ensino sobre a lavagem das mãos. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO. [Internet]. 2015. [acesso:em 25 mar.2023] Disponível em: <a href="https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132011/000850589.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y">https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132011/000850589.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y</a> 3. Da M, Padrão C, Monteiro M, Maciel N, Freitas F, Fazoleli Viana C, et al. Prevalência de infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva* Prevalence of nosocomial infection in intensive care unit ARTIGO ORIGINAL [Internet]. Available from: <a href="http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf">http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2010/v8n2/a007.pdf</a> 4. Silveira Siqueira D, da Silva Lemos K, Franco da Silva E. INFECÇÃO DE CORRENTE SANGÜÍNEA ASSOCIADA A MANUSEIO DE CATETER VENOSO CENTRAL: REVISÃO INTEGRATIVA. RECISATEC [Internet]. 2º de março de 2023 [citado 4º de setembro de 2023];3(3):e33257. Disponível em: <a href="https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257">https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/257</a> 5. Torre FPFL, Baldanzi G, Troster EJ. Fatores de risco para infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateter em unidades de terapia intensiva pediátrica. Rev bras ter intensiva [Internet]. 2023 [citado 12º de setembro de 2023];2018Oct;30(4):436–42. Available from: <a href="https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066">https://doi.org/10.5935/0103-507X.20180066</a> 6. Robazzi ML do CC, Marziale MHP. A norma regulamentadora 32 e suas implicações sobre os trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet] 2023 [citado 12º de setembro de 2023]. 2004Sep;12(5):834–6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019">https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500019</a> 7. Azi LMT de A, Fonseca NM, Linard LG. SBA 2020: Regional anesthesia safety recommendations update(#38)#9734;. Rev Bras Anestesiol [Internet]. [citado 12º de setembro de 2023] 2020Jul;70(4):398–418. Available from: <a href="https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01">https://doi.org/10.1016/j.bjane.2020.04.01</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14227	Administração de Empresas	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4284691 - JULIANA SOUZA SANTANA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alberto dos Santos		
<b>TITULO</b>	O uso da tecnologia para absorção da mão de obra dos surdos no ambiente empresarial.			
<b>INTRODUCA O</b>	Por obrigatoriedade de lei ou por algum aspecto social que seja, é compreensivo que os surdos também tenham uma posição de trabalho no mercado empresarial. Observa-se um empenho cada vez mais presente em se desenvolver tecnologias que possam absorver este público no mercado de trabalho. Surdos não ouvem, mas andam, escrevem, leem e podem tomar decisões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudar e conhecer os aspectos de dificuldade dos surdos diante de cenários que possam promover a utilização desta mão de obra disponível no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Levantamento e análise de dados estatísticos e de pesquisas disponibilizados em sites e livros que possam permitir a compreensão da viabilização da mão de obra dos surdos no mercado de trabalho.			
<b>RESULTADO S</b>	Segundo Freitas (2021), a quantidade de surdos no Brasil é de cerca de 10 milhões de pessoas, das quais 2,7 milhões têm 100% da audição comprometida. Após ser regulamentada através do decreto nº 5.626 de 22 dezembro de 2005, o ensino de Libras passou a ser obrigatório no processo de formação de professores, garantindo assim, o desenvolvimento na educação da pessoa surda.			
<b>CONCLUSOES</b>	As evidências e pesquisas, revelam que, mais e mais as empresas estão utilizando a mão de obra dos surdos. Isto gera ganhos para as empresas e garante o processo contínuo da busca por sustentabilidade.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FREITAS, Karina. Dia Internacional da Linguagem de Sinais procura promover a inclusão de pessoas surdas. 23 de set de 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://www.al.sp.gov.br/noticia/723/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62">https://www.al.sp.gov.br/noticia/723/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62</a>. Acesso em: 12 de set de 2023. Lei nº 10436 de 24 de abril de 2022. [2002]. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm</a>. Acesso em 14 de set de 2023. Lei nº 14.191 de 3 de agosto de 2021. Presidência da República. 03 de agosto de 2021. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm</a>. Acesso em: 19 de set de 2023. OLIVEIRA, Adriane Silva de Abreu; ABREU, Cristiana Silva de; BRAUNA, Mayara Priscila; OLIVEIRA, Neuzenir Silva de Abreu; OLIVEIRA, Santino de. Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 22, nº 18, 17 de maio de 2022. Disponível em: <a href="https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar">https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar</a>. Acesso em: 21 de set de 2023. PLANALTO, 2015. Disponível em: L13146 (planalto.gov.br) Acesso em: 05 set. 2023. SIGNUMWEB, 2023. Disponível em: (#60) SignumWeb   Acessibilidade comunicativa entre empresas e pessoas surdas. (#62). Acesso em: 26 set. 2023. SILVA, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Disponível em: (#60) <a href="https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62">https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62</a>. Acesso em 12 de set de 2023. SILVA, Deise Souza da. Surdez e mercado de trabalho: a escolha profissional dos surdos. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Libras – EAD) - Instituto Federal da Paraíba, Patos, 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14227	Administração de Empresas	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4348826 - IGOR GOMES DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alberto dos Santos		
<b>TITULO</b>	O uso da tecnologia para absorção da mão de obra dos surdos no ambiente empresarial.			
<b>INTRODUCAO</b>	Por obrigatoriedade de lei ou por algum aspecto social que seja, é compreensivo que os surdos também tenham uma posição de trabalho no mercado empresarial. Observa-se um empenho cada vez mais presente em se desenvolver tecnologias que possam absorver este público no mercado de trabalho. Surdos não ouvem, mas andam, escrevem, leem e podem tomar decisões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudar e conhecer os aspectos de dificuldade dos surdos diante de cenários que possam promover a utilização desta mão de obra disponível no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Levantamento e análise de dados estatísticos e de pesquisas disponibilizados em sites e livros que possam permitir a compreensão da viabilização da mão de obra dos surdos no mercado de trabalho.			
<b>RESULTADOS</b>	Segundo Freitas (2021), a quantidade de surdos no Brasil é de cerca de 10 milhões de pessoas, das quais 2,7 milhões têm 100% da audição comprometida. Após ser regulamentada através do decreto nº 5.626 de 22 dezembro de 2005, o ensino de Libras passou a ser obrigatório no processo de formação de professores, garantindo assim, o desenvolvimento na educação da pessoa surda.			
<b>CONCLUSOES</b>	As evidências e pesquisas, revelam que, mais e mais as empresas estão utilizando a mão de obra dos surdos. Isto gera ganhos para as empresas e garante o processo contínuo da busca por sustentabilidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FREITAS, Karina. Dia Internacional da Linguagem de Sinais procura promover a inclusão de pessoas surdas. 23 de set de 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://www.al.sp.gov.br/noticia/723/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62">https://www.al.sp.gov.br/noticia/723/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62</a>. Acesso em: 12 de set de 2023. Lei nº 10436 de 24 de abril de 2022. [2002]. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm</a>. Acesso em 14 de set de 2023. Lei nº 14.191 de 3 de agosto de 2021. Presidência da República. 03 de agosto de 2021. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm</a>. Acesso em: 19 de set de 2023. OLIVEIRA, Adriane Silva de Abreu; ABREU, Cristiana Silva de; BRAUNA, Mayara Priscila; OLIVEIRA, Neuzenir Silva de Abreu; OLIVEIRA, Santino de. Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 22, nº 18, 17 de maio de 2022. Disponível em: <a href="https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar">https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar</a>. Acesso em: 21 de set de 2023. PLANALTO, 2015. Disponível em: L13146 (planalto.gov.br) Acesso em: 05 set. 2023. SIGNUMWEB, 2023. Disponível em: (#60) SignumWeb   Acessibilidade comunicativa entre empresas e pessoas surdas. (#62). Acesso em: 26 set. 2023. SILVA, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Disponível em: (#60) <a href="https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62">https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62</a>. Acesso em 12 de set de 2023. SILVA, Deise Souza da. Surdez e mercado de trabalho: a escolha profissional dos surdos. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Libras – EAD) - Instituto Federal da Paraíba, Patos, 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14227	Administração de Empresas	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4362233 - KETHELEN TAISA SANTIAGO DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alberto dos Santos		
<b>TITULO</b>	O uso da tecnologia para absorção da mão de obra dos surdos no ambiente empresarial.			
<b>INTRODUCA O</b>	Por obrigatoriedade de lei ou por algum aspecto social que seja, é compreensivo que os surdos também tenham uma posição de trabalho no mercado empresarial. Observa-se um empenho cada vez mais presente em se desenvolver tecnologias que possam absorver este público no mercado de trabalho. Surdos não ouvem, mas andam, escrevem, leem e podem tomar decisões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudar e conhecer os aspectos de dificuldade dos surdos diante de cenários que possam promover a utilização desta mão de obra disponível no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Levantamento e análise de dados estatísticos e de pesquisas disponibilizados em sites e livros que possam permitir a compreensão da viabilização da mão de obra dos surdos no mercado de trabalho.			
<b>RESULTADO S</b>	Segundo Freitas (2021), a quantidade de surdos no Brasil é de cerca de 10 milhões de pessoas, das quais 2,7 milhões têm 100% da audição comprometida. Após ser regulamentada através do decreto nº 5.626 de 22 dezembro de 2005, o ensino de Libras passou a ser obrigatório no processo de formação de professores, garantindo assim, o desenvolvimento na educação da pessoa surda.			
<b>CONCLUSOES</b>	As evidências e pesquisas, revelam que, mais e mais as empresas estão utilizando a mão de obra dos surdos. Isto gera ganhos para as empresas e garante o processo contínuo da busca por sustentabilidade.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FREITAS, Karina. Dia Internacional da Linguagem de Sinais procura promover a inclusão de pessoas surdas. 23 de set de 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://www.al.sp.gov.br/noticia/?23/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62">https://www.al.sp.gov.br/noticia/?23/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62</a>. Acesso em: 12 de set de 2023. Lei nº 10436 de 24 de abril de 2022. [2002]. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm</a>. Acesso em 14 de set de 2023. Lei nº 14.191 de 3 de agosto de 2021. Presidência da República. 03 de agosto de 2021. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/14191.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/14191.htm</a>. Acesso em: 19 de set de 2023. OLIVEIRA, Adriane Silva de Abreu; ABREU, Cristiana Silva de; BRAUNA, Mayara Priscila; OLIVEIRA, Neuzenir Silva de Abreu; OLIVEIRA, Santino de. Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 22, nº 18, 17 de maio de 2022. Disponível em: <a href="https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar">https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar</a>. Acesso em: 21 de set de 2023. PLANALTO, 2015. Disponível em: L13146 (planalto.gov.br) Acesso em: 05 set. 2023. SIGNUMWEB, 2023. Disponível em: (#60) SignumWeb   Acessibilidade comunicativa entre empresas e pessoas surdas. (#62). Acesso em: 26 set. 2023. SILVA, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Disponível em: (#60) <a href="https://brasilecola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62">https://brasilecola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62</a>. Acesso em 12 de set de 2023. SILVA, Deise Souza da. Surdez e mercado de trabalho: a escolha profissional dos surdos. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Libras – EAD) - Instituto Federal da Paraíba, Patos, 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14227	Administração de Empresas	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4431111 - WELLINGTON LISBOA DAS NEVES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alberto dos Santos		
<b>TITULO</b>	O uso da tecnologia para absorção da mão de obra dos surdos no ambiente empresarial.			
<b>INTRODUCA O</b>	Por obrigatoriedade de lei ou por algum aspecto social que seja, é compreensivo que os surdos também tenham uma posição de trabalho no mercado empresarial. Observa-se um empenho cada vez mais presente em se desenvolver tecnologias que possam absorver este público no mercado de trabalho. Surdos não ouvem, mas andam, escrevem, leem e podem tomar decisões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudar e conhecer os aspectos de dificuldade dos surdos diante de cenários que possam promover a utilização desta mão de obra disponível no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Levantamento e análise de dados estatísticos e de pesquisas disponibilizados em sites e livros que possam permitir a compreensão da viabilização da mão de obra dos surdos no mercado de trabalho.			
<b>RESULTADO S</b>	Segundo Freitas (2021), a quantidade de surdos no Brasil é de cerca de 10 milhões de pessoas, das quais 2,7 milhões têm 100% da audição comprometida. Após ser regulamentada através do decreto nº 5.626 de 22 dezembro de 2005, o ensino de Libras passou a ser obrigatório no processo de formação de professores, garantindo assim, o desenvolvimento na educação da pessoa surda.			
<b>CONCLUSOES</b>	As evidências e pesquisas, revelam que, mais e mais as empresas estão utilizando a mão de obra dos surdos. Isto gera ganhos para as empresas e garante o processo contínuo da busca por sustentabilidade.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FREITAS, Karina. Dia Internacional da Linguagem de Sinais procura promover a inclusão de pessoas surdas. 23 de set de 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://www.al.sp.gov.br/noticia/?23/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62">https://www.al.sp.gov.br/noticia/?23/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62</a>. Acesso em: 12 de set de 2023. Lei nº 10436 de 24 de abril de 2022. [2002]. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm</a>. Acesso em 14 de set de 2023. Lei nº 14.191 de 3 de agosto de 2021. Presidência da República. 03 de agosto de 2021. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm</a>. Acesso em: 19 de set de 2023. OLIVEIRA, Adriane Silva de Abreu; ABREU, Cristiana Silva de; BRAUNA, Mayara Priscila; OLIVEIRA, Neuzenir Silva de Abreu; OLIVEIRA, Santino de. Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 22, nº 18, 17 de maio de 2022. Disponível em: <a href="https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar">https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar</a>. Acesso em: 21 de set de 2023. PLANALTO, 2015. Disponível em: L13146 (planalto.gov.br) Acesso em: 05 set. 2023. SIGNUMWEB, 2023. Disponível em: (#60) SignumWeb   Acessibilidade comunicativa entre empresas e pessoas surdas. (#62). Acesso em: 26 set. 2023. SILVA, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Disponível em: (#60) <a href="https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62">https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62</a>. Acesso em 12 de set de 2023. SILVA, Deise Souza da. Surdez e mercado de trabalho: a escolha profissional dos surdos. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Libras – EAD) - Instituto Federal da Paraíba, Patos, 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14227	Administração de Empresas	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517865 - ANDRELI LUIZA DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alberto dos Santos		
<b>TITULO</b>	O uso da tecnologia para absorção da mão de obra dos surdos no ambiente empresarial.			
<b>INTRODUCA O</b>	Por obrigatoriedade de lei ou por algum aspecto social que seja, é compreensivo que os surdos também tenham uma posição de trabalho no mercado empresarial. Observa-se um empenho cada vez mais presente em se desenvolver tecnologias que possam absorver este público no mercado de trabalho. Surdos não ouvem, mas andam, escrevem, leem e podem tomar decisões.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudar e conhecer os aspectos de dificuldade dos surdos diante de cenários que possam promover a utilização desta mão de obra disponível no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Levantamento e análise de dados estatísticos e de pesquisas disponibilizados em sites e livros que possam permitir a compreensão da viabilização da mão de obra dos surdos no mercado de trabalho.			
<b>RESULTADO S</b>	Segundo Freitas (2021), a quantidade de surdos no Brasil é de cerca de 10 milhões de pessoas, das quais 2,7 milhões têm 100% da audição comprometida. Após ser regulamentada através do decreto nº 5.626 de 22 dezembro de 2005, o ensino de Libras passou a ser obrigatório no processo de formação de professores, garantindo assim, o desenvolvimento na educação da pessoa surda.			
<b>CONCLUSOES</b>	As evidências e pesquisas, revelam que, mais e mais as empresas estão utilizando a mão de obra dos surdos. Isto gera ganhos para as empresas e garante o processo contínuo da busca por sustentabilidade.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FREITAS, Karina. Dia Internacional da Linguagem de Sinais procura promover a inclusão de pessoas surdas. 23 de set de 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://www.al.sp.gov.br/noticia/723/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62">https://www.al.sp.gov.br/noticia/723/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-#62</a>. Acesso em: 12 de set de 2023. Lei nº 10436 de 24 de abril de 2022. [2002]. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm</a>. Acesso em 14 de set de 2023. Lei nº 14.191 de 3 de agosto de 2021. Presidência da República. 03 de agosto de 2021. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14191.htm</a>. Acesso em: 19 de set de 2023. OLIVEIRA, Adriane Silva de Abreu; ABREU, Cristiana Silva de; BRAUNA, Mayara Priscila; OLIVEIRA, Neuzenir Silva de Abreu; OLIVEIRA, Santino de. Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 22, nº 18, 17 de maio de 2022. Disponível em: <a href="https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar">https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar</a>. Acesso em: 21 de set de 2023. PLANALTO, 2015. Disponível em: L13146 (planalto.gov.br) Acesso em: 05 set. 2023. SIGNUMWEB, 2023. Disponível em: (#60) SignumWeb   Acessibilidade comunicativa entre empresas e pessoas surdas. (#62). Acesso em: 26 set. 2023. SILVA, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Disponível em: (#60) <a href="https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62">https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm#62</a>. Acesso em 12 de set de 2023. SILVA, Deise Souza da. Surdez e mercado de trabalho: a escolha profissional dos surdos. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Libras – EAD) - Instituto Federal da Paraíba, Patos, 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14228	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3776093 - MARIA EDUARDA PEREIRA DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	RECLUSÃO E ESTIGMA: A OPINIÃO SOCIAL SOBRE OS DETENTOS BRASILEIROS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os atos infracionais geram sentimento de revolta e indignação popular. Ao ser atingida pela criminalidade, a sociedade reivindica seu direito comunitário de punir o transgressor através da participação ativa de todos os seus agentes: seja diretamente através do Estado, ou indiretamente através do próprio fazer social. A sociedade, por meio do imaginário popular, perpetua o estereótipo de infrator através da estigmatização e marginalização dos indivíduos em situação de encarceramento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os comentários virtuais feitos sobre o sistema prisional brasileiro em publicações jornalísticas da rede social Twitter.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os dados foram coletados através da ferramenta de busca-avançada do Twitter. Foram filtradas publicações feitas pelo perfil G1, no período de 2020 a 2022, com as palavras-chaves "detentos" e "sistema prisional". Publicações que abordavam casos de grande repercussão midiática, como prisões de pessoas públicas e rebeliões entre facções, não foram consideradas para este estudo. Após a seleção das postagens, segundo os critérios estabelecidos, os comentários com discurso estigmatizante foram contabilizados e transcritos integralmente em uma planilha e analisados de acordo com o referencial teórico utilizado na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Nos anos de 2020 a 2022, a palavra-chave "detentos" reuniu 12 publicações com 115 comentários classificados como estigmatizantes. Já a palavra-chave 'sistema prisional' contabilizou 4 publicações com 30 comentários classificados como estigmatizantes. As temáticas encontradas foram de violência extrema, sugerindo medidas de pena de morte e tortura; comentários sarcásticos; visões simplistas, categorizadas por atribuir o fenômeno da criminalidade apenas ao sujeito infrator; e comentários de indiferença, classificados através de palavras curtas e ou com descrições apáticas diante da situação noticiada. Compreendidas através do fenômeno do punitivismo, conceito caracterizado por medidas e ideologias estabelecidas que propõem o endurecimento de penas e o encarceramento em massa como forma de combater a criminalidade, tais discursos demonstram a visão social limitada ante o multifacetado fenômeno da criminalidade e o desejo comunitário em punir ao invés de reintegrar, marginalizar e eliminar os sujeitos em situação de encarceramento (Domingues, 2022; Foucault, 1975; Reuter, 2016)			
<b>CONCLUSOES</b>	As crenças sociais relativas à pessoa encarcerada, demonstraram-se enraizadas em discursos estigmatizantes e punitivistas, além de visões simplistas sobre fenômenos sociais complexos.			
<b>REFERENCIAS</b>	DOMINGUES, Cleber Rogério Rodrigues. CULTURA PUNITIVISTA NA JURISDIÇÃO UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O ENCARCERAMENTO E SEUS REFLEXOS SOCIAIS. Pesquisas e Inovações em Ciências Humanas e Sociais: Produções Científicas Multidisciplinares no Século XXI, Volume 2, [S.L.], p. 313-317, 2 set. 2022. Instituto Scientia. <a href="http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19">http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19</a> . FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 1975. 302 p. 9-88 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira; PEREIRA, Marcos Emanuel (org.). Estereótipos, preconceitos e discriminação: perspectivas teóricas e metodológicas. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2004. Disponível em: <a href="https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%2C%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20R1.pdf">https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%2C%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20R1.pdf</a> . Acesso em: 17 set. 2023. REUTER, Cristina. O Trabalho do Psicólogo em prisões. 2016. Disponível em: <a href="https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf">https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf</a> . Acesso em: 27 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14228	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4397754 - JULIA SILVA DE LIMA FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	RECLUSÃO E ESTIGMA: A OPINIÃO SOCIAL SOBRE OS DETENTOS BRASILEIROS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os atos infracionais geram sentimento de revolta e indignação popular. Ao ser atingida pela criminalidade, a sociedade reivindica seu direito comunitário de punir o transgressor através da participação ativa de todos os seus agentes: seja diretamente através do Estado, ou indiretamente através do próprio fazer social. A sociedade, por meio do imaginário popular, perpetua o estereótipo de infrator através da estigmatização e marginalização dos indivíduos em situação de encarceramento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os comentários virtuais feitos sobre o sistema prisional brasileiro em publicações jornalísticas da rede social Twitter.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os dados foram coletados através da ferramenta de busca-avançada do Twitter. Foram filtradas publicações feitas pelo perfil G1, no período de 2020 a 2022, com as palavras-chaves "detentos" e "sistema prisional". Publicações que abordavam casos de grande repercussão midiática, como prisões de pessoas públicas e rebeliões entre facções, não foram consideradas para este estudo. Após a seleção das postagens, segundo os critérios estabelecidos, os comentários com discurso estigmatizante foram contabilizados e transcritos integralmente em uma planilha e analisados de acordo com o referencial teórico utilizado na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Nos anos de 2020 a 2022, a palavra-chave "detentos" reuniu 12 publicações com 115 comentários classificados como estigmatizantes. Já a palavra-chave 'sistema prisional' contabilizou 4 publicações com 30 comentários classificados como estigmatizantes. As temáticas encontradas foram de violência extrema, sugerindo medidas de pena de morte e tortura; comentários sarcásticos; visões simplistas, categorizadas por atribuir o fenômeno da criminalidade apenas ao sujeito infrator; e comentários de indiferença, classificados através de palavras curtas e ou com descrições apáticas diante da situação noticiada. Compreendidas através do fenômeno do punitivismo, conceito caracterizado por medidas e ideologias estabelecidas que propõem o endurecimento de penas e o encarceramento em massa como forma de combater a criminalidade, tais discursos demonstram a visão social limitada ante o multifacetado fenômeno da criminalidade e o desejo comunitário em punir ao invés de reintegrar, marginalizar e eliminar os sujeitos em situação de encarceramento (Domingues, 2022; Foucault, 1975; Reuter, 2016)			
<b>CONCLUSÕES</b>	As crenças sociais relativas à pessoa encarcerada, demonstraram-se enraizadas em discursos estigmatizantes e punitivistas, além de visões simplistas sobre fenômenos sociais complexos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	DOMINGUES, Cleber Rogério Rodrigues. CULTURA PUNITIVISTA NA JURISDIÇÃO UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O ENCARCERAMENTO E SEUS REFLEXOS SOCIAIS. Pesquisas e Inovações em Ciências Humanas e Sociais: Produções Científicas Multidisciplinares no Século XXI, Volume 2, [S.L.], p. 313-317, 2 set. 2022. Instituto Scientia. <a href="http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19">http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19</a> . FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 1975. 302 p. 9-88 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira; PEREIRA, Marcos Emanuel (org.). Estereótipos, preconceitos e discriminação: perspectivas teóricas e metodológicas. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2004. Disponível em: <a href="https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%2C%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20R1.pdf">https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%2C%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20R1.pdf</a> . Acesso em: 17 set. 2023. REUTER, Cristina. O Trabalho do Psicólogo em prisões. 2016. Disponível em: <a href="https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf">https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf</a> . Acesso em: 27 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14229	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4031351 - BRUNA FERNANDES RAINHA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Natali Maia Marques		
<b>TITULO</b>	O BINÔMIO SUICÍDIO E A DEPENDÊNCIA EMOCIONAL: RELAÇÕES QUE AS EMOÇÕES TÊM COM O SUICÍDIO NA PERSPECTIVA DA TEORIA COGNITIVO – COMPORTAMENTAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O suicídio está presente em todas as faixas etárias, mas é preocupante como este comportamento suicida cresceu entre os jovens de 15 a 29 anos, imersos em suas desesperanças, sentimentos de tristezas, depressão, violência em diversos ambientes e outros aspectos socioculturais. Segundo dados levantados pela OMS (2014), o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens dessa faixa etária tornando-se uma questão de saúde pública. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo estudar o tema suicídio, focando sua relação com dependência emocional numa perspectiva da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC).			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a dinâmica da dependência emocional e comportamentos suicidas entre jovens brasileiros e identificar as crenças centrais envolvidas a partir dos artigos pesquisados e literatura em psicologia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este projeto de pesquisa consistiu-se mediante leituras de livros e uma revisão bibliográfica com a utilização do banco de dados Scientific Eletronic Library Online (SCILEO), Google Acadêmico, Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC) para pesquisa online de estudos e artigos que foram selecionados do período de 2013 a 2023 referentes a temática sobre suicídios juvenil brasileiro, dependência emocional numa perspectiva da Teoria Cognitiva Comportamental.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir dos dados obtidos, até o momento, foi possível constatar a complexidade do tema e a relevância da sua discussão apresentando a Teoria Cognitivo-Comportamental como uma abordagem eficaz para ajudar pessoas com dependência emocional e prevenir o suicídio. Ao identificar e corrigir padrões de pensamentos disfuncionais, essa abordagem busca promover mudanças comportamentais positivas. Sendo eficaz no tratamento de transtornos mentais e comportamentais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, das informações coletadas nos materiais acadêmicos selecionados, observou-se que existem fundamentos que sustentam a correlação entre suicídio e dependência emocional numa perspectiva da Terapia Comportamental Cognitiva (TCC).			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Beck JS. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022. 2. Bution DC, Wechsler, AM. Dependência emocional: uma revisão sistemática da literatura. Est. Inter. Psicol., Londrina 2016; 7 (1): 77-101. 3. Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde, (SVS). Mortalidade por suicídio e notificações de lesões autoprovocadas no Brasil. 2021. (Vol.33)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14229	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
			<b>Autor</b>	<b>Status</b>
			4033248 - RENATA MARISTELA SILVA MELO	2 - Aprovado
			<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>
			Natali Maia Marques	
			<b>Orientador Externo</b>	0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	O BINÔMIO SUICÍDIO E A DEPENDÊNCIA EMOCIONAL: RELAÇÕES QUE AS EMOÇÕES TÊM COM O SUICÍDIO NA PERSPECTIVA DA TEORIA COGNITIVO – COMPORTAMENTAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O suicídio está presente em todas as faixas etárias, mas é preocupante como este comportamento suicida cresceu entre os jovens de 15 a 29 anos, imersos em suas desesperanças, sentimentos de tristezas, depressão, violência em diversos ambientes e outros aspectos socioculturais. Segundo dados levantados pela OMS (2014), o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens dessa faixa etária tornando-se uma questão de saúde pública. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo estudar o tema suicídio, focando sua relação com dependência emocional numa perspectiva da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC).			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a dinâmica da dependência emocional e comportamentos suicidas entre jovens brasileiros e identificar as crenças centrais envolvidas a partir dos artigos pesquisados e literatura em psicologia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este projeto de pesquisa consistiu-se mediante leituras de livros e uma revisão bibliográfica com a utilização do banco de dados Scientific Eletronic Library Online (SCILEO), Google Acadêmico, Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC) para pesquisa online de estudos e artigos que foram selecionados do período de 2013 a 2023 referentes a temática sobre suicídios juvenil brasileiro, dependência emocional numa perspectiva da Teoria Cognitiva Comportamental.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir dos dados obtidos, até o momento, foi possível constatar a complexidade do tema e a relevância da sua discussão apresentando a Teoria Cognitivo-Comportamental como uma abordagem eficaz para ajudar pessoas com dependência emocional e prevenir o suicídio. Ao identificar e corrigir padrões de pensamentos disfuncionais, essa abordagem busca promover mudanças comportamentais positivas. Sendo eficaz no tratamento de transtornos mentais e comportamentais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, das informações coletadas nos materiais acadêmicos selecionados, observou-se que existem fundamentos que sustentam a correlação entre suicídio e dependência emocional numa perspectiva da Terapia Comportamental Cognitiva (TCC).			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Beck JS. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022. 2. Bution DC, Wechsler, AM. Dependência emocional: uma revisão sistemática da literatura. Est. Inter. Psicol., Londrina 2016; 7 (1): 77-101. 3. Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde, (SVS). Mortalidade por suicídio e notificações de lesões autoprovocadas no Brasil. 2021. (Vol.33)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14229	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135873 - JANAINA ROSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Natali Maia Marques		
<b>TITULO</b>	O BINÔMIO SUICÍDIO E A DEPENDÊNCIA EMOCIONAL: RELAÇÕES QUE AS EMOÇÕES TÊM COM O SUICÍDIO NA PERSPECTIVA DA TEORIA COGNITIVO – COMPORTAMENTAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O suicídio está presente em todas as faixas etárias, mas é preocupante como este comportamento suicida cresceu entre os jovens de 15 a 29 anos, imersos em suas desesperanças, sentimentos de tristeza, depressão, violência em diversos ambientes e outros aspectos socioculturais. Segundo dados levantados pela OMS (2014), o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens dessa faixa etária tomando-se uma questão de saúde pública. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo estudar o tema suicídio, focando sua relação com dependência emocional numa perspectiva da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC).			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a dinâmica da dependência emocional e comportamentos suicidas entre jovens brasileiros e identificar as crenças centrais envolvidas a partir dos artigos pesquisados e literatura em psicologia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este projeto de pesquisa consistiu-se mediante leituras de livros e uma revisão bibliográfica com a utilização do banco de dados Scientific Eletronic Library Online (SCILEO), Google Acadêmico, Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC) para pesquisa online de estudos e artigos que foram selecionados do período de 2013 a 2023 referentes a temática sobre suicídios juvenil brasileiro, dependência emocional numa perspectiva da Teoria Cognitiva Comportamental.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir dos dados obtidos, até o momento, foi possível constatar a complexidade do tema e a relevância da sua discussão apresentando a Teoria Cognitivo-Comportamental como uma abordagem eficaz para ajudar pessoas com dependência emocional e prevenir o suicídio. Ao identificar e corrigir padrões de pensamentos disfuncionais, essa abordagem busca promover mudanças comportamentais positivas. Sendo eficaz no tratamento de transtornos mentais e comportamentais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, das informações coletadas nos materiais acadêmicos selecionados, observou-se que existem fundamentos que sustentam a correlação entre suicídio e dependência emocional numa perspectiva da Terapia Comportamental Cognitiva (TCC).			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Beck JS. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022. 2. Bution DC, Wechsler, AM. Dependência emocional: uma revisão sistemática da literatura. Est. Inter. Psicol., Londrina 2016; 7 (1): 77-101. 3. Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde, (SVS). Mortalidade por suicídio e notificações de lesões autoprovocadas no Brasil. 2021. (Vol.33)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14232	Arquitetura e Urbanismo	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4828496 - ELIANE DE LIMA FURQUIM	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Alcantara Freitas Peixoto		
<b>TITULO</b>	Praças públicas em Apiaí (SP): potenciais localidades para receberem infraestrutura e equipamentos para lazer e atividades esportivas			
<b>INTRODUCA O</b>	O planejamento urbano envolve planejar espaços nas cidades incluindo, no mínimo, leis, investimentos, infraestrutura, zoneamento para atuar em melhoria da qualidade das cidades. Caracteriza-se como processo contínuo e consciente para resolver problemas existentes e futuros (Scopel, 2018). Políticas públicas urbanas são objeto da Constituição Federal (Brasil, 1988), havendo o Estatuto da Cidade, que estabelece princípios de ocupação e uso do solo, preservação, proteção, uso sustentável do meio ambiente, garantindo direito à moradia, trabalho e lazer (Brasil, 2001). O lazer, segundo a Associação Mundial de Recreação e Lazer (1993), promove bem-estar e saúde às pessoas possibilitando que estas escolham experiências e atividades de acordo com suas necessidades, interesses e preferências. Com o propósito de planejar áreas urbanas nas quais o lazer e atividade física possam ocorrer, esta pesquisa se desenvolve na cidade de Apiaí (SP), com 24585 habitantes, área de 974322 km <sup>2</sup> (Brasil, 2023), analisando as praças do município. O problema desta pesquisa é identificar praças potenciais em Apiaí que possam receber infraestrutura e equipamentos para lazer e atividades físicas para atender à população de diferentes faixas etárias.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo da pesquisa é mapear e analisar praças da cidade de Apiaí, identificando aquelas potenciais para receberem equipamentos e infraestrutura para acomodar atividades de lazer e atividades físicas para contribuir com a qualidade de vida da população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o desenvolvimento da pesquisa é efetuada pesquisa bibliográfica sobre o tema. Em seguida serão realizadas visitas técnicas para identificação das características e recursos disponíveis nas praças.			
<b>RESULTADO S</b>	Como resultados parciais foram obtidos: Paulo Saldiva, médico, defende que a cidade seja mais bonita e mais habitável, havendo necessidade de políticas públicas relacionadas ao urbanismo (Summit Mobilidade Urbana, 2020); O Estatuto da Cidade define que os municípios com mais de 20.000 habitantes elaborem o Plano Diretor, democratizando aspectos do gerenciamento de território de cidades nacionais (Brasil, 2001); A cidade de Apiaí tem investido em lazer na cidade em situações específicas (Apiaí, 2021); Numa primeira visita, observando-se praças localizadas na área central da cidade de Apiaí, identifica-se infraestrutura, equipamentos para serem usufruídos pela população; as praças da periferia não apresentam os mesmos recursos disponíveis naquelas da área central da cidade, além de baixa manutenção.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Intervenções em praças que propiciem atividades físicas e lazer possibilitam que moradores da vizinhança usufruam de recursos públicos, reduzindo gastos com academia de ginástica e similares, propiciando deslocamentos a pé, devido às distâncias a serem percorridas, contribuindo para promoção da saúde e convívio social.			
<b>REFERENCIA S</b>	BRASIL. Estatuto da Cidade, lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: <a href="https://encurtador.com.br/adoF5">https://encurtador.com.br/adoF5</a> . Acesso em: 30 set. 2023. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério do Planejamento e Orçamento. Brasil / São Paulo / Apiaí: panorama.. 2023. Disponível em: <a href="https://encurtador.com.br/nwAB4">https://encurtador.com.br/nwAB4</a> . Acesso em: 30 set.2023. SCOPEL, Vanessa Guerini. Planejamento urbano. Porto Alegre: Sagah, 2018. SUMMIT MOBILIDADE URBANA (Brasil). Estádão. As relações entre mobilidade urbana e saúde. 2020. Disponível em: <a href="https://encurtador.com.br/cuAE6">https://encurtador.com.br/cuAE6</a> . Acesso em: 30 set. 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14233	Projeto de Arquitetuta e Urbanismo	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4828496 - ELIANE DE LIMA FURQUIM	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Alcantara Freitas Peixoto		
<b>TITULO</b>	Praças públicas em Apiaí (SP): potenciais localidades para receberem infraestrutura e equipamentos para lazer e atividades esportivas			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O planejamento urbano envolve planejar espaços nas cidades incluindo, no mínimo, leis, investimentos, infraestrutura, zoneamento para atuar em melhoria da qualidade das cidades. Caracteriza-se como processo contínuo e consciente para resolver problemas existentes e futuros (Scopel, 2018). Políticas públicas urbanas são objeto da Constituição Federal (Brasil, 1988), havendo o Estatuto da Cidade, que estabelece princípios de ocupação e uso do solo, preservação, proteção, uso sustentável do meio ambiente, garantindo direito à moradia, trabalho e lazer (Brasil, 2001). O lazer, segundo a Associação Mundial de Recreação e Lazer (1993), promove bem-estar e saúde às pessoas possibilitando que estas escolham experiências e atividades de acordo com suas necessidades, interesses e preferências. Com o propósito de planejar áreas urbanas nas quais o lazer e atividade física possam ocorrer, esta pesquisa se desenvolve na cidade de Apiaí (SP), com 24585 habitantes, área de 974322 km² (Brasil, 2023), analisando as praças do município. O problema desta pesquisa é identificar praças potenciais em Apiaí que possam receber infraestrutura e equipamentos para lazer e atividades físicas para atender à população de diferentes faixas etárias.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo da pesquisa é mapear e analisar praças da cidade de Apiaí, identificando aquelas potenciais para receberem equipamentos e infraestrutura para acomodar atividades de lazer e atividades físicas para contribuir com a qualidade de vida da população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o desenvolvimento da pesquisa é efetuada pesquisa bibliográfica sobre o tema. Em seguida serão realizadas visitas técnicas para identificação das características e recursos disponíveis nas praças.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultados parciais foram obtidos: Paulo Saldiva, médico, defende que a cidade seja mais bonita e mais habitável, havendo necessidade de políticas públicas relacionados ao urbanismo (Summit Mobilidade Urbana, 2020); O Estatuto da Cidade define que os municípios com mais de 20.000 habitantes elaborem o Plano Diretor, democratizando aspectos do gerenciamento de território de cidades nacionais (Brasil, 2001); A cidade de Apiaí tem investido em lazer na cidade em situações específicas (Apiaí, 2021); Numa primeira visita, observando-se praças localizadas na área central da cidade de Apiaí, identifica-se infraestrutura, equipamentos para serem usufruídos pela população; as praças da periferia não apresentam os mesmos recursos disponíveis naquelas da área central da cidade, além de baixa manutenção.			
<b>CONCLUSOES</b>	Intervenções em praças que propiciem atividades físicas e lazer possibilitam que moradores da vizinhança usufruam de recursos públicos, reduzindo gastos com academia de ginástica e similares, propiciando deslocamentos a pé, devido às distâncias a serem percorridas, contribuindo para promoção da saúde e convívio social.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Estatuto da Cidade, lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: <a href="https://encurtador.com.br/adoF5">https://encurtador.com.br/adoF5</a> . Acesso em: 30 set. 2023. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério do Planejamento e Orçamento. Brasil / São Paulo / Apiaí: panorama.. 2023. Disponível em: <a href="https://encurtador.com.br/nwAB4">https://encurtador.com.br/nwAB4</a> . Acesso em: 30 set. 2023. SCOPEL, Vanessa Guerini. Planejamento urbano. Porto Alegre: Sagah, 2018. SUMMIT MOBILIDADE URBANA (Brasil). Estadão. As relações entre mobilidade urbana e saúde. 2020. Disponível em: <a href="https://encurtador.com.br/cuAE6">https://encurtador.com.br/cuAE6</a> . Acesso em: 30 set. 2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14234	Farmacognosia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4792319 - TATIANA TIEMI YAMAMOTO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Eugenia Del Llano Archondo		
<b>TITULO</b>	CONTROLE DE QUALIDADE, OTIMIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE EXTRATOS DE CHÁ VERDE ( <i>Camellia sinensis</i> L.) PARA INCORPORAÇÃO EM PROTETOR SOLAR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A utilização do extrato de chá-verde como componente de produtos cosméticos vem se tornando cada vez mais comum no mercado consumidor, devido à sua alta concentração de compostos fenólicos que fornecem propriedades antioxidante e fotoprotetora. Porém, a composição química e seu teor em plantas de chá-verde podem variar de acordo com o clima, as condições de cultivo e o processo de preparação, o que pode interferir na qualidade da planta.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o controle de qualidade de amostras de chá verde para incorporação em protetor solar.			
<b>METODOLOGIA</b>	As amostras foram adquiridas em uma casa de produtos naturais na cidade de São Paulo, sendo uma de fabricação nacional e outra importada. Foram realizados os ensaios de controle físico químico das drogas vegetais, a otimização da preparação do extrato através de Planejamento Fatorial avaliando o tempo e a agitação no processo de maceração, a caracterização e padronização do extrato vegetal preparado a partir da planta e o doseamento de metabólitos secundários (flavonoides totais) partindo do método de espectrofotometria de reação com cloreto de alumínio 5% a 420 nm, utilizando quercetina como padrão.			
<b>RESULTADOS</b>	As amostras se encontravam na forma seca fracionada, com coloração e aparência características. A prospecção fitoquímica mostrou a presença de flavonoides, taninos, saponinas e alcaloides. O teor de umidade e cinzas se apresentaram dentro do esperado. Foram preparados os extratos glicólico e hidroalcoólico e o teor de flavonoides obtido foi utilizado para otimização do extrato. Os resultados mostraram que o extrato obtido que apresenta o maior teor de flavonoides foi o hidroalcoólico de chá verde importado, com um tempo de agitação para maceração dinâmica de 30 minutos a 220 rpm, obtendo-se 182,69 µg/mL de concentração; em comparação ao hidroalcoólico nacional com a mesma agitação e tempo, obteve-se concentração de 21,43 µg/mL. Já o extrato glicólico com o maior teor de flavonoides foi também o de chá verde importado que teve um tempo de agitação de 45 minutos a 220 rpm, com 156,69 µg/mL de concentração; em comparação ao glicólico nacional com mesmo tempo e agitação que obteve-se 17,37 µg/mL de concentração.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O extrato nacional apresentou teor menor em relação ao extrato importado, esse fato pode ser observado pela diferença nas condições de cultivo e preparação do chá. Os resultados obtidos podem ser utilizados para montagem de uma especificação e para obtenção de um extrato padronizado com alto teor de flavonoides.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Firmino L de A. Avaliação da qualidade de diferentes marcas de chá verde ( <i>Camellia sinensis</i> ) comercializadas. 2011. 2. Barros Neto B de., Scaminio ISpacio, Bruns REdward. Como fazer experimentos pesquisa e desenvolvimento na cie(#38)#770;ncia e na indu(#38)#769;stria. 4 ed. Campinas: Editora Unicamp; 2001. 3. Marques GS. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonoides totais e canferitrina em folhas de <i>Bauhinia forficata</i> Link. Quim Nova. 2012;35(3):517–22.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14237	Medicina Veterinária Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4185668 - DAFNER ALVES DE ARAUJO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Valeria Castilho Onofrio		
<b>TITULO</b>	IDENTIFICAÇÃO DE ECTOPARASITAS DE ANIMAIS SILVESTRES ATROPELADOS EM RODOVIAS BRASILEIRAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A interferência do homem em habitats naturais ocasiona profundas mudanças no ambiente. Uma das atividades antrópicas que mais geram impacto é a implantação de rodovias, causando desmatamento, modificando ecossistemas e a relação da fauna silvestre com esse novo ambiente. A diminuição do espaço de vida leva a busca por novos locais, que muitas vezes implica na travessia das rodovias, e ao risco de serem atropelados durante esse deslocamento. Outro fator é que a aproximação do homem e animais domésticos com a fauna silvestre facilita a transmissão de agentes patogênicos, além de aumentar o nicho ecológico dos ectoparasitas alterando a dinâmica entre parasita e hospedeiro.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a presença de ectoparasitas em animais silvestres atropelados em rodovias brasileiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os ectoparasitas foram provenientes de doação e foram colhidos de animais silvestres atropelados nas rodovias concessionadas pela CART. A identificação dos ectoparasitas foi feita com base na morfologia, utilizando chaves de identificação. Após a identificação foi feita a correlação com seus hospedeiros e pontos de coleta.			
<b>RESULTADOS</b>	Dos 57 animais atropelados, 11 estavam parasitados, sendo 10 infestados somente por carrapatos e 1 por carrapatos e piolhos. A quase totalidade dos animais com ectoparasitas pertenciam ao grupo dos mamíferos, e um ao das aves. Em <i>Myrmecophaga tridactyla</i> foram coletados exemplares de <i>A. nodosum</i> , carrapato encontrado quase que exclusivamente nestes mamíferos. Porém, outros indivíduos desta mesma espécie hospedeira apresentaram infestações mistas com <i>A. sculptum</i> , o que pode ser explicado pela baixa especificidade desse carrapato. E também explicar a presença de <i>A. sculptum</i> em outras amostras analisadas, como as de <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> , onde foi encontrado com <i>A. dubitatum</i> . Na única amostra de <i>Procyon cancrivorus</i> foi encontrado apenas um exemplar de <i>A. ovale</i> , enquanto na de <i>Mazama sp.</i> haviam <i>Rhipicephalus microplus</i> , espécie de carrapato que parasita bovinos. Nessa mesma amostra foram encontrados piolhos, morfológicamente próximos a <i>Linognathis vituly</i> , espécie que também parasita bovinos. O que por si só já seria um indicador do deslocamento do cervídeo em áreas de criação de animais domésticos, é corroborado pela constatação de que ponto onde houve o atropelamento é cercado em ambos os lados por campos de pastagem.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Nas amostras de ectoparasitos analisadas foi possível observar a baixa especificidade de <i>A. sculptum</i> em infestações mistas onde esta espécie foi encontrada com outras que são específicas dos hospedeiros parasitados. Também foi observado o parasitismo de carrapatos de animais domésticos em silvestres, indicando o possível deslocamento desses últimos em áreas onde circulam animais de criação e sua proximidade com o homem. Aumentando assim o risco de transmissão de patógenos entre os animais silvestres, domésticos e o homem.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Abra FD. Mammal - vehicle collisions on toll roads in São Paulo State: implications for wildlife, human safety and costs for society. 257 p. Thesis (Doctor in Science) - University of São Paulo, [S. l.], 2019. 2. Barros-Battesti DM, Arzua M, Bechara GH. Carrapatos de importância médico-veterinária da Região Neotropical: um guia ilustrado para identificação de espécies. São Paulo: Vox/ICTTD-3/Butantan, 2006. 223p. 3. Marcondes CB. Entomologia médica e veterinária. São Paulo: Atheneu, 2001. 432p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14237	Medicina Veterinária Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4894103 - CAMYLLA SILVA PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Valeria Castilho Onofrio		
<b>TITULO</b>	IDENTIFICAÇÃO DE ECTOPARASITAS DE ANIMAIS SILVESTRES ATROPELADOS EM RODOVIAS BRASILEIRAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A interferência do homem em habitats naturais ocasiona profundas mudanças no ambiente. Uma das atividades antrópicas que mais geram impacto é a implantação de rodovias, causando desmatamento, modificando ecossistemas e a relação da fauna silvestre com esse novo ambiente. A diminuição do espaço de vida leva a busca por novos locais, que muitas vezes implica na travessia das rodovias, e ao risco de serem atropelados durante esse deslocamento. Outro fator é que a aproximação do homem e animais domésticos com a fauna silvestre facilita a transmissão de agentes patogênicos, além de aumentar o nicho ecológico dos ectoparasitas alterando a dinâmica entre parasita e hospedeiro.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a presença de ectoparasitas em animais silvestres atropelados em rodovias brasileiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os ectoparasitas foram provenientes de doação e foram colhidos de animais silvestres atropelados nas rodovias concessionadas pela CART. A identificação dos ectoparasitas foi feita com base na morfologia, utilizando chaves de identificação. Após a identificação foi feita a correlação com seus hospedeiros e pontos de coleta.			
<b>RESULTADOS</b>	Dos 57 animais atropelados, 11 estavam parasitados, sendo 10 infestados somente por carrapatos e 1 por carrapatos e piolhos. A quase totalidade dos animais com ectoparasitas pertenciam ao grupo dos mamíferos, e um ao das aves. Em <i>Myrmecophaga tridactyla</i> foram coletados exemplares de <i>A. nodosum</i> , carrapato encontrado quase que exclusivamente nestes mamíferos. Porém, outros indivíduos desta mesma espécie hospedeira apresentaram infestações mistas com <i>A. sculptum</i> , o que pode ser explicado pela baixa especificidade desse carrapato. E também explicar a presença de <i>A. sculptum</i> em outras amostras analisadas, como as de <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> , onde foi encontrado com <i>A. dubitatum</i> . Na única amostra de <i>Procyon cancrivorus</i> foi encontrado apenas um exemplar de <i>A. ovale</i> , enquanto na de <i>Mazama sp.</i> haviam <i>Rhipicephalus microplus</i> , espécie de carrapato que parasita bovinos. Nessa mesma amostra foram encontrados piolhos, morfologicamente próximos a <i>Linognathis vituly</i> , espécie que também parasita bovinos. O que por si só já seria um indicador do deslocamento do cervídeo em áreas de criação de animais domésticos, é corroborado pela constatação de que ponto onde houve o atropelamento é cercado em ambos os lados por campos de pastagem.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Nas amostras de ectoparasitos analisadas foi possível observar a baixa especificidade de <i>A. sculptum</i> em infestações mistas onde esta espécie foi encontrada com outras que são específicas dos hospedeiros parasitados. Também foi observado o parasitismo de carrapatos de animais domésticos em silvestres, indicando o possível deslocamento desses últimos em áreas onde circulam animais de criação e sua proximidade com o homem. Aumentando assim o risco de transmissão de patógenos entre os animais silvestres, domésticos e o homem.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Abra FD. Mammal - vehicle collisions on toll roads in São Paulo State: implications for wildlife, human safety and costs for society. 257 p. Thesis (Doctor in Science) - University of São Paulo, [S. l.], 2019. 2. Barros-Battesti DM, Arzua M, Bechara GH. Carrapatos de importância médico-veterinária da Região Neotropical: um guia ilustrado para identificação de espécies. São Paulo: Vox/ICTTD-3/Butantan, 2006. 223p. 3. Marcondes CB. Entomologia médica e veterinária. São Paulo: Atheneu, 2001. 432p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14239	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3071651 - BIANCA RAQUEL SOUZA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Moraes		
<b>TITULO</b>	O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	A crescente importância da tecnologia na vida pessoal, empresarial e educacional destaca a necessidade de sua integração nas escolas, especialmente no ensino médio. Embora a tecnologia na educação possa beneficiar os alunos, nem todas as escolas possuem a infraestrutura e os profissionais necessários para aproveitá-la ao máximo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Mostrar pontos importantes da inclusão de determinadas tecnologias em meio ao estudo, mostrar os resultados obtidos de pesquisas sobre a infraestrutura em escolas e a capacidade dos professores e perspectivas com relação ao tema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa usa o método de revisão sistemática da literatura, estudos de revisão de literatura estão entre as fontes bibliográficas mais relevantes para a construção e divulgação do conhecimento científico segundo Andrade (2021).			
<b>RESULTADOS</b>	A internet e os computadores têm revolucionado a educação, criando oportunidades e melhorando a aprendizagem. A utilização adequada da tecnologia digital pode impulsionar os resultados educacionais, oferecendo recursos online, dispositivos móveis, multimídia, aprendizado adaptativo e colaboração. A Base Nacional Comum Curricular identifica três dimensões essenciais: o pensamento computacional (habilidade de resolver problemas sistematicamente), o domínio do mundo digital (processamento seguro de informações digitais) e a cultura digital (compreensão dos impactos da revolução digital na sociedade e na solução de problemas culturais). No entanto, mesmo com o potencial da tecnologia na educação, existem desafios a serem superados. Os dados do INEP revelam que 80,4% das escolas estaduais têm acesso a recursos tecnológicos, mas em 2023, de acordo com a ANATEL, 18,9 mil escolas ainda não tinham laboratórios de informática, e 281 escolas não dispunham de internet. Os professores variam em sua familiaridade com a tecnologia na educação, com alguns à vontade em sua implementação, mas outros enfrentando desafios. Isso evidencia a necessidade de superar obstáculos para aproveitar plenamente o potencial tecnológico na educação, apesar de alguns professores se considerarem proficientes nessa área.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, a tecnologia no ensino é um recurso indispensável que melhora a qualidade da educação e prepara os alunos para os desafios do mundo atual. Seu uso enriquece o aprendizado, promove a colaboração e amplia o acesso ao conhecimento. Portanto, investir em tecnologia educacional é essencial para o sucesso dos estudantes e para atender às demandas do século XXI.			
<b>REFERENCIAS</b>	Almeida, R. R., Araújo Jr, C. F., (#38) França, M. P. (2015). O uso do tablet para a representação de conceitos de genética: proposta e análise com base na Teoria da Atividade. RENOTE, 13(1). Andrade, M. C. R. (2021). O papel das revisões de literatura na produção e síntese do conhecimento científico em Psicologia. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 14(SPE), 1-5. Assessoria de Comunicação Social do Inep. Pesquisa revela dados sobre tecnologias nas escolas. INEP, 2020. BRASIL. Ministério das Comunicações. Anatel: Painel das Conectividades nas Escolas. [São Paulo]: Ministério das Comunicações, 06 mar. 2023. Disponível em: <a href="https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas">https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas</a> . Acesso em: 06 set. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14239	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4352408 - JOÃO VITOR PEREIRA VITAL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	A crescente importância da tecnologia na vida pessoal, empresarial e educacional destaca a necessidade de sua integração nas escolas, especialmente no ensino médio. Embora a tecnologia na educação possa beneficiar os alunos, nem todas as escolas possuem a infraestrutura e os profissionais necessários para aproveitá-la ao máximo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Mostrar pontos importantes da inclusão de determinadas tecnologias em meio ao estudo, mostrar os resultados obtidos de pesquisas sobre a infraestrutura em escolas e a capacidade dos professores e perspectivas com relação ao tema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa usa o método de revisão sistemática da literatura, estudos de revisão de literatura estão entre as fontes bibliográficas mais relevantes para a construção e divulgação do conhecimento científico segundo Andrade (2021).			
<b>RESULTADOS</b>	A internet e os computadores têm revolucionado a educação, criando oportunidades e melhorando a aprendizagem. A utilização adequada da tecnologia digital pode impulsionar os resultados educacionais, oferecendo recursos online, dispositivos móveis, multimídia, aprendizado adaptativo e colaboração. A Base Nacional Comum Curricular identifica três dimensões essenciais: o pensamento computacional (habilidade de resolver problemas sistematicamente), o domínio do mundo digital (processamento seguro de informações digitais) e a cultura digital (compreensão dos impactos da revolução digital na sociedade e na solução de problemas culturais). No entanto, mesmo com o potencial da tecnologia na educação, existem desafios a serem superados. Os dados do INEP revelam que 80,4% das escolas estaduais têm acesso a recursos tecnológicos, mas em 2023, de acordo com a ANATEL, 18,9 mil escolas ainda não tinham laboratórios de informática, e 281 escolas não dispunham de internet. Os professores variam em sua familiaridade com a tecnologia na educação, com alguns à vontade em sua implementação, mas outros enfrentando desafios. Isso evidencia a necessidade de superar obstáculos para aproveitar plenamente o potencial tecnológico na educação, apesar de alguns professores se considerarem proficientes nessa área.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, a tecnologia no ensino é um recurso indispensável que melhora a qualidade da educação e prepara os alunos para os desafios do mundo atual. Seu uso enriquece o aprendizado, promove a colaboração e amplia o acesso ao conhecimento. Portanto, investir em tecnologia educacional é essencial para o sucesso dos estudantes e para atender às demandas do século XXI.			
<b>REFERENCIAS</b>	Almeida, R. R., Araújo Jr, C. F., (#38) França, M. P. (2015). O uso do tablet para a representação de conceitos de genética: proposta e análise com base na Teoria da Atividade. RENE, 13(1). Andrade, M. C. R. (2021). O papel das revisões de literatura na produção e síntese do conhecimento científico em Psicologia. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 14(SPE), 1-5. Assessoria de Comunicação Social do Inep. Pesquisa revela dados sobre tecnologias nas escolas. INEP, 2020. BRASIL. Ministério das Comunicações. Anatel: Painel das Conectividades nas Escolas. [São Paulo]: Ministério das Comunicações, 06 mar. 2023. Disponível em: <a href="https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas">https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas</a> . Acesso em: 06 set. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14239	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4363523 - LAVINIA DA SILVA VALES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	A crescente importância da tecnologia na vida pessoal, empresarial e educacional destaca a necessidade de sua integração nas escolas, especialmente no ensino médio. Embora a tecnologia na educação possa beneficiar os alunos, nem todas as escolas possuem a infraestrutura e os profissionais necessários para aproveitá-la ao máximo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Mostrar pontos importantes da inclusão de determinadas tecnologias em meio ao estudo, mostrar os resultados obtidos de pesquisas sobre a infraestrutura em escolas e a capacidade dos professores e perspectivas com relação ao tema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa usa o método de revisão sistemática da literatura, estudos de revisão de literatura estão entre as fontes bibliográficas mais relevantes para a construção e divulgação do conhecimento científico segundo Andrade (2021).			
<b>RESULTADOS</b>	A internet e os computadores têm revolucionado a educação, criando oportunidades e melhorando a aprendizagem. A utilização adequada da tecnologia digital pode impulsionar os resultados educacionais, oferecendo recursos online, dispositivos móveis, multimídia, aprendizado adaptativo e colaboração. A Base Nacional Comum Curricular identifica três dimensões essenciais: o pensamento computacional (habilidade de resolver problemas sistematicamente), o domínio do mundo digital (processamento seguro de informações digitais) e a cultura digital (compreensão dos impactos da revolução digital na sociedade e na solução de problemas culturais). No entanto, mesmo com o potencial da tecnologia na educação, existem desafios a serem superados. Os dados do INEP revelam que 80,4% das escolas estaduais têm acesso a recursos tecnológicos, mas em 2023, de acordo com a ANATEL, 18,9 mil escolas ainda não tinham laboratórios de informática, e 281 escolas não dispunham de internet. Os professores variam em sua familiaridade com a tecnologia na educação, com alguns à vontade em sua implementação, mas outros enfrentando desafios. Isso evidencia a necessidade de superar obstáculos para aproveitar plenamente o potencial tecnológico na educação, apesar de alguns professores se considerarem proficientes nessa área.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, a tecnologia no ensino é um recurso indispensável que melhora a qualidade da educação e prepara os alunos para os desafios do mundo atual. Seu uso enriquece o aprendizado, promove a colaboração e amplia o acesso ao conhecimento. Portanto, investir em tecnologia educacional é essencial para o sucesso dos estudantes e para atender às demandas do século XXI.			
<b>REFERENCIAS</b>	Almeida, R. R., Araújo Jr, C. F., (#38) França, M. P. (2015). O uso do tablet para a representação de conceitos de genética: proposta e análise com base na Teoria da Atividade. RENE, 13(1). Andrade, M. C. R. (2021). O papel das revisões de literatura na produção e síntese do conhecimento científico em Psicologia. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 14(SPE), 1-5. Assessoria de Comunicação Social do Inep. Pesquisa revela dados sobre tecnologias nas escolas. INEP, 2020. BRASIL. Ministério das Comunicações. Anatel: Painel das Conectividades nas Escolas. [São Paulo]: Ministério das Comunicações, 06 mar. 2023. Disponível em: <a href="https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas">https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas</a> . Acesso em: 06 set. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14239	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4516940 - MAIQUELE DOS SANTOS ANDRADE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Moraes		
<b>TITULO</b>	O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	A crescente importância da tecnologia na vida pessoal, empresarial e educacional destaca a necessidade de sua integração nas escolas, especialmente no ensino médio. Embora a tecnologia na educação possa beneficiar os alunos, nem todas as escolas possuem a infraestrutura e os profissionais necessários para aproveitá-la ao máximo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Mostrar pontos importantes da inclusão de determinadas tecnologias em meio ao estudo, mostrar os resultados obtidos de pesquisas sobre a infraestrutura em escolas e a capacidade dos professores e perspectivas com relação ao tema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa usa o método de revisão sistemática da literatura, estudos de revisão de literatura estão entre as fontes bibliográficas mais relevantes para a construção e divulgação do conhecimento científico segundo Andrade (2021).			
<b>RESULTADOS</b>	A internet e os computadores têm revolucionado a educação, criando oportunidades e melhorando a aprendizagem. A utilização adequada da tecnologia digital pode impulsionar os resultados educacionais, oferecendo recursos online, dispositivos móveis, multimídia, aprendizado adaptativo e colaboração. A Base Nacional Comum Curricular identifica três dimensões essenciais: o pensamento computacional (habilidade de resolver problemas sistematicamente), o domínio do mundo digital (processamento seguro de informações digitais) e a cultura digital (compreensão dos impactos da revolução digital na sociedade e na solução de problemas culturais). No entanto, mesmo com o potencial da tecnologia na educação, existem desafios a serem superados. Os dados do INEP revelam que 80,4% das escolas estaduais têm acesso a recursos tecnológicos, mas em 2023, de acordo com a ANATEL, 18,9 mil escolas ainda não tinham laboratórios de informática, e 281 escolas não dispunham de internet. Os professores variam em sua familiaridade com a tecnologia na educação, com alguns à vontade em sua implementação, mas outros enfrentando desafios. Isso evidencia a necessidade de superar obstáculos para aproveitar plenamente o potencial tecnológico na educação, apesar de alguns professores se considerarem proficientes nessa área.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, a tecnologia no ensino é um recurso indispensável que melhora a qualidade da educação e prepara os alunos para os desafios do mundo atual. Seu uso enriquece o aprendizado, promove a colaboração e amplia o acesso ao conhecimento. Portanto, investir em tecnologia educacional é essencial para o sucesso dos estudantes e para atender às demandas do século XXI.			
<b>REFERENCIAS</b>	Almeida, R. R., Araújo Jr, C. F., (#38) França, M. P. (2015). O uso do tablet para a representação de conceitos de genética: proposta e análise com base na Teoria da Atividade. RENOTE, 13(1). Andrade, M. C. R. (2021). O papel das revisões de literatura na produção e síntese do conhecimento científico em Psicologia. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 14(SPE), 1-5. Assessoria de Comunicação Social do Inep. Pesquisa revela dados sobre tecnologias nas escolas. INEP, 2020. BRASIL. Ministério das Comunicações. Anatel: Painel das Conectividades nas Escolas. [São Paulo]: Ministério das Comunicações, 06 mar. 2023. Disponível em: <a href="https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas">https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas</a> . Acesso em: 06 set. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14239	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4546032 - TALITA DA SILVA CORREIA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcos de Oliveira Morais		
<b>TITULO</b>	O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	A crescente importância da tecnologia na vida pessoal, empresarial e educacional destaca a necessidade de sua integração nas escolas, especialmente no ensino médio. Embora a tecnologia na educação possa beneficiar os alunos, nem todas as escolas possuem a infraestrutura e os profissionais necessários para aproveitá-la ao máximo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Mostrar pontos importantes da inclusão de determinadas tecnologias em meio ao estudo, mostrar os resultados obtidos de pesquisas sobre a infraestrutura em escolas e a capacidade dos professores e perspectivas com relação ao tema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa usa o método de revisão sistemática da literatura, estudos de revisão de literatura estão entre as fontes bibliográficas mais relevantes para a construção e divulgação do conhecimento científico segundo Andrade (2021).			
<b>RESULTADOS</b>	A internet e os computadores têm revolucionado a educação, criando oportunidades e melhorando a aprendizagem. A utilização adequada da tecnologia digital pode impulsionar os resultados educacionais, oferecendo recursos online, dispositivos móveis, multimídia, aprendizado adaptativo e colaboração. A Base Nacional Comum Curricular identifica três dimensões essenciais: o pensamento computacional (habilidade de resolver problemas sistematicamente), o domínio do mundo digital (processamento seguro de informações digitais) e a cultura digital (compreensão dos impactos da revolução digital na sociedade e na solução de problemas culturais). No entanto, mesmo com o potencial da tecnologia na educação, existem desafios a serem superados. Os dados do INEP revelam que 80,4% das escolas estaduais têm acesso a recursos tecnológicos, mas em 2023, de acordo com a ANATEL, 18,9 mil escolas ainda não tinham laboratórios de informática, e 281 escolas não dispunham de internet. Os professores variam em sua familiaridade com a tecnologia na educação, com alguns à vontade em sua implementação, mas outros enfrentando desafios. Isso evidencia a necessidade de superar obstáculos para aproveitar plenamente o potencial tecnológico na educação, apesar de alguns professores se considerarem proficientes nessa área.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, a tecnologia no ensino é um recurso indispensável que melhora a qualidade da educação e prepara os alunos para os desafios do mundo atual. Seu uso enriquece o aprendizado, promove a colaboração e amplia o acesso ao conhecimento. Portanto, investir em tecnologia educacional é essencial para o sucesso dos estudantes e para atender às demandas do século XXI.			
<b>REFERENCIAS</b>	Almeida, R. R., Araújo Jr, C. F., (#38) França, M. P. (2015). O uso do tablet para a representação de conceitos de genética: proposta e análise com base na Teoria da Atividade. RENE, 13(1). Andrade, M. C. R. (2021). O papel das revisões de literatura na produção e síntese do conhecimento científico em Psicologia. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 14(SPE), 1-5. Assessoria de Comunicação Social do Inep. Pesquisa revela dados sobre tecnologias nas escolas. INEP, 2020. BRASIL. Ministério das Comunicações. Anatel: Painel das Conectividades nas Escolas. [São Paulo]: Ministério das Comunicações, 06 mar. 2023. Disponível em: <a href="https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas">https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas</a> . Acesso em: 06 set. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14243	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2121310 - LUCAS CLEITON PINHEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Chagas Raszeja		
<b>TITULO</b>	A presença de fatores ambientais na formação do transtorno de Personalidade Antissocial			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Houve uma evolução da terminologia e conceitos relacionados a transtornos de personalidade antissocial ao longo da história da medicina. Diferentes autores e períodos históricos influenciaram as definições desses transtornos, levando a uma falta de consenso entre especialistas. Para abordar essa questão, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveram critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade antissocial. A APA criou o Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais (DSM), enquanto a OMS criou a Classificação Internacional de Doenças (CID). As diferentes edições do DSM influenciaram a compreensão da Sociopatia até o Transtorno de Personalidade Antissocial. O DSM-V (2014), introduziu um modelo alternativo para entender a personalidade e listar traços patológicos associados ao transtorno de personalidade antissocial, com o objetivo de facilitar a pesquisa e a prática clínica.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar uma possível presença de fatores ambientais, a partir da psicanálise, na formação do Transtorno de Personalidade Antissocial.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>O procedimento metodológico utilizado para alcançar o objetivo foi uma pesquisa bibliográfica qualitativa, em trinta e cinco unidades de análise publicadas em português no google acadêmico, utilizando as palavras chaves, Antissocial, Psicopata, Psicanálise, Psicopatologia, e que tiveram como critério a psicopatologia e um enfoque Winnicottiano sobre a influência dos fatores ambientais na formação da Personalidade Antissocial. Utilizamos como autores principais, Sigmund S. Freud, Christian Dunker e Donald W. Winnicott.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Os resultados da pesquisa indicam que o TPAS seja uma condição complexa que envolve uma série de fatores psicológicos, sociais e ambientais. Ao longo da história da medicina e psiquiatria, houve uma evolução na classificação e diagnóstico dos transtornos de personalidade antissocial. A criação do DSM e da CID pela APA e OMS, respectivamente, ajudaram a padronizar os critérios diagnósticos. Notou-se uma importância de diferenciar o TPAS da psicopatia, pois segundo Martens (2000), enquanto ambos compartilham algumas características, como comportamento antissocial, a psicopatia é caracterizada por traços interpessoais e afetivos específicos que não estão necessariamente presentes no TPAS. A aplicação de conceitos da psicanálise como o superego (Freud, 1923), perversão (Dunker, 2010), perda original, capacidade de ser delinquente e ambiente facilitador (Winnicott, 1987) facilitou o entendimento do quanto talvez a presença de fatores ambientais atuem fortemente no desenvolvimento da personalidade antissocial.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Nessa pesquisa procurou-se identificar uma possível presença de fatores ambientais no desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial. Foi verificado indícios que o período da infância aparenta ser o ponto crucial para que a violência seja instaurada na psique de um indivíduo, intensificando possíveis traços de uma personalidade antissocial. Nota-se a importância de fatores ambientais na infância para prevenir o desenvolvimento do TPAS, onde cuidadores que fornecem um ambiente seguro, sensível às necessidades emocionais da criança, podem ajudar a evitar comportamentos antissociais no futuro.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>DSM-V. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2014. MARTENS, Willem HJ. Antisocial and psychopathic personality disorders: Causes, course, and remission—A review article. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2000. WINNICOTT, Donald Woods. Privação e Delinquência. São Paulo: Martins Fontes, 1987</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14243	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3794822 - TATIANA ANDRADE THEOPHILO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Chagas Raszeja		
<b>TITULO</b>	A presença de fatores ambientais na formação do transtorno de Personalidade Antissocial			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Houve uma evolução da terminologia e conceitos relacionados a transtornos de personalidade antissocial ao longo da história da medicina. Diferentes autores e períodos históricos influenciaram as definições desses transtornos, levando a uma falta de consenso entre especialistas. Para abordar essa questão, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveram critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade antissocial. A APA criou o Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais (DSM), enquanto a OMS criou a Classificação Internacional de Doenças (CID). As diferentes edições do DSM influenciaram a compreensão da Sociopatia até o Transtorno de Personalidade Antissocial. O DSM-V (2014), introduziu um modelo alternativo para entender a personalidade e listar traços patológicos associados ao transtorno de personalidade antissocial, com o objetivo de facilitar a pesquisa e a prática clínica.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar uma possível presença de fatores ambientais, a partir da psicanálise, na formação do Transtorno de Personalidade Antissocial.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>O procedimento metodológico utilizado para alcançar o objetivo foi uma pesquisa bibliográfica qualitativa, em trinta e cinco unidades de análise publicadas em português no google acadêmico, utilizando as palavras chaves, Antissocial, Psicopata, Psicanálise, Psicopatologia, e que tiveram como critério a psicopatologia e um enfoque Winnicottiano sobre a influência dos fatores ambientais na formação da Personalidade Antissocial. Utilizamos como autores principais, Sigmund S. Freud, Christian Dunker e Donald W. Winnicott.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Os resultados da pesquisa indicam que o TPAS seja uma condição complexa que envolve uma série de fatores psicológicos, sociais e ambientais. Ao longo da história da medicina e psiquiatria, houve uma evolução na classificação e diagnóstico dos transtornos de personalidade antissocial. A criação do DSM e da CID pela APA e OMS, respectivamente, ajudaram a padronizar os critérios diagnósticos. Notou-se uma importância de diferenciar o TPAS da psicopatia, pois segundo Martens (2000), enquanto ambos compartilham algumas características, como comportamento antissocial, a psicopatia é caracterizada por traços interpessoais e afetivos específicos que não estão necessariamente presentes no TPAS. A aplicação de conceitos da psicanálise como o superego (Freud, 1923), perversão (Dunker, 2010), perda original, capacidade de ser delinquente e ambiente facilitador (Winnicott, 1987) facilitou o entendimento do quanto talvez a presença de fatores ambientais atuem fortemente no desenvolvimento da personalidade antissocial.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Nessa pesquisa procurou-se identificar uma possível presença de fatores ambientais no desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial. Foi verificado indícios que o período da infância aparenta ser o ponto crucial para que a violência seja instaurada na psique de um indivíduo, intensificando possíveis traços de uma personalidade antissocial. Nota-se a importância de fatores ambientais na infância para prevenir o desenvolvimento do TPAS, onde cuidadores que fornecem um ambiente seguro, sensível às necessidades emocionais da criança, podem ajudar a evitar comportamentos antissociais no futuro.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>DSM-V. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2014. MARTENS, Willem HJ. Antisocial and psychopathic personality disorders: Causes, course, and remission—A review article. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2000. WINNICOTT, Donald Woods. Privação e Delinquência. São Paulo: Martins Fontes, 1987</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14243	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4018192 - PAULO CESAR BIAGGIO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Chagas Raszeja		
<b>TITULO</b>	A presença de fatores ambientais na formação do transtorno de Personalidade Antissocial			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Houve uma evolução da terminologia e conceitos relacionados a transtornos de personalidade antissocial ao longo da história da medicina. Diferentes autores e períodos históricos influenciaram as definições desses transtornos, levando a uma falta de consenso entre especialistas. Para abordar essa questão, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveram critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade antissocial. A APA criou o Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais (DSM), enquanto a OMS criou a Classificação Internacional de Doenças (CID). As diferentes edições do DSM influenciaram a compreensão da Sociopatia até o Transtorno de Personalidade Antissocial. O DSM-V (2014), introduziu um modelo alternativo para entender a personalidade e listar traços patológicos associados ao transtorno de personalidade antissocial, com o objetivo de facilitar a pesquisa e a prática clínica.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar uma possível presença de fatores ambientais, a partir da psicanálise, na formação do Transtorno de Personalidade Antissocial.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>O procedimento metodológico utilizado para alcançar o objetivo foi uma pesquisa bibliográfica qualitativa, em trinta e cinco unidades de análise publicadas em português no google acadêmico, utilizando as palavras chaves, Antissocial, Psicopata, Psicanálise, Psicopatologia, e que tiveram como critério a psicopatologia e um enfoque Winnicottiano sobre a influência dos fatores ambientais na formação da Personalidade Antissocial. Utilizamos como autores principais, Sigmund S. Freud, Christian Dunker e Donald W. Winnicott.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Os resultados da pesquisa indicam que o TPAS seja uma condição complexa que envolve uma série de fatores psicológicos, sociais e ambientais. Ao longo da história da medicina e psiquiatria, houve uma evolução na classificação e diagnóstico dos transtornos de personalidade antissocial. A criação do DSM e da CID pela APA e OMS, respectivamente, ajudaram a padronizar os critérios diagnósticos. Notou-se uma importância de diferenciar o TPAS da psicopatia, pois segundo Martens (2000), enquanto ambos compartilham algumas características, como comportamento antissocial, a psicopatia é caracterizada por traços interpessoais e afetivos específicos que não estão necessariamente presentes no TPAS. A aplicação de conceitos da psicanálise como o superego (Freud, 1923), perversão (Dunker, 2010), perda original, capacidade de ser delinquente e ambiente facilitador (Winnicott, 1987) facilitou o entendimento do quanto talvez a presença de fatores ambientais atuem fortemente no desenvolvimento da personalidade antissocial.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Nessa pesquisa procurou-se identificar uma possível presença de fatores ambientais no desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial. Foi verificado indícios que o período da infância aparenta ser o ponto crucial para que a violência seja instaurada na psique de um indivíduo, intensificando possíveis traços de uma personalidade antissocial. Nota-se a importância de fatores ambientais na infância para prevenir o desenvolvimento do TPAS, onde cuidadores que fornecem um ambiente seguro, sensível às necessidades emocionais da criança, podem ajudar a evitar comportamentos antissociais no futuro.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>DSM-V. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2014. MARTENS, Willem HJ. Antisocial and psychopathic personality disorders: Causes, course, and remission—A review article. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2000. WINNICOTT, Donald Woods. Privação e Delinquência. São Paulo: Martins Fontes, 1987</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14248	Saúde Coletiva	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4325800 - HENRIQUE DA SILVA ESPINDOLA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Silles		
<b>TITULO</b>	Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) e os principais desafios no âmbito da saúde coletiva			
<b>INTRODUCAO</b>	O diabetes mellitus é uma doença crônica, na qual o organismo não produz insulina ou não consegue utilizá-la da forma como deveria, podendo levar à diversas complicações, como a cetoacidose diabética, neuropatia diabética caso não tratado e acompanhado, pode levar ao óbito.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever os principais desafios do Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) dentro do âmbito da saúde coletiva e relatar a experiência obtida dentro de uma unidade de ESF e a realização da etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) nas problemáticas encontradas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, do 8º semestre do curso de enfermagem.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o período de estágio, foram levantados os formulários do AMG, das 05 equipes. No que tange os desafios são: formulários sem nome completo, sem o tipo de diabetes, tipo de insulina para o tratamento e o esquema dose/vezes ao dia para administração, datas vencidas para renovação, sem exames laboratoriais. Um total de 253 pacientes/formulários, todos os formulários foram refeitos, solicitados exames laboratoriais aos pacientes que não tinha no sistema CientificaLab, feito comparação se estavam ativos nos sistema Siga saúde e Sobcontrole. Os pacientes sem registro de exames laboratoriais no CientificaLab foram solicitados e convocados a fazer. Demonstrando então uma ação efetiva, foi construída uma planilha no Excel com: nome do paciente, CNES, tipo de DM, Insulina utilizada, vencimento do formulário, data para realização dos exames.			
<b>CONCLUSOES</b>	A importância do monitoramento glicêmico, se demonstra pelo controle efetivo desta doença crônica, prevenindo então complicações e reduzindo os custos de saúde à longo prazo, fica evidente que ainda há muito a ser feito, como questões relacionadas à acessibilidade aos dispositivos de monitoramento, à educação em saúde dos pacientes e profissionais, coordenação do cuidado, falta de recursos e a sobrecarga dos sistemas de saúde. Sendo importante o investimento em pesquisa, educação e infraestrutura na Atenção Básica, mesmo os desafios sendo reais e difíceis, com dedicação e cooperação, é possível superá-los e oferecer então, um atendimento de qualidade e com total integralidade aos pacientes portadores de diabetes mellitus, melhorando sua qualidade de vida. Com a elaboração dessa planilha observamos que facilitou o trabalho da equipe de técnicos de enfermagem na realização do grupo do AMG e também a supervisão por parte do enfermeiro responsável pelo programa, o qual consegue ter um controle melhor do acompanhamento. Também os sistemas existentes nos proporcionaram a realização dos levantamentos de dados fidedignos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1.Sociedade Brasileira de Diabetes. Disponível em: <a href="https://diabetes.org.br/">https://diabetes.org.br/</a> 2.MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIDA, Claudio Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. Revista práxis educacional, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021. Disponível em: <a href="http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S2178-26792021000500060/#38">http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S2178-26792021000500060/#38</a> script=sci_arttext 3.NOUEIRA, Durval Mazzei et al. Diabetes mellitus: importância dos exames laboratoriais. Rev. bras. anal. clin, p. 206-9, 1985. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-27187">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-27187</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14251	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4259572 - MARCELO FERNANDES DE CASTRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	Análise dos implantes dentários instalados no Sistema Único de Saúde: estudo observacional de 11 anos			
<b>INTRODUCAO</b>	A partir de 2010, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) através do Programa Brasil Sorridente passou a ofertar os procedimentos de implantes dentários no Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando o acesso aos tratamentos reabilitadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse estudo foi analisar os implantes dentários realizados no SUS no período de 11 anos (2010 – 2020), além de uma análise comparativa dos números de Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs) e implantodontista dos anos de 2014 e 2018.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo, quantitativo utilizando dados de uso público coletados na base de dados SAI/SUS-DATASUS e PMAQ-CEO. Foram considerados o total do código de procedimento através de coleta anual, com dados Nacionais agrupados por macrorregiões, números de CEOs e a atuação dos especialistas implantodontista nos CEOs.			
<b>RESULTADOS</b>	Num total de 766.752.939 procedimentos odontológicos os implantes dentários representaram 1,92% deste total de procedimentos. A Região Sul obteve a maior representatividade com 59,94% e a Região Norte a menor com 0,80% (p(#60)0.0001). Quando comparado ano a ano os resultados apresentaram diferença estatística (p(#60)0,05). Em relação a quantidade de CEOs, o Brasil contava com 932 no 1º Ciclo (2014) e 1060 no 2º Ciclo (2018), dos quais 282 (27%) realizaram implantes. O CEO tipo II realizou o maior número de procedimentos (56%). O número de Implantodontistas foi de 27 no 1º e 34 no 2º ciclo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Sugere-se que as disparidades entre as regiões do país podem ser decorrentes de obstáculos no acesso aos serviços de implante, ou ainda, à indisponibilidade desses serviços em alguns CEOs, afetando negativamente a qualidade do atendimento e tratamento aos pacientes que necessitam desse tipo de intervenção odontológica.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Lopes FRL, Monteiro KS, Santos S. How data provided by the Brazilian information system of primary care have been used by researchers. Health Informatics J. setembro de 2020;26(3):1617–30. 2. Janakiram C, Dye BA. A public health approach for prevention of periodontal disease. Periodontol 2000. outubro de 2020;84(1):202–14. 3. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. The Lancet. julho de 2019;394(10194):249–60.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14251	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678150 - JASIEL DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	Análise dos implantes dentários instalados no Sistema Único de Saúde: estudo observacional de 11 anos			
<b>INTRODUCAO</b>	A partir de 2010, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) através do Programa Brasil Sorridente passou a ofertar os procedimentos de implantes dentários no Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando o acesso aos tratamentos reabilitadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse estudo foi analisar os implantes dentários realizados no SUS no período de 11 anos (2010 – 2020), além de uma análise comparativa dos números de Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs) e implantodontista dos anos de 2014 e 2018.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo, quantitativo utilizando dados de uso público coletados na base de dados SAI/SUS-DATASUS e PMAQ-CEO. Foram considerados o total do código de procedimento através de coleta anual, com dados Nacionais agrupados por macrorregiões, números de CEOs e a atuação dos especialistas implantodontista nos CEOs.			
<b>RESULTADOS</b>	Num total de 766.752.939 procedimentos odontológicos os implantes dentários representaram 1,92% deste total de procedimentos. A Região Sul obteve a maior representatividade com 59,94% e a Região Norte a menor com 0,80% (p(#60)0.0001). Quando comparado ano a ano os resultados apresentaram diferença estatística (p(#60)0,05). Em relação a quantidade de CEOs, o Brasil contava com 932 no 1º Ciclo (2014) e 1060 no 2º Ciclo (2018), dos quais 282 (27%) realizaram implantes. O CEO tipo II realizou o maior número de procedimentos (56%). O número de Implantodontistas foi de 27 no 1º e 34 no 2º ciclo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Sugere-se que as disparidades entre as regiões do país podem ser decorrentes de obstáculos no acesso aos serviços de implante, ou ainda, à indisponibilidade desses serviços em alguns CEOs, afetando negativamente a qualidade do atendimento e tratamento aos pacientes que necessitam desse tipo de intervenção odontológica.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Lopes FRL, Monteiro KS, Santos S. How data provided by the Brazilian information system of primary care have been used by researchers. Health Informatics J. setembro de 2020;26(3):1617–30. 2. Janakiram C, Dye BA. A public health approach for prevention of periodontal disease. Periodontol 2000. outubro de 2020;84(1):202–14. 3. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. The Lancet. julho de 2019;394(10194):249–60.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14251	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678290 - CRISTINE HARALAMBOS BASSOUKOU	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	Análise dos implantes dentários instalados no Sistema Único de Saúde: estudo observacional de 11 anos			
<b>INTRODUCAO</b>	A partir de 2010, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) através do Programa Brasil Sorridente passou a ofertar os procedimentos de implantes dentários no Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando o acesso aos tratamentos reabilitadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse estudo foi analisar os implantes dentários realizados no SUS no período de 11 anos (2010 – 2020), além de uma análise comparativa dos números de Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs) e implantodontista dos anos de 2014 e 2018.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo, quantitativo utilizando dados de uso público coletados na base de dados SAI/SUS-DATASUS e PMAQ-CEO. Foram considerados o total do código de procedimento através de coleta anual, com dados Nacionais agrupados por macrorregiões, números de CEOs e a atuação dos especialistas implantodontista nos CEOs.			
<b>RESULTADOS</b>	Num total de 766.752.939 procedimentos odontológicos os implantes dentários representaram 1,92% deste total de procedimentos. A Região Sul obteve a maior representatividade com 59,94% e a Região Norte a menor com 0,80% (p(#60)0.0001). Quando comparado ano a ano os resultados apresentaram diferença estatística (p(#60)0,05). Em relação a quantidade de CEOs, o Brasil contava com 932 no 1º Ciclo (2014) e 1060 no 2º Ciclo (2018), dos quais 282 (27%) realizaram implantes. O CEO tipo II realizou o maior número de procedimentos (56%). O número de Implantodontistas foi de 27 no 1º e 34 no 2º ciclo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Sugere-se que as disparidades entre as regiões do país podem ser decorrentes de obstáculos no acesso aos serviços de implante, ou ainda, à indisponibilidade desses serviços em alguns CEOs, afetando negativamente a qualidade do atendimento e tratamento aos pacientes que necessitam desse tipo de intervenção odontológica.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Lopes FRL, Monteiro KS, Santos S. How data provided by the Brazilian information system of primary care have been used by researchers. Health Informatics J. setembro de 2020;26(3):1617–30. 2. Janakiram C, Dye BA. A public health approach for prevention of periodontal disease. Periodontol 2000. outubro de 2020;84(1):202–14. 3. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. The Lancet. julho de 2019;394(10194):249–60.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14252	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4259572 - MARCELO FERNANDES DE CASTRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	Efeito do gel com oxigênio ativo sobre biofilme de <i>Streptococcus gordonii</i> em superfície de titânio.			
<b>INTRODUCAO</b>	O tratamento e a recuperação dos tecidos perimplantares são importantes para a manutenção dos implantes dentários tanto do ponto de vista funcional como estético. Portanto, a descontaminação da superfície do implante é um passo importante no tratamento da perimplantite, porém a descontaminação mecânica como raspagem e alisamento desta superfície não é suficiente para eliminar os microrganismos da superfície dos implantes. O uso de clorexidina e géis que liberam oxigênio ativo tem sido sugerido como terapias complementares no tratamento da perimplantite.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito antimicrobiano de um gel com oxigênio ativo (BlueM®) sobre biofilme de <i>Streptococcus gordonii</i> ( <i>S. gordonii</i> ) formado em discos de titânio de superfície lisa (SL) e superfície tratada (ST).			
<b>METODOLOGIA</b>	Um total de 54 discos, divididos em 2 grupos SL e ST e subdivididos em 3 subgrupos, de acordo com o tratamento antimicrobiano: BlueM® (B), clorexidina (CX) e um grupo controle (CT) sem tratamento. O biofilme de <i>S. gordonii</i> foi submetido aos tratamentos acima citados por 5 minutos. Após os tratamentos foi realizado a contagem das unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/ml) em meio específico, de cada subgrupo avaliado.			
<b>RESULTADOS</b>	Houve diferença estatisticamente significante ( $p \leq 0,05$ ) entre os subgrupos B e CX em relação ao grupo CT nas duas superfícies. Porém, não houve diferença estatística significante entre os subgrupos B e CX tanto na SL quanto na ST.			
<b>CONCLUSOES</b>	O gel com oxigênio ativo apresentou efeito antimicrobiano promissor sobre biofilme de <i>S. gordonii</i> formado de discos de titânio, em ambas as superfícies analisadas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Cheng, J., Chen, L., Tao, X., Qiang, X., Li, R., Ma, J., Shi, D., (#38) Qiu, Z. (2023). Efficacy of surgical methods for peri-implantitis: a systematic review and network meta-analysis. <i>BMC oral health</i> , 23(1), 227. 2- Santos, V. C. E. D., Maquera-Huacho, P. M., Imbriani, M. J. M., Minhaco, V. M. T. R., (#38) Spolidorio, D. M. P. (2023). Effects of BlueM® against <i>Streptococcus mutans</i> biofilm and its virulence gene expression. <i>Brazilian dental journal</i> , 34(1), 19–28. 3- Ryu, H. S., Kim, Y. I., Lim, B. S., Lim, Y. J., (#38) Ahn, S. J. (2015). Chlorhexidine Uptake and Release From Modified Titanium Surfaces and Its Antimicrobial Activity. <i>Journal of periodontology</i> , 86(11), 1268–1275.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14252	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678150 - JASIEL DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	Efeito do gel com oxigênio ativo sobre biofilme de <i>Streptococcus gordonii</i> em superfície de titânio.			
<b>INTRODUCAO</b>	O tratamento e a recuperação dos tecidos perimplantares são importantes para a manutenção dos implantes dentários tanto do ponto de vista funcional como estético. Portanto, a descontaminação da superfície do implante é um passo importante no tratamento da perimplantite, porém a descontaminação mecânica como raspagem e alisamento desta superfície não é suficiente para eliminar os microrganismos da superfície dos implantes. O uso de clorexidina e géis que liberam oxigênio ativo tem sido sugerido como terapias complementares no tratamento da perimplantite.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito antimicrobiano de um gel com oxigênio ativo (BlueM®) sobre biofilme de <i>Streptococcus gordonii</i> ( <i>S. gordonii</i> ) formado em discos de titânio de superfície lisa (SL) e superfície tratada (ST).			
<b>METODOLOGIA</b>	Um total de 54 discos, divididos em 2 grupos SL e ST e subdivididos em 3 subgrupos, de acordo com o tratamento antimicrobiano: BlueM® (B), clorexidina (CX) e um grupo controle (CT) sem tratamento. O biofilme de <i>S. gordonii</i> foi submetido aos tratamentos acima citados por 5 minutos. Após os tratamentos foi realizado a contagem das unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/ml) em meio específico, de cada subgrupo avaliado.			
<b>RESULTADOS</b>	Houve diferença estatisticamente significante ( $p < 0,05$ ) entre os subgrupos B e CX em relação ao grupo CT nas duas superfícies. Porém, não houve diferença estatística significante entre os subgrupos B e CX tanto na SL quanto na ST.			
<b>CONCLUSOES</b>	O gel com oxigênio ativo apresentou efeito antimicrobiano promissor sobre biofilme de <i>S. gordonii</i> formado de discos de titânio, em ambas as superfícies analisadas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Cheng, J., Chen, L., Tao, X., Qiang, X., Li, R., Ma, J., Shi, D., (#38) Qiu, Z. (2023). Efficacy of surgical methods for peri-implantitis: a systematic review and network meta-analysis. <i>BMC oral health</i> , 23(1), 227. 2- Santos, V. C. E. D., Maquera-Huacho, P. M., Imbriani, M. J. M., Minhaco, V. M. T. R., (#38) Spolidorio, D. M. P. (2023). Effects of BlueM® against <i>Streptococcus mutans</i> biofilm and its virulence gene expression. <i>Brazilian dental journal</i> , 34(1), 19–28. 3- Ryu, H. S., Kim, Y. I., Lim, B. S., Lim, Y. J., (#38) Ahn, S. J. (2015). Chlorhexidine Uptake and Release From Modified Titanium Surfaces and Its Antimicrobial Activity. <i>Journal of periodontology</i> , 86(11), 1268–1275.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14252	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678290 - CRISTINE HARALAMBOS BASSOUKOU	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	Efeito do gel com oxigênio ativo sobre biofilme de Streptococcus gordonii em superfície de titânio.			
<b>INTRODUCAO</b>	O tratamento e a recuperação dos tecidos perimplantares são importantes para a manutenção dos implantes dentários tanto do ponto de vista funcional como estético. Portanto, a descontaminação da superfície do implante é um passo importante no tratamento da perimplantite, porém a descontaminação mecânica como raspagem e alisamento desta superfície não é suficiente para eliminar os microrganismos da superfície dos implantes. O uso de clorexidina e géis que liberam oxigênio ativo tem sido sugerido como terapias complementares no tratamento da perimplantite.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito antimicrobiano de um gel com oxigênio ativo (BlueM®) sobre biofilme de Streptococcus gordonii (S. gordonii) formado em discos de titânio de superfície lisa (SL) e superfície tratada (ST).			
<b>METODOLOGIA</b>	Um total de 54 discos, divididos em 2 grupos SL e ST e subdivididos em 3 subgrupos, de acordo com o tratamento antimicrobiano: BlueM® (B), clorexidina (CX) e um grupo controle (CT) sem tratamento. O biofilme de S. gordonii foi submetido aos tratamentos acima citados por 5 minutos. Após os tratamentos foi realizado a contagem das unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/ml) em meio específico, de cada subgrupo avaliado.			
<b>RESULTADOS</b>	Houve diferença estatisticamente significante (p(#60)0,05) entre os subgrupos B e CX em relação ao grupo CT nas duas superfícies. Porém, não houve diferença estatística significante entre os subgrupos B e CX tanto na SL quanto na ST.			
<b>CONCLUSOES</b>	O gel com oxigênio ativo apresentou efeito antimicrobiano promissor sobre biofilme de S. gordonii formado de discos de titânio, em ambas as superfícies analisadas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Cheng, J., Chen, L., Tao, X., Qiang, X., Li, R., Ma, J., Shi, D., (#38) Qiu, Z. (2023). Efficacy of surgical methods for peri-implantitis: a systematic review and network meta-analysis. BMC oral health, 23(1), 227. 2- Santos, V. C. E. D., Maquera-Huacho, P. M., Imbriani, M. J. M., Minhaco, V. M. T. R., (#38) Spolidorio, D. M. P. (2023). Effects of BlueM® against Streptococcus mutans biofilm and its virulence gene expression. Brazilian dental journal, 34(1), 19-28. 3- Ryu, H. S., Kim, Y. I., Lim, B. S., Lim, Y. J., (#38) Ahn, S. J. (2015). Chlorhexidine Uptake and Release From Modified Titanium Surfaces and Its Antimicrobial Activity. Journal of periodontology, 86(11), 1268-1275.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14253	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4259572 - MARCELO FERNANDES DE CASTRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	O uso do plasma de baixa temperatura sobre pressão atmosférica e da terapia fotodinâmica sobre biofilme de Streptococcus gordonii em superfície de titânio.			
<b>INTRODUCAO</b>	Os implantes dentários são parte indispensável da odontologia clínica. A peri-implantite está presente em 20% de todos os pacientes implantados. Portanto, a eliminação de colonizadores primários, como o Streptococcus gordonii, da superfície dos implantes, pode ser decisiva para seu sucesso a longo prazo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito antimicrobiano de diferentes tratamentos: Plasma de baixa temperatura sob pressão atmosférica (PBTPA), Terapia Fotodinâmica (PDT) e Clorexidina (CX), sobre biofilme de S. gordonii, em discos de titânio de superfície lisa e superfície tratada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um total de 90 discos, divididos em 2 grupos superfície lisa (SL) e superfície tratada (ST) e subdivididos em 4 subgrupos, de acordo com o tratamento antimicrobiano: plasma de baixa temperatura sob pressão atmosférica (PBTPA), terapia fotodinâmica (PDT), clorexidina (CX) e um grupo controle (CT), sem tratamento. O biofilme de Streptococcus gordonii (S. gordonii) foi submetido aos tratamentos acima citados por 5 minutos. Após os tratamentos foi realizada a contagem das unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/ml) em meio específico, de cada subgrupo avaliado.			
<b>RESULTADOS</b>	O subgrupo PBTPA apresentou a menor contagem de UFC/ml em comparação com todos os subgrupos avaliados (p(#60)0,001), tanto em SL quanto em ST. Na SL, os subgrupos PDT e CX tiveram menor número de UFC/ml em comparação ao grupo CT (p(#60)0,05). No entanto, em ST, apenas o subgrupo PDT não teve diferença estatística em relação ao subgrupo CT.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluiu-se que dentre os tratamentos antimicrobianos avaliados, o PBTPA teve uma maior ação antimicrobiana sobre o biofilme de S. gordonii, tanto em SL quanto em ST.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Lima GDMG, Borges AC, Nishime TMC, Santana-Melo GDF, Kostov KG, Mayer MPA, et al. Cold Atmospheric Plasma Jet as a Possible Adjuvant Therapy for Periodontal Disease. Molecules. 15 de setembro de 2021;26(18):5590. 2. Toma S, Behets C, Brex MC, Lasserre JF. In Vitro Comparison of the Efficacy of Peri-Implantitis Treatments on the Removal and Recolonization of Streptococcus gordonii Biofilm on Titanium Disks. Materials. 6 de dezembro de 2018;11(12):2484. 3. Ichioka Y, Derks J, Dahlén G, Berglundh T, Larsson L. In vitro evaluation of chemical decontamination of titanium discs. Sci Rep. 23 de novembro de 2021;11(1):22753.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14253	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678150 - JASIEL DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	O uso do plasma de baixa temperatura sobre pressão atmosférica e da terapia fotodinâmica sobre biofilme de Streptococcus gordonii em superfície de titânio.			
<b>INTRODUCAO</b>	Os implantes dentários são parte indispensável da odontologia clínica. A peri-implantite está presente em 20% de todos os pacientes implantados. Portanto, a eliminação de colonizadores primários, como o Streptococcus gordonii, da superfície dos implantes, pode ser decisiva para seu sucesso a longo prazo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito antimicrobiano de diferentes tratamentos: Plasma de baixa temperatura sob pressão atmosférica (PBTPA), Terapia Fotodinâmica (PDT) e Clorexidina (CX), sobre biofilme de S. gordonii, em discos de titânio de superfície lisa e superfície tratada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um total de 90 discos, divididos em 2 grupos superfície lisa (SL) e superfície tratada (ST) e subdivididos em 4 subgrupos, de acordo com o tratamento antimicrobiano: plasma de baixa temperatura sob pressão atmosférica (PBTPA), terapia fotodinâmica (PDT), clorexidina (CX) e um grupo controle (CT), sem tratamento. O biofilme de Streptococcus gordonii (S. gordonii) foi submetido aos tratamentos acima citados por 5 minutos. Após os tratamentos foi realizada a contagem das unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/ml) em meio específico, de cada subgrupo avaliado.			
<b>RESULTADOS</b>	O subgrupo PBTPA apresentou a menor contagem de UFC/ml em comparação com todos os subgrupos avaliados (p(#60)0,001), tanto em SL quanto em ST. Na SL, os subgrupos PDT e CX tiveram menor número de UFC/ml em comparação ao grupo CT (p(#60)0,05). No entanto, em ST, apenas o subgrupo PDT não teve diferença estatística em relação ao subgrupo CT.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluiu-se que dentre os tratamentos antimicrobianos avaliados, o PBTPA teve uma maior ação antimicrobiana sobre o biofilme de S. gordonii, tanto em SL quanto em ST.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Lima GDMG, Borges AC, Nishime TMC, Santana-Melo GDF, Kostov KG, Mayer MPA, et al. Cold Atmospheric Plasma Jet as a Possible Adjuvant Therapy for Periodontal Disease. Molecules. 15 de setembro de 2021;26(18):5590. 2. Toma S, Behets C, Brex MC, Lasserre JF. In Vitro Comparison of the Efficacy of Peri-Implantitis Treatments on the Removal and Recolonization of Streptococcus gordonii Biofilm on Titanium Disks. Materials. 6 de dezembro de 2018;11(12):2484. 3. Ichioka Y, Derks J, Dahlén G, Berglundh T, Larsson L. In vitro evaluation of chemical decontamination of titanium discs. Sci Rep. 23 de novembro de 2021;11(1):22753.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14253	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678290 - CRISTINE HARALAMBOS BASSOUKOU	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka		
<b>TITULO</b>	O uso do plasma de baixa temperatura sobre pressão atmosférica e da terapia fotodinâmica sobre biofilme de Streptococcus gordonii em superfície de titânio.			
<b>INTRODUCAO</b>	Os implantes dentários são parte indispensável da odontologia clínica. A peri-implantite está presente em 20% de todos os pacientes implantados. Portanto, a eliminação de colonizadores primários, como o Streptococcus gordonii, da superfície dos implantes, pode ser decisiva para seu sucesso a longo prazo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito antimicrobiano de diferentes tratamentos: Plasma de baixa temperatura sob pressão atmosférica (PBTPA), Terapia Fotodinâmica (PDT) e Clorexidina (CX), sobre biofilme de S. gordonii, em discos de titânio de superfície lisa e superfície tratada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um total de 90 discos, divididos em 2 grupos superfície lisa (SL) e superfície tratada (ST) e subdivididos em 4 subgrupos, de acordo com o tratamento antimicrobiano: plasma de baixa temperatura sob pressão atmosférica (PBTPA), terapia fotodinâmica (PDT), clorexidina (CX) e um grupo controle (CT), sem tratamento. O biofilme de Streptococcus gordonii (S. gordonii) foi submetido aos tratamentos acima citados por 5 minutos. Após os tratamentos foi realizada a contagem das unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/ml) em meio específico, de cada subgrupo avaliado.			
<b>RESULTADOS</b>	O subgrupo PBTPA apresentou a menor contagem de UFC/ml em comparação com todos os subgrupos avaliados (p(#60)0,001), tanto em SL quanto em ST. Na SL, os subgrupos PDT e CX tiveram menor número de UFC/ml em comparação ao grupo CT (p(#60)0,05). No entanto, em ST, apenas o subgrupo PDT não teve diferença estatística em relação ao subgrupo CT.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluiu-se que dentre os tratamentos antimicrobianos avaliados, o PBTPA teve uma maior ação antimicrobiana sobre o biofilme de S. gordonii, tanto em SL quanto em ST.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Lima GDMG, Borges AC, Nishime TMC, Santana-Melo GDF, Kostov KG, Mayer MPA, et al. Cold Atmospheric Plasma Jet as a Possible Adjuvant Therapy for Periodontal Disease. Molecules. 15 de setembro de 2021;26(18):5590. 2. Toma S, Behets C, Brex MC, Lasserre JF. In Vitro Comparison of the Efficacy of Peri-Implantitis Treatments on the Removal and Recolonization of Streptococcus gordonii Biofilm on Titanium Disks. Materials. 6 de dezembro de 2018;11(12):2484. 3. Ichioka Y, Derks J, Dahlén G, Berglundh T, Larsson L. In vitro evaluation of chemical decontamination of titanium discs. Sci Rep. 23 de novembro de 2021;11(1):22753.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14256	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3992683 - LUAN FORTE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Patricia Daniele Piaulino de Araujo		ANDREA FORGAS SALUM
<b>TITULO</b>	PREVALÊNCIA DE LESÕES EM ATLETAS DE FUTSAL AMADOR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A prática do Futsal requer mudança de direções a todo momento, aceleração e desaceleração, força e impulso, principalmente em membros inferiores. Durante a partida dessa modalidade, pode ocorrer traumas, entorses, estiramentos, rupturas, concussões e afins. Os atletas amadores não vivem do esporte, mas a prática do futsal concomitantemente a rotina estressante de trabalho, a falta de preparo físico, pouco tempo de descanso mental e físico podem ser fatores que desencadeiam lesões osteomioarticulares nesse grupo específico de indivíduos.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse estudo foi verificar a prevalência de lesões ortopédicas em atletas amadores de futsal. Avaliar os principais segmentos afetados na prática esportiva do Futsal. Relacionar se a ocorrência de lesões diminui a frequência de comparecimento aos jogos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo observacional, transversal com análise quantitativa dos dados. Participaram do estudo 42 atletas de futsal amador do extremo sul da cidade de São Paulo. Os critérios de inclusão foram: idade acima de 20 anos, praticantes do esporte pelos respectivos times (Fusion Futsal, IMF, Roma Futsal) e foram excluídos os indivíduos que não apresentassem lesão ortopédica autorreferida devido ao esporte ou que não assinaram o TCLE			
<b>RESULTADOS</b>	A idade média dos atletas foi de 29 anos. A prevalência de lesões foi de 92,8% e em sua maioria com lesão nos joelhos (32%) seguidos do segmento de tornozelo e pé (45%), mostrando que o gesto esportivo do futsal contribui diretamente nesse resultado. Foi verificado que a frequência semanal de comparecimento aos jogos diminuiu 52% nos atletas que sofreram alguma lesão. Apesar dessa diminuição, constatou-se 62% dos atletas não apresentam receio ao retorno esportivo, demonstrando que muitos continuam utilizando o futsal como lazer ou até mesmo como uma fonte de renda extra.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os atletas amadores de futsal apresentam maior prevalência de lesões osteomioarticulares em membros inferiores, sendo respectivamente mais frequentes as lesões de joelho, tornozelo e pé. O receio de ocorrer novas lesões é pequeno comparado ao comparecimento aos jogos e frequência semanal pós lesão.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Angoorani H, Haratian Z, Mazaherinezhad A, Younespour, S. Injuries in Iran Futsal National Teams: A Comparative Study of Incidence and Characteristics. Asian J Sports Med, 2014, 5(3), 23070. 2. Bento M, Coratella G, Schena F. Brief review of the state of art in futsal. J Sports Med Phys Fitness. 2016 Apr;56(4):428-32. 3. Hinz M, Kleim B D, Berthold D P, Geyer S, Lambert C, Imhoff A B, Mehl, J. Injury Patterns, Risk Factors, and Return to Sport in Brazilian Jiu Jitsu A Cross-sectional Survey of 1140 Athletes. Orthop J Sports Med 2021 Dec 20;9(12):23259671211062568. 4. Junge A, Dvorak, J. Injury risk of playing football in Futsal World Cups. Br J Sports Med. 2010, 44(15), 1089–1092.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14257	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		492620 - KARIN CRISTINA GARCIA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio	Luiz Henrique da Silva Nali	ENAN B. DOMINGUES SANDRO LUIS DE ANDRADE MATAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da resposta humoral anti -HERV e anti -MOG em líquido cefalorraquidiano de pacientes com esclerose múltipla			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurodegenerativa inflamatória crônica do sistema nervoso central (SNC) que afeta adultos jovens. As mulheres representam maior incidência da doença. A EM afeta mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo Os sintomas dependem da localização de focos inflamatórios que podem acometer todas as regiões do SNC e incluem alteração da memória, visão e atenção e dificuldade nas atividades diárias [1] A etiologia da EM é desconhecida, porém ela pode ser caracterizada como uma doença multifatorial, onde há fatores genéticos associados a fatores ambientais: exposição aos raios solares, latitude, tabagismo, dieta, obesidade, deficiência de vitamina D, infecções virais (Herpesviridae, o EBV) e suscetibilidade genética, são capazes desencadear resposta imunogênica da doença. Dentre os principais possíveis agentes etiológicos que possam estar associados a EM, os Retrovirus Endógenos Humanos (HERVs) podem exercer um papel em induzir uma resposta autoimune seja por quebra de tolerância ou mimetismo molecular induzindo uma resposta humoral cruzada entre MOG e HERV-W[2].</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a resposta humoral anti peptídeos de HERV-W e K em LCR de pacientes com Esclerose Múltipla			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Esse é um estudo transversal do tipo caso controle. O estudo foi realizado em colaboração com o laboratório Senne Liquor que forneceu 25 amostras de LCR de pacientes diagnosticados com EM (Grupo Esclerose Múltipla) e 25 amostras de pseudotumor (Grupo Controle) O trabalho foi aprovado no CEP sob parecer 55272749 Foram realizados contagem global e diferencial do LCR, dosagens bioquímicas e Banda Oligoclonal. Para detecção de resposta humoral anti HERV e anti MOG, um ensaio de ELISA in-house foi padronizado e utilizado, análise estatística foi avaliada no programa GraphPad Prism versão 6.0 (La Jolla, California), utilizado o Mann –Whitney (não paramétrico).</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>A análise do LCR demonstrou pelo índice de IgG e BOC tipo 2 e 3, síntese intratecal de anticorpos. O ensaio de ELISA anti-HERV-K e W revelou resposta humoral anti MOG e HERV-W nos indivíduos com EM em comparação com GC (p(#60)0,001 e p (#60) 0,0142 respectivamente), com relação análise do HERV-K, os resultados revelaram maior resposta humoral para três peptídeos de HERV-K (p(#60) 0,0007; p(#60)0,0009; p(#60)0,0001).</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Através do método de Elisa indireto demonstramos resposta humoral anti-Herv-W (env) e anti-MOG e anti-Herv-k(pol). Utilizando peptídeos que foram sintetizados possuindo 50 % de similaridade com a MOG, que mostram locais potenciais para a resposta autoimune, por meio de mimetismo molecular entre os HERVs e a MOG. No presente estudo trazemos resposta humoral anti-Herv-K para gene pol, gene pouco estudado nas doenças autoimunes.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1.Rangel SC, da Silva MD et al. Human endogenous retroviruses and the inflammatory response: A vicious circle associated with health and illness. Front Immunol. 2022 Nov 23;13. 2.Arru G, Sechi E, Mariotto S,et al. Antibody response against HERV-W env surface peptides differentiates multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder. Mult Scler J Exp Transl Clin. 2017 Dec 22;3(4):205521731774242.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14257	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382943 - SAMUEL NASCIMENTO SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio	Luiz Henrique da Silva Nali	ENAN B. DOMINGUES SANDRO LUIS DE ANDRADE MATAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da resposta humoral anti -HERV e anti -MOG em líquido cefalorraquidiano de pacientes com esclerose múltipla			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurodegenerativa inflamatória crônica do sistema nervoso central (SNC) que afeta adultos jovens. As mulheres representam maior incidência da doença. A EM afeta mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo Os sintomas dependem da localização de focos inflamatórios que podem acometer todas as regiões do SNC e incluem alteração da memória, visão e atenção e dificuldade nas atividades diárias [1] A etiologia da EM é desconhecida, porém ela pode ser caracterizada como uma doença multifatorial, onde há fatores genéticos associados a fatores ambientais: exposição aos raios solares, latitude, tabagismo, dieta, obesidade, deficiência de vitamina D, infecções virais (Herpesviridae, o EBV) e suscetibilidade genética, são capazes desencadear resposta imunogênica da doença. Dentre os principais possíveis agentes etiológicos que possam estar associados a EM, os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) podem exercer um papel em induzir uma resposta autoimune seja por quebra de tolerância ou mimetismo molecular induzindo uma resposta humoral cruzada entre MOG e HERV-W[2].</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a resposta humoral anti peptídeos de HERV-W e K em LCR de pacientes com Esclerose Múltipla			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Esse é um estudo transversal do tipo caso controle. O estudo foi realizado em colaboração com o laboratório Senne Liquor que forneceu 25 amostras de LCR de pacientes diagnosticados com EM (Grupo Esclerose Múltipla) e 25 amostras de pseudotumor (Grupo Controle) O trabalho foi aprovado no CEP sob parecer 55272749 Foram realizados contagem global e diferencial do LCR, dosagens bioquímicas e Banda Oligoclonal. Para detecção de resposta humoral anti HERV e anti MOG, um ensaio de ELISA in-house foi padronizado e utilizado, análise estatística foi avaliada no programa GraphPad Prism versão 6.0 (La Jolla, California), utilizado o Mann -Whitney (não paramétrico).</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A análise do LCR demonstrou pelo índice de IgG e BOC tipo 2 e 3, síntese intratecal de anticorpos. O ensaio de ELISA anti-HERV-K e W revelou resposta humoral anti MOG e HERV-W nos indivíduos com EM em comparação com GC (p(#60)0,001 e p (#60) 0,0142 respectivamente), com relação análise do HERV-K, os resultados revelaram maior resposta humoral para três peptídeos de HERV-K (p(#60) 0,0007; p(#60)0,0009; p(#60)0,0001).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Através do método de Elisa indireto demonstramos resposta humoral anti-Herv-W (env) e anti-MOG e anti-Herv-k(pol). Utilizando peptídeos que foram sintetizados possuindo 50 % de similaridade com a MOG, que mostram locais potenciais para a resposta autoimune, por meio de mimetismo molecular entre os HERVs e a MOG. No presente estudo trazemos resposta humoral anti-Herv-K para gene pol, gene pouco estudado nas doenças autoimunes.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1.Rangel SC, da Silva MD et al. Human endogenous retroviruses and the inflammatory response: A vicious circle associated with health and illness. Front Immunol. 2022 Nov 23;13. 2.Arru G, Sechi E, Mariotto S,et al. Antibody response against HERV-W env surface peptides differentiates multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder. Mult Scler J Exp Transl Clin. 2017 Dec 22;3(4):205521731774242.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14260	Psicologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4222024 - SABRINA ARAUJO VITURIANO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Natali Maia Marques		
<b>TITULO</b>	Aspectos sociodemográficos e clínicos de crianças e adolescentes acolhidos em decorrência de maus-tratos no contexto de pandemia de COVID-19			
<b>INTRODUCAO</b>	O abuso infantil causa efeitos ao longo da vida, incluindo depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, assim como impactos no desenvolvimento do sistema nervoso. A pandemia de COVID-19 resultou em altos índices de negligência infantil e aumento de acolhimentos pelo Estado, como evidenciado no Anuário de Segurança Pública de 2022. Este estudo busca entender os impactos sociais e clínicos em crianças sob tutela do Estado em São Paulo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar os aspectos sociodemográficos e psicológicos de crianças e adolescentes em contexto de abrigo no período da Pandemia.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo envolveu quatro instituições de abrigo infantil em São Paulo. Analisou os impactos do abuso infantil durante o distanciamento social. Utilizando um formulário online, as instituições compartilharam suas perspectivas, que foram comparadas com a literatura existente. Até o momento duas instituições preencheram o formulário. As respostas estão sendo categorizadas numericamente para compreender os agravamentos nos impactos psicológicos e emocionais causados pelo abuso infantil.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram identificados dois perfis de instituições de acolhimento a partir dos formulários coletados: a primeira unidade abrange vítimas de todos os tipos de violência, enquanto a segunda acolhe crianças vítimas de negligência e maus-tratos. No total, 32 crianças foram acolhidas na região Sul e Oeste de São Paulo, abrangendo ambos os gêneros com idades de 0 a 18 anos. Os impactos incluem tristeza, dificuldade em demonstrar sentimentos, irritabilidade, agressividade, comportamentos erotizados, choro e auto exposição. Alterações fisiológicas incluem enurese e sintomas psicossomáticos. Houve também dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento social, atribuídas à falta de estímulo aos estudos, com hipótese de TDAH e outros quadros do neurodesenvolvimento. As disregulações emocionais foram consideradas raras, com comportamentos agressivos sendo os mais comuns devido ao repertório das vítimas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os impactos sociais encontrados foram o isolamento social, a importância da avaliação para verificar quadros do neurodesenvolvimento, sendo também um impacto clínico na vida das vítimas já que não conseguem ter acesso ao seu possível diagnóstico, bem como a disregulação emocional acentuada, agressividade exacerbada e irritabilidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	Fórum de Segurança Pública, Anuário brasileiro de segurança pública 2022 – anuario-2022.pdf (forumseguranca.org.br) Nunes K, Tonietto L, Dias K, Rego C. O impacto dos maus-tratos na infância no desenvolvimento do cérebro e no funcionamento infantil: uma revisão. Diphora -Porto Alegre 2020; 9 (3), 2020. Magalhães BC, Souza RCS, Silva MO, Oliveira HMNS, Antunes SLD, Gomes GA, Antunes ALD, Gumes VJR, Fernandes LEL, Souza CLS. Abuso infantil no período da pandemia da COVID-19. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 23(1), e11352. <a href="https://doi.org/10.25248/reas.e11352.2023">https://doi.org/10.25248/reas.e11352.2023</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14260	Psicologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4371500 - CIBELE RODRIGUES DA CRUZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Natali Maia Marques		
<b>TITULO</b>	Aspectos sociodemográficos e clínicos de crianças e adolescentes acolhidos em decorrência de maus-tratos no contexto de pandemia de COVID-19			
<b>INTRODUCAO</b>	O abuso infantil causa efeitos ao longo da vida, incluindo depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, assim como impactos no desenvolvimento do sistema nervoso. A pandemia de COVID-19 resultou em altos índices de negligência infantil e aumento de acolhimentos pelo Estado, como evidenciado no Anuário de Segurança Pública de 2022. Este estudo busca entender os impactos sociais e clínicos em crianças sob tutela do Estado em São Paulo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar os aspectos sociodemográficos e psicológicos de crianças e adolescentes em contexto de abrigo no período da Pandemia.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo envolveu quatro instituições de abrigo infantil em São Paulo. Analisou os impactos do abuso infantil durante o distanciamento social. Utilizando um formulário online, as instituições compartilharam suas perspectivas, que foram comparadas com a literatura existente. Até o momento duas instituições preencheram o formulário. As respostas estão sendo categorizadas numericamente para compreender os agravamentos nos impactos psicológicos e emocionais causados pelo abuso infantil.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram identificados dois perfis de instituições de acolhimento a partir dos formulários coletados: a primeira unidade abrange vítimas de todos os tipos de violência, enquanto a segunda acolhe crianças vítimas de negligência e maus-tratos. No total, 32 crianças foram acolhidas na região Sul e Oeste de São Paulo, abrangendo ambos os gêneros com idades de 0 a 18 anos. Os impactos incluem tristeza, dificuldade em demonstrar sentimentos, irritabilidade, agressividade, comportamentos erotizados, choro e auto exposição. Alterações fisiológicas incluem enurese e sintomas psicossomáticos. Houve também dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento social, atribuídas à falta de estímulo aos estudos, com hipótese de TDAH e outros quadros do neurodesenvolvimento. As disregulações emocionais foram consideradas raras, com comportamentos agressivos sendo os mais comuns devido ao repertório das vítimas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os impactos sociais encontrados foram o isolamento social, a importância da avaliação para verificar quadros do neurodesenvolvimento, sendo também um impacto clínico na vida das vítimas já que não conseguem ter acesso ao seu possível diagnóstico, bem como a disregulação emocional acentuada, agressividade exacerbada e irritabilidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	Fórum de Segurança Pública, Anuário brasileiro de segurança pública 2022 – anuario-2022.pdf (forumseguranca.org.br) Nunes K, Tonietto L, Dias K, Rego C. O impacto dos maus-tratos na infância no desenvolvimento do cérebro e no funcionamento infantil: uma revisão. Diphora -Porto Alegre 2020; 9 (3), 2020. Magalhães BC, Souza RCS, Silva MO, Oliveira HMNS, Antunes SLD, Gomes GA, Antunes ALD, Gumes VJR, Fernandes LEL, Souza CLS. Abuso infantil no período da pandemia da COVID-19. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 23(1), e11352. <a href="https://doi.org/10.25248/reas.e11352.2023">https://doi.org/10.25248/reas.e11352.2023</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14261	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4431294 - GABRIELA SILVA SIQUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Patricia Daniele Piauino de Araujo		
<b>TITULO</b>	ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA ONLINE PARA O AUTOGERENCIAMENTO DA ASMA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A asma é definida como uma doença inflamatória crônica caracterizada pela hiperresponsividade das vias aéreas. Entre os sintomas mais encontrados estão os sibilos, alta de ar, aperto no peito, tosse e hipersecreção. Os alérgenos, como mofo, ácaros, pelos de animais e insetos, infecções, poluição do ar, perfume e fumaça de tabaco, estão mais intimamente associados a aumentos nos sintomas e na gravidade da asma, mudanças climáticas também estão relacionadas com essas exacerbações. O autogerenciamento da asma, dessa forma, tem um papel essencial no tratamento da doença pois conhecer o contexto da patologia é mais uma proposta de plano terapêutico para a asma.			
<b>OBJETIVOS</b>	Elaborar uma cartilha em forma de postagens do Instagram sobre o autogerenciamento da asma para pacientes e familiares de portadores dessa patologia.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo contou com uma revisão de literatura dos últimos 5 anos, que utilizou a base de dados Pubmed, BVS, Scielo e PEDro para elaboração das informações educacionais para o controle da asma. Realizamos a elaboração de uma cartilha em forma de postagens do Instagram que foi produzida através da Ferramenta online Canva®. Essa cartilha foi dividida em assuntos importantes para o autogerenciamento da asma levando em consideração autores da literatura científica pesquisada. Esse material está pronto para ser publicado nas redes sociais após a aprovação do comitê de ética em pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	No período de junho a setembro de 2023, foram criados 10 temas para o autogerenciamento da asma subdivididos em 71 postagens. Os temas foram: "O que é a asma", "O que acontece em uma crise de asma", "Sinais e sintomas da asma", "Diagnóstico da asma", "Graus da asma", "Educação em asma", "Os gatilhos da asma", "Tipos de dispositivos inalatórios", "Tratamento não farmacológicos" e "Comorbidades associadas a asma".			
<b>CONCLUSÕES</b>	Há diversos autores que confirmam que o autogerenciamento da asma é importante para o controle dos sintomas e evitar exacerbações. As mídias sociais podem ter um papel importante no processo de divulgação de informações relevantes sobre a doença. A elaboração das postagens que podem ser utilizadas em rede social pode contribuir para informações assertivas com uma linguagem informal ao público.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1- Carvalho-Pinto RM, Cançado JED, Pizzichini MMM, Fiterman J, Rubin AS, Cerci Neto A, et al. 2021 Brazilian Thoracic Association recommendations for the management of severe asthma. J Bras Pneumol. 2021;47(6):e20210273 2-Levy ML, Bacharier LB, Bateman E, Boulet LP, Brightling C, Buhl R, Brusselle G, Cruz AA, Drazen JM, Duijts L, Fleming L, Inoue H, Ko FWS, Krishnan JA, Mortimer K, Pitrez PM, Sheikh A, Yorganc(#38)#305;o(#38)#287;lu A, Reddel HK. Key recommendations for primary care from the 2022 Global Initiative for Asthma (GINA) update. NPJ Prim Care Respir Med. 2023 Feb 8;33(1):7. doi: 10.1038/s41533-023-00330-1. PMID: 36754956; PMCID: PMC9907191. 3- Evaristo KB, Mendes FAR, Saccomani MG, et al. Effects of Aerobic Training Versus Breathing Exercises on Asthma Control: A Randomized Trial. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(9):2989-2996.e4. doi:10.1016/j.jaip.2020.06.042			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14263	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3969398 - PALOMA SOUZA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Patricia Daniele Piauino de Araujo		
<b>TITULO</b>	USO DE TECNOLOGIAS E QUALIDADE DO SONO EM UNIVERSITÁRIOSUSO DE TECNOLOGIAS E QUALIDADE DO SONO EM UNIVERSITÁRIOSUSO DE TECNOLOGIAS E QUALIDADE DO SONO EM UNIVERSITÁRIOS			
<b>INTRODUCAO</b>	O sono é caracterizado por modificação do estado de consciência e é importante para aprendizado e desempenho cognitivo. Estudos mostram que problemas e insatisfação com sono são prevalentes e crescentes entre estudantes universitários, pois estão particularmente vulneráveis à privação de sono que pode estar relacionada ao uso de tecnologias digitais como o celular e redes sociais sobrando menos tempo para outras atividades, inclusive para dormir.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os efeitos do uso das tecnologias digitais relacionando-as com a qualidade do sono e o nível de sonolência diurna em universitários.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal, prospectivo e descritivo, devidamente aprovado pelo CEP. Todos os participantes responderam aos questionários autoaplicáveis: Termo de consentimento livre e esclarecido Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg, Escala de Sonolência Diurna de Epworth e o Questionário de Tecnologias Portáteis e internet Móvel. O Teste quiquadrado e Mann-Whitney foram utilizados para avaliar as associações sendo considerado significativamente diferentes aqueles que atendessem ao p (#38)#8804; 0,05.			
<b>RESULTADOS</b>	A amostra foi de 213 indivíduos, 82,6% do sexo feminino e 17,4% do masculino, 70,2% com idade inferior a 25 anos. Todos possuem telefone celular e 87,7% possuem tablet ou computador com acesso a internet. 69,8% são do período noturno e 68,9% deles também trabalha. Foram considerados maus dormidores 86,8%, sendo que 68,5% também tem sonolência excessiva diurna. Quanto ao uso de tecnologias, 34,7% usam mais de 10 horas por dia. O público feminino apresenta sonolência diurna (p=0,04), além de que as com mais de 25 anos tem pior qualidade do sono (p=0,04).			
<b>CONCLUSOES</b>	A qualidade do sono e a sonolência diurna estão prejudicados nos universitários. Comparando os gêneros, o feminino apresenta pior qualidade do sono e quanto maior a idade mais sonolência excessiva diurna. Realizar atividades físicas, além de estudar, trabalhar e morar próximo a universidade não interferiram diretamente na qualidade do sono.			
<b>REFERENCIAS</b>	1-Oliveira CR, Oliveira BC, Ferreira LGF. Qualidade de sono em universitários de uma instituição privada. Rev Pesqui Fisioter. 2020;10(2):274-281. doi: 10.17267/2238-2704rpf.v10i2.2916 2-Trockel, MT, Barnes, MD e Egget, DL (2000). Variáveis relacionadas à saúde e desempenho acadêmico entre estudantes universitários do primeiro ano: implicações para o sono e outros comportamentos. Geléia. Col. Saúde 49, 125–131. doi: 10.1080/07448480009596294 3-Buboltz, WC, Brown, F., e Soper, B. (2001). Hábitos e padrões de sono de universitários: um estudo preliminar. Geléia. Col. Saúde 50, 131–135. doi: 10.1080/07448480109596017 4-Gaultney, JF (2010). Prevalência de distúrbios do sono em universitários: impacto no desempenho acadêmico. Geléia. Col. Saúde 59, 91–97. doi: 10.1080/07448481.2010.483708 5-Gomes AA, Tavares J, de Azevedo MH. Sono e desempenho acadêmico em universitários: uma abordagem multimídia e multipreditora. Cronobiol Int. 2011;28:786–801. 6- Murillo R, Lambiase MJ, Rockette-Wagner BJ, Kriska AM, Haibach JP, Thurston RC. Racial/ethnic differences in the associations between physical activity and sleep duration: a population-based study. J Phys Act Health 2017;14:138-44			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14264	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4061284 - MARINA PARDINHO DOS SANTOS RIBEIRO DA CRUZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NO AMBIENTE ESCOLAR			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O autismo, segundo a APA(2013), é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e comportamento. Essas crianças enfrentam desafios na escola, mas compreendê-las é essencial para seu desenvolvimento. O Psicólogo Escolar pode desempenhar um papel crucial, considerando a teoria sócio-histórica de Vygotsky, que destaca a interação social e cultural no processo de aprendizado. As crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tendem a apresentar um desenvolvimento comprometido ou acentuado da inserção social e da comunicação, contudo mesmo com tais limitações esses alunos integram o ambiente escolar e devem ser inseridas nessa rotina, a inclusão é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento físico e intelectual dessas crianças.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a atuação do psicólogo na inclusão de crianças autistas no âmbito escolar.			
<b>METODOLOGIA</b>	É uma revisão bibliográfica narrativa de artigos acadêmicos que exploram a alunos com TEA, professores e inclusão. Essa análise é realizada com base na literatura disponível em livros, artigos de revistas impressas e eletrônicas, interpretando e criticando os materiais. Para encontrar esses recursos, serão utilizadas plataformas de pesquisa como Scielo, BVS, Pepsico e artigos acadêmicos.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por alterações qualitativas e quantitativas na comunicação, interação social e no comportamento, em diferentes graus de severidade (APA, 2013) A inclusão é uma prática apoiada em um paradigma educacional voltado à defesa da diversidade e dos direitos humanos, tratando-se, de um processo social complexo que resulta de ações estabelecidas por agentes distintos envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem (Benítez (#38) Domeniconi, 2015). Para Vygotsky a inclusão na escola deve ser baseada na compreensão das necessidades individuais das crianças, promovendo interações sociais enriquecedoras, usando ferramentas culturais. O papel do psicólogo escolar é avaliar o desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos, ajudar na identificação de necessidades especiais, criar ambientes de aprendizado inclusivos desenvolvendo estratégias para melhorar o bem-estar, promoção da inclusão.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Conclui-se que, a atuação do psicólogo desempenha papel fundamental na inclusão da criança autista na escola. Através de observações, avaliações e intervenções, pode ajudar a identificar as necessidades específicas da criança, desenvolver estratégias de ensino adaptadas, oferecer apoio emocional para a criança. Além disso, o psicólogo pode desempenhar um papel importante na conscientização e na promoção de uma cultura inclusiva, garantindo que crianças autistas tenham acesso a uma educação de qualidade e se sintam integradas no meio escolar.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>American Psychiatric Association (APA) (2013)– Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. DSM 5a. Edição. Benitez, P.; Domeniconi, C. (2015). Inclusão Escolar: o Papel dos Agentes Educacionais Brasileiros. Psicologia: Ciência e Profissão, 35(4), <a href="https://doi.org/10.1590/1982-3703000652014">https://doi.org/10.1590/1982-3703000652014</a> Oliveira, Marta Khol de(1997). Vygotsky. aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio histórico. São Paulo: Scipio. 4ª edição. VYGOTSKY, Lev Semenovich. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução Paulo Bezerra. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14264	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4083431 - BEATRIZ NOVAIS FARIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli Aparecida Monaco		
<b>TITULO</b>	ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NO AMBIENTE ESCOLAR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O autismo, segundo a APA(2013), é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e comportamento. Essas crianças enfrentam desafios na escola, mas compreendê-las é essencial para seu desenvolvimento. O Psicólogo Escolar pode desempenhar um papel crucial, considerando a teoria sócio-histórica de Vygotsky, que destaca a interação social e cultural no processo de aprendizado. As crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tendem a apresentar um desenvolvimento comprometido ou acentuado da inserção social e da comunicação, contudo mesmo com tais limitações esses alunos integram o ambiente escolar e devem ser inseridas nessa rotina, a inclusão é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento físico e intelectual dessas crianças.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a atuação do psicólogo na inclusão de crianças autistas no âmbito escolar.			
<b>METODOLOGIA</b>	É uma revisão bibliográfica narrativa de artigos acadêmicos que exploram a alunos com TEA, professores e inclusão. Essa análise é realizada com base na literatura disponível em livros, artigos de revistas impressas e eletrônicas, interpretando e criticando os materiais. Para encontrar esses recursos, serão utilizadas plataformas de pesquisa como Scielo, BVS, Pepsico e artigos acadêmicos.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por alterações qualitativas e quantitativas na comunicação, interação social e no comportamento, em diferentes graus de severidade (APA, 2013) A inclusão é uma prática apoiada em um paradigma educacional voltado à defesa da diversidade e dos direitos humanos, tratando-se, de um processo social complexo que resulta de ações estabelecidas por agentes distintos envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem (Benitez (#38) Domeniconi, 2015). Para Vygotsky a inclusão na escola deve ser baseada na compreensão das necessidades individuais das crianças, promovendo interações sociais enriquecedoras, usando ferramentas culturais. O papel do psicólogo escolar é avaliar o desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos, ajudar na identificação de necessidades especiais, criar ambientes de aprendizado inclusivos desenvolvendo estratégias para melhorar o bem-estar, promoção da inclusão.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Conclui-se que, a atuação do psicólogo desempenha papel fundamental na inclusão da criança autista na escola. Através de observações, avaliações e intervenções, pode ajudar a identificar as necessidades específicas da criança, desenvolver estratégias de ensino adaptadas, oferecer apoio emocional para a criança. Além disso, o psicólogo pode desempenhar um papel importante na conscientização e na promoção de uma cultura inclusiva, garantindo que crianças autistas tenham acesso a uma educação de qualidade e se sintam integradas no meio escolar.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>American Psychiatric Association (APA) (2013)– Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. DSM 5a. Edição. Benitez, P.; Domeniconi, C. (2015). Inclusão Escolar: o Papel dos Agentes Educacionais Brasileiros. Psicologia: Ciência e Profissão, 35(4), <a href="https://doi.org/10.1590/1982-3703000652014">https://doi.org/10.1590/1982-3703000652014</a> Oliveira, Marta Khol de(1997). Vygotsky. aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio histórico. São Paulo: Scipio. 4ª edição. VYGOTSKY, Lev Semenovich. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução Paulo Bezerra. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14267	Botânica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		366533 - ELISANGELA GONÇALVES DA CRUZ	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marco Aurelio Sivero Mayworm		LEANDRO MATHEUS DE CARVALHO VAZ
<b>TITULO</b>	30 Anos de Contribuições Científicas do Herbário UNISA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Um herbário é um laboratório que abriga coleções de diferentes grupos de plantas e fungos na forma, principalmente de exsiccatas (plantas desidratadas) O seu principal propósito é armazenar amostras testemunhas de espécies provindas de diferentes locais, contribuindo para o conhecimento da biodiversidade. Essas coleções também desempenham um papel fundamental como recurso de pesquisa para profissionais de ciências biológicas, agronomia, medicina, nutrição, farmácia entre outras, em âmbito acadêmico, representando uma fonte valiosa de materiais para inúmeras pesquisas científicas<sup>1,2</sup>. O Herbário UNISA (Fig. 1) foi concebido na década de 1980, inicialmente concentrando suas atividades de coleta e registro da flora no Campus Interlagos da instituição. Em 1º de maio de 1993, foi formalmente estabelecido, sob a curadoria do Dr. Paulo Affonso. Entre seus objetivos estão o fornecimento de material para as disciplinas relacionadas à botânica, promoção do aprimoramento técnico-científico de estudantes e docentes, guarda de amostras testemunhas de trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso realizados pelos alunos, e desenvolvimento de atividades de pesquisa com outras Instituições.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar a produção científica do Herbário UNISA nos seus 30 anos de existência.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A presente pesquisa se dedicou à catalogação sistemática de publicações científicas, abrangendo artigos completos em periódicos, resumos apresentados em anais de congressos, TCCs e projetos de IC. Adicionalmente, foi realizada uma análise das famílias botânicas mais frequentemente documentadas no acervo do Herbário UNISA. Este procedimento culminou na criação de tabelas informativas com o propósito de aprimorar a organização e disponibilidade das informações de relevância taxonômica. Os dados foram obtidos por meio de fontes institucionais e consultas a bases de dados como Scielo e Google Acadêmico, utilizando os termos "Herbário UNISA" e "Curucutu".</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Herbário UNISA abriga um conjunto de produções científicas, incluindo 52 TCCs (Tab. 1), 40 resumos publicados em anais de congressos (Tab. 2), 13 artigos em periódicos (Tab. 3), e 10 ICs (Tab. 4). A coleção abriga 4.500 exsiccatas, com destaque para as principais famílias vegetais (Tabela 5), estabelecendo o Herbário UNISA como o quinto maior entre instituições privadas e o vigésimo segundo entre públicas e privadas no Estado de São Paulo<sup>3</sup>.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O Herbário UNISA é um acervo de extrema importância à medida que contribui para as disciplinas relacionadas a Botânica, oferece ambiente de trabalho para alunos e professores, e atua em parceria com outras Instituições na preservação da flora do município de São Paulo.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 Silva RCMV. Coleta e identificação de espécimes botânicos. 1 ed. Belém: Embrapa Amazônia Oriental; 2002. 40 p. 2 Bridson D, Forman L. The herbarium handbook. 3 ed. Kew: Royal Botanic Gardens; 1998. 334 p. 3 Mamede MCH, Simão-Bianchini R. The Herbaria of the State of São Paulo. Biota Neotrop. 2022; 22(spe): e20221408.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14267	Botânica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4103653 - MARCIA DE SOUZA BARCELLOS MATTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marco Aurelio Sivero Mayworm		LEANDRO MATHEUS DE CARVALHO VAZ
<b>TITULO</b>	30 Anos de Contribuições Científicas do Herbário UNISA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Um herbário é um laboratório que abriga coleções de diferentes grupos de plantas e fungos na forma, principalmente de exsiccatas (plantas desidratadas) O seu principal propósito é armazenar amostras testemunhas de espécies provindas de diferentes locais, contribuindo para o conhecimento da biodiversidade. Essas coleções também desempenham um papel fundamental como recurso de pesquisa para profissionais de ciências biológicas, agronomia, medicina, nutrição, farmácia entre outras, em âmbito acadêmico, representando uma fonte valiosa de materiais para inúmeras pesquisas científicas<sup>1,2</sup>. O Herbário UNISA (Fig. 1) foi concebido na década de 1980, inicialmente concentrando suas atividades de coleta e registro da flora no Campus Interlagos da instituição. Em 1º de maio de 1993, foi formalmente estabelecido, sob a curadoria do Dr. Paulo Affonso. Entre seus objetivos estão o fornecimento de material para as disciplinas relacionadas à botânica, promoção do aprimoramento técnico-científico de estudantes e docentes, guarda de amostras testemunhas de trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso realizados pelos alunos, e desenvolvimento de atividades de pesquisa com outras Instituições.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar a produção científica do Herbário UNISA nos seus 30 anos de existência.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A presente pesquisa se dedicou à catalogação sistemática de publicações científicas, abrangendo artigos completos em periódicos, resumos apresentados em anais de congressos, TCCs e projetos de IC. Adicionalmente, foi realizada uma análise das famílias botânicas mais frequentemente documentadas no acervo do Herbário UNISA. Este procedimento culminou na criação de tabelas informativas com o propósito de aprimorar a organização e disponibilidade das informações de relevância taxonômica. Os dados foram obtidos por meio de fontes institucionais e consultas a bases de dados como Scielo e Google Acadêmico, utilizando os termos "Herbário UNISA" e "Curucutu".</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Herbário UNISA abriga um conjunto de produções científicas, incluindo 52 TCCs (Tab. 1), 40 resumos publicados em anais de congressos (Tab. 2), 13 artigos em periódicos (Tab. 3), e 10 ICs (Tab. 4). A coleção abriga 4.500 exsiccatas, com destaque para as principais famílias vegetais (Tabela 5), estabelecendo o Herbário UNISA como o quinto maior entre instituições privadas e o vigésimo segundo entre públicas e privadas no Estado de São Paulo<sup>3</sup>.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O Herbário UNISA é um acervo de extrema importância à medida que contribui para as disciplinas relacionadas a Botânica, oferece ambiente de trabalho para alunos e professores, e atua em parceria com outras Instituições na preservação da flora do município de São Paulo.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 Silva RCVM. Coleta e identificação de espécimes botânicos. 1 ed. Belém: Embrapa Amazônia Oriental; 2002. 40 p. 2 Bridson D, Forman L. The herbarium handbook. 3 ed. Kew: Royal Botanic Gardens; 1998. 334 p. 3 Mamede MCH, Simão-Bianchini R. The Herbaria of the State of São Paulo. Biota Neotrop. 2022; 22(spe): e20221408.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14267	Botânica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4569741 - ANDREIA DE ABRANTES PEREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marco Aurelio Sivero Mayworm		LEANDRO MATHEUS DE CARVALHO VAZ
<b>TITULO</b>	30 Anos de Contribuições Científicas do Herbário UNISA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Um herbário é um laboratório que abriga coleções de diferentes grupos de plantas e fungos na forma, principalmente de exsiccatas (plantas desidratadas) O seu principal propósito é armazenar amostras testemunhas de espécies provindas de diferentes locais, contribuindo para o conhecimento da biodiversidade. Essas coleções também desempenham um papel fundamental como recurso de pesquisa para profissionais de ciências biológicas, agronomia, medicina, nutrição, farmácia entre outras, em âmbito acadêmico, representando uma fonte valiosa de materiais para inúmeras pesquisas científicas<sup>1,2</sup>. O Herbário UNISA (Fig. 1) foi concebido na década de 1980, inicialmente concentrando suas atividades de coleta e registro da flora no Campus Interlagos da instituição. Em 1º de maio de 1993, foi formalmente estabelecido, sob a curadoria do Dr. Paulo Affonso. Entre seus objetivos estão o fornecimento de material para as disciplinas relacionadas à botânica, promoção do aprimoramento técnico-científico de estudantes e docentes, guarda de amostras testemunhas de trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso realizados pelos alunos, e desenvolvimento de atividades de pesquisa com outras Instituições.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar a produção científica do Herbário UNISA nos seus 30 anos de existência.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A presente pesquisa se dedicou à catalogação sistemática de publicações científicas, abrangendo artigos completos em periódicos, resumos apresentados em anais de congressos, TCCs e projetos de IC. Adicionalmente, foi realizada uma análise das famílias botânicas mais frequentemente documentadas no acervo do Herbário UNISA. Este procedimento culminou na criação de tabelas informativas com o propósito de aprimorar a organização e disponibilidade das informações de relevância taxonômica. Os dados foram obtidos por meio de fontes institucionais e consultas a bases de dados como Scielo e Google Acadêmico, utilizando os termos "Herbário UNISA" e "Curucutu".</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Herbário UNISA abriga um conjunto de produções científicas, incluindo 52 TCCs (Tab. 1), 40 resumos publicados em anais de congressos (Tab. 2), 13 artigos em periódicos (Tab. 3), e 10 ICs (Tab. 4). A coleção abriga 4.500 exsiccatas, com destaque para as principais famílias vegetais (Tabela 5), estabelecendo o Herbário UNISA como o quinto maior entre instituições privadas e o vigésimo segundo entre públicas e privadas no Estado de São Paulo<sup>3</sup>.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O Herbário UNISA é um acervo de extrema importância à medida que contribui para as disciplinas relacionadas a Botânica, oferece ambiente de trabalho para alunos e professores, e atua em parceria com outras Instituições na preservação da flora do município de São Paulo.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 Silva RCMV. Coleta e identificação de espécimes botânicos. 1 ed. Belém: Embrapa Amazônia Oriental; 2002. 40 p. 2 Bridson D, Forman L. The herbarium handbook. 3 ed. Kew: Royal Botanic Gardens; 1998. 334 p. 3 Mamede MCH, Simão-Bianchini R. The Herbaria of the State of São Paulo. Biota Neotrop. 2022; 22(spe): e20221408.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14267	Botânica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4671457 - JAISLLA MARIANE MENDES RAMOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marco Aurelio Sivero Mayworm		LEANDRO MATHEUS DE CARVALHO VAZ
<b>TITULO</b>	30 Anos de Contribuições Científicas do Herbário UNISA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Um herbário é um laboratório que abriga coleções de diferentes grupos de plantas e fungos na forma, principalmente de exsiccatas (plantas desidratadas) O seu principal propósito é armazenar amostras testemunhas de espécies provindas de diferentes locais, contribuindo para o conhecimento da biodiversidade. Essas coleções também desempenham um papel fundamental como recurso de pesquisa para profissionais de ciências biológicas, agronomia, medicina, nutrição, farmácia entre outras, em âmbito acadêmico, representando uma fonte valiosa de materiais para inúmeras pesquisas científicas<sup>1,2</sup>. O Herbário UNISA (Fig. 1) foi concebido na década de 1980, inicialmente concentrando suas atividades de coleta e registro da flora no Campus Interlagos da instituição. Em 1º de maio de 1993, foi formalmente estabelecido, sob a curadoria do Dr. Paulo Affonso. Entre seus objetivos estão o fornecimento de material para as disciplinas relacionadas à botânica, promoção do aprimoramento técnico-científico de estudantes e docentes, guarda de amostras testemunhas de trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso realizados pelos alunos, e desenvolvimento de atividades de pesquisa com outras Instituições.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar a produção científica do Herbário UNISA nos seus 30 anos de existência.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A presente pesquisa se dedicou à catalogação sistemática de publicações científicas, abrangendo artigos completos em periódicos, resumos apresentados em anais de congressos, TCCs e projetos de IC. Adicionalmente, foi realizada uma análise das famílias botânicas mais frequentemente documentadas no acervo do Herbário UNISA. Este procedimento culminou na criação de tabelas informativas com o propósito de aprimorar a organização e disponibilidade das informações de relevância taxonômica. Os dados foram obtidos por meio de fontes institucionais e consultas a bases de dados como Scielo e Google Acadêmico, utilizando os termos "Herbário UNISA" e "Curucutu".</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O Herbário UNISA abriga um conjunto de produções científicas, incluindo 52 TCCs (Tab. 1), 40 resumos publicados em anais de congressos (Tab. 2), 13 artigos em periódicos (Tab. 3), e 10 ICs (Tab. 4). A coleção abriga 4.500 exsiccatas, com destaque para as principais famílias vegetais (Tabela 5), estabelecendo o Herbário UNISA como o quinto maior entre instituições privadas e o vigésimo segundo entre públicas e privadas no Estado de São Paulo<sup>3</sup>.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O Herbário UNISA é um acervo de extrema importância à medida que contribui para as disciplinas relacionadas a Botânica, oferece ambiente de trabalho para alunos e professores, e atua em parceria com outras Instituições na preservação da flora do município de São Paulo.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 Silva RCMV. Coleta e identificação de espécimes botânicos. 1 ed. Belém: Embrapa Amazônia Oriental; 2002. 40 p. 2 Bridson D, Forman L. The herbarium handbook. 3 ed. Kew: Royal Botanic Gardens; 1998. 334 p. 3 Mamede MCH, Simão-Bianchini R. The Herbaria of the State of São Paulo. Biota Neotrop. 2022; 22(spe): e20221408.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14268	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4185242 - MARIA FERNANDA MARQUES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Saúde Digital na Atenção Primária à Saúde: impactos e desafios de implementação			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A Saúde Digital, caracterizada pelo uso de tecnologias e informações na área da saúde, como telemedicina, registros eletrônicos de saúde e aplicativos móveis tem influência positiva na Atenção Primária à Saúde (APS). Esses fatores aprimoram diversos aspectos, pois podem melhorar a coordenação do cuidado, facilitar o acesso aos serviços de saúde e avançar na medicina preventiva. Além disso, o uso de ferramentas digitais na APS tem o potencial de reduzir erros médicos, melhorar a eficiência dos processos assistenciais e otimizar os recursos de saúde disponíveis. Entretanto, ressalta-se que há diversas dificuldades para sua implementação, principalmente diante das desigualdades sociais observadas no Brasil, como a capacitação dos profissionais, o pouco investimento, a reduzida acessibilidade digital. Diante da pluralidade de cenários na saúde pública do país, deve-se considerar a viabilidade e formas de aplicação da tecnologia em diferentes contextos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto da Saúde Digital na APS e explorar desafios em sua implementação.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A pesquisa é revisão bibliográfica. A coleta de informações é realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do PubMed. A pesquisa considera apenas artigos publicados entre 2013 e 2023, em idiomas como português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram "Primary Health Care", "Telemedicine", "Impacts", "Brazil" e "Electronic Health Records". As análises estudadas são os objetivos, resultados, discussão e conclusão dos trabalhos selecionados.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os resultados são baseados na análise de 12 artigos, com maior representatividade de recentes publicações. A pesquisa destaca a telemedicina como ferramenta crucial durante a pandemia de COVID-19, otimizando encaminhamentos para especialistas e priorização de casos. A eficácia da teleconsulta na resolução de consultas e no aumento da resolutividade na APS também é evidenciada. Nota-se uma heterogeneidade regional na adoção da Saúde Digital, com regiões mais desenvolvidas apresentando maior participação em ações de telemedicina. A desigualdade socioeconômica afeta a adesão às tecnologias, enquanto a falta de infraestrutura tecnológica e resistência por parte dos profissionais são desafios persistentes. A implementação de prontuários eletrônicos é abordada nos artigos estudados, destacando a necessidade de padronização e validação dos dados coletados. A análise também identifica a falta de uma política nacional para a saúde digital, abordando preocupações com a privacidade dos pacientes, caráter normatizador e incompatibilidade com o cuidado comunitário. Percebe-se também que a telemedicina é mais adotada em níveis de atenção secundária e terciária, muitas vezes em instituições privadas, criando disparidades na sua utilização.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>A Saúde Digital se tornou ainda mais relevante na pandemia, porém, a falta de acesso equitativo a tecnologias, despreparo profissional e inexistência de políticas abrangentes continuam sendo desafios. Em cenários de desenvolvimento desigual, a implementação da Saúde Digital requer considerações regionais e estratégias inclusivas. Conclui-se que a abordagem da telemedicina na APS possui potencial, mas necessita de medidas abrangentes para ser efetivamente aplicada, visando melhorar a qualidade da atenção e equalizar o acesso aos cuidados de saúde</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Blumenberg C, Peiris D, Loret de Mola C, Sinnadurai M, Tian M, Beleigoli AM, Lazo-Porras M, Diez-Canseco F, Paredes M, Labán-Seminario LM, Zafra-Tanaka JH, Praveen D, Miranda JJ. Going digital: opportunities and barriers in the use of technology for health research. <i>Salud Publica Mex.</i> 2022;64(Supl 1):S22-S30. Araújo HPM, Santos LC, Alencar RA. Telessaúde: a experiência dos profissionais de saúde no setor. <i>Revista da Escola de Enfermagem da USP.</i> 2023 Mar. Netto AV, Salvador ME. Desafios inerentes ao desenvolvimento de projetos e estudos científicos em saúde digital e tecnologias móveis. <i>Revista Brasileira de Enfermagem.</i> 2020.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14268	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4975286 - GUILHERME FRANCA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Saúde Digital na Atenção Primária à Saúde: impactos e desafios de implementação			
<b>INTRODUCA O</b>	A Saúde Digital, caracterizada pelo uso de tecnologias e informações na área da saúde, como telemedicina, registros eletrônicos de saúde e aplicativos móveis tem influência positiva na Atenção Primária à Saúde (APS). Esses fatores aprimoram diversos aspectos, pois podem melhorar a coordenação do cuidado, facilitar o acesso aos serviços de saúde e avançar na medicina preventiva. Além disso, o uso de ferramentas digitais na APS tem o potencial de reduzir erros médicos, melhorar a eficiência dos processos assistenciais e otimizar os recursos de saúde disponíveis. Entretanto, ressalta-se que há diversas dificuldades para sua implementação, principalmente diante das desigualdades sociais observadas no Brasil, como a capacitação dos profissionais, o pouco investimento, a reduzida acessibilidade digital. Diante da pluralidade de cenários na saúde pública do país, deve-se considerar a viabilidade e formas de aplicação da tecnologia em diferentes contextos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto da Saúde Digital na APS e explorar desafios em sua implementação.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa é revisão bibliográfica. A coleta de informações é realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do PubMed. A pesquisa considera apenas artigos publicados entre 2013 e 2023, em idiomas como português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram "Primary Health Care", "Telemedicine", "Impacts", "Brazil" e "Electronic Health Records". As análises estudadas são os objetivos, resultados, discussão e conclusão dos trabalhos selecionados.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados são baseados na análise de 12 artigos, com maior representatividade de recentes publicações. A pesquisa destaca a telemedicina como ferramenta crucial durante a pandemia de COVID-19, otimizando encaminhamentos para especialistas e priorização de casos. A eficácia da teleconsulta na resolução de consultas e no aumento da resolutividade na APS também é evidenciada. Nota-se uma heterogeneidade regional na adoção da Saúde Digital, com regiões mais desenvolvidas apresentando maior participação em ações de telemedicina. A desigualdade socioeconômica afeta a adesão às tecnologias, enquanto a falta de infraestrutura tecnológica e resistência por parte dos profissionais são desafios persistentes. A implementação de prontuários eletrônicos é abordada nos artigos estudados, destacando a necessidade de padronização e validação dos dados coletados. A análise também identifica a falta de uma política nacional para a saúde digital, abordando preocupações com a privacidade dos pacientes, caráter normatizador e incompatibilidade com o cuidado comunitário. Percebe-se também que a telemedicina é mais adotada em níveis de atenção secundária e terciária, muitas vezes em instituições privadas, criando disparidades na sua utilização.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A Saúde Digital se tornou ainda mais relevante na pandemia, porém, a falta de acesso equitativo a tecnologias, despreparo profissional e inexistência de políticas abrangentes continuam sendo desafios. Em cenários de desenvolvimento desigual, a implementação da Saúde Digital requer considerações regionais e estratégias inclusivas. Conclui-se que a abordagem da telemedicina na APS possui potencial, mas necessita de medidas abrangentes para ser efetivamente aplicada, visando melhorar a qualidade da atenção e equalizar o acesso aos cuidados de saúde			
<b>REFERENCIA S</b>	Blumenberg C, Peiris D, Loret de Mola C, Sinnadurai M, Tian M, Beleigoli AM, Lazo-Porras M, Diez-Canseco F, Paredes M, Labán-Seminario LM, Zafra-Tanaka JH, Praveen D, Miranda JJ. Going digital: opportunities and barriers in the use of technology for health research. <i>Salud Publica Mex.</i> 2022;64(Supl 1):S22-S30. Araújo HPM, Santos LC, Alencar RA. Telessaúde: a experiência dos profissionais de saúde no setor. <i>Revista da Escola de Enfermagem da USP.</i> 2023 Mar. Netto AV, Salvador ME. Desafios inerentes ao desenvolvimento de projetos e estudos científicos em saúde digital e tecnologias móveis. <i>Revista Brasileira de Enfermagem.</i> 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14268	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027659 - ANA CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Saúde Digital na Atenção Primária à Saúde: impactos e desafios de implementação			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A Saúde Digital, caracterizada pelo uso de tecnologias e informações na área da saúde, como telemedicina, registros eletrônicos de saúde e aplicativos móveis tem influência positiva na Atenção Primária à Saúde (APS). Esses fatores aprimoram diversos aspectos, pois podem melhorar a coordenação do cuidado, facilitar o acesso aos serviços de saúde e avançar na medicina preventiva. Além disso, o uso de ferramentas digitais na APS tem o potencial de reduzir erros médicos, melhorar a eficiência dos processos assistenciais e otimizar os recursos de saúde disponíveis. Entretanto, ressalta-se que há diversas dificuldades para sua implementação, principalmente diante das desigualdades sociais observadas no Brasil, como a capacitação dos profissionais, o pouco investimento, a reduzida acessibilidade digital. Diante da pluralidade de cenários na saúde pública do país, deve-se considerar a viabilidade e formas de aplicação da tecnologia em diferentes contextos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto da Saúde Digital na APS e explorar desafios em sua implementação.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A pesquisa é revisão bibliográfica. A coleta de informações é realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do PubMed. A pesquisa considera apenas artigos publicados entre 2013 e 2023, em idiomas como português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram "Primary Health Care", "Telemedicine", "Impacts", "Brazil" e "Electronic Health Records". As análises estudadas são os objetivos, resultados, discussão e conclusão dos trabalhos selecionados.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os resultados são baseados na análise de 12 artigos, com maior representatividade de recentes publicações. A pesquisa destaca a telemedicina como ferramenta crucial durante a pandemia de COVID-19, otimizando encaminhamentos para especialistas e priorização de casos. A eficácia da teleconsulta na resolução de consultas e no aumento da resolatividade na APS também é evidenciada. Nota-se uma heterogeneidade regional na adoção da Saúde Digital, com regiões mais desenvolvidas apresentando maior participação em ações de telemedicina. A desigualdade socioeconômica afeta a adesão às tecnologias, enquanto a falta de infraestrutura tecnológica e resistência por parte dos profissionais são desafios persistentes. A implementação de prontuários eletrônicos é abordada nos artigos estudados, destacando a necessidade de padronização e validação dos dados coletados. A análise também identifica a falta de uma política nacional para a saúde digital, abordando preocupações com a privacidade dos pacientes, caráter normatizador e incompatibilidade com o cuidado comunitário. Percebe-se também que a telemedicina é mais adotada em níveis de atenção secundária e terciária, muitas vezes em instituições privadas, criando disparidades na sua utilização.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A Saúde Digital se tornou ainda mais relevante na pandemia, porém, a falta de acesso equitativo a tecnologias, despreparo profissional e inexistência de políticas abrangentes continuam sendo desafios. Em cenários de desenvolvimento desigual, a implementação da Saúde Digital requer considerações regionais e estratégias inclusivas. Conclui-se que a abordagem da telemedicina na APS possui potencial, mas necessita de medidas abrangentes para ser efetivamente aplicada, visando melhorar a qualidade da atenção e equalizar o acesso aos cuidados de saúde</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Blumenberg C, Peiris D, Loret de Mola C, Sinnadurai M, Tian M, Beileigoli AM, Lazo-Porras M, Diez-Canseco F, Paredes M, Labán-Seminario LM, Zafra-Tanaka JH, Praveen D, Miranda JJ. Going digital: opportunities and barriers in the use of technology for health research. Salud Publica Mex. 2022;64(Supl 1):S22-S30. Araújo HPM, Santos LC, Alencar RA. Telessaúde: a experiência dos profissionais de saúde no setor. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2023 Mar. Netto AV, Salvador ME. Desafios inerentes ao desenvolvimento de projetos e estudos científicos em saúde digital e tecnologias móveis. Revista Brasileira de Enfermagem. 2020.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14268	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027691 - ISA LAURA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Saúde Digital na Atenção Primária à Saúde: impactos e desafios de implementação			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A Saúde Digital, caracterizada pelo uso de tecnologias e informações na área da saúde, como telemedicina, registros eletrônicos de saúde e aplicativos móveis tem influência positiva na Atenção Primária à Saúde (APS). Esses fatores aprimoram diversos aspectos, pois podem melhorar a coordenação do cuidado, facilitar o acesso aos serviços de saúde e avançar na medicina preventiva. Além disso, o uso de ferramentas digitais na APS tem o potencial de reduzir erros médicos, melhorar a eficiência dos processos assistenciais e otimizar os recursos de saúde disponíveis. Entretanto, ressalta-se que há diversas dificuldades para sua implementação, principalmente diante das desigualdades sociais observadas no Brasil, como a capacitação dos profissionais, o pouco investimento, a reduzida acessibilidade digital. Diante da pluralidade de cenários na saúde pública do país, deve-se considerar a viabilidade e formas de aplicação da tecnologia em diferentes contextos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto da Saúde Digital na APS e explorar desafios em sua implementação.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A pesquisa é revisão bibliográfica. A coleta de informações é realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do PubMed. A pesquisa considera apenas artigos publicados entre 2013 e 2023, em idiomas como português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram "Primary Health Care", "Telemedicine", "Impacts", "Brazil" e "Electronic Health Records". As análises estudadas são os objetivos, resultados, discussão e conclusão dos trabalhos selecionados.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os resultados são baseados na análise de 12 artigos, com maior representatividade de recentes publicações. A pesquisa destaca a telemedicina como ferramenta crucial durante a pandemia de COVID-19, otimizando encaminhamentos para especialistas e priorização de casos. A eficácia da teleconsulta na resolução de consultas e no aumento da resolutividade na APS também é evidenciada. Nota-se uma heterogeneidade regional na adoção da Saúde Digital, com regiões mais desenvolvidas apresentando maior participação em ações de telemedicina. A desigualdade socioeconômica afeta a adesão às tecnologias, enquanto a falta de infraestrutura tecnológica e resistência por parte dos profissionais são desafios persistentes. A implementação de prontuários eletrônicos é abordada nos artigos estudados, destacando a necessidade de padronização e validação dos dados coletados. A análise também identifica a falta de uma política nacional para a saúde digital, abordando preocupações com a privacidade dos pacientes, caráter normatizador e incompatibilidade com o cuidado comunitário. Percebe-se também que a telemedicina é mais adotada em níveis de atenção secundária e terciária, muitas vezes em instituições privadas, criando disparidades na sua utilização.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A Saúde Digital se tornou ainda mais relevante na pandemia, porém, a falta de acesso equitativo a tecnologias, despreparo profissional e inexistência de políticas abrangentes continuam sendo desafios. Em cenários de desenvolvimento desigual, a implementação da Saúde Digital requer considerações regionais e estratégias inclusivas. Conclui-se que a abordagem da telemedicina na APS possui potencial, mas necessita de medidas abrangentes para ser efetivamente aplicada, visando melhorar a qualidade da atenção e equalizar o acesso aos cuidados de saúde</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Blumenberg C, Peiris D, Loret de Mola C, Sinnadurai M, Tian M, Beleigoli AM, Lazo-Porras M, Diez-Canseco F, Paredes M, Labán-Seminario LM, Zafra-Tanaka JH, Praveen D, Miranda JJ. Going digital: opportunities and barriers in the use of technology for health research. <i>Salud Publica Mex.</i> 2022;64(Supl 1):S22-S30. Araújo HPM, Santos LC, Alencar RA. Telessaúde: a experiência dos profissionais de saúde no setor. <i>Revista da Escola de Enfermagem da USP.</i> 2023 Mar. Netto AV, Salvador ME. Desafios inerentes ao desenvolvimento de projetos e estudos científicos em saúde digital e tecnologias móveis. <i>Revista Brasileira de Enfermagem.</i> 2020.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14269	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4069846 - RAFAEL VILLAPANDO LAX	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josué de Castro Filho		
<b>TITULO</b>	O papel dos grupos reflexivos de gênero para homens no combate ao discurso do movimento redpill			
<b>INTRODUCAO</b>	Este estudo se propõe a descrever, analisar e problematizar o papel desempenhado pelos Grupos Reflexivos de Gênero na desconstrução e combate ao discurso propagado pelo movimento redpill. Busca-se consolidar uma compreensão sólida das estratégias utilizadas por esses grupos para abordar e contrapor-se ao discurso redpill.			
<b>OBJETIVOS</b>	Problematizar e descrever o papel dos Grupos Reflexivos de Gênero para homens no combate ao discurso do movimento redpill e seu impacto na promoção de relacionamentos saudáveis e igualitários entre os gêneros.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia deste projeto consistiu em uma revisão narrativa de literatura. Essa revisão foi conduzida a partir da seleção de artigos disponíveis nos repositórios acadêmicos Scielo e Google Acadêmico. Essa abordagem permitiu uma análise aprofundada das informações disponíveis sobre o tema a partir de fontes acadêmicas confiáveis e acessíveis.			
<b>RESULTADOS</b>	O movimento redpill tem ganhado destaque nos últimos anos como uma subcultura virtual que aborda questões relacionadas a gênero, relações interpessoais e masculinidade. Originado em comunidades online, o termo redpill faz referência à famosa pilula vermelha oferecida ao personagem Neo no filme Matrix, simbolizando a escolha entre aceitar uma realidade desconfortável e verdadeira, em oposição à ilusão reconfortante da pilula azul. Neste contexto, o redpill representa a busca pela verdade sobre as relações de gênero, frequentemente promovendo ideias que desafiam as normas e valores sociais predominantes. Os seguidores desse movimento alegam estar despertando para uma visão mais realista das relações de gênero. Os conceitos centrais do redpill incluem a crítica às ideias feministas, a ênfase na autonomia masculina e a visão das interações homem-mulher como uma competição. Por outro lado, os grupos reflexivos de gênero fornecem um espaço seguro para a reflexão, o diálogo e a desconstrução do discurso do movimento redpill, possibilitando uma profunda conscientização sobre as questões de desigualdade de gênero.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esta investigação possibilitou aprofundar a compreensão sobre o papel fundamental dos Grupos Reflexivos de Gênero para homens no enfrentamento do discurso do movimento redpill e na promoção de relacionamentos saudáveis e igualitários. Os resultados desta pesquisa ressaltam a importância crítica dos Grupos Reflexivos de Gênero como uma estratégia eficaz de desconstrução de estereótipos de gênero geradores de preconceito e discriminação. Eles promovem uma abordagem baseada na igualdade de gênero e no respeito mútuo, contrapondo-se diretamente às narrativas divisórias do movimento redpill.			
<b>REFERENCIAS</b>	Oliveira PP. A Construção Social da Masculinidade. IUPERJ. 2004. Silva BCSL. Masculinismo: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil. Belo Horizonte; 2023. Voks DJ. Virilidade e os discursos masculinistas: um "novo homem" para a sociedade brasileira. Sexualidad, Salud y Sociedad. 2021; (37):1-22. Disponível em: <a href="http://old.scielo.br/pdf/sexs/n37/1984-6487-sess-37-e21204.pdf">http://old.scielo.br/pdf/sexs/n37/1984-6487-sess-37-e21204.pdf</a> . Acesso em: 9 setembro 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14269	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
			<b>Autor</b>	<b>Status</b>
			4082656 - MATHEUS SOARES DA SILVA AMARAL	2 - Aprovado
			<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>
			Josué de Castro Filho	<b>Orientador Externo</b>
				0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	O papel dos grupos reflexivos de gênero para homens no combate ao discurso do movimento redpill			
<b>INTRODUCAO</b>	Este estudo se propõe a descrever, analisar e problematizar o papel desempenhado pelos Grupos Reflexivos de Gênero na desconstrução e combate ao discurso propagado pelo movimento redpill. Busca-se consolidar uma compreensão sólida das estratégias utilizadas por esses grupos para abordar e contrapor-se ao discurso redpill.			
<b>OBJETIVOS</b>	Problematizar e descrever o papel dos Grupos Reflexivos de Gênero para homens no combate ao discurso do movimento redpill e seu impacto na promoção de relacionamentos saudáveis e igualitários entre os gêneros.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia deste projeto consistiu em uma revisão narrativa de literatura. Essa revisão foi conduzida a partir da seleção de artigos disponíveis nos repositórios acadêmicos Scielo e Google Acadêmico. Essa abordagem permitiu uma análise aprofundada das informações disponíveis sobre o tema a partir de fontes acadêmicas confiáveis e acessíveis.			
<b>RESULTADOS</b>	O movimento redpill tem ganhado destaque nos últimos anos como uma subcultura virtual que aborda questões relacionadas a gênero, relações interpessoais e masculinidade. Originado em comunidades online, o termo redpill faz referência à famosa pilula vermelha oferecida ao personagem Neo no filme Matrix, simbolizando a escolha entre aceitar uma realidade desconfortável e verdadeira, em oposição à ilusão reconfortante da pilula azul. Neste contexto, o redpill representa a busca pela verdade sobre as relações de gênero, frequentemente promovendo ideias que desafiam as normas e valores sociais predominantes. Os seguidores desse movimento alegam estar despertando para uma visão mais realista das relações de gênero. Os conceitos centrais do redpill incluem a crítica às ideias feministas, a ênfase na autonomia masculina e a visão das interações homem-mulher como uma competição. Por outro lado, os grupos reflexivos de gênero fornecem um espaço seguro para a reflexão, o diálogo e a desconstrução do discurso do movimento redpill, possibilitando uma profunda conscientização sobre as questões de desigualdade de gênero.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esta investigação possibilitou aprofundar a compreensão sobre o papel fundamental dos Grupos Reflexivos de Gênero para homens no enfrentamento do discurso do movimento redpill e na promoção de relacionamentos saudáveis e igualitários. Os resultados desta pesquisa ressaltam a importância crítica dos Grupos Reflexivos de Gênero como uma estratégia eficaz de desconstrução de estereótipos de gênero geradores de preconceito e discriminação. Eles promovem uma abordagem baseada na igualdade de gênero e no respeito mútuo, contrapondo-se diretamente às narrativas divisórias do movimento redpill.			
<b>REFERENCIAS</b>	Oliveira PP. A Construção Social da Masculinidade. IUPERJ. 2004. Silva BCSL. Masculinismo: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil. Belo Horizonte; 2023. Voks DJ. Virilidade e os discursos masculinistas: um "novo homem" para a sociedade brasileira. Sexualidad, Salud y Sociedad. 2021; (37):1-22. Disponível em: <a href="http://old.scielo.br/pdf/sex/n37/1984-6487-sess-37-e21204.pdf">http://old.scielo.br/pdf/sex/n37/1984-6487-sess-37-e21204.pdf</a> . Acesso em: 9 setembro 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14269	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135857 - RODRIGO JESUS DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josué de Castro Filho		
<b>TITULO</b>	O papel dos grupos reflexivos de gênero para homens no combate ao discurso do movimento redpill			
<b>INTRODUCAO</b>	Este estudo se propõe a descrever, analisar e problematizar o papel desempenhado pelos Grupos Reflexivos de Gênero na desconstrução e combate ao discurso propagado pelo movimento redpill. Busca-se consolidar uma compreensão sólida das estratégias utilizadas por esses grupos para abordar e contrapor-se ao discurso redpill.			
<b>OBJETIVOS</b>	Problematizar e descrever o papel dos Grupos Reflexivos de Gênero para homens no combate ao discurso do movimento redpill e seu impacto na promoção de relacionamentos saudáveis e igualitários entre os gêneros.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia deste projeto consistiu em uma revisão narrativa de literatura. Essa revisão foi conduzida a partir da seleção de artigos disponíveis nos repositórios acadêmicos Scielo e Google Acadêmico. Essa abordagem permitiu uma análise aprofundada das informações disponíveis sobre o tema a partir de fontes acadêmicas confiáveis e acessíveis.			
<b>RESULTADOS</b>	O movimento redpill tem ganhado destaque nos últimos anos como uma subcultura virtual que aborda questões relacionadas a gênero, relações interpessoais e masculinidade. Originado em comunidades online, o termo redpill faz referência à famosa pilula vermelha oferecida ao personagem Neo no filme Matrix, simbolizando a escolha entre aceitar uma realidade desconfortável e verdadeira, em oposição à ilusão reconfortante da pilula azul. Neste contexto, o redpill representa a busca pela verdade sobre as relações de gênero, frequentemente promovendo ideias que desafiam as normas e valores sociais predominantes. Os seguidores desse movimento alegam estar despertando para uma visão mais realista das relações de gênero. Os conceitos centrais do redpill incluem a crítica às ideias feministas, a ênfase na autonomia masculina e a visão das interações homem-mulher como uma competição. Por outro lado, os grupos reflexivos de gênero fornecem um espaço seguro para a reflexão, o diálogo e a desconstrução do discurso do movimento redpill, possibilitando uma profunda conscientização sobre as questões de desigualdade de gênero.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esta investigação possibilitou aprofundar a compreensão sobre o papel fundamental dos Grupos Reflexivos de Gênero para homens no enfrentamento do discurso do movimento redpill e na promoção de relacionamentos saudáveis e igualitários. Os resultados desta pesquisa ressaltam a importância crítica dos Grupos Reflexivos de Gênero como uma estratégia eficaz de desconstrução de estereótipos de gênero geradores de preconceito e discriminação. Eles promovem uma abordagem baseada na igualdade de gênero e no respeito mútuo, contrapondo-se diretamente às narrativas divisórias do movimento redpill.			
<b>REFERENCIAS</b>	Oliveira PP. A Construção Social da Masculinidade. IUPERJ. 2004. Silva BCSL. Masculinismo: misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil. Belo Horizonte; 2023. Voks DJ. Virilidade e os discursos masculinistas: um "novo homem" para a sociedade brasileira. Sexualidad, Salud y Sociedad. 2021; (37):1-22. Disponível em: <a href="http://old.scielo.br/pdf/sexs/n37/1984-6487-secs-37-e21204.pdf">http://old.scielo.br/pdf/sexs/n37/1984-6487-secs-37-e21204.pdf</a> . Acesso em: 9 setembro 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14273	Engenharias	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4521650 - IGOR WESLEY LOSACCO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Carlos Miyashiro		
<b>TITULO</b>	ACIDENTES DE TRAJETO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA ESTATISTICA PROVENIENTE DA MUDANÇA DAS LEIS DE TRÂNSITO ENTRE 1997 E 2021			
<b>INTRODUCAO</b>	A ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho é um evento imprevisito que pode resultar em perdas materiais, danos e lesões. Um cenário em que o empregador tem pouco controle sobre os fatores determinantes é o acidente de trajeto, que apresentou um aumento substancial em relação aos acidentes típicos e doenças ocupacionais. Essas tendências são influenciadas por mudanças nas regulamentações governamentais ao longo do tempo, refletidas nas alterações do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo explora as estatísticas de acidentes de trajeto e sua evolução, além de analisar a relação percentual entre acidentes de trajeto e acidentes de trabalho em geral.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado através de pesquisa bibliográfica com livros, artigos, publicações da Internet relacionado com o assunto do artigo, com o intuito de relacionar a legislação de trânsito com os acidentes de trajeto. Foi utilizado alterações do CTB como contribuidor das consequências das estatísticas de acidentes de trajetos. Foi analisado os períodos de 1997 até 2021, relacionando o número bruto de acidentes de trajeto, sua evolução e o percentual de acidentes de trajeto e comparação ao acidente de trabalho.			
<b>RESULTADOS</b>	Observa-se que nos anos iniciais do CTB, houve uma diminuição nos acidentes de trajeto. Contudo, após os passaram dos anos os números começaram a crescer, atingindo um patamar elevado, em 2002 os acidentes de trajeto demonstraram um aumento considerável em números absolutos e entre 2006 e 2007, houve um aumento nos acidentes de trabalho que não envolviam trajeto. No ano de 2008, iniciou-se lei para diminuição de acidentes de trabalho, mas os acidentes de trajetos não foram afetados. Até 2014, no qual ocorreu mudanças do CTB que diminuiram os sinistros de trânsito e os acidentes de trajetos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em 2006 ocorreu a lei nº 11.343 de 25 de julho de 2006 sobre alteração os limites de velocidade para fins de enquadramentos infracionais e de penalidades e nas resoluções, logo esses anos teve como destaque o aumento acidentes de trajeto. Em 2019 ocorreu a criação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, com isso os acidentes do trabalho típico e as doenças ocupacionais diminuíram gradualmente. Em 2014 a câmara aprova criação do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito a Lei 8272/14, criando leis e resoluções com intenção de diminuição de mortes e por consequência reduziu os acidentes de trajetos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Cabral, CF. Análise de correlação entre acidentes de trânsito, de trajeto e variáveis socioeconômicas no brasil. São Carlos: UFSCar 2011. 2. Carvalho, RT. Acidentes de trajeto no brasil: estatísticas, causas e consequências. Florianópolis: UNISUL 2018. 3. Abreu, DROM.; Souza, EM.; Mathias, TAF. Impacto do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Seca na mortalidade por acidentes de trânsito. Cad. Saúde Pública, 2018; doi: 10.1590/0102-311X00122117.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14274	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4333284 - ANA GABRIELA SCHIEFELBEIN DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Percepção de crianças de escola pública quanto a condição bucal e relação com sintomas e bem estar: estudo observacional			
<b>INTRODUCAO</b>	A qualidade de vida em saúde bucal, está relacionada diretamente com os sintomas orais e o bem-estar social dos indivíduos, uma vez que, as doenças bucais são de características cumulativas e progressivas o que proporciona um impacto negativo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo foi avaliar o índice CPOD e a percepção de crianças quanto a condição bucal e sua relação com sintomatologia e bem estar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliadas 81 crianças com idade entre 7 e 9 anos, oriundas de uma escola municipal de ensino fundamental da cidade de São Paulo e o questionário de percepção infantil (Child Perceptions Questionnaire -CPQ) composto de 27 itens foi aplicado em forma individual e como entrevista. Índice CPOD foi observado por dois examinadores previamente calibrados. Palestra de instrução de higiene bucal foi aplicada e após 3 meses o questionário e o exame clínico foram novamente observados.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram índice CPOD com prevalência moderada de 1,91 e nos resultados do questionário CPQ as perguntas com relação a dificuldade de mastigar alimentos duros no último mês com afirmativa de 80,2% e a com relação a comida ficar presa entre os dentes com 87,7%, foram as que apresentaram maior prevalência de respostas que não correspondem a saúde.			
<b>CONCLUSOES</b>	As crianças avaliadas apresentam índice CPOD com prevalência moderada e a percepção das crianças quanto a situação bucal reflete as características clínicas observadas. Instruções de higiene bucal constantes são necessárias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Priya PRG, Asokan S, Janani RG, Kandaswamy D. Effectiveness of school dental health education on the oral health status and knowledge of children: A systematic review. Indian J Dent Res. 2019 May-Jun;30(3):437-449. Markeviciute G; Narbutaite J. Effectiveness of a motivation and practical skills development methods on the oral hygiene of orphans children in Kaunas, Lithuania. J Oral Max Res. 2015; 6(3): e2. Barbosa TS, Vicentin, MDS; Gavião MBD. Qualidade de vida e saúde bucal em crianças - Parte I: versão brasileira do Child Perceptions Questionnaire 8-10. Ciência (#38) Saúde Coletiva. 2011; 16(10): 4077-4085.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14274	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382480 - ESTHER MACHADO PIUVEZAM	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Percepção de crianças de escola pública quanto a condição bucal e relação com sintomas e bem estar: estudo observacional			
<b>INTRODUCAO</b>	A qualidade de vida em saúde bucal, está relacionada diretamente com os sintomas orais e o bem-estar social dos indivíduos, uma vez que, as doenças bucais são de características cumulativas e progressivas o que proporciona um impacto negativo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo foi avaliar o índice CPOD e a percepção de crianças quanto a condição bucal e sua relação com sintomatologia e bem estar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliadas 81 crianças com idade entre 7 e 9 anos, oriundas de uma escola municipal de ensino fundamental da cidade de São Paulo e o questionário de percepção infantil (Child Perceptions Questionnaire -CPQ) composto de 27 itens foi aplicado em forma individual e como entrevista. Índice CPOD foi observado por dois examinadores previamente calibrados. Palestra de instrução de higiene bucal foi aplicada e após 3 meses o questionário e o exame clínico foram novamente observados.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram índice CPOD com prevalência moderada de 1,91 e nos resultados do questionário CPQ as perguntas com relação a dificuldade de mastigar alimentos duros no último mês com afirmativa de 80,2% e a com relação a comida ficar presa entre os dentes com 87,7%, foram as que apresentaram maior prevalência de respostas que não correspondem a saúde.			
<b>CONCLUSOES</b>	As crianças avaliadas apresentam índice CPOD com prevalência moderada e a percepção das crianças quanto a situação bucal reflete as características clínicas observadas. Instruções de higiene bucal constantes são necessárias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Priya PRG, Asokan S, Janani RG, Kandaswamy D. Effectiveness of school dental health education on the oral health status and knowledge of children: A systematic review. Indian J Dent Res. 2019 May-Jun;30(3):437-449. Markeviciute G; Narbutaite J. Effectiveness of a motivation and practical skills development methods on the oral hygiene of orphans children in Kaunas, Lithuania. J Oral Max Res. 2015; 6(3): e2. Barbosa TS, Vicentin, MDS; Gavião MBD. Qualidade de vida e saúde bucal em crianças - Parte I: versão brasileira do Child Perceptions Questionnaire 8-10. Ciência (#38) Saúde Coletiva. 2011; 16(10): 4077-4085.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14274	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888383 - ANGELA CRISTINA DE JESUS PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Percepção de crianças de escola pública quanto a condição bucal e relação com sintomas e bem estar: estudo observacional			
<b>INTRODUCAO</b>	A qualidade de vida em saúde bucal, está relacionada diretamente com os sintomas orais e o bem-estar social dos indivíduos, uma vez que, as doenças bucais são de características cumulativas e progressivas o que proporciona um impacto negativo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo foi avaliar o índice CPOD e a percepção de crianças quanto a condição bucal e sua relação com sintomatologia e bem estar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliadas 81 crianças com idade entre 7 e 9 anos, oriundas de uma escola municipal de ensino fundamental da cidade de São Paulo e o questionário de percepção infantil (Child Perceptions Questionnaire -CPQ) composto de 27 itens foi aplicado em forma individual e como entrevista. Índice CPOD foi observado por dois examinadores previamente calibrados. Palestra de instrução de higiene bucal foi aplicada e após 3 meses o questionário e o exame clínico foram novamente observados.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram índice CPOD com prevalência moderada de 1,91 e nos resultados do questionário CPQ as perguntas com relação a dificuldade de mastigar alimentos duros no último mês com afirmativa de 80,2% e a com relação a comida ficar presa entre os dentes com 87,7%, foram as que apresentaram maior prevalência de respostas que não correspondem a saúde.			
<b>CONCLUSOES</b>	As crianças avaliadas apresentam índice CPOD com prevalência moderada e a percepção das crianças quanto a situação bucal reflete as características clínicas observadas. Instruções de higiene bucal constantes são necessárias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Priya PRG, Asokan S, Janani RG, Kandaswamy D. Effectiveness of school dental health education on the oral health status and knowledge of children: A systematic review. Indian J Dent Res. 2019 May-Jun;30(3):437-449. Markeviciute G; Narbutaite J. Effectiveness of a motivation and practical skills development methods on the oral hygiene of orphans children in Kaunas, Lithuania. J Oral Max Res. 2015; 6(3): e2. Barbosa TS, Vicentin, MDS; Gavião MBD. Qualidade de vida e saúde bucal em crianças - Parte I: versão brasileira do Child Perceptions Questionnaire 8-10. Ciência (#38) Saúde Coletiva. 2011; 16(10): 4077-4085.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14274	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124247 - ALVARO LUIZ MENDONCA PINHEIRO BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Percepção de crianças de escola pública quanto a condição bucal e relação com sintomas e bem estar: estudo observacional			
<b>INTRODUCAO</b>	A qualidade de vida em saúde bucal, está relacionada diretamente com os sintomas orais e o bem-estar social dos indivíduos, uma vez que, as doenças bucais são de características cumulativas e progressivas o que proporciona um impacto negativo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo foi avaliar o índice CPOD e a percepção de crianças quanto a condição bucal e sua relação com sintomatologia e bem estar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliadas 81 crianças com idade entre 7 e 9 anos, oriundas de uma escola municipal de ensino fundamental da cidade de São Paulo e o questionário de percepção infantil (Child Perceptions Questionnaire - CPQ) composto de 27 itens foi aplicado em forma individual e como entrevista. Índice CPOD foi observado por dois examinadores previamente calibrados. Palestra de instrução de higiene bucal foi aplicada e após 3 meses o questionário e o exame clínico foram novamente observados.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram índice CPOD com prevalência moderada de 1,91 e nos resultados do questionário CPQ as perguntas com relação a dificuldade de mastigar alimentos duros no último mês com afirmativa de 80,2% e a com relação a comida ficar presa entre os dentes com 87,7%, foram as que apresentaram maior prevalência de respostas que não correspondem a saúde.			
<b>CONCLUSOES</b>	As crianças avaliadas apresentam índice CPOD com prevalência moderada e a percepção das crianças quanto a situação bucal reflete as características clínicas observadas. Instruções de higiene bucal constantes são necessárias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Priya PRG, Asokan S, Janani RG, Kandaswamy D. Effectiveness of school dental health education on the oral health status and knowledge of children: A systematic review. Indian J Dent Res. 2019 May-Jun;30(3):437-449. Markeviciute G; Narbutaite J. Effectiveness of a motivation and practical skills development methods on the oral hygiene of orphans children in Kaunas, Lithuania. J Oral Max Res. 2015; 6(3): e2. Barbosa TS, Vicentin, MDS; Gavião MBD. Qualidade de vida e saúde bucal em crianças - Parte I: versão brasileira do Child Perceptions Questionnaire 8-10. Ciência (#38) Saúde Coletiva. 2011; 16(10): 4077-4085.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14275	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4064127 - TAMIRES SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renan Ponte Marianno		
<b>TITULO</b>	Grupos N.A. e AL-ANON: revisão bibliográfica em psicologia			
<b>INTRODUCAO</b>	Este trabalho aborda a importância dos grupos de apoio no tratamento de substâncias químicas, com foco na análise das dinâmicas dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de álcool e drogas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O estudo tem como objetivo apresentar a relevância e a eficácia desses grupos de apoio. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, que incluem analisar o papel da empatia e identificação nas dinâmicas do NA e AA através também do auxílio do papel e olhar ético da psicologia, avaliar a eficácia do Al-Anon e NA no apoio aos familiares, investigar a interseção entre os grupos, e identificar barreiras facilitadoras para o engajamento deles.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada incluiu a revisão de literatura relevante e análise de dados secundários através de pesquisas sobre os artigos relacionados aos grupos de apoio, baseada principalmente nos "Doze Passos" e nas "Doze Tradições", que foram criados em 1939 por Bill Wilson e Dr. Bob Smith, os fundadores do AA. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de substâncias e que a continuidade da participação nesses grupos é fundamental para a manutenção da sobriedade. Um estudo publicado "Journal of Substance Abuse Treatment" em 2017, intitulado "Eficácia dos Alcoólicos Anônimos: Uma revisão sistemática de ensaios controlados randomizados", examinou a eficácia do programa AA em ajudar os alcoólicos a alcançar a sobriedade.			
<b>RESULTADOS</b>	Visando alcançar os objetivos elencados, o desenvolvimento deste trabalho buscou esclarecer que os grupos de AA e NA oferecem um ambiente de apoio onde os participantes podem compartilhar experiências, desafios e sucessos relacionados à recuperação. Isso promove a conexão emocional entre os membros e fornece um suporte social crucial para a abstinência e a manutenção da recuperação. O AA e o NA são espaços onde os membros compartilham suas lutas, sucessos, recaídas e esperanças, formando uma rede de apoio comum que é crucial para a jornada de recuperação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao final da pesquisa, foi possível concluir que os grupos de apoio desempenham um papel vital no tratamento, fornecendo um ambiente de empatia, identificação e suporte mútuo que favorece a recuperação. Além disso, a interação entre os Alcoólicos e Narcóticos Anônimos e outros grupos, demonstrou ter um impacto positivo ao abordar a complexidade do alcoolismo e do uso de substâncias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Kelly, J. F., Humphreys, K., Ferri, M. (2017). ALCOÓLICOS ANÔNIMOS E OUTROS PROGRAMAS DE 12 PASSOS PARA TRANSTORNO DO USO DE ALCOÓL. Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas, 3. Assis, N. S., et al. (2018). ALCOOLISMO E ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DESTA DOENÇA: UM ESTUDO NO GRUPO ESPERANÇA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM. In 13º Congresso Internacional Rede Unida. Santos Parreira, R. M. G. (2019). A Intervenção do Serviço Social no Âmbito dos Problemas Ligados ao Alcool. Tese de Doutorado, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14275	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
			<b>Autor</b>	<b>Status</b>
			4092724 - GIOVANNA CALDEIRA RIBEIRO DA SILVA	2 - Aprovado
			<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>
			Renan Ponte Marianno	<b>Orientador Externo</b>
<b>TITULO</b>	Grupos N.A. e AL-ANON: revisão bibliográfica em psicologia			
<b>INTRODUCAO</b>	Este trabalho aborda a importância dos grupos de apoio no tratamento de substâncias químicas, com foco na análise das dinâmicas dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de álcool e drogas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O estudo tem como objetivo apresentar a relevância e a eficácia desses grupos de apoio. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, que incluem analisar o papel da empatia e identificação nas dinâmicas do NA e AA através também do auxílio do papel e olhar ético da psicologia, avaliar a eficácia do Al-Anon e NA no apoio aos familiares, investigar a interseção entre os grupos, e identificar barreiras facilitadoras para o engajamento deles.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada incluiu a revisão de literatura relevante e análise de dados secundários através de pesquisas sobre os artigos relacionados aos grupos de apoio, baseada principalmente nos "Doze Passos" e nas "Doze Tradições", que foram criados em 1939 por Bill Wilson e Dr. Bob Smith, os fundadores do AA. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de substâncias e que a continuidade da participação nesses grupos é fundamental para a manutenção da sobriedade. Um estudo publicado "Journal of Substance Abuse Treatment" em 2017, intitulado "A eficácia dos Alcoólicos Anônimos: Uma revisão sistemática de ensaios controlados randomizados", examinou a eficácia do programa AA em ajudar os alcoólicos a alcançar a sobriedade.			
<b>RESULTADOS</b>	Visando alcançar os objetivos elencados, o desenvolvimento deste trabalho buscou esclarecer que os grupos de AA e NA oferecem um ambiente de apoio onde os participantes podem compartilhar experiências, desafios e sucessos relacionados à recuperação. Isso promove a conexão emocional entre os membros e fornece um suporte social crucial para a abstinência e a manutenção da recuperação. O AA e o NA são espaços onde os membros compartilham suas lutas, sucessos, recaídas e esperanças, formando uma rede de apoio comum que é crucial para a jornada de recuperação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao final da pesquisa, foi possível concluir que os grupos de apoio desempenham um papel vital no tratamento, fornecendo um ambiente de empatia, identificação e suporte mútuo que favorece a recuperação. Além disso, a interação entre os Alcoólicos e Narcóticos Anônimos e outros grupos, demonstrou ter um impacto positivo ao abordar a complexidade do alcoolismo e do uso de substâncias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Kelly, J. F., Humphreys, K., Ferri, M. (2017). ALCOÓLICOS ANÔNIMOS E OUTROS PROGRAMAS DE 12 PASSOS PARA TRANSTORNO DO USO DE ALCOÓL. Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas, 3. Assis, N. S., et al. (2018). ALCOOLISMO E ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DESTA DOENÇA: UM ESTUDO NO GRUPO ESPERANÇA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM. In 13º Congresso Internacional Rede Unida. Santos Parreira, R. M. G. (2019). A Intervenção do Serviço Social no Âmbito dos Problemas Ligados ao Alcool. Tese de Doutorado, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14276	Educação	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442598 - ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Olga Maria Lodi Rizzini	Silvia Gonçalves de Almeida	
<b>TITULO</b>	A utilização do livro didático na prática da Alfabetização e do Letramento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental numa Escola da Rede Pública Estadual, no município de São Paulo			
<b>INTRODUCAO</b>	As competências de leitura e escrita são necessárias para que a criança possa ser inserida na sociedade. Um dos objetivos da escola é assegurar que o aluno participe de várias práticas de leitura e a escrita, com protagonismo e autonomia. Nesse sentido, trataremos de questões sobre a utilização do livro didático na prática da Alfabetização e do Letramento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender como o professor utiliza o livro didático no dia a dia da sala de aula no processo da alfabetização e do letramento.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma pesquisa bibliográfica Letramento e utilização e análise documental. A pesquisa de campo foi realizada com observação do processo da utilização do Livro Didático na prática da Alfabetização e do Letramento.			
<b>RESULTADOS</b>	Verificou-se que há tradição para alfabetizar com livros didáticos, porém outros procedimentos são utilizados para complementar o processo de alfabetização e letramento. Além do conteúdo do livro didático, foram desenvolvidas atividades sugeridas pelo próprio livro e outros procedimentos e recursos: materiais impressos, leituras, duplas produtivas, apresentações para outras salas. Entretanto, não foi possível observar a realização de sequências didáticas ou articulação entre os temas propostos em aula. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017) aponta que a ação pedagógica deve garantir oportunidades diversas para que os alunos tomem para si o sistema da escrita alfabética. Outro aspecto observado, foi a ausência de diálogo entre os componentes curriculares dos livros. Foram trabalhados dois livros: Língua Portuguesa e Matemática; e Ciências e Geografia. A interdisciplinaridade e a diversificação de contextos não foram observadas na prática pedagógica. A BNCC (2017) explica a importância da diversificação dos contextos, permitindo o aprofundamento das práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas e reflexão crítica. É uma proposta para que o aluno compreenda como se expressar e participar do mundo, formando questionamentos mais sistematizados, selecionados, organizados, analisando e apresentando descobertas e conclusões. Os livros atuais possuem sequências didáticas. As sequências didáticas "são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática". (ZABALA, 1998, p. 16) Em relação ao trabalho docente, verificou-se utilização de ferramentas para ampliar o repertório das crianças.			
<b>CONCLUSOES</b>	Para proporcionar uma alfabetização e um letramento significativos, diversos recursos didáticos devem ser trabalhados em sala de aula, mesmo que o livro didático ainda exerça um papel importante. O professor é o responsável por selecionar um material adequado para a realidade do aluno para que ocorra aprendizagem. Pela observação foi possível notar que diversas ferramentas e materiais didáticos, além do livro, estão sendo disponibilizados pelo docente. No início do ano somente 30% das crianças eram alfabéticas. Atualmente, 80% de crianças são alfabéticas, segundo sondagem realizada pelo professor. Foi possível perceber que o material selecionado no livro didático pode ser trabalhado como uma sequência didática significativa, cultural, social e que faça sentido no seu dia a dia. Sugere-se que o livro didático precisa ser utilizado em concomitância com outros recursos didáticos.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017. ZABALA, Antoni. A prática educativa. Porto Alegre: Grupo A, 1998.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14278	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4064127 - TAMIRES SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renan Ponte Marianno		
<b>TITULO</b>	Grupos N.A. e AL-ANON: revisão bibliográfica em psicologia			
<b>INTRODUCA O</b>	Este trabalho aborda a importância dos grupos de apoio no tratamento de substâncias químicas, com foco na análise das dinâmicas dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de álcool e drogas			
<b>OBJETIVOS</b>	O estudo tem como objetivo apresentar a relevância e a eficácia desses grupos de apoio. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, que incluem analisar o papel da empatia e identificação nas dinâmicas do NA e AA através também do auxílio do papel e olhar ético da psicologia, avaliar a eficácia do Al-Anon e NA no apoio aos familiares, investigar a interseção entre os grupos, e identificar barreiras facilitadoras para o engajamento deles			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada incluiu a revisão de literatura relevante e análise de dados secundários através de pesquisas sobre os artigos relacionados aos grupos de apoio, baseada principalmente nos "Doze Passos" e nas "Doze Tradições", que foram criados em 1939 por Bill Wilson e Dr. Bob Smith, os fundadores do AA. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de substâncias e que a continuidade da participação nesses grupos é fundamental para a manutenção da sobriedade. Um estudo publicado "Journal of Substance Abuse Treatment" em 2017, intitulado "A eficácia dos Alcoólicos Anônimos: Uma revisão sistemática de ensaios controlados randomizados", examinou a eficácia do programa AA em ajudar os alcoólicos a alcançar a sobriedade			
<b>RESULTADO S</b>	Visando alcançar os objetivos elencados, o desenvolvimento deste trabalho buscou esclarecer que os grupos de AA e NA oferecem um ambiente de apoio onde os participantes podem compartilhar experiências, desafios e sucessos relacionados à recuperação. Isso promove a conexão emocional entre os membros e fornece um suporte social crucial para a abstinência e a manutenção da recuperação. O AA e o NA são espaços onde os membros compartilham suas lutas, sucessos, recaídas e esperanças, formando uma rede de apoio comum que é crucial para a jornada de recuperação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao final da pesquisa, foi possível concluir que os grupos de apoio desempenham um papel vital no tratamento, fornecendo um ambiente de empatia, identificação e suporte mútuo que favorece a recuperação. Além disso, a interação entre os Alcoólicos e Narcóticos Anônimos e outros grupos, demonstrou ter um impacto positivo ao abordar a complexidade do alcoolismo e do uso de substâncias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Kelly, J. F., Humphreys, K., Ferri, M. (2017). ALCOÓLICOS ANÔNIMOS E OUTROS PROGRAMAS DE 12 PASSOS PARA TRANSTORNO DO USO DE ALCOÓL. Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas, 3. Assis, N. S., et al. (2018). ALCOOLISMO E ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DESTA DOENÇA: UM ESTUDO NO GRUPO ESPERANÇA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM. In 13º Congresso Internacional Rede Unida. Santos Parreira, R. M. G. (2019). A Intervenção do Serviço Social no Âmbito dos Problemas Ligados ao Alcool. Tese de Doutorado, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14278	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
			<b>Autor</b>	<b>Status</b>
			4092724 - GIOVANNA CALDEIRA RIBEIRO DA SILVA	2 - Aprovado
			<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>
			Renan Ponte Marianno	<b>Orientador Externo</b>
<b>TITULO</b>	Grupos N.A. e AL-ANON: revisão bibliográfica em psicologia			
<b>INTRODUCAO</b>	Este trabalho aborda a importância dos grupos de apoio no tratamento de substâncias químicas, com foco na análise das dinâmicas dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de álcool e drogas			
<b>OBJETIVOS</b>	O estudo tem como objetivo apresentar a relevância e a eficácia desses grupos de apoio. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, que incluem analisar o papel da empatia e identificação nas dinâmicas do NA e AA através também do auxílio do papel e olhar ético da psicologia, avaliar a eficácia do Al-Anon e NA no apoio aos familiares, investigar a interseção entre os grupos, e identificar barreiras facilitadoras para o engajamento deles			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada incluiu a revisão de literatura relevante e análise de dados secundários através de pesquisas sobre os artigos relacionados aos grupos de apoio, baseada principalmente nos "Doze Passos" e nas "Doze Tradições", que foram criados em 1939 por Bill Wilson e Dr. Bob Smith, os fundadores do AA. A pesquisa revelou que o ambiente de apoio, empatia e identificação dentro desses grupos desempenham um papel crucial na recuperação de usuários de substâncias e que a continuidade da participação nesses grupos é fundamental para a manutenção da sobriedade. Um estudo publicado "Journal of Substance Abuse Treatment" em 2017, intitulado "A eficácia dos Alcoólicos Anônimos: Uma revisão sistemática de ensaios controlados randomizados", examinou a eficácia do programa AA em ajudar os alcoólicos a alcançar a sobriedade			
<b>RESULTADOS</b>	Visando alcançar os objetivos elencados, o desenvolvimento deste trabalho buscou esclarecer que os grupos de AA e NA oferecem um ambiente de apoio onde os participantes podem compartilhar experiências, desafios e sucessos relacionados à recuperação. Isso promove a conexão emocional entre os membros e fornece um suporte social crucial para a abstinência e a manutenção da recuperação. O AA e o NA são espaços onde os membros compartilham suas lutas, sucessos, recaídas e esperanças, formando uma rede de apoio comum que é crucial para a jornada de recuperação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao final da pesquisa, foi possível concluir que os grupos de apoio desempenham um papel vital no tratamento, fornecendo um ambiente de empatia, identificação e suporte mútuo que favorece a recuperação. Além disso, a interação entre os Alcoólicos e Narcóticos Anônimos e outros grupos, demonstrou ter um impacto positivo ao abordar a complexidade do alcoolismo e do uso de substâncias.			
<b>REFERENCIAS</b>	Kelly, J. F., Humphreys, K., Ferri, M. (2017). ALCOÓLICOS ANÔNIMOS E OUTROS PROGRAMAS DE 12 PASSOS PARA TRANSTORNO DO USO DE ALCOÓL. Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas, 3. Assis, N. S., et al. (2018). ALCOOLISMO E ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DESTA DOENÇA: UM ESTUDO NO GRUPO ESPERANÇA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM. In 13º Congresso Internacional Rede Unida. Santos Parreira, R. M. G. (2019). A Intervenção do Serviço Social no Âmbito dos Problemas Ligados ao Alcool. Tese de Doutorado, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14279	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4303539 - LARISSA GONÇALVES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Músicos de instrumentos de sopro e condição bucal: repercussões ao longo da vida.			
<b>INTRODUCA O</b>	Músicos de instrumentos de sopro utilizam o tempo todo a cavidade bucal para o trabalho do dia a dia, são muitas horas no dia dedicadas a atividade. Não existe na literatura um protocolo de desinfecção do bocal ou palheta dos instrumentos de sopro, como também dados sobre a repercussão dos instrumentos de sopro no posicionamento dentário.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do estudo foi observar o comportamento dos músicos com relação a desinfecção do bocal do instrumento e sua percepção quanto os efeitos do instrumento na cavidade bucal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram inicialmente entrevistados 48 músicos de instrumentos de sopro e de acordo com os critérios de elegibilidade 27 foram incluídos no estudo, de ambos os gêneros e com média de idade de 39 anos. como critério de elegibilidade os músicos deveriam exercer exclusivamente o ofício de músico, utilizar instrumento de sopro e estar de acordo com o termo de consentimento. Questionário sobre hábitos de higiene e desinfecção do instrumento foi aplicado individualmente após palestra de instrução de higiene bucal.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram que 40,7% não higienizam o bocal/palheta, dos 59,3% que realizam a desinfecção, a maioria faz com agua corrente (56,2%), outros métodos utilizados foram lenço umedecido e mergulho em antisséptico bucal. Quanto a condição bucal, 37% relatam impacto negativo da prática musical.			
<b>CONCLUSOES</b>	Músicos de instrumentos de sopro precisam de orientação quanto a desinfecção dos componentes do instrumento que estão em constante contato com a cavidade bucal e de como minimizar os efeitos no posicionamento dentário.			
<b>REFERENCIA S</b>	Herman E. Dental considerations in the playing of musical instruments. Dent Assist J. 1974 set;89(3):611-19. Frias-Bulhosa J. Oral-facial impacts associated with the use of musical instruments. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac. 2012 jun;53(2):69-132. Walter WG, Chaffey D. Bacteriological and Cleaning Studies on the Mouthpieces of Musical Instruments. Appl Microbiol . 1958 mar;7(2):126-130			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14279	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4333284 - ANA GABRIELA SCHIEFELBEIN DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Músicos de instrumentos de sopro e condição bucal: repercussões ao longo da vida.			
<b>INTRODUCAO</b>	Músicos de instrumentos de sopro utilizam o tempo todo a cavidade bucal para o trabalho do dia a dia, são muitas horas no dia dedicadas a atividade. Não existe na literatura um protocolo de desinfecção do bocal ou palheta dos instrumentos de sopro, como também dados sobre a repercussão dos instrumentos de sopro no posicionamento dentário.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do estudo foi observar o comportamento dos músicos com relação a desinfecção do bocal do instrumento e sua percepção quanto os efeitos do instrumento na cavidade bucal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram inicialmente entrevistados 48 músicos de instrumentos de sopro e de acordo com os critérios de elegibilidade 27 foram incluídos no estudo, de ambos os gêneros e com média de idade de 39 anos. como critério de elegibilidade os músicos deveriam exercer exclusivamente o ofício de músico, utilizar instrumento de sopro e estar de acordo com o termo de consentimento. Questionário sobre hábitos de higiene e desinfecção do instrumento foi aplicado individualmente após palestra de instrução de higiene bucal.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram que 40,7% não higienizam o bocal/palheta, dos 59,3% que realizam a desinfecção, a maioria faz com agua corrente (56,2%), outros métodos utilizados foram lenço umedecido e mergulho em antisséptico bucal. Quanto a condição bucal, 37% relatam impacto negativo da prática musical.			
<b>CONCLUSOES</b>	Músicos de instrumentos de sopro precisam de orientação quanto a desinfecção dos componentes do instrumento que estão em constante contato com a cavidade bucal e de como minimizar os efeitos no posicionamento dentário.			
<b>REFERENCIAS</b>	Herman E. Dental considerations in the playing of musical instruments. Dent Assist J. 1974 set;89(3):611-19. Frias-Bulhosa J. Oral-facial impacts associated with the use of musical instruments. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac. 2012 jun;53(2):69-132. Walter WG, Chaffey D. Bacteriological and Cleaning Studies on the Mouthpieces of Musical Instruments. Appl Microbiol . 1958 mar;7(2):126-130			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14279	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382480 - ESTHER MACHADO PIUVEZAM	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Músicos de instrumentos de sopro e condição bucal: repercussões ao longo da vida.			
<b>INTRODUCA O</b>	Músicos de instrumentos de sopro utilizam o tempo todo a cavidade bucal para o trabalho do dia a dia, são muitas horas no dia dedicadas a atividade. Não existe na literatura um protocolo de desinfecção do bocal ou palheta dos instrumentos de sopro, como também dados sobre a repercussão dos instrumentos de sopro no posicionamento dentário.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do estudo foi observar o comportamento dos músicos com relação a desinfecção do bocal do instrumento e sua percepção quanto os efeitos do instrumento na cavidade bucal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram inicialmente entrevistados 48 músicos de instrumentos de sopro e de acordo com os critérios de elegibilidade 27 foram incluídos no estudo, de ambos os gêneros e com média de idade de 39 anos. como critério de elegibilidade os músicos deveriam exercer exclusivamente o ofício de músico, utilizar instrumento de sopro e estar de acordo com o termo de consentimento. Questionário sobre hábitos de higiene e desinfecção do instrumento foi aplicado individualmente após palestra de instrução de higiene bucal.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram que 40,7% não higienizam o bocal/palheta, dos 59,3% que realizam a desinfecção, a maioria faz com agua corrente (56,2%), outros métodos utilizados foram lenço umedecido e mergulho em antisséptico bucal. Quanto a condição bucal, 37% relatam impacto negativo da prática musical.			
<b>CONCLUSOES</b>	Músicos de instrumentos de sopro precisam de orientação quanto a desinfecção dos componentes do instrumento que estão em constante contato com a cavidade bucal e de como minimizar os efeitos no posicionamento dentário.			
<b>REFERENCIA S</b>	Herman E. Dental considerations in the playing of musical instruments. Dent Assist J. 1974 set;89(3):611-19. Frias-Bulhosa J. Oral-facial impacts associated with the use of musical instruments. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac. 2012 jun;53(2):69-132. Walter WG, Chaffey D. Bacteriological and Cleaning Studies on the Mouthpieces of Musical Instruments. Appl Microbiol . 1958 mar;7(2):126-130			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14279	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888383 - ANGELA CRISTINA DE JESUS PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Músicos de instrumentos de sopro e condição bucal: repercussões ao longo da vida.			
<b>INTRODUCA O</b>	Músicos de instrumentos de sopro utilizam o tempo todo a cavidade bucal para o trabalho do dia a dia, são muitas horas no dia dedicadas a atividade. Não existe na literatura um protocolo de desinfecção do bocal ou palheta dos instrumentos de sopro, como também dados sobre a repercussão dos instrumentos de sopro no posicionamento dentário.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do estudo foi observar o comportamento dos músicos com relação a desinfecção do bocal do instrumento e sua percepção quanto os efeitos do instrumento na cavidade bucal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram inicialmente entrevistados 48 músicos de instrumentos de sopro e de acordo com os critérios de elegibilidade 27 foram incluídos no estudo, de ambos os gêneros e com média de idade de 39 anos. como critério de elegibilidade os músicos deveriam exercer exclusivamente o ofício de músico, utilizar instrumento de sopro e estar de acordo com o termo de consentimento. Questionário sobre hábitos de higiene e desinfecção do instrumento foi aplicado individualmente após palestra de instrução de higiene bucal.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram que 40,7% não higienizam o bocal/palheta, dos 59,3% que realizam a desinfecção, a maioria faz com agua corrente (56,2%), outros métodos utilizados foram lenço umedecido e mergulho em antisséptico bucal. Quanto a condição bucal, 37% relatam impacto negativo da prática musical.			
<b>CONCLUSOES</b>	Músicos de instrumentos de sopro precisam de orientação quanto a desinfecção dos componentes do instrumento que estão em constante contato com a cavidade bucal e de como minimizar os efeitos no posicionamento dentário.			
<b>REFERENCIA S</b>	Herman E. Dental considerations in the playing of musical instruments. Dent Assist J. 1974 set;89(3):611-19. Frias-Bulhosa J. Oral-facial impacts associated with the use of musical instruments. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac. 2012 jun;53(2):69-132. Walter WG, Chaffey D. Bacteriological and Cleaning Studies on the Mouthpieces of Musical Instruments. Appl Microbiol . 1958 mar;7(2):126-130			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14279	Odontologia Social e Preventiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124247 - ALVARO LUIZ MENDONCA PINHEIRO BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Músicos de instrumentos de sopro e condição bucal: repercussões ao longo da vida.			
<b>INTRODUCA O</b>	Músicos de instrumentos de sopro utilizam o tempo todo a cavidade bucal para o trabalho do dia a dia, são muitas horas no dia dedicadas a atividade. Não existe na literatura um protocolo de desinfecção do bocal ou palheta dos instrumentos de sopro, como também dados sobre a repercussão dos instrumentos de sopro no posicionamento dentário.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do estudo foi observar o comportamento dos músicos com relação a desinfecção do bocal do instrumento e sua percepção quanto os efeitos do instrumento na cavidade bucal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram inicialmente entrevistados 48 músicos de instrumentos de sopro e de acordo com os critérios de elegibilidade 27 foram incluídos no estudo, de ambos os gêneros e com média de idade de 39 anos. como critério de elegibilidade os músicos deveriam exercer exclusivamente o ofício de músico, utilizar instrumento de sopro e estar de acordo com o termo de consentimento. Questionário sobre hábitos de higiene e desinfecção do instrumento foi aplicado individualmente após palestra de instrução de higiene bucal.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram que 40,7% não higienizam o bocal/palheta, dos 59,3% que realizam a desinfecção, a maioria faz com agua corrente (56,2%), outros métodos utilizados foram lenço umedecido e mergulho em antisséptico bucal. Quanto a condição bucal, 37% relatam impacto negativo da prática musical.			
<b>CONCLUSOES</b>	Músicos de instrumentos de sopro precisam de orientação quanto a desinfecção dos componentes do instrumento que estão em constante contato com a cavidade bucal e de como minimizar os efeitos no posicionamento dentário.			
<b>REFERENCIA S</b>	Herman E. Dental considerations in the playing of musical instruments. Dent Assist J. 1974 set;89(3):611-19. Frias-Bulhosa J. Oral-facial impacts associated with the use of musical instruments. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac. 2012 jun;53(2):69-132. Walter WG, Chaffey D. Bacteriological and Cleaning Studies on the Mouthpieces of Musical Instruments. Appl Microbiol . 1958 mar;7(2):126-130			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14281	Arquitetura e Urbanismo	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4746911 - ANDREIA RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Alcantara Freitas Peixoto		
<b>TITULO</b>	Acessibilidade em edificações tombadas do centro histórico de Sabará, Minas Gerais			
<b>INTRODUCA O</b>	Este apresenta resultados de pesquisa de Iniciação Científica da Universidade Santo Amaro, curso Arquitetura e Urbanismo, que analisou condições de acessibilidade em quatro edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Sabará (MG). Seu propósito é instigar debate acerca da adaptação do patrimônio cultural à acessibilidade, além do cumprimento às leis e normas técnicas federais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar condições de acessibilidade para pessoas com deficiência em quatro edificações tombadas no centro histórico de Sabará.			
<b>METODOLOGIA</b>	As técnicas para obter dados: pesquisa bibliográfica e visitas in loco aos bens culturais para levantamento de informações sobre acessibilidade. Ao visitar os bens, adotei lista de verificação de acessibilidade que orientou minhas observações quanto aos itens a serem examinados. Os dados foram analisados segundo leis e normas que regulamentam a acessibilidade para pessoas com deficiência.			
<b>RESULTADO S</b>	Foram analisados: duas igrejas (séc.XVIII), um teatro (séc.XIX) e um sobrado (séc.XVIII). As duas igrejas não possuem itens de acessibilidade, conforme preconizam NBR 9050/2020, NBR 16.537/2018 e Leis 10.098/2000 e 13.146/2015. O teatro possui alguns itens de acessibilidade para pessoas com deficiência motora: elevador vertical, sanitários acessíveis e ausência de desnível em uma das portas de acesso, itens incorporadas à edificação quando da obra de restauro (2016-2019). Espaço que promove eventos, inexistindo área demarcada para pessoas com deficiência; O sobrado, contemplado com alguns itens de acessibilidade no período do restauro (2018-2021), apresenta: rebaixamento da calçada em direção a uma das entradas ao terreno, corredores inclinados para acessar o interior do imóvel, sanitários acessíveis, elevador vertical.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A pesquisa apontou que a acessibilidade nas edificações estudadas é inexistente ou insatisfatória. A inexistência: confirmada nas duas igrejas, por barreiras variadas: escadas e degraus sem corrimões, falta de rebaixamento nas calçadas. A acessibilidade insatisfatória, presente no teatro e no sobrado: evidenciada por acessibilidade de acesso e circulação interna para pessoas com deficiência motora. Nas edificações analisadas inexistem sinalização ou inserção de itens voltados às pessoas com deficiência visual, auditiva, mental ou intelectual, como placa em braille e descrição sonora. A acessibilidade, quando existe, é pontual, atendendo insatisfatoriamente apenas pessoas com deficiência motora. As edificações restauradas com incorporação de itens de acessibilidade não atenderam às leis e normas integralmente, nem a Instrução Normativa N.1/2003 (IPHAN), que aponta diminuição/superação de barreiras aos bens culturais imóveis, para assegurar acesso, trânsito, orientação e comunicação, propiciando utilização desses e conhecimento de seus acervos por todos os cidadãos.			
<b>REFERENCIA S</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNTNBR 9050/2020: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020. BRASIL. Constituição (2015). Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015. Nstitui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: D.O.U.. Brasília, 07 jul. 2015. p. 2-2. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN. Instrução Normativa N.01, 25 de novembro de 2003. Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acatrelados em nível federal, e outras categorias, conforme específica.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14282	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4893972 - CRISTIANE DEL NERO VELASCO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maria Auxiliadora Fontana Baseio		
<b>TITULO</b>	PESQUISA NARRATIVA EM EDUCAÇÃO: O MÉTODO EM PERSPECTIVA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A utilização de narrativas como método é nova no Brasil, causando questionamentos advindos de uma concepção positivista de ciência. Há pouco mais de duas décadas, com as contribuições de Antônio Nóvoa (1992), de Michael Connelly e Jean Clandinin(2011), entre outros, o método passou a ser olhado como possibilidade hermenêutica, sobretudo no campo da Educação.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo discute a metodologia pesquisa narrativa, debruçando-se especialmente sobre um dos tipos dessa pesquisa no campo educacional - a narrativa de experiências do vivido (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015) - adotada no Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Santo Amaro "Imaginário e o motivo mítico do regresso ao útero: uma pesquisa narrativa acerca do faz de conta infantil".			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada é bibliográfica, em que colocaremos em diálogo autores como Antônio Nóvoa; Michael Connelly, Jean Clandinin; Maria Emilia Caixeta de Castro Lima; Corínta Maria Grisolia Geraldi; João Wanderley Geraldi.			
<b>RESULTADOS</b>	As narrativas como método de pesquisa têm sido usadas no Brasil há pouco mais de duas décadas, com as contribuições de Antônio Nóvoa (1992), de Michael Connelly e Jean Clandinin(2011). A obra Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa, dos referidos autores, apresenta o método como possibilidade de pesquisa em educação. Os autores apontam a influência de Dewey, com o conceito de experiência. No artigo "O trabalho com narrativas na investigação em educação" (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015), os autores apontam 4 empregos das narrativas no campo educacional: a narrativa como construção de sentidos para um evento, em que a memória de narradores contribui para pesquisa de terceiros; a narrativa (auto)biográfica, que reconstitui a história de alguém ou do pesquisador com uma escrita de si; a narrativa de experiências planejadas para serem pesquisadas, apoiadas em uma intencionalidade prévia, podendo o pesquisador ser ou não aquele que realiza a ação pedagógica; e a narrativa de experiências em educação, em que esta pesquisa se encaixa.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Ao narrar sua experiência, o sujeito extrai lições sobre o vivido; o conhecimento é produzido a partir de diálogos entre a experiência significativa e a base teórica. Conferir voz ao sujeito da experiência mostra-se relevante nas Ciências Humanas, pois, ao dar oportunidade para o docente compartilhar práticas pedagógicas, contribui-se para a superação da dicotomia entre teoria e prática, imprimindo coerência a uma profissão que se constrói sob as bases do encontro de vidas, de saberes e de fazeres. Testemunho e legado tecem essa escrita reflexiva na construção de um pensar relacional que narra e problematiza a história de uma vida em seu imbricamento com a vida de outros.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, F. Michael. Pesquisa Narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa. Uberlândia: EDUFU, 2011. DEWEY, John. Experiência e Educação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. LIMA, Maria Emilia Caixeta de Castro; GERALDI, Corínta Maria Grisolia; GERALDI, João Wanderley. O trabalho com narrativas na investigação em educação. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 31, n. 1, p. 17-44, 2015. NOVOA, Antônio (org.). Vidas de Professores. Porto, Portugal: Porto Editora, 1992.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14283	Saúde Coletiva	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4408705 - ESTELA SOUZA ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Silles		
<b>TITULO</b>	TUBERCULOSE LATENTE (ILTB) um desafio para saúde coletiva			
<b>INTRODUCAO</b>	A tuberculose (TB) é uma doença contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões e pode se apresentar em duas formas, como tuberculose ativa, que é quando a doença está ativamente produzindo sintomas e pode ser transmitida para outras pessoas ou tuberculose latente (ILTB), que é quando a pessoa está infectada, mas não produz sintomas e não transmite a doença para outras pessoas. A investigação de pessoas expostas a pacientes com TB ativa é importante para o diagnóstico precoce e na redução da transmissão da doença, assim como a falta de adesão ao tratamento da ILTB aumenta o risco de desenvolvimento da tuberculose ativa.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar pessoas que foram expostas a pacientes com tuberculose ativa e acompanhar pacientes diagnosticados com infecção latente da tuberculose com o tratamento atrasado.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, do 8º semestre do curso de enfermagem onde foram coletados dados entre os dias 14/08/2023 ao dia 23/08/2023, feito análise das planilhas, livros e prontuários de registro de pacientes com tuberculose ativa, seus contatos e pacientes com tuberculose latente. Diante disso, foram identificados 31 contatos sem exames de RX e baciloscopia e 5 pacientes ILTB com o tratamento atrasado.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o período de estágio foi observado que a unidade tem uma meta estipulada para a busca ativa de contatos que é de 80%, entretanto estão com a porcentagem de 54,55%. O acompanhamento de pacientes ILTB com o tratamento atrasado não estava sendo realizado pelo setor de vigilância em saúde. Diante disso, foi elaborada duas planilhas no Excel com a relação de contatos e de pacientes ILTB, a fim de auxiliar no controle e acompanhamento diário. Diante do exposto, foi realizado busca ativa por meio de mensagens via WhatsApp e visita domiciliaria.			
<b>CONCLUSOES</b>	A importância do monitoramento, acompanhamento do tratamento demonstra um efetivo diferencial para que a doença não se torne ativa. Por hora com essas medidas foram alcançados o total de 90,32% de sucesso na realização da proposta de busca ativa dos contatos de pacientes com diagnóstico de tuberculose ativa, que fizeram a coleta de baciloscopia e dentre esses pacientes, 87,10% comparecem à unidade para realizar o exame de RX, conforme a orientação feita na visita domiciliaria. No entanto, para os pacientes ILTB com o tratamento atrasado, resultou no alcance de 60% de sucesso.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BRASIL, Ministério da Saúde. MANUAL de RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, 2019. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/bvsm/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf">https://bvsm.s.saude.gov.br/bvsm/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf</a> 2. BRASIL, Ministério da Saúde. GUIA de VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5a Edição Revisada. 2022. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/bvsm/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf">https://bvsm.s.saude.gov.br/bvsm/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf</a> 3. Ferreira, S. M. B., Silva, A. M. C. da., (#38) Botelho, C.. (2005). Abandono do tratamento da tuberculose pulmonar em Cuiabá - MT - Brasil. Jornal Brasileiro De Pneumologia, 31(5), 427–435. <a href="https://doi.org/10.1590/S1806-37132005000500011">https://doi.org/10.1590/S1806-37132005000500011</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14285	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2238411 - RITA DE CÁSSIA GERALDI MENEGON	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maria Auxiliadora Fontana Baseio		
<b>TITULO</b>	CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA NO CONTEXTO PAULISTANO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os primeiros anos de vida da criança são essenciais para o pleno desenvolvimento da pessoa, tanto na própria infância, quanto nas fases da vida que virão. Para muitas crianças, a primeira etapa da educação básica, a educação infantil, é o primeiro momento em que vivenciam novas socializações e aprendizagens. Cada vez mais, as instituições são chamadas para discutir e colocar, em suas propostas educacionais, o desenvolvimento das competências socioemocionais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Discutir como a concepção de infância se manifesta em diretrizes educacionais e documentos institucionais para o ensino de crianças com 4 anos a 5 anos e 11 meses e suas relações com o desenvolvimento da competência socioemocional.			
<b>METODOLOGIA</b>	A investigação ocorreu por meio da abordagem bibliográfica e documental (documentação pedagógica - Projeto Político-Pedagógico e Cartas de Intenções e diretrizes educacionais - Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), Base Nacional Comum Curricular (BNCC), parte da Educação Infantil e Currículo da Cidade - Educação Infantil).			
<b>RESULTADOS</b>	Nas diretrizes educacionais e na documentação pedagógica, identificamos a concepção de infância que abordam. Existem indicações explícitas da necessidade de um trabalho para o desenvolvimento pleno da criança nos seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais. No contexto paulistano, em suas diretrizes educacionais, encontramos o apontamento da necessidade organização adequada de um ambiente que propicie as condições necessárias para um desenvolvimento pleno em termos cognitivos, afetivos e motores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nas diretrizes educacionais e na documentação pedagógica da EMEI Campo Limpo, identificamos uma concepção de infância que prioriza a formação integral da criança, considerando o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e das competências socioemocionais.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABED, Anita. O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica. São Paulo: UNESCO/MEC, 2014. DENHAM, S. A. Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it?. Early education and development, v. 17, n. 1, p. 57-89, 2006. GOLEMAN, D. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14287	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4369742 - JEFFERSON SANTOS DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Uma abordagem sobre ESG e o impacto que tem no resultado das companhias.			
<b>INTRODUCAO</b>	A busca pelo termo ESG teve um grande crescimento a partir de 2020 e isso se dá por parte das empresas em demonstrar sua preocupação com causas ambientais, sociais e de governança corporativa, seja para atrair investimentos, aumentar a rentabilidade ou reduzir riscos. Tendo em vista que impacta diretamente no resultado das companhias. (REIS, 2022).			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a importância do ESG e como ele impacta no resultado financeiro e reputacional das empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia apresentada neste trabalho foi baseada em pesquisas bibliográficas, exploratória qualitativa, utilizando artigos e relatórios de três Big Four e outras empresas para exemplificar o conteúdo produzido, além disso exploramos os princípios do Pacto Global da ONU, para fundamentar ainda mais o conteúdo.			
<b>RESULTADOS</b>	A implementação eficaz do ESG não apenas beneficia o Meio Ambiente e a Sociedade, mas também cria um impacto positivo nas empresas, gerando sustentabilidade financeira, atratividade para investidores, melhoria de reputação, acesso a mercados novos, inovação e eficiência, atração e retenção de talentos, redução de riscos de litígios e multas, engajamento de funcionários e influência na Indústria.			
<b>CONCLUSOES</b>	As práticas ESG são de extrema importância para a saúde financeira da empresa, pois é através disso a empresa possuirá maior segurança em sua operação, com redução de riscos e ganhos reputacionais, portanto as práticas ESG são capazes de atrair ou apartar novos negócios, interferindo diretamente no resultado financeiro da companhia.			
<b>REFERENCIAS</b>	REIS, T. ESG: sigla que está mudando o mundo dos investimentos. 2022. Disponível em: (#60) <a href="https://www.sunio.com.br/guias/esg/#62">https://www.sunio.com.br/guias/esg/#62</a> . Acesso em: 30 agosto 2023. Entenda o significado da sigla ESG (Ambiental, Social e Governança) e saiba como inserir esses princípios no dia a dia de sua empresa. PACTO GLOBAL. Rede Brasil. Disponível em: <a href="https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg">https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg</a> . Acesso em 23 agosto 2023. Entenda sobre o guia de sustentabilidade e gestão ASG. B3. Disponível em: <a href="https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/guia-esg.htm">https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/guia-esg.htm</a> . Acesso 23 agosto 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14287	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4400330 - WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tomas de Aquino Salomao	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	Uma abordagem sobre ESG e o impacto que tem no resultado das companhias.			
<b>INTRODUCAO</b>	A busca pelo termo ESG teve um grande crescimento a partir de 2020 e isso se dá por parte das empresas em demonstrar sua preocupação com causas ambientais, sociais e de governança corporativa, seja para atrair investimentos, aumentar a rentabilidade ou reduzir riscos. Tendo em vista que impacta diretamente no resultado das companhias. (REIS, 2022).			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a importância do ESG e como ele impacta no resultado financeiro e reputacional das empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia apresentada neste trabalho foi baseada em pesquisas bibliográficas, exploratória qualitativa, utilizando artigos e relatórios de três Big Four e outras empresas para exemplificar o conteúdo produzido, além disso exploramos os princípios do Pacto Global da ONU, para fundamentar ainda mais o conteúdo.			
<b>RESULTADOS</b>	A implementação eficaz do ESG não apenas beneficia o Meio Ambiente e a Sociedade, mas também cria um impacto positivo nas empresas, gerando sustentabilidade financeira, atratividade para investidores, melhoria de reputação, acesso a mercados novos, inovação e eficiência, atração e retenção de talentos, redução de riscos de litígios e multas, engajamento de funcionários e influência na Indústria.			
<b>CONCLUSOES</b>	As práticas ESG são de extrema importância para a saúde financeira da empresa, pois é através disso a empresa possuirá maior segurança em sua operação, com redução de riscos e ganhos reputacionais, portanto as práticas ESG são capazes de atrair ou apartar novos negócios, interferindo diretamente no resultado financeiro da companhia.			
<b>REFERENCIAS</b>	REIS, T. ESG: sigla que está mudando o mundo dos investimentos. 2022. Disponível em: (#60) <a href="https://www.sun0.com.br/guias/esg/#62">https://www.sun0.com.br/guias/esg/#62</a> . Acesso em: 30 agosto 2023. Entenda o significado da sigla ESG (Ambiental, Social e Governança) e saiba como inserir esses princípios no dia a dia de sua empresa. PACTO GLOBAL. Rede Brasil. Disponível em: <a href="https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg">https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg</a> . Acesso em 23 agosto 2023. Entenda sobre o guia de sustentabilidade e gestão ASG. B3. Disponível em: <a href="https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/guia-esg.htm">https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/guia-esg.htm</a> . Acesso 23 agosto 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14288	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1678001 - THATIANA RAQUEL SANTANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Chagas Raszeja		
<b>TITULO</b>	O LUTO NO FILME BELEZA OCULTA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Introdução: o presente trabalho tem como temática o Luto a partir do filme Beleza Oculta. O luto é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre uma pessoa e seu objeto, portanto um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. A origem da palavra luto vem do latim lucto, que significa sentimento de pesar pela morte de alguém. O processo de luto está inevitavelmente presente na dinâmica entre os dois polos da existência humana: a vida e a morte. Para compreender tal princípio buscou-se, neste estudo, explorar as concepções de luto e seu processo, a partir da ótica psicanalítica, utilizando as contribuições conceituais de Sigmund Freud e de Melanie Klein. Já no filme Beleza Oculta foi feito no ano 2016, conta a história de Howard que entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, algo que preocupa seus amigos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar o luto a partir do filme Beleza Oculta, utilizando o viés psicanalítico.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esse trabalho parte de um levantamento bibliográfico de abordagem qualitativa, e para a confecção desse trabalho foi pesquisado artigos na plataforma do Google Acadêmico e Scielo, sendo as palavras chave: luto patológico; luto; luto na perspectiva psicanalítica; e luto parental. Foi feita uma revisão de literatura utilizando livros voltados para o Luto na perspectiva psicanalítica, tendo como autores base Sigmund Freud e Melanie Klein e o filme "Beleza Oculta".			
<b>RESULTADOS</b>	É possível notar no filme "beleza oculta" que o personagem principal Howard, vivenciou um luto no início e com o passar do tempo desembocou em um possível luto patológico, ou seja, em melancolia segundo Freud.			
<b>CONCLUSOES</b>	Por meio deste trabalho foi possível concluir que a melancolia seria um luto patológico, ou seja, um luto que fica impossibilitado de ser elaborado. Além disso, o luto embora seja uma reação dolorosa, faz parte do processo de amadurecimento humano e não deve ser interrompido em seu curso.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FREUD, Sigmund. Luto e melancolia (1917 [1915]). In: FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 12 v. p. 171-194. KLEIN, Melanie. Uma contribuição à psicogênese dos estados maniaco-depressivos (1935). In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 301-329. KLEIN, Melanie. O luto e suas relações com os estados maniaco-depressivos (1940). In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago, 1996. p.385-412.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14288	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4027191 - SARA SANTOS CRUZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Chagas Raszeja		
<b>TITULO</b>	O LUTO NO FILME BELEZA OCULTA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Introdução: o presente trabalho tem como temática o Luto a partir do filme Beleza Oculta. O luto é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre uma pessoa e seu objeto, portanto um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. A origem da palavra luto vem do latim lucto, que significa sentimento de pesar pela morte de alguém. O processo de luto está inevitavelmente presente na dinâmica entre os dois polos da existência humana: a vida e a morte. Para compreender tal princípio buscou-se, neste estudo, explorar as concepções de luto e seu processo, a partir da ótica psicanalítica, utilizando as contribuições conceituais de Sigmund Freud e de Melanie Klein. Já no filme Beleza Oculta foi feito no ano 2016, conta a história de Howard que entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, algo que preocupa seus amigos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar o luto a partir do filme Beleza Oculta, utilizando o viés psicanalítico.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esse trabalho parte de um levantamento bibliográfico de abordagem qualitativa, e para a confecção desse trabalho foi pesquisado artigos na plataforma do Google Acadêmico e Scielo, sendo as palavras chave: luto patológico; luto; luto na perspectiva psicanalítica; e luto parental. Foi feita uma revisão de literatura utilizando livros voltados para o Luto na perspectiva psicanalítica, tendo como autores base Sigmund Freud e Melanie Klein e o filme "Beleza Oculta".			
<b>RESULTADOS</b>	É possível notar no filme "beleza oculta" que o personagem principal Howard, vivenciou um luto no início e com o passar do tempo desembocou em um possível luto patológico, ou seja, em melancolia segundo Freud.			
<b>CONCLUSOES</b>	Por meio deste trabalho foi possível concluir que a melancolia seria um luto patológico, ou seja, um luto que fica impossibilitado de ser elaborado. Além disso, o luto embora seja uma reação dolorosa, faz parte do processo de amadurecimento humano e não deve ser interrompido em seu curso.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FREUD, Sigmund. Luto e melancolia (1917 [1915]). In: FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 12 v. p.171-194. KLEIN, Melanie. Uma contribuição à psicogênese dos estados maniaco-depressivos (1935). In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 301-329. KLEIN, Melanie. O luto e suas relações com os estados maniaco-depressivos (1940). In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago, 1996. p.385-412.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14288	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4074262 - DANIELA SANTOS LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Chagas Raszeja		
<b>TITULO</b>	O LUTO NO FILME BELEZA OCULTA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Introdução: o presente trabalho tem como temática o Luto a partir do filme Beleza Oculta. O luto é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre uma pessoa e seu objeto, portanto um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. A origem da palavra luto vem do latim lucto, que significa sentimento de pesar pela morte de alguém. O processo de luto está inevitavelmente presente na dinâmica entre os dois polos da existência humana: a vida e a morte. Para compreender tal princípio buscou-se, neste estudo, explorar as concepções de luto e seu processo, a partir da ótica psicanalítica, utilizando as contribuições conceituais de Sigmund Freud e de Melanie Klein. Já no filme Beleza Oculta foi feito no ano 2016, conta a história de Howard que entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, algo que preocupa seus amigos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar o luto a partir do filme Beleza Oculta, utilizando o viés psicanalítico.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esse trabalho parte de um levantamento bibliográfico de abordagem qualitativa, e para a confecção desse trabalho foi pesquisado artigos na plataforma do Google Acadêmico e Scielo, sendo as palavras chave: luto patológico; luto; luto na perspectiva psicanalítica; e luto parental. Foi feita uma revisão de literatura utilizando livros voltados para o Luto na perspectiva psicanalítica, tendo como autores base Sigmund Freud e Melanie Klein e o filme "Beleza Oculta".			
<b>RESULTADOS</b>	É possível notar no filme "beleza oculta" que o personagem principal Howard, vivenciou um luto no início e com o passar do tempo desembocou em um possível luto patológico, ou seja, em melancolia segundo Freud.			
<b>CONCLUSOES</b>	Por meio deste trabalho foi possível concluir que a melancolia seria um luto patológico, ou seja, um luto que fica impossibilitado de ser elaborado. Além disso, o luto embora seja uma reação dolorosa, faz parte do processo de amadurecimento humano e não deve ser interrompido em seu curso.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FREUD, Sigmund. Luto e melancolia (1917 [1915]). In: FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 12 v. p. 171-194. KLEIN, Melanie. Uma contribuição à psicogênese dos estados maniaco-depressivos (1935). In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 301-329. KLEIN, Melanie. O luto e suas relações com os estados maniaco-depressivos (1940). In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago, 1996. p.385-412.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14290	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3981541 - MILENA MENDES PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	A Importância da Arte na Vida da Juventude Periférica			
<b>INTRODUCAO</b>	O presente trabalho propõe um estudo sobre a importância da arte na experiência da juventude periférica, entendendo a arte como um fenômeno social que causa influência sobre a vivência dos jovens impactados pela desigualdade, como é o caso dos jovens periféricos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a importância da arte na sociabilidade de jovens da periferia, enquanto mediadora para a construção de protagonismo, cidadania e pertencimento, considerando as políticas públicas na garantia de direitos da juventude.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se como metodologia a análise documental, ou seja, o uso de documentos diversificados como técnica de análise e compreensão. Foram selecionados dois documentários, sendo estes "Panorama Arte na Periferia" e "Panorama - Arte na Periferia II", que retratam o olhar da realidade vivida pela juventude periférica.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados obtidos trouxeram para a compreensão a visão plural da arte pelo olhar da população periférica, exemplificando o modo como a arte desempenha um papel transformador na realidade dessa população, e ilustrando a atuação artística dos "becos" e "vuelas" como um compromisso de existência e uma luta diária pela própria vida. A arte mostra-se também como um recurso utilizado pelos artistas periféricos para transmitir suas ideias, utilizada como ato político, traduzindo o viver e o sentir dos jovens dentro do contexto ao qual estão inseridos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A pesquisa demonstrou que a arte é um importante recurso para a juventude periférica, sendo um instrumento ativo para que possam, por meio dela, exercer sua cidadania expondo suas vivências, criando reflexões, fazendo com que o sujeito se sinta pertencente ao meio em que está inserido, sendo protagonista de sua própria vida a partir das reflexões propostas por eles.			
<b>REFERENCIAS</b>	BOCK, A. ; FURTADO, O. ; TEIXEIRA, M. Psicologias: Uma Introdução ao Estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. MOREIRA, M. ; SOUZA, S. Psicologia Sócio-Histórica: Bases Epistemológicas, Categorias Fundamentais e Intervenções Psicossociais. Goiânia: Editora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2022. MUSHA, E. H. Jovens de projetos sociais em tempos neoliberais: o "personagem do social". 2017. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14290	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135806 - ONILA LARISSA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	A Importância da Arte na Vida da Juventude Periférica			
<b>INTRODUCAO</b>	O presente trabalho propõe um estudo sobre a importância da arte na experiência da juventude periférica, entendendo a arte como um fenômeno social que causa influência sobre a vivência dos jovens impactados pela desigualdade, como é o caso dos jovens periféricos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a importância da arte na sociabilidade de jovens da periferia, enquanto mediadora para a construção de protagonismo, cidadania e pertencimento, considerando as políticas públicas na garantia de direitos da juventude.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se como metodologia a análise documental, ou seja, o uso de documentos diversificados como técnica de análise e compreensão. Foram selecionados dois documentários, sendo estes "Panorama Arte na Periferia" e "Panorama - Arte na Periferia II", que retratam o olhar da realidade vivida pela juventude periférica.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados obtidos trouxeram para a compreensão a visão plural da arte pelo olhar da população periférica, exemplificando o modo como a arte desempenha um papel transformador na realidade dessa população, e ilustrando a atuação artística dos "becos" e "vuelas" como um compromisso de existência e uma luta diária pela própria vida. A arte mostra-se também como um recurso utilizado pelos artistas periféricos para transmitir suas ideias, utilizada como ato político, traduzindo o viver e o sentir dos jovens dentro do contexto ao qual estão inseridos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A pesquisa demonstrou que a arte é um importante recurso para a juventude periférica, sendo um instrumento ativo para que possam, por meio dela, exercer sua cidadania expondo suas vivências, criando reflexões, fazendo com que o sujeito se sinta pertencente ao meio em que está inserido, sendo protagonista de sua própria vida a partir das reflexões propostas por eles.			
<b>REFERENCIAS</b>	BOCK, A. ; FURTADO, O. ; TEIXEIRA, M. Psicologias: Uma Introdução ao Estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. MOREIRA, M. ; SOUZA, S. Psicologia Sócio-Histórica: Bases Epistemológicas, Categorias Fundamentais e Intervenções Psicossociais. Goiânia: Editora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2022. MUSHA, E. H. Jovens de projetos sociais em tempos neoliberais: o "personagem do social". 2017. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14291	Psicologia Social	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4818849 - FRANCISCO RENNER SANTOS CARVALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	Prender Compensa? uma análise crítica sobre a intervenção punitivista e sua efetividade no combate à criminalidade			
<b>INTRODUCA O</b>	O combate à criminalidade costuma ser pauta das promessas políticas durante os períodos de campanha eleitoral, nas últimas décadas o número de encarceramento vem aumentando progressivamente no Brasil a cada ano e em 2023 chegou a atingir um número maior do que 5 mil de seus municípios possuem em habitantes. Contudo, será que tal medida é o suficiente para ressocializar o indivíduo? Dados mostram que cerca de 50% dos encarcerados reincidem no sistema penitenciário, sendo assim é de fundamental importância refletir sobre o punitivismo penal utilizado pelo Estado, para tanto, o presente estudo se pauta nos pressupostos teóricos e epistemológicos da Psicologia Sócio-histórica, utilizando os conceitos de violência, afetos e sofrimento ético-político em seus eixos analíticos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a efetividade da lógica punitivista do Estado no combate à criminalidade, refletindo sobre a concepção ético-política que a sustenta.			
<b>METODOLOGIA</b>	Essa é uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, com finalidade exploratória, e a análise dos dados se orientará pelos princípios do materialismo histórico e dialético. O levantamento do material foi feito de acordo com três eixos, sendo eles: teóricos referência para o movimento anti punitivista / abolicionista penal; trabalhos jornalísticos focados em segurança pública no Brasil; e dados sobre segurança pública e sistema carcerário brasileiro.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao refletir sobre a lógica punitivista que o Estado utiliza, para além da essencial análise de dados, faz-se necessário discutir a respeito de conceitos amplamente usados quando a questão da segurança pública é pauta. O fenômeno da violência, por exemplo, assume diversos significados de acordo com a concepção ideológica e/ou objetivo político do grupo social que a utiliza. No decorrer desta pesquisa, a definição utilizada é a defendida por Bader Sawaia (2020) ao interpretar as ideias filosóficas de Espinosa: a violência como desmesura de poder, ameaça ao direito natural e que sustenta a desigualdade social. Quando analisada a partir dessa ótica, percebe-se que a violência se apresenta de diversas formas em nossa sociedade, seja no presente ou em seu processo histórico de construção. Tal afirmação não visa relativizar e enfraquecer a ideia de violência, mas complexifica-la para que seja possível refletir sobre o impacto da violência na construção da subjetividade de quem por ela é afetado e discutir a respeito da coerência entre o método punitivista e o seu objetivo, a ressocialização do indivíduo.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Considerando que os afetos são essenciais para o desenvolvimento da subjetividade é possível afirmar que submeter um indivíduo que cresceu em uma sociedade repleta de violência, mesmo que não necessariamente como vítima, a um regime que intensifica essas violências através de diversos afetos que diminuem a sua potência de vida, além de não contribuir para um processo de ressocialização, propicia reações que reproduzem ainda mais violência.			
<b>REFERENCIA S</b>	BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. 1ª. ed. Jandáira, 2019. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <a href="https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf">https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf</a> . Acesso em: 08/10/2013 SAWAIA, Bader Burihan. Prólogo: A dimensão ético-ontológica da violência. In: SAWAIA, Bader Burihan et al. Afeto e violência: lugares de servidão e resistência. 1ª. ed. Embu das Artes/ SP: Alexa Cultural, 2020. p. 33-42.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14292	Psicologia Cognitiva	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4098242 - MONALISA SANTOS RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	Intervenção em TCC's para Comportamento Suicida e Autolesão: Uma Revisão sistemática			
<b>INTRODUCAO</b>	O comportamento autolesivo e a ideação suicida entre adolescentes representam desafios cruciais para a saúde pública global[1]. A adolescência é marcada por mudanças significativas no desenvolvimento físico, psicológico e social, pois apresenta desafios que afetam a saúde mental dos jovens e os expõe a fatores estressantes[2]. Essa combinação de fatores biopsicossociais torna a adolescência um período crítico, o que pode influenciar profundamente a saúde emocional e comportamental dos jovens[3]. Recentemente, o suicídio entre adolescentes atingiu níveis preocupantes, classificando-se como a segunda causa de morte em alguns países[1]. Diante dessa realidade, é fundamental conduzir pesquisas para entender, intervir e minimizar esses impactos.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo principal desta revisão é analisar e resumir intervenções terapêuticas que se mostraram eficazes na redução de comportamentos suicidas e autolesão em adolescentes, considerando as evidências mais recentes em nível mundial.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizamos uma busca sistemática em várias bases de dados científicas, incluindo PubMed, Google Scholar, Scielo e JAMA Network, no período entre junho de 2017 e junho de 2023, com foco em intervenções baseadas em Terapias Cognitivo-Comportamentais (TCC's) para adolescentes com comportamentos suicidas e autolesão, com idades entre 12 até 20 anos. Utilizamos palavras-chave de busca, incluindo "Suicide AND adolescent AND Intervention," "Suicide AND adolescent," e "Suicide AND self-harm." Inicialmente, identificamos um total de 87 artigos relacionados, e foram selecionados 10 artigos, priorizado Ensaio Clínico Randomizados.			
<b>RESULTADOS</b>	Nesta revisão, foram analisados 10 artigos que investigaram intervenções terapêuticas baseadas em TCC's para adolescentes com comportamentos suicidas e autolesão. A síntese dos artigos revelou as seguintes informações: A autolesão é um fator preditor para comportamentos suicidas entre adolescentes[1], as intervenções analisadas neste estudo demonstraram um foco claro na busca por fatores de segurança[4], incluindo o fortalecimento do ajuste emocional e da interação familiar, com ênfase na resiliência e no apoio emocional dos adolescentes. Crises, violências e problemas familiares estavam presentes como fatores contribuintes para comportamentos suicidas e autolesão em adolescentes, ressaltando a importância da participação ativa da família nas intervenções[5]. A Terapia Comportamental Dialética para Adolescentes (DBT-A) [6], que enfoca desenvolvimento de habilidades [7] de enfrentamento se mostrou eficaz [1] na redução a longo prazo de comportamentos suicidas e autolesão, especialmente entre adolescentes considerados de alto risco.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que a DBT-A oferece diretrizes e estratégias que favorecem a mudança de comportamento do adolescente, que passa a reunir as habilidades e recursos para lidar com os infortúnios da vida – regulação emocional. E, ainda que, quando associada a orientação familiar tende a ser mais efetiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	[1] Clarke S, Allerhand LA, Berk MS. Recent advances in understanding and managing self-harm in adolescents. F1000Research. 2019;8. [2] Senna SRM, Dessen MA. Contribuições das teorias do desenvolvimento humano para a concepção contemporânea da adolescência. Psicologia: teoria e Pesquisa. 2012; 28:101-108. [3] Remédios CIFRN. O bem-estar psicológico e as competências pessoais e sociais na adolescência (Tese de doutorado). 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14293	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4071328 - ANNE KELLY EVANGELISTA FEITOSA PACIFICO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	A Juventude como um Período de Transição entre a Adolescência e a Vida Adulta: uma análise psicossocial			
<b>INTRODUCAO</b>	O desenvolvimento humano é um processo ininterrupto e pode ser dividido em fases distintas, demarcadas por mudanças significativas nas dimensões biológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. Nas últimas décadas, o conceito de juventude adquiriu um novo significado, deixando de ser considerado exclusivamente um estilo de vida e se caracterizando por uma faixa etária específica, no Brasil, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude, abrangendo o final da adolescência e o início da vida adulta. O que permite levantar a seguinte questão: seria a juventude o processo transitório entre a adolescência e a vida adulta? A hipótese aqui levantada é de que as transformações sociais, econômicas e políticas fizeram com que a adolescência não fosse mais suficiente para preparar os sujeitos para a fase adulta, sendo necessária uma extensão desse período, a juventude.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar se a juventude pode ser reconhecida como um período transitório entre a adolescência e a vida adulta.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho adota uma abordagem metodológica baseada em uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando os seguintes descritores: juventude, adolescência, transição, adulto, identidade, fatores sociais.			
<b>RESULTADOS</b>	O ingresso na vida adulta é marcado por diversos acontecimentos, como ingressar na faculdade, sair da casa dos pais, estabelecer relacionamentos românticos, assumir responsabilidades, gravidez e ingresso no mercado de trabalho, ainda que não tenha uma ordem a ser seguida, tais eventos costumam acontecer entre o final da adolescência até os anos iniciais da vida adulta, período etário que caracteriza a juventude. A exigência de uma maior qualificação para ingresso no mercado de trabalho, as transformações nos modelos familiares, o avanço nos direitos sexuais e reprodutivos têm interferido no processo de autonomia dos indivíduos. No contexto brasileiro, as desigualdades sociais influenciam de maneira significativa a vida dos jovens. A falta de oportunidades educacionais de qualidade e a distribuição desigual de renda afetam suas perspectivas de futuro. Muitos jovens de famílias de baixa renda são obrigados a assumir responsabilidades precocemente, contribuindo para o sustento da família desde cedo. Além disso, o alto índice de violência, de mortalidade, de adoecimento psíquico e o aumento dos casos de suicídio são fatores psicossociais que vulnerabilizam a juventude.			
<b>CONCLUSOES</b>	Embora a adolescência seja tradicionalmente reconhecida como a fase de transição entre a infância e a vida adulta, a pesquisa demonstrou que essa fase tem sido insuficiente para sanar as necessidades e garantir o preparo dos indivíduos para se tornarem adultos na sociedade contemporânea. Tendo isso em consideração, a juventude emerge como um período de transição mais abrangente, garantindo assim, a formulação de políticas públicas que considerem o estado de vulnerabilidade do indivíduo nesse período possibilitando um maior apoio na busca pela autonomia.			
<b>REFERENCIAS</b>	Lane, S. T. M. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2006. Brasil. Estatuto da juventude: atos internacionais e normas correlatas. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas. 2013. CAMARANO, Ana Amélia et al. Caminhos para a Vida Adulta: As Múltiplas Trajetórias dos Jovens Brasileiro. Última década, Santiago, v. 12, n. 21, p. 11-50, 2004. Disponível em (#60) <a href="https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=scl_arttext(#38)pid=S0718-22362004000200002(#38)lng=es(#38)nrm=iso(#62)">https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=scl_arttext(#38)pid=S0718-22362004000200002(#38)lng=es(#38)nrm=iso(#62)</a> . Acesso em: 10/10/2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14293	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4127901 - YANCA BATISTA PINA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	A Juventude como um Período de Transição entre a Adolescência e a Vida Adulta: uma análise psicossocial			
<b>INTRODUCA O</b>	O desenvolvimento humano é um processo ininterrupto e pode ser dividido em fases distintas, demarcadas por mudanças significativas nas dimensões biológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. Nas últimas décadas, o conceito de juventude adquiriu um novo significado, deixando de ser considerado exclusivamente um estilo de vida e se caracterizando por uma faixa etária específica, no Brasil, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude, abrangendo o final da adolescência e o início da vida adulta. O que permite levantar a seguinte questão: seria a juventude o processo transitório entre a adolescência e a vida adulta? A hipótese aqui levantada é de que as transformações sociais, econômicas e políticas fizeram com que a adolescência não fosse mais suficiente para preparar os sujeitos para a fase adulta, sendo necessária uma extensão desse período, a juventude.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar se a juventude pode ser reconhecida como um período transitório entre a adolescência e a vida adulta.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho adota uma abordagem metodológica baseada em uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando os seguintes descritores: juventude, adolescência, transição, adulto, identidade, fatores sociais.			
<b>RESULTADO S</b>	O ingresso na vida adulta é marcado por diversos acontecimentos, como ingressar na faculdade, sair da casa dos pais, estabelecer relacionamentos românticos, assumir responsabilidades, gravidez e ingresso no mercado de trabalho, ainda que não tenha uma ordem a ser seguida, tais eventos costumam acontecer entre o final da adolescência até os anos iniciais da vida adulta, período etário que caracteriza a juventude. A exigência de uma maior qualificação para ingresso no mercado de trabalho, as transformações nos modelos familiares, o avanço nos direitos sexuais e reprodutivos têm interferido no processo de autonomia dos indivíduos. No contexto brasileiro, as desigualdades sociais influenciam de maneira significativa a vida dos jovens. A falta de oportunidades educacionais de qualidade e a distribuição desigual de renda afetam suas perspectivas de futuro. Muitos jovens de famílias de baixa renda são obrigados a assumir responsabilidades precocemente, contribuindo para o sustento da família desde cedo. Além disso, o alto índice de violência, de mortalidade, de adoecimento psíquico e o aumento dos casos de suicídio são fatores psicossociais que vulnerabilizam a juventude.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Embora a adolescência seja tradicionalmente reconhecida como a fase de transição entre a infância e a vida adulta, a pesquisa demonstrou que essa fase tem sido insuficiente para sanar as necessidades e garantir o preparo dos indivíduos para se tornarem adultos na sociedade contemporânea. Tendo isso em consideração, a juventude emerge como um período de transição mais abrangente, garantindo assim, a formulação de políticas públicas que considerem o estado de vulnerabilidade do indivíduo nesse período possibilitando um maior apoio na busca pela autonomia.			
<b>REFERENCIA S</b>	Lane, S. T. M. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2006. Brasil. Estatuto da juventude: atos internacionais e normas correlatas. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas. 2013. CAMARANO, Ana Amélia et al. Caminhos para a Vida Adulta: As Múltiplas Trajetórias dos Jovens Brasileiro. Última década, Santiago, v. 12, n. 21, p. 11-50, 2004. Disponível em (#60) <a href="https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=scl_arttext(#38)pid=S0718-22362004000200002(#38)lng=es(#38)nrm=iso(#62)">https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=scl_arttext(#38)pid=S0718-22362004000200002(#38)lng=es(#38)nrm=iso(#62)</a> . Acesso em: 10/10/2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14293	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135911 - ANA JULIA SILVA DE FREITAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	A Juventude como um Período de Transição entre a Adolescência e a Vida Adulta: uma análise psicossocial			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O desenvolvimento humano é um processo ininterrupto e pode ser dividido em fases distintas, demarcadas por mudanças significativas nas dimensões biológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. Nas últimas décadas, o conceito de juventude adquiriu um novo significado, deixando de ser considerado exclusivamente um estilo de vida e se caracterizando por uma faixa etária específica, no Brasil, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude, abrangendo o final da adolescência e o início da vida adulta. O que permite levantar a seguinte questão: seria a juventude o processo transitório entre a adolescência e a vida adulta? A hipótese aqui levantada é de que as transformações sociais, econômicas e políticas fizeram com que a adolescência não fosse mais suficiente para preparar os sujeitos para a fase adulta, sendo necessária uma extensão desse período, a juventude.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar se a juventude pode ser reconhecida como um período transitório entre a adolescência e a vida adulta.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente trabalho adota uma abordagem metodológica baseada em uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando os seguintes descritores: juventude, adolescência, transição, adulto, identidade, fatores sociais.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O ingresso na vida adulta é marcado por diversos acontecimentos, como ingressar na faculdade, sair da casa dos pais, estabelecer relacionamentos românticos, assumir responsabilidades, gravidez e ingresso no mercado de trabalho, ainda que não tenha uma ordem a ser seguida, tais eventos costumam acontecer entre o final da adolescência até os anos iniciais da vida adulta, período etário que caracteriza a juventude. A exigência de uma maior qualificação para ingresso no mercado de trabalho, as transformações nos modelos familiares, o avanço nos direitos sexuais e reprodutivos têm interferido no processo de autonomia dos indivíduos. No contexto brasileiro, as desigualdades sociais influenciam de maneira significativa a vida dos jovens. A falta de oportunidades educacionais de qualidade e a distribuição desigual de renda afetam suas perspectivas de futuro. Muitos jovens de famílias de baixa renda são obrigados a assumir responsabilidades precocemente, contribuindo para o sustento da família desde cedo. Além disso, o alto índice de violência, de mortalidade, de adoecimento psíquico e o aumento dos casos de suicídio são fatores psicossociais que vulnerabilizam a juventude.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Embora a adolescência seja tradicionalmente reconhecida como a fase de transição entre a infância e a vida adulta, a pesquisa demonstrou que essa fase tem sido insuficiente para sanar as necessidades e garantir o preparo dos indivíduos para se tornarem adultos na sociedade contemporânea. Tendo isso em consideração, a juventude emerge como um período de transição mais abrangente, garantindo assim, a formulação de políticas públicas que considerem o estado de vulnerabilidade do indivíduo nesse período possibilitando um maior apoio na busca pela autonomia.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Lane, S. T. M. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2006. Brasil. Estatuto da juventude: atos internacionais e normas correlatas. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas. 2013. CAMARANO, Ana Amélia et al. Caminhos para a Vida Adulta: As Múltiplas Trajetórias dos Jovens Brasileiro. Última década, Santiago, v. 12, n. 21, p. 11-50, 2004. Disponível em (#60)<a href="https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0718-22362004000200002(#38)lng=es(#38)nrm=iso(#62)">https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0718-22362004000200002(#38)lng=es(#38)nrm=iso(#62)</a>. Acesso em: 10/10/2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14295	Educação	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442491 - NATHIELY KATRINE COSTA BRITO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Gonçalves de Almeida	Olga Maria Lodi Rizzini	
<b>TITULO</b>	RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: O IMPACTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM HISTÓRIA E GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A formação de professores em História e Geografia para os anos iniciais do Ensino Fundamental é importante para a formação das crianças. Portanto, esta pesquisa busca compreender como essa formação impacta no ensino. A metodologia inclui pesquisa bibliográfica, documental e observação. Espera-se que o estudo forneça subsídios para aprimorar a formação de professores em história e geografia para os anos iniciais do Ensino Fundamental.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar quais os impactos na formação de professores no ensino de disciplinas de história e geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram realizadas pesquisa bibliográfica, documental e de campo com observação.			
<b>RESULTADOS</b>	<p><b>RESULTADO E DISCUSSÃO:</b> Foi possível identificar movimentos de transformação constante no cenário da formação de professores em História e Geografia para os anos iniciais do ensino fundamental. Quando o Estado declarou preocupação com a formação de professores, sobretudo nas décadas de 30 e 40, a organização não foi capaz de atender plenamente às necessidades de formação. História e Geografia seguiram um percurso marcado pela memorização de fatos e exercícios mecânicos, sem promoverem reflexão crítica ou compreensão profunda de acontecimentos. Além disso, a formação ocorria de maneira desarticulada com outros componentes curriculares. Na década de 60, esses componentes foram fundidos, dando origem aos "Estudos Sociais". Contudo, a formação dos professores continuou a enfrentar grandes limitações na evolução legal, que ora enfatizavam a necessidade de uma formação abrangente do docente, mas, na prática, não eram inovadoras; ora a autonomia do professor foi cerceada devido a interesses políticos. (SAVIANI, 2009) Atualmente, as práticas educacionais são regulamentadas pelas diretrizes educacionais vigentes, com evolução para uma formação mais integral e contextualizada, incentivando a formação continuada e práticas educativas condizentes com as demandas contemporâneas. As observações de campo forneceram uma visão prática. Buscou-se uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pelos docentes. As observações destacam que há sobreposição dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática sobre os demais componentes no cotidiano escolar. As limitações na flexibilidade das metodologias de ensino interdisciplinares ou que englobem História e Geografia são questões persistentes.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Verifica-se que há desafios para o ensino de História e Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Há preocupação dos educadores em abordar todos os componentes curriculares. Entretanto, na prática, essa preocupação não se evidencia. A ênfase em Língua Portuguesa e Matemática parece exercer pressão para os professores priorizá-las. A flexibilidade nas metodologias de ensino tem sido limitada. Durante o segundo semestre, algumas mudanças começaram a ocorrer. Essas mudanças trazem o potencial de oferecer oportunidades para os professores enfrentarem os desafios em constante evolução da educação.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BRASIL. Resolução CNE/CP No 2, de 20 de dezembro de 2019 - Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. MEC, Brasília, 2019. SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, Campinas, v.14, n.40, pp.143-155, mai/2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14297	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
			<b>Autor</b>	<b>Status</b>
			3400328 - KEVIN ANDREAS CRESCENCIO HELLER	2 - Aprovado
			<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>
			Natali Maia Marques	0 - Comunicação Oral
			<b>Orientador Externo</b>	
<b>TITULO</b>	As relações parentais para o desenvolvimento de uma pessoa antissocial			
<b>INTRODUCAO</b>	O vínculo entre pais e filhos é uma das relações mais fundamentais e impactantes na vida de uma criança. A qualidade dessa relação desempenha um papel crítico no desenvolvimento psíquico e emocional do filho. No entanto, como abordado por Nardi, Hauck e Dell'Aglio (2016), essa influência pode se tornar ainda mais significativa quando analisada em relação ao desenvolvimento de transtornos de personalidade antissocial. Este trabalho propõe uma análise aprofundada dessa conexão intrincada, buscando entender até que ponto a relação entre pais e filhos pode contribuir para a formação de um transtorno de personalidade antissocial. De acordo com os estudos de John Bowlby com jovens delinquentes institucionalizados, é possível delinear a fissura do relacionamento parental com o bebê que virá a ser uma psicopatologia futura, enfatizando a importância dos efeitos negativos da privação dos cuidados (Guedeney, 2004).			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho revisa artigos e pesquisas com o objetivo de atualizar o conhecimento levantado em relação a parentalidade e a relação dela com uma pessoa antissocial, os agravantes e formas para se melhorar essas relações.			
<b>METODOLOGIA</b>	O trabalho utilizou a revisão bibliográfica narrativa, dos últimos 10 anos, para traçar a relação parental com a pessoa antissocial, ou seja, procura mostrar como a qualidade das relações dos pais podem acarretar a uma criança com transtornos de conduta podendo evoluir para um Transtorno de personalidade antissocial (TPAS). E para ilustração, utilizamos o filme "Precisamos Falar sobre Kevin". Ao explorar detalhes das cenas e comportamentos do protagonista, Kevin, fornecemos exemplos concretos que evidenciam como a dinâmica parental pode impactar o desenvolvimento de uma personalidade antissocial.			
<b>RESULTADOS</b>	Destacamos as principais discussões até o momento: a questão da qualidade do relacionamento pai/filho e crítica na prevenção ou desencadeamento de transtornos de personalidade antissocial; A ausência de vínculo seguro e afetivo na infância pode contribuir para comportamentos antissociais; A privação de cuidados parentais na primeira infância pode estar ligada ao desenvolvimento de psicopatologias; O filme "Precisamos Falar sobre Kevin" exemplifica como a dinâmica familiar pode influenciar o comportamento da criança.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em síntese, observamos a importância crítica da parentalidade no contexto do desenvolvimento de transtornos de personalidade antissocial. A qualidade das interações entre pais e filhos, juntamente com a presença emocional dos pais, emerge como fatores-chave na prevenção desses transtornos. Além disso, destacamos que intervenções precoces e estratégias de apoio à parentalidade desempenham um papel vital na interrupção do ciclo de desenvolvimento dessas psicopatologias. Essas conclusões reforçam a necessidade contínua de pesquisa e intervenção na área da parentalidade e desenvolvimento infantil, com o objetivo de criar um ambiente saudável e afetivo para as futuras gerações e reduzir a incidência de transtornos de personalidade antissocial.			
<b>REFERENCIAS</b>	American Psychiatric Association (APA). DSM-5. Artmed Editora 2014. Guedeney, A. A Teoria Da Vinculação: A História E As Personagens. In Guedeney N, Guedeney A. (Eds.), Lisboa: Climepsi 2004. Nardi FL, Hauck FN, Dell'Aglio DD. Preditores do Comportamento Antissocial em Adolescentes. Psicologia: Teoria E Pesquisa 2016; 32(1), 63–70.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14297	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3758451 - ITALO CAMELO CUNHA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Natali Maia Marques		
<b>TITULO</b>	As relações parentais para o desenvolvimento de uma pessoa antissocial			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O vínculo entre pais e filhos é uma das relações mais fundamentais e impactantes na vida de uma criança. A qualidade dessa relação desempenha um papel crítico no desenvolvimento psíquico e emocional do filho. No entanto, como abordado por Nardi, Hauck e Dell'Aglio (2016), essa influência pode se tornar ainda mais significativa quando analisada em relação ao desenvolvimento de transtornos de personalidade antissocial. Este trabalho propõe uma análise aprofundada dessa conexão intrincada, buscando entender até que ponto a relação entre pais e filhos pode contribuir para a formação de um transtorno de personalidade antissocial. De acordo com os estudos de John Bowlby com jovens delinquentes institucionalizados, é possível delinear a fissura do relacionamento parental com o bebê que virá a ser uma psicopatologia futura, enfatizando a importância dos efeitos negativos da privação dos cuidados (Guedeney, 2004).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho revisa artigos e pesquisas com o objetivo de atualizar o conhecimento levantado em relação a parentalidade e a relação dela com uma pessoa antissocial, os agravantes e formas para se melhorar essas relações.			
<b>METODOLOGIA</b>	O trabalho utilizou a revisão bibliográfica narrativa, dos últimos 10 anos, para traçar a relação parental com a pessoa antissocial, ou seja, procura mostrar como a qualidade das relações dos pais podem acarretar a uma criança com transtornos de conduta podendo evoluir para um Transtorno de personalidade antissocial (TPAS). E para ilustração, utilizamos o filme "Precisamos Falar sobre Kevin". Ao explorar detalhes das cenas e comportamentos do protagonista, Kevin, fornecemos exemplos concretos que evidenciam como a dinâmica parental pode impactar o desenvolvimento de uma personalidade antissocial.			
<b>RESULTADOS</b>	Destacamos as principais discussões até o momento: a questão da qualidade do relacionamento pai/filho e crítica na prevenção ou desencadeamento de transtornos de personalidade antissocial; A ausência de vínculo seguro e afetivo na infância pode contribuir para comportamentos antissociais; A privação de cuidados parentais na primeira infância pode estar ligada ao desenvolvimento de psicopatologias; O filme "Precisamos Falar sobre Kevin" exemplifica como a dinâmica familiar pode influenciar o comportamento da criança.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em síntese, observamos a importância crítica da parentalidade no contexto do desenvolvimento de transtornos de personalidade antissocial. A qualidade das interações entre pais e filhos, juntamente com a presença emocional dos pais, emerge como fatores-chave na prevenção desses transtornos. Além disso, destacamos que intervenções precoces e estratégias de apoio à parentalidade desempenham um papel vital na interrupção do ciclo de desenvolvimento dessas psicopatologias. Essas conclusões reforçam a necessidade contínua de pesquisa e intervenção na área da parentalidade e desenvolvimento infantil, com o objetivo de criar um ambiente saudável e afetivo para as futuras gerações e reduzir a incidência de transtornos de personalidade antissocial.			
<b>REFERENCIAS</b>	American Psychiatric Association (APA). DSM-5. Artmed Editora 2014. Guedeney, A. A Teoria Da Vinculação: A História E As Personagens. In Guedeney N, Guedeney A. (Eds.), Lisboa: Climepsi 2004. Nardi FL, Hauck FN, Dell'Aglio DD. Preditores do Comportamento Antissocial em Adolescentes. Psicologia: Teoria E Pesquisa 2016; 32(1), 63–70.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14298	Clínica Odontológica	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3863867 - LUCIANO NASCIMENTO BRAGA MIZIARA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiana Martins e Martins de Oliveira		PAULO BRAZ-SILVA
<b>TITULO</b>	Perfil de citocinas inflamatórias em pacientes transplantados renais			
<b>INTRODUCAO</b>	O transplante (Tx) renal é o tratamento de escolha para falência renal. Citocinas podem sugerir informações sobre condições bucais e doenças sistêmicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparar o perfil de citocinas do soro e saliva dos pacientes pós Tx renal em imunossupressão em dois tempos, comparando a dados clínicos gerais e orais.			
<b>METODOLOGIA</b>	As amostras foram analisadas pelo sistema Luminex® xMAP, quantificando as citocinas: IL-6, IFN gama, IL-10, IL-8, IL-4 e TNF-alfa. Os testes não-paramétricos de Wilcoxon e exato de Fisher foram usados, nível de significância de 0,05 (confiança de 95%).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram incluídos 48 pacientes, mulheres 25 (52,1%) e homens 23 (47,9%). As alterações clínicas mais observadas foram a viremia para citomegalovírus (CMV) 27 (61,4%), anemia 18 (48,6%), hiperglicemia 11 (24,4%). Entre as alterações orais mais frequentes destacamos a gengivite 22 (53,7%), xerostomia 17 (39,5%) e estomatite 10 (20,8%). Em relação ao perfil de citocinas, foram significativas as seguintes relações; dosagem menor da IL-6 (saliva): CMV positivo e maior para gengivite. IL-6 (soro): xerostomia com média maior e gengivite; IL-8 (saliva): média maior para xerostomia, saburra e gengivite. IL-10 (saliva): diarreia e saburra com média menor e IL-4 (soro) dosagens com médias maiores naqueles que exibiram candidíase oral. As médias dos valores das citocinas oscilaram entre os dois tempos das coletas, porém estas não foram significativas.			
<b>CONCLUSOES</b>	O perfil de citocinas pode ser um parâmetro confiável para o seguimento clínico de pacientes transplantados renais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Romagnani P, Remuzzi G, Glasscock R, Levin A, Jager KJ, Tonelli M, et al. Chronic kidney disease. Nat Rev Dis Primer. 21 de dezembro de 2017;3(1):17088. 2. Neyra JA, Chawla LS. Acute Kidney Disease to Chronic Kidney Disease. Crit Care Clin. abril de 2021;37(2):453-74. 3. Martins F, de Oliveira MA, Wang Q, Sonis S, Gallottini M, George S, Treister N. A review of oral toxicity associated with mTOR inhibitor therapy in cancer patients. Oral Oncol. 2013 Apr;49(4):293-8.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14299	Clínica Odontológica	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3863867 - LUCIANO NASCIMENTO BRAGA MIZIARA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiana Martins e Martins de Oliveira		PAULO BRAZ-SILVA
<b>TITULO</b>	Análise de citocinas inflamatórias em pacientes transplantados renais			
<b>INTRODUCAO</b>	O transplante (Tx) renal é o tratamento de escolha para falência renal. Citocinas podem sugerir informações sobre condições bucais e doenças sistêmicas			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparar o perfil de citocinas do soro e saliva dos pacientes pós Tx renal em imunossupressão em dois tempos, comparando a dados clínicos gerais e orais.			
<b>METODOLOGIA</b>	As amostras de saliva e sangue foram obtidas em pacientes transplantados renais e foram analisadas pela plataforma multiplex Luminex® xMAP, quantificando as citocinas: IL-6, IFN gama, IL-10, IL-8, IL-4 e TNF-alfa. Os testes não-paramétricos de Wilcoxon e exato de Fisher foram usados, nível de significância de 0,05 (confiança de 95%).			
<b>RESULTADO S</b>	Foram incluídos 48 pacientes, mulheres 25 (52,1%) e homens 23 (47,9%). As alterações clínicas mais observadas foram a viremia para citomegalovirus (CMV) 27 (61,4%), anemia 18 (48,6%), hiperglicemia 11 (24,4%). Entre as alterações orais mais frequentes destacamos a gengivite 22 (53,7%), xerostomia 17 (39,5%) e estomatite 10 (20,8%). Em relação ao perfil de citocinas, foram significativas as seguintes relações; dosagem menor da IL-6 (saliva): CMV positivo e maior para gengivite. IL-6 (soro): xerostomia com média maior e gengivite; IL-8 (saliva): média maior para xerostomia, saburra e gengivite. IL-10 (saliva): diarreia e saburra com média menor e IL-4 (soro) dosagens com médias maiores naqueles que exibiram candidíase oral.			
<b>CONCLUSOES</b>	As médias dos valores das citocinas oscilaram entre os dois tempos das coletas, porém estas não foram significativas. O perfil de citocinas pode ser um parâmetro confiável para o seguimento clínico de pacientes transplantados renais.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Romagnani P, Remuzzi G, Glasscock R, Levin A, Jager KJ, Tonelli M, et al. Chronic kidney disease. Nat Rev Dis Primer. 21 de dezembro de 2017;3(1):17088. 2. Neyra JA, Chawla LS. Acute Kidney Disease to Chronic Kidney Disease. Crit Care Clin. abril de 2021;37(2):453-74. 3. Martins F, de Oliveira MA, Wang Q, Sonis S, Gallottini M, George S, Treister N. A review of oral toxicity associated with mTOR inhibitor therapy in cancer patients. Oral Oncol. 2013 Apr;49(4):293-8.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14300	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135938 - LARISSA GOMES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	Efeitos Psicológicos Grupais e Individuais da Cultura do Cancelamento: uma análise do documentário "15 Minutes Of Shame"			
<b>INTRODUCAO</b>	O presente trabalho discute a ascensão da cultura do cancelamento desde 2014, caracterizada por intolerância e confrontos nas redes sociais. Este estudo aborda a falta de pesquisa aprofundada na área da Psicologia sobre este fenômeno e busca compreender seus possíveis impactos sociais e individuais. Observa-se uma tendência crescente em direção a uma sociedade menos empática e compreensiva, com sérios impactos financeiros, sociais e psicológicos para os indivíduos afetados pelo cancelamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar quais são os possíveis efeitos psicológicos da cultura do cancelamento a nível grupal e individual, a partir dos depoimentos apresentados no documentário "15 Minutes of Shame".			
<b>METODOLOGIA</b>	Este trabalho adotou uma abordagem qualitativa com caráter exploratório e utilizou a investigação documental como procedimento de coleta de dados.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi realizada uma análise do documentário de modo a investigar quais são os possíveis efeitos psicológicos da "cultura do cancelamento", através da observação de entrevistas apresentadas pelo documentário, foi possível observar as vivências individuais de pessoas que sofreram e foram afetadas pelo cancelamento em massa através de redes sociais. Identificou-se que os efeitos dos episódios de cancelamento saíram da esfera virtual e causaram impactos significativos na vida das pessoas acusadas, causando perda de empregos, relações sociais, perda de respeito pelos outros, até mesmo o recebimento de ameaças diretas contra si e seus familiares. Além disso, através de pesquisas com especialistas das áreas da Psicologia, é possível identificar que pessoas que sofrem episódios de cancelamento estão sujeitas a um grande sofrimento psíquico que pode levar ao desenvolvimento e/ou agravamento de transtornos psicológicos. Portanto, uma análise apenas dos efeitos do cancelamento para o indivíduo mostrou-se incapaz de explicar a complexidade da "cultura do cancelamento", exigindo também uma análise dos efeitos e motivações grupais, que foram analisados através dos conceitos de Schadenfreude(Watt Smith) e de níveis de conhecimento (Baruch Espinoza).			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível identificar que a "cultura do cancelamento" produz efeitos psicológicos individuais e grupais na sociedade em que ela é praticada. Dentre os efeitos individuais, identificou-se que há uma relação direta entre o cancelamento e o sofrimento psicológico, podendo se expandir para transtornos psicológicos como ansiedade, pânico e depressão, conforme demonstrado no documentário, onde os entrevistados desenvolveram ou agravaram transtornos mentais já existentes. A respeito dos efeitos grupais, identificou-se que essa cultura pode levar à superestimação de opiniões e habilidades por pessoas com conhecimento limitado, bem como à sensação de prazer ao testemunhar o infortúnio de outros, levando a sociedade a um pensamento com influência de vieses políticos e ações baseadas em moralidade para justificar o cancelamento e o mal que causam ao outro.			
<b>REFERENCIAS</b>	ESPINOSA, Baruch (1677). Ética. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. JOSEPH. Max. (Diretor). 15 Minutes of Shame. [documentário] .HBO, 2021. SMITH, T. W. Schadenfreude. Profile Books, 2018			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14300	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135946 - LIVIA GONZAGA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	Efeitos Psicológicos Grupais e Individuais da Cultura do Cancelamento: uma análise do documentário "15 Minutes Of Shame"			
<b>INTRODUCAO</b>	O presente trabalho discute a ascensão da cultura do cancelamento desde 2014, caracterizada por intolerância e confrontos nas redes sociais. Este estudo aborda a falta de pesquisa aprofundada na área da Psicologia sobre este fenômeno e busca compreender seus possíveis impactos sociais e individuais. Observa-se uma tendência crescente em direção a uma sociedade menos empática e compreensiva, com sérios impactos financeiros, sociais e psicológicos para os indivíduos afetados pelo cancelamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar quais são os possíveis efeitos psicológicos da cultura do cancelamento a nível grupal e individual, a partir dos depoimentos apresentados no documentário "15 Minutes of Shame".			
<b>METODOLOGIA</b>	Este trabalho adotou uma abordagem qualitativa com caráter exploratório e utilizou a investigação documental como procedimento de coleta de dados.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi realizada uma análise do documentário de modo a investigar quais são os possíveis efeitos psicológicos da "cultura do cancelamento", através da observação de entrevistas apresentadas pelo documentário, foi possível observar as vivências individuais de pessoas que sofreram e foram afetadas pelo cancelamento em massa através de redes sociais. Identificou-se que os efeitos dos episódios de cancelamento saíram da esfera virtual e causaram impactos significativos na vida das pessoas acusadas, causando perda de empregos, relações sociais, perda de respeito pelos outros, até mesmo o recebimento de ameaças diretas contra si e seus familiares. Além disso, através de pesquisas com especialistas das áreas da Psicologia, é possível identificar que pessoas que sofrem episódios de cancelamento estão sujeitas a um grande sofrimento psíquico que pode levar ao desenvolvimento e/ou agravamento de transtornos psicológicos. Portanto, uma análise apenas dos efeitos do cancelamento para o indivíduo mostrou-se incapaz de explicar a complexidade da "cultura do cancelamento", exigindo também uma análise dos efeitos e motivações grupais, que foram analisados através dos conceitos de Schadenfreude(Watt Smith) e de níveis de conhecimento (Baruch Espinoza).			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível identificar que a "cultura do cancelamento" produz efeitos psicológicos individuais e grupais na sociedade em que ela é praticada. Dentre os efeitos individuais, identificou-se que há uma relação direta entre o cancelamento e o sofrimento psicológico, podendo se expandir para transtornos psicológicos como ansiedade, pânico e depressão, conforme demonstrado no documentário, onde os entrevistados desenvolveram ou agravaram transtornos mentais já existentes. A respeito dos efeitos grupais, identificou-se que essa cultura pode levar à superestimação de opiniões e habilidades por pessoas com conhecimento limitado, bem como à sensação de prazer ao testemunhar o infortúnio de outros, levando a sociedade a um pensamento com influência de vieses políticos e ações baseadas em moralidade para justificar o cancelamento e o mal que causam ao outro.			
<b>REFERENCIAS</b>	ESPINOSA, Baruch (1677). Ética. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. JOSEPH. Max. (Diretor). 15 Minutes of Shame. [documentário] .HBO, 2021. SMITH, T. W. Schadenfreude. Profile Books, 2018			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14300	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4138678 - GABRIELA MESSIAS DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	Efeitos Psicológicos Grupais e Individuais da Cultura do Cancelamento: uma análise do documentário "15 Minutes Of Shame"			
<b>INTRODUCA O</b>	O presente trabalho discute a ascensão da cultura do cancelamento desde 2014, caracterizada por intolerância e confrontos nas redes sociais. Este estudo aborda a falta de pesquisa aprofundada na área da Psicologia sobre este fenômeno e busca compreender seus possíveis impactos sociais e individuais. Observa-se uma tendência crescente em direção a uma sociedade menos empática e compreensiva, com sérios impactos financeiros, sociais e psicológicos para os indivíduos afetados pelo cancelamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar quais são os possíveis efeitos psicológicos da cultura do cancelamento a nível grupal e individual, a partir dos depoimentos apresentados no documentário "15 Minutes of Shame".			
<b>METODOLOGIA</b>	Este trabalho adotou uma abordagem qualitativa com caráter exploratório e utilizou a investigação documental como procedimento de coleta de dados.			
<b>RESULTADO S</b>	Foi realizada uma análise do documentário de modo a investigar quais são os possíveis efeitos psicológicos da "cultura do cancelamento", através da observação de entrevistas apresentadas pelo documentário, foi possível observar as vivências individuais de pessoas que sofreram e foram afetadas pelo cancelamento em massa através de redes sociais. Identificou-se que os efeitos dos episódios de cancelamento saíram da esfera virtual e causaram impactos significativos na vida das pessoas acusadas, causando perda de empregos, relações sociais, perda de respeito pelos outros, até mesmo o recebimento de ameaças diretas contra si e seus familiares. Além disso, através de pesquisas com especialistas das áreas da Psicologia, é possível identificar que pessoas que sofrem episódios de cancelamento estão sujeitas a um grande sofrimento psíquico que pode levar ao desenvolvimento e/ou agravamento de transtornos psicológicos. Portanto, uma análise apenas dos efeitos do cancelamento para o indivíduo mostrou-se incapaz de explicar a complexidade da "cultura do cancelamento", exigindo também uma análise dos efeitos e motivações grupais, que foram analisados através dos conceitos de Schadenfreude(Watt Smith) e de níveis de conhecimento (Baruch Espinoza).			
<b>CONCLUSOE S</b>	Foi possível identificar que a "cultura do cancelamento" produz efeitos psicológicos individuais e grupais na sociedade em que ela é praticada. Dentre os efeitos individuais, identificou-se que há uma relação direta entre o cancelamento e o sofrimento psicológico, podendo se expandir para transtornos psicológicos como ansiedade, pânico e depressão, conforme demonstrado no documentário, onde os entrevistados desenvolveram ou agravaram transtornos mentais já existentes. A respeito dos efeitos grupais, identificou-se que essa cultura pode levar à superestimação de opiniões e habilidades por pessoas com conhecimento limitado, bem como à sensação de prazer ao testemunhar o infortúnio de outros, levando a sociedade a um pensamento com influência de vieses políticos e ações baseadas em moralidade para justificar o cancelamento e o mal que causam ao outro.			
<b>REFERENCIAS</b>	ESPINOSA, Baruch (1677). Ética. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. JOSEPH. Max. (Diretor). 15 Minutes of Shame. [documentário] .HBO, 2021. SMITH, T. W. Schadenfreude. Profile Books, 2018			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14301	Psicologia Experimental	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4041658 - SANDRA OLIVEIRA DE FREITAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	VOZES SILENCIADAS: REVELANDO OS DESAFIOS DAS MÃES DE CRIANÇAS AUTISTAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição médica que afeta o desenvolvimento e a funcionalidade das pessoas acometidas, de modo especial, nas interações sociais do indivíduo<sup>1</sup>. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com esse transtorno, sendo que, em crianças, é mais comum que o câncer, a Aids e o diabetes<sup>2</sup>. O diagnóstico em si é frequentemente um momento de choque e angústia, marcado por incertezas sobre o futuro. Diante disso, a maternidade envolvendo um filho com TEA tem se mostrado uma montanha-russa de emoções que pode interferir em sua adaptabilidade às necessidades complexas de seus filhos, frequentemente envolvendo terapias intensivas, intervenções educacionais e necessidade de rede de apoio contínuo<sup>3</sup>.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar os desafios enfrentados pelas mães de crianças com espectro autista compreendendo suas percepções, desafios, estratégias de enfrentamento e busca por uma rede de apoio.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada revisão da literatura por meio de buscas nas seguintes bases científicas: Scielo, Pepsic, Psicoinfo, Periódicos da UFSM e Periódicos da Usiminas sendo utilizado os seguintes descritores: autismo, maternidade e impacto emocional, separados e inter-relacionados.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram selecionados 8 artigos para compor esta pesquisa. Em que foi possível identificar que as mães apresentam sensação de desamparo, necessitam de apoio adaptado às necessidades únicas de suas crianças, que se sentem frequentemente influenciadas por uma sociedade que valoriza a perfeição, dessa forma, percebe-se um aumento no sentimento de inferioridade e inadequação. Há um acréscimo de sofrimento quando a condição desta mulher é de mãe-solteira, o que ressalta a relevância de intervenções sensíveis às realidades individuais das famílias e a importância de suporte para a redução do estresse materno. Além da rede apoio, destaca-se a influência da saúde mental das mães no desenvolvimento de seus filhos com autismo, reforçando a necessidade de abordar a saúde mental como parte integrante da intervenção, pois além das intervenções para os filhos, é necessário destacar que o bem-estar emocional das mães influencia diretamente em sua capacidade de cuidar e apoiar suas crianças. Portanto, abordar a saúde mental das mães e contribuir para um ambiente mais saudável e acolhedor, onde elas possam enfrentar os desafios com mais confiança e proporcionar maior suporte para seus filhos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que a necessidade de apoio emocional e prático para essas mães tem uma importância crucial no seu bem-estar emocional. Aponta-se que o desenvolvimento de políticas públicas e a adequação dos recursos podem melhorar a qualidade de vida das famílias afetadas pelo autismo.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. ONZI, F., (#38) Gomes, R. (2015). Transtorno do Espectro Autista: A importância do diagnóstico e reabilitação. Revista Caderno Pedagógico, 12(3). 2. SILVA, A. B. (2012). Mundo Singular – Entenda o Autismo, Rio de Janeiro, Fontanar. 3. RAPOPORT, A. (#38) Piccinini, C. A. (2006). Apoio social e experiência da maternidade. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 16(1), 85-96.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14301	Psicologia Experimental	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4062558 - LUANA FERNANDES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	VOZES SILENCIADAS: REVELANDO OS DESAFIOS DAS MÃES DE CRIANÇAS AUTISTAS			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição médica que afeta o desenvolvimento e a funcionalidade das pessoas acometidas, de modo especial, nas interações sociais do indivíduo<sup>1</sup>. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com esse transtorno, sendo que, em crianças, é mais comum que o câncer, a Aids e o diabetes<sup>2</sup>. O diagnóstico em si é frequentemente um momento de choque e angústia, marcado por incertezas sobre o futuro. Diante disso, a maternidade envolvendo um filho com TEA tem se mostrado uma montanha-russa de emoções que pode interferir em sua adaptabilidade às necessidades complexas de seus filhos, frequentemente envolvendo terapias intensivas, intervenções educacionais e necessidade de rede de apoio contínuo<sup>3</sup>.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar os desafios enfrentados pelas mães de crianças com espectro autista compreendendo suas percepções, desafios, estratégias de enfrentamento e busca por uma rede de apoio.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada revisão da literatura por meio de buscas nas seguintes bases científicas: Scielo, Pepsic, Psicoinfo, Periódicos da UFSM e Periódicos da Usiminas sendo utilizado os seguintes descritores: autismo, maternidade e impacto emocional, separados e inter-relacionados.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram selecionados 8 artigos para compor esta pesquisa. Em que foi possível identificar que as mães apresentam sensação de desamparo, necessitam de apoio adaptado às necessidades únicas de suas crianças, que se sentem frequentemente influenciadas por uma sociedade que valoriza a perfeição, dessa forma, percebe-se um aumento no sentimento de inferioridade e inadequação. Há um acréscimo de sofrimento quando a condição desta mulher é de mãe-solteira, o que ressalta a relevância de intervenções sensíveis às realidades individuais das famílias e a importância de suporte para a redução do estresse materno. Além da rede apoio, destaca-se a influência da saúde mental das mães no desenvolvimento de seus filhos com autismo, reforçando a necessidade de abordar a saúde mental como parte integrante da intervenção, pois além das intervenções para os filhos, é necessário destacar que o bem-estar emocional das mães influencia diretamente em sua capacidade de cuidar e apoiar suas crianças. Portanto, abordar a saúde mental das mães e contribuir para um ambiente mais saudável e acolhedor, onde elas possam enfrentar os desafios com mais confiança e proporcionar maior suporte para seus filhos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que a necessidade de apoio emocional e prático para essas mães tem uma importância crucial no seu bem-estar emocional. Aponta-se que o desenvolvimento de políticas públicas e a adequação dos recursos podem melhorar a qualidade de vida das famílias afetadas pelo autismo.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ONZI, F., (#38) Gomes, R. (2015). Transtorno do Espectro Autista: A importância do diagnóstico e reabilitação. Revista Caderno Pedagógico, 12(3). 2. SILVA, A. B. (2012). Mundo Singular – Entenda o Autismo, Fontanar. 3. RAPOPORT, A. (#38) Piccinini, C. A. (2006). Apoio social e experiência da maternidade. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 16(1), 85-96.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14301	Psicologia Experimental	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4077547 - JULIANA OLIVEIRA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	VOZES SILENCIADAS: REVELANDO OS DESAFIOS DAS MÃES DE CRIANÇAS AUTISTAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição médica que afeta o desenvolvimento e a funcionalidade das pessoas acometidas, de modo especial, nas interações sociais do indivíduo<sup>1</sup>. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com esse transtorno, sendo que, em crianças, é mais comum que o câncer, a Aids e o diabetes<sup>2</sup>. O diagnóstico em si é frequentemente um momento de choque e angústia, marcado por incertezas sobre o futuro. Diante disso, a maternidade envolvendo um filho com TEA tem se mostrado uma montanha-russa de emoções que pode interferir em sua adaptabilidade às necessidades complexas de seus filhos, frequentemente envolvendo terapias intensivas, intervenções educacionais e necessidade de rede de apoio contínuo<sup>3</sup>.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar os desafios enfrentados pelas mães de crianças com espectro autista compreendendo suas percepções, desafios, estratégias de enfrentamento e busca por uma rede de apoio.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada revisão da literatura por meio de buscas nas seguintes bases científicas: Scielo, Pepsic, Psicoinfo, Periódicos da UFSM e Periódicos da Usiminas sendo utilizado os seguintes descritores: autismo, maternidade e impacto emocional, separados e inter-relacionados.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram selecionados 8 artigos para compor esta pesquisa. Em que foi possível identificar que as mães apresentam sensação de desamparo, necessitam de apoio adaptado às necessidades únicas de suas crianças, que se sentem frequentemente influenciadas por uma sociedade que valoriza a perfeição, dessa forma, percebe-se um aumento no sentimento de inferioridade e inadequação. Há um acréscimo de sofrimento quando a condição desta mulher é de mãe-solteira, o que ressalta a relevância de intervenções sensíveis às realidades individuais das famílias e a importância de suporte para a redução do estresse materno. Além da rede apoio, destaca-se a influência da saúde mental das mães no desenvolvimento de seus filhos com autismo, reforçando a necessidade de abordar a saúde mental como parte integrante da intervenção, pois além das intervenções para os filhos, é necessário destacar que o bem-estar emocional das mães influencia diretamente em sua capacidade de cuidar e apoiar suas crianças. Portanto, abordar a saúde mental das mães e contribuir para um ambiente mais saudável e acolhedor, onde elas possam enfrentar os desafios com mais confiança e proporcionar maior suporte para seus filhos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que a necessidade de apoio emocional e prático para essas mães tem uma importância crucial no seu bem-estar emocional. Aponta-se que o desenvolvimento de políticas públicas e a adequação dos recursos podem melhorar a qualidade de vida das famílias afetadas pelo autismo.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. ONZI, F., (#38) Gomes, R. (2015). Transtorno do Espectro Autista: A importância do diagnóstico e reabilitação. Revista Caderno Pedagógico, 12(3). 2. SILVA, A. B. (2012). Mundo Singular – Entenda o Autismo, Rio de Janeiro, Fontanar. 3. RAPOPORT, A. (#38) Piccinini, C. A. (2006). Apoio social e experiência da maternidade. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 16(1), 85-96.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14301	Psicologia Experimental	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135865 - LARISSA DE JESUS FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	VOZES SILENCIADAS: REVELANDO OS DESAFIOS DAS MÃES DE CRIANÇAS AUTISTAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição médica que afeta o desenvolvimento e a funcionalidade das pessoas acometidas, de modo especial, nas interações sociais do indivíduo<sup>1</sup>. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com esse transtorno, sendo que, em crianças, é mais comum que o câncer, a Aids e o diabetes<sup>2</sup>. O diagnóstico em si é frequentemente um momento de choque e angústia, marcado por incertezas sobre o futuro. Diante disso, a maternidade envolvendo um filho com TEA tem se mostrado uma montanha-russa de emoções que pode interferir em sua adaptabilidade às necessidades complexas de seus filhos, frequentemente envolvendo terapias intensivas, intervenções educacionais e necessidade de rede de apoio contínuo<sup>3</sup>.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar os desafios enfrentados pelas mães de crianças com espectro autista compreendendo suas percepções, desafios, estratégias de enfrentamento e busca por uma rede de apoio.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada revisão da literatura por meio de buscas nas seguintes bases científicas: Scielo, Pepsic, Psicoinfo, Periódicos da UFSM e Periódicos da Usiminas sendo utilizado os seguintes descritores: autismo, maternidade e impacto emocional, separados e inter-relacionados.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram selecionados 8 artigos para compor esta pesquisa. Em que foi possível identificar que as mães apresentam sensação de desamparo, necessitam de apoio adaptado às necessidades únicas de suas crianças, que se sentem frequentemente influenciadas por uma sociedade que valoriza a perfeição, dessa forma, percebe-se um aumento no sentimento de inferioridade e inadequação. Há um acréscimo de sofrimento quando a condição desta mulher é de mãe-solteira, o que ressalta a relevância de intervenções sensíveis às realidades individuais das famílias e a importância de suporte para a redução do estresse materno. Além da rede apoio, destaca-se a influência da saúde mental das mães no desenvolvimento de seus filhos com autismo, reforçando a necessidade de abordar a saúde mental como parte integrante da intervenção, pois além das intervenções para os filhos, é necessário destacar que o bem-estar emocional das mães influencia diretamente em sua capacidade de cuidar e apoiar suas crianças. Portanto, abordar a saúde mental das mães e contribuir para um ambiente mais saudável e acolhedor, onde elas possam enfrentar os desafios com mais confiança e proporcionar maior suporte para seus filhos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que a necessidade de apoio emocional e prático para essas mães tem uma importância crucial no seu bem-estar emocional. Aponta-se que o desenvolvimento de políticas públicas e a adequação dos recursos podem melhorar a qualidade de vida das famílias afetadas pelo autismo.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. ONZI, F., (#38) Gomes, R. (2015). Transtorno do Espectro Autista: A importância do diagnóstico e reabilitação. Revista Caderno Pedagógico, 12(3). 2. SILVA, A. B. (2012). Mundo Singular – Entenda o Autismo, Rio de Janeiro, Fontanar. 3. RAPOPORT, A. (#38) Piccinini, C. A. (2006). Apoio social e experiência da maternidade. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 16(1), 85-96.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14302	Odontologia Social e Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382480 - ESTHER MACHADO PIUVEZAM	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Campanha de prevenção ao câncer labial para os trabalhadores ambulantes das praias de Guarujá: estudo observacional.			
<b>INTRODUCA O</b>	No Brasil, não há estatística sobre a incidência específica de câncer labial, porém, em cavidade oral no ano 2020 foram relatados 11.200 novos casos, representando 5,0% de todas neoplasias, exceto pele não melanoma em homens, e em mulheres 4.010 novos casos, representando 1,8% de todas neoplasias, exceto pele não melanoma. A radiação solar é responsável pela maior parte dos cânceres de lábio inferior, se o diagnóstico é tardio, o prognóstico é desfavorável, os tratamentos mutilantes, paliativos e dispendiosos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta campanha de prevenção teve como objetivo a informar e avaliar trabalhadores ambulantes das praias de Guarujá com relação a exposição solar e lesões labiais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram realizadas 3 oficinas de capacitação com os 20 avaliadores e instruções sobre a abordagem e calibração quanto a perguntas e repostas. Foram avaliados 182 ambulantes que receberam informações sobre os cuidados, sintomas e formas de prevenção solar, um folder explicativo foi desenvolvido pela equipe e foi distribuído. Exame bucal foi realizado avaliando lábios e mucosa perioral e dentro das necessidades de tratamento bucal foram encaminhados para tratamento.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados observados mostraram média de idade de 35,3 anos, 27,5% eram tabagistas e 20,3% etilistas. Apenas 11,5% utilizam protetor labial, 48,4% o protetor corporal e 72% usavam boné ou chapéu como proteção; alterações em mucosa labial foram observadas em 40,7% da população avaliada, onde 82,4% eram do gênero masculino e 83,3% apresentavam exposição direta aos raios UV durante o período de trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	É necessária uma maior atenção a essa população vulnerável sobre os efeitos da exposição solar, os cuidados de proteção não são realizados adequadamente pela grande maioria dos ambulantes.			
<b>REFERENCIA S</b>	Warnakulasuriya S. Clinical features and presentation of oral potentially malignant disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018 Jun;125(6):582-590. doi: 10.1016/j.oooo.2018.03.011. Epub 2018 Apr 4. PMID: 29673799. Cavalcante AS, Anbinder AL, Carvalho YR. Actinic cheilitis: clinical and histological features. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Mar;66(3):498-503. doi: 10.1016/j.joms.2006.09.016. PMID: 18280383. Piñera-Marques K, Lorenço SV, Silva LF, Sotto MN, Carneiro PC. Actinic lesions in fishermen's lower lip: clinical, cytopathological and histopathologic analysis. Clinics (Sao Paulo). 2010 Apr;65(4):363-7. doi: 10.1590/S1807-59322010000400003. PMID: 20454492; PMCID: PMC2862672.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14302	Odontologia Social e Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5123313 - TATIANA DE ALMEIDA BEZZI ELIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Campanha de prevenção ao câncer labial para os trabalhadores ambulantes das praias de Guarujá: estudo observacional.			
<b>INTRODUCA O</b>	No Brasil, não há estatística sobre a incidência específica de câncer labial, porém, em cavidade oral no ano 2020 foram relatados 11.200 novos casos, representando 5,0% de todas neoplasias, exceto pele não melanoma em homens, e em mulheres 4.010 novos casos, representando 1,8% de todas neoplasias, exceto pele não melanoma. A radiação solar é responsável pela maior parte dos cânceres de lábio inferior, se o diagnóstico é tardio, o prognóstico é desfavorável, os tratamentos mutilantes, paliativos e dispendiosos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta campanha de prevenção teve como objetivo a informar e avaliar trabalhadores ambulantes das praias de Guarujá com relação a exposição solar e lesões labiais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram realizadas 3 oficinas de capacitação com os 20 avaliadores e instruções sobre a abordagem e calibração quanto a perguntas e repostas. Foram avaliados 182 ambulantes que receberam informações sobre os cuidados, sintomas e formas de prevenção solar, um folder explicativo foi desenvolvido pela equipe e foi distribuído. Exame bucal foi realizado avaliando lábios e mucosa perioral e dentro das necessidades de tratamento bucal foram encaminhados para tratamento.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados observados mostraram média de idade de 35,3 anos, 27,5% eram tabagistas e 20,3% etilistas. Apenas 11,5% utilizam protetor labial, 48,4% o protetor corporal e 72% usavam boné ou chapéu como proteção; alterações em mucosa labial foram observadas em 40,7% da população avaliada, onde 82,4% eram do gênero masculino e 83,3% apresentavam exposição direta aos raios UV durante o período de trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	É necessária uma maior atenção a essa população vulnerável sobre os efeitos da exposição solar, os cuidados de proteção não são realizados adequadamente pela grande maioria dos ambulantes.			
<b>REFERENCIA S</b>	Warnakulasuriya S. Clinical features and presentation of oral potentially malignant disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018 Jun;125(6):582-590. doi: 10.1016/j.oooo.2018.03.011. Epub 2018 Apr 4. PMID: 29673799. Cavalcante AS, Anbinder AL, Carvalho YR. Actinic cheilitis: clinical and histological features. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Mar;66(3):498-503. doi: 10.1016/j.joms.2006.09.016. PMID: 18280383. Piñera-Marques K, Lorenço SV, Silva LF, Sotto MN, Carneiro PC. Actinic lesions in fishermen's lower lip: clinical, cytopathological and histopathologic analysis. Clinics (Sao Paulo). 2010 Apr;65(4):363-7. doi: 10.1590/S1807-59322010000400003. PMID: 20454492; PMCID: PMC2862672.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14302	Odontologia Social e Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124247 - ALVARO LUIZ MENDONCA PINHEIRO BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Campanha de prevenção ao câncer labial para os trabalhadores ambulantes das praias de Guarujá: estudo observacional.			
<b>INTRODUCA O</b>	No Brasil, não há estatística sobre a incidência específica de câncer labial, porém, em cavidade oral no ano 2020 foram relatados 11.200 novos casos, representando 5,0% de todas neoplasias, exceto pele não melanoma em homens, e em mulheres 4.010 novos casos, representando 1,8% de todas neoplasias, exceto pele não melanoma. A radiação solar é responsável pela maior parte dos cânceres de lábio inferior, se o diagnóstico é tardio, o prognóstico é desfavorável, os tratamentos mutilantes, paliativos e dispendiosos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta campanha de prevenção teve como objetivo a informar e avaliar trabalhadores ambulantes das praias de Guarujá com relação a exposição solar e lesões labiais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram realizadas 3 oficinas de capacitação com os 20 avaliadores e instruções sobre a abordagem e calibração quanto a perguntas e repostas. Foram avaliados 182 ambulantes que receberam informações sobre os cuidados, sintomas e formas de prevenção solar, um folder explicativo foi desenvolvido pela equipe e foi distribuído. Exame bucal foi realizado avaliando lábios e mucosa perioral e dentro das necessidades de tratamento bucal foram encaminhados para tratamento.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados observados mostraram média de idade de 35,3 anos, 27,5% eram tabagistas e 20,3% etilistas. Apenas 11,5% utilizam protetor labial, 48,4% o protetor corporal e 72% usavam boné ou chapéu como proteção; alterações em mucosa labial foram observadas em 40,7% da população avaliada, onde 82,4% eram do gênero masculino e 83,3% apresentavam exposição direta aos raios UV durante o período de trabalho.			
<b>CONCLUSOES</b>	É necessária uma maior atenção a essa população vulnerável sobre os efeitos da exposição solar, os cuidados de proteção não são realizados adequadamente pela grande maioria dos ambulantes.			
<b>REFERENCIA S</b>	Warnakulasuriya S. Clinical features and presentation of oral potentially malignant disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018 Jun;125(6):582-590. doi: 10.1016/j.oooo.2018.03.011. Epub 2018 Apr 4. PMID: 29673799. Cavalcante AS, Anbinder AL, Carvalho YR. Actinic cheilitis: clinical and histological features. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Mar;66(3):498-503. doi: 10.1016/j.joms.2006.09.016. PMID: 18280383. Piñera-Marques K, Lorenço SV, Silva LF, Sotto MN, Carneiro PC. Actinic lesions in fishermen's lower lip: clinical, cytopathological and histopathologic analysis. Clinics (Sao Paulo). 2010 Apr;65(4):363-7. doi: 10.1590/S1807-59322010000400003. PMID: 20454492; PMCID: PMC2862672.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14304	Odontologia Social e Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382480 - ESTHER MACHADO PIUVEZAM	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Condição labial de agricultores expostos a radiação solar: estudo transversal.			
<b>INTRODUCAO</b>	A exposição solar repetida e prolongada por muitas décadas pode resultar em mudanças na pele e desenvolvimento de lesões potencialmente malignas. Mesmo diante do enorme volume de dados e estudos sobre lesões de mucosa labial decorrentes da exposição solar, não está clara a patogênese dessas doenças. A prevenção do câncer de boca adquire relevância em saúde pública, particularmente se considerarmos que a abordagem preventiva é compatível com a natureza desta doença, pois a boca favorece o fácil acesso visual. Além disso, é possível esclarecer a população sobre a necessidade da eliminação dos fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer, bem como orientá-la sobre a importância da realização do auto-exame de boca periódico, já que o câncer nas fases iniciais não apresenta sintomas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo transversal foi avaliar os hábitos e a prevalência de lesões labiais em trabalhadores rurais de Vitória de Santo Antão/PE.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após ter acesso e assinar o TCLE, 80 participantes foram entrevistados, 50 homens e 30 mulheres, receberam instruções de prevenção e autodiagnóstico, responderam questionários de hábitos e cuidados de proteção solar e tiveram lábios avaliados por examinadores previamente treinados e calibrados. De acordo com as necessidades de tratamento os participantes foram encaminhados para a clínica da Faculdade ou para o centro de especialidades municipal.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram hábito de tabagismo em 16,25% e de etilismo em 40% da população avaliada, o uso de chapéu durante as atividades foi de 80%. O uso de protetor corporal foi informado por 31,25%, enquanto o protetor labial de 18,75%. A prevalência de lesões labiais foi de 43,75%, sendo mais prevalente nos homens 48% do que nas mulheres 36%			
<b>CONCLUSOES</b>	Na população avaliada os cuidados de proteção labial a radiação solar são poucos e a prevalência de lesões alta, campanhas de prevenção que busquem explicar e instruir a necessidade de proteção constante são fundamentais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. English DR, Armstrong BK, Kricger A, Fleming C. Sunlight and cancer. Cancer Causes Control. 1997;8(3):271-83. 2. Azurdia RM, Pagliaro JA, Diffey BL, Rhodes LE. Sunscreen application by photosensitive patients is inadequate for protection. Br J Dermatol. 1999;140(2):255-8. 3. Armstrong BK, Kricger A. The epidemiology of UV induced skin cancer. J Photochem Photobiol B. 2001;63(1-3):8-18. 4. Silva FD, Daniel FI, Grandó LJ, Calvo MC, Rath IBS, Fabro SML. Estudo da prevalência de alterações labiais em pescadores da Ilha de Santa Catarina. Rev Odonto Cienc. 2006;21(51):239-42. 5. Campisi G, Margiotta V. Oral mucosa lesions and risk habits among men in an Italian study population. J Oral Pathol Med. 2001;30(1):22-8.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14304	Odontologia Social e Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5123313 - TATIANA DE ALMEIDA BEZZI ELIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Condição labial de agricultores expostos a radiação solar: estudo transversal.			
<b>INTRODUCA O</b>	A exposição solar repetida e prolongada por muitas décadas pode resultar em mudanças na pele e desenvolvimento de lesões potencialmente malignas. Mesmo diante do enorme volume de dados e estudos sobre lesões de mucosa labial decorrentes da exposição solar, não está clara a patogênese dessas doenças. A prevenção do câncer de boca adquire relevância em saúde pública, particularmente se considerarmos que a abordagem preventiva é compatível com a natureza desta doença, pois a boca favorece o fácil acesso visual. Além disso, é possível esclarecer a população sobre a necessidade da eliminação dos fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer, bem como orientá-la sobre a importância da realização do auto-exame de boca periódico, já que o câncer nas fases iniciais não apresenta sintomas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo transversal foi avaliar os hábitos e a prevalência de lesões labiais em trabalhadores rurais de Vitória de Santo Antão/PE.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após ter acesso e assinar o TCLE, 80 participantes foram entrevistados, 50 homens e 30 mulheres, receberam instruções de prevenção e autodiagnóstico, responderam questionários de hábitos e cuidados de proteção solar e tiveram lábios avaliados por examinadores previamente treinados e calibrados. De acordo com as necessidades de tratamento os participantes foram encaminhados para a clínica da Faculdade ou para o centro de especialidades municipal.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados mostraram hábito de tabagismo em 16,25% e de etilismo em 40% da população avaliada, o uso de chapéu durante as atividades foi de 80%. O uso de protetor corporal foi informado por 31,25%, enquanto o protetor labial de 18,75%. A prevalência de lesões labiais foi de 43,75%, sendo mais prevalente nos homens 48% do que nas mulheres 36%			
<b>CONCLUSOES</b>	Na população avaliada os cuidados de proteção labial a radiação solar são poucos e a prevalência de lesões alta, campanhas de prevenção que busquem explicar e instruir a necessidade de proteção constante são fundamentais.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. English DR, Armstrong BK, Kricger A, Fleming C. Sunlight and cancer. Cancer Causes Control. 1997;8(3):271-83. 2. Azurdia RM, Pagliaro JA, Diffey BL, Rhodes LE. Sunscreen application by photosensitive patients is inadequate for protection. Br J Dermatol. 1999;140(2):255-8. 3. Armstrong BK, Kricger A. The epidemiology of UV induced skin cancer. J Photochem Photobiol B. 2001;63(1-3):8-18. 4. Silva FD, Daniel FI, Grandó LJ, Calvo MC, Rath IBS, Fabro SML. Estudo da prevalência de alterações labiais em pescadores da Ilha de Santa Catarina. Rev Odonto Cienc. 2006;21(51):239-42. 5. Campisi G, Margiotta V. Oral mucosa lesions and risk habits among men in an Italian study population. J Oral Pathol Med. 2001;30(1):22-8.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14304	Odontologia Social e Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124247 - ALVARO LUIZ MENDONCA PINHEIRO BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Condição labial de agricultores expostos a radiação solar: estudo transversal.			
<b>INTRODUCA O</b>	A exposição solar repetida e prolongada por muitas décadas pode resultar em mudanças na pele e desenvolvimento de lesões potencialmente malignas. Mesmo diante do enorme volume de dados e estudos sobre lesões de mucosa labial decorrentes da exposição solar, não está clara a patogênese dessas doenças. A prevenção do câncer de boca adquire relevância em saúde pública, particularmente se considerarmos que a abordagem preventiva é compatível com a natureza desta doença, pois a boca favorece o fácil acesso visual. Além disso, é possível esclarecer a população sobre a necessidade da eliminação dos fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer, bem como orientá-la sobre a importância da realização do auto-exame de boca periódico, já que o câncer nas fases iniciais não apresenta sintomas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo transversal foi avaliar os hábitos e a prevalência de lesões labiais em trabalhadores rurais de Vitória de Santo Antão/PE.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após ter acesso e assinar o TCLE, 80 participantes foram entrevistados, 50 homens e 30 mulheres, receberam instruções de prevenção e autodiagnóstico, responderam questionários de hábitos e cuidados de proteção solar e tiveram lábios avaliados por examinadores previamente treinados e calibrados. De acordo com as necessidades de tratamento os participantes foram encaminhados para a clínica da Faculdade ou para o centro de especialidades municipal.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados mostraram hábito de tabagismo em 16,25% e de etilismo em 40% da população avaliada, o uso de chapéu durante as atividades foi de 80%. O uso de protetor corporal foi informado por 31,25%, enquanto o protetor labial de 18,75%. A prevalência de lesões labiais foi de 43,75%, sendo mais prevalente nos homens 48% do que nas mulheres 36%			
<b>CONCLUSOES</b>	Na população avaliada os cuidados de proteção labial a radiação solar são poucos e a prevalência de lesões alta, campanhas de prevenção que busquem explicar e instruir a necessidade de proteção constante são fundamentais.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. English DR, Armstrong BK, Kricger A, Fleming C. Sunlight and cancer. Cancer Causes Control. 1997;8(3):271-83. 2. Azurdia RM, Pagliaro JA, Diffey BL, Rhodes LE. Sunscreen application by photosensitive patients is inadequate for protection. Br J Dermatol. 1999;140(2):255-8. 3. Armstrong BK, Kricger A. The epidemiology of UV induced skin cancer. J Photochem Photobiol B. 2001;63(1-3):8-18. 4. Silva FD, Daniel FI, Grandó LJ, Calvo MC, Rath IBS, Fabro SML. Estudo da prevalência de alterações labiais em pescadores da Ilha de Santa Catarina. Rev Odonto Cienc. 2006;21(51):239-42. 5. Campisi G, Margiotta V. Oral mucosa lesions and risk habits among men in an Italian study population. J Oral Pathol Med. 2001;30(1):22-8.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14304	Odontologia Social e Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124816 - REINALDO OLIVEIRA GUEDES JUNIOR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Condição labial de agricultores expostos a radiação solar: estudo transversal.			
<b>INTRODUCA O</b>	A exposição solar repetida e prolongada por muitas décadas pode resultar em mudanças na pele e desenvolvimento de lesões potencialmente malignas. Mesmo diante do enorme volume de dados e estudos sobre lesões de mucosa labial decorrentes da exposição solar, não está clara a patogênese dessas doenças. A prevenção do câncer de boca adquire relevância em saúde pública, particularmente se considerarmos que a abordagem preventiva é compatível com a natureza desta doença, pois a boca favorece o fácil acesso visual. Além disso, é possível esclarecer a população sobre a necessidade da eliminação dos fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer, bem como orientá-la sobre a importância da realização do auto-exame de boca periódico, já que o câncer nas fases iniciais não apresenta sintomas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente estudo transversal foi avaliar os hábitos e a prevalência de lesões labiais em trabalhadores rurais de Vitória de Santo Antão/PE.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após ter acesso e assinar o TCLE, 80 participantes foram entrevistados, 50 homens e 30 mulheres, receberam instruções de prevenção e autodiagnóstico, responderam questionários de hábitos e cuidados de proteção solar e tiveram lábios avaliados por examinadores previamente treinados e calibrados. De acordo com as necessidades de tratamento os participantes foram encaminhados para a clínica da Faculdade ou para o centro de especialidades municipal.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados mostraram hábito de tabagismo em 16,25% e de etilismo em 40% da população avaliada, o uso de chapéu durante as atividades foi de 80%. O uso de protetor corporal foi informado por 31,25%, enquanto o protetor labial de 18,75%. A prevalência de lesões labiais foi de 43,75%, sendo mais prevalente nos homens 48% do que nas mulheres 36%			
<b>CONCLUSOES</b>	Na população avaliada os cuidados de proteção labial a radiação solar são poucos e a prevalência de lesões alta, campanhas de prevenção que busquem explicar e instruir a necessidade de proteção constante são fundamentais.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. English DR, Armstrong BK, Kricger A, Fleming C. Sunlight and cancer. Cancer Causes Control. 1997;8(3):271-83. 2. Azurdia RM, Pagliaro JA, Diffey BL, Rhodes LE. Sunscreen application by photosensitive patients is inadequate for protection. Br J Dermatol. 1999;140(2):255-8. 3. Armstrong BK, Kricger A. The epidemiology of UV induced skin cancer. J Photochem Photobiol B. 2001;63(1-3):8-18. 4. Silva FD, Daniel FI, Grandó LJ, Calvo MC, Rath IBS, Fabro SML. Estudo da prevalência de alterações labiais em pescadores da Ilha de Santa Catarina. Rev Odonto Cienc. 2006;21(51):239-42. 5. Campisi G, Margiotta V. Oral mucosa lesions and risk habits among men in an Italian study population. J Oral Pathol Med. 2001;30(1):22-8.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14305	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382480 - ESTHER MACHADO PIUVEZAM	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Cirurgia ortognática em pacientes Classe III e repercussões nas vias aéreas superiores: estudo coorte retrospectivo			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As vias aéreas são estruturas anatómicas que permitem função respiratória, essencial à vida. De morfologia similar a um tubo circundado por parede fibromuscular que se estende da base do crânio até a borda da cartilagem cricóide, as vias aéreas se dividem em via aérea superior e inferior. As deformidades dentoalveolares comprometem não só a função mastigatória e estética dos pacientes, mas também podem levar à diminuição do espaço das vias aéreas e contribuir no desenvolvimento de distúrbios respiratórios do sono como a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Estabelecer uma relação adequada entre os efeitos nas vias aéreas de acordo com o movimento cirúrgico realizado na cirurgia ortognática é primordial para sucesso da terapêutica.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho retrospectivo tem como objetivo avaliar tridimensionalmente as alterações ocorridas na via aérea superior após a cirurgia ortognática bi maxilar em pacientes classe III de Angle.			
<b>METODOLOGIA</b>	A amostra foi proveniente da análise dos prontuários clínicos de pacientes submetidos à cirurgia entre os anos de 2019 e 2020. Entre os 32 prontuários analisados, 19 foram incluídos da pesquisa por preencherem os critérios de elegibilidade. Foram realizadas as mensurações de: volume total e área axial mínima da via aérea superior. Análise das tomografias computadorizadas (TC) de pacientes submetidos à cirurgia avaliados nos momentos pré-operatório (T1) e pós-operatório de até 30 dias (T2), por meio do software Dolphin Imaging®.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados individuais em T1 e T2 foram discrepantes entre os pacientes. Tanto para volume total como para área axial não foi observada diferença entre os tempos (p(#38)#8804;0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observamos uma diminuição significativa no pós-operatório da área de secção transversa da faringe ao nível da base da língua na cirurgia de recuo mandibular, mas nenhuma mudança significativa na cirurgia bi maxilar para correção da discrepância de Classe III.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. de Souza Carvalho AC, Magro Filho O, Garcia IR Jr, Araujo PM, Nogueira RL. Cephalometric and three-dimensional assessment of superior posterior airway space after maxillomandibular advancement. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012. 2. Achilleos S, Krogstad O, Lyberg T. Surgical mandibular advancement and changes in uvuloglossopharyngeal morphology and head posture: a short- and long-term cephalometric study in males. Eur J Orthod. 2000. 3. Yamashita AL, Iwaki Filho L, Leite PCC, Navarro R de L, Ramos AL, Previdelli ITS, et al. Three-dimensional analysis of the pharyngeal airway space and hyoid bone position after orthognathic surgery. J Cranio-Maxillofacial Surg 2017. 4. Degerliyurt K, Ueki K, Hashiba Y, Marukawa K, Simsek B, Okabe K, et al. The effect of mandibular setback or two-jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. Int J Oral Maxillofac Surg [Internet]. 2009. 5. Anderson, T.W. and Darling, D.A., A Test of Goodness-of-Fit. Journal of the American Statistical Association 49: 765–769, 1954. Barrera JE, Powell NB, Riley RW. Facial skeletal surgery in the management of obstructive sleep apnea syndrome. Clin Plast Surg. 2007 .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14305	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888383 - ANGELA CRISTINA DE JESUS PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Cirurgia ortognática em pacientes Classe III e repercussões nas vias aéreas superiores: estudo coorte retrospectivo			
<b>INTRODUCAO</b>	As vias aéreas são estruturas anatómicas que permitem função respiratória, essencial à vida. De morfologia similar a um tubo circundado por parede fibromuscular que se estende da base do crânio até a borda da cartilagem cricóide, as vias aéreas se dividem em via aérea superior e inferior. As deformidades dentoalveolares comprometem não só a função mastigatória e estética dos pacientes, mas também podem levar à diminuição do espaço das vias aéreas e contribuir no desenvolvimento de distúrbios respiratórios do sono como a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Estabelecer uma relação adequada entre os efeitos nas vias aéreas de acordo com o movimento cirúrgico realizado na cirurgia ortognática é primordial para sucesso da terapêutica.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho retrospectivo tem como objetivo avaliar tridimensionalmente as alterações ocorridas na via aérea superior após a cirurgia ortognática bi maxilar em pacientes classe III de Angle.			
<b>METODOLOGIA</b>	A amostra foi proveniente da análise dos prontuários clínicos de pacientes submetidos à cirurgia entre os anos de 2019 e 2020. Entre os 32 prontuários analisados, 19 foram incluídos da pesquisa por preencherem os critérios de elegibilidade. Foram realizadas as mensurações de: volume total e área axial mínima da via aérea superior. Análise das tomografias computadorizadas (TC) de pacientes submetidos à cirurgia avaliados nos momentos pré-operatório (T1) e pós-operatório de até 30 dias (T2), por meio do software Dolphin Imaging®.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados individuais em T1 e T2 foram discrepantes entre os pacientes. Tanto para volume total como para área axial não foi observada diferença entre os tempos (p(#38)#8804;0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observamos uma diminuição significativa no pós-operatório da área de secção transversa da faringe ao nível da base da língua na cirurgia de recuo mandibular, mas nenhuma mudança significativa na cirurgia bi maxilar para correção da discrepância de Classe III.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. de Souza Carvalho AC, Magro Filho O, Garcia IR Jr, Araujo PM, Nogueira RL. Cephalometric and three-dimensional assessment of superior posterior airway space after maxillomandibular advancement. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012. 2. Achilleos S, Krogstad O, Lyberg T. Surgical mandibular advancement and changes in uvuloglossopharyngeal morphology and head posture: a short- and long-term cephalometric study in males. Eur J Orthod. 2000. 3. Yamashita AL, Iwaki Filho L, Leite PCC, Navarro R de L, Ramos AL, Previdelli ITS, et al. Three-dimensional analysis of the pharyngeal airway space and hyoid bone position after orthognathic surgery. J Cranio-Maxillofac Surg 2017. 4. Degerliyurt K, Ueki K, Hashiba Y, Marukawa K, Simsek B, Okabe K, et al. The effect of mandibular setback or two-jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. Int J Oral Maxillofac Surg [Internet]. 2009. 5. Anderson, T.W. and Darling, D.A., A Test of Goodness-of-Fit. Journal of the American Statistical Association 49: 765–769, 1954. Barrera JE, Powell NB, Riley RW. Facial skeletal surgery in the management of obstructive sleep apnea syndrome. Clin Plast Surg. 2007 .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14305	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5123313 - TATIANA DE ALMEIDA BEZZI ELIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Cirurgia ortognática em pacientes Classe III e repercussões nas vias aéreas superiores: estudo coorte retrospectivo			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As vias aéreas são estruturas anatómicas que permitem função respiratória, essencial à vida. De morfologia similar a um tubo circundado por parede fibromuscular que se estende da base do crânio até a borda da cartilagem cricóide, as vias aéreas se dividem em via aérea superior e inferior. As deformidades dentoesqueléticas comprometem não só a função mastigatória e estética dos pacientes, mas também podem levar à diminuição do espaço das vias aéreas e contribuir no desenvolvimento de distúrbios respiratórios do sono como a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Estabelecer uma relação adequada entre os efeitos nas vias aéreas de acordo com o movimento cirúrgico realizado na cirurgia ortognática é primordial para sucesso da terapêutica.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho retrospectivo tem como objetivo avaliar tridimensionalmente as alterações ocorridas na via aérea superior após a cirurgia ortognática bi maxilar em pacientes classe III de Angle.			
<b>METODOLOGIA</b>	A amostra foi proveniente da análise dos prontuários clínicos de pacientes submetidos à cirurgia entre os anos de 2019 e 2020. Entre os 32 prontuários analisados, 19 foram incluídos da pesquisa por preencherem os critérios de elegibilidade. Foram realizadas as mensurações de: volume total e área axial mínima da via aérea superior. Análise das tomografias computadorizadas (TC) de pacientes submetidos à cirurgia avaliados nos momentos pré-operatório (T1) e pós-operatório de até 30 dias (T2), por meio do software Dolphin Imaging®.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados individuais em T1 e T2 foram discrepantes entre os pacientes. Tanto para volume total como para área axial não foi observada diferença entre os tempos (p(#38)#8804;0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observamos uma diminuição significativa no pós-operatório da área de secção transversa da faringe ao nível da base da língua na cirurgia de recuo mandibular, mas nenhuma mudança significativa na cirurgia bi maxilar para correção da discrepância de Classe III.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. de Souza Carvalho AC, Magro Filho O, Garcia IR Jr, Araujo PM, Nogueira RL. Cephalometric and three-dimensional assessment of superior posterior airway space after maxillomandibular advancement. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012. 2. Achilleos S, Krogstad O, Lyberg T. Surgical mandibular advancement and changes in uvuloglossopharyngeal morphology and head posture: a short- and long-term cephalometric study in males. Eur J Orthod. 2000. 3. Yamashita AL, Iwaki Filho L, Leite PCC, Navarro R de L, Ramos AL, Previdelli ITS, et al. Three-dimensional analysis of the pharyngeal airway space and hyoid bone position after orthognathic surgery. J Cranio-Maxillofacial Surg 2017. 4. Degerliyurt K, Ueki K, Hashiba Y, Marukawa K, Simsek B, Okabe K, et al. The effect of mandibular setback or two-jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. Int J Oral Maxillofac Surg [Internet]. 2009. 5. Anderson, T.W. and Darling, D.A., A Test of Goodness-of-Fit. Journal of the American Statistical Association 49: 765–769, 1954. Barrera JE, Powell NB, Riley RW. Facial skeletal surgery in the management of obstructive sleep apnea syndrome. Clin Plast Surg. 2007 .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14305	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124247 - ALVARO LUIZ MENDONCA PINHEIRO BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Cirurgia ortognática em pacientes Classe III e repercussões nas vias aéreas superiores: estudo coorte retrospectivo			
<b>INTRODUCAO</b>	As vias aéreas são estruturas anatómicas que permitem função respiratória, essencial à vida. De morfologia similar a um tubo circundado por parede fibromuscular que se estende da base do crânio até a borda da cartilagem cricóide, as vias aéreas se dividem em via aérea superior e inferior. As deformidades dentoalveolares comprometem não só a função mastigatória e estética dos pacientes, mas também podem levar à diminuição do espaço das vias aéreas e contribuir no desenvolvimento de distúrbios respiratórios do sono como a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Estabelecer uma relação adequada entre os efeitos nas vias aéreas de acordo com o movimento cirúrgico realizado na cirurgia ortognática é primordial para sucesso da terapêutica.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho retrospectivo tem como objetivo avaliar tridimensionalmente as alterações ocorridas na via aérea superior após a cirurgia ortognática bi maxilar em pacientes classe III de Angle.			
<b>METODOLOGIA</b>	A amostra foi proveniente da análise dos prontuários clínicos de pacientes submetidos à cirurgia entre os anos de 2019 e 2020. Entre os 32 prontuários analisados, 19 foram incluídos da pesquisa por preencherem os critérios de elegibilidade. Foram realizadas as mensurações de: volume total e área axial mínima da via aérea superior. Análise das tomografias computadorizadas (TC) de pacientes submetidos à cirurgia avaliados nos momentos pré-operatório (T1) e pós-operatório de até 30 dias (T2), por meio do software Dolphin Imaging®.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados individuais em T1 e T2 foram discrepantes entre os pacientes. Tanto para volume total como para área axial não foi observada diferença entre os tempos (p(#38)#8804;0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observamos uma diminuição significativa no pós-operatório da área de secção transversa da faringe ao nível da base da língua na cirurgia de recuo mandibular, mas nenhuma mudança significativa na cirurgia bi maxilar para correção da discrepância de Classe III.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. de Souza Carvalho AC, Magro Filho O, Garcia IR Jr, Araujo PM, Nogueira RL. Cephalometric and three-dimensional assessment of superior posterior airway space after maxillomandibular advancement. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012. 2. Achilleos S, Krogstad O, Lyberg T. Surgical mandibular advancement and changes in uvuloglossopharyngeal morphology and head posture: a short- and long-term cephalometric study in males. Eur J Orthod. 2000. 3. Yamashita AL, Iwaki Filho L, Leite PCC, Navarro R de L, Ramos AL, Previdelli ITS, et al. Three-dimensional analysis of the pharyngeal airway space and hyoid bone position after orthognathic surgery. J Cranio-Maxillofac Surg 2017. 4. Degerliyurt K, Ueki K, Hashiba Y, Marukawa K, Simsek B, Okabe K, et al. The effect of mandibular setback or two-jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. Int J Oral Maxillofac Surg [Internet]. 2009. 5. Anderson, T.W. and Darling, D.A., A Test of Goodness-of-Fit. Journal of the American Statistical Association 49: 765–769, 1954. Barrera JE, Powell NB, Riley RW. Facial skeletal surgery in the management of obstructive sleep apnea syndrome. Clin Plast Surg. 2007 .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14305	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124816 - REINALDO OLIVEIRA GUEDES JUNIOR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Caio Vinicius Goncalves Roman Torres		
<b>TITULO</b>	Cirurgia ortognática em pacientes Classe III e repercussões nas vias aéreas superiores: estudo coorte retrospectivo			
<b>INTRODUCAO</b>	As vias aéreas são estruturas anatómicas que permitem função respiratória, essencial à vida. De morfologia similar a um tubo circundado por parede fibromuscular que se estende da base do crânio até a borda da cartilagem cricóide, as vias aéreas se dividem em via aérea superior e inferior. As deformidades dentoesqueléticas comprometem não só a função mastigatória e estética dos pacientes, mas também podem levar à diminuição do espaço das vias aéreas e contribuir no desenvolvimento de distúrbios respiratórios do sono como a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Estabelecer uma relação adequada entre os efeitos nas vias aéreas de acordo com o movimento cirúrgico realizado na cirurgia ortognática é primordial para sucesso da terapêutica.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho retrospectivo tem como objetivo avaliar tridimensionalmente as alterações ocorridas na via aérea superior após a cirurgia ortognática bi maxilar em pacientes classe III de Angle.			
<b>METODOLOGIA</b>	A amostra foi proveniente da análise dos prontuários clínicos de pacientes submetidos à cirurgia entre os anos de 2019 e 2020. Entre os 32 prontuários analisados, 19 foram incluídos da pesquisa por preencherem os critérios de elegibilidade. Foram realizadas as mensurações de: volume total e área axial mínima da via aérea superior. Análise das tomografias computadorizadas (TC) de pacientes submetidos à cirurgia avaliados nos momentos pré-operatório (T1) e pós-operatório de até 30 dias (T2), por meio do software Dolphin Imaging®.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados individuais em T1 e T2 foram discrepantes entre os pacientes. Tanto para volume total como para área axial não foi observada diferença entre os tempos (p(#38)#8804;0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observamos uma diminuição significativa no pós-operatório da área de secção transversa da faringe ao nível da base da língua na cirurgia de recuo mandibular, mas nenhuma mudança significativa na cirurgia bi maxilar para correção da discrepância de Classe III.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. de Souza Carvalho AC, Magro Filho O, Garcia IR Jr, Araujo PM, Nogueira RL. Cephalometric and three-dimensional assessment of superior posterior airway space after maxillomandibular advancement. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012. 2. Achilleos S, Krogstad O, Lyberg T. Surgical mandibular advancement and changes in uvuloglossopharyngeal morphology and head posture: a short- and long-term cephalometric study in males. Eur J Orthod. 2000. 3. Yamashita AL, Iwaki Filho L, Leite PCC, Navarro R de L, Ramos AL, Previdelli ITS, et al. Three-dimensional analysis of the pharyngeal airway space and hyoid bone position after orthognathic surgery. J Cranio-Maxillofacial Surg 2017. 4. Degerliyurt K, Ueki K, Hashiba Y, Marukawa K, Simsek B, Okabe K, et al. The effect of mandibular setback or two-jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. Int J Oral Maxillofac Surg [Internet]. 2009. 5. Anderson, T.W. and Darling, D.A., A Test of Goodness-of-Fit. Journal of the American Statistical Association 49: 765–769, 1954. Barrera JE, Powell NB, Riley RW. Facial skeletal surgery in the management of obstructive sleep apnea syndrome. Clin Plast Surg. 2007 .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14308	Ciências Contábeis	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4311710 - MÔNICA APARECIDA DE SOUZA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO EM EMPRESAS DE VAREJO: UMA ANÁLISE COM O MÉTODO FLEURIET			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Gestão do capital de giro é um dos principais elementos da gestão empresarial, principalmente com os desafios trazidos pela crise financeira causada pela pandemia. A crescente complexidade dos negócios exige aplicação de técnicas e conceitos de finanças que viabilizem utilização mais competente dos recursos necessários às atividades organizacionais. (ASSAFNETO:LIMA,2011) Análise Dinâmica do Capital de Giro, ou Modelo Fleuriet, é uma metodologia destinada a avaliar os investimentos em capital de giro. Considera os aspectos dinâmicos, combinando aspectos quantitativos e qualitativos, ampliando possibilidades de análise. (NASCIMENTO,2014) Com a aplicação do Modelo Fleuriet, são obtidas as estruturas financeiras das empresas, que variam entre o nível 1 (excelente) ao nível 6 (arriscada). Essas estruturas evidenciam a qualidade da gestão do capital de giro.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar os resultados da aplicação do Modelo Fleuriet, às empresas de varejo selecionadas, antes e após a pandemia, identificando os impactos resultantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental, abordagem longitudinal. Corpus formado por dois grupos de dados das empresas Boticário, Americanas, Magazine Luiza, Pão de Açúcar e Raia Drogasil. 2014-2018: dados levantados, analisados e apresentados pelos autores do artigo inicial. 2019-2022: demonstrações contábeis obtidas no sítio da B3: Bolsa, Brasil, Balcão, a partir delas foram calculados os indicadores para aplicação do Modelo Fleuriet.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Aplicação do modelo apresentou estruturas financeiras das empresas de 2019 a 2022. Estruturas foram comparadas com os dados do artigo de 2020, de 2014 a 2018. Boticário: oscilação na estrutura financeira no 1º período, com tipo 3 (insatisfatória) em 2018. Durante a pandemia, passou da estrutura 1 (excelente) para 2 (sólida), retomando nível 1 em 2022. Lojas Americanas: chegou a 2018 com estrutura 1, com queda para 2 em 2020 e nível 3 em 2022. Magazine Luiza: única empresa com estabilidade em sua estrutura financeira, praticamente todo o período pré e pós pandemia no nível 2 (sólida). Pão de Açúcar: manteve estrutura tipo 2 durante todo 1º período, com queda para nível 6 (arriscada) em 2019 e 2020. Portanto, resultado não pode ser atribuído à pandemia, pois retomou nível 1 em 2021 e 2022. Raia Drogasil: manteve nível 2 até 2017, queda para nível 3 em 2018, mantendo esse nível durante e após o período da pandemia.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	Com exceção do Magazine Luiza, pouca consistência na gestão do capital de giro. Há oscilação nas estruturas financeiras das empresas, antes e após a pandemia. Pão de Açúcar, Raia Drogasil e Boticário apresentavam piora nessa estrutura antes da pandemia. Destaque para Lojas Americanas, estrutura financeira favorável até 2021, pode ser um indicativo dos problemas com as demonstrações contábeis, identificados e divulgados em 2023.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FLEURIET,Michel;KEHDY,Ricardo;BLANC,Georges. ModeloFleuriet Dinâmica financeira das empresas brasileiras:um método de análise, orçamento e planejamento financeiro. Rio de Janeiro:Elsevier, 2003. MARQUES,José; BRAGA,Roberto. Análise dinâmica do capital de giro:o modelo Fleuriet. RAEv.35,n.3,p. 49-63,1995. VALE,Rosilda; CRUZ,June; PICCOLI,Pedro Análise dinâmica do capital de giro aplicado ao varejo. Brazilian Journal of Development.v.6,n.9. Curitiba: 2020. p.73904-73916.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14308	Ciências Contábeis	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4337883 - ANA BEATRIZ MONTEIRO ROCHA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO EM EMPRESAS DE VAREJO: UMA ANÁLISE COM O MÉTODO FLEURIET			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Gestão do capital de giro é um dos principais elementos da gestão empresarial, principalmente com os desafios trazidos pela crise financeira causada pela pandemia. A crescente complexidade dos negócios exige aplicação de técnicas e conceitos de finanças que viabilizem utilização mais competente dos recursos necessários às atividades organizacionais. (ASSAFNETO:LIMA,2011) Análise Dinâmica do Capital de Giro, ou Modelo Fleuriet, é uma metodologia destinada a avaliar os investimentos em capital de giro. Considera os aspectos dinâmicos, combinando aspectos quantitativos e qualitativos, ampliando possibilidades de análise. (NASCIMENTO,2014) Com a aplicação do Modelo Fleuriet, são obtidas as estruturas financeiras das empresas, que variam entre o nível 1 (excelente) ao nível 6 (arriscada). Essas estruturas evidenciam a qualidade da gestão do capital de giro.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar os resultados da aplicação do Modelo Fleuriet, às empresas de varejo selecionadas, antes e após a pandemia, identificando os impactos resultantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental, abordagem longitudinal. Corpus formado por dois grupos de dados das empresas Boticário, Americanas, Magazine Luiza, Pão de Açúcar e Raia Drogasil. 2014-2018: dados levantados, analisados e apresentados pelos autores do artigo inicial. 2019-2022: demonstrações contábeis obtidas no sítio da B3: Bolsa, Brasil, Balcão, a partir delas foram calculados os indicadores para aplicação do Modelo Fleuriet.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Aplicação do modelo apresentou estruturas financeiras das empresas de 2019 a 2022. Estruturas foram comparadas com os dados do artigo de 2020, de 2014 a 2018. Boticário: oscilação na estrutura financeira no 1º período, com tipo 3 (insatisfatória) em 2018. Durante a pandemia, passou da estrutura 1 (excelente) para 2 (sólida), retomando nível 1 em 2022. Lojas Americanas: chegou a 2018 com estrutura 1, com queda para 2 em 2020 e nível 3 em 2022. Magazine Luiza: única empresa com estabilidade em sua estrutura financeira, praticamente todo o período pré e pós pandemia no nível 2 (sólida). Pão de Açúcar: manteve estrutura tipo 2 durante todo 1º período, com queda para nível 6 (arriscada) em 2019 e 2020. Portanto, resultado não pode ser atribuído à pandemia, pois retomou nível 1 em 2021 e 2022. Raia Drogasil: manteve nível 2 até 2017, queda para nível 3 em 2018, mantendo esse nível durante e após o período da pandemia.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	Com exceção do Magazine Luiza, pouca consistência na gestão do capital de giro. Há oscilação nas estruturas financeiras das empresas, antes e após a pandemia. Pão de Açúcar, Raia Drogasil e Boticário apresentavam piora nessa estrutura antes da pandemia. Destaque para Lojas Americanas, estrutura financeira favorável até 2021, pode ser um indicativo dos problemas com as demonstrações contábeis, identificados e divulgados em 2023.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>FLEURIET,Michel;KEHDY,Ricardo;BLANC,Georges. ModeloFleuriet Dinâmica financeira das empresas brasileiras:um método de análise, orçamento e planejamento financeiro. Rio de Janeiro:Elsevier, 2003. MARQUES,José; BRAGA,Roberto. Análise dinâmica do capital de giro:o modelo Fleuriet. RAEv.35,n.3,p. 49-63,1995. VALE,Rosilda; CRUZ,June; PICCOLI,Pedro Análise dinâmica do capital de giro aplicado ao varejo. Brazilian Journal of Development.v.6,n.9. Curitiba: 2020. p.73904-73916.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14308	Ciências Contábeis	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4413539 - GUSTAVO LOPES ROCHA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO EM EMPRESAS DE VAREJO: UMA ANÁLISE COM O MÉTODO FLEURIET			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Gestão do capital de giro é um dos principais elementos da gestão empresarial, principalmente com os desafios trazidos pela crise financeira causada pela pandemia. A crescente complexidade dos negócios exige aplicação de técnicas e conceitos de finanças que viabilizem utilização mais competente dos recursos necessários às atividades organizacionais. (ASSAFNETO:LIMA,2011) Análise Dinâmica do Capital de Giro, ou Modelo Fleuriet, é uma metodologia destinada a avaliar os investimentos em capital de giro. Considera os aspectos dinâmicos, combinando aspectos quantitativos e qualitativos, ampliando possibilidades de análise. (NASCIMENTO,2014) Com a aplicação do Modelo Fleuriet, são obtidas as estruturas financeiras das empresas, que variam entre o nível 1 (excelente) ao nível 6 (arriscada). Essas estruturas evidenciam a qualidade da gestão do capital de giro.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar os resultados da aplicação do Modelo Fleuriet, às empresas de varejo selecionadas, antes e após a pandemia, identificando os impactos resultantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental, abordagem longitudinal. Corpus formado por dois grupos de dados das empresas Boticário, Americanas, Magazine Luiza, Pão de Açúcar e Raia Drogasil. 2014-2018: dados levantados, analisados e apresentados pelos autores do artigo inicial. 2019-2022: demonstrações contábeis obtidas no sítio da B3: Bolsa, Brasil, Balcão, a partir delas foram calculados os indicadores para aplicação do Modelo Fleuriet.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Aplicação do modelo apresentou estruturas financeiras das empresas de 2019 a 2022. Estruturas foram comparadas com os dados do artigo de 2020, de 2014 a 2018. Boticário: oscilação na estrutura financeira no 1º período, com tipo 3 (insatisfatória) em 2018. Durante a pandemia, passou da estrutura 1 (excelente) para 2 (sólida), retomando nível 1 em 2022. Lojas Americanas: chegou a 2018 com estrutura 1, com queda para 2 em 2020 e nível 3 em 2022. Magazine Luiza: única empresa com estabilidade em sua estrutura financeira, praticamente todo o período pré e pós pandemia no nível 2 (sólida). Pão de Açúcar: manteve estrutura tipo 2 durante todo 1º período, com queda para nível 6 (arriscada) em 2019 e 2020. Portanto, resultado não pode ser atribuído à pandemia, pois retomou nível 1 em 2021 e 2022. Raia Drogasil: manteve nível 2 até 2017, queda para nível 3 em 2018, mantendo esse nível durante e após o período da pandemia.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Com exceção do Magazine Luiza, pouca consistência na gestão do capital de giro. Há oscilação nas estruturas financeiras das empresas, antes e após a pandemia. Pão de Açúcar, Raia Drogasil e Boticário apresentavam piora nessa estrutura antes da pandemia. Destaque para Lojas Americanas, estrutura financeira favorável até 2021, pode ser um indicativo dos problemas com as demonstrações contábeis, identificados e divulgados em 2023.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>FLEURIET,Michel;KEHDY,Ricardo;BLANC,Georges. ModeloFleuriet Dinâmica financeira das empresas brasileiras:um método de análise, orçamento e planejamento financeiro. Rio de Janeiro:Elsevier, 2003. MARQUES,José; BRAGA,Roberto. Análise dinâmica do capital de giro:o modelo Fleuriet. RAEv.35,n.3,p. 49-63,1995. VALE,Rosilda; CRUZ,June; PICCOLI,Pedro Análise dinâmica do capital de giro aplicado ao varejo. Brazilian Journal of Development.v.6,n.9. Curitiba: 2020. p.73904-73916.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14308	Ciências Contábeis	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4518080 - AMANDA SILVA ARAUJO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa	Roberta Auler Bittencourt Bernardo	
<b>TITULO</b>	GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO EM EMPRESAS DE VAREJO: UMA ANÁLISE COM O MÉTODO FLEURIET			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Gestão do capital de giro é um dos principais elementos da gestão empresarial, principalmente com os desafios trazidos pela crise financeira causada pela pandemia. A crescente complexidade dos negócios exige aplicação de técnicas e conceitos de finanças que viabilizem utilização mais competente dos recursos necessários às atividades organizacionais. (ASSAFNETO:LIMA,2011) Análise Dinâmica do Capital de Giro, ou Modelo Fleuriet, é uma metodologia destinada a avaliar os investimentos em capital de giro. Considera os aspectos dinâmicos, combinando aspectos quantitativos e qualitativos, ampliando possibilidades de análise. (NASCIMENTO,2014) Com a aplicação do Modelo Fleuriet, são obtidas as estruturas financeiras das empresas, que variam entre o nível 1 (excelente) ao nível 6 (arriscada). Essas estruturas evidenciam a qualidade da gestão do capital de giro.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar os resultados da aplicação do Modelo Fleuriet, às empresas de varejo selecionadas, antes e após a pandemia, identificando os impactos resultantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Pesquisa qualitativa, descritiva e documental, abordagem longitudinal. Corpus formado por dois grupos de dados das empresas Boticário, Americanas, Magazine Luiza, Pão de Açúcar e Raia Drogasil. 2014-2018: dados levantados, analisados e apresentados pelos autores do artigo inicial. 2019-2022: demonstrações contábeis obtidas no sítio da B3: Bolsa, Brasil, Balcão, a partir delas foram calculados os indicadores para aplicação do Modelo Fleuriet.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Aplicação do modelo apresentou estruturas financeiras das empresas de 2019 a 2022. Estruturas foram comparadas com os dados do artigo de 2020, de 2014 a 2018. Boticário: oscilação na estrutura financeira no 1º período, com tipo 3 (insatisfatória) em 2018. Durante a pandemia, passou da estrutura 1 (excelente) para 2 (sólida), retomando nível 1 em 2022. Lojas Americanas: chegou a 2018 com estrutura 1, com queda para 2 em 2020 e nível 3 em 2022. Magazine Luiza: única empresa com estabilidade em sua estrutura financeira, praticamente todo o período pré e pós pandemia no nível 2 (sólida). Pão de Açúcar: manteve estrutura tipo 2 durante todo 1º período, com queda para nível 6 (arriscada) em 2019 e 2020. Portanto, resultado não pode ser atribuído à pandemia, pois retomou nível 1 em 2021 e 2022. Raia Drogasil: manteve nível 2 até 2017, queda para nível 3 em 2018, mantendo esse nível durante e após o período da pandemia.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Com exceção do Magazine Luiza, pouca consistência na gestão do capital de giro. Há oscilação nas estruturas financeiras das empresas, antes e após a pandemia. Pão de Açúcar, Raia Drogasil e Boticário apresentavam piora nessa estrutura antes da pandemia. Destaque para Lojas Americanas, estrutura financeira favorável até 2021, pode ser um indicativo dos problemas com as demonstrações contábeis, identificados e divulgados em 2023.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>FLEURIET,Michel;KEHDY,Ricardo;BLANC,Georges. ModeloFleuriet Dinâmica financeira das empresas brasileiras:um método de análise, orçamento e planejamento financeiro. Rio de Janeiro:Elsevier, 2003. MARQUES,José; BRAGA,Roberto. Análise dinâmica do capital de giro:o modelo Fleuriet. RAEv.35,n.3,p. 49-63,1995. VALE,Rosilda; CRUZ,June; PICCOLI,Pedro Análise dinâmica do capital de giro aplicado ao varejo. Brazilian Journal of Development.v.6,n.9. Curitiba: 2020. p.73904-73916.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14310	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3630391 - SARA COELHO RANGEL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Decio Gilberto Natrielli Filho	Lucas Melo Neves	JONATAS BUSSADOR DO AMARAL
<b>TITULO</b>	Análise da expressão de retrovírus endógenos humanos em pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Aproximadamente 8% do genoma humano é composto por elementos retrovirais. Os retrovírus endógenos foram adquiridos durante os últimos milhões de anos por meio de interações de retrovírus exógenos com células germinativas dos nossos ancestrais, atualmente sabemos que estão presentes em todos os vertebrados. Ao decorrer da evolução humana, os HERVs sofreram diversos eventos mutacionais, tornaram-se silenciados, porém suas proteínas podem ser expressas e eles possuem diversos papéis na fisiologia humana e acredita-se que possam mediar a patogênese de algumas doenças. Postula-se um papel inflamatório na patogênese dessas doenças. Pouco se sabe sobre esses elementos transponíveis nas condições destas doenças, alguns estudos indicam que a expressão de alguns HERVs pode estar elevada em pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia, o que pode indicar uma possível interação de um papel do vírus com a patogênese da doença</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o perfil de expressão de HERV-W e perfil inflamatório em pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar e esquizofrenia			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliados 48 pacientes voluntários diagnosticados com estes transtornos mentais, além de 46 indivíduos para o grupo controle saudável. Três amostras de sangue foram coletadas de cada voluntário, uma para a análise de expressão de HERV (RNA por PCR) e outra para análise dos níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias.			
<b>RESULTADO S</b>	Foi observado uma diferença de 3,5 vezes maior da expressão de HERV-W em pacientes com esquizofrenia em relação ao grupo controle (p(#60)0,01), a correlação de IL-10 com HERV-W foi negativa para ambos os grupos de transtorno mental e a razão de TNF- $\alpha$ /IL-10 e IFN- $\gamma$ /IL-10 com HERV-W apresentou uma correlação positiva para o grupo de transtorno bipolar. Os achados foram característicos de estudos anteriores para a expressão de HERV-W em pacientes com esquizofrenia, os dados de correlação negativa de IL-10 com HERV-W podem indicar um ambiente inflamatório, caracterizado pela inflamação crônica de baixo grau presentes nestes transtornos. Houve uma correlação positiva entre a razão de TNF- $\alpha$ /IL-10 e IFN- $\gamma$ /IL-10 com HERV-W para o grupo de transtorno bipolar, estes dados podem indicar um possível processo de compensação do organismo, ou seja, apesar destes pacientes possuírem um quadro de inflamação crônica de baixo grau, eles podem estar contidos devido a este equilíbrio entre a resposta inflamatória e reguladora, sugerindo também o porquê da expressão de HERV-W não ter tido uma diferença significativa em sua expressão quando comparada ao grupo controle.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os HERVs não apresentam uma relação direta com a etiologia da doença, porém, as condições inflamatórias desencadeada pelos transtornos mentais resultam em condições favoráveis para a expressão destes elementos retrovirais			
<b>REFERENCIA S</b>	Rodrigues LS, da Silva Nali LH, Leal COD, et al. HERV-K and HERV-W transcriptional activity in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Autoimmunity Highlights. 2019;10(1):1-5. doi:10.1186/S13317-019-0122-8 Griffiths DJ. Endogenous retroviruses in the human genome sequence. Genome Biology. 2001;2(6):reviews1017.1. doi:10.1186/GB-2001-2			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14310	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441796 - MICHELLY DAMASCENO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Decio Gilberto Natrielli Filho	Lucas Melo Neves	JONATAS BUSSADOR DO AMARAL
<b>TITULO</b>	Análise da expressão de retrovírus endógenos humanos em pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Aproximadamente 8% do genoma humano é composto por elementos retrovirais. Os retrovírus endógenos foram adquiridos durante os últimos milhões de anos por meio de interações de retrovírus exógenos com células germinativas dos nossos ancestrais, atualmente sabemos que estão presentes em todos os vertebrados. Ao decorrer da evolução humana, os HERVs sofreram diversos eventos mutacionais, tornaram-se silenciados, porém suas proteínas podem ser expressas e eles possuem diversos papéis na fisiologia humana e acredita-se que possam mediar a patogênese de algumas doenças. Postula-se um papel inflamatório na patogênese dessas doenças. Pouco se sabe sobre esses elementos transponíveis nas condições destas doenças, alguns estudos indicam que a expressão de alguns HERVs pode estar elevada em pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia, o que pode indicar uma possível interação de um papel do vírus com a patogênese da doença</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o perfil de expressão de HERV-W e perfil inflamatório em pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar e esquizofrenia			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliados 48 pacientes voluntários diagnosticados com estes transtornos mentais, além de 46 indivíduos para o grupo controle saudável. Três amostras de sangue foram coletadas de cada voluntário, uma para a análise de expressão de HERV (RNA por PCR) e outra para análise dos níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi observado uma diferença de 3,5 vezes maior da expressão de HERV-W em pacientes com esquizofrenia em relação ao grupo controle (p=#60)0,01), a correlação de IL-10 com HERV-W foi negativa para ambos os grupos de transtorno mental e a razão de TNF- $\alpha$ /IL-10 e IFN- $\gamma$ /IL-10 com HERV-W apresentou uma correlação positiva para o grupo de transtorno bipolar. Os achados foram característicos de estudos anteriores para a expressão de HERV-W em pacientes com esquizofrenia, os dados de correlação negativa de IL-10 com HERV-W podem indicar um ambiente inflamatório, caracterizado pela inflamação crônica de baixo grau presentes nestes transtornos. Houve uma correlação positiva entre a razão de TNF- $\alpha$ /IL-10 e IFN- $\gamma$ /IL-10 com HERV-W para o grupo de transtorno bipolar, estes dados podem indicar um possível processo de compensação do organismo, ou seja, apesar destes pacientes possuírem um quadro de inflamação crônica de baixo grau, eles podem estar contidos devido a este equilíbrio entre a resposta inflamatória e reguladora, sugerindo também o porquê da expressão de HERV-W não ter tido uma diferença significativa em sua expressão quando comparada ao grupo controle.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os HERVs não apresentam uma relação direta com a etiologia da doença, porém, as condições inflamatórias desencadeada pelos transtornos mentais resultam em condições favoráveis para a expressão destes elementos retrovirais			
<b>REFERENCIAS</b>	Rodrigues LS, da Silva Nali LH, Leal COD, et al. HERV-K and HERV-W transcriptional activity in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Autoimmunity Highlights. 2019;10(1):1-5. doi:10.1186/S13317-019-0122-8 Griffiths DJ. Endogenous retroviruses in the human genome sequence. Genome Biology. 2001;2(6):reviews1017.1. doi:10.1186/GB-2001-2			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14311	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382943 - SAMUEL NASCIMENTO SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Virginia Fernandes Moca Trevisani	Ana Paula Ribeiro	BRUNA REIMBERG FLOSE,
<b>TITULO</b>	Resposta humoral anti-HERV-K e W em pacientes com Artrite Reumatoide			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) são vírus que infectaram células germinativas dos nossos ancestrais a milhões de anos atrás. Esses vírus se integraram e se fixaram no genoma humano, foram transmitidos pelas gerações de forma mendeliana e hoje sabemos que cerca de 8% do genoma humano é composto por seqüências dos HERVs. Durante a evolução humana, muitos desses eventos ocorreram e resultaram no surgimento de várias famílias de HERVs (por exemplo, W, K, H, S L, E). Além disso, eles acumularam várias mutações, como stop códons dentro do gene, genes isolados ou um único Long Terminal Repeats (LTRs) espalhados em todos os cromossomos. Embora a maioria dos genes de HERVs estejam silenciados ou isolados, o vírião pode ser formado pela combinação das proteínas virais traduzidas dos genes em diferentes regiões do genoma. Esses vírus têm sido associados com um possível papel na patogênese de doenças autoimunes, em especial a Esclerose Múltipla (EM) e em Lúpus Eritematoso Sistêmico, mas as outras doenças autoimunes estão sendo estudadas de forma escassa, em especial a Artrite Reumatoide (AR). Essa doença não apresenta etiologia definida e os pacientes acometidos pela doença podem apresentar quadros graves e consideravelmente debilitantes. Vale destacar que existem poucos os trabalhos que buscaram compreender quais famílias de HERV possam estar expressas em pacientes com AR ou se podem apresentar um papel na patogênese dessa doença.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a resposta humoral anti HERV em pacientes com AR			
<b>METODOLOGIA</b>	40 pacientes com AR e 40 indivíduos saudáveis pareados por sexo e idade sem histórico de doenças autoimunes foram recrutados. Uma amostra de sangue foi coletada de cada voluntário para realização do ensaio de ELISA para verificação da resposta humoral (IgG) nos pacientes com AR a fim de verificar níveis de produção de anticorpos específicos e circulantes anti peptídeos específicos de HERV-K e W em pacientes com AR			
<b>RESULTADOS</b>	A técnica de Elisa foi realizada com os soros dos pacientes com AR e os resultados deram baixo, em comparação com o grupo controle. O que pode explicar é que os pacientes estavam tratando com anti-inflamatórios, o que foi visto em pacientes com EM onde tiveram uma redução humoral.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apesar da presença de resposta humoral, a maioria dos pacientes apresentou um baixo nível da concentração de anticorpos, o que sugere que nas condições presentes torna-se inviável estabelecer um possível mecanismo de resposta autoimune associado aos HERVs.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Greenig M. Hervs, immunity, and autoimmunity: Understanding the connection. PeerJ;2019(4). Available from: /pmc/articles/PMC6452852/ Freimanis, G., Hooley, P., Ejtehadi, H. D., Ali, H. A., et al, (2010). A role for human endogenous retrovirus-K (HML-2) in rheumatoid arthritis: Investigating mechanisms of pathogenesis. Clinical and Experimental Immunology, 160(3), 340–347. <a href="https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2010.04110.x">https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2010.04110.x</a> Garcia-Montojo M, Doucet-O'Hare T, Henderson L, Nath A. Human endogenous retrovirus-K (HML-2): a comprehensive review. Crit Rev Microbiol. 2018 Nov;44(6):715-738. doi: 10.1080/1040841X.2018.1501345</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14312	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4448944 - MACGREGOR ARAUJO SEVERIANO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PERFIL DAS INTERNAÇÕES DE CRIANÇAS DE 0 A 9 ANOS INSULINODEPENDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	O Diabetes Mellitus 1 (DM1) é uma doença genética, sistêmica, metabólica e autoimune que impacta toda vida do indivíduo, que demanda um tratamento terapêutico contínuo com uso de insulina, originando assim o nome insulino dependentes referido1.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o perfil epidemiológico das internações de crianças de 0 a 9 anos insulino dependentes no Município de São Paulo, no período de 2018 a 2022.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e retrospectivo, com dados do município de São Paulo, dentro do período selecionado de 2018 a 2022. Os dados foram obtidos nas plataformas Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), disponíveis publicamente de forma eletrônica através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) advindos do TABNET.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados obtidos apresentaram que de 2018 a 2022 registrou-se um total de 538 internações hospitalares de crianças de 0 a 9 anos por complicações do Diabetes Mellitus tipo 1, sendo um total de 114 (21,19%) em 2018, 87 (16,17%) em 2019, 98 (18,22%) em 2020, 118 (21,93%) em 2021 e 121 (22,49%) em 2022 segundo dados do SIH e DATASUS. Entre os anos de 2020 a 2022 houve aumento das internações por complicações do DM1, no qual esteve relacionado à pandemia do Covid-19, sendo essa comorbidade fator de risco durante a pandemia para desenvolvimento do SARS-CoV-2, ocasionando aumento nas taxas de óbitos e internações em UTI's em 7,69%2. Houve maiores índices de complicações no sexo feminino com 272 (50,56%) internações, em relação ao sexo masculino com 266 (49,44%) internações de 2018 a 2022. Avaliando anualmente, nota-se que os anos de 2018 com 66 (12,27%) e 2022 com 62 (11,52%) ocorreram respectivamente mais internações do sexo feminino. Internações do sexo masculino foram 48 (8,92%) internações nos anos de 2018 e 2019 e 10,97% nos anos de 2021 e 2022. Averiguou-se o tempo médio de internações por complicações do DM1 em crianças resultou em uma média de 7,8 dias, com estimativa de gastos em internações em cerca de R\$1.252,83 no ano de 2022, de R\$1.266,63 em 2021 e R\$1.352,26 em 2020, se comparado com o ano de 2018 e 2019 que correspondiam a menos de R\$700,00 por internação, mostrando-se evidente que o período da pandemia influenciou o aumento dos gastos e média de internações no Diabetes em crianças no Município3.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que o perfil de internações por Diabetes se modificou devido à presença do Covid-19, evidenciando vulnerabilidades e maiores complicações, importantes para justificar maiores estratégias e intervenções de promoção e prevenção na saúde da criança, enfatizando cuidados e monitoramento desses agravos, melhorando a qualidade de vida e evitando aumento das complicações e internações por Diabetes.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Brasil. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Brasília. Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019. Ed.: Clannad. 491 p. Disponível em: <a href="https://ishortlink/CzSf">https://ishortlink/CzSf</a> 2. Yafi M, et al. Diabetes Mellitus tipo 1 pediátrico e infecção COVID-19 existe uma Associação?. Residência Pediátrica. 2021;11(1):1-2n1-504. Disponível em: <a href="https://ishortlink/CcBt">https://ishortlink/CcBt</a> 3. Sousa PD, et al. Hospitalizações por diabetes mellitus na infância no Brasil e regiões entre 2010 e 2019. Revista de Pediatria SOPERJ. 2021;21 (supl 1)(1):16-22 Disponível em: <a href="https://ishortlink/D5UD">https://ishortlink/D5UD</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14312	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577396 - INGRID RIBEIRO GONÇALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PERFIL DAS INTERNAÇÕES DE CRIANÇAS DE 0 A 9 ANOS INSULINODEPENDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	O Diabetes Mellitus 1 (DM1) é uma doença genética, sistêmica, metabólica e autoimune que impacta toda vida do indivíduo, que demanda um tratamento terapêutico contínuo com uso de insulina, originando assim o nome insulino dependentes referido1.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o perfil epidemiológico das internações de crianças de 0 a 9 anos insulino dependentes no Município de São Paulo, no período de 2018 a 2022.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e retrospectivo, com dados do município de São Paulo, dentro do período selecionado de 2018 a 2022. Os dados foram obtidos nas plataformas Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), disponíveis publicamente de forma eletrônica através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) advindos do TABNET.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados obtidos apresentaram que de 2018 a 2022 registrou-se um total de 538 internações hospitalares de crianças de 0 a 9 anos por complicações do Diabetes Mellitus tipo 1, sendo um total de 114 (21,19%) em 2018, 87 (16,17%) em 2019, 98 (18,22%) em 2020, 118 (21,93%) em 2021 e 121 (22,49%) em 2022 segundo dados do SIH e DATASUS. Entre os anos de 2020 a 2022 houve aumento das internações por complicações do DM1, no qual esteve relacionado à pandemia do Covid-19, sendo essa comorbidade fator de risco durante a pandemia para desenvolvimento do SARS-CoV-2, ocasionando aumento nas taxas de óbitos e internações em UTI's em 7,69%. Houve maiores índices de complicações no sexo feminino com 272 (50,56%) internações, em relação ao sexo masculino com 266 (49,44%) internações de 2018 a 2022. Avaliando anualmente, nota-se que os anos de 2018 com 66 (12,27%) e 2022 com 62 (11,52%) ocorreram respectivamente mais internações do sexo feminino. Internações do sexo masculino foram 48 (8,92%) internações nos anos de 2018 e 2019 e 10,97% nos anos de 2021 e 2022. Averiguou-se o tempo médio de internações por complicações do DM1 em crianças resultou em uma média de 7,8 dias, com estimativa de gastos em internações em cerca de R\$1.252,83 no ano de 2022, de R\$1.266,63 em 2021 e R\$1.352,26 em 2020, se comparado com o ano de 2018 e 2019 que correspondiam a menos de R\$700,00 por internação, mostrando-se evidente que o período da pandemia influenciou o aumento dos gastos e média de internações no Diabetes em crianças no Município3.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que o perfil de internações por Diabetes se modificou devido à presença do Covid-19, evidenciando vulnerabilidades e maiores complicações, importantes para justificar maiores estratégias e intervenções de promoção e prevenção na saúde da criança, enfatizando cuidados e monitoramento desses agravos, melhorando a qualidade de vida e evitando aumento das complicações e internações por Diabetes.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Brasil. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Brasília. Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019. Ed.: Clannad. 491 p. Disponível em: <a href="https://ishortlink/CzSf">https://ishortlink/CzSf</a> 2. Yafi M, et al. Diabetes Mellitus tipo 1 pediátrico e infecção COVID-19 existe uma Associação?. Residência Pediátrica. 2021;11(1):1-2n1-504. Disponível em: <a href="https://ishortlink/CcBt">https://ishortlink/CcBt</a> 3. Sousa PD, et al. Hospitalizações por diabetes mellitus na infância no Brasil e regiões entre 2010 e 2019. Revista de Pediatria SOPERJ. 2021;21 (supl 1)(1):16-22 Disponível em: <a href="https://ishortlink/D5UD">https://ishortlink/D5UD</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14314	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4065280 - ANDRÉIA NASCIMENTO DANTAS ARAUJO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ariana Aline da Silva		
<b>TITULO</b>	DANÇA DO VENTRE E A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA NO CICLO MENSTRUAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O ciclo menstrual é um processo comum fisiológico que ocorre durante a idade reprodutiva da mulher e é dividido nas fases folicular, lútea e ovulação, levando o organismo a preparar o endométrio para o desenvolvimento do embrião, no caso de uma gestação. O funcionamento de todo o ciclo acontece através da sincronização entre hormônios e neurotransmissores, que atuam como inibidores ou estimuladores da secreção hormonal, proporcionando diferentes sintomas na mulher, em cada uma das fases. Em algumas fases do ciclo menstrual a mulher pode se sentir mais ativa fisicamente ou mais disposta, enquanto outras fases apresentam maior sensibilidade ou dores corporais, o que faz com que o movimento corporal seja uma estratégia para o bem-estar feminino. A dança do ventre é uma arte milenar, que surgiu no antigo Egito entre as sacerdotisas que realizavam danças sagradas. Apenas elas sabiam os movimentos e conheciam a arte de expressar sentimentos através de seu corpo com a música. Atualmente essa prática é realizada por mulheres como terapia, apresentando benefícios para o corpo e a mente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar a influência da prática de dança do ventre nas fases do ciclo menstrual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo em questão é uma revisão de literatura bibliográfica, realizada através de pesquisa nas bases de dados do Google acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES, e utilizando palavras-chave: dança do ventre, ciclo menstrual, atividade física, benefícios da dança.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Foram encontrados trinta artigos utilizando as palavras-chave, mas apenas três apresentaram relação direta com a temática e relevância para o estudo. Entre os benefícios da dança do ventre estão o estímulo à irrigação sanguínea na região do útero e o relaxamento dos órgãos internos (CELESTINO et. al., 2012). Além disso, a prática apresenta potencial terapêutico, liberando tensões e resgatando a essência feminina (FIGUEIREDO, 2005). O estudo de Cardoso e Leme (2003) enfatiza a relação entre dança do ventre e ciclo menstrual, com adaptações na prática referentes a cada fase, que pode minimizar dores e desconfortos da dismenorria primária, promover autoestima e saúde física, além de ajuda as mulheres nos desafios do ciclo menstrual, resgatando sua feminilidade. Celestino e colaboradores (2012) estudaram a comparação da força muscular de mulheres em cada fase do ciclo menstrual e apresentaram uma pequena variação no desempenho da força na fase pós-menstrual, que pode estar relacionada com as dores ocasionadas na fase menstrual ou pré-menstrual. Os movimentos dos músculos do ventre durante a dança, "massageiam" os órgãos internos, propiciando alívio nos desconfortos da dismenorria, caracterizada como uma dor aguda e em espasmos que acontecem no período anterior ou durante a menstruação (CARDOSO; LEME, 2003).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que a Dança do Ventre tem benefícios terapêuticos, incluindo o fortalecimento dos músculos do útero, ocasionando redução das dores decorrente de algumas fases do ciclo menstrual, além de enfatiza a importância da autoestima das mulheres e a contribuição para relacionamentos interpessoais saudáveis.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CARDOSO, T. S. M.; LEME, A. P. C. B. P. A equivalência da dança do ventre à cinesioterapia na terapêutica da dismenorria primária. Fisioterapia Brasil; 4(2): 96-102, 2003. CELESTINO K. S. D.; SANTOS I. F.; SANTOS A. L. B.; LOUREIRO A. C. Comparação da força muscular de mulheres durante as fases do ciclo menstrual. Caderno de Cultura e Ciência; 11(1): 42-50, 2012. FIGUEIREDO, A. C. L. Na linguagem artística da dança do ventre: o reencontro com a feminilidade no processo de subjetivação. In: II SEAD - II Seminário de Estudos em Análise do Discurso, 2005, Porto Alegre. II SEAD - II Seminário de Estudos em Análise do Discurso ? O campo da Análise do discurso no Brasil: mapeando conceitos, confrontando limites, 2005.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14314	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4450116 - NAUZIRA CONCEIÇÃO SILVA ANDRADE	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ariana Aline da Silva		
<b>TITULO</b>	DANÇA DO VENTRE E A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA NO CICLO MENSTRUAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O ciclo menstrual é um processo comum fisiológico que ocorre durante a idade reprodutiva da mulher e é dividido nas fases folicular, lútea e ovulação, levando o organismo a preparar o endométrio para o desenvolvimento do embrião, no caso de uma gestação. O funcionamento de todo o ciclo acontece através da sincronização entre hormônios e neurotransmissores, que atuam como inibidores ou estimuladores da secreção hormonal, proporcionando diferentes sintomas na mulher, em cada uma das fases. Em algumas fases do ciclo menstrual a mulher pode se sentir mais ativa fisicamente ou mais disposta, enquanto outras fases apresentam maior sensibilidade ou dores corporais, o que faz com que o movimento corporal seja uma estratégia para o bem-estar feminino. A dança do ventre é uma arte milenar, que surgiu no antigo Egito entre as sacerdotisas que realizavam danças sagradas. Apenas elas sabiam os movimentos e conheciam a arte de expressar sentimentos através de seu corpo com a música. Atualmente essa prática é realizada por mulheres como terapia, apresentando benefícios para o corpo e a mente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar a influência da prática de dança do ventre nas fases do ciclo menstrual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo em questão é uma revisão de literatura bibliográfica, realizada através de pesquisa nas bases de dados do Google acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES, e utilizando palavras-chave: dança do ventre, ciclo menstrual, atividade física, benefícios da dança.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Foram encontrados trinta artigos utilizando as palavras-chave, mas apenas três apresentaram relação direta com a temática e relevância para o estudo. Entre os benefícios da dança do ventre estão o estímulo à irrigação sanguínea na região do útero e o relaxamento dos órgãos internos (CELESTINO et. al., 2012). Além disso, a prática apresenta potencial terapêutico, liberando tensões e resgatando a essência feminina (FIGUEIREDO, 2005). O estudo de Cardoso e Leme (2003) enfatiza a relação entre dança do ventre e ciclo menstrual, com adaptações na prática referentes a cada fase, que pode minimizar dores e desconfortos da dismenorrea primária, promover autoestima e saúde física, além de ajuda as mulheres nos desafios do ciclo menstrual, resgatando sua feminilidade. Celestino e colaboradores (2012) estudaram a comparação da força muscular de mulheres em cada fase do ciclo menstrual e apresentaram uma pequena variação no desempenho da força na fase pós-menstrual, que pode estar relacionada com as dores ocasionadas na fase menstrual ou pré-menstrual. Os movimentos dos músculos do ventre durante a dança, "massageiam" os órgãos internos, propiciando alívio nos desconfortos da dismenorrea, caracterizada como uma dor aguda e em espasmos que acontecem no período anterior ou durante a menstruação (CARDOSO; LEME, 2003).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que a Dança do Ventre tem benefícios terapêuticos, incluindo o fortalecimento dos músculos do útero, ocasionando redução das dores decorrente de algumas fases do ciclo menstrual, além de enfatiza a importância da autoestima das mulheres e a contribuição para relacionamentos interpessoais saudáveis.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CARDOSO, T. S. M.; LEME, A. P. C. B. P. A equivalência da dança do ventre à cinesioterapia na terapêutica da dismenorrea primária. <i>Fisioterapia Brasil</i>; 4(2): 96-102, 2003. CELESTINO K. S. D.; SANTOS I. F.; SANTOS A. L. B.; LOUREIRO A. C. Comparação da força muscular de mulheres durante as fases do ciclo menstrual. <i>Caderno de Cultura e Ciência</i>; 11(1): 42-50, 2012. FIGUEIREDO, A. C. L. Na linguagem artística da dança do ventre: o reencontro com a feminilidade no processo de subjetivação. In: II SEAD - II Seminário de Estudos em Análise do Discurso, 2005, Porto Alegre. II SEAD - II Seminário de Estudos em Análise do Discurso ? O campo da Análise do discurso no Brasil: mapeando conceitos, confrontando limites, 2005.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14316	Pediatria	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4826094 - LUIZA GALEGO DE CARVALHO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniel Servigia Domingos		CLARA RODRIGUES
<b>TITULO</b>	Impactos Psicossociais Enfrentados por Crianças e Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1			
<b>INTRODUCAO</b>	A Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é doença autoimune crônica que se manifesta, geralmente, durante a infância e a adolescência e demanda rigoroso regime médico. Apesar dos avanços tecnológicos atualmente, ainda existem dificuldades em manter o nível glicêmico adequado entre os indivíduos portadores dessa enfermidade. Por isso, risco de doenças de longo prazo, depressão, ansiedade e outros quadros mentais são mais comuns entre esses jovens.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisar a literatura acerca dos impactos psicossociais sofridos por crianças e adolescentes com DM1, elucidando a importância do bem-estar emocional para garantir boa qualidade de vida à pessoa com diabetes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. A busca foi feita no período de 2013 a 2023, nas bases de dados LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO de estudos publicados em inglês, espanhol e português acerca da problemática. Utilizou-se os descritores "Diabetes Mellitus, Type 1", "Type 1 Diabetes", "Child", "Adolescent" e "Psychosocial Impact". Os artigos foram avaliados considerando o sistema de classificação em níveis de evidência (NE) da Oxford Centre Evidence-Based Medicine e a apresentação dos resultados foi realizada por meio de quadro comparativo e de forma descritiva.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram identificados 24 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados apontam para maior número de pesquisas qualitativas ou exploratórias, com nível de evidência 2C. Com destaque, têm-se estudos direcionados à análise do comportamento e das características psicológicas de crianças e adolescentes com DM1, abordando a percepção da doença e a sobrecarga psicossocial dos pacientes e de seus pais com relação ao controle glicêmico. Os estudos analisados apresentaram diferenças na forma como jovens com e sem diabetes lidam com seu emocional. A doença foi apontada como um fator limitante e a percepção do indivíduo sobre a sua condição repercute no bem-estar psíquico e dificulta a adesão ao tratamento. Diante disso, pacientes diabéticos frequentemente apresentam altos níveis de estresse e transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, em comparação com jovens saudáveis. Outros quadros também presentes são ideação suicida, compulsão alimentar, preocupações com o peso e visão distorcida sobre seus corpos. Diversos outros fatores como estresse familiar, rejeição social e aspectos socioeconômicos também dificultam o controle glicêmico, o que reduz o desempenho ideal da diabetes e promove o surgimento de agravantes físicos e psicossociais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verifica-se que a aceitação do diagnóstico e das complicações decorrentes da DM1 estão relacionadas a transtornos psicológicos, principalmente entre os adolescentes, pois é nessa faixa etária em que o indivíduo entende as suas limitações. Portanto, destaca-se a importância de forte rede de apoio e do incentivo ao autocuidado no processo de aceitação da DM1, na redução do surgimento de problemáticas psicossociais relacionadas à doença e na promoção da qualidade de vida de crianças e adolescentes com diabetes.			
<b>REFERENCIAS</b>				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14316	Pediatria	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4835611 - CAROLINE MARTINS MENEZES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniel Servigia Domingos		CLARA RODRIGUES
<b>TITULO</b>	Impactos Psicossociais Enfrentados por Crianças e Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1			
<b>INTRODUCAO</b>	A Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é doença autoimune crônica que se manifesta, geralmente, durante a infância e a adolescência e demanda rigoroso regime médico. Apesar dos avanços tecnológicos atualmente, ainda existem dificuldades em manter o nível glicêmico adequado entre os indivíduos portadores dessa enfermidade. Por isso, risco de doenças de longo prazo, depressão, ansiedade e outros quadros mentais são mais comuns entre esses jovens.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisar a literatura acerca dos impactos psicossociais sofridos por crianças e adolescentes com DM1, elucidando a importância do bem-estar emocional para garantir boa qualidade de vida à pessoa com diabetes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. A busca foi feita no período de 2013 a 2023, nas bases de dados LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO de estudos publicados em inglês, espanhol e português acerca da problemática. Utilizou-se os descritores "Diabetes Mellitus, Type 1", "Type 1 Diabetes", "Child", "Adolescent" e "Psychosocial Impact". Os artigos foram avaliados considerando o sistema de classificação em níveis de evidência (NE) da Oxford Centre Evidence-Based Medicine e a apresentação dos resultados foi realizada por meio de quadro comparativo e de forma descritiva.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram identificados 24 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados apontam para maior número de pesquisas qualitativas ou exploratórias, com nível de evidência 2C. Com destaque, têm-se estudos direcionados à análise do comportamento e das características psicológicas de crianças e adolescentes com DM1, abordando a percepção da doença e a sobrecarga psicossocial dos pacientes e de seus pais com relação ao controle glicêmico. Os estudos analisados apresentaram diferenças na forma como jovens com e sem diabetes lidam com seu emocional. A doença foi apontada como um fator limitante e a percepção do indivíduo sobre a sua condição repercute no bem-estar psíquico e dificulta a adesão ao tratamento. Diante disso, pacientes diabéticos frequentemente apresentam altos níveis de estresse e transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, em comparação com jovens saudáveis. Outros quadros também presentes são ideação suicida, compulsão alimentar, preocupações com o peso e visão distorcida sobre seus corpos. Diversos outros fatores como estresse familiar, rejeição social e aspectos socioeconômicos também dificultam o controle glicêmico, o que reduz o desempenho ideal da diabetes e promove o surgimento de agravantes físicos e psicossociais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verifica-se que a aceitação do diagnóstico e das complicações decorrentes da DM1 estão relacionadas a transtornos psicológicos, principalmente entre os adolescentes, pois é nessa faixa etária em que o indivíduo entende as suas limitações. Portanto, destaca-se a importância de forte rede de apoio e do incentivo ao autocuidado no processo de aceitação da DM1, na redução do surgimento de problemáticas psicossociais relacionadas à doença e na promoção da qualidade de vida de crianças e adolescentes com diabetes.			
<b>REFERENCIAS</b>				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14316	Pediatria	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027713 - JÉSSICA ELIAS FREITAS SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniel Servigia Domingos		CLARA RODRIGUES
<b>TITULO</b>	Impactos Psicossociais Enfrentados por Crianças e Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1			
<b>INTRODUCAO</b>	A Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é doença autoimune crônica que se manifesta, geralmente, durante a infância e a adolescência e demanda rigoroso regime médico. Apesar dos avanços tecnológicos atualmente, ainda existem dificuldades em manter o nível glicêmico adequado entre os indivíduos portadores dessa enfermidade. Por isso, risco de doenças de longo prazo, depressão, ansiedade e outros quadros mentais são mais comuns entre esses jovens.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisar a literatura acerca dos impactos psicossociais sofridos por crianças e adolescentes com DM1, elucidando a importância do bem-estar emocional para garantir boa qualidade de vida à pessoa com diabetes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. A busca foi feita no período de 2013 a 2023, nas bases de dados LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO de estudos publicados em inglês, espanhol e português acerca da problemática. Utilizou-se os descritores "Diabetes Mellitus, Type 1", "Type 1 Diabetes", "Child", "Adolescent" e "Psychosocial Impact". Os artigos foram avaliados considerando o sistema de classificação em níveis de evidência (NE) da Oxford Centre Evidence-Based Medicine e a apresentação dos resultados foi realizada por meio de quadro comparativo e de forma descritiva.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram identificados 24 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados apontam para maior número de pesquisas qualitativas ou exploratórias, com nível de evidência 2C. Com destaque, têm-se estudos direcionados à análise do comportamento e das características psicológicas de crianças e adolescentes com DM1, abordando a percepção da doença e a sobrecarga psicossocial dos pacientes e de seus pais com relação ao controle glicêmico. Os estudos analisados apresentaram diferenças na forma como jovens com e sem diabetes lidam com seu emocional. A doença foi apontada como um fator limitante e a percepção do indivíduo sobre a sua condição repercute no bem-estar psíquico e dificulta a adesão ao tratamento. Diante disso, pacientes diabéticos frequentemente apresentam altos níveis de estresse e transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, em comparação com jovens saudáveis. Outros quadros também presentes são ideação suicida, compulsão alimentar, preocupações com o peso e visão distorcida sobre seus corpos. Diversos outros fatores como estresse familiar, rejeição social e aspectos socioeconômicos também dificultam o controle glicêmico, o que reduz o desempenho ideal da diabetes e promove o surgimento de agravantes físicos e psicossociais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verifica-se que a aceitação do diagnóstico e das complicações decorrentes da DM1 estão relacionadas a transtornos psicológicos, principalmente entre os adolescentes, pois é nessa faixa etária em que o indivíduo entende as suas limitações. Portanto, destaca-se a importância de forte rede de apoio e do incentivo ao autocuidado no processo de aceitação da DM1, na redução do surgimento de problemáticas psicossociais relacionadas à doença e na promoção da qualidade de vida de crianças e adolescentes com diabetes.			
<b>REFERENCIAS</b>				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14318	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4448944 - MACGREGOR ARAUJO SEVERIANO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA E MANOBRAS DE DESENGASGO COM O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.			
<b>INTRODUCAO</b>	INTRODUÇÃO Durante a realização do levantamento de dados sobre o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, foi observado a quantidade de usuários adscritos que apresentam comorbidades que classificam como fatores de risco para eventos cardiovasculares e obstruções de vias aéreas por corpo estranho (OVACE).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o processo de intervenção do estágio de gestão, através da realização de uma palestra com treinamento sobre Suporte Básico de Vida (SBV) e Manobras de Desengasgo com os Agentes Comunitários de Saúde de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no extremo da zona sul da cidade de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em uma UBS na zona sul do Município de São Paulo, durante a intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES).			
<b>RESULTADO S</b>	Apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP iniciada por leigos e menos de 12% têm um DEA aplicado antes da chegada do serviço médico especializado 1. Em alguns países como Dinamarca e Espanha o SBV é ensinado em escolas. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 50% dos engasgos em crianças são no sexo masculino entre 1 e 3 anos, e mais de 94% antes dos 7 anos. De 2009 a 2019 houve 2148 óbitos infantis por causa de engasgos, sendo cerca de 1545 (72%) dos óbitos foram de crianças menores de 1 ano, 465 (21,6%) são em crianças entre 1 e 4 anos, e 138 (6,4%) são em crianças de 5 a 9 anos. Cerca de 1817 (84,6%) foram por causa de obstrução por alimentos e 331(15,4%) por objetos diversos 2. Durante a vivência do estágio, observamos que havia a necessidade de uma intervenção voltada para orientação dos ACS em emergências, visto que estes demonstram passar grande parte do tempo em visitas no território adscrito, e conseqüentemente aumentando as chances de se depararem com alguma parada cardiorrespiratória ou obstrução de vias aéreas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Durante a realização do treinamento, foi possível observarmos grande interesse e satisfação por parte dos ACS sobre os temas abordados, levando em conta que alguns trouxeram relatos de circunstâncias onde estes conhecimentos foram previamente necessários.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.link/48HK">https://ishort.link/48HK</a> 2. Costa IO, Alves-Felipe RW, Ramos TB, Galvão VB-L, Aguiar MSB, Rocha VG. Estudo descritivo de óbitos por engasgo em crianças no Brasil. - Revista de Pediatria SOPERJ. 2021;21 (supl 1)(1):11-14. Disponível em: <a href="https://ishort.link/9cq3">https://ishort.link/9cq3</a> 3. Cruz RNS, Griep R, Coelho ICMM, Almeida RM de SSA de, Garbelini MC da L. Extensão universitária como estratégia para o ensino do suporte básico de vida para a comunidade. Braz. J. Hea. Rev. [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2023 Oct. 10];6(1):2212-3. Disponível em: <a href="https://ishort.link/mCBJ">https://ishort.link/mCBJ</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14318	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517504 - VICTOR CARLOS ALVES PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA E MANOBRAS DE DESENGASGO COM O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.			
<b>INTRODUCAO</b>	INTRODUÇÃO Durante a realização do levantamento de dados sobre o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, foi observado a quantidade de usuários adscritos que apresentam comorbidades que classificam como fatores de risco para eventos cardiovasculares e obstruções de vias aéreas por corpo estranho (OVACE).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o processo de intervenção do estágio de gestão, através da realização de uma palestra com treinamento sobre Suporte Básico de Vida (SBV) e Manobras de Desengasgo com os Agentes Comunitários de Saúde de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no extremo da zona sul da cidade de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em uma UBS na zona sul do Município de São Paulo, durante a intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES).			
<b>RESULTADO S</b>	Apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP iniciada por leigos e menos de 12% têm um DEA aplicado antes da chegada do serviço médico especializado 1. Em alguns países como Dinamarca e Espanha o SBV é ensinado em escolas. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 50% dos engasgos em crianças são no sexo masculino entre 1 e 3 anos, e mais de 94% antes dos 7 anos. De 2009 a 2019 houve 2148 óbitos infantis por causa de engasgos, sendo cerca de 1545 (72%) dos óbitos foram de crianças menores de 1 ano, 465 (21,6%) são em crianças entre 1 e 4 anos, e 138 (6,4%) são em crianças de 5 a 9 anos. Cerca de 1817 (84,6%) foram por causa de obstrução por alimentos e 331(15,4%) por objetos diversos 2. Durante a vivência do estágio, observamos que havia a necessidade de uma intervenção voltada para orientação dos ACS em emergências, visto que estes demonstram passar grande parte do tempo em visitas no território adscrito, e conseqüentemente aumentando as chances de se depararem com alguma parada cardiorrespiratória ou obstrução de vias aéreas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Durante a realização do treinamento, foi possível observarmos grande interesse e satisfação por parte dos ACS sobre os temas abordados, levando em conta que alguns trouxeram relatos de circunstâncias onde estes conhecimentos foram previamente necessários.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.link/48HK">https://ishort.link/48HK</a> 2. Costa IO, Alves-Felipe RW, Ramos TB, Galvão VB-L, Aguiar MSB, Rocha VG. Estudo descritivo de óbitos por engasgo em crianças no Brasil. - Revista de Pediatria SOPERJ. 2021;21 (supl 1)(1):11-14. Disponível em: <a href="https://ishort.link/9cq3">https://ishort.link/9cq3</a> 3. Cruz RNS, Griep R, Coelho ICMM, Almeida RM de SSA de, Garbelini MC da L. Extensão universitária como estratégia para o ensino do suporte básico de vida para a comunidade. Braz. J. Hea. Rev. [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2023 Oct. 10];6(1):2212-3. Disponível em: <a href="https://ishort.link/mCBJ">https://ishort.link/mCBJ</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14318	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577396 - INGRID RIBEIRO GONÇALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA E MANOBRAS DE DESENGASGO COM O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.			
<b>INTRODUCAO</b>	INTRODUÇÃO Durante a realização do levantamento de dados sobre o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, foi observado a quantidade de usuários adscritos que apresentam comorbidades que classificam como fatores de risco para eventos cardiovasculares e obstruções de vias aéreas por corpo estranho (OVACE).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o processo de intervenção do estágio de gestão, através da realização de uma palestra com treinamento sobre Suporte Básico de Vida (SBV) e Manobras de Desengasgo com os Agentes Comunitários de Saúde de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no extremo da zona sul da cidade de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em uma UBS na zona sul do Município de São Paulo, durante a intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES).			
<b>RESULTADO S</b>	Apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP iniciada por leigos e menos de 12% têm um DEA aplicado antes da chegada do serviço médico especializado 1. Em alguns países como Dinamarca e Espanha o SBV é ensinado em escolas. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 50% dos engasgos em crianças são no sexo masculino entre 1 e 3 anos, e mais de 94% antes dos 7 anos. De 2009 a 2019 houve 2148 óbitos infantis por causa de engasgos, sendo cerca de 1545 (72%) dos óbitos foram de crianças menores de 1 ano, 465 (21,6%) são em crianças entre 1 e 4 anos, e 138 (6,4%) são em crianças de 5 a 9 anos. Cerca de 1817 (84,6%) foram por causa de obstrução por alimentos e 331(15,4%) por objetos diversos 2. Durante a vivência do estágio, observamos que havia a necessidade de uma intervenção voltada para orientação dos ACS em emergências, visto que estes demonstram passar grande parte do tempo em visitas no território adscrito, e conseqüentemente aumentando as chances de se depararem com alguma parada cardiorrespiratória ou obstrução de vias aéreas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Durante a realização do treinamento, foi possível observarmos grande interesse e satisfação por parte dos ACS sobre os temas abordados, levando em conta que alguns trouxeram relatos de circunstâncias onde estes conhecimentos foram previamente necessários.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.link/48HK">https://ishort.link/48HK</a> 2. Costa IO, Alves-Felipe RW, Ramos TB, Galvão VB-L, Aguiar MSB, Rocha VG. Estudo descritivo de óbitos por engasgo em crianças no Brasil. - Revista de Pediatria SOPERJ. 2021;21 (supl 1)(1):11-14. Disponível em: <a href="https://ishort.link/9cq3">https://ishort.link/9cq3</a> 3. Cruz RNS, Griep R, Coelho ICMM, Almeida RM de SSA de, Garbelini MC da L. Extensão universitária como estratégia para o ensino do suporte básico de vida para a comunidade. Braz. J. Hea. Rev. [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2023 Oct. 10];6(1):2212-3. Disponível em: <a href="https://ishort.link/mCBJ">https://ishort.link/mCBJ</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14321	Engenharia Civil	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3994082 - ILTON MELO SALVIANO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rafael Testoni Cécel	Daniele Maria Pilla Junqueira Cafange	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DE UMA GLEBA URBANIZÁVEL PELOS MÉTODOS INVOLUTIVOS ESTÁTICO, DINÂMICO COM EQUAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS E DINÂMICO POR FLUXO DE CAIXA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS METODOLOGIAS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A engenharia de avaliações possui papel fundamental no mercado imobiliário, definindo, através dos métodos existentes, o provável valor de mercado do imóvel, tal como uma gleba urbanizável, onde se é possível parcelar terras e vender as unidades imobiliárias. Dentre os métodos para avaliação destas, há o involutivo, dividido em estático, dinâmico por equações pré-definidas e dinâmico por fluxo de caixa descontado.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar uma gleba urbanizável pelos métodos involutivos da NBR 14.653-2:2011, analisando valores obtidos e apontando diferenças entre eles.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi definida uma gleba urbanizável com ocupação residencial urbana, aplicando-se os métodos involutivos estático, dinâmico com equações pré-definidas e dinâmico por fluxo de caixa. De posse dos valores de cada método, foi feita uma análise comparativa, apontando-se limitações e diferenças. Considerou-se uma gleba com 50.000,00m² de área bruta e área loteável de 32.500m². Foi considerada uma ocupação residencial unifamiliar com valor unitário de venda de R\$ 1.000,00/m², custo de implantação de infraestrutura de R\$ 104,98/m² com variação média de 0,89%a.m., impostos sobre a terra de 3,00%, impostos sobre a receita de 6,73%, prazo de urbanização de 12 meses, prazo de venda dos lotes de 48 meses, taxa de remuneração de capital de 0,6227%a.m., valorização territorial de 0,50%a.m., lucro do incorporador de 30%, custo com marketing e corretagem de 3,00% sobre o VGV, percentual de vendas no 1º ano de 20% e nos anos seguintes de 20,67% e taxa de risco de 4,00%. Em seguida, realizou-se uma análise de sensibilidade, variando a área bruta da gleba de 30.000,00m² até 70.000,00m².			
<b>RESULTADOS</b>	Adotou-se como valor de referência o resultado obtido pelo involutivo dinâmico por fluxo de caixa, pois é o de maior grau de fundamentação, conforme NBR 14.653-2:2011. O valor obtido variou em +24,14% para o estático e -2,30% para o dinâmico com equações pré-definidas. Já na análise de sensibilidade, os valores pelo estático variaram entre +22,27% e +28,71%, e pelo dinâmico com equações pré-definidas, entre -0,99% e -6,88%.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Foi possível perceber que para áreas menores, a diferença entre estático e dinâmicos é maior, mostrando que, para glebas pequenas, com rápida absorção mercadológica, o fator tempo, ausente no estático, desempenha papel fundamental. Além disso, é possível destacar limitações do estático, que majorou os valores acima do campo de arbítrio, por exemplo, que é limitado a 15% do valor mercadológico, mostrando que os modelos dinâmicos são mais coerentes.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1) DANTAS, Rubens Alves. Engenharia de avaliações: uma introdução à metodologia científica. 3ª ed. São Paulo: Editora Pini Ltda, 1998. 2) CAIRES, Hélio de (#38) CAIRES, Hélio Roberto Ribeiro de. Avaliação de Glebas Urbanizáveis. 1ª ed. São Paulo: Editora Pini Ltda, 1984. 3) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14.653-2:2011 – Avaliação de bens Parte 2: Imóveis urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14321	Engenharia Civil	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4651529 - NILSON DAL MASO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rafael Testoni Cécel	Daniele Maria Pilla Junqueira Cafange	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DE UMA GLEBA URBANIZÁVEL PELOS MÉTODOS INVOLUTIVOS ESTÁTICO, DINÂMICO COM EQUAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS E DINÂMICO POR FLUXO DE CAIXA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS METODOLOGIAS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A engenharia de avaliações possui papel fundamental no mercado imobiliário, definindo, através dos métodos existentes, o provável valor de mercado do imóvel, tal como uma gleba urbanizável, onde se é possível parcelar terras e vender as unidades imobiliárias. Dentre os métodos para avaliação destas, há o involutivo, dividido em estático, dinâmico por equações pré-definidas e dinâmico por fluxo de caixa descontado.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar uma gleba urbanizável pelos métodos involutivos da NBR 14.653-2:2011, analisando valores obtidos e apontando diferenças entre eles.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi definida uma gleba urbanizável com ocupação residencial urbana, aplicando-se os métodos involutivos estático, dinâmico com equações pré-definidas e dinâmico por fluxo de caixa. De posse dos valores de cada método, foi feita uma análise comparativa, apontando-se limitações e diferenças. Considerou-se uma gleba com 50.000,00m² de área bruta e área loteável de 32.500m². Foi considerada uma ocupação residencial unifamiliar com valor unitário de venda de R\$ 1.000,00/m², custo de implantação de infraestrutura de R\$ 104,98/m² com variação média de 0,89%a.m., impostos sobre a terra de 3,00%, impostos sobre a receita de 6,73%, prazo de urbanização de 12 meses, prazo de venda dos lotes de 48 meses, taxa de remuneração de capital de 0,6227%a.m., valorização territorial de 0,50%a.m., lucro do incorporador de 30%, custo com marketing e corretagem de 3,00% sobre o VGV, percentual de vendas no 1º ano de 20% e nos anos seguintes de 20,67% e taxa de risco de 4,00%. Em seguida, realizou-se uma análise de sensibilidade, variando a área bruta da gleba de 30.000,00m² até 70.000,00m².			
<b>RESULTADOS</b>	Adotou-se como valor de referência o resultado obtido pelo involutivo dinâmico por fluxo de caixa, pois é o de maior grau de fundamentação, conforme NBR 14.653-2:2011. O valor obtido variou em +24,14% para o estático e -2,30% para o dinâmico com equações pré-definidas. Já na análise de sensibilidade, os valores pelo estático variaram entre +22,27% e +28,71%, e pelo dinâmico com equações pré-definidas, entre -0,99% e -6,88%.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Foi possível perceber que para áreas menores, a diferença entre estático e dinâmicos é maior, mostrando que, para glebas pequenas, com rápida absorção mercadológica, o fator tempo, ausente no estático, desempenha papel fundamental. Além disso, é possível destacar limitações do estático, que majorou os valores acima do campo de arbítrio, por exemplo, que é limitado a 15% do valor mercadológico, mostrando que os modelos dinâmicos são mais coerentes.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1) DANTAS, Rubens Alves. Engenharia de avaliações: uma introdução à metodologia científica. 3ª ed. São Paulo: Editora Pini Ltda, 1998. 2) CAIRES, Hélio de (#38) CAIRES, Hélio Roberto Ribeiro de. Avaliação de Glebas Urbanizáveis. 1ª ed. São Paulo: Editora Pini Ltda, 1984. 3) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14.653-2:2011 – Avaliação de bens Parte 2: Imóveis urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14322	Psicologia Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4020821 - PAULO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cinara Brito de Oliveira		
<b>TITULO</b>	Suicídio no Clero: reflexões psicossociais sobre um caso ocorrido no agreste brasileiro			
<b>INTRODUCA O</b>	Os comportamentos ressentidos da dor, da angústia, da humilhação são características marcantes no atual cenário contemporâneo e, ainda que não seja assunto inédito, segue sendo um terreno espinhoso, um tabu em nossa sociedade, ainda mais quando se trata de suicídio entre sacerdotes que são ordenados para promover a vida e a felicidade.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar os motivos de um caso de suicídio, refletindo sobre esse fenômeno no clero brasileiro.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso e foi realizada por meio de análise documental. O documento analisado é uma carta escrita por um padre, encontrada ao lado do seu corpo e divulgada pela mídia.			
<b>RESULTADO S</b>	Padre Geraldo Oliveira, 77 anos, foi encontrado morto na Igreja de São Sebastião, localizada em Surubim-PE, na véspera da comemoração de seus cinquenta anos de sacerdócio, cuja marca era o trabalho social junto aos menos favorecidos. Ao lado do seu corpo existia uma corda e um frasco com veneno e uma carta direcionada à imprensa local. Na carta foi retratado o desprezo, isolamento, maus tratos e opressão que vinha recebendo pelos demais sacerdotes, que geravam intenso sofrimento que ele afirma esconder. Além disso, ele relata sentir decepção, ansiedade e angústia, como "frutos de uma convivência que ignora a presença do outro". A dor psicológica descrita pelo suicidologista Shneidman (apud Vale, 2021) é evidente no relato do padre, mas é igualmente evidente que esse sofrimento decorre do vínculo estabelecido com os seus pares, corroborando com as ideias do sociólogo Durkheim (2000). A carta retrata também uma tentativa de conversar com um dos padres com quem não tinha uma boa relação, mas não obteve sucesso, ficando então sem ter com quem conversar, e apesar de reconhecer o sofrimento, tentava abafá-los, recorrendo sempre a fé para lidar com as dificuldades "Não alimento mágoa, pois na condição de cristão devo sempre perdoar estas atitudes[...]" Outro fator gerador de sofrimento no padre, foi o afastamento das funções como padre, pois já havia passado dos 75 anos, idade de aposentaria preconizada pelo Código de Direito Canônico. Na carta há também um último desejo do padre, ser sepultado em Surubim, cidade em que exerceu a vida sacerdotal por mais tempo, a afirmação de que a amizade e atenção das pessoas foi o que o fez resistir até aquele momento e o agradecimento ao bispo por tratar bem os padres idosos, revelando o quanto que as boas relações são fatores de proteção, mas possivelmente a sua posição de padre o impedia de pedir ajuda, pois se via como a pessoa que sempre precisava ajudar.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Casos de suicídio no clero são mais comuns do que se imagina, porém pouco divulgados, as causas são diversas, mas o caso do padre Geraldo demonstra como a ordenação para promover a vida e a felicidade do outro pode dificultar um pedido de ajuda. podendo ser evitadas desde que encontrem apoio, ajuda, acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para o seu bom estado de humor.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. DURKHEIM, Émile. O Suicídio. São Paulo, Martins Fontes, 2000. 2. VALE, Licio de Araújo. Mente suicida: respostas aos porquês silenciados. São Paulo: Paulinas, 2021. 3. PEREIRA, William Cesar Castilho. Sofrimento Psiquico dos Presbíteros: dor institucional. 4. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14324	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678117 - CRISTINA MARIA ARVATE ALVARES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luana de Campos		
<b>TITULO</b>	Avaliação da terapia de fotobiomodulação em diferentes parâmetros dosimétricos em pós-operatório de preenchimento labial			
<b>INTRODUCAO</b>	O preenchimento labial (PL) pode acarretar consequências pós-operatórias como edema, eritema e dor. A terapia de fotobiomodulação (TFBM) tem sido indicada no controle destes efeitos, no entanto, permanece sem consenso com relação ao melhor protocolo dosimétrico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Tivemos como objetivo comparar, através de análises clínicas objetivas e subjetivas, o efeito de diferentes protocolos dosimétricos da TFBM no pós-operatório (PO) de PL.			
<b>METODOLOGIA</b>	60 pacientes foram igualmente divididos em quatro grupos: G1 - controle, apenas a prescrição de medicamentos e cuidados PO; G2 - TFBM no (#38)#61548;660nm, 100mW, 2J; G3 - TFBM no (#38)#61548;808nm, 100mW, 2J; G4 - TFBM nos (#38)#61548;808 e 660nm, 100mW, 2J de forma simultânea. A análise clínica subjetiva incluiu avaliação de dor, por meio da escala visual analógica (EVA) nos tempos PO imediato, 24h, 48h e 7 dias de PO. Edema e eritema foram analisados objetivamente, nos tempos: PO imediato, 48h e 7 dias. Os grupos foram comparados por meio de análise de variância e teste de Tukey.			
<b>RESULTADOS</b>	Para a dor em EVA, todos os grupos apresentaram resultados semelhantes em todos os tempos experimentais (p(#62)0,05). Para edema em lábios superior e inferior, todos os grupos experimentais apresentaram redução em 48h (p(#60)0,05), assim como mantiveram valores reduzidos em 7 dias para lábio superior (p(#60)0,05) com relação ao grupo G1. A TFBM influenciou positivamente o eritema, onde todos os grupos experimentais apresentaram redução dos valores em 48h (p(#60)0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	A TFBM pode ser benéfica no controle do edema e eritema em pós-operatório de PL com ácido hialurônico.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Winslow CP. The management of dermal filler complications. Vol. 25, Facial Plastic Surgery. 2009. 2. Anders JJ, Lanzafame RJ, Arany PR. Low-level light/laser therapy versus photobiomodulation therapy. Vol. 33, Photomedicine and Laser Surgery. 2015. 3. Lago ADN. Laser na Odontologia - Conceitos e Aplicações Clínicas. 1o ed. São Luiz do Maranhão; 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14325	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4414357 - ELAINE MOURA FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Henrique da Silva Nali		GRACIELA DOS SANTOS SOARES
<b>TITULO</b>	Prevalência de Infecção por Vírus Respiratórios em creches da Zona Sul de São Paulo após o retorno das atividades escolares.			
<b>INTRODUCA O</b>	As infecções do trato respiratório podem ser causadas por diferentes microrganismos, mas principalmente por vírus. Essas infecções são responsáveis por provocar inúmeras doenças aos seres humanos que ao longo do tempo vêm desafiando as políticas públicas de saúde de diversos países. As infecções virais correspondem a 2ª causa de morte quando se trata da população infantil; e no Brasil a 3ª causa de morte entre todas as idades. Sua transmissão ocorre facilmente pela sociedade o que exige um hábito cuidadoso com a higiene afim de controlar a disseminação dos vírus respiratórios, medidas essas que foram intensificadas em virtude da pandemia de SARS-CoV2.1-3			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a prevalência dos vírus respiratórios circulantes nas creches da Zona Sul de São Paulo; mapear a faixas etárias que mais ocorrem as infecções respiratórias.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este projeto é um estudo tipo prospectivo observacional. Respeitando as questões éticas, as creches foram convidadas por meio de ligações telefônicas e e-mails, após o aceite, os TCLEs foram levados a diretoria e encaminhados para serem assinados pelos pais. A coleta do material foi realizada através de swab nasal e orofaríngea. Em seguida, as amostras foram direcionadas ao laboratório da UNISA onde foram feitas a extração dos ácidos nucleicos. A detecção dos vírus respiratórios foi realizada via painel de vírus respiratórios com auxílio do kit Allplex respiratory panel I, II e III (seegene), que consiste em uma técnica de PCR em Tempo Real one step			
<b>RESULTADOS</b>	No presente estudo tivemos 111 infecções virais (35,02% do N total), sendo 11 em voluntários adultos que representou 13,56% de todos os adultos participantes, e 100 em voluntários crianças representando 42,37% de todas as crianças voluntárias.			
<b>CONCLUSO E S</b>	As crianças continuam sendo as mais acometidas pelos vírus causadores de gripes e resfriados. O Rinovírus Humano e os vírus família Coronaviridae foram os mais prevalentes nas creches participantes deste estudo. No entanto, encontramos outros resultados que também explicam a importância dos frequentes estudos como este em relação aos vírus respiratórios.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Filho EB da S, Silva AL, Santos AO, Dall'acqua DSV, Souza LFB. Infecções Respiratórias de Importância Clínica: uma Revisão Sistemática. Rev Fimca. 2017;4(1):7-16. 2. Abbatati C, Abbas KM, Abbasi-Kangevari M, Abd-Allah F, Abdelalim A, Abdollahi M, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. 3. Dalcin, P T R; Silva DR. Infecções Virais Do Trato Respiratório. Influenza. 2009;23(01):15-22.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14326	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3630391 - SARA COELHO RANGEL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Decio Gilberto Natrielli Filho	Carolina Nunes Franca	
<b>TITULO</b>	Análise de perfil de expressão de retrovírus endógenos humanos associada a esquizofrenia			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Esquizofrenia é um transtorno mental sem etiologia biológica conhecida, que afeta pessoas no mundo todo, com sintomas de psicose ao longo da vida, os pacientes são diagnosticados por volta da segunda década de vida. Estudos apontam índices de resposta inflamatória durante o desenvolvimento da esquizofrenia, e postula-se que os retrovírus endógenos humanos possam ter um papel na imunopatogênese da doença. Os HERVs são elementos presentes em 8% do genoma humano, esses retrovírus eram vírus exógenos, que foram endogenizados a milhares de anos, e hoje sabemos que esses vírus são expressos em doenças de caráter inflamatório como artrite reumatoide, esclerose múltipla e diabetes tipo 1, assim como em esquizofrenia.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a expressão dos retrovírus endógenos na esquizofrenia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para isso foi realizado um estudo transversal do tipo caso controle com 29 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e 46 saudáveis, foram submetidos a uma coleta de sangue para análise e amplificação de material através de RT-PCR para avaliar o perfil de expressão dos retrovírus endógenos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A análise de expressão de Herv-W por PCR em tempo real mostrou que, dos indivíduos participantes todos expressavam em suas células moléculas de Herv-W, porém, quando comparado o grupo com esquizofrenia ao grupo controle há uma diferença de aproximadamente 4 vezes mais, sendo assim foi identificado que o grupo de paciente com esquizofrenia expressa (#38)#8773; 4 vezes mais em comparação com a expressão basal do grupo controle. Os resultados encontrados na análise de expressão corroboram estudos anteriores que apontam níveis de HERV-W elevados em soro de pacientes com esquizofrenia em comparação ao grupo controle. levantando dessa forma, uma possível evidencia imunopatologia dos retrovírus na fisiopatologia da esquizofrenia, porém apenas com a análises de expressão do HERV-W, não se é possível identificar qual o mecanismo mediado por esses elementos, a hipótese principal de mimetismo molecular é ainda, a mais coerente, devido ao resultado apresentado de expressão relacionado a pacientes saudáveis, o que mostra alta concentração de moléculas que deveriam estar silenciadas como visto no grupo controle, sendo expressas a nível molecular na esquizofrenia.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados da análise de expressão do HERV-W indicam forte perfil imunopatogenico nos pacientes com esquizofrenia, além de grande atividade transcricional desses elementos, enquanto nos indivíduos sem o quadro da doença é visto uma expressão a nível basal, mostrando que não há atividade exacerbada desses retroelementos fora do quadro de esquizofrenia.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Perron H, Lang A. The human endogenous retrovirus link between genes and environment in multiple sclerosis and in multifactorial diseases associating neuroinflammation. Clin Rev Allergy Immunol [Internet]. 2010;39(1):51–61. Perron H, Mekaoui L, Bernard C, Veas F, Stefas I, Leboyer M. Endogenous retrovirus type W GAG and envelope protein antigenemia in serum of schizophrenic patients. Biol Psychiatry [Internet]. 2008;64(12):1019–23. Rolland A, Jouvin-Marche E, Viret C, Faure M, Perron H, Marche PN. The envelope protein of a human endogenous retrovirus-W family activates innate immunity through CD14/TLR4 and promotes Th1-like responses. J Immunol [Internet]. 2006;176(12):7636–44.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14326	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441796 - MICHELLY DAMASCENO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Decio Gilberto Natrielli Filho	Carolina Nunes Franca	
<b>TITULO</b>	Análise de perfil de expressão de retrovírus endógenos humanos associada a esquizofrenia			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Esquizofrenia é um transtorno mental sem etiologia biológica conhecida, que afeta pessoas no mundo todo, com sintomas de psicose ao longo da vida, os pacientes são diagnosticados por volta da segunda década de vida. Estudos aponta índices de resposta inflamatória durante o desenvolvimento da esquizofrenia, e postula-se que os retrovírus endógenos humanos possam ter um papel na imunopatogênese da doença. Os HERVs são elementos presentes em 8% do genoma humano, esses retrovírus eram vírus exógenos, que foram endogenizados a milhares de anos, e hoje sabemos que esses vírus são expressos em doenças de caráter inflamatório como artrite reumatoide, esclerose múltipla e diabetes tipo 1, assim como em esquizofrenia.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a expressão dos retrovírus endógenos na esquizofrenia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para isso foi realizado um estudo transversal do tipo caso controle com 29 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e 46 saudáveis, foram submetidos a uma coleta de sangue para análise e amplificação de material através de RT-PCR para avaliar o perfil de expressão dos retrovírus endógenos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A análise de expressão de Herv-W por PCR em tempo real mostrou que, dos indivíduos participantes todos expressavam em suas células moléculas de Herv-W, porém, quando comparado o grupo com esquizofrenia ao grupo controle há uma diferença de aproximadamente 4 vezes mais, sendo assim foi identificado que o grupo de paciente com esquizofrenia expressa (#38)#8773; 4 vezes mais em comparação com a expressão basal do grupo controle. Os resultados encontrados na análise de expressão corroboram estudos anteriores que apontam níveis de HERV-W elevados em soro de pacientes com esquizofrenia em comparação ao grupo controle. levantando dessa forma, uma possível evidencia imunopatologia dos retrovírus na fisiopatologia da esquizofrenia, porém apenas com a análises de expressão do HERV-W, não se é possível identificar qual o mecanismo mediado por esses elementos, a hipótese principal de mimetismo molecular é ainda, a mais coerente, devido ao resultado apresentado de expressão relacionado a pacientes saudáveis, o que mostra alta concentração de moléculas que deveriam estar silenciadas como visto no grupo controle, sendo expressas a nível molecular na esquizofrenia.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados da análise de expressão do HERV-W indicam forte perfil imunopatogenico nos pacientes com esquizofrenia, além de grande atividade transcricional desses elementos, enquanto nos indivíduos sem o quadro da doença é visto uma expressão a nível basal, mostrando que não há atividade exacerbada desses retroelementos fora do quadro de esquizofrenia.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Perron H, Lang A. The human endogenous retrovirus link between genes and environment in multiple sclerosis and in multifactorial diseases associating neuroinflammation. Clin Rev Allergy Immunol [Internet]. 2010;39(1):51–61. Perron H, Mekaoui L, Bernard C, Veas F, Stefas I, Leboyer M. Endogenous retrovirus type W GAG and envelope protein antigenemia in serum of schizophrenic patients. Biol Psychiatry [Internet]. 2008;64(12):1019–23. Rolland A, Jouvin-Marche E, Viret C, Faure M, Perron H, Marche PN. The envelope protein of a human endogenous retrovirus-W family activates innate immunity through CD14/TLR4 and promotes Th1-like responses. J Immunol [Internet]. 2006;176(12):7636–44.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14329	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3852547 - SAMANTHA HORTA MARTINS DE ALCANTARA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Paula Ribeiro	Luiz Henrique da Silva Nali	
<b>TITULO</b>	ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS DA FAMÍLIA K E W E OS PARÂMETROS DE MARCHA E EQUILÍBRIO EM INDIVÍDUOS COM ARTRITE REUMATOIDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O genoma humano contém muitas sequências retrovirais endógenas, cerca de 8% são retrovírus endógenos humanos (HERVs), que representam remanescentes de infecções retrovirais ancestrais que se fixaram no DNA germinativo e tem herança mendeliana. Os HERVs agem nos mecanismos de autoimunidade que vão desde o mimetismo molecular até a ativação de sensores intracelulares por RNA viral e modulação epigenética de genes de resposta imune e podem estar associados a patogênese de algumas doenças autoimunes e neurológicas. Entre elas a Artrite Reumatoide AR, uma doença inflamatória crônica caracterizada por poliartrite periférica e deformidades articulares e incapacidade funcional, consequentemente disfunções de marcha e oscilação de equilíbrio. O HERV-K e HERV-W, foram cotados como possíveis agentes etiológicos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a correlação entre os níveis de expressão de Retrovírus Endógenos Humanos HERVs, da família (HERV-K e HERV-W) e os parâmetros de marcha e equilíbrio em indivíduos com Artrite Reumatoide – AR			
<b>METODOLOGIA</b>	Um total de indivíduos (N=66), divididos entre 2 grupos. O primeiro grupo de indivíduos com Artrite Reumatoide - GAR (N=22) e o segundo, o grupo controle, com indivíduos saudáveis - GC (N=44). Os leucócitos serão submetidos à análise por PCR em Tempo Real para investigação da expressão de HERV-K e HERV-W por quantificação relativa pelo método de $-2^{-(\#38)\#916;(\#38)\#916;Ct}$ . Os dados da avaliação de marcha do GAR (n=22) e do GC (N=10), englobará a utilização da passarela de 20 metros com cadência auto-selecionada; Frequência de amostragem de 100 Hz; com Média de coleta: 6 passos de cada lado do pé (D e E) e plataforma de pressão localizada no centro da passarela e resultados da avaliação do equilíbrio, com percepção da oscilação corporal e avaliação de 4 regiões do pé (Antepé; Mediopé; Retropé medial e lateral). Dados serão correlacionados, por estatística quantitativa e qualitativa. Local: URC e LABIREM, na Universidade Santo Amaro- UNISA			
<b>RESULTADOS</b>	O grupo com artrite reumatoide, GAR- expressa HERV-K de forma basal. valores em sua maioria estão entre 0 e 1. Comparando os dois grupos podemos observar que o grupo com Artrite reumatoide, GAR, expressa em média duas vezes mais o HERV-W do que o grupo controle, GC (p(#60)0,01).			
<b>CONCLUSOES</b>	Como perspectiva espera-se realizar as análises dos parametros de marcha com os níveis de expressão de HERV-W que mostraram-se mais elevados em pacientes com Artrite Reumatoide.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Griffiths, D. J. (2001). Endogenous retroviruses in the human genome sequence. <a href="http://genomebiology.com/2001/2/6/reviews/1017">http://genomebiology.com/2001/2/6/reviews/1017</a> 2. Nali, Luiz Henrique da Silva. Perfil da expressão dos retrovírus endógenos humanos da família W em pacientes com esclerose múltipla [tese]. São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo; 2018. doi:10.11606/T.99.2018.tde-26042018-115451. 3. Jaqueline Koerich, Karen Kowalski Armanini e Rodrigo da Rosa Iop et al. Avaliação do equilíbrio corporal de pacientes com artrite reumatoide. Fisioter. Pesqui. 2013. Vol. 20(4):336-342. DOI:10.1590/S1809-29502013000400006 fisioterapia.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14331	Administração Financeira	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4060121 - FELLIPH JORDAN MORENO RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	A contabilidade, enquanto ciência que se propõe a fornecer informações sobre uma entidade aos seus usuários, historicamente recorreu a métodos e ferramentas para assegurar a entrega apropriada dos dados. Segundo Iudicibus e Marion (2007, p 32), "a contabilidade existe desde os povos mais primitivos, em função da necessidade de controlar, medir e preservar o patrimônio família, e, até mesmo, em função de trocar bens para maior satisfação das pessoas".			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como tema "os impactos da tecnologia na contabilidade" com o objetivo de investigar a revolução dos processos tradicionais de contabilidade através das novas tecnologias disponíveis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado uma metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória com a finalidade de examinar a evolução da contabilidade ao longo do tempo, utilizando o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) como um caso exemplar.			
<b>RESULTADOS</b>	Diante das evoluções tecnológicas, é importante ressaltar que as autoridades fiscais também estão se adaptando, buscando expandir seu alcance, reduzir custos, agilizar o atendimento aos contribuintes e diminuir os prazos de resposta. No entanto, essa modernização também resulta em novas responsabilidades para os profissionais da contabilidade. Neste contexto, entre as ferramentas desenvolvidas pelo Fisco para atender à demanda de modernização das práticas contábeis, destaca-se o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), uma iniciativa da Receita Federal do Brasil. O SPED foi concebido com o propósito de aprimorar e agilizar o cumprimento das obrigações acessórias que os contribuintes devem transmitir às autoridades fiscais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que a era digital na contabilidade oferece vários mecanismos e oportunidades significativas, mas também demanda uma adaptação permanente e concentração aprofundada das variações tecnológicas. Como em toda área do conhecimento, o importante é que o profissional não pare de se atualizar e continue buscando se aperfeiçoar e se aprimorar, não somente com relação aos conhecimentos contábeis, como também sobre assuntos que mesmo que de uma forma indireta se relacionam com a contabilidade, como por exemplo, a tecnologia. Assim, por mais que haja a modernização dos sistemas, mas a sua utilização é sempre feita para seres humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	- IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2017 - YOUNG, Lúcia Helena Briski. SPED Sistema Público de Escrituração Digital. Curitiba: Juruá, 2009 - MALAVAZI, Rodrigo. Escrita e contabilidade: evolução. Portal educação. Disponível em: <a href="https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181">https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181</a> . Acesso em 04/10/2023 às 15horas e 20minutos. - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Sistema Público De Escrituração Digital: Histórico. Disponível em: <a href="http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966">http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966</a> . Acesso em 04/10/2023 as 19horas e 02 minutos			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14331	Administração Financeira	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4323599 - ÉVELYN THAISSA DA FONSECA LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE			
<b>INTRODUCA O</b>	A contabilidade, enquanto ciência que se propõe a fornecer informações sobre uma entidade aos seus usuários, historicamente recorreu a métodos e ferramentas para assegurar a entrega apropriada dos dados. Segundo Iudicibus e Marion (2007, p 32), "a contabilidade existe desde os povos mais primitivos, em função da necessidade de controlar, medir e preservar o patrimônio família, e, até mesmo, em função de trocar bens para maior satisfação das pessoas".			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como tema "os impactos da tecnologia na contabilidade" com o objetivo de investigar a revolução dos processos tradicionais de contabilidade através das novas tecnologias disponíveis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado uma metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória com a finalidade de examinar a evolução da contabilidade ao longo do tempo, utilizando o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) como um caso exemplar.			
<b>RESULTADO S</b>	Diante das evoluções tecnológicas, é importante ressaltar que as autoridades fiscais também estão se adaptando, buscando expandir seu alcance, reduzir custos, agilizar o atendimento aos contribuintes e diminuir os prazos de resposta. No entanto, essa modernização também resulta em novas responsabilidades para os profissionais da contabilidade. Neste contexto, entre as ferramentas desenvolvidas pelo Fisco para atender à demanda de modernização das práticas contábeis, destaca-se o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), uma iniciativa da Receita Federal do Brasil. O SPED foi concebido com o propósito de aprimorar e agilizar o cumprimento das obrigações acessórias que os contribuintes devem transmitir às autoridades fiscais.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Concluímos que a era digital na contabilidade oferece vários mecanismos e oportunidades significativas, mas também demanda uma adaptação permanente e concentração aprofundada das variações tecnológicas. Como em toda área do conhecimento, o importante é que o profissional não pare de se atualizar e continue buscando se aperfeiçoar e se aprimorar, não somente com relação aos conhecimentos contábeis, como também sobre assuntos que mesmo que de uma forma indireta se relacionam com a contabilidade, como por exemplo, a tecnologia. Assim, por mais que haja a modernização dos sistemas, mas a sua utilização é sempre feita para seres humanos.			
<b>REFERENCIA S</b>	- IUDICÍBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2017 - YOUNG, Lúcia Helena Briski. SPED Sistema Público de Escrituração Digital. Curitiba: Juruá, 2009 - MALAVAZI, Rodrigo. Escrita e contabilidade: evolução. Portal educação. Disponível em: <a href="https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181">https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181</a> . Acesso em 04/10/2023 às 15horas e 20minutos. - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Sistema Público De Escrituração Digital: Histórico. Disponível em: <a href="http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966">http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966</a> . Acesso em 04/10/2023 as 19horas e 02 minutos			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14331	Administração Financeira	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4363361 - TREYCIANE DE SOUSA FIGUEIREDO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	A contabilidade, enquanto ciência que se propõe a fornecer informações sobre uma entidade aos seus usuários, historicamente recorreu a métodos e ferramentas para assegurar a entrega apropriada dos dados. Segundo Iudicibus e Marion (2007, p 32), "a contabilidade existe desde os povos mais primitivos, em função da necessidade de controlar, medir e preservar o patrimônio família, e, até mesmo, em função de trocar bens para maior satisfação das pessoas".			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como tema "os impactos da tecnologia na contabilidade" com o objetivo de investigar a revolução dos processos tradicionais de contabilidade através das novas tecnologias disponíveis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado uma metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória com a finalidade de examinar a evolução da contabilidade ao longo do tempo, utilizando o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) como um caso exemplar.			
<b>RESULTADOS</b>	Diante das evoluções tecnológicas, é importante ressaltar que as autoridades fiscais também estão se adaptando, buscando expandir seu alcance, reduzir custos, agilizar o atendimento aos contribuintes e diminuir os prazos de resposta. No entanto, essa modernização também resulta em novas responsabilidades para os profissionais da contabilidade. Neste contexto, entre as ferramentas desenvolvidas pelo Fisco para atender à demanda de modernização das práticas contábeis, destaca-se o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), uma iniciativa da Receita Federal do Brasil. O SPED foi concebido com o propósito de aprimorar e agilizar o cumprimento das obrigações acessórias que os contribuintes devem transmitir às autoridades fiscais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que a era digital na contabilidade oferece vários mecanismos e oportunidades significativas, mas também demanda uma adaptação permanente e concentração aprofundada das variações tecnológicas. Como em toda área do conhecimento, o importante é que o profissional não pare de se atualizar e continue buscando se aperfeiçoar e se aprimorar, não somente com relação aos conhecimentos contábeis, como também sobre assuntos que mesmo que de uma forma indireta se relacionam com a contabilidade, como por exemplo, a tecnologia. Assim, por mais que haja a modernização dos sistemas, mas a sua utilização é sempre feita para seres humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	- IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2017 - YOUNG, Lúcia Helena Briski. SPED Sistema Público de Escrituração Digital. Curitiba: Juruá, 2009 - MALAVAZI, Rodrigo. Escrita e contabilidade: evolução. Portal educação. Disponível em: <a href="https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181">https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181</a> . Acesso em 04/10/2023 às 15horas e 20minutos. - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Sistema Público De Escrituração Digital: Histórico. Disponível em: <a href="http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966">http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966</a> . Acesso em 04/10/2023 as 19horas e 02 minutos			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14331	Administração Financeira	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4377699 - ANDRYEL JONES SILVA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	A contabilidade, enquanto ciência que se propõe a fornecer informações sobre uma entidade aos seus usuários, historicamente recorreu a métodos e ferramentas para assegurar a entrega apropriada dos dados. Segundo Iudicibus e Marion (2007, p 32), "a contabilidade existe desde os povos mais primitivos, em função da necessidade de controlar, medir e preservar o patrimônio família, e, até mesmo, em função de trocar bens para maior satisfação das pessoas".			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como tema "os impactos da tecnologia na contabilidade" com o objetivo de investigar a revolução dos processos tradicionais de contabilidade através das novas tecnologias disponíveis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado uma metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória com a finalidade de examinar a evolução da contabilidade ao longo do tempo, utilizando o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) como um caso exemplar.			
<b>RESULTADOS</b>	Diante das evoluções tecnológicas, é importante ressaltar que as autoridades fiscais também estão se adaptando, buscando expandir seu alcance, reduzir custos, agilizar o atendimento aos contribuintes e diminuir os prazos de resposta. No entanto, essa modernização também resulta em novas responsabilidades para os profissionais da contabilidade. Neste contexto, entre as ferramentas desenvolvidas pelo Fisco para atender à demanda de modernização das práticas contábeis, destaca-se o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), uma iniciativa da Receita Federal do Brasil. O SPED foi concebido com o propósito de aprimorar e agilizar o cumprimento das obrigações acessórias que os contribuintes devem transmitir às autoridades fiscais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que a era digital na contabilidade oferece vários mecanismos e oportunidades significativas, mas também demanda uma adaptação permanente e concentração aprofundada das variações tecnológicas. Como em toda área do conhecimento, o importante é que o profissional não pare de se atualizar e continue buscando se aperfeiçoar e se aprimorar, não somente com relação aos conhecimentos contábeis, como também sobre assuntos que mesmo que de uma forma indireta se relacionam com a contabilidade, como por exemplo, a tecnologia. Assim, por mais que haja a modernização dos sistemas, mas a sua utilização é sempre feita para seres humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	- IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2017 - YOUNG, Lúcia Helena Briski. SPED Sistema Público de Escrituração Digital. Curitiba: Juruá, 2009 - MALAVAZI, Rodrigo. Escrita e contabilidade: evolução. Portal educação. Disponível em: <a href="https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181">https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181</a> . Acesso em 04/10/2023 às 15horas e 20minutos. - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Sistema Público De Escrituração Digital: Histórico. Disponível em: <a href="http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966">http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966</a> . Acesso em 04/10/2023 as 19horas e 02 minutos			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14331	Administração Financeira	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4390130 - SINDI SOARES ROCHA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	A contabilidade, enquanto ciência que se propõe a fornecer informações sobre uma entidade aos seus usuários, historicamente recorreu a métodos e ferramentas para assegurar a entrega apropriada dos dados. Segundo Iudicibus e Marion (2007, p 32), "a contabilidade existe desde os povos mais primitivos, em função da necessidade de controlar, medir e preservar o patrimônio família, e, até mesmo, em função de trocar bens para maior satisfação das pessoas".			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como tema "os impactos da tecnologia na contabilidade" com o objetivo de investigar a revolução dos processos tradicionais de contabilidade através das novas tecnologias disponíveis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado uma metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória com a finalidade de examinar a evolução da contabilidade ao longo do tempo, utilizando o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) como um caso exemplar.			
<b>RESULTADOS</b>	Diante das evoluções tecnológicas, é importante ressaltar que as autoridades fiscais também estão se adaptando, buscando expandir seu alcance, reduzir custos, agilizar o atendimento aos contribuintes e diminuir os prazos de resposta. No entanto, essa modernização também resulta em novas responsabilidades para os profissionais da contabilidade. Neste contexto, entre as ferramentas desenvolvidas pelo Fisco para atender à demanda de modernização das práticas contábeis, destaca-se o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), uma iniciativa da Receita Federal do Brasil. O SPED foi concebido com o propósito de aprimorar e agilizar o cumprimento das obrigações acessórias que os contribuintes devem transmitir às autoridades fiscais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que a era digital na contabilidade oferece vários mecanismos e oportunidades significativas, mas também demanda uma adaptação permanente e concentração aprofundada das variações tecnológicas. Como em toda área do conhecimento, o importante é que o profissional não pare de se atualizar e continue buscando se aperfeiçoar e se aprimorar, não somente com relação aos conhecimentos contábeis, como também sobre assuntos que mesmo que de uma forma indireta se relacionam com a contabilidade, como por exemplo, a tecnologia. Assim, por mais que haja a modernização dos sistemas, mas a sua utilização é sempre feita para seres humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	- IUDICÍBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2017 - YOUNG, Lúcia Helena Briski. SPED Sistema Público de Escrituração Digital. Curitiba: Juruá, 2009 - MALAVAZI, Rodrigo. Escrita e contabilidade: evolução. Portal educação. Disponível em: <a href="https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181">https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/escrita-e-contabilidade-evolucao/20181</a> . Acesso em 04/10/2023 às 15horas e 20minutos. - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Sistema Público De Escrituração Digital: Histórico. Disponível em: <a href="http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966">http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966</a> . Acesso em 04/10/2023 as 19horas e 02 minutos			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14334	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4134222 - BEATRIZ CARLA ALVES SANTOS VELOSO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL NA ABORDAGEM DA SÍFILIS CONGÊNITA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	A sífilis é uma doença infecto-contagiosa crônica. A sífilis congênita é a infecção do feto pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida por via placentária, em qualquer momento da gestação <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) na abordagem da sífilis congênita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de gestão em saúde coletiva, obrigatória no 7º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de fevereiro de 2023 a junho de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A proposta de intervenção do PES se baseia na criação de um mapa gestacional e realização de busca ativa de Gestantes na região de forma concomitante, sendo possível assim, identificar os determinantes sociais de saúde dessas mulheres, compreender estilo de vida e complicações na adesão ao tratamento, buscando a melhor forma de intervenção para o manejo individual da situação de cada paciente, realizando um trabalho em equipe com a colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) <sup>2</sup> . Dentre outras propostas elaboradas, também foi sugerido a criação de grupos de gestantes para acompanhamento contínuo da gestação e implementação de campanhas de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque na sífilis que apresenta maior crescimento de contágio, visto que dados epidemiológicos nacionais destacam que em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil casos de sífilis adquirida (taxa de detecção de 78,5 por 100 mil habitantes), 74 mil casos em gestantes (taxa de 27,1 por 1 mil nascidos vivos), 27 mil casos de sífilis congênita (taxa de 9,9 por 1 mil nascidos vivos menores de um ano) e 192 óbitos por sífilis congênita (taxa de 7,0 por 100 mil nascidos vivos) <sup>3</sup> . Para a melhoria das ações, foi sugerido a criação de grupos operativos sobre ISTs e busca ativa de parceiros das pessoas infectadas para o rompimento do ciclo de contágio. Para controle de tratamento, a proposta é criar uma planilha com o número de infectados organizados por região, idade, sexo, escolaridade, parceiros em período de 1 ano e razão do abandono. Isso permitirá análises estatísticas para identificar a principal causa de abandono, rever condutas anteriores e desenvolver novas propostas <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle e combate à sífilis gestacional como método de proteção e prevenção de agravos ao feto exposto a infecção, por meio do Planejamento Estratégico Situacional(PES).			
<b>REFERENCIAS</b>	1. AVELEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2006, v. 81, n. 2, p. 111-126, maio 2006. 2. Horácio Pereira de; Campos, Francisco Carlos Cardoso de; Santos, Max André dos. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018. 3. BRASIL, Ministério da Saúde. Sífilis: entenda o que é, qual a prevenção e o tratamento disponível no SUS; 10 nov 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14334	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4353366 - ELLEN PESSOA FRANCO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL NA ABORDAGEM DA SÍFILIS CONGÊNITA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	A sífilis é uma doença infecto-contagiosa crônica. A sífilis congênita é a infecção do feto pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida por via placentária, em qualquer momento da gestação <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) na abordagem da sífilis congênita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de gestão em saúde coletiva, obrigatória no 7º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de fevereiro de 2023 a junho de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A proposta de intervenção do PES se baseia na criação de um mapa gestacional e realização de busca ativa de Gestantes na região de forma concomitante, sendo possível assim, identificar os determinantes sociais de saúde dessas mulheres, compreender estilo de vida e complicações na adesão ao tratamento, buscando a melhor forma de intervenção para o manejo individual da situação de cada paciente, realizando um trabalho em equipe com a colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) <sup>2</sup> . Dentre outras propostas elaboradas, também foi sugerido a criação de grupos de gestantes para acompanhamento contínuo da gestação e implementação de campanhas de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque na sífilis que apresenta maior crescimento de contágio, visto que dados epidemiológicos nacionais destacam que em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil casos de sífilis adquirida (taxa de detecção de 78,5 por 100 mil habitantes), 74 mil casos em gestantes (taxa de 27,1 por 1 mil nascidos vivos), 27 mil casos de sífilis congênita (taxa de 9,9 por 1 mil nascidos vivos menores de um ano) e 192 óbitos por sífilis congênita (taxa de 7,0 por 100 mil nascidos vivos) <sup>3</sup> . Para a melhoria das ações, foi sugerido a criação de grupos operativos sobre ISTs e busca ativa de parceiros das pessoas infectadas para o rompimento do ciclo de contágio. Para controle de tratamento, a proposta é criar uma planilha com o número de infectados organizados por região, idade, sexo, escolaridade, parceiros em período de 1 ano e razão do abandono. Isso permitirá análises estatísticas para identificar a principal causa de abandono, rever condutas anteriores e desenvolver novas propostas <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle e combate à sífilis gestacional como método de proteção e prevenção de agravos ao feto exposto a infecção, por meio do Planejamento Estratégico Situacional(PES).			
<b>REFERENCIAS</b>	1. AVELEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2006, v. 81, n. 2, p. 111-126, maio 2006. 2. Horácio Pereira de; Campos, Francisco Carlos Cardoso de; Santos, Max André dos. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018. 3. BRASIL, Ministério da Saúde. Sífilis: entenda o que é, qual a prevenção e o tratamento disponível no SUS; 10 nov 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14334	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382595 - STEFANY MOREIRA ALEIXO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL NA ABORDAGEM DA SÍFILIS CONGÊNITA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	A sífilis é uma doença infecto-contagiosa crônica. A sífilis congênita é a infecção do feto pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida por via placentária, em qualquer momento da gestação <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) na abordagem da sífilis congênita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de gestão em saúde coletiva, obrigatória no 7º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de fevereiro de 2023 a junho de 2023.			
<b>RESULTADO S</b>	A proposta de intervenção do PES se baseia na criação de um mapa gestacional e realização de busca ativa de Gestantes na região de forma concomitante, sendo possível assim, identificar os determinantes sociais de saúde dessas mulheres, compreender estilo de vida e complicações na adesão ao tratamento, buscando a melhor forma de intervenção para o manejo individual da situação de cada paciente, realizando um trabalho em equipe com a colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) <sup>2</sup> . Dentre outras propostas elaboradas, também foi sugerido a criação de grupos de gestantes para acompanhamento contínuo da gestação e implementação de campanhas de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque na sífilis que apresenta maior crescimento de contágio, visto que dados epidemiológicos nacionais destacam que em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil casos de sífilis adquirida (taxa de detecção de 78,5 por 100 mil habitantes), 74 mil casos em gestantes (taxa de 27,1 por 1 mil nascidos vivos), 27 mil casos de sífilis congênita (taxa de 9,9 por 1 mil nascidos vivos menores de um ano) e 192 óbitos por sífilis congênita (taxa de 7,0 por 100 mil nascidos vivos) <sup>3</sup> . Para a melhoria das ações, foi sugerido a criação de grupos operativos sobre ISTs e busca ativa de parceiros das pessoas infectadas para o rompimento do ciclo de contágio. Para controle de tratamento, a proposta é criar uma planilha com o número de infectados organizados por região, idade, sexo, escolaridade, parceiros em período de 1 ano e razão do abandono. Isso permitirá análises estatísticas para identificar a principal causa de abandono, rever condutas anteriores e desenvolver novas propostas <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle e combate à sífilis gestacional como método de proteção e prevenção de agravos ao feto exposto a infecção, por meio do Planejamento Estratégico Situacional(PES).			
<b>REFERENCIA S</b>	1. AVELEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2006, v. 81, n. 2, p. 111-126, maio 2006. 2. Horácio Pereira de; Campos, Francisco Carlos Cardoso de; Santos, Max André dos. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018. 3. BRASIL, Ministério da Saúde. Sífilis: entenda o que é, qual a prevenção e o tratamento disponível no SUS; 10 nov 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14334	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4420543 - ELLEN VITORIA DE HOLANDA MOTTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL NA ABORDAGEM DA SÍFILIS CONGÊNITA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	A sífilis é uma doença infecto-contagiosa crônica. A sífilis congênita é a infecção do feto pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida por via placentária, em qualquer momento da gestação <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) na abordagem da sífilis congênita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de gestão em saúde coletiva, obrigatória no 7º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de fevereiro de 2023 a junho de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A proposta de intervenção do PES se baseia na criação de um mapa gestacional e realização de busca ativa de Gestantes na região de forma concomitante, sendo possível assim, identificar os determinantes sociais de saúde dessas mulheres, compreender estilo de vida e complicações na adesão ao tratamento, buscando a melhor forma de intervenção para o manejo individual da situação de cada paciente, realizando um trabalho em equipe com a colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) <sup>2</sup> . Dentre outras propostas elaboradas, também foi sugerido a criação de grupos de gestantes para acompanhamento contínuo da gestação e implementação de campanhas de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque na sífilis que apresenta maior crescimento de contágio, visto que dados epidemiológicos nacionais destacam que em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil casos de sífilis adquirida (taxa de detecção de 78,5 por 100 mil habitantes), 74 mil casos em gestantes (taxa de 27,1 por 1 mil nascidos vivos), 27 mil casos de sífilis congênita (taxa de 9,9 por 1 mil nascidos vivos menores de um ano) e 192 óbitos por sífilis congênita (taxa de 7,0 por 100 mil nascidos vivos) <sup>3</sup> . Para a melhoria das ações, foi sugerido a criação de grupos operativos sobre ISTs e busca ativa de parceiros das pessoas infectadas para o rompimento do ciclo de contágio. Para controle de tratamento, a proposta é criar uma planilha com o número de infectados organizados por região, idade, sexo, escolaridade, parceiros em período de 1 ano e razão do abandono. Isso permitirá análises estatísticas para identificar a principal causa de abandono, rever condutas anteriores e desenvolver novas propostas <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle e combate à sífilis gestacional como método de proteção e prevenção de agravos ao feto exposto a infecção, por meio do Planejamento Estratégico Situacional(PES).			
<b>REFERENCIAS</b>	1. AVELEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2006, v. 81, n. 2, p. 111-126, maio 2006. 2. Horácio Pereira de; Campos, Francisco Carlos Cardoso de; Santos, Max André dos. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018. 3. BRASIL, Ministério da Saúde. Sífilis: entenda o que é, qual a prevenção e o tratamento disponível no SUS; 10 nov 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14336	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4448944 - MACGREGOR ARAUJO SEVERIANO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PRINCIPAIS MOTIVOS DA BAIXA COBERTURA DA AMPI-AB SEGUNDO EXPERIÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL			
<b>INTRODUCAO</b>	Na Atenção Primária à Saúde é preconizado que a principal estratégia para prevenção de agravos na população idosa seja a avaliação das capacidades funcionais do idoso, por meio da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI-AB)1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência na elaboração de um Planejamento Estratégico Situacional para a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa realizada durante o 7º semestre da graduação de enfermagem, na disciplina de Gestão em Saúde Coletiva, com enfoque em desenvolver um Plano de Ação voltado à baixa cobertura da AMPI na Atenção Básica de Saúde.			
<b>RESULTADOS</b>	Através da realização do diagrama de Ishikawa, foram identificados e selecionados os nós críticos que resultam na baixa cobertura da AMPI, sendo eles: má gestão do tempo, segurança, demanda de trabalho, horários inacessíveis para visita domiciliar, ambiente e localidade, resistência da família ou tutor, e falta de desenho do perfil populacional. Como forma de solução para estes nós críticos, a elaboração do plano operativo se deu em propor melhorar a gestão do tempo, reestruturando a agenda de enfermagem contemplando horários e dias que favoreçam as visitas domiciliares, ou a realização da educação em saúde para tornar a equipe mais bem capacitada para a realização da AMPI. Outra forma de otimizar o tempo e aplicações, seria oportunamente utilizar das reuniões e grupos como do programa de Automonitoramento Glicêmico para aplicar a AMPI. Realizar a contratação de novos funcionários para que a demanda de trabalho seja mais adequada facilitando a reestruturação da agenda do enfermeiro. Realizar a busca ativa em redes de apoio como igrejas, bares e centros comunitários, fortalecendo assim os vínculos da UBS com a população, sempre reforçando a importância da avaliação. A implementação de mapa vivo como uma ferramenta para dimensionar e conhecer os idosos ou utilizando de informações em outros serviços da UBS como farmácia, curativos, sala de vacina e que permitam levantar informações a respeito de idosos que apresentem fatores de risco, para criar uma priorização nas aplicações para os idosos que apresentem maiores vulnerabilidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base no desenvolvimento do planejamento, é válido concluir que somente com a existência de equipamentos e fluxos adequados para atender as necessidades desta população será possível garantir a qualidade do atendimento. As experiências aqui relatadas mostram como é possível enfrentar estes desafios com os recursos disponíveis no SUS, de maneira inovadora e assertiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. São Paulo. Secretaria da Saúde. Documento Norteador: Unidade De Referência À Saúde Do Idoso URSI. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Coordenação da Atenção Básica, Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa. São Paulo: SMS, 2016. 127 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf</a> 2. São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Manual Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica AMPI-AB. Prefeitura Da Cidade De São Paulo, Secretaria Municipal De Saúde. São Paulo, 2021. 48 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf</a> 3. Machado DR, Kimura M, Duarte YA de O, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil. Ciência saúde coletiva [Internet]. 2020Mar;25(3):1119–28. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018">https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14336	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517504 - VICTOR CARLOS ALVES PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PRINCIPAIS MOTIVOS DA BAIXA COBERTURA DA AMPI-AB SEGUNDO EXPERIÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL			
<b>INTRODUCAO</b>	Na Atenção Primária à Saúde é preconizado que a principal estratégia para prevenção de agravos na população idosa seja a avaliação das capacidades funcionais do idoso, por meio da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI-AB)1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência na elaboração de um Planejamento Estratégico Situacional para a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa realizada durante o 7º semestre da graduação de enfermagem, na disciplina de Gestão em Saúde Coletiva, com enfoque em desenvolver um Plano de Ação voltado à baixa cobertura da AMPI na Atenção Básica de Saúde.			
<b>RESULTADOS</b>	Através da realização do diagrama de Ishikawa, foram identificados e selecionados os nós críticos que resultam na baixa cobertura da AMPI, sendo eles: má gestão do tempo, segurança, demanda de trabalho, horários inacessíveis para visita domiciliar, ambiente e localidade, resistência da família ou tutor, e falta de desenho do perfil populacional. Como forma de solução para estes nós críticos, a elaboração do plano operativo se deu em propor melhorar a gestão do tempo, reestruturando a agenda de enfermagem contemplando horários e dias que favoreçam as visitas domiciliares, ou a realização da educação em saúde para tornar a equipe mais bem capacitada para a realização da AMPI. Outra forma de otimizar o tempo e aplicações, seria oportunamente utilizar das reuniões e grupos como do programa de Automonitoramento Glicêmico para aplicar a AMPI. Realizar a contratação de novos funcionários para que a demanda de trabalho seja mais adequada facilitando a reestruturação da agenda do enfermeiro. Realizar a busca ativa em redes de apoio como igrejas, bares e centros comunitários, fortalecendo assim os vínculos da UBS com a população, sempre reforçando a importância da avaliação. A implementação de mapa vivo como uma ferramenta para dimensionar e conhecer os idosos ou utilizando de informações em outros serviços da UBS como farmácia, curativos, sala de vacina e que permitam levantar informações a respeito de idosos que apresentem fatores de risco, para criar uma priorização nas aplicações para os idosos que apresentem maiores vulnerabilidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base no desenvolvimento do planejamento, é válido concluir que somente com a existência de equipamentos e fluxos adequados para atender as necessidades desta população será possível garantir a qualidade do atendimento. As experiências aqui relatadas mostram como é possível enfrentar estes desafios com os recursos disponíveis no SUS, de maneira inovadora e assertiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. São Paulo. Secretaria da Saúde. Documento Norteador: Unidade De Referência À Saúde Do Idoso URSI. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Coordenação da Atenção Básica, Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa. São Paulo: SMS, 2016. 127 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf</a> 2. São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Manual Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica AMPI-AB. Prefeitura Da Cidade De São Paulo, Secretaria Municipal De Saúde. São Paulo, 2021. 48 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf</a> 3. Machado DR, Kimura M, Duarte YA de O, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil. Ciência saúde coletiva [Internet]. 2020Mar;25(3):1119–28. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018">https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14336	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4536517 - ZILEIDE RIBEIRO DE MALTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PRINCIPAIS MOTIVOS DA BAIXA COBERTURA DA AMPI-AB SEGUNDO EXPERIÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL			
<b>INTRODUCAO</b>	Na Atenção Primária à Saúde é preconizado que a principal estratégia para prevenção de agravos na população idosa seja a avaliação das capacidades funcionais do idoso, por meio da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI-AB)1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência na elaboração de um Planejamento Estratégico Situacional para a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa realizada durante o 7º semestre da graduação de enfermagem, na disciplina de Gestão em Saúde Coletiva, com enfoque em desenvolver um Plano de Ação voltado à baixa cobertura da AMPI na Atenção Básica de Saúde.			
<b>RESULTADOS</b>	Através da realização do diagrama de Ishikawa, foram identificados e selecionados os nós críticos que resultam na baixa cobertura da AMPI, sendo eles: má gestão do tempo, segurança, demanda de trabalho, horários inacessíveis para visita domiciliar, ambiente e localidade, resistência da família ou tutor, e falta de desenho do perfil populacional. Como forma de solução para estes nós críticos, a elaboração do plano operativo se deu em propor melhorar a gestão do tempo, reestruturando a agenda de enfermagem contemplando horários e dias que favoreçam as visitas domiciliares, ou a realização da educação em saúde para tornar a equipe mais bem capacitada para a realização da AMPI. Outra forma de otimizar o tempo e aplicações, seria oportunamente utilizar das reuniões e grupos como do programa de Automonitoramento Glicêmico para aplicar a AMPI. Realizar a contratação de novos funcionários para que a demanda de trabalho seja mais adequada facilitando a reestruturação da agenda do enfermeiro. Realizar a busca ativa em redes de apoio como igrejas, bares e centros comunitários, fortalecendo assim os vínculos da UBS com a população, sempre reforçando a importância da avaliação. A implementação de mapa vivo como uma ferramenta para dimensionar e conhecer os idosos ou utilizando de informações em outros serviços da UBS como farmácia, curativos, sala de vacina e que permitam levantar informações a respeito de idosos que apresentem fatores de risco, para criar uma priorização nas aplicações para os idosos que apresentem maiores vulnerabilidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base no desenvolvimento do planejamento, é válido concluir que somente com a existência de equipamentos e fluxos adequados para atender as necessidades desta população será possível garantir a qualidade do atendimento. As experiências aqui relatadas mostram como é possível enfrentar estes desafios com os recursos disponíveis no SUS, de maneira inovadora e assertiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. São Paulo. Secretaria da Saúde. Documento Norteador: Unidade De Referência À Saúde Do Idoso URSI. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Coordenação da Atenção Básica, Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa. São Paulo: SMS, 2016. 127 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf</a> 2. São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Manual Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica AMPI-AB. Prefeitura Da Cidade De São Paulo, Secretaria Municipal De Saúde. São Paulo, 2021. 48 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf</a> 3. Machado DR, Kimura M, Duarte YA de O, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil. Ciência saúde coletiva [Internet]. 2020Mar;25(3):1119–28. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018">https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14336	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577396 - INGRID RIBEIRO GONÇALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	PRINCIPAIS MOTIVOS DA BAIXA COBERTURA DA AMPI-AB SEGUNDO EXPERIÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL			
<b>INTRODUCAO</b>	Na Atenção Primária à Saúde é preconizado que a principal estratégia para prevenção de agravos na população idosa seja a avaliação das capacidades funcionais do idoso, por meio da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI-AB)1,2,3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência na elaboração de um Planejamento Estratégico Situacional para a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa realizada durante o 7º semestre da graduação de enfermagem, na disciplina de Gestão em Saúde Coletiva, com enfoque em desenvolver um Plano de Ação voltado à baixa cobertura da AMPI na Atenção Básica de Saúde.			
<b>RESULTADO S</b>	Através da realização do diagrama de Ishikawa, foram identificados e selecionados os nós críticos que resultam na baixa cobertura da AMPI, sendo eles: má gestão do tempo, segurança, demanda de trabalho, horários inacessíveis para visita domiciliar, ambiente e localidade, resistência da família ou tutor, e falta de desenho do perfil populacional. Como forma de solução para estes nós críticos, a elaboração do plano operativo se deu em propor melhorar a gestão do tempo, reestruturando a agenda de enfermagem contemplando horários e dias que favoreçam as visitas domiciliares, ou a realização da educação em saúde para tornar a equipe mais bem capacitada para a realização da AMPI. Outra forma de otimizar o tempo e aplicações, seria oportunamente utilizar das reuniões e grupos como do programa de Automonitoramento Glicêmico para aplicar a AMPI. Realizar a contratação de novos funcionários para que a demanda de trabalho seja mais adequada facilitando a reestruturação da agenda do enfermeiro. Realizar a busca ativa em redes de apoio como igrejas, bares e centros comunitários, fortalecendo assim os vínculos da UBS com a população, sempre reforçando a importância da avaliação. A implementação de mapa vivo como uma ferramenta para dimensionar e conhecer os idosos ou utilizando de informações em outros serviços da UBS como farmácia, curativos, sala de vacina e que permitam levantar informações a respeito de idosos que apresentem fatores de risco, para criar uma priorização nas aplicações para os idosos que apresentem maiores vulnerabilidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base no desenvolvimento do planejamento, é válido concluir que somente com a existência de equipamentos e fluxos adequados para atender as necessidades desta população será possível garantir a qualidade do atendimento. As experiências aqui relatadas mostram como é possível enfrentar estes desafios com os recursos disponíveis no SUS, de maneira inovadora e assertiva.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. São Paulo. Secretaria da Saúde. Documento Norteador: Unidade De Referência À Saúde Do Idoso URSI. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Coordenação da Atenção Básica, Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa. São Paulo: SMS, 2016. 127 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/DOCUMENTONORTEADOR%20URSIversadofinal09012017.pdf</a> 2. São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Manual Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica AMPI-AB. Prefeitura Da Cidade De São Paulo, Secretaria Municipal De Saúde. São Paulo, 2021. 48 p. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/MANUAL_AMPI_AB_ATUALIZAO_2021.pdf</a> 3. Machado DR, Kimura M, Duarte YA de O, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil. Ciência saúde coletiva [Internet]. 2020Mar;25(3):1119–28. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018">https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.19232018</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14339	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4302206 - LUCAS SOUSA BATISTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luis Agune		
<b>TITULO</b>	Cidadania nas Organizações Contra a Discriminação Sexual			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil há alguns lugares que se movem em direção a uma maior aceitação da diversidade sexual, porém em outros há resistência, como por exemplo o Estado do Rio de Janeiro e Brasília. A discriminação sexual vem sendo um grande problema dentro das organizações, e isso acaba afetando em questão financeira, pois empresas que aceitam essa diversidade tem mais reconhecimento e lucros.			
<b>OBJETIVOS</b>	Buscar analisar e explicar maneiras de como combatemos a discriminação sexual dentro das organizações, e melhorar a cidadania dentro do ambiente de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração desse artigo utilizamos o método quali-quantitativo através de fontes de pesquisas bibliográficas, artigos científicos e sites que falam sobre o tema.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme o autor ADAM (2008) um dos principais resultados encontrados em nossa pesquisa foi a sexualidade na atualidade onde comprova que onde vivemos existe sim a discriminação sexual e também em ambientes de trabalho onde diz que a cada 5 empresas apenas 1 contrata pessoas LGBT. Conforme uma pesquisa (Jornal comunicação, 2022) mostra que 40% das pessoas sofreram certos tipos de preconceito em seu local de trabalho devido seu gênero e 61% têm medo de não serem aceitos em vagas por conta da questão da sexualidade, outro ponto que dificulta a entrada de trans, homossexuais e bissexual é o nome social. Também através de pesquisas percebemos que a discriminação sexual está presente em diversos lugares além do ambiente de trabalho, o que acaba se tornando um grande problema para nossa população, pois pessoas perdem suas vidas por serem discriminadas pela sexualidade. Diante um gráfico de pesquisa (Consultoria de Engajamento Santo Caos, 2021) referente a discriminação sexual nas organizações, mostrou que 41% dos gays sofreram discriminação por seu gênero sexual, 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT e 61% dos funcionários LGBT no Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas e gestores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com a elaboração desse artigo concluímos que a grande maioria das empresas têm dificuldades de aceitar pessoas de LGBT, então isso acaba se tornando um grande problema. Uma forma de reduzir essa situação é estabelecer benefícios iguais a todos os funcionários, independente da sua sexualidade; aceitar mais a diversidade LGBT, fazendo uma declaração de igualdade e postando em redes sociais e investir em canais de ética e denúncia, sobretudo em capacitações para seus colaboradores aceitarem com mais naturalidade as diferentes formas de sexualidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	ADAM, 1987 (Sexualidade e organizações: estudo sobre lésbicas no ambiente de trabalho). 2010. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/">https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/</a> Acesso em: 21 ago 2023 AKTOUF, 2004 (Sexualidade e organizações: estudo sobre lésbicas no ambiente de trabalho). 2010. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/">https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/</a> Acesso em: 29 ago 2023 FILIPE COLOUT, 2022 (Sexualidade e organizações: estudo sobre lésbicas no ambiente de trabalho). 2010. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/">https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/</a> Acesso em: 05 set 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14339	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4372417 - PABLO VIEIRA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luis Agune		
<b>TITULO</b>	Cidadania nas Organizações Contra a Discriminação Sexual			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil há alguns lugares que se movem em direção a uma maior aceitação da diversidade sexual, porém em outros há resistência, como por exemplo o Estado do Rio de Janeiro e Brasília. A discriminação sexual vem sendo um grande problema dentro das organizações, e isso acaba afetando em questão financeira, pois empresas que aceitam essa diversidade tem mais reconhecimento e lucros.			
<b>OBJETIVOS</b>	Buscar analisar e explicar maneiras de como combatemos a discriminação sexual dentro das organizações, e melhorar a cidadania dentro do ambiente de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração desse artigo utilizamos o método quali-quantitativo através de fontes de pesquisas bibliográficas, artigos científicos e sites que falam sobre o tema.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme o autor ADAM (2008) um dos principais resultados encontrados em nossa pesquisa foi a sexualidade na atualidade onde comprova que onde vivemos existe sim a discriminação sexual e também em ambientes de trabalho onde diz que a cada 5 empresas apenas 1 contrata pessoas LGBT. Conforme uma pesquisa (Jornal comunicação, 2022) mostra que 40% das pessoas sofreram certos tipos de preconceito em seu local de trabalho devido seu gênero e 61% têm medo de não serem aceitos em vagas por conta da questão da sexualidade, outro ponto que dificulta a entrada de trans, homossexuais e bissexual é o nome social. Também através de pesquisas percebemos que a discriminação sexual está presente em diversos lugares além do ambiente de trabalho, o que acaba se tornando um grande problema para nossa população, pois pessoas perdem suas vidas por serem discriminadas pela sexualidade. Diante um gráfico de pesquisa (Consultoria de Engajamento Santo Caos, 2021) referente a discriminação sexual nas organizações, mostrou que 41% dos gays sofreram discriminação por seu gênero sexual, 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT e 61% dos funcionários LGBT no Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas e gestores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com a elaboração desse artigo concluímos que a grande maioria das empresas têm dificuldades de aceitar pessoas de LGBT, então isso acaba se tornando um grande problema. Uma forma de reduzir essa situação é estabelecer benefícios iguais a todos os funcionários, independente da sua sexualidade; aceitar mais a diversidade LGBT, fazendo uma declaração de igualdade e postando em redes sociais e investir em canais de ética e denúncia, sobretudo em capacitações para seus colaboradores aceitarem com mais naturalidade as diferentes formas de sexualidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	ADAM, 1987 (Sexualidade e organizações: estudo sobre lésbicas no ambiente de trabalho). 2010. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/">https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/</a> Acesso em: 21 ago 2023 AKTOUF, 2004 (Sexualidade e organizações: estudo sobre lésbicas no ambiente de trabalho). 2010. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/">https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/</a> Acesso em: 29 ago 2023 FILIPE COLOUT, 2022 (Sexualidade e organizações: estudo sobre lésbicas no ambiente de trabalho). 2010. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/">https://www.scielo.br/j/osoc/a/X6yQXM9SQgwCwMyp7xfvWdS/</a> Acesso em: 05 set 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14342	Ginecologia e Obstetria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4089626 - FERNANDO MATEUS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	O efeito das fases folicular ou lútea na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal			
<b>INTRODUCAO</b>	Mulheres ao longo de seus anos reprodutivos apresentam natural variação hormonal nas diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea), e diferentes pesquisas tem demonstrado o impacto dessas fases no desempenho de força e resistência muscular. Porém, uma importante limitação metodológica nos achados disponíveis, é a necessidade de estudos experimentais considerando além das fases menstruais (fase folicular ou lútea), o não uso de contraceptivos hormonais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência das diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea) na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após triagem inicial quanto ao não uso de contraceptivo hormonal e realização de programa de treino de força nos últimos 6 meses (critérios de inclusão), as mulheres interessadas participaram de 1 avaliação online (anamnese) e 2 avaliações presenciais: i. avaliação da composição corporal; ii. avaliação da força muscular com o teste de 1RM e avaliação da resistência muscular com o teste de 3 séries até a falha concêntrica com carga de 80% de 1RM (contabilização da carga total). Previamente as avaliações, foi verificada a variação em teste e reteste dos testes de 1RM e resistência muscular. As comparações entre os ciclos foi realizada no software SPSS 23.0. Após verificação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, um teste t de Student foi realizado. O valor de p=0.05 foi adotado como limite de significância.			
<b>RESULTADOS</b>	Um total de 10 mulheres (idade = 24.9±6.9 anos, IMC= 23.5±2.4kg/m2) foram incluídas na pesquisa. As variações em teste e reteste observadas foi de 6.7% no teste de 1RM e 1.2% na avaliação de resistência. Observou-se um melhor desempenho (p=0.0087) no teste de 1RM na fase folicular (216.6±47.3kg) comparado a fase lútea (201.2±43.3kg) com uma diferença percentual média de 8% ou 15kg. No teste de resistência de força (volume total) não foi observada diferenças significantes na fase folicular (4844±1476kg) comparado a fase lútea (4802±2336kg) com uma diferença percentual média de -5% ou -42kg.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com os dados apresentados, nota-se uma diferença na força muscular dinâmica máxima nas diferentes fases do ciclo, com melhor desempenho na fase folicular.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Thompson B, Almarjawi A, Sculley D, et al. The Effect of the Menstrual Cycle and Oral Contraceptives on Acute Responses and Chronic Adaptations to Resistance Training: A Systematic Review of the Literature. 2020. 2. Romero-Moraleda B, Del Coso J, Gutiérrez-Hellin J, et al. The influence of the menstrual cycle on muscle strength and power performance. Journal of human kinetics 2019. 3. Oosthuysen T and Bosch AN. The Effect of the Menstrual Cycle on Exercise Metabolism. Sports medicine 2010. 4. 6. Kissow J, Jacobsen KJ, Gunnarsson TP, et al. Effects of Follicular and Luteal Phase-Based Menstrual Cycle Resistance Training on Muscle Strength and Mass. Sports medicine 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14342	Ginecologia e Obstetria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4313739 - MARIANA BALLALAI BORDON	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	O efeito das fases folicular ou lútea na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal			
<b>INTRODUCAO</b>	Mulheres ao longo de seus anos reprodutivos apresentam natural variação hormonal nas diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea), e diferentes pesquisas tem demonstrado o impacto dessas fases no desempenho de força e resistência muscular. Porém, uma importante limitação metodológica nos achados disponíveis, é a necessidade de estudos experimentais considerando além das fases menstruais (fase folicular ou lútea), o não uso de contraceptivos hormonais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência das diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea) na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após triagem inicial quanto ao não uso de contraceptivo hormonal e realização de programa de treino de força nos últimos 6 meses (critérios de inclusão), as mulheres interessadas participaram de 1 avaliação online (anamnese) e 2 avaliações presenciais: i. avaliação da composição corporal; ii. avaliação da força muscular com o teste de 1RM e avaliação da resistência muscular com o teste de 3 séries até a falha concêntrica com carga de 80% de 1RM (contabilização da carga total). Previamente as avaliações, foi verificada a variação em teste e reteste dos testes de 1RM e resistência muscular. As comparações entre os ciclos foi realizada no software SPSS 23.0. Após verificação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, um teste t de Student foi realizado. O valor de p=0.05 foi adotado como limite de significância.			
<b>RESULTADOS</b>	Um total de 10 mulheres (idade = 24.9±6.9 anos, IMC= 23.5±2.4kg/m2) foram incluídas na pesquisa. As variações em teste e reteste observadas foi de 6.7% no teste de 1RM e 1.2% na avaliação de resistência. Observou-se um melhor desempenho (p=0.0087) no teste de 1RM na fase folicular (216.6±47.3kg) comparado a fase lútea (201.2±43.3kg) com uma diferença percentual média de 8% ou 15kg. No teste de resistência de força (volume total) não foi observada diferenças significantes na fase folicular (4844±1476kg) comparado a fase lútea (4802±2336kg) com uma diferença percentual média de -5% ou -42kg.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com os dados apresentados, nota-se uma diferença na força muscular dinâmica máxima nas diferentes fases do ciclo, com melhor desempenho na fase folicular.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Thompson B, Almarjawi A, Sculley D, et al. The Effect of the Menstrual Cycle and Oral Contraceptives on Acute Responses and Chronic Adaptations to Resistance Training: A Systematic Review of the Literature. 2020. 2. Romero-Moraleda B, Del Coso J, Gutiérrez-Hellin J, et al. The influence of the menstrual cycle on muscle strength and power performance. Journal of human kinetics 2019. 3. Oosthuysen T and Bosch AN. The Effect of the Menstrual Cycle on Exercise Metabolism. Sports medicine 2010. 4. 6. Kissow J, Jacobsen KJ, Gunnarsson TP, et al. Effects of Follicular and Luteal Phase-Based Menstrual Cycle Resistance Training on Muscle Strength and Mass. Sports medicine 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14342	Ginecologia e Obstetria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4314590 - CLARA CASSOLARI DE CASTRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	O efeito das fases folicular ou lútea na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal			
<b>INTRODUCA O</b>	Mulheres ao longo de seus anos reprodutivos apresentam natural variação hormonal nas diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea), e diferentes pesquisas tem demonstrado o impacto dessas fases no desempenho de força e resistência muscular. Porém, uma importante limitação metodológica nos achados disponíveis, é a necessidade de estudos experimentais considerando além das fases menstruais (fase folicular ou lútea), o não uso de contraceptivos hormonais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência das diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea) na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após triagem inicial quanto ao não uso de contraceptivo hormonal e realização de programa de treino de força nos últimos 6 meses (critérios de inclusão), as mulheres interessadas participaram de 1 avaliação online (anamnese) e 2 avaliações presenciais: i. avaliação da composição corporal; ii. avaliação da força muscular com o teste de 1RM e avaliação da resistência muscular com o teste de 3 séries até a falha concêntrica com carga de 80% de 1RM (contabilização da carga total). Previamente as avaliações, foi verificada a variação em teste e reteste dos testes de 1RM e resistência muscular. As comparações entre os ciclos foi realizada no software SPSS 23.0. Após verificação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, um teste t de Student foi realizado. O valor de p=0.05 foi adotado como limite de significância.			
<b>RESULTADO S</b>	Um total de 10 mulheres (idade = 24.9±6.9 anos, IMC= 23.5±2.4kg/m2) foram incluídas na pesquisa. As variações em teste e reteste observadas foi de 6.7% no teste de 1RM e 1.2% na avaliação de resistência. Observou-se um melhor desempenho (p=0.0087) no teste de 1RM na fase folicular (216.6±47.3kg) comparado a fase lútea (201.2±43.3kg) com uma diferença percentual média de 8% ou 15kg. No teste de resistência de força (volume total) não foi observada diferenças significantes na fase folicular (4844±1476kg) comparado a fase lútea (4802±2336kg) com uma diferença percentual média de -5% ou -42kg.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com os dados apresentados, nota-se uma diferença na força muscular dinâmica máxima nas diferentes fases do ciclo, com melhor desempenho na fase folicular.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Thompson B, Almarjawi A, Sculley D, et al. The Effect of the Menstrual Cycle and Oral Contraceptives on Acute Responses and Chronic Adaptations to Resistance Training: A Systematic Review of the Literature. 2020. 2. Romero-Moraleda B, Del Coso J, Gutiérrez-Hellin J, et al. The influence of the menstrual cycle on muscle strength and power performance. Journal of human kinetics 2019. 3. Oosthuysen T and Bosch AN. The Effect of the Menstrual Cycle on Exercise Metabolism. Sports medicine 2010. 4. 6. Kissow J, Jacobsen KJ, Gunnarsson TP, et al. Effects of Follicular and Luteal Phase-Based Menstrual Cycle Resistance Training on Muscle Strength and Mass. Sports medicine 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14342	Ginecologia e Obstetria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317360 - MARCELA DE CASTRO MUNIZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	O efeito das fases folicular ou lútea na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal			
<b>INTRODUCAO</b>	Mulheres ao longo de seus anos reprodutivos apresentam natural variação hormonal nas diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea), e diferentes pesquisas tem demonstrado o impacto dessas fases no desempenho de força e resistência muscular. Porém, uma importante limitação metodológica nos achados disponíveis, é a necessidade de estudos experimentais considerando além das fases menstruais (fase folicular ou lútea), o não uso de contraceptivos hormonais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência das diferentes fases menstruais (fase folicular ou lútea) na força muscular dinâmica máxima e resistência muscular de mulheres praticantes de treinamento de força não adeptas ao uso de contraceptivo hormonal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Após triagem inicial quanto ao não uso de contraceptivo hormonal e realização de programa de treino de força nos últimos 6 meses (critérios de inclusão), as mulheres interessadas participaram de 1 avaliação online (anamnese) e 2 avaliações presenciais: i. avaliação da composição corporal; ii. avaliação da força muscular com o teste de 1RM e avaliação da resistência muscular com o teste de 3 séries até a falha concêntrica com carga de 80% de 1RM (contabilização da carga total). Previamente as avaliações, foi verificada a variação em teste e reteste dos testes de 1RM e resistência muscular. As comparações entre os ciclos foi realizada no software SPSS 23.0. Após verificação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, um teste t de Student foi realizado. O valor de p=0.05 foi adotado como limite de significância.			
<b>RESULTADOS</b>	Um total de 10 mulheres (idade = 24.9±6.9 anos, IMC= 23.5±2.4kg/m2) foram incluídas na pesquisa. As variações em teste e reteste observadas foi de 6.7% no teste de 1RM e 1.2% na avaliação de resistência. Observou-se um melhor desempenho (p=0.0087) no teste de 1RM na fase folicular (216.6±47.3kg) comparado a fase lútea (201.2±43.3kg) com uma diferença percentual média de 8% ou 15kg. No teste de resistência de força (volume total) não foi observada diferenças significantes na fase folicular (4844±1476kg) comparado a fase lútea (4802±2336kg) com uma diferença percentual média de -5% ou -42kg.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com os dados apresentados, nota-se uma diferença na força muscular dinâmica máxima nas diferentes fases do ciclo, com melhor desempenho na fase folicular.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Thompson B, Almarjawi A, Sculley D, et al. The Effect of the Menstrual Cycle and Oral Contraceptives on Acute Responses and Chronic Adaptations to Resistance Training: A Systematic Review of the Literature. 2020. 2. Romero-Moraleda B, Del Coso J, Gutiérrez-Hellin J, et al. The influence of the menstrual cycle on muscle strength and power performance. Journal of human kinetics 2019. 3. Oosthuysen T and Bosch AN. The Effect of the Menstrual Cycle on Exercise Metabolism. Sports medicine 2010. 4. 6. Kissow J, Jacobsen KJ, Gunnarsson TP, et al. Effects of Follicular and Luteal Phase-Based Menstrual Cycle Resistance Training on Muscle Strength and Mass. Sports medicine 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14343	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4323874 - ENZO KUK DE ALMEIDA PEROBELLI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva	MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA	
<b>TITULO</b>	QUEBRA-CABEÇA DE MIOLOGIA DOS CÃES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE ANATOMIA ANIMAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No ensino da anatomia, dois são os principais métodos utilizados. O ensino tradicional, onde o docente detém o conhecimento, transmitido através de aulas expositivas estimulando a passividade dos ouvintes. Apesar de ser o método mais utilizado pelas instituições, as formas de relacionar professor e aluno vem se modificando. A metodologia ativa torna o educando protagonista do seu próprio conhecimento, desenvolvendo seu senso crítico. O modelo tridimensional (3D) surge como um dos preferidos para a substituição da prática da dissecação, ou agir em conjunto com ela, dando maior suporte ao ensino.			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um modelo anatómico tridimensional, no formato de quebra-cabeça, referente aos músculos dos animais domésticos, trazendo uma nova forma de estudar a anatomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi desenvolvido um modelo 3D dos músculos do membro pélvico do cão, através de uma pesquisa sobre sua topografia correta <sup>3</sup> . Para desenvolver o quebra-cabeça, utilizou-se massa biscuit, imãs e uma estrutura metálica, a partir de uma imagem da estrutura óssea. As peças foram manufaturadas com materiais que tivessem baixo custo, facilidade no manuseio e de fácil acesso. Para avaliar o modelo e sua aplicabilidade, foi desenvolvido um questionário e analisados por 104 pessoas. O modelo foi apresentado através de fotos, com questões sobre suas vistas e as estruturas anatómicas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram obtidas 104 respostas, 73 estudantes e 31 veterinários, sendo os resultados focados nas respostas dos alunos. Questionou-se sobre o método utilizado atualmente, sobre qual método achariam interessante, sendo aqui colocada a opção do uso do modelo 3D. Embora 62% dos alunos preferirem a dissecação, 38% se interessaram pelo uso do modelo, sendo uma porcentagem considerável. Logo, buscou-se entender essa escolha: para 47%, traria maior confiança na hora de aplicar a teoria à prática; 29%, auxiliaria na compreensão do conteúdo; e 16%, ajudaria no estudo. E sobre a disponibilização desta ferramenta pela instituição, 70% votaram a favor. Além disso, 41% dos participantes gostariam de fazer uso desse tipo de modelo anatómico.			
<b>CONCLUSOES</b>	O modelo foi aceito para utilização no processo de ensino-aprendizagem, trazendo benefícios ausentes na dissecação, como: acessibilidade, baixo custo e ser acompanhado com vídeo explicativo. O modelo também pode ser construído pelo próprio aluno e ainda ser explorado pelo docente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BORGES, T. S.; ALENCAR, G. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em Revista, v. Ano 03, n. 04, p. 1 19-143, jul. 2014. 2. PREECE, D. et al. "Let's Get Physical": Advantages of a physical model over 3D computer models and textbooks in learning imaging anatomy. Anatomical Sciences Education, v. 6, n. 4, p. 216–224, jul. 2013. 3. ST. CLAIR, L. E. Miologia. Em: SISSON/GROSSMAN (Ed.). Anatomia dos animais domésticos getty. 5a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. v. 1p. 38–46.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14343	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4696816 - JOAO CARLOS MOREIRA DIAS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva		MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA
<b>TITULO</b>	QUEBRA-CABEÇA DE MIOLOGIA DOS CÃES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE ANATOMIA ANIMAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No ensino da anatomia, dois são os principais métodos utilizados. O ensino tradicional, onde o docente detém o conhecimento, transmitido através de aulas expositivas estimulando a passividade dos ouvintes. Apesar de ser o método mais utilizado pelas instituições, as formas de relacionar professor e aluno vem se modificando. A metodologia ativa torna o educando protagonista do seu próprio conhecimento, desenvolvendo seu senso crítico. O modelo tridimensional (3D) surge como um dos preferidos para a substituição da prática da dissecação, ou agir em conjunto com ela, dando maior suporte ao ensino.			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um modelo anatômico tridimensional, no formato de quebra-cabeça, referente aos músculos dos animais domésticos, trazendo uma nova forma de estudar a anatomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi desenvolvido um modelo 3D dos músculos do membro pélvico do cão, através de uma pesquisa sobre sua topografia correta <sup>3</sup> . Para desenvolver o quebra-cabeça, utilizou-se massa biscuit, imãs e uma estrutura metálica, a partir de uma imagem da estrutura óssea. As peças foram manufaturadas com materiais que tivessem baixo custo, facilidade no manuseio e de fácil acesso. Para avaliar o modelo e sua aplicabilidade, foi desenvolvido um questionário e analisados por 104 pessoas. O modelo foi apresentado através de fotos, com questões sobre suas vistas e as estruturas anatômicas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram obtidas 104 respostas, 73 estudantes e 31 veterinários, sendo os resultados focados nas respostas dos alunos. Questionou-se sobre o método utilizado atualmente, sobre qual método achariam interessante, sendo aqui colocada a opção do uso do modelo 3D. Embora 62% dos alunos preferirem a dissecação, 38% se interessaram pelo uso do modelo, sendo uma porcentagem considerável. Logo, buscou-se entender essa escolha: para 47%, traria maior confiança na hora de aplicar a teoria à prática; 29%, auxiliaria na compreensão do conteúdo; e 16%, ajudaria no estudo. E sobre a disponibilização desta ferramenta pela instituição, 70% votaram a favor. Além disso, 41% dos participantes gostariam de fazer uso desse tipo de modelo anatômico.			
<b>CONCLUSOES</b>	O modelo foi aceito para utilização no processo de ensino-aprendizagem, trazendo benefícios ausentes na dissecação, como: acessibilidade, baixo custo e ser acompanhado com vídeo explicativo. O modelo também pode ser construído pelo próprio aluno e ainda ser explorado pelo docente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BORGES, T. S.; ALENCAR, G. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em Revista, v. Ano 03, n. 04, p. 1 19-143, jul. 2014. 2. PREECE, D. et al. "Let's Get Physical": Advantages of a physical model over 3D computer models and textbooks in learning imaging anatomy. Anatomical Sciences Education, v. 6, n. 4, p. 216–224, jul. 2013. 3. ST. CLAIR, L. E. Miologia. Em: SISSON/GROSSMAN (Ed.). Anatomia dos animais domésticos getty. 5a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. v. 1p. 38–46.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14346	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		230880 - MARIA APARECIDA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Lacerda Bachi	Carolina Nunes Franca	
<b>TITULO</b>	EFEITO DO TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO NA PERIODONTITE ASSOCIADA AO DIABETES SOBRE MARCADORES IMUNE/INFLAMATÓRIOS E DE ESTRESSE OXIDATIVO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A periodontite é um processo inflamatório que pode levar à perda dentária e disseminação sistêmica de bactérias, ocasionando outros distúrbios como Diabetes Mellitus e Doenças Cardiovasculares que possuem uma relação bidirecional com a periodontite. Citocinas bem como a presença de peróxidos na cavidade oral podem ter seus níveis influenciados pelo tratamento periodontal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar citocinas no Fluido Crevicular Gengival e biomarcadores salivares (citocinas IL-6, IL-10, IFN-gama, TNF- $\alpha$ ), peptídeos antimicrobianos (catelicidina e lisozima); imunoglobulina (IgA secretora) e estresse oxidativo (peróxidos totais e capacidade antioxidante total (TAC), ao longo do tratamento periodontal (basal e 30 dias após o término do tratamento periodontal não-cirúrgico).			
<b>METODOLOGIA</b>	Os pacientes foram classificados com periodontite grau B e grau C com Diabetes e sem Diabetes. Foram avaliadas as concentrações das citocinas no Fluido Crevicular Gengival pelo Ensaio Multiplex-Luminex e as concentrações salivares das citocinas, do peptídeo antimicrobiano, da lisozima, da IgA secretora, dos peróxidos totais e da capacidade antioxidante total foram submetidas ao método ELISA e absorvância.			
<b>RESULTADOS</b>	Não foram encontradas diferenças significantes no Fluido Crevicular Gengival nas comparações intragrupos (Teste de Wilcoxon, basal comparado a 30 dias após o término do tratamento), bem como nas comparações intergrupos (Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn, Com e Sem Diabetes). Na análise intragrupo (Teste T de Student pareado), enquanto as concentrações salivares de lisozima ( $p=0,0260$ ) e de IL-10 ( $p=0,0034$ ) mostraram-se significativamente reduzidas após o tratamento, houve aumento de TNF- $\alpha$ ( $p=0,0443$ ) pós-tratamento quando comparado aos valores basais no grupo Com Diabetes. Além disso, as concentrações salivares de TNF- $\alpha$ ( $p=0,0313$ ) observadas no grupo Sem Diabetes foram menores do que no basal. Foi observada diferença significativa entre as concentrações salivares nos grupos Sem e Com Diabetes pós-tratamento ( $p=0,008$ ). Com relação à análise intragrupo, foi possível evidenciar aumento das razões entre IL-6/IL-10 ( $p=0,0134$ ) e IFN-gama/IL-10 ( $p=0,0313$ ) no grupo Sem Diabetes e da razão TNF- $\alpha$ /IL-10 ( $p=0,003$ ) após tratamento quando comparados aos valores observados no basal. Na análise intergrupos (Testes ANOVA de fator único com pós-teste de Tukey), foi verificada maior razão de TNF- $\alpha$ /IL-10 ( $p=0,0418$ ) no grupo Com Diabetes do que no grupo Sem Diabetes após tratamento. Nenhuma diferença significativa foi encontrada na razão entre as concentrações salivares dos peróxidos totais e da TAC.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Enquanto a disbiose bacteriana promove uma inflamação destrutiva, a inflamação cria um ambiente nutricionalmente favorável para uma maior disseminação de patógenos orais e fatores inflamatórios, criando assim um ciclo de alimentação que pode causar/intensificar Periodontite evidente em indivíduos com Diabetes Mellitus que são susceptíveis a outros distúrbios como as Doenças Cardiovasculares.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Nat Rev Immunol. 2021;21(7):426-440. 2- Rev Port Clín Geral, 2006; 22: 379-82. 3- Lancet 2017;390 (10100): 1211–1259. 4- Oral Diseases 2016;22(7):609–619.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14346	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3543552 - STEFFANY BERNARDO OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Lacerda Bachi	Carolina Nunes Franca	
<b>TITULO</b>	EFEITO DO TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO NA PERIODONTITE ASSOCIADA AO DIABETES SOBRE MARCADORES IMUNE/INFLAMATÓRIOS E DE ESTRESSE OXIDATIVO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A periodontite é um processo inflamatório que pode levar à perda dentária e disseminação sistêmica de bactérias, ocasionando outros distúrbios como Diabetes Mellitus e Doenças Cardiovasculares que possuem uma relação bidirecional com a periodontite. Citocinas bem como a presença de peróxidos na cavidade oral podem ter seus níveis influenciados pelo tratamento periodontal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar citocinas no Fluido Crevicular Gengival e biomarcadores salivares (citocinas IL-6, IL-10, IFN-gama, TNF- $\alpha$ ), peptídeos antimicrobianos (catelicidina e lisozima); imunoglobulina (IgA secretora) e estresse oxidativo (peróxidos totais e capacidade antioxidante total (TAC), ao longo do tratamento periodontal (basal e 30 dias após o término do tratamento periodontal não-cirúrgico).			
<b>METODOLOGIA</b>	Os pacientes foram classificados com periodontite grau B e grau C com Diabetes e sem Diabetes. Foram avaliadas as concentrações das citocinas no Fluido Crevicular Gengival pelo Ensaio Multiplex-Luminex e as concentrações salivares das citocinas, do peptídeo antimicrobiano, da lisozima, da IgA secretora, dos peróxidos totais e da capacidade antioxidante total foram submetidas ao método ELISA e absorvância.			
<b>RESULTADOS</b>	Não foram encontradas diferenças significantes no Fluido Crevicular Gengival nas comparações intragrupos (Teste de Wilcoxon, basal comparado a 30 dias após o término do tratamento), bem como nas comparações intergrupos (Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn, Com e Sem Diabetes). Na análise intragrupo (Teste T de Student pareado), enquanto as concentrações salivares de lisozima ( $p=0,0260$ ) e de IL-10 ( $p=0,0034$ ) mostraram-se significativamente reduzidas após o tratamento, houve aumento de TNF- $\alpha$ ( $p=0,0443$ ) pós-tratamento quando comparado aos valores basais no grupo Com Diabetes. Além disso, as concentrações salivares de TNF- $\alpha$ ( $p=0,0313$ ) observadas no grupo Sem Diabetes foram menores do que no basal. Foi observada diferença significativa entre as concentrações salivares nos grupos Sem e Com Diabetes pós-tratamento ( $p=0,008$ ). Com relação à análise intragrupo, foi possível evidenciar aumento das razões entre IL-6/IL-10 ( $p=0,0134$ ) e IFN-gama/IL-10 ( $p=0,0313$ ) no grupo Sem Diabetes e da razão TNF- $\alpha$ /IL-10 ( $p=0,003$ ) após tratamento quando comparados aos valores observados no basal. Na análise intergrupos (Testes ANOVA de fator único com pós-teste de Tukey), foi verificada maior razão de TNF- $\alpha$ /IL-10 ( $p=0,0418$ ) no grupo Com Diabetes do que no grupo Sem Diabetes após tratamento. Nenhuma diferença significativa foi encontrada na razão entre as concentrações salivares dos peróxidos totais e da TAC.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Enquanto a disbiose bacteriana promove uma inflamação destrutiva, a inflamação cria um ambiente nutricionalmente favorável para uma maior disseminação de patógenos orais e fatores inflamatórios, criando assim um ciclo de alimentação que pode causar/intensificar Periodontite evidente em indivíduos com Diabetes Mellitus que são susceptíveis a outros distúrbios como as Doenças Cardiovasculares.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Nat Rev Immunol. 2021;21(7):426-440. 2- Rev Port Clín Geral, 2006; 22: 379-82. 3- Lancet 2017;390 (10100): 1211–1259. 4- Oral Diseases 2016;22(7):609–619.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14346	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4237382 - ANA LUIZA PEREIRA ASSUNÇÃO SILVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Lacerda Bachi	Carolina Nunes Franca	
<b>TITULO</b>	EFEITO DO TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO NA PERIODONTITE ASSOCIADA AO DIABETES SOBRE MARCADORES IMUNE/INFLAMATÓRIOS E DE ESTRESSE OXIDATIVO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A periodontite é um processo inflamatório que pode levar à perda dentária e disseminação sistêmica de bactérias, ocasionando outros distúrbios como Diabetes Mellitus e Doenças Cardiovasculares que possuem uma relação bidirecional com a periodontite. Citocinas bem como a presença de peróxidos na cavidade oral podem ter seus níveis influenciados pelo tratamento periodontal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar citocinas no Fluido Crevicular Gengival e biomarcadores salivares (citocinas IL-6, IL-10, IFN-gama, TNF- $\alpha$ ), peptídeos antimicrobianos (catelicidina e lisozima); imunoglobulina (IgA secretora) e estresse oxidativo (peróxidos totais e capacidade antioxidante total (TAC), ao longo do tratamento periodontal (basal e 30 dias após o término do tratamento periodontal não-cirúrgico).			
<b>METODOLOGIA</b>	Os pacientes foram classificados com periodontite grau B e grau C com Diabetes e sem Diabetes. Foram avaliadas as concentrações das citocinas no Fluido Crevicular Gengival pelo Ensaio Multiplex-Luminex e as concentrações salivares das citocinas, do peptídeo antimicrobiano, da lisozima, da IgA secretora, dos peróxidos totais e da capacidade antioxidante total foram submetidas ao método ELISA e absorvância.			
<b>RESULTADOS</b>	Não foram encontradas diferenças significantes no Fluido Crevicular Gengival nas comparações intragrupos (Teste de Wilcoxon, basal comparado a 30 dias após o término do tratamento), bem como nas comparações intergrupos (Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn, Com e Sem Diabetes). Na análise intragrupo (Teste T de Student pareado), enquanto as concentrações salivares de lisozima ( $p=0,0260$ ) e de IL-10 ( $p=0,0034$ ) mostraram-se significativamente reduzidas após o tratamento, houve aumento de TNF- $\alpha$ ( $p=0,0443$ ) pós-tratamento quando comparado aos valores basais no grupo Com Diabetes. Além disso, as concentrações salivares de TNF- $\alpha$ ( $p=0,0313$ ) observadas no grupo Sem Diabetes foram menores do que no basal. Foi observada diferença significativa entre as concentrações salivares nos grupos Sem e Com Diabetes pós-tratamento ( $p=0,008$ ). Com relação à análise intragrupo, foi possível evidenciar aumento das razões entre IL-6/IL-10 ( $p=0,0134$ ) e IFN-gama/IL-10 ( $p=0,0313$ ) no grupo Sem Diabetes e da razão TNF- $\alpha$ /IL-10 ( $p=0,003$ ) após tratamento quando comparados aos valores observados no basal. Na análise intergrupos (Testes ANOVA de fator único com pós-teste de Tukey), foi verificada maior razão de TNF- $\alpha$ /IL-10 ( $p=0,0418$ ) no grupo Com Diabetes do que no grupo Sem Diabetes após tratamento. Nenhuma diferença significativa foi encontrada na razão entre as concentrações salivares dos peróxidos totais e da TAC.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Enquanto a disbiose bacteriana promove uma inflamação destrutiva, a inflamação cria um ambiente nutricionalmente favorável para uma maior disseminação de patógenos orais e fatores inflamatórios, criando assim um ciclo de alimentação que pode causar/intensificar Periodontite evidente em indivíduos com Diabetes Mellitus que são susceptíveis a outros distúrbios como as Doenças Cardiovasculares.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Nat Rev Immunol. 2021;21(7):426-440. 2- Rev Port Clín Geral, 2006; 22: 379-82. 3- Lancet 2017;390 (10100): 1211–1259. 4- Oral Diseases 2016;22(7):609–619.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14347	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4595220 - DANIEL DI PROFIO BALDI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva		MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA
<b>TITULO</b>	ATLAS ANATÔMICO ILUSTRADO DO CORAÇÃO DOS ANIMAIS VERTEBRADOS COMO MÉTODO DE APRENDIZADO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A anatomia veterinária é uma das matérias para formação dos médicos veterinários, a qual compreende diferenças morfológicas das estruturas anatômicas dos diversos sistemas dos animais. O conhecimento sobre a anatomia do sistema cardiovascular, com foco no coração é de suma importância por ser utilizado na prática veterinária.			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um atlas ilustrado do coração dos animais vertebrados como método de estudo complementar, que reunisse as particularidades anatômicas dos animais vertebrados como o cavalo e o cão, e outros vertebrados não tão comuns nas aulas de anatomia como anfíbios e peixes (teleosteos e elasmobrânquios), em diferentes posições anatômicas em um só modelo didático, visando uma maior compreensão do discente. Além disso, utilizar o atlas para colorir as estruturas presentes nele.			
<b>METODOLOGIA</b>	Inicialmente foi feita uma pesquisa científica sobre o coração dos animais vertebrados e estudos em peças cadavéricas de diferentes animais para fazer as imagens do atlas. Para a realização das ilustrações utilizou-se: lápis grafite; borracha; canetas nanquim pretas e papel A4. Junto com a disponibilização do atlas foi criado um formulário de pesquisa com 67 discentes do curso de medicina veterinária da Universidade Santo Amaro (UNISA) e de outras instituições acadêmicas, para analisar as opiniões dos alunos sobre o atlas.			
<b>RESULTADOS</b>	No questionário foram apresentadas ilustrações do atlas com perguntas sobre as estruturas anatômicas. Em uma das perguntas do formulário sobre as dificuldades referente ao estudo da anatomia onde 31,3% dos discentes relatam apresentar dificuldades em visualizar estruturas em peças anatômicas, 25,4% apresentam dificuldades na correlação de imagens com a prática, 22,4% comentam sobre a falta de métodos alternativos de estudo, 11,9% apresentam a falta de costume de visualizar imagens anatômicas, e 9% marcaram a opção "outros". Visando avaliar o atlas através de uma escala de nota de um a cinco onde, obtivemos resultado de 58,2% dos participantes avaliaram com nota máxima (5), enquanto 32,8% atribuíram nota 4 e apenas 9% atribuíram nota 3. Além disso, 80,6% dos discentes participantes da pesquisa consideram que a utilização do atlas nos estudos traria mais segurança em aplicações práticas, sendo um benefício em sua aprendizagem, enquanto apenas 16,4% optaram por somente utilizar peças cadavéricas em seus estudos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O método, utilizando o atlas, despertou interesse e foi bem aceito pelos alunos. Além disso, mostrou-se relevante na contribuição do desenvolvimento de métodos alternativos de ensino e estudos, incentivando a busca e o desejo do discente em fixar o conteúdo de uma forma alternativa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	DYCE, K.M; SACK; W.O.; WENSING, C.J.G. Tratado de anatomia veterinária. 5.ed. SAUNDRES, 2019. GETTY, R.; SISSON, S.; GROSSMAN, J. D. Anatomia dos animais domésticos, 5ª ed. Guanabara Koogan, p. 662-672. 1986. KARDONG, KENNETH V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14348	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4696816 - JOAO CARLOS MOREIRA DIAS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva		MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA
<b>TITULO</b>	MODELO ANATÔMICO DE BAIXO CUSTO PARA OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A disciplina de anatomia faz parte do ciclo básico de ensino em diversos cursos de graduação. Dentro dos assuntos estudados, a anatomia oftálmica é tópico indispensável, apresentando complexidade e delicadeza das estruturas oculares. Entre as diversas ferramentas utilizadas, os modelos anatômicos se destacam como alternativas práticas para aprimorar a compreensão e a fixação do conteúdo, oferecendo uma abordagem descontraída e atrativa para os alunos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um modelo anatômico de olho de cão, com baixo custo, a fim de usá-lo como ferramenta alternativa no ensino prático da anatomia ocular animal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a elaboração do modelo anatômico, foram utilizados massa de porcelana fria (biscuit), tinta à base de PVA e uma bola de isopor. Adicionalmente, com o intuito de avaliar o modelo desenvolvido, foi elaborado um formulário on-line com fotografias do modelo anatômico, bem como questões relacionadas ao nível acadêmico dos discentes entrevistados, seu conhecimento prévio sobre anatomia ocular e perguntas destinadas a identificar as estruturas anatômicas sinalizadas nas fotos do modelo anatômico de olho de cão. Ao final do questionário, foram incluídas três perguntas adicionais destinadas à avaliação do protótipo em si. O questionário foi respondido por 80 alunos do curso de medicina veterinária da Universidade de Santo Amaro (UNISA).			
<b>RESULTADOS</b>	O modelo anatômico do olho de cão teve baixo custo, totalizando R\$ 66,95 em despesas para sua produção. Vale ressaltar, que o valor é considerado baixo quando comparado aos modelos 3D existentes. O modelo anatômico teve uma boa aceitação por parte dos alunos, sendo que 77,5% dos participantes atribuíram a pontuação máxima ao modelo, em uma escala de avaliação de 0 a 5. Adicionalmente, aproximadamente 85% e 95% dos entrevistados afirmaram, respectivamente, que a utilização do modelo lhes confere maior confiança na aplicação prática do conteúdo e o consideraram benéfico para sua aprendizagem. Além desses resultados, havia um segmento específico do questionário que pedia aos alunos a identificação das estruturas identificadas nas fotografias do modelo anatômico do olho de cão. Os resultados dessa seção foram 45% foram marcadas com a resposta "Não sei", 34,9% das respostas foram respondidas corretamente, enquanto 19,8% foram consideradas incorretas. As respostas em que os alunos admitiram desconhecimento das estruturas apontadas pode ser justificado pela ausência de familiaridade prévia com a anatomia ocular. Sendo assim, observamos que 76,3% dos participantes afirmaram não ter tido conhecimento prévia ao conteúdo relacionado à anatomia ocular.			
<b>CONCLUSOES</b>	O modelo teve boa aceitabilidade pelos alunos, demonstrando que esse pode ser uma ferramenta eficaz no envolvimento ativo durante o processo de aprendizagem prática da anatomia ocular.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALBERNAZ, R.M; BERNARDI, N. Uso de modelo anatômico para o ensino da técnica de bloqueio regional da porção distal dos membros torácicos em equinos. <i>Ars Veterinária</i> , Jaboticabal, SP, v. 37, n. 1, p. 10-14, 26 mar. 2021. MASSARI, Catia et al. Tendências do Ensino de Anatomia Animal na Graduação de Medicina Veterinária. <i>Revista Grad. USP, São Paulo</i> , v. 3, n. 225, p. 25-32, 4 jul. 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14352	Materiais Odontológicos	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124808 - MYLLENE BOSSOLANI GALLORO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Flávia Gonçalves		
<b>TITULO</b>	Efeito do tamanho e concentração de partículas de quitosana carregada com fosfato de cálcio nas propriedades de compósitos resinosos			
<b>INTRODUCAO</b>	O desenvolvimento de materiais restauradores, contendo substâncias bioativas como agentes antibacterianos e remineralizantes, apresentam-se como alternativas para reduzir a progressão da cárie adjacentes aos materiais restauradores. O uso de partículas de quitosana carregada com fosfato de cálcio tem-se mostrado um método viável e promissor neste setor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar a influência do tamanho e da concentração de partículas de quitosana carregada com fosfato (QCP) no grau de conversão (GC), resistência a flexão (RF) e módulo de elasticidade (E) de compósitos experimentais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Partículas QCP foram fabricadas por eletrodispersão em dois tamanhos: partículas pequenas (122 µm) e partículas grandes (216 µm) e adicionadas em diferentes concentrações (0, 0,5% e 1,0%) a compósitos resinosos com proporção equimolar de BisGMA e TEGDMA e 59 a 60% vidro de bário. GC foi mensurado por espectroscopia infravermelho com transformada de Fourier (n=5). RF e E foram obtidos por ensaio de flexão em três pontos em máquina universal de ensaios (n=10). Dados foram submetidos a ANOVA de um fator e teste de Tukey ((#38)#945;-0,05).			
<b>RESULTADOS</b>	Os diferentes tamanhos e concentrações de QCP não alteraram o grau de conversão dos compósitos. Materiais com partículas grandes apresentaram RF e E semelhantes entre si, independente da concentração, e inferior ao grupo controle. Materiais com partículas pequenas em concentração 0.5% apresentou maior RF e E que na concentração de 1% e foram similar ao controle.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apenas a incorporação de partículas pequenas de quitosana carregada com fosfato na concentração de 0,5% em compósitos restauradores foram capazes de manter a conversão sem prejuizo das propriedades mecânicas dos compósitos resinosos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Nedeljko I, Teughels W, De Munck J, Van Meerbeek B, Van Landuyt KL. Is secondary caries with composites a material-based problem? Dent Mater. 2015; 31(11):247-77. 2. Skrtic D, Antonucci JM. Polymeric dental composites based on remineralizing amorphous calcium phosphate fillers. Curr Trends Polym Sci. 2016; 17:1-31. 3. Raafat D, Sahl HG. Chitosan and its antimicrobial potential: a critical literature survey. Microbial biotechnology.2009; 2(2):186-20			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14355	Materials Odontológicos	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4902017 - CAIO SALINAS TRONCOSO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Flávia Gonçalves		
<b>TITULO</b>	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E DE PROLIFERAÇÃO CELULAR DE HIDROGÉIS DE GELATINA METACRILADA			
<b>INTRODUCAO</b>	A bioengenharia tecidual visa desenvolver substitutos de órgãos e tecidos humanos em laboratório, o que envolve o uso de biomateriais, células e fatores de crescimento. A seleção adequada do biomaterial é essencial para garantir a adesão, diferenciação e proliferação celular. O hidrogel de gelatina Metacrilato (GelMA) é um biomaterial bastante promissor devido às suas propriedades biológicas e físicas, especialmente voltado para a bioimpressão.			
<b>OBJETIVOS</b>	Os objetivos deste estudo foram: (1) sintetizar hidrogéis de GelMA em diferentes concentrações; (2) avaliar as propriedades reológicas (viscosidade, tixotropia e fotoreologia) dos hidrogéis de GelMA; e (3) avaliar a adesão e proliferação de células-tronco do ligamento periodontal sobre os hidrogéis de GelMA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi sintetizada gelatina metacrilada (GelMA) pela reação de gelatina com anidrido metacrilico. Hidrogéis com 0.5% lítio fenil-2,4,6-trimetilbenzoilfosfinato (fotoiniciador) e 5, 10, 15% e 20% de GelMA foram sintetizados. Células-tronco do ligamento periodontal foram isoladas a partir de fragmentos de ligamento periodontal de dentes permanentes humanos e dispersas nos hidrogéis de GelMA na concentração de 100.000 células/mL. A proliferação celular nos hidrogéis foi mensurada pelo ensaio alamarBlue com 24 e 72 horas de semeadura. Para confirmar a metacrilização da gelatina, o produto da síntese foi submetido a análise de ressonância magnética de prótons 1H RMN. Os ensaios reológicos e fotoreológicos foram mensurados em um reômetro com uma geometria de cone e placa. Os dados foram submetidos a ANOVA de fator único e Teste de Tukey e análise de correlação de Pearson ((#38)#945;=0,05).			
<b>RESULTADOS</b>	O grau de metacrilização foi calculado em 82,2% e 82%. A concentração de 5% apresentou uma viscosidade cerca de 1 a 4 ordens de grandeza menor do que as demais concentrações. A área de histerese dos hidrogéis apresentaram forte correlação linear direta com a concentração de GelMA (r=0.98). As concentrações de 15 e 20% apresentaram os menores tempo de fotoreticulação após fotoativação com luz UV. A redução de alamarBlue mostrou resultados semelhantes de adesão e proliferação celular entre os grupos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A análise confirmou a metacrilização bem-sucedida da gelatina. A viscosidade e as propriedades reológicas dos hidrogéis de GelMA variam de acordo com a concentração do GelMA, porém essa concentração não mostrou diferença significativa na proliferação celular. Logo, o hidrogel a 20% GelMA, que apresentou maior tixotropia, é indicado o mais promissor para avaliação de bioimpressão. Referências:			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Yue K, Trujillo-de Santiago G, Alvarez MM, Tamayol A, Annabi N, Khademhosseini A. Synthesis, properties, and biomedical applications of gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogels. Biomaterials. 2015 Dec; 73:254-71. 2. Nichol JW, Koshy ST, Bae H, Hwang CM, Yamanlar S, Khademhosseini A. Cell-laden microengineered gelatin methacrylate hydrogels. Biomaterials. 2010 Jul;31(21):5536-44. 3. Sun M, Sun X, Wang Z, Guo S, Yu G, Yang H. Synthesis and Properties of Gelatin Methacryloyl (GelMA) Hydrogels and Their Recent Applications in Load-Bearing Tissue. Polymers (Basel). 2018 Nov 21;10(11):1290.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14359	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4315278 - LEONARDO RODRIGUES DE PAULA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marli Reinado Barbosa		
<b>TITULO</b>	TERAPIA COMPLEMENTAR DO OZÔNIO COMO MECANISMO PRÓ OXIDATIVO EM FERIDA DIABETICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>É entendido que a ozonioterapia é uma alternativa de terapia que se baseia no resultado da transformação do O<sub>2</sub> puro (medicinal) em ozônio (O<sub>3</sub>). Sabe-se que, o ozônio é um oxidante potente que melhora na oxigenação sanguínea. Garantindo melhor suprimento de oxigênio nos tecidos, reduzindo a adesão plaquetária, atuando como um analgésico e anti-inflamatório estimulando o crescimento tecidual de granulação, e em contato com fluidos orgânicos promove a formação de moléculas reativas de oxigênio no que se influencia eventos bioquímicos do metabolismo celular, proporcionando benefícios para a reparação tecidual, facilitando o crescimento do tecido epitelial, inibindo o crescimento bacteriano, promovendo ação antimicrobiana e fungicida. Uma classe de lesão que pode ser tratado com a ozonioterapia são as úlceras nos pés em pessoas com diabetes melitos (DM).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	OBJETIVO: Apresentar o efeito da ozonioterapia em lesão tecidual de paciente diabético.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>METODOLOGIA: Através de um relato de experiência, no acompanhamento de dois pacientes, sendo um do sexo masculino de 58 anos, apresentado lesão tecidual em pé esquerdo e um do sexo feminino com 62 anos, apresentado lesão tecidual em perna direita, ambos com diagnóstico de Diabetes tipo II, foram acompanhados em uma clínica de ozonioterapia, os procedimentos foram realizados por um enfermeiro, que após à avaliação do paciente, estabeleceu protocolo de atendimento aos mesmos, utilizando Ozônio por via tópica com aplicação de bag de ozônio envolvendo todo membro composto da ferida, com vedação da bolsa e aplicação do ozônio no período de 02 meses feito uma vez por semana, e ozônio retal para resposta inflamatória sistêmica, com registros da evolução da cicatrização e da dor.</p>			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>CONCLUSÃO: Diante do relato de experiência, pode-se observar que a ozonioterapia vêm sendo cada vez mais difundida e empregada no cenário da saúde, e apresentado grandes resultados em feridas. No entanto, apesar do resultado satisfatório apresentado pelos pacientes deste estudo de caso, seu uso na área clínica ainda não está totalmente regulamentado no Brasil, apesar de ser descrito que foi utilizada na primeira guerra mundial, no tratamento de lesões traumáticas e de pele em vítimas das lutas. Assim, o artigo apresenta os benefícios da ozonioterapia em feridas, porém, é necessário aguardar liberação para que possa ser difundida como terapia complementar.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>.Declaración de Madrid. Declaration of Madrid on Organic Agriculture and Food Systems. Madrid: FAO, 2020. Disponível em: <a href="https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5803895/mod_folder/content/0/2020%20Declaracio(#38)#769;n-de-Madrid_EN-7.pdf">https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5803895/mod_folder/content/0/2020%20Declaracio(#38)#769;n-de-Madrid_EN-7.pdf</a>. Acesso em: 5 de outubro de 2023. 2. SILVA, G. et al. OZONIOTERAPIA: UMA FORMA ALTERNATIVA DE TRATAMENTO NÃO RECONHECIDA. [s.l.: s.n.]. Disponível em: (#60)<a href="https://www.ufopa.edu.br/anaisdajornada/6/resumo/1435/ozonioterapia-uma-forma-alternativa-de-tratamento-nao-reconhecida#:~:text=Durante%20a%201(#62)">https://www.ufopa.edu.br/anaisdajornada/6/resumo/1435/ozonioterapia-uma-forma-alternativa-de-tratamento-nao-reconhecida#:~:text=Durante%20a%201(#62)</a>. Acesso em: 5 de outubro de 2023</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14360	Administração de Recursos Humanos	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4305647 - MAIKON RODRIGUES GOMES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Januario		
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO E A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	A Lei 8213/91 lei de cotas para PCDs, tem por obrigação garantir vagas para pessoas com deficiências, determinando que as empresas privadas com 100 empregados ou mais tenham no mínimo 2% das vagas destinadas aos PCDs. Segun-do IBGE de 2010 cerca de 24% da população brasileira, possuem algum tipo de deficiência de certo grau, seja ela visual, auditiva, motora e intelectual. Dentro do estado de São Paulo, temos 9.344.109 pessoas com pelo menos uma das deficiências encontradas, sendo a mais comum entre elas a deficiência visual. No entanto a acessibilidade ainda é um desafio que interfere na vida de PCDS na hora de entrar no mercado de trabalho, além da falta de acessibilidade a sociedade possuem dificuldades já estabelecidas mesmo com o grande número de PCDs.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo busca descrever e analisar de forma qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica algumas das dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam ao tentar entrar no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente artigo é do tipo descritivo, tendo o objetivo de encontrar informa-ções mais especificas e detalhadas de uma população, grupo ou situação (MAR-CONI; LAKATOS, 2009). Fazendo uso de levantamento de dados e abordagem qualitativa de modo a observar as informações encontradas para poder interpretar, analisar e discutir so-bre, usando fontes de pesquisa bibliográfica e documental. Segundo Gil (2002, p. 44), pesquisa bibliográfica "é desenvolvida com base em ma terial já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".			
<b>RESULTADOS</b>	A inclusão de pessoas com deficiência possui relação direta com a politica de res-ponsabilidade social, quando qualquer pessoa independente de classe busca estar inserida na sociedade, principalmente quando essas pessoas já são excluídas e encontram no mercado de trabalho uma forma de se inserir na dinâmica da sociedade A contratação de pessoas com deficiência ainda se mostra muito seletiva e precon-ceituosa com diversos problemas estruturais onde deficientes encontram uma edu-cação precária e uma baixa remuneração salarial, o que não se mostra vantajoso para nenhum lado. Contudo, em meio a tantas dificuldades, o estudo questiona e procura entender como o mercado de trabalho lida com a contratação de pessoas com deficiência			
<b>CONCLUSOES</b>	A pesquisa apontou que as empresas procuram sempre pelo candidato PCD mais qualificado e para exercer o cargo. Na maioria das vezes, pessoas com defici-ência não são contratadas por conta de não estarem preparadas o suficiente para exercer o cargo ou as empresas ainda não se adaptaram, bem como não montaram uma estrutura adequada de acordo com o grau ou tipo de deficiência para empregá-los.			
<b>REFERENCIAS</b>	GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Cientifi-ca. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia: Filosofia pagã an-tiga. 4.ed. Vol.1. São Paulo: Paulus, 2003.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14360	Administração de Recursos Humanos	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4343140 - MICHELE GOMES DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Januario		
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO E A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A Lei 8213/91 lei de cotas para PCDs, tem por obrigação garantir vagas para pessoas com deficiências, determinando que as empresas privadas com 100 empregados ou mais tenham no mínimo 2% das vagas destinadas aos PCDs. Segundo IBGE de 2010 cerca de 24% da população brasileira, possuem algum tipo de deficiência de certo grau, seja ela visual, auditiva, motora e intelectual. Dentro do estado de São Paulo, temos 9.344.109 pessoas com pelo menos uma das deficiências encontradas, sendo a mais comum entre elas a deficiência visual. No entanto a acessibilidade ainda é um desafio que interfere na vida de PCDs na hora de entrar no mercado de trabalho, além da falta de acessibilidade a sociedade possuem dificuldades já estabelecidas mesmo com o grande número de PCDs.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo busca descrever e analisar de forma qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica algumas das dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam ao tentar entrar no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente artigo é do tipo descritivo, tendo o objetivo de encontrar informações mais específicas e detalhadas de uma população, grupo ou situação (MARCONI; LAKATOS, 2009). Fazendo uso de levantamento de dados e abordagem qualitativa de modo a observar as informações encontradas para poder interpretar, analisar e discutir sobre, usando fontes de pesquisa bibliográfica e documental. Segundo Gil (2002, p. 44), pesquisa bibliográfica "é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".			
<b>RESULTADOS</b>	A inclusão de pessoas com deficiência possui relação direta com a política de responsabilidade social, quando qualquer pessoa independente de classe busca estar inserida na sociedade, principalmente quando essas pessoas já são excluídas e encontram no mercado de trabalho uma forma de se inserir na dinâmica da sociedade. A contratação de pessoas com deficiência ainda se mostra muito seletiva e preconceituosa com diversos problemas estruturais onde deficientes encontram uma educação precária e uma baixa remuneração salarial, o que não se mostra vantajoso para nenhum lado. Contudo, em meio a tantas dificuldades, o estudo questiona e procura entender como o mercado de trabalho lida com a contratação de pessoas com deficiência.			
<b>CONCLUSOES</b>	A pesquisa apontou que as empresas procuram sempre pelo candidato PCD mais qualificado e para exercer o cargo. Na maioria das vezes, pessoas com deficiência não são contratadas por conta de não estarem preparadas o suficiente para exercer o cargo ou as empresas ainda não se adaptaram, bem como não montaram uma estrutura adequada de acordo com o grau ou tipo de deficiência para empregá-los.			
<b>REFERENCIAS</b>	GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia: Filosofia pagã antiga. 4.ed. Vol.1. São Paulo: Paulus, 2003.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14360	Administração de Recursos Humanos	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4372841 - NICOLAS MANGUEIRA RAMALHO TAVARES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Januario		
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO E A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A Lei 8213/91 lei de cotas para PCDs, tem por obrigação garantir vagas para pessoas com deficiências, determinando que as empresas privadas com 100 empregados ou mais tenham no mínimo 2% das vagas destinadas aos PCDs. Segundo IBGE de 2010 cerca de 24% da população brasileira, possuem algum tipo de deficiência de certo grau, seja ela visual, auditiva, motora e intelectual. Dentro do estado de São Paulo, temos 9.344.109 pessoas com pelo menos uma das deficiências encontradas, sendo a mais comum entre elas a deficiência visual. No entanto a acessibilidade ainda é um desafio que interfere na vida de PCDS na hora de entrar no mercado de trabalho, além da falta de acessibilidade a sociedade possuem dificuldades já estabelecidas mesmo com o grande número de PCDs.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo busca descrever e analisar de forma qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica algumas das dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam ao tentar entrar no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente artigo é do tipo descritivo, tendo o objetivo de encontrar informações mais específicas e detalhadas de uma população, grupo ou situação (MARCONI; LAKATOS, 2009). Fazendo uso de levantamento de dados e abordagem qualitativa de modo a observar as informações encontradas para poder interpretar, analisar e discutir so-bre, usando fontes de pesquisa bibliográfica e documental. Segundo Gil (2002, p. 44), pesquisa bibliográfica "é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".			
<b>RESULTADOS</b>	A inclusão de pessoas com deficiência possui relação direta com a política de responsabilidade social, quando qualquer pessoa independente de classe busca estar inserida na sociedade, principalmente quando essas pessoas já são excluídas e encontram no mercado de trabalho uma forma de se inserir na dinâmica da sociedade A contratação de pessoas com deficiência ainda se mostra muito seletiva e preconceituosa com diversos problemas estruturais onde deficientes encontram uma educação precária e uma baixa remuneração salarial, o que não se mostra vantajoso para nenhum lado. Contudo, em meio a tantas dificuldades, o estudo questiona e procura entender como o mercado de trabalho lida com a contratação de pessoas com deficiência			
<b>CONCLUSOES</b>	A pesquisa apontou que as empresas procuram sempre pelo candidato PCD mais qualificado e para exercer o cargo. Na maioria das vezes, pessoas com deficiência não são contratadas por conta de não estarem preparadas o suficiente para exercer o cargo ou as empresas ainda não se adaptaram, bem como não montaram uma estrutura adequada de acordo com o grau ou tipo de deficiência para empregá-los.			
<b>REFERENCIAS</b>	GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia: Filosofia pagã an-tiga. 4.ed. Vol.1. São Paulo: Paulus, 2003.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14360	Administração de Recursos Humanos	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442628 - INGRID VITORIA ALMEIDA SAMPAIO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Januario		
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO E A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A Lei 8213/91 lei de cotas para PCDs, tem por obrigação garantir vagas para pessoas com deficiências, determinando que as empresas privadas com 100 empregados ou mais tenham no mínimo 2% das vagas destinadas aos PCDs. Segundo do IBGE de 2010 cerca de 24% da população brasileira, possuem algum tipo de deficiência de certo grau, seja ela visual, auditiva, motora e intelectual. Dentro do estado de São Paulo, temos 9.344.109 pessoas com pelo menos uma das deficiências encontradas, sendo a mais comum entre elas a deficiência visual. No entanto a acessibilidade ainda é um desafio que interfere na vida de PCDS na hora de entrar no mercado de trabalho, além da falta de acessibilidade a sociedade possuem dificuldades já estabelecidas mesmo com o grande número de PCDs.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo busca descrever e analisar de forma qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica algumas das dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam ao tentar entrar no mercado de trabalho.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente artigo é do tipo descritivo, tendo o objetivo de encontrar informações mais específicas e detalhadas de uma população, grupo ou situação (MARCONI; LAKATOS, 2009). Fazendo uso de levantamento de dados e abordagem qualitativa de modo a observar as informações encontradas para poder interpretar, analisar e discutir so-bre, usando fontes de pesquisa bibliográfica e documental. Segundo Gil (2002, p. 44), pesquisa bibliográfica "é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".			
<b>RESULTADOS</b>	A inclusão de pessoas com deficiência possui relação direta com a política de responsabilidade social, quando qualquer pessoa independente de classe busca estar inserida na sociedade, principalmente quando essas pessoas já são excluídas e encontram no mercado de trabalho uma forma de se inserir na dinâmica da sociedade A contratação de pessoas com deficiência ainda se mostra muito seletiva e preconceituosa com diversos problemas estruturais onde deficientes encontram uma educação precária e uma baixa remuneração salarial, o que não se mostra vantajoso para nenhum lado. Contudo, em meio a tantas dificuldades, o estudo questiona e procura entender como o mercado de trabalho lida com a contratação de pessoas com deficiência			
<b>CONCLUSOES</b>	A pesquisa apontou que as empresas procuram sempre pelo candidato PCD mais qualificado e para exercer o cargo. Na maioria das vezes, pessoas com deficiência não são contratadas por conta de não estarem preparadas o suficiente para exercer o cargo ou as empresas ainda não se adaptaram, bem como não montaram uma estrutura adequada de acordo com o grau ou tipo de deficiência para empregá-los.			
<b>REFERENCIAS</b>	GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia: Filosofia pagã an-tiga. 4.ed. Vol.1. São Paulo: Paulus, 2003.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14362	Mercadologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3608051 - TALITA SAMIRA COSTA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiola Assumpção Barrella		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As mídias sociais tornaram-se componentes indispensáveis nas estratégias de marketing digital, com sua capacidade de alcançar um público vasto e diversificado, principalmente após a pandemia. O marketing digital se tornou essencial na promoção de produtos, serviços e marcas, utilizando canais digitais como seu veículo principal. As mídias estabelecem uma conexão eficaz com o público, impulsionando as vendas. Nesse contexto, as mídias sociais surgem como uma ferramenta impactante e relevante. Apresentamos pesquisas que destacam a tendência crescente de utilização de mídias sociais como canal de vendas. Abordou-se dados e estudos que comprovam a eficácia desse método e como ele tem evoluído ao longo do tempo. Explorou-se como as mídias sociais não apenas conectam as marcas ao seu público-alvo de maneira eficiente, mas também impulsionam resultados tangíveis, transformando-se em um instrumento vital para qualquer estratégia de marketing digital bem desenvolvida			
<b>OBJETIVOS</b>	Destacar os impactos do marketing digital na vida dos consumidores que se fortaleceu, especialmente após o período da pandemia do COVID-19, e trouxe benefícios significativos para as empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo de pesquisa descritiva. Os dados foram obtidos a partir de pesquisas em plataformas como o Google Acadêmico para se encontrar artigos, TCCs, Dissertações e Teses sobre o tema. Ao analisar dados secundários obtidos através das informações coletadas propõe-se uma qualitativa obtenção de resultados e o alcance dos objetivos propostos na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi verificado que as ferramentas apresentadas, Instagram e WhatsApp, são de grande importância para qualquer empresa que visa crescimento no marketing digital. Verificou-se que existe a facilidade de estar o tempo inteiro na mente do consumidor, ou seja, estimulando o processo de compra. O processo se inicia com um post no Instagram e depois com mensagens no WhatsApp para estimular a aquisição do produto ou serviço. A maioria das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, para facilitar o contato deixam o link do número de WhatsApp na bio do Instagram.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O marketing digital se tornou uma parte vital das estratégias de negócios modernas. É uma ferramenta poderosa para alcançar e envolver os consumidores, mas requer adaptação constante e atenção aos desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças nas preferências dos consumidores.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALBINO, P. M. B.; GUEDES, R. C. M.; FARIAS, Y. C.; CABRAL, D. V. WhatsApp Business: Aprenda como utilizar a plataforma e adaptar seu negócio para um novo canal de comercialização. Viçosa - MG: UFV, DER, IPPDS, 2021. Disponível em (#60) <a href="https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62">https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62</a> Acesso em 19 de setembro de 2023. ALVES, Tarsis Gouveia. Whats app como mídia social estratégica para vendas no contexto da pandemia da Covid-19: um estudo nas mercearias de Caruaru-PE. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62">https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62</a> . Acesso em 29 de setembro de 2023. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. Disponível em: <a href="https://plataforma.bvirtual.com.br">https://plataforma.bvirtual.com.br</a> . Acesso em: 08 out. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14362	Mercadologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4310918 - SABRINA APARECIDA LIMA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiola Assumpção Barrella		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As mídias sociais tornaram-se componentes indispensáveis nas estratégias de marketing digital, com sua capacidade de alcançar um público vasto e diversificado, principalmente após a pandemia. O marketing digital se tornou essencial na promoção de produtos, serviços e marcas, utilizando canais digitais como seu veículo principal. As mídias estabelecem uma conexão eficaz com o público, impulsionando as vendas. Nesse contexto, as mídias sociais surgem como uma ferramenta impactante e relevante. Apresentamos pesquisas que destacam a tendência crescente de utilização de mídias sociais como canal de vendas. Abordou-se dados e estudos que comprovam a eficácia desse método e como ele tem evoluído ao longo do tempo. Explorou-se como as mídias sociais não apenas conectam as marcas ao seu público-alvo de maneira eficiente, mas também impulsionam resultados tangíveis, transformando-se em um instrumento vital para qualquer estratégia de marketing digital bem desenvolvida			
<b>OBJETIVOS</b>	Destacar os impactos do marketing digital na vida dos consumidores que se fortaleceu, especialmente após o período da pandemia do COVID-19, e trouxe benefícios significativos para as empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo de pesquisa descritiva. Os dados foram obtidos a partir de pesquisas em plataformas como o Google Acadêmico para se encontrar artigos, TCCs, Dissertações e Teses sobre o tema. Ao analisar dados secundários obtidos através das informações coletadas propõe-se uma qualitativa obtenção de resultados e o alcance dos objetivos propostos na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi verificado que as ferramentas apresentadas, Instagram e WhatsApp, são de grande importância para qualquer empresa que visa crescimento no marketing digital. Verificou-se que existe a facilidade de estar o tempo inteiro na mente do consumidor, ou seja, estimulando o processo de compra. O processo se inicia com um post no Instagram e depois com mensagens no WhatsApp para estimular a aquisição do produto ou serviço. A maioria das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, para facilitar o contato deixam o link do número de WhatsApp na bio do Instagram.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O marketing digital se tornou uma parte vital das estratégias de negócios modernas. É uma ferramenta poderosa para alcançar e envolver os consumidores, mas requer adaptação constante e atenção aos desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças nas preferências dos consumidores.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALBINO, P. M. B.; GUEDES, R. C. M.; FARIAS, Y. C.; CABRAL, D. V. WhatsApp Business: Aprenda como utilizar a plataforma e adaptar seu negócio para um novo canal de comercialização. Viçosa - MG: UFV, DER, IPPDS, 2021. Disponível em (#60) <a href="https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62">https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62</a> Acesso em 19 de setembro de 2023. ALVES, Tarsis Gouveia. Whats app como mídia social estratégica para vendas no contexto da pandemia da Covid-19: um estudo nas mercearias de Caruaru-PE. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62">https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62</a> . Acesso em 29 de setembro de 2023. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. Disponível em: <a href="https://plataforma.bvirtual.com.br">https://plataforma.bvirtual.com.br</a> . Acesso em: 08 out. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14362	Mercadologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4376773 - ANA BEATRIZ DE CARVALHO SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiola Assumpção Barrella		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As mídias sociais tornaram-se componentes indispensáveis nas estratégias de marketing digital, com sua capacidade de alcançar um público vasto e diversificado, principalmente após a pandemia. O marketing digital se tornou essencial na promoção de produtos, serviços e marcas, utilizando canais digitais como seu veículo principal. As mídias estabelecem uma conexão eficaz com o público, impulsionando as vendas. Nesse contexto, as mídias sociais surgem como uma ferramenta impactante e relevante. Apresentamos pesquisas que destacam a tendência crescente de utilização de mídias sociais como canal de vendas. Abordou-se dados e estudos que comprovam a eficácia desse método e como ele tem evoluído ao longo do tempo. Explorou-se como as mídias sociais não apenas conectam as marcas ao seu público-alvo de maneira eficiente, mas também impulsionam resultados tangíveis, transformando-se em um instrumento vital para qualquer estratégia de marketing digital bem desenvolvida			
<b>OBJETIVOS</b>	Destacar os impactos do marketing digital na vida dos consumidores que se fortaleceu, especialmente após o período da pandemia do COVID-19, e trouxe benefícios significativos para as empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo de pesquisa descritiva. Os dados foram obtidos a partir de pesquisas em plataformas como o Google Acadêmico para se encontrar artigos, TCCs, Dissertações e Teses sobre o tema. Ao analisar dados secundários obtidos através das informações coletadas propõe-se uma qualitativa obtenção de resultados e o alcance dos objetivos propostos na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi verificado que as ferramentas apresentadas, Instagram e WhatsApp, são de grande importância para qualquer empresa que visa crescimento no marketing digital. Verificou-se que existe a facilidade de estar o tempo inteiro na mente do consumidor, ou seja, estimulando o processo de compra. O processo se inicia com um post no Instagram e depois com mensagens no WhatsApp para estimular a aquisição do produto ou serviço. A maioria das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, para facilitar o contato deixam o link do número de WhatsApp na bio do Instagram.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O marketing digital se tornou uma parte vital das estratégias de negócios modernas. É uma ferramenta poderosa para alcançar e envolver os consumidores, mas requer adaptação constante e atenção aos desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças nas preferências dos consumidores.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALBINO, P. M. B.; GUEDES, R. C. M.; FARIAS, Y. C.; CABRAL, D. V. WhatsApp Business: Aprenda como utilizar a plataforma e adaptar seu negócio para um novo canal de comercialização. Viçosa - MG: UFV, DER, IPPDS, 2021. Disponível em (#60) <a href="https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62">https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62</a> Acesso em 19 de setembro de 2023. ALVES, Tarsis Gouveia. Whats app como mídia social estratégica para vendas no contexto da pandemia da Covid-19: um estudo nas mercearias de Caruaru-PE. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62">https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62</a> . Acesso em 29 de setembro de 2023. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. Disponível em: <a href="https://plataforma.bvirtual.com.br">https://plataforma.bvirtual.com.br</a> . Acesso em: 08 out. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14362	Mercadologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4430620 - VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiola Assumpção Barrella		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As mídias sociais tornaram-se componentes indispensáveis nas estratégias de marketing digital, com sua capacidade de alcançar um público vasto e diversificado, principalmente após a pandemia. O marketing digital se tornou essencial na promoção de produtos, serviços e marcas, utilizando canais digitais como seu veículo principal. As mídias estabelecem uma conexão eficaz com o público, impulsionando as vendas. Nesse contexto, as mídias sociais surgem como uma ferramenta impactante e relevante. Apresentamos pesquisas que destacam a tendência crescente de utilização de mídias sociais como canal de vendas. Abordou-se dados e estudos que comprovam a eficácia desse método e como ele tem evoluído ao longo do tempo. Explorou-se como as mídias sociais não apenas conectam as marcas ao seu público-alvo de maneira eficiente, mas também impulsionam resultados tangíveis, transformando-se em um instrumento vital para qualquer estratégia de marketing digital bem desenvolvida			
<b>OBJETIVOS</b>	Destacar os impactos do marketing digital na vida dos consumidores que se fortaleceu, especialmente após o período da pandemia do COVID-19, e trouxe benefícios significativos para as empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo de pesquisa descritiva. Os dados foram obtidos a partir de pesquisas em plataformas como o Google Acadêmico para se encontrar artigos, TCCs, Dissertações e Teses sobre o tema. Ao analisar dados secundários obtidos através das informações coletadas propõe-se uma qualitativa obtenção de resultados e o alcance dos objetivos propostos na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi verificado que as ferramentas apresentadas, Instagram e WhatsApp, são de grande importância para qualquer empresa que visa crescimento no marketing digital. Verificou-se que existe a facilidade de estar o tempo inteiro na mente do consumidor, ou seja, estimulando o processo de compra. O processo se inicia com um post no Instagram e depois com mensagens no WhatsApp para estimular a aquisição do produto ou serviço. A maioria das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, para facilitar o contato deixam o link do número de WhatsApp na bio do Instagram.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O marketing digital se tornou uma parte vital das estratégias de negócios modernas. É uma ferramenta poderosa para alcançar e envolver os consumidores, mas requer adaptação constante e atenção aos desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças nas preferências dos consumidores.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALBINO, P. M. B.; GUEDES, R. C. M.; FARIAS, Y. C.; CABRAL, D. V. WhatsApp Business: Aprenda como utilizar a plataforma e adaptar seu negócio para um novo canal de comercialização. Viçosa - MG: UFV, DER, IPPDS, 2021. Disponível em (#60) <a href="https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62">https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62</a> Acesso em 19 de setembro de 2023. ALVES, Tarsis Gouveia. Whats app como mídia social estratégica para vendas no contexto da pandemia da Covid-19: um estudo nas mercearias de Caruaru-PE. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62">https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62</a> . Acesso em 29 de setembro de 2023. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. Disponível em: <a href="https://plataforma.bvirtual.com.br">https://plataforma.bvirtual.com.br</a> . Acesso em: 08 out. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14362	Mercadologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442679 - GABRIELLY SANTOS SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiola Assumpção Barrella		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As mídias sociais tornaram-se componentes indispensáveis nas estratégias de marketing digital, com sua capacidade de alcançar um público vasto e diversificado, principalmente após a pandemia. O marketing digital se tornou essencial na promoção de produtos, serviços e marcas, utilizando canais digitais como seu veículo principal. As mídias estabelecem uma conexão eficaz com o público, impulsionando as vendas. Nesse contexto, as mídias sociais surgem como uma ferramenta impactante e relevante. Apresentamos pesquisas que destacam a tendência crescente de utilização de mídias sociais como canal de vendas. Abordou-se dados e estudos que comprovam a eficácia desse método e como ele tem evoluído ao longo do tempo. Explorou-se como as mídias sociais não apenas conectam as marcas ao seu público-alvo de maneira eficiente, mas também impulsionam resultados tangíveis, transformando-se em um instrumento vital para qualquer estratégia de marketing digital bem desenvolvida			
<b>OBJETIVOS</b>	Destacar os impactos do marketing digital na vida dos consumidores que se fortaleceu, especialmente após o período da pandemia do COVID-19, e trouxe benefícios significativos para as empresas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo de pesquisa descritiva. Os dados foram obtidos a partir de pesquisas em plataformas como o Google Acadêmico para se encontrar artigos, TCCs, Dissertações e Teses sobre o tema. Ao analisar dados secundários obtidos através das informações coletadas propõe-se uma qualitativa obtenção de resultados e o alcance dos objetivos propostos na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi verificado que as ferramentas apresentadas, Instagram e WhatsApp, são de grande importância para qualquer empresa que visa crescimento no marketing digital. Verificou-se que existe a facilidade de estar o tempo inteiro na mente do consumidor, ou seja, estimulando o processo de compra. O processo se inicia com um post no Instagram e depois com mensagens no WhatsApp para estimular a aquisição do produto ou serviço. A maioria das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, para facilitar o contato deixam o link do número de WhatsApp na bio do Instagram.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O marketing digital se tornou uma parte vital das estratégias de negócios modernas. É uma ferramenta poderosa para alcançar e envolver os consumidores, mas requer adaptação constante e atenção aos desenvolvimentos tecnológicos e as mudanças nas preferências dos consumidores.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALBINO, P. M. B.; GUEDES, R. C. M.; FARIAS, Y. C.; CABRAL, D. V. WhatsApp Business: Aprenda como utilizar a plataforma e adaptar seu negócio para um novo canal de comercialização. Viçosa - MG: UFV, DER, IPPDS, 2021. Disponível em (#60) <a href="https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62">https://bibliotecasemiarios.ufv.br/jspui/handle/123456789/134/#62</a> Acesso em 19 de setembro de 2023. ALVES, Tarsis Gouveia. Whats app como mídia social estratégica para vendas no contexto da pandemia da Covid-19: um estudo nas mercearias de Caruaru-PE. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62">https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42902/#62</a> . Acesso em 29 de setembro de 2023. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. Disponível em: <a href="https://plataforma.bvirtual.com.br">https://plataforma.bvirtual.com.br</a> . Acesso em: 08 out. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14363	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4259891 - JODKANDLYS CANDEIA RESENDE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiana Martins e Martins de Oliveira		
<b>TITULO</b>	Relação dos valores médios da pressão arterial e ansiedade em uma clínica odontológica de urgência			
<b>INTRODUCAO</b>	A ansiedade frente o tratamento odontológico é frequentemente observada em clínicas odontológicas e, quando é detectado um aumento nos valores da pressão arterial (PA), pode ser classificada como um tipo de hipertensão do avental branco (HAB).			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi medir a PA antes e após procedimentos odontológicos de emergência em uma clínica-escola de odontologia e discutir a importância da abordagem desses pacientes considerando os valores da PA e a ansiedade odontológica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pacientes foram abordados previamente e após as consultas odontológicas de urgência e foram obtidos os valores da PA. A variação da medida da PA foi comparada estatisticamente com a Escala Visual Analógica (EVA), histórico de odontologia, hipertensão arterial (HA) e outras comorbidades.			
<b>RESULTADOS</b>	Resultados: Entre todos os participantes (n=75), 66,7% pacientes eram do sexo feminino, 33,3% do sexo masculino, idade (45.5 ± 12.7), 78,7% apresentavam dor antes do atendimento odontológico, escala EVA (5.2 ± 3.5) e em uso de analgésicos e 44,4% fobia em relação ao tratamento odontológico, os mesmos relataram que por isto só retornavam ao consultório após 2 anos ou mais. Dentre os dados relacionados à PA, 53,3% pacientes tinham histórico familiar de HPB, 28,9% diagnóstico de HA, entre esses, 50% em uso regular de medicação anti-hipertensiva. A PA sistólica média foi de 131,9 e a diastólica de 90,4 mm/hg, sendo que em termos de evolução a variação foi de 3,7 a 1,7 respectivamente.			
<b>CONCLUSOES</b>	O monitoramento da PA na clínica odontológica e como foi visto nesta pesquisa, nossos resultados mostraram níveis mais elevados de PA antes do atendimento odontológico porém estes parâmetros não foram considerados determinantes para realização dos procedimentos clínicos de urgência.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Stergiou GS, Parati G. Diagnosis and management of white coat hypertension. Hypertension. 2018;72(2):232-233. 2. Rao SS, Ramana Reddy KV, Nath P, Bindra S, Jadaun G. Is screening in dental office an effective method of detecting undiagnosed hypertension? Indian J Dent Res. 2018 Jul-Aug;29(4):534-539. 3. Barroso et al. 7a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14363	Ciências da Saúde	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4752082 - LUANA PEREIRA CORDEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabiana Martins e Martins de Oliveira		
<b>TITULO</b>	Relação dos valores médios da pressão arterial e ansiedade em uma clínica odontológica de urgência			
<b>INTRODUCAO</b>	A ansiedade frente o tratamento odontológico é frequentemente observada em clínicas odontológicas e, quando é detectado um aumento nos valores da pressão arterial (PA), pode ser classificada como um tipo de hipertensão do avental branco (HAB).			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi medir a PA antes e após procedimentos odontológicos de emergência em uma clínica-escola de odontologia e discutir a importância da abordagem desses pacientes considerando os valores da PA e a ansiedade odontológica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pacientes foram abordados previamente e após as consultas odontológicas de urgência e foram obtidos os valores da PA. A variação da medida da PA foi comparada estatisticamente com a Escala Visual Analógica (EVA), histórico de odontologia, hipertensão arterial (HA) e outras comorbidades.			
<b>RESULTADO S</b>	Resultados: Entre todos os participantes (n=75), 66,7% pacientes eram do sexo feminino, 33,3% do sexo masculino, idade (45.5 ± 12.7), 78,7% apresentavam dor antes do atendimento odontológico, escala EVA (5.2 ± 3.5) e em uso de analgésicos e 44.4% fobia em relação ao tratamento odontológico, os mesmos relataram que por isto só retornavam ao consultório após 2 anos ou mais. Dentre os dados relacionados à PA, 53,3% pacientes tinham histórico familiar de HPB, 28,9% diagnóstico de HA, entre esses, 50% em uso regular de medicação anti-hipertensiva. A PA sistólica média foi de 131,9 e a diastólica de 90,4 mm/hg, sendo que em termos de evolução a variação foi de 3,7 a 1,7 respectivamente.			
<b>CONCLUSOES</b>	O monitoramento da PA na clínica odontológica e como foi visto nesta pesquisa, nossos resultados mostraram níveis mais elevados de PA antes do atendimento odontológico porém estes parâmetros não foram considerados determinantes para realização dos procedimentos clínicos de urgência.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Stergiou GS, Parati G. Diagnosis and management of white coat hypertension. Hypertension. 2018;72(2):232-233. 2. Rao SS, Ramana Reddy KV, Nath P, Bindra S, Jadaun G. Is screening in dental office an effective method of detecting undiagnosed hypertension? Indian J Dent Res. 2018 Jul-Aug;29(4):534-539. 3. Barroso et al. 7a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14367	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3694097 - TAMIRIS PEREIRA DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	DISPOSITIVOS DE IRRIGAÇÃO EM ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A eliminação completa de todo o material necrótico e carga microbiana do canal radicular infectado, além de material obturador remanescente, quando necessário, são os objetivos do tratamento endodôntico e muito é conseguido após o uso dos devidos instrumentos endodônticos e substâncias irrigadoras durante a terapia. O hipoclorito de sódio tem sido uma das substâncias mais aceitas mundialmente, mas dispositivos tem sido associado a ele para aumentar a efetividade de sua ação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar através de uma revisão de literatura alguns dispositivos que atuam para melhorar a ação das soluções irrigadoras durante a terapia endodôntica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2012 a 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	Entre os materiais indicados para auxiliar na remoção de debris de dentro do Sistema de canais radiculares há o Canal Brush (Roeko Canal Brush™, Coltène/Whaledent, Langenau, Germany) que é um tipo de micro escova com alta flexibilidade podendo ser usada de forma manual ou em rotação mecânica (Gorduysus, et al., 2012). Outra forma de ativar as soluções irrigadoras são as pontas ultrassônicas e os dispositivos sônicos (Plotino et al, 2019), sendo, que, aparentemente, ambos conseguem aumentar a efetividade da irrigação nos canais, segundo os autores. Outros dispositivos, como limas endodônticas apropriadas para aumentar a atividade irrigadora, é a proposta da lima Endo-Finisher R, (FKG, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), cuja ação foi considerada semelhante a outros dispositivos (Matoso et al, 2022). O irrigante mais aceito em nível mundial, apesar de ter algumas limitações, ainda é o hipoclorito de sódio. O fato de a lima Endo-finisher R melhorar a efetividade da irrigação, pode ser atribuído à agitação da substância química e expansão que ocorre dentro do espaço do canal radicular, tornando-a ajustada a todas as paredes do canal. As micro escovas e os métodos sônicos e ultrassônicos também aumentam a agitação mecânica do irrigante e, por isso, aumentam a efetividade da solução.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Todos os métodos utilizados parecem ter melhora na efetividade da ação das substâncias irrigadoras na remoção de debris e material obturador dentro do sistema de canais radiculares.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1-Gorduysus M, Yilmaz Z, Gorduysus O, Atila B P, Karapinar SO. Effectiveness of a new canal brushing technique in removing calcium hydroxide from the root canal system: A scanning electron microscope study. J Conserv Dent 2012;15:367-371. 2-Plotino, G, Grande, NM, Mercade, M, Cortese, T, Staffoli, S, Gambarini, G, Testarelli, L. (2022). Efficacy of sonic and ultrasonic irrigation devices in the removal of debris from canal irregularities in artificial root canals. J. Appl. Oral Sci, 2019, 27. 3. Matoso, FB, Quintana, RM, Jardine, AP, Delai, D, Fontanella, VRC, Grazziotin, Soares, R, Kopper, PMP. XP Endo Finisher-R and PUI as supplementary methods to remove root filling materials from curved canals. Braz. Oral Res. 2022;36:e053			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14367	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4598008 - CAROLINA SILVA MONTEIRO MARTINHA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	DISPOSITIVOS DE IRRIGAÇÃO EM ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A eliminação completa de todo o material necrótico e carga microbiana do canal radicular infectado, além de material obturador remanescente, quando necessário, são os objetivos do tratamento endodôntico e muito é conseguido após o uso dos devidos instrumentos endodônticos e substâncias irrigadoras durante a terapia. O hipoclorito de sódio tem sido uma das substâncias mais aceitas mundialmente, mas dispositivos tem sido associado a ele para aumentar a efetividade de sua ação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar atrave(#38)#769;s de uma revisa(#38)#771;o de literatura alguns dispositivos que atuam para melhorar a ação das soluções irrigadoras durante a terapia endodôntica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2012 a 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	Entre os materiais indicados para auxiliar na remoção de debris de dentro do Sistema de canais radiculares há o Canal Brush (Roeko Canal Brush™, Coltène/Whaledent, Langenau, Germany) que é um tipo de micro escova com alta flexibilidade podendo ser usada de forma manual ou em rotação mecânica (Gorduysus, et al., 2012). Outra forma de ativar as soluções irrigadoras são as pontas ultrassônicas e os dispositivos sônicos (Plotino et al, 2019), sendo, que, aparentemente, ambos conseguem aumentar a efetividade da irrigação nos canais, segundo os autores. Outros dispositivos, como limas endodônticas apropriadas para aumentar a atividade irrigadora, é a proposta da lima Endo-Finisher R, (FKG, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), cuja ação foi considerada semelhante a outros dispositivos (Matoso et al, 2022). O irrigante mais aceito em nível mundial, apesar de ter algumas limitações, ainda é o hipoclorito de sódio. O fato de a lima Endo-finisher R melhorar a efetividade da irrigação, pode ser atribuído à agitação da substância química e expansão que ocorre dentro do espaço do canal radicular, tornando-a ajustada a todas as paredes do canal. As micro escovas e os métodos sônicos e ultrassônicos também aumentam a agitação mecânica do irrigante e, por isso, aumentam a efetividade da solução.			
<b>CONCLUSOES</b>	Todos os métodos utilizados parecem ter melhora na efetividade da ação das substâncias irrigadoras na remoção de debris e material obturador dentro do sistema de canais radiculares.			
<b>REFERENCIAS</b>	1-Gorduysus M, Yilmaz Z, Gorduysus O, Atila B P, Karapinar SO. Effectiveness of a new canal brushing technique in removing calcium hydroxide from the root canal system: A scanning electron microscope study. J Conserv Dent 2012;15:367-371. 2-Plotino, G, Grande, NM, Mercade, M, Cortese, T, Staffoli, S, Gambarini, G, Testarelli, L. (2022). Efficacy of sonic and ultrasonic irrigation devices in the removal of debris from canal irregularities in artificial root canals. J. Appl. Oral Sci, 2019, 27. 3. Matoso, FB, Quintana, RM, Jardine, AP, Delai, D, Fontanella, VRC, Grazziotin, Soares, R, Kopper, PMP. XP Endo Finisher-R and PUI as supplementary methods to remove root filling materials from curved canals. Braz. Oral Res. 2022;36:e053			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14369	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3266443 - GUILHERME BORGES DE LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	A reconstrução de dentes tratados endodonticamente (DTE) é um dos desafios da Odontologia Restauradora, pois geralmente toda ou a maior parte da coroa dentária, muitas vezes, é perdida por lesão de cárie, erosão, abrasão, restaurações anteriores e possíveis traumas. A maneira ideal de restaurar os dentes após o tratamento endodôntico continua a ser um tópico controverso. (Palma et al., 2021). As modificações nas propriedades biomecânicas e integridade estrutural dos dentes são mais provavelmente atribuídas à perda volumétrica dos tecidos duros, assim, a preservação do dente remanescente estrutura é importante para a longevidade do tratamento endodôntico (Carvalho, de et al., 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisão de literatura que propõe demonstrar o tratamento para Dente Tratado Endodonticamente com base em princípios biomiméticos de adesão e preservação dentária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2016 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	O prognóstico da restauração de dentes pós- endodontia depende principalmente de sua estrutura remanescente (Jurema et al., 2021; Zarow et al., 2021; Borzangy et al., 2019). Dentes com canais radiculares alargados são mais suscetíveis a fraturas, pois sua estrutura é mais fragilizada para tolerar as forças mastigatórias normais (Soares et al., 2018). Além disso, a fratura também ocorre quando as cargas aplicadas excedem a resistência à tração ou o limite proporcional da dentina (Kasuya et al., 2020).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os avanços tecnológicos em materiais dentários nos últimos anos têm revolucionado os conceitos aplicados a odontologia restauradora, tornando-a basicamente uma odontologia adesiva. A correta seleção de agentes cimentantes com módulo de elasticidade próximo da dentina, somados ao pino de fibra, são importantes na mimetização da estrutura dental, fatores esses que, quando associados a escolha de materiais restauradores que necessitem de menor número de etapas clínicas são importantes no sucesso do tratamento restaurador com pinos de fibra de vidro a longo prazo.			
<b>REFERENCIAS</b>	1-Lima, D. da S., Lima, D. C., Gomes Junior, R. da C., Costa, K. B., Vasconcelos, O. F., (#38) Lima, T. M. de. (2020). Comportamento biomimético dos pinos de fibra de vidro: relato de caso. Archives of Health Investigation , 10 (2), 296–300. 2-Palma, FAM., Martim, L., Amorim, JVO., Góis, IL., Abreu, GBA., da Cruz, EDS., da Rocha, DM. (#38) Nahsan, FPS. (2021). Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura / Biomimetic approach to endodontically treated teeth: Literature review. Brazilian Journal of Development, 7(10), 100286–100300. 3-Sopi(#38)#324;ska K, Bo(#38)#322,tacz-Rzepakowska E. The influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of an adult population of the (#38)#321;ód(#38)#378; region, Poland. Int J Occup Med Environ Health 2020; 33:45-57.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14369	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4864239 - PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	A reconstrução de dentes tratados endodonticamente (DTE) é um dos desafios da Odontologia Restauradora, pois geralmente toda ou a maior parte da coroa dentária, muitas vezes, é perdida por lesão de cárie, erosão, abrasão, restaurações anteriores e possíveis traumas. A maneira ideal de restaurar os dentes após o tratamento endodôntico continua a ser um tópico controverso. (Palma et al., 2021). As modificações nas propriedades biomecânicas e integridade estrutural dos dentes são mais provavelmente atribuídas à perda volumétrica dos tecidos duros, assim, a preservação do dente remanescente estrutura é importante para a longevidade do tratamento endodôntico (Carvalho, de et al., 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisão de literatura que propõe demonstrar o tratamento para Dente Tratado Endodonticamente com base em princípios biomiméticos de adesão e preservação dentária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2016 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	O prognóstico da restauração de dentes pós- endodontia depende principalmente de sua estrutura remanescente (Jurema et al., 2021; Zarow et al., 2021; Borzangy et al., 2019). Dentes com canais radiculares alargados são mais suscetíveis a fraturas, pois sua estrutura é mais fragilizada para tolerar as forças mastigatórias normais (Soares et al., 2018). Além disso, a fratura também ocorre quando as cargas aplicadas excedem a resistência à tração ou o limite proporcional da dentina (Kasuya et al., 2020).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os avanços tecnológicos em materiais dentários nos últimos anos têm revolucionado os conceitos aplicados a odontologia restauradora, tornando-a basicamente uma odontologia adesiva. A correta seleção de agentes cimentantes com módulo de elasticidade próximo da dentina, somados ao pino de fibra, são importantes na mimetização da estrutura dental, fatores esses que, quando associados a escolha de materiais restauradores que necessitem de menor número de etapas clínicas são importantes no sucesso do tratamento restaurador com pinos de fibra de vidro a longo prazo.			
<b>REFERENCIAS</b>	1-Lima, D. da S., Lima, D. C., Gomes Junior, R. da C., Costa, K. B., Vasconcelos, O. F., (#38) Lima, T. M. de. (2020). Comportamento biomimético dos pinos de fibra de vidro: relato de caso. Archives of Health Investigation , 10 (2), 296–300. 2-Palma, FAM., Martim, L., Amorim, JVO., Góis, IL., Abreu, GBA., da Cruz, EDS., da Rocha, DM. (#38) Nahsan, FPS. (2021). Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura / Biomimetic approach to endodontically treated teeth: Literature review. Brazilian Journal of Development, 7(10), 100286–100300. 3-Sopi(#38)#324;ska K, Bo(#38)#322,tacz-Rzepkowska E. The influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of an adult population of the (#38)#321;ód(#38)#378; region, Poland. Int J Occup Med Environ Health 2020; 33:45-57.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14370	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3266443 - GUILHERME BORGES DE LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	A reconstrução de dentes tratados endodonticamente (DTE) é um dos desafios da Odontologia Restauradora, pois geralmente toda ou a maior parte da coroa dentária, muitas vezes, é perdida por lesão de cárie, erosão, abrasão, restaurações anteriores e possíveis traumas. A maneira ideal de restaurar os dentes após o tratamento endodôntico continua a ser um tópico controverso. (Palma et al., 2021). As modificações nas propriedades biomecânicas e integridade estrutural dos dentes são mais provavelmente atribuídas à perda volumétrica dos tecidos duros, assim, a preservação do dente remanescente estrutura é importante para a longevidade do tratamento endodôntico (Carvalho, de et al., 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisão de literatura que propõe demonstrar o tratamento para Dente Tratado Endodonticamente com base em princípios biomiméticos de adesão e preservação dentária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2016 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	O prognóstico da restauração de dentes pós- endodontia depende principalmente de sua estrutura remanescente (Jurema et al., 2021; Zarow et al., 2021; Borzangy et al., 2019). Dentes com canais radiculares alargados são mais suscetíveis a fraturas, pois sua estrutura é mais fragilizada para tolerar as forças mastigatórias normais (Soares et al., 2018). Além disso, a fratura também ocorre quando as cargas aplicadas excedem a resistência à tração ou o limite proporcional da dentina (Kasuya et al., 2020).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os avanços tecnológicos em materiais dentários nos últimos anos têm revolucionado os conceitos aplicados a odontologia restauradora, tornando-a basicamente uma odontologia adesiva. A correta seleção de agentes cimentantes com módulo de elasticidade próximo da dentina, somados ao pino de fibra, são importantes na mimetização da estrutura dental, fatores esses que, quando associados a escolha de materiais restauradores que necessitem de menor número de etapas clínicas são importantes no sucesso do tratamento restaurador com pinos de fibra de vidro a longo prazo.			
<b>REFERENCIAS</b>	1-Lima, D. da S., Lima, D. C., Gomes Junior, R. da C., Costa, K. B., Vasconcelos, O. F., (#38) Lima, T. M. de. (2020). Comportamento biomimético dos pinos de fibra de vidro: relato de caso. Archives of Health Investigation , 10 (2), 296–300. 2-Palma, FAM., Martim, L., Amorim, JVO., Góis, IL., Abreu, GBA., da Cruz, EDS., da Rocha, DM. (#38) Nahsan, FPS. (2021). Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura / Biomimetic approach to endodontically treated teeth: Literature review. Brazilian Journal of Development, 7(10), 100286–100300. 3-Sopi(#38)#324;ska K, Bo(#38)#322,tacz-Rzepakowska E. The influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of an adult population of the (#38)#321;ód(#38)#378; region, Poland. Int J Occup Med Environ Health 2020; 33:45-57.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14370	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4864239 - PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	A reconstrução de dentes tratados endodonticamente (DTE) é um dos desafios da Odontologia Restauradora, pois geralmente toda ou a maior parte da coroa dentária, muitas vezes, é perdida por lesão de cárie, erosão, abrasão, restaurações anteriores e possíveis traumas. A maneira ideal de restaurar os dentes após o tratamento endodôntico continua a ser um tópico controverso. (Palma et al., 2021). As modificações nas propriedades biomecânicas e integridade estrutural dos dentes são mais provavelmente atribuídas à perda volumétrica dos tecidos duros, assim, a preservação do dente remanescente estrutura é importante para a longevidade do tratamento endodôntico (Carvalho, de et al., 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisão de literatura que propõe demonstrar o tratamento para Dente Tratado Endodonticamente com base em princípios biomiméticos de adesão e preservação dentária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2016 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	O prognóstico da restauração de dentes pós- endodontia depende principalmente de sua estrutura remanescente (Jurema et al., 2021; Zarow et al., 2021; Borzangy et al., 2019). Dentes com canais radiculares alargados são mais suscetíveis a fraturas, pois sua estrutura é mais fragilizada para tolerar as forças mastigatórias normais (Soares et al., 2018). Além disso, a fratura também ocorre quando as cargas aplicadas excedem a resistência à tração ou o limite proporcional da dentina (Kasuya et al., 2020).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os avanços tecnológicos em materiais dentários nos últimos anos têm revolucionado os conceitos aplicados a odontologia restauradora, tornando-a basicamente uma odontologia adesiva. A correta seleção de agentes cimentantes com módulo de elasticidade próximo da dentina, somados ao pino de fibra, são importantes na mimetização da estrutura dental, fatores esses que, quando associados a escolha de materiais restauradores que necessitem de menor número de etapas clínicas são importantes no sucesso do tratamento restaurador com pinos de fibra de vidro a longo prazo.			
<b>REFERENCIAS</b>	1-Lima, D. da S., Lima, D. C., Gomes Junior, R. da C., Costa, K. B., Vasconcelos, O. F., (#38) Lima, T. M. de. (2020). Comportamento biomimético dos pinos de fibra de vidro: relato de caso. Archives of Health Investigation , 10 (2), 296–300. 2-Palma, FAM., Martim, L., Amorim, JVO., Góis, IL., Abreu, GBA., da Cruz, EDS., da Rocha, DM. (#38) Nahsan, FPS. (2021). Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: Revisão de literatura / Biomimetic approach to endodontically treated teeth: Literature review. Brazilian Journal of Development, 7(10), 100286–100300. 3-Sopi(#38)#324;ska K, Bo(#38)#322.tacz-Rzepkowska E. The influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of an adult population of the (#38)#321;ód(#38)#378; region, Poland. Int J Occup Med Environ Health 2020; 33:45-57.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14371	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4671040 - YASMIM DE QUEIROZ SOARES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	Ana Lucia Franco Ricardo	
<b>TITULO</b>	MEIOS DE CONSERVAÇÃO DOS DENTES AVULSIONADOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Avulsão dentária é definida como o deslocamento completo do dente para fora de seu alvéolo com ruptura das fibras do ligamento periodontal, permanecendo algumas delas aderidas ao cimento e o restante ao osso alveolar. A avulsão de dentes permanentes é um dos problemas de saúde bucal mais graves entre crianças e adolescentes. O tratamento ideal é o replante rápido do dente avulsionado para evitar mais necrose celular e reabsorção radicular de substituição. Infelizmente, algumas condições como a falta de conhecimento do público costumam adiar o replante imediato. Nessas situações, o dente deve ser mantido em meios de armazenamento adequados para preservar a máxima viabilidade das células do ligamento periodontal (CLP) antes do replante (Martinez DH, 2022).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é uma revisão de literatura sobre os Meios de Conservação dos Dentes Avulsionados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados artigos sobre o tema publicados nas bases de dados PubMed, SCOPUS e Google Scholar, com ênfase nos últimos 5 anos.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>É importante destacar que o tratamento apropriado nos primeiros 30 minutos após a avulsão, oferece uma maior probabilidade de sucesso (Foadud et al, 2020), assim como Moreira et al, 2022, relataram que o elemento avulsionado quando conservado a seco, possui uma sobrevida das CLP de no máximo 30 minutos. Algumas revisões sistemáticas identificaram o meio de conservação mais adequado, com base na viabilidade das CLP e relataram que além do leite, outros meios também demonstraram eficácia: HBSS, própolis, sais de reidratação oral e água de arroz em película aderente. Apontaram ainda, que algumas substâncias apresentaram taxas de viabilidade celular baixas, para serem indicadas como meio de conservação como: água de torneira, soro de leite coalhado, óleo de rícino, GC Tooth Mousse e extrato de cúrcuma. O interesse por terapias alternativas, como meios alternativos, como: própolis, Aloe vera, suco de romã e óleo de mamona, também se mostraram eficazes, durante estudos in vitro (Moreira T et al, 2022; Babaji P et al, 2019; Nozari A et al, 2018).</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Pode-se concluir a importância de um meio de conservação adequado para manter a vitalidade das CLP. E com base na literatura consultada, o leite pasteurizado torna-se o meio de conservação mais adequado, por suas características nutricionais, disponibilidade e conveniência.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1- Martinez DH, Treviño JJF, Ramos MAG, Arana HLM, et al. An update on management of avulsed teeth: International Journal of Applied Dental Sciences 2022;8(4):42- 45. 2- Fouad AF, Abbott PV, Tsilingaridis G, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol 36(4):331-342, 2020. Disponível em:(#60) <a href="https://doi.org/10.1111/edt.12573">https://doi.org/10.1111/edt.12573</a>. (#62). Acesso em: 30.nov.2021. 3- Babaji P, Melkundi M, Devanna R, S SB, Chaurasia VR, V GP. In vitro comparative evaluation of diferente storage média (hank's balanced salt solution, propolis, Aloe vera, and pomegranate juice) for preservation of avulsed tooth. Eur J Dent. 2017 Jan- Mar;11(1):71-75.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14371	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4682076 - GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	Ana Lucia Franco Ricardo	
<b>TITULO</b>	MEIOS DE CONSERVAÇÃO DOS DENTES AVULSIONADOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Avulsão dentária é definida como o deslocamento completo do dente para fora de seu alvéolo com ruptura das fibras do ligamento periodontal, permanecendo algumas delas aderidas ao cimento e o restante ao osso alveolar. A avulsão de dentes permanentes é um dos problemas de saúde bucal mais graves entre crianças e adolescentes. O tratamento ideal é o implante rápido do dente avulsionado para evitar mais necrose celular e reabsorção radicular de substituição. Infelizmente, algumas condições como a falta de conhecimento do público costumam adiar o implante imediato. Nessas situações, o dente deve ser mantido em meios de armazenamento adequados para preservar a máxima viabilidade das células do ligamento periodontal (CLP) antes do implante (Martinez DH, 2022).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é uma revisão de literatura sobre os Meios de Conservação dos Dentes Avulsionados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados artigos sobre o tema publicados nas bases de dados PubMed, SCOPUS e Google Scholar, com ênfase nos últimos 5 anos.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>É importante destacar que o tratamento apropriado nos primeiros 30 minutos após a avulsão, oferece uma maior probabilidade de sucesso (Foadud et al, 2020), assim como Moreira et al, 2022, relataram que o elemento avulsionado quando conservado a seco, possui uma sobrevivência das CLP de no máximo 30 minutos. Algumas revisões sistemáticas identificaram o meio de conservação mais adequado, com base na viabilidade das CLP e relataram que além do leite, outros meios também demonstraram eficácia: HBSS, própolis, sais de reidratação oral e água de arroz em película aderente. Apontaram ainda, que algumas substâncias apresentaram taxas de viabilidade celular baixas, para serem indicadas como meio de conservação como: água de torneira, soro de leite coalhado, óleo de ricino, GC Tooth Mousse e extrato de cúrcuma. O interesse por terapias alternativas, como meios alternativos, como: própolis, Aloe vera, suco de romã e óleo de mamona, também se mostraram eficazes, durante estudos in vitro (Moreira T et al, 2022; Babaji P et al, 2019; Nozari A et al, 2018).</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Pode-se concluir a importância de um meio de conservação adequado para manter a vitalidade das CLP. E com base na literatura consultada, o leite pasteurizado torna-se o meio de conservação mais adequado, por suas características nutricionais, disponibilidade e conveniência.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1- Martinez DH, Treviño JF, Ramos MAG, Arana HLM, et al. An update on management of avulsed teeth: International Journal of Applied Dental Sciences 2022;8(4):42- 45. 2- Foadud AF, Abbott PV, Tsilingaridis G, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol 36(4):331-342, 2020. Disponível em:(#60) <a href="https://doi.org/10.1111/edt.12573">https://doi.org/10.1111/edt.12573</a>. (#62). Acesso em: 30.nov.2021. 3- Babaji P, Melkundi M, Devanna R, S SB, Chaurasia VR, V GP. In vitro comparative evaluation of diferente storage média (hank' s balanced salt solution, própolis, Aloe vera, and pomegranate juice) for preservation of avulsed tooth. Eur J Dent. 2017 Jan- Mar;11(1):71-75.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14372	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4632095 - KESIA FERNANDES COSTA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA DESINFECÇÃO DOS CONES DE GUTA PERCHA UTILIZANDO DIFERENTES PRODUTOS QUÍMICOS: REVISÃO DE LITERATURA			
<b>INTRODUCAO</b>	O tratamento endodôntico visa a eliminação completa do material necrótico e carga microbiana do canal radicular infectado, seguida de sua substituição por materiais obturadores do canal radicular, como guta-percha (GP) e cimento obturador. Após inúmeras tentativas, a GP tornou-se o material obturador de canal radicular padrão-ouro, e estão disponíveis comercialmente em uma embalagem pré-esterilizada. No entanto, os pontas GP embaladas pré-esterilizadas recém-abertas mostram alguma quantidade de contaminação por micróbios (Gomes BP, 2005). Portanto, a desinfecção dos cones de GP torna-se relevante, uma vez que a utilização de um material contaminado no interior do canal radicular pode comprometer o sucesso da terapia endodôntica (Mezzomo VC, 2017).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar através de uma revisão de literatura a importância da desinfecção de cones de guta percha, com diferentes soluções desinfetantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2016 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	Os cones de guta percha são termoplásticos e, assim não podem ser esterilizados de maneira convencional, uma vez que quando submetidos a um aumento de temperatura sofrem alterações em suas propriedades físicas e químicas. Logo, são utilizadas substâncias químicas para sua limpeza e desinfecção, que devem apresentar tempo, ação e a concentração adequados (Costa M, 2021). Os cones de guta percha são produzidos em condições assépticas, mas podem ser contaminados por aerossóis e aspectos físicos durante sua armazenagem. Isto pode acontecer também durante o manuseio, segundo o estudo feitos por Mezzomo VC, 2017 que demonstrou que houve crescimento bacteriano quando eles foram manipulados sem luvas. Considerando a literatura científica, a maioria dos estudos que avaliaram a descontaminação dos cones de guta percha contaminados pela cepa de Enterococcus faecalis. O fizeram porque esta é uma das espécies mais comuns encontradas como responsáveis pela contaminação dos canais radicular.			
<b>CONCLUSOES</b>	O processo de desinfecção dos cones de GP não devem ser impostas como uma medida obrigatória para o profissional, mas sem dúvida um procedimento que visa a uma remoção rigorosa de possíveis fatores de contaminação. Após a busca na literatura, concluiu-se que o hipoclorito de sódio a 2% e 5% e a clorexidina a 2%, são as melhores soluções para a desinfecção dos cones de GP, isso por apresentarem ação altamente eficaz e um custo menor quando comparado ao ácido peracético. Os cones de guta-percha devem ser desinfetados rotineiramente por aproximadamente 15 segundos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1-Gomes BP, Vianna ME, Matsumoto CU, Rossi Vde P, et al., e outros Desinfecção de cones de guta-percha com clorexidina e hipoclorito de sódio. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100:512(#38)#8208;7. 2-Rozendo, DMM., Alcino, ABM., Domingueti, CB, Silva, NC., et al. Efetividade de agentes desinfetantes de cones de guta percha. Arquivos Em Odontologia, 2022;58, 294-301. 3-Costa, M; Conde, A; B, Maria C; Paulus, Marília. Rev. Odontol. Araçatuba (Impr.) ; 2021;42(3): 4-8, set.-dez.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14372	Endodontia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4673387 - IGOR GENTIL RODRIGUES DE OLIVEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Lucia Franco Ricardo	Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA DESINFECÇÃO DOS CONES DE GUTA PERCHA UTILIZANDO DIFERENTES PRODUTOS QUÍMICOS: REVISÃO DE LITERATURA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O tratamento endodôntico visa a eliminação completa do material necrótico e carga microbiana do canal radicular infectado, seguida de sua substituição por materiais obturadores do canal radicular, como guta-percha (GP) e cimento obturador. Após inúmeras tentativas, a GP tornou-se o material obturador de canal radicular padrão-ouro, e estão disponíveis comercialmente em uma embalagem pré-esterilizada. No entanto, os pontas GP embaladas pré-esterilizadas recém-abertas mostram alguma quantidade de contaminação por micróbios (Gomes BP, 2005). Portanto, a desinfecção dos cones de GP torna-se relevante, uma vez que a utilização de um material contaminado no interior do canal radicular pode comprometer o sucesso da terapia endodôntica (Mezzomo VC, 2017).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar através de uma revisão de literatura a importância da desinfecção de cones de guta percha, com diferentes soluções desinfetantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2016 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.			
<b>RESULTADOS</b>	Os cones de guta percha são termoplásticos e, assim não podem ser esterilizados de maneira convencional, uma vez que quando submetidos a um aumento de temperatura sofrem alterações em suas propriedades físicas e químicas. Logo, são utilizadas substâncias químicas para sua limpeza e desinfecção, que devem apresentar tempo, ação e a concentração adequados (Costa M, 2021). Os cones de guta percha são produzidos em condições assépticas, mas podem ser contaminados por aerossóis e aspectos físicos durante sua armazenagem. Isto pode acontecer também durante o manuseio, segundo o estudo feitos por Mezzomo VC, 2017 que demonstrou que houve crescimento bacteriano quando eles foram manipulados sem luvas. Considerando a literatura científica, a maioria dos estudos que avaliaram a descontaminação dos cones de guta percha contaminados pela cepa de Enterococcus faecalis. O fizeram porque esta é uma das espécies mais comuns encontradas como responsáveis pela contaminação dos canais radicular.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O processo de desinfecção dos cones de GP não devem ser impostas como uma medida obrigatória para o profissional, mas sem dúvida um procedimento que visa a uma remoção rigorosa de possíveis fatores de contaminação. Após a busca na literatura, concluiu-se que o hipoclorito de sódio a 2% e 5% e a clorexidina a 2%, são as melhores soluções para a desinfecção dos cones de GP, isso por apresentarem ação altamente eficaz e um custo menor quando comparado ao ácido peracético. Os cones de guta-percha devem ser desinfetados rotineiramente por aproximadamente 15 segundos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1-Gomes BP, Vianna ME, Matsumoto CU, Rossi Vde P, et al., e outros Desinfecção de cones de guta-percha com clorexidina e hipoclorito de sódio. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100:512(#38)#8208;7. 2-Rozendo, DMM., Alcino, ABM., Domingueti, CB, Silva, NC., et al. Efetividade de agentes desinfetantes de cones de guta percha. Arquivos Em Odontologia, 2022;58, 294-301. 3-Costa, M; Conde, A; B, Maria C; Paulus, Marília. Rev. Odontol. Araçatuba (Impr.) ; 2021;42(3): 4-8, set.-dez.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14375	Materiais Odontológicos	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2973863 - WEVERTEON SOARES DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		William Cunha Brandt		
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA DUREZA DO ESMALTE DENTAL EM RESTAURAÇÕES COM COMPÓSITOS E SISTEMAS ADESIVOS INCORPORADOS DE NANOPARTÍCULAS CARREGADAS DE CLOREXIDINA APÓS CRESCIMENTO DE BIOFILME			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Com o propósito de compreender os processos químicos-patológicos das lesões de cárie secundárias em elementos restaurados com compósitos adesivos, bem como, estabelecer práticas clínicas que previnam ditas lesões através de procedimentos com um controle do smear layer local, diversas pesquisas e metodologias têm sido ofertadas para a comunidade científica como forma de promover funcionalidade, estética e saúde oral com materiais inovadores que permitam domínio sobre o menor risco de desenvolvimento de micro infiltrações adjacentes à restauração/dente			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desta pesquisa foi avaliar a diferença da microdureza Knoop em esmalte dental humano antes e depois do crescimento de biofilme, quando realizadas restaurações com compósitos e adesivos carregados de nanopartículas de MMT/CHX, e avaliar o crescimento bacteriano através das unidades formadoras de colônias.			
<b>METODOLOGIA</b>	A amostra foi separada em 3 grupos, sendo o primeiro grupo controle (GC) restaurados com a resina comercial e o adesivo de acordo com as orientações do fabricante. Segundo grupo (MMT Bulk) foi utilizado a resina comercial carregada de MMT/CHX, e o sistema adesivo feito com o Single Bond 2 na sua fórmula tradicional. Para o terceiro grupo (MMT SB+Bulk) foi utilizado a resina e adesivos carregados de MMT/CHX.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise dos resultados demonstrou que quando os materiais restauradores foram avaliados, não existiu diferença dos valores de DKi e após 7 dias de crescimento do biofilme. Entretanto, quando avaliado o tempo, DKi mostrou valores superiores a DK7 (p(#60)0,001). Com relação aos valores de %Diferença, não existiu diferença estatística entre os materiais restauradores (p=0,133). Quanto aos valores médios e o desvio padrão de Unidades Formadoras de Colônia após 8 diluições, não existiu diferença estatística (p=0,101).			
<b>CONCLUSÕES</b>	A avaliação de DK antes e depois do crescimento bacteriano mostrou que adição de MMT carregado com CHX não foi capaz de impedir a diminuição dos valores de DK em esmalte dental. Também não mostrou valores de DK diferente do grupo sem MMT/CHX. A avaliação do crescimento bacteriano, não preveniu a formação de UFC.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Arbildo-Vega HI, Lapinska B, Panda S, Lamas-Lara C, Khan AS, Lukomska-Szymanska M. Clinical Effectiveness of Bulk-Fill and Conventional Resin Composite Restorations: Systematic Review and Meta-Analysis. Polymers (Basel). 2020;12(8):1786. 2020. Boaro LCC, Campos LM, Varca GHC, dos Santos TMR, Marques PA, Sugii MM, et al. Antibacterial resin-based composite containing chlorhexidine for dental applications. Dent Mater. 2019 Jun;35(6):909-18. doi: 10.1016/j.dental.2019.03.004. Epub 2019 Apr 5. Citado em PubMed; PMID: 30955856. Zhang Y, et al. Compostos quaternários de amônio em materiais restauradores dentários. Dent Mater J 2018;37(2):183–91. 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14375	Materiais Odontológicos	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4321499 - GRECA BUARQUE EKER BAISE DE SOUZA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		William Cunha Brandt		
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA DUREZA DO ESMALTE DENTAL EM RESTAURAÇÕES COM COMPÓSITOS E SISTEMAS ADESIVOS INCORPORADOS DE NANOPARTÍCULAS CARREGADAS DE CLOREXIDINA APÓS CRESCIMENTO DE BIOFILME			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Com o propósito de compreender os processos químicos-patológicos das lesões de cárie secundárias em elementos restaurados com compósitos adesivos, bem como, estabelecer práticas clínicas que previnam ditas lesões através de procedimentos com um controle do smear layer local, diversas pesquisas e metodologias têm sido ofertadas para a comunidade científica como forma de promover funcionalidade, estética e saúde oral com materiais inovadores que permitam domínio sobre o menor risco de desenvolvimento de micro infiltrações adjacentes à restauração/dente			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desta pesquisa foi avaliar a diferença da microdureza Knoop em esmalte dental humano antes e depois do crescimento de biofilme, quando realizadas restaurações com compósitos e adesivos carregados de nanopartículas de MMT/CHX, e avaliar o crescimento bacteriano através das unidades formadoras de colônias.			
<b>METODOLOGIA</b>	A amostra foi separada em 3 grupos, sendo o primeiro grupo controle (GC) restaurados com a resina comercial e o adesivo de acordo com as orientações do fabricante. Segundo grupo (MMT Bulk) foi utilizado a resina comercial carregada de MMT/CHX, e o sistema adesivo feito com o Single Bond 2 na sua fórmula tradicional. Para o terceiro grupo (MMT SB+Bulk) foi utilizado a resina e adesivos carregados de MMT/CHX.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise dos resultados demonstrou que quando os materiais restauradores foram avaliados, não existiu diferença dos valores de DKi e após 7 dias de crescimento do biofilme. Entretanto, quando avaliado o tempo, DKi mostrou valores superiores a DK7 (p(#60)0,001). Com relação aos valores de %Diferença, não existiu diferença estatística entre os materiais restauradores (p=0,133). Quanto aos valores médios e o desvio padrão de Unidades Formadoras de Colônia após 8 diluições, não existiu diferença estatística (p=0,101).			
<b>CONCLUSÕES</b>	A avaliação de DK antes e depois do crescimento bacteriano mostrou que adição de MMT carregado com CHX não foi capaz de impedir a diminuição dos valores de DK em esmalte dental. Também não mostrou valores de DK diferente do grupo sem MMT/CHX. A avaliação do crescimento bacteriano, não preveniu a formação de UFC.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Arbildo-Vega HI, Lapinska B, Panda S, Lamas-Lara C, Khan AS, Lukomska-Szymanska M. Clinical Effectiveness of Bulk-Fill and Conventional Resin Composite Restorations: Systematic Review and Meta-Analysis. Polymers (Basel). 2020;12(8):1786. 2020. Boaro LCC, Campos LM, Varca GHC, dos Santos TMR, Marques PA, Sugii MM, et al. Antibacterial resin-based composite containing chlorhexidine for dental applications. Dent Mater. 2019 Jun;35(6):909-18. doi: 10.1016/j.dental.2019.03.004. Epub 2019 Apr 5. Citado em PubMed; PMID: 30955856. Zhang Y, et al. Compostos quaternários de amônio em materiais restauradores dentários. Dent Mater J 2018;37(2):183–91. 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14376	Materiais Odontológicos	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor	Status	Apresentação
		2912937 - ISAIAS DONIZETI SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		William Cunha Brandt		
TITULO	Grau de conversão e resistência da união de adesivo com propriedades bioativas			
INTRODUCA O	Os adesivos dentais ainda o elo mais fraco das reabilitações adesivas, proporcionando fendas marginais e a instalação de cáries secundárias, pois a degradação do colágeno ainda é o maior problema devido ao condicionamento ácido prévio da dentina, que ao longo do tempo, pode causar uma maior permeabilidade da dentina hibridizada, maior degradação da união e diminuição da resistência da união. Com o intuito de melhorar a durabilidade e as propriedades mecânicas da interface adesiva, têm-se incorporado na composição desses materiais resinosos partículas de carga inorgânicas nanométricas e bioativas.			
OBJETIVOS	Analisar o efeito do conteúdo em massa de partículas de sílica nanométricas no grau de conversão e resistência da união (RU) de um adesivo universal com propriedades bioativas após armazenamento de 24 h e 12 meses.			
METODOLOGIA	Em um adesivo comercial universal foram acrescidos diferentes percentuais em massa (0%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%) de sílica nanométrica com 7 nm e 1% em massa de nanomontmorilonita (MMT) carregada com 10% de clorexidina, e um grupo controle sem adição de partículas de carga, totalizando assim 7 grupos. Amostras em matriz de silicone, medindo 7 mm (C) x 2 mm (L) x 1 mm (P), foram confeccionadas. As amostras foram fotoativadas pelo LED BluePhase e armazenadas por 24 h e 12 meses em água destilada e estufa a 37°C (n=10). O grau de conversão (GC) foi analisado através de espectroscopia de infravermelho transformada de Fourier. Para avaliação RU através do teste de microtração, cento e quarenta dentes humanos receberam uma camada de adesivo e uma de resina composta, ambas fotoativadas com o mesmo aparelho e analisadas após o mesmo período do GC. Para análise estatística, foi utilizado análise de variância e teste de Tukey ((#38)#945; = 5%).			
RESULTADO S	A sílica nanométrica e MMT carregada com clorexidina não teve influência no GC após 12 meses de armazenamento exceto para o grupo com 3% de sílica que apresentou valores inferiores após 24 horas de armazenamento. No teste de RU o grupo controle (sem carga e sem MMT) apresentou os menores valores após 12 meses, enquanto os outros grupos não apresentaram diferenças estatísticas. No padrão de falha houve prevalência das falhas adesivas e após armazenamento de 12 meses um aumento nas falhas mistas e coesivas. Os resultados demonstram uma melhora na RU, indicando uma diminuição na degradação do colágeno e com potencial para aumentar a longevidade da restauração adesiva. Estudos a longo prazo são indicados para confirmar os achados deste estudo.			
CONCLUSOES	Após 12 meses, as partículas de carga bioativas não influenciaram no GC, entretanto mantiveram maiores valores de RU.			
REFERENCIA S	Hashimoto M, Ohno H, Sano H, Kaga M, Ogushi H. Degradation patterns of different adhesives and bonding procedures. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2003;66: 324-30. Mazzoni A, Angeloni V, Comba A, Maravic T, Cadenaro M, Tezvergil-Mutluay A, Pashley DH, Tay FR, Breschi L. Cross-linking effect on dentin bond strength and MMPs activity. Dent Mater. 2018;34(2): 288-295.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14376	Materiais Odontológicos	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4424786 - ELLEN CHRISTINE RODRIGUES DE ABREU	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		William Cunha Brandt		
<b>TITULO</b>	Grau de conversão e resistência da união de adesivo com propriedades bioativas			
<b>INTRODUCA O</b>	Os adesivos dentais ainda o elo mais fraco das reabilitações adesivas, proporcionando fendas marginais e a instalação de cáries secundárias, pois a degradação do colágeno ainda é o maior problema devido ao condicionamento ácido prévio da dentina, que ao longo do tempo, pode causar uma maior permeabilidade da dentina hibridizada, maior degradação da união e diminuição da resistência da união. Com o intuito de melhorar a durabilidade e as propriedades mecânicas da interface adesiva, têm-se incorporado na composição desses materiais resinosos partículas de carga inorgânicas nanométricas e bioativas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o efeito do conteúdo em massa de partículas de sílica nanométricas no grau de conversão e resistência da união (RU) de um adesivo universal com propriedades bioativas após armazenamento de 24 h e 12 meses.			
<b>METODOLOGIA</b>	Em um adesivo comercial universal foram acrescidos diferentes percentuais em massa (0%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%) de sílica nanométrica com 7 nm e 1% em massa de nanomontmorilonita (MMT) carregada com 10% de clorexidina, e um grupo controle sem adição de partículas de carga, totalizando assim 7 grupos. Amostras em matriz de silicone, medindo 7 mm (C) x 2 mm (L) x 1 mm (P), foram confeccionadas. As amostras foram fotoativadas pelo LED BluePhase e armazenadas por 24 h e 12 meses em água destilada e estufa a 37°C (n=10). O grau de conversão (GC) foi analisado através de espectroscopia de infravermelho transformada de Fourier. Para avaliação RU através do teste de microtração, cento e quarenta dentes humanos receberam uma camada de adesivo e uma de resina composta, ambas fotoativadas com o mesmo aparelho e analisadas após o mesmo período do GC. Para análise estatística, foi utilizado análise de variância e teste de Tukey ((#38)#945; = 5%).			
<b>RESULTADO S</b>	A sílica nanométrica e MMT carregada com clorexidina não teve influência no GC após 12 meses de armazenamento exceto para o grupo com 3% de sílica que apresentou valores inferiores após 24 horas de armazenamento. No teste de RU o grupo controle (sem carga e sem MMT) apresentou os menores valores após 12 meses, enquanto os outros grupos não apresentaram diferenças estatísticas. No padrão de falha houve prevalência das falhas adesivas e após armazenamento de 12 meses um aumento nas falhas mistas e coesivas. Os resultados demonstram uma melhora na RU, indicando uma diminuição na degradação do colágeno e com potencial para aumentar a longevidade da restauração adesiva. Estudos a longo prazo são indicados para confirmar os achados deste estudo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Após 12 meses, as partículas de carga bioativas não influenciaram no GC, entretanto mantiveram maiores valores de RU.			
<b>REFERENCIA S</b>	Hashimoto M, Ohno H, Sano H, Kaga M, Ogushi H. Degradation patterns of different adhesives and bonding procedures. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2003;66: 324-30. Mazzoni A, Angeloni V, Comba A, Maravic T, Cadenaro M, Tezvergil-Mutluay A, Pashley DH, Tay FR, Breschi L. Cross-linking effect on dentin bond strength and MMPs activity. Dent Mater. 2018;34(2): 288-295.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14378	Psicologia Cognitiva	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3847314 - BEATRIZ BARROS DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	Mães Narcisistas e o impacto na vida adulta dos filhos uma compreensão pela Terapia do Esquema: Revisão Integrativa			
<b>INTRODUCA O</b>	Os transtornos de personalidade são caracterizados por traços inflexíveis que afetam as relações e causam sofrimento ao indivíduo, entre os transtornos há o conhecido como transtorno de personalidade narcisista este tem como característica marcante o arrogo e uma necessidade extrema de admiração, que marcam negativamente seus relacionamentos, pois carecem de empatia, tendem a explorar os outros a sua volta e ficam furiosos quando não recebem a atenção que acreditam merecer. Estas características quando apresentadas por pessoas no papel de mãe podem trazer prejuízos significativos para seus filhos, para tanto a proposta é utilizar a Terapia do Esquema (TE) na compreensão deste transtorno.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar artigos científicos focados nos impactos no adulto de ter tido uma mãe narcisista por meio do olhar da terapia do esquema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado a revisão integrativa buscando artigos nas bases científicas: Scielo, Lilacs, Pepsic, Psicoinfo e Pubmed. Com os critérios pesquisas de campo de avaliação e/ou intervenção, em português, texto completo. Artigos que abordassem o tema de transtorno de personalidade ou mães narcisistas envolvendo a TE.			
<b>RESULTADO S</b>	Foram selecionados 14 artigos para compor este estudo que apontaram como consequências emocionais, em adultos de terem tido em seu desenvolvimento a presença de uma mãe narcisista, os sentimentos de vazio, ansiedade e constante busca por amor e validação. Outro aspecto decorrente desta convivência é a violência psicológica que afeta as crianças, causando cicatrizes emocionais, desequilíbrio comportamental e isolamento social. A TE tem seu enfoque nos eventos precoces, ou seja, situações experienciadas na infância e/ou adolescência, onde algum tipo de abuso, trauma ou negligência corroboraram para a criação de pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais, de modo geral, o que poderia explicar o sofrimento psicossocial destes filhos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que os comportamentos disfuncionais presentes na conduta de mães narcisistas é um importante fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, sofrimento psicológico e a perpetuação destes modelos disfuncionais.			
<b>REFERENCIA S</b>	Beck, T A.; DAVIS D D; FREEMAN A. (2017). Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade. 3.ed. Porto Alegre: Artmed. American Psychiatric Association - APA. (2023). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed. Young, J. E.; Klosko, J S e Weishaar, M E. (2008) Terapia do esquema – Terapias cognitivo-comportamentais inovadoras. Porto Alegre: Artmed			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14378	Psicologia Cognitiva	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4020251 - ANDRESA ROSA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	Mães Narcisistas e o impacto na vida adulta dos filhos uma compreensão pela Terapia do Esquema: Revisão Integrativa			
<b>INTRODUCA O</b>	Os transtornos de personalidade são caracterizados por traços inflexíveis que afetam as relações e causam sofrimento ao indivíduo, entre os transtornos há o conhecido como transtorno de personalidade narcisistas este tem como característica marcante o arrogo e uma necessidade extrema de admiração, que marcam negativamente seus relacionamentos, pois carecem de empatia, tendem a explorar os outros a sua volta e ficam furiosos quando não recebem a atenção que acreditam merecer. Estas características quando apresentadas por pessoas no papel de mãe podem trazer prejuízos significativos para seus filhos, para tanto a proposta é utilizar a Terapia do Esquema (TE) na compreensão deste transtorno.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar artigos científicos focados nos impactos no adulto de ter tido uma mãe narcisista por meio do olhar da terapia do esquema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado a revisão integrativa buscando artigos nas bases científicas: Scielo, Lilacs, Pepsic, Psicoinfo e Pubmed. Com os critérios pesquisas de campo de avaliação e/ou intervenção, em português, texto completo. Artigos que abordassem o tema de transtorno de personalidade ou mães narcisistas envolvendo a TE.			
<b>RESULTADO S</b>	Foram selecionados 14 artigos para compor este estudo que apontaram como consequências emocionais, em adultos de terem tido em seu desenvolvimento a presença de uma mãe narcisista, os sentimentos de vazio, ansiedade e constante busca por amor e validação. Outro aspecto decorrente desta convivência é a violência psicológica que afeta as crianças, causando cicatrizes emocionais, desequilíbrio comportamental e isolamento social. A TE tem seu enfoque nos eventos precoces, ou seja, situações experienciadas na infância e/ou adolescência, onde algum tipo de abuso, trauma ou negligência corroboraram para a criação de pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais, de modo geral, o que poderia explicar o sofrimento psicossocial destes filhos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que os comportamentos disfuncionais presentes na conduta de mães narcisistas é um importante fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, sofrimento psicológico e a perpetuação destes modelos disfuncionais.			
<b>REFERENCIA S</b>	Beck, T A.; DAVIS D D; FREEMAN A. (2017). Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade. 3.ed. Porto Alegre: Artmed. American Psychiatric Association - APA. (2023). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed. Young, J. E.; Klosko, J S e Weishaar, M E. (2008) Terapia do esquema – Terapias cognitivo-comportamentais inovadoras. Porto Alegre: Artmed			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14378	Psicologia Cognitiva	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4044061 - AMANDA LEMOS LOPES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Oliveira Silva		
<b>TITULO</b>	Mães Narcisistas e o impacto na vida adulta dos filhos uma compreensão pela Terapia do Esquema: Revisão Integrativa			
<b>INTRODUCA O</b>	Os transtornos de personalidade são caracterizados por traços inflexíveis que afetam as relações e causam sofrimento ao indivíduo, entre os transtornos há o conhecido como transtorno de personalidade narcisistas este tem como característica marcante o arrogo e uma necessidade extrema de admiração, que marcam negativamente seus relacionamentos, pois carecem de empatia, tendem a explorar os outros a sua volta e ficam furiosos quando não recebem a atenção que acreditam merecer. Estas características quando apresentadas por pessoas no papel de mãe podem trazer prejuízos significativos para seus filhos, para tanto a proposta é utilizar a Terapia do Esquema (TE) na compreensão deste transtorno.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar artigos científicos focados nos impactos no adulto de ter tido uma mãe narcisista por meio do olhar da terapia do esquema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado a revisão integrativa buscando artigos nas bases científicas: Scielo, Lilacs, Pepsic, Psicoinfo e Pubmed. Com os critérios pesquisas de campo de avaliação e/ou intervenção, em português, texto completo. Artigos que abordassem o tema de transtorno de personalidade ou mães narcisistas envolvendo a TE.			
<b>RESULTADO S</b>	Foram selecionados 14 artigos para compor este estudo que apontaram como consequências emocionais, em adultos de terem tido em seu desenvolvimento a presença de uma mãe narcisista, os sentimentos de vazio, ansiedade e constante busca por amor e validação. Outro aspecto decorrente desta convivência é a violência psicológica que afeta as crianças, causando cicatrizes emocionais, desequilíbrio comportamental e isolamento social. A TE tem seu enfoque nos eventos precoces, ou seja, situações experienciadas na infância e/ou adolescência, onde algum tipo de abuso, trauma ou negligência corroboraram para a criação de pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais, de modo geral, o que poderia explicar o sofrimento psicossocial destes filhos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que os comportamentos disfuncionais presentes na conduta de mães narcisistas é um importante fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, sofrimento psicológico e a perpetuação destes modelos disfuncionais.			
<b>REFERENCIA S</b>	Beck, T A.; DAVIS D D; FREEMAN A. (2017). Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade. 3.ed. Porto Alegre: Artmed. American Psychiatric Association - APA. (2023). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed. Young, J. E.; Klosko, J S e Weishaar, M E. (2008) Terapia do esquema – Terapias cognitivo-comportamentais inovadoras. Porto Alegre: Artmed			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14379	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2778556 - EVANICE DOS SANTOS MONTEIRO PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da matriz tributária brasileira			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O problema da desigualdade está presente no Brasil e no mundo. Dados revelados pelo Banco Mundial indicam que 1% da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99% (Banco Mundial, 2013). No Brasil, a desigualdade também é revelada por números. É o que apontam Medeiros, Souza e Castro: "quando se combina a PNAD à DIRPF, quase metade de toda a renda no país está concentrada nos 5% mais ricos e um quarto no 1% mais rico. O milésimo mais rico acumula mais renda que toda a metade mais pobre da população. Isso reflete um perfil que já é bem conhecido: o Brasil é marcado por uma grande massa de população de baixa renda que se distingue de uma pequena, porém muito rica elite" (MEDEIROS, et al. 2015). Neste contexto, a tributação - fonte de receita imprescindível para financiar as atividades do Estado - pode ser um eficiente instrumento para redução das desigualdades, seja por meio do investimento do produto de sua arrecadação, seja pela implementação de políticas fiscais baseadas na noção de que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar a matriz tributária brasileira e verificar se o Sistema tributário brasileiro está estruturado de forma a reduzir as desigualdades			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>São vários os problemas que podem ser identificados a partir de uma rápida análise da legislação tributária, tais como: (i) a inexistência do imposto sobre grande fortunas previsto no art. 153, VII, da Constituição Federal; (ii) a ausência de uma progressividade efetiva do imposto de renda; (iii) a existência de inúmeras hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas sem qualquer vinculação com o mínimo vital; (iv) a isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de distribuição de lucros e dividendos; (v) o efeito regressivo da tributação sobre o consumo; (vi) a concentração da carga tributária em tributos indiretos; e, dentre outros, (vii) as baixas alíquotas praticadas para a tributação das heranças e doações. Estas distorções provocadas pelo sistema tributário, além de agravar a desigualdade social, afetam negativamente, também, as relações de desigualdade racial e de gênero, tendo em vista a desigualdade salarial verificada entre negros e brancos e entre homens e mulheres (OXFAM, 2017).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O Sistema tributário brasileiro está estruturado para privilegiar aqueles contribuintes que detém maior concentração de riqueza, apresentando efeitos regressivos e agravando o problema da desigualdade social.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a>. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a>. Acesso em 11 out. 2023. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14379	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4098455 - MARCELO BERNARDO SUDARIO DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da matriz tributária brasileira			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O problema da desigualdade está presente no Brasil e no mundo. Dados revelados pelo Banco Mundial indicam que 1% da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99% (Banco Mundial, 2013). No Brasil, a desigualdade também é revelada por números. É o que apontam Medeiros, Souza e Castro: "quando se combina a PNAD à DIRPF, quase metade de toda a renda no país está concentrada nos 5% mais ricos e um quarto no 1% mais rico. O milésimo mais rico acumula mais renda que toda a metade mais pobre da população. Isso reflete um perfil que já é bem conhecido: o Brasil é marcado por uma grande massa de população de baixa renda que se distingue de uma pequena, porém muito rica elite" (MEDEIROS, et al. 2015). Neste contexto, a tributação - fonte de receita imprescindível para financiar as atividades do Estado - pode ser um eficiente instrumento para redução das desigualdades, seja por meio do investimento do produto de sua arrecadação, seja pela implementação de políticas fiscais baseadas na noção de que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar a matriz tributária brasileira e verificar se o Sistema tributário brasileiro está estruturado de forma a reduzir as desigualdades			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>São vários os problemas que podem ser identificados a partir de uma rápida análise da legislação tributária, tais como: (i) a inexistência do imposto sobre grande fortunas previsto no art. 153, VII, da Constituição Federal; (ii) a ausência de uma progressividade efetiva do imposto de renda; (iii) a existência de inúmeras hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas sem qualquer vinculação com o mínimo vital; (iv) a isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de distribuição de lucros e dividendos; (v) o efeito regressivo da tributação sobre o consumo; (vi) a concentração da carga tributária em tributos indiretos; e, dentre outros, (vii) as baixas alíquotas praticadas para a tributação das heranças e doações. Estas distorções provocadas pelo sistema tributário, além de agravar a desigualdade social, afetam negativamente, também, as relações de desigualdade racial e de gênero, tendo em vista a desigualdade salarial verificada entre negros e brancos e entre homens e mulheres (OXFAM, 2017).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O Sistema tributário brasileiro está estruturado para privilegiar aqueles contribuintes que detém maior concentração de riqueza, apresentando efeitos regressivos e agravando o problema da desigualdade social.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a>. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a>. Acesso em 11 out. 2023. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14379	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4186109 - ERIKA ISLENE DE JESUS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da matriz tributária brasileira			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O problema da desigualdade está presente no Brasil e no mundo. Dados revelados pelo Banco Mundial indicam que 1% da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99% (Banco Mundial, 2013). No Brasil, a desigualdade também é revelada por números. É o que apontam Medeiros, Souza e Castro: "quando se combina a PNAD à DIRPF, quase metade de toda a renda no país está concentrada nos 5% mais ricos e um quarto no 1% mais rico. O milésimo mais rico acumula mais renda que toda a metade mais pobre da população. Isso reflete um perfil que já é bem conhecido: o Brasil é marcado por uma grande massa de população de baixa renda que se distingue de uma pequena, porém muito rica elite" (MEDEIROS, et al. 2015). Neste contexto, a tributação - fonte de receita imprescindível para financiar as atividades do Estado - pode ser um eficiente instrumento para redução das desigualdades, seja por meio do investimento do produto de sua arrecadação, seja pela implementação de políticas fiscais baseadas na noção de que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar a matriz tributária brasileira e verificar se o Sistema tributário brasileiro está estruturado de forma a reduzir as desigualdades			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>São vários os problemas que podem ser identificados a partir de uma rápida análise da legislação tributária, tais como: (i) a inexistência do imposto sobre grande fortunas previsto no art. 153, VII, da Constituição Federal; (ii) a ausência de uma progressividade efetiva do imposto de renda; (iii) a existência de inúmeras hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas sem qualquer vinculação com o mínimo vital; (iv) a isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de distribuição de lucros e dividendos; (v) o efeito regressivo da tributação sobre o consumo; (vi) a concentração da carga tributária em tributos indiretos; e, dentre outros, (vii) as baixas alíquotas praticadas para a tributação das heranças e doações. Estas distorções provocadas pelo sistema tributário, além de agravar a desigualdade social, afetam negativamente, também, as relações de desigualdade racial e de gênero, tendo em vista a desigualdade salarial verificada entre negros e brancos e entre homens e mulheres (OXFAM, 2017).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O Sistema tributário brasileiro está estruturado para privilegiar aqueles contribuintes que detém maior concentração de riqueza, apresentando efeitos regressivos e agravando o problema da desigualdade social.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a>. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a>. Acesso em 11 out. 2023. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14379	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4991281 - ALISON NUNES PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da matriz tributária brasileira			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O problema da desigualdade está presente no Brasil e no mundo. Dados revelados pelo Banco Mundial indicam que 1% da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99% (Banco Mundial, 2013). No Brasil, a desigualdade também é revelada por números. É o que apontam Medeiros, Souza e Castro: "quando se combina a PNAD à DIRPF, quase metade de toda a renda no país está concentrada nos 5% mais ricos e um quarto no 1% mais rico. O milésimo mais rico acumula mais renda que toda a metade mais pobre da população. Isso reflete um perfil que já é bem conhecido: o Brasil é marcado por uma grande massa de população de baixa renda que se distingue de uma pequena, porém muito rica elite" (MEDEIROS, et al. 2015). Neste contexto, a tributação - fonte de receita imprescindível para financiar as atividades do Estado - pode ser um eficiente instrumento para redução das desigualdades, seja por meio do investimento do produto de sua arrecadação, seja pela implementação de políticas fiscais baseadas na noção de que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar a matriz tributária brasileira e verificar se o Sistema tributário brasileiro está estruturado de forma a reduzir as desigualdades			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>São vários os problemas que podem ser identificados a partir de uma rápida análise da legislação tributária, tais como: (i) a inexistência do imposto sobre grande fortunas previsto no art. 153, VII, da Constituição Federal; (ii) a ausência de uma progressividade efetiva do imposto de renda; (iii) a existência de inúmeras hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas sem qualquer vinculação com o mínimo vital; (iv) a isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de distribuição de lucros e dividendos; (v) o efeito regressivo da tributação sobre o consumo; (vi) a concentração da carga tributária em tributos indiretos; e, dentre outros, (vii) as baixas alíquotas praticadas para a tributação das heranças e doações. Estas distorções provocadas pelo sistema tributário, além de agravar a desigualdade social, afetam negativamente, também, as relações de desigualdade racial e de gênero, tendo em vista a desigualdade salarial verificada entre negros e brancos e entre homens e mulheres (OXFAM, 2017).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O Sistema tributário brasileiro está estruturado para privilegiar aqueles contribuintes que detém maior concentração de riqueza, apresentando efeitos regressivos e agravando o problema da desigualdade social.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a>. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a>. Acesso em 11 out. 2023. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14379	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5278147 - PIETTRA REIS ZEFERINA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da matriz tributária brasileira			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O problema da desigualdade está presente no Brasil e no mundo. Dados revelados pelo Banco Mundial indicam que 1% da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99% (Banco Mundial, 2013). No Brasil, a desigualdade também é revelada por números. É o que apontam Medeiros, Souza e Castro: "quando se combina a PNAD à DIRPF, quase metade de toda a renda no país está concentrada nos 5% mais ricos e um quarto no 1% mais rico. O milésimo mais rico acumula mais renda que toda a metade mais pobre da população. Isso reflete um perfil que já é bem conhecido: o Brasil é marcado por uma grande massa de população de baixa renda que se distingue de uma pequena, porém muito rica elite" (MEDEIROS, et al. 2015). Neste contexto, a tributação - fonte de receita imprescindível para financiar as atividades do Estado - pode ser um eficiente instrumento para redução das desigualdades, seja por meio do investimento do produto de sua arrecadação, seja pela implementação de políticas fiscais baseadas na noção de que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar a matriz tributária brasileira e verificar se o Sistema tributário brasileiro está estruturado de forma a reduzir as desigualdades			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>São vários os problemas que podem ser identificados a partir de uma rápida análise da legislação tributária, tais como: (i) a inexistência do imposto sobre grande fortunas previsto no art. 153, VII, da Constituição Federal; (ii) a ausência de uma progressividade efetiva do imposto de renda; (iii) a existência de inúmeras hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas sem qualquer vinculação com o mínimo vital; (iv) a isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de distribuição de lucros e dividendos; (v) o efeito regressivo da tributação sobre o consumo; (vi) a concentração da carga tributária em tributos indiretos; e, dentre outros, (vii) as baixas alíquotas praticadas para a tributação das heranças e doações. Estas distorções provocadas pelo sistema tributário, além de agravar a desigualdade social, afetam negativamente, também, as relações de desigualdade racial e de gênero, tendo em vista a desigualdade salarial verificada entre negros e brancos e entre homens e mulheres (OXFAM, 2017).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O Sistema tributário brasileiro está estruturado para privilegiar aqueles contribuintes que detém maior concentração de riqueza, apresentando efeitos regressivos e agravando o problema da desigualdade social.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuicao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a>. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a>. Acesso em 11 out. 2023. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14380	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		603520 - MARCOS ALVES DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Efeitos regressivos da tributação sobre o consumo			
<b>INTRODUCAO</b>	Considerando que o total da carga tributária brasileira em 2022 foi de 33,05% do PIB e a carga obtida a partir de tributos incidentes sobre bases de bens e serviços foi de 13,44%, nota-se que a tributação do consumo no Brasil é responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIAS</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acessado em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14380	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4323441 - ANDERSON LUIZ SILVA VIEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Efeitos regressivos da tributação sobre o consumo			
<b>INTRODUCA O</b>	Considerando que o total da carga tributária brasileira em 2022 foi de 33,05% do PIB e a carga obtida a partir de tributos incidentes sobre bases de bens e serviços foi de 13,44%, nota-se que a tributação do consumo no Brasil é responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIA S</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acessado em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14380	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4325842 - KAIROS ELIAS PONCIANO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Efeitos regressivos da tributação sobre o consumo			
<b>INTRODUCAO</b>	Considerando que o total da carga tributária brasileira em 2022 foi de 33,05% do PIB e a carga obtida a partir de tributos incidentes sobre bases de bens e serviços foi de 13,44%, nota-se que a tributação do consumo no Brasil é responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIAS</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acessado em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14380	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4379047 - GEOVANA SANTANA DA HORA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Efeitos regressivos da tributação sobre o consumo			
<b>INTRODUCA O</b>	Considerando que o total da carga tributária brasileira em 2022 foi de 33,05% do PIB e a carga obtida a partir de tributos incidentes sobre bases de bens e serviços foi de 13,44%, nota-se que a tributação do consumo no Brasil é responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIA S</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acessado em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14380	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4421795 - VANDA FERREIRA ALVES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Efeitos regressivos da tributação sobre o consumo			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Considerando que o total da carga tributária brasileira em 2022 foi de 33,05% do PIB e a carga obtida a partir de tributos incidentes sobre bases de bens e serviços foi de 13,44%, nota-se que a tributação do consumo no Brasil é responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a>. Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a>. Acessado em 30/04/2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14380	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4441125 - ANA KEILA CRUZ LIMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Efeitos regressivos da tributação sobre o consumo			
<b>INTRODUCA O</b>	Considerando que o total da carga tributária brasileira em 2022 foi de 33,05% do PIB e a carga obtida a partir de tributos incidentes sobre bases de bens e serviços foi de 13,44%, nota-se que a tributação do consumo no Brasil é responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIA S</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acessado em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14381	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4199952 - GUSTAVO ALMEIDA ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Isenção da distribuição de lucros e dividendos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O imposto de renda e proventos de qualquer natureza incide sobre acréscimo patrimonial produzido por diferentes fontes. Nos termos da legislação tributária, renda significa o acréscimo patrimonial decorrente do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Relativamente à remuneração do capital, uma de suas manifestações mais frequentes é a distribuição de lucros e dividendos por sociedade, pessoas jurídicas de direito privado constituídas com objetivo econômico. Ocorre que o art. 10, da Lei 9.249/1995 estabelece isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a referida norma de isenção tem o potencial de agravar o problema da desigualdade na sociedade brasileira.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Em comparação com países da OCDE, o Brasil se apresenta como um dos únicos países que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Uma justificativa comumente utilizada para tentar explicar esse fenômeno é a alegação de que o lucro já seria tributado antes da distribuição a uma alíquota global de 34%. No entanto, considerando que economias avançadas como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, dentre outros, tributam o lucro corporativo em duas ocasiões (apuração pela pessoa jurídica e distribuição aos sócios ou acionistas) a alíquota global praticada por esses países é superior à praticada pelo Brasil, podendo alcançar o patamar de 55% em países como Canadá e França. Dessa forma, apesar do Brasil adotar alíquotas de IRPJ e CSLL mais elevadas do que outros países, tal fato não compensa a isenção completa da distribuição dos lucros e dividendos. A referida norma favorece todo e qualquer sócio ou acionista que receber lucro a ser distribuído por pessoa jurídica. No entanto, os principais beneficiados são os contribuintes mais ricos, que acumulam riqueza graças à estrutura pouco progressiva do sistema tributário brasileiro. Diante desse cenário, Gobetti sugere a ampliação da base tributável do imposto de renda, com a revogação da norma de isenção de distribuição de lucros e dividendos, o que seria suficiente para promover justiça redistributiva, além de um aumento da arrecadação. Neste sentido, Gobetti afirma que a revogação da referida isenção representaria a arrecadação de: R\$ 43 bilhões ao ano, aplicando-se uma alíquota de 15%; 59 bilhões ao ano, aplicando-se alíquota de 27,5%; e 72 bilhões ao ano com a criação de alíquota de 35% sobre rendas acima de R\$ 325.000,00.			
<b>CONCLUSOES</b>	A isenção da distribuição de lucros agrava o problema da desigualdade afetando negativamente a justiça fiscal pela falta de racionalidade na distribuição da carga tributária, além de gerar uma renúncia fiscal bilionária.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 25 ed. São Paulo, Malheiros: 2010. GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuiçao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuiçao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a> . OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. (acesso em 10/09/2018). Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14381	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4767845 - LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Isenção da distribuição de lucros e dividendos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O imposto de renda e proventos de qualquer natureza incide sobre acréscimo patrimonial produzido por diferentes fontes. Nos termos da legislação tributária, renda significa o acréscimo patrimonial decorrente do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Relativamente à remuneração do capital, uma de suas manifestações mais frequentes é a distribuição de lucros e dividendos por sociedade, pessoas jurídicas de direito privado constituídas com objetivo econômico. Ocorre que o art. 10, da Lei 9.249/1995 estabelece isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a referida norma de isenção tem o potencial de agravar o problema da desigualdade na sociedade brasileira.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Em comparação com países da OCDE, o Brasil se apresenta como um dos únicos países que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Uma justificativa comumente utilizada para tentar explicar esse fenômeno é a alegação de que o lucro já seria tributado antes da distribuição a uma alíquota global de 34%. No entanto, considerando que economias avançadas como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, dentre outros, tributam o lucro corporativo em duas ocasiões (apuração pela pessoa jurídica e distribuição aos sócios ou acionistas) a alíquota global praticada por esses países é superior à praticada pelo Brasil, podendo alcançar o patamar de 55% em países como Canadá e França. Dessa forma, apesar do Brasil adotar alíquotas de IRPJ e CSLL mais elevadas do que outros países, tal fato não compensa a isenção completa da distribuição dos lucros e dividendos. A referida norma favorece todo e qualquer sócio ou acionista que receber lucro a ser distribuído por pessoa jurídica. No entanto, os principais beneficiados são os contribuintes mais ricos, que acumulam riqueza graças à estrutura pouco progressiva do sistema tributário brasileiro. Diante desse cenário, Gobetti sugere a ampliação da base tributável do imposto de renda, com a revogação da norma de isenção de distribuição de lucros e dividendos, o que seria suficiente para promover justiça redistributiva, além de um aumento da arrecadação. Neste sentido, Gobetti afirma que a revogação da referida isenção representaria a arrecadação de: R\$ 43 bilhões ao ano, aplicando-se uma alíquota de 15%; 59 bilhões ao ano, aplicando-se alíquota de 27,5%; e 72 bilhões ao ano com a criação de alíquota de 35% sobre rendas acima de R\$ 325.000,00.			
<b>CONCLUSOES</b>	A isenção da distribuição de lucros agrava o problema da desigualdade afetando negativamente a justiça fiscal pela falta de racionalidade na distribuição da carga tributária, além de gerar uma renúncia fiscal bilionária.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 25 ed. São Paulo, Malheiros: 2010. GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuciao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuciao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a> . OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. (acesso em 10/09/2018). Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14381	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4782062 - MAURICIO EDUARDO ROBERTO JUNIOR		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Isenção da distribuição de lucros e dividendos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O imposto de renda e proventos de qualquer natureza incide sobre acréscimo patrimonial produzido por diferentes fontes. Nos termos da legislação tributária, renda significa o acréscimo patrimonial decorrente do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Relativamente à remuneração do capital, uma de suas manifestações mais frequentes é a distribuição de lucros e dividendos por sociedade, pessoas jurídicas de direito privado constituídas com objetivo econômico. Ocorre que o art. 10, da Lei 9.249/1995 estabelece isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a referida norma de isenção tem o potencial de agravar o problema da desigualdade na sociedade brasileira.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Em comparação com países da OCDE, o Brasil se apresenta como um dos únicos países que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Uma justificativa comumente utilizada para tentar explicar esse fenômeno é a alegação de que o lucro já seria tributado antes da distribuição a uma alíquota global de 34%. No entanto, considerando que economias avançadas como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, dentre outros, tributam o lucro corporativo em duas ocasiões (apuração pela pessoa jurídica e distribuição aos sócios ou acionistas) a alíquota global praticada por esses países é superior à praticada pelo Brasil, podendo alcançar o patamar de 55% em países como Canadá e França. Dessa forma, apesar do Brasil adotar alíquotas de IRPJ e CSLL mais elevadas do que outros países, tal fato não compensa a isenção completa da distribuição dos lucros e dividendos. A referida norma favorece todo e qualquer sócio ou acionista que receber lucro a ser distribuído por pessoa jurídica. No entanto, os principais beneficiados são os contribuintes mais ricos, que acumulam riqueza graças à estrutura pouco progressiva do sistema tributário brasileiro. Diante desse cenário, Gobetti sugere a ampliação da base tributável do imposto de renda, com a revogação da norma de isenção de distribuição de lucros e dividendos, o que seria suficiente para promover justiça redistributiva, além de um aumento da arrecadação. Neste sentido, Gobetti afirma que a revogação da referida isenção representaria a arrecadação de: R\$ 43 bilhões ao ano, aplicando-se uma alíquota de 15%; 59 bilhões ao ano, aplicando-se alíquota de 27,5%; e 72 bilhões ao ano com a criação de alíquota de 35% sobre rendas acima de R\$ 325.000,00.			
<b>CONCLUSOES</b>	A isenção da distribuição de lucros agrava o problema da desigualdade afetando negativamente a justiça fiscal pela falta de racionalidade na distribuição da carga tributária, além de gerar uma renúncia fiscal bilionária.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 25 ed. São Paulo, Malheiros: 2010. GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuiçao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuiçao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a> . OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. (acesso em 10/09/2018). Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14381	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4792611 - GIOVANNA GREGORIM SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Isenção da distribuição de lucros e dividendos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O imposto de renda e proventos de qualquer natureza incide sobre acréscimo patrimonial produzido por diferentes fontes. Nos termos da legislação tributária, renda significa o acréscimo patrimonial decorrente do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Relativamente à remuneração do capital, uma de suas manifestações mais frequentes é a distribuição de lucros e dividendos por sociedade, pessoas jurídicas de direito privado constituídas com objetivo econômico. Ocorre que o art. 10, da Lei 9.249/1995 estabelece isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a referida norma de isenção tem o potencial de agravar o problema da desigualdade na sociedade brasileira.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Em comparação com países da OCDE, o Brasil se apresenta como um dos únicos países que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Uma justificativa comumente utilizada para tentar explicar esse fenômeno é a alegação de que o lucro já seria tributado antes da distribuição a uma alíquota global de 34%. No entanto, considerando que economias avançadas como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, dentre outros, tributam o lucro corporativo em duas ocasiões (apuração pela pessoa jurídica e distribuição aos sócios ou acionistas) a alíquota global praticada por esses países é superior à praticada pelo Brasil, podendo alcançar o patamar de 55% em países como Canadá e França. Dessa forma, apesar do Brasil adotar alíquotas de IRPJ e CSLL mais elevadas do que outros países, tal fato não compensa a isenção completa da distribuição dos lucros e dividendos. A referida norma favorece todo e qualquer sócio ou acionista que receber lucro a ser distribuído por pessoa jurídica. No entanto, os principais beneficiados são os contribuintes mais ricos, que acumulam riqueza graças à estrutura pouco progressiva do sistema tributário brasileiro. Diante desse cenário, Gobetti sugere a ampliação da base tributável do imposto de renda, com a revogação da norma de isenção de distribuição de lucros e dividendos, o que seria suficiente para promover justiça redistributiva, além de um aumento da arrecadação. Neste sentido, Gobetti afirma que a revogação da referida isenção representaria a arrecadação de: R\$ 43 bilhões ao ano, aplicando-se uma alíquota de 15%; 59 bilhões ao ano, aplicando-se alíquota de 27,5%; e 72 bilhões ao ano com a criação de alíquota de 35% sobre rendas acima de R\$ 325.000,00.			
<b>CONCLUSOES</b>	A isenção da distribuição de lucros agrava o problema da desigualdade afetando negativamente a justiça fiscal pela falta de racionalidade na distribuição da carga tributária, além de gerar uma renúncia fiscal bilionária.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 25 ed. São Paulo, Malheiros: 2010. GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. IPC-IG Working Paper. Brasília, número 136, p. 1-23, fevereiro de 2016. (Acesso em 10/09/2018) Disponível em <a href="http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuciao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf">http://www.ipc-undp.org/pub/port/WP136PT_Tributacao_e_distribuciao_da_renda_no_Brasil_novas_evidencias_a_partir_das_declaracoes_tributarias_das_pessoas.pdf</a> . OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. (acesso em 10/09/2018). Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14382	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4186338 - LEONALDO FIGUEIREDO QUARESMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Deduções de despesas médico-hospitalares da base de cálculo do IRPF			
<b>INTRODUCAO</b>	O imposto de renda das pessoas físicas é apurado de acordo com o sistema de bases correntes, compostos por ferramentas de antecipação (pagamento ou retenção) e ajuste anual, no qual todos os rendimentos, exceto os isentos, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva serão considerados com a dedução de despesas permitidas em lei. Dentre as despesas dedutíveis, estão as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF provoca algum tipo de distorção capaz de agravar o problema da desigualdade tributária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com Ocke-Reis deduções de despesas médico-hospitalares previstas no art. 8º, II, "a" da Lei nº 9.250/1995 Constituição Federal beneficiam a parcela mais rica da sociedade, uma vez que 1% dos indivíduos mais bem posicionados na pirâmide de distribuição se apropria de 18% do total de tais subsídios. Ademais disso, a dedução do IRPF se dá em detrimento de recursos financeiros, que geram um quadro de desfinanciamento do SUS. É importante destacar, ainda, que as despesas médico-hospitalares não estão sujeitas a nenhum tipo de limite quantitativo, podendo ser deduzidas integralmente da base de cálculo do contribuinte, desde que não supere o total de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Não bastasse tal fato, o limite qualitativo é mal delineado pela legislação autorizando todo e qualquer tipo de despesas com profissionais médicos ou hospitais, independentemente de estarem relacionadas diretamente com a saúde do contribuinte ou de seus dependentes, o que permite distorções como a possibilidade de dedução de procedimentos meramente estéticos, que se afastam do valor da saúde protegido constitucionalmente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A norma que autoriza dedução de despesas médicas representa uma política fiscal regressiva, na medida em que desonera mais contribuintes detentores de rendimentos mais elevados em detrimento de recursos financeiros que poderiam ser aplicados para financiar o SUS, que atende majoritariamente a população mais pobre da população. Esse problema poderia ser resolvido com a previsão de limites qualitativos e quantitativos mais adequados do que aqueles previstos na legislação vigente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: Perfil Constitucional e temas específicos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. OCKE-REIS, Carlos Octávio. Avaliação do Gasto Tributário em Saúde: O caso das despesas médicas do imposto de renda da pessoa física (IRPF). Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14382	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4644581 - MARIA LENICE RODRIGUES PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Deduções de despesas médico-hospitalares da base de cálculo do IRPF			
<b>INTRODUCAO</b>	O imposto de renda das pessoas físicas é apurado de acordo com o sistema de bases correntes, compostos por ferramentas de antecipação (pagamento ou retenção) e ajuste anual, no qual todos os rendimentos, exceto os isentos, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva serão considerados com a dedução de despesas permitidas em lei. Dentre as despesas dedutíveis, estão as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF provoca algum tipo de distorção capaz de agravar o problema da desigualdade tributária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com Ocke-Reis deduções de despesas médico-hospitalares previstas no art. 8º, II, "a" da Lei nº 9.250/1995 Constituição Federal beneficiam a parcela mais rica da sociedade, uma vez que 1% dos indivíduos mais bem posicionados na pirâmide de distribuição se apropria de 18% do total de tais subsídios. Ademais disso, a dedução do IRPF se dá em detrimento de recursos financeiros, que geram um quadro de desfinanciamento do SUS. É importante destacar, ainda, que as despesas médico-hospitalares não estão sujeitas a nenhum tipo de limite quantitativo, podendo ser deduzidas integralmente da base de cálculo do contribuinte, desde que não supere o total de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Não bastasse tal fato, o limite qualitativo é mal delineado pela legislação autorizando todo e qualquer tipo de despesas com profissionais médicos ou hospitais, independentemente de estarem relacionadas diretamente com a saúde do contribuinte ou de seus dependentes, o que permite distorções como a possibilidade de dedução de procedimentos meramente estéticos, que se afastam do valor da saúde protegido constitucionalmente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A norma que autoriza dedução de despesas médicas representa uma política fiscal regressiva, na medida em que desonera mais contribuintes detentores de rendimentos mais elevados em detrimento de recursos financeiros que poderiam ser aplicados para financiar o SUS, que atende majoritariamente a população mais pobre da população. Esse problema poderia ser resolvido com a previsão de limites qualitativos e quantitativos mais adequados do que aqueles previstos na legislação vigente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: Perfil Constitucional e temas específicos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. OCKE-REIS, Carlos Octávio. Avaliação do Gasto Tributário em Saúde: O caso das despesas médicas do imposto de renda da pessoa física (IRPF). Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14382	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4667123 - CICERO MARQUES DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Deduções de despesas médico-hospitalares da base de cálculo do IRPF			
<b>INTRODUCAO</b>	O imposto de renda das pessoas físicas é apurado de acordo com o sistema de bases correntes, compostos por ferramentas de antecipação (pagamento ou retenção) e ajuste anual, no qual todos os rendimentos, exceto os isentos, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva serão considerados com a dedução de despesas permitidas em lei. Dentre as despesas dedutíveis, estão as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF provoca algum tipo de distorção capaz de agravar o problema da desigualdade tributária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com Ocke-Reis deduções de despesas médico-hospitalares previstas no art. 8º, II, "a" da Lei nº 9.250/1995 Constituição Federal beneficiam a parcela mais rica da sociedade, uma vez que 1% dos indivíduos mais bem posicionados na pirâmide de distribuição se apropria de 18% do total de tais subsídios. Ademais disso, a dedução do IRPF se dá em detrimento de recursos financeiros, que geram um quadro de desfinanciamento do SUS. É importante destacar, ainda, que as despesas médico-hospitalares não estão sujeitas a nenhum tipo de limite quantitativo, podendo ser deduzidas integralmente da base de cálculo do contribuinte, desde que não supere o total de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Não bastasse tal fato, o limite qualitativo é mal delineado pela legislação autorizando todo e qualquer tipo de despesas com profissionais médicos ou hospitais, independentemente de estarem relacionadas diretamente com a saúde do contribuinte ou de seus dependentes, o que permite distorções como a possibilidade de dedução de procedimentos meramente estéticos, que se afastam do valor da saúde protegido constitucionalmente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A norma que autoriza dedução de despesas médicas representa uma política fiscal regressiva, na medida em que desonera mais contribuintes detentores de rendimentos mais elevados em detrimento de recursos financeiros que poderiam ser aplicados para financiar o SUS, que atende majoritariamente a população mais pobre da população. Esse problema poderia ser resolvido com a previsão de limites qualitativos e quantitativos mais adequados do que aqueles previstos na legislação vigente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: Perfil Constitucional e temas específicos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. OCKE-REIS, Carlos Octávio. Avaliação do Gasto Tributário em Saúde: O caso das despesas médicas do imposto de renda da pessoa física (IRPF). Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14382	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5084580 - LETICIA RODRIGUES CENTURION		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Deduções de despesas médico-hospitalares da base de cálculo do IRPF			
<b>INTRODUCAO</b>	O imposto de renda das pessoas físicas é apurado de acordo com o sistema de bases correntes, compostos por ferramentas de antecipação (pagamento ou retenção) e ajuste anual, no qual todos os rendimentos, exceto os isentos, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva serão considerados com a dedução de despesas permitidas em lei. Dentre as despesas dedutíveis, estão as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF provoca algum tipo de distorção capaz de agravar o problema da desigualdade tributária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com Ocke-Reis deduções de despesas médico-hospitalares previstas no art. 8º, II, "a" da Lei nº 9.250/1995 Constituição Federal beneficiam a parcela mais rica da sociedade, uma vez que 1% dos indivíduos mais bem posicionados na pirâmide de distribuição se apropria de 18% do total de tais subsídios. Ademais disso, a dedução do IRPF se dá em detrimento de recursos financeiros, que geram um quadro de desfinanciamento do SUS. É importante destacar, ainda, que as despesas médico-hospitalares não estão sujeitas a nenhum tipo de limite quantitativo, podendo ser deduzidas integralmente da base de cálculo do contribuinte, desde que não supere o total de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Não bastasse tal fato, o limite qualitativo é mal delineado pela legislação autorizando todo e qualquer tipo de despesas com profissionais médicos ou hospitais, independentemente de estarem relacionadas diretamente com a saúde do contribuinte ou de seus dependentes, o que permite distorções como a possibilidade de dedução de procedimentos meramente estéticos, que se afastam do valor da saúde protegido constitucionalmente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A norma que autoriza dedução de despesas médicas representa uma política fiscal regressiva, na medida em que desonera mais contribuintes detentores de rendimentos mais elevados em detrimento de recursos financeiros que poderiam ser aplicados para financiar o SUS, que atende majoritariamente a população mais pobre da população. Esse problema poderia ser resolvido com a previsão de limites qualitativos e quantitativos mais adequados do que aqueles previstos na legislação vigente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: Perfil Constitucional e temas específicos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. OCKE-REIS, Carlos Octávio. Avaliação do Gasto Tributário em Saúde: O caso das despesas médicas do imposto de renda da pessoa física (IRPF). Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14382	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5163188 - MARIA CLARA DA SILVA SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Deduções de despesas médico-hospitalares da base de cálculo do IRPF			
<b>INTRODUCAO</b>	O imposto de renda das pessoas físicas é apurado de acordo com o sistema de bases correntes, compostos por ferramentas de antecipação (pagamento ou retenção) e ajuste anual, no qual todos os rendimentos, exceto os isentos, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva serão considerados com a dedução de despesas permitidas em lei. Dentre as despesas dedutíveis, estão as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF provoca algum tipo de distorção capaz de agravar o problema da desigualdade tributária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com Ocke-Reis deduções de despesas médico-hospitalares previstas no art. 8º, II, "a" da Lei nº 9.250/1995 Constituição Federal beneficiam a parcela mais rica da sociedade, uma vez que 1% dos indivíduos mais bem posicionados na pirâmide de distribuição se apropria de 18% do total de tais subsídios. Ademais disso, a dedução do IRPF se dá em detrimento de recursos financeiros, que geram um quadro de desfinanciamento do SUS. É importante destacar, ainda, que as despesas médico-hospitalares não estão sujeitas a nenhum tipo de limite quantitativo, podendo ser deduzidas integralmente da base de cálculo do contribuinte, desde que não supere o total de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Não bastasse tal fato, o limite qualitativo é mal delineado pela legislação autorizando todo e qualquer tipo de despesas com profissionais médicos ou hospitais, independentemente de estarem relacionadas diretamente com a saúde do contribuinte ou de seus dependentes, o que permite distorções como a possibilidade de dedução de procedimentos meramente estéticos, que se afastam do valor da saúde protegido constitucionalmente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A norma que autoriza dedução de despesas médicas representa uma política fiscal regressiva, na medida em que desonera mais contribuintes detentores de rendimentos mais elevados em detrimento de recursos financeiros que poderiam ser aplicados para financiar o SUS, que atende majoritariamente a população mais pobre da população. Esse problema poderia ser resolvido com a previsão de limites qualitativos e quantitativos mais adequados do que aqueles previstos na legislação vigente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: Perfil Constitucional e temas específicos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. OCKE-REIS, Carlos Octávio. Avaliação do Gasto Tributário em Saúde: O caso das despesas médicas do imposto de renda da pessoa física (IRPF). Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14382	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5240590 - ANDREIA GIOVANNI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Deduções de despesas médico-hospitalares da base de cálculo do IRPF			
<b>INTRODUCAO</b>	O imposto de renda das pessoas físicas é apurado de acordo com o sistema de bases correntes, compostos por ferramentas de antecipação (pagamento ou retenção) e ajuste anual, no qual todos os rendimentos, exceto os isentos, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva serão considerados com a dedução de despesas permitidas em lei. Dentre as despesas dedutíveis, estão as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem o objetivo de analisar se a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF provoca algum tipo de distorção capaz de agravar o problema da desigualdade tributária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De acordo com Ocke-Reis deduções de despesas médico-hospitalares previstas no art. 8º, II, "a" da Lei nº 9.250/1995 Constituição Federal beneficiam a parcela mais rica da sociedade, uma vez que 1% dos indivíduos mais bem posicionados na pirâmide de distribuição se apropria de 18% do total de tais subsídios. Ademais disso, a dedução do IRPF se dá em detrimento de recursos financeiros, que geram um quadro de desfinanciamento do SUS. É importante destacar, ainda, que as despesas médico-hospitalares não estão sujeitas a nenhum tipo de limite quantitativo, podendo ser deduzidas integralmente da base de cálculo do contribuinte, desde que não supere o total de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Não bastasse tal fato, o limite qualitativo é mal delineado pela legislação autorizando todo e qualquer tipo de despesas com profissionais médicos ou hospitais, independentemente de estarem relacionadas diretamente com a saúde do contribuinte ou de seus dependentes, o que permite distorções como a possibilidade de dedução de procedimentos meramente estéticos, que se afastam do valor da saúde protegido constitucionalmente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A norma que autoriza dedução de despesas médicas representa uma política fiscal regressiva, na medida em que desonera mais contribuintes detentores de rendimentos mais elevados em detrimento de recursos financeiros que poderiam ser aplicados para financiar o SUS, que atende majoritariamente a população mais pobre da população. Esse problema poderia ser resolvido com a previsão de limites qualitativos e quantitativos mais adequados do que aqueles previstos na legislação vigente.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: Perfil Constitucional e temas específicos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. OCKE-REIS, Carlos Octávio. Avaliação do Gasto Tributário em Saúde: O caso das despesas médicas do imposto de renda da pessoa física (IRPF). Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14383	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3548236 - DANIEL MORILLA BURGER		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Desafios para criação do imposto sobre grandes fortunas			
<b>INTRODUCA O</b>	No Brasil, a competência para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) foi ineditamente prevista na Constituição Federal de 1988. Passados 35 anos da promulgação da Carta Constitucional, o referido imposto ainda não foi instituído. Dentro deste período foram apresentados dois projetos de lei, porém os argumentos dos parlamentares para rejeitar os projetos foram os mesmos nos dois casos: fuga de capitais, baixo potencial arrecadatório, alto custo administrativo, conflitos entre impostos de propriedade, dificuldade para identificação do proprietário e a sua extinção em diversos países europeus.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as críticas que servem como resistência às propostas de criação do IGF.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	Sobre a potencial saída do capital, um estudo realizado pela Câmara dos Deputados revela que a arrecadação do IGF cresce de forma desproporcional à redução da riqueza provocada pela instituição deste imposto. Para cada elevação de 1% na alíquota do IGF, o crescimento econômico é afetado a uma taxa menor, variando de 0,02% a 0,33%. Relativamente ao baixo potencial arrecadatório, embora seja difícil o montante a ser arrecadado sem a definição das alíquotas aplicáveis e do valor mínimo a ser tributado. No entanto, estudos sugerem que a carga tributária do IGF poderia variar entre 10 e 100 bilhões de reais, valor que seria integralmente destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 80, da ADCT. Ademais disso, a norma de competência autoriza a criação de um imposto sobre grandes fortunas, assim considerada a totalidade de bens e direitos que uma pessoa possui, podendo superpor-se aos impostos específicos sobre o patrimônio. Sobre as dificuldades na identificação do real proprietário, os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional e a experiência do Direito Comparado revelam medidas que podem ser adotadas para coibir a evasão fiscal. Por fim, sobre a experiência malsucedida em vários países e o alto custo de administração do IGF, é importante dizer que a desistência de diversos países não significa uma experiência malsucedida. Percebe-se que alguns dos países que extinguiram o IGF não hesitaram em reaplicá-lo em tempos de crise para aumentar a arrecadação.			
<b>CONCLUSOES</b>	As críticas comumente feitas ao IGF são manifestamente especulativas e desprovidas de rigor científico. Tratam-se de simplificações reproduzidas com a intenção de convencer o interlocutor da inviabilidade da criação do IGF.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Pedro Humberto Bruno. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2011. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62">https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. NUNES, Cleucio Santos. Justiça Tributária. Belo Horizonte: Forum, 2019. REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; ARAUJO, João Victor Nogueira. Tributação e Desigualdade: Thomas Piketty e o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. In: REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante (coord.). Capital no Século XXI: Piketty e a Economia da Desigualdade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14383	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4383281 - ISABELLA BONALUME THOMAZINHO		2 - Aprovado
				<b>Apresentação</b>
				0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Desafios para criação do imposto sobre grandes fortunas			
<b>INTRODUCA O</b>	No Brasil, a competência para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) foi ineditamente prevista na Constituição Federal de 1988. Passados 35 anos da promulgação da Carta Constitucional, o referido imposto ainda não foi instituído. Dentro deste período foram apresentados dois projetos de lei, porém os argumentos dos parlamentares para rejeitar os projetos foram os mesmos nos dois casos: fuga de capitais, baixo potencial arrecadatório, alto custo administrativo, conflitos entre impostos de propriedade, dificuldade para identificação do proprietário e a sua extinção em diversos países europeus.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as críticas que servem como resistência às propostas de criação do IGF.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	Sobre a potencial saída do capital, um estudo realizado pela Câmara dos Deputados revela que a arrecadação do IGF cresce de forma desproporcional à redução da riqueza provocada pela instituição deste imposto. Para cada elevação de 1% na alíquota do IGF, o crescimento econômico é afetado a uma taxa menor, variando de 0,02% a 0,33%. Relativamente ao baixo potencial arrecadatório, embora seja difícil o montante a ser arrecadado sem a definição das alíquotas aplicáveis e do valor mínimo a ser tributado. No entanto, estudos sugerem que a carga tributária do IGF poderia variar entre 10 e 100 bilhões de reais, valor que seria integralmente destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 80, da ADCT. Ademais disso, a norma de competência autoriza a criação de um imposto sobre grandes fortunas, assim considerada a totalidade de bens e direitos que uma pessoa possui, podendo superpor-se aos impostos específicos sobre o patrimônio. Sobre as dificuldades na identificação do real proprietário, os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional e a experiência do Direito Comparado revelam medidas que podem ser adotadas para coibir a evasão fiscal. Por fim, sobre a experiência malsucedida em vários países e o alto custo de administração do IGF, é importante dizer que a desistência de diversos países não significa uma experiência malsucedida. Percebe-se que alguns dos países que extinguiram o IGF não hesitaram em reaplicá-lo em tempos de crise para aumentar a arrecadação.			
<b>CONCLUSOES</b>	As críticas comumente feitas ao IGF são manifestamente especulativas e desprovidas de rigor científico. Tratam-se de simplificações reproduzidas com a intenção de convencer o interlocutor da inviabilidade da criação do IGF.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Pedro Humberto Bruno. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2011. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62">https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. NUNES, Cleucio Santos. Justiça Tributária. Belo Horizonte: Forum, 2019. REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; ARAUJO, João Victor Nogueira. Tributação e Desigualdade: Thomas Piketty e o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. In: REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante (coord.). Capital no Século XXI: Piketty e a Economia da Desigualdade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14383	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4745752 - SORAYA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Desafios para criação do imposto sobre grandes fortunas			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, a competência para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) foi ineditamente prevista na Constituição Federal de 1988. Passados 35 anos da promulgação da Carta Constitucional, o referido imposto ainda não foi instituído. Dentro deste período foram apresentados dois projetos de lei, porém os argumentos dos parlamentares para rejeitar os projetos foram os mesmos nos dois casos: fuga de capitais, baixo potencial arrecadatório, alto custo administrativo, conflitos entre impostos de propriedade, dificuldade para identificação do proprietário e a sua extinção em diversos países europeus.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as críticas que servem como resistência às propostas de criação do IGF.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Sobre a potencial saída do capital, um estudo realizado pela Câmara dos Deputados revela que a arrecadação do IGF cresce de forma desproporcional à redução da riqueza provocada pela instituição deste imposto. Para cada elevação de 1% na alíquota do IGF, o crescimento econômico é afetado a uma taxa menor, variando de 0,02% a 0,33%. Relativamente ao baixo potencial arrecadatório, embora seja difícil o montante a ser arrecadado sem a definição das alíquotas aplicáveis e do valor mínimo a ser tributado. No entanto, estudos sugerem que a carga tributária do IGF poderia variar entre 10 e 100 bilhões de reais, valor que seria integralmente destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 80, da ADCT. Ademais disso, a norma de competência autoriza a criação de um imposto sobre grandes fortunas, assim considerada a totalidade de bens e direitos que uma pessoa possui, podendo superpor-se aos impostos específicos sobre o patrimônio. Sobre as dificuldades na identificação do real proprietário, os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional e a experiência do Direito Comparado revelam medidas que podem ser adotadas para coibir a evasão fiscal. Por fim, sobre a experiência malsucedida em vários países e o alto custo de administração do IGF, é importante dizer que a desistência de diversos países não significa uma experiência malsucedida. Percebe-se que alguns dos países que extinguiram o IGF não hesitaram em reaplicá-lo em tempos de crise para aumentar a arrecadação.			
<b>CONCLUSOES</b>	As críticas comumente feitas ao IGF são manifestamente especulativas e desprovidas de rigor científico. Tratam-se de simplificações reproduzidas com a intenção de convencer o interlocutor da inviabilidade da criação do IGF.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARVALHO, Pedro Humberto Bruno. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2011. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62">https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. NUNES, Cleucio Santos. Justiça Tributária. Belo Horizonte: Forum, 2019. REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; ARAUJO, João Victor Nogueira. Tributação e Desigualdade: Thomas Piketty e o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. In: REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante (coord.). Capital no Século XXI: Piketty e a Economia da Desigualdade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14383	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4775384 - IGOR DOS SANTOS SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Desafios para criação do imposto sobre grandes fortunas			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, a competência para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) foi ineditamente prevista na Constituição Federal de 1988. Passados 35 anos da promulgação da Carta Constitucional, o referido imposto ainda não foi instituído. Dentro deste período foram apresentados dois projetos de lei, porém os argumentos dos parlamentares para rejeitar os projetos foram os mesmos nos dois casos: fuga de capitais, baixo potencial arrecadatório, alto custo administrativo, conflitos entre impostos de propriedade, dificuldade para identificação do proprietário e a sua extinção em diversos países europeus.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as críticas que servem como resistência às propostas de criação do IGF.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Sobre a potencial saída do capital, um estudo realizado pela Câmara dos Deputados revela que a arrecadação do IGF cresce de forma desproporcional à redução da riqueza provocada pela instituição deste imposto. Para cada elevação de 1% na alíquota do IGF, o crescimento econômico é afetado a uma taxa menor, variando de 0,02% a 0,33%. Relativamente ao baixo potencial arrecadatório, embora seja difícil o montante a ser arrecadado sem a definição das alíquotas aplicáveis e do valor mínimo a ser tributado. No entanto, estudos sugerem que a carga tributária do IGF poderia variar entre 10 e 100 bilhões de reais, valor que seria integralmente destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 80, da ADCT. Ademais disso, a norma de competência autoriza a criação de um imposto sobre grandes fortunas, assim considerada a totalidade de bens e direitos que uma pessoa possui, podendo superpor-se aos impostos específicos sobre o patrimônio. Sobre as dificuldades na identificação do real proprietário, os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional e a experiência do Direito Comparado revelam medidas que podem ser adotadas para coibir a evasão fiscal. Por fim, sobre a experiência malsucedida em vários países e o alto custo de administração do IGF, é importante dizer que a desistência de diversos países não significa uma experiência malsucedida. Percebe-se que alguns dos países que extinguiram o IGF não hesitaram em reaplicá-lo em tempos de crise para aumentar a arrecadação.			
<b>CONCLUSOES</b>	As críticas comumente feitas ao IGF são manifestamente especulativas e desprovidas de rigor científico. Tratam-se de simplificações reproduzidas com a intenção de convencer o interlocutor da inviabilidade da criação do IGF.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARVALHO, Pedro Humberto Bruno. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2011. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62">https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. NUNES, Cleucio Santos. Justiça Tributária. Belo Horizonte: Forum, 2019. REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; ARAUJO, João Victor Nogueira. Tributação e Desigualdade: Thomas Piketty e o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. In: REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante (coord.). Capital no Século XXI: Piketty e a Economia da Desigualdade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14383	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4787544 - JONATHAN SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Desafios para criação do imposto sobre grandes fortunas			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, a competência para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) foi ineditamente prevista na Constituição Federal de 1988. Passados 35 anos da promulgação da Carta Constitucional, o referido imposto ainda não foi instituído. Dentro deste período foram apresentados dois projetos de lei, porém os argumentos dos parlamentares para rejeitar os projetos foram os mesmos nos dois casos: fuga de capitais, baixo potencial arrecadatório, alto custo administrativo, conflitos entre impostos de propriedade, dificuldade para identificação do proprietário e a sua extinção em diversos países europeus.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as críticas que servem como resistência às propostas de criação do IGF.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Sobre a potencial saída do capital, um estudo realizado pela Câmara dos Deputados revela que a arrecadação do IGF cresce de forma desproporcional à redução da riqueza provocada pela instituição deste imposto. Para cada elevação de 1% na alíquota do IGF, o crescimento econômico é afetado a uma taxa menor, variando de 0,02% a 0,33%. Relativamente ao baixo potencial arrecadatório, embora seja difícil o montante a ser arrecadado sem a definição das alíquotas aplicáveis e do valor mínimo a ser tributado. No entanto, estudos sugerem que a carga tributária do IGF poderia variar entre 10 e 100 bilhões de reais, valor que seria integralmente destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 80, da ADCT. Ademais disso, a norma de competência autoriza a criação de um imposto sobre grandes fortunas, assim considerada a totalidade de bens e direitos que uma pessoa possui, podendo superpor-se aos impostos específicos sobre o patrimônio. Sobre as dificuldades na identificação do real proprietário, os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional e a experiência do Direito Comparado revelam medidas que podem ser adotadas para coibir a evasão fiscal. Por fim, sobre a experiência malsucedida em vários países e o alto custo de administração do IGF, é importante dizer que a desistência de diversos países não significa uma experiência malsucedida. Percebe-se que alguns dos países que extinguiram o IGF não hesitaram em reaplicá-lo em tempos de crise para aumentar a arrecadação.			
<b>CONCLUSOES</b>	As críticas comumente feitas ao IGF são manifestamente especulativas e desprovidas de rigor científico. Tratam-se de simplificações reproduzidas com a intenção de convencer o interlocutor da inviabilidade da criação do IGF.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARVALHO, Pedro Humberto Bruno. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2011. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62">https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. NUNES, Cleucio Santos. Justiça Tributária. Belo Horizonte: Forum, 2019. REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; ARAUJO, João Victor Nogueira. Tributação e Desigualdade: Thomas Piketty e o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. In: REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante (coord.). Capital no Século XXI: Piketty e a Economia da Desigualdade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14383	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5137004 - VIVIANE FERREIRA SANTOS SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Desafios para criação do imposto sobre grandes fortunas			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, a competência para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) foi ineditamente prevista na Constituição Federal de 1988. Passados 35 anos da promulgação da Carta Constitucional, o referido imposto ainda não foi instituído. Dentro deste período foram apresentados dois projetos de lei, porém os argumentos dos parlamentares para rejeitar os projetos foram os mesmos nos dois casos: fuga de capitais, baixo potencial arrecadatório, alto custo administrativo, conflitos entre impostos de propriedade, dificuldade para identificação do proprietário e a sua extinção em diversos países europeus.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as críticas que servem como resistência às propostas de criação do IGF.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Sobre a potencial saída do capital, um estudo realizado pela Câmara dos Deputados revela que a arrecadação do IGF cresce de forma desproporcional à redução da riqueza provocada pela instituição deste imposto. Para cada elevação de 1% na alíquota do IGF, o crescimento econômico é afetado a uma taxa menor, variando de 0,02% a 0,33%. Relativamente ao baixo potencial arrecadatório, embora seja difícil o montante a ser arrecadado sem a definição das alíquotas aplicáveis e do valor mínimo a ser tributado. No entanto, estudos sugerem que a carga tributária do IGF poderia variar entre 10 e 100 bilhões de reais, valor que seria integralmente destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 80, da ADCT. Ademais disso, a norma de competência autoriza a criação de um imposto sobre grandes fortunas, assim considerada a totalidade de bens e direitos que uma pessoa possui, podendo superpor-se aos impostos específicos sobre o patrimônio. Sobre as dificuldades na identificação do real proprietário, os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional e a experiência do Direito Comparado revelam medidas que podem ser adotadas para coibir a evasão fiscal. Por fim, sobre a experiência malsucedida em vários países e o alto custo de administração do IGF, é importante dizer que a desistência de diversos países não significa uma experiência malsucedida. Percebe-se que alguns dos países que extinguiram o IGF não hesitaram em reaplicá-lo em tempos de crise para aumentar a arrecadação.			
<b>CONCLUSOES</b>	As críticas comumente feitas ao IGF são manifestamente especulativas e desprovidas de rigor científico. Tratam-se de simplificações reproduzidas com a intenção de convencer o interlocutor da inviabilidade da criação do IGF.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARVALHO, Pedro Humberto Bruno. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2011. Disponível em: (#60) <a href="https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62">https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5755/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. NUNES, Cleucio Santos. Justiça Tributária. Belo Horizonte: Forum, 2019. REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; ARAUJO, João Victor Nogueira. Tributação e Desigualdade: Thomas Piketty e o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. In: REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante (coord.). Capital no Século XXI: Piketty e a Economia da Desigualdade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14385	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1529773 - ANGELICA CHAGAS SCHWERN	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Tributação da herança no Brasil e no Direito Comparado			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, incide sobre as heranças o ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. De acordo com relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária brasileira em 2022 representou R\$ 3.342.093.000.000,00 (três trilhões, trezentos e quarenta e dois bilhões, noventa e três milhões de reais), equivalente a 33,71% do PIB brasileiro, enquanto a carga tributária do ITCMD representou apenas R\$ 12.874.000.000,00 (doze bilhões, oitocentos e setenta e quatro milhões de reais), equivalente a 0,13% do PIB e 0,38% da carga tributária brasileira. Os números revelam que a tributação da herança no Brasil é pouco significativa, o que estimula a concentração de riqueza e agrava a desigualdade social.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a tributação sobre heranças no Brasil, comparando-a com a prática de outros países.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	O ITCMD é um imposto de competência estadual, com alíquota máxima de 8% definida na Resolução do Senado Federal nº 9, de 1992. Relativamente às alíquotas aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 21), que é constitucional a fixação de alíquotas progressivas para o ITCMD. Atualmente, muitos Estados utilizam a alíquota máxima de 8%. Esse é o caso dos Estados da Bahia (Lei nº 4.826/1989), Pernambuco (Lei nº 13.974/2009), Ceará (Lei nº 15.812/2015), Rio de Janeiro (Lei nº 7.174/2015), Santa Catarina (Lei nº 13.136/2004) e Mato Grosso (Lei nº 7.850/2002), entre outros. Na contramão desse movimento de tributação das heranças com alíquotas progressivas alcançando o percentual máximo de 8%, o Estado de São Paulo utiliza a alíquota de 4%, sendo que esteve perto de ter as suas alíquotas reduzidas para 1% em casos de herança, uma vez que o PL 511/2020 foi aprovado pela ALESP, mas vetado pelo Governador do Estado de São Paulo, sob a justificativa de que a renúncia de receita estaria desacompanhada de estudo de impacto orçamentário financeiro exigido pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As baixas alíquotas praticadas pelos Estados brasileiros, destoam das alíquotas praticadas por países desenvolvidos para tributação de ascendentes ou descendentes do de cujus. A título de exemplo, veja-se o caso da França (45%), Alemanha (30%), Estados Unidos (40%), Japão (55%), Reino Unido (36%), Espanha (32%) e Bélgica (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre heranças no Brasil, em comparação com a praticada em Países desenvolvidos, é pouco significativa, criando um cenário de desigualdade, uma vez que a riqueza herdada é tributada de forma muito mais branda do que aquela produzida pelo trabalho. Nesse sentido, a OCDE sugere a elevação de alíquotas do ITCMD que se apresenta como instrumento capaz de aumentar a igualdade de oportunidades, decompor a concentração de riqueza e nivelar as condições de concorrência entre indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ERNST (#38) YOUNG. Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62">https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62</a> Acesso em 09/10/2023. OECD. Inheritance Taxation in OECD Countries. OECD Tax Policy Studies nº 28, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62">https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62</a> Acesso em 09/10/2023. PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14385	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4102444 - MARIA EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Tributação da herança no Brasil e no Direito Comparado			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, incide sobre as heranças o ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. De acordo com relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária brasileira em 2022 representou R\$ 3.342.093.000.000,00 (três trilhões, trezentos e quarenta e dois bilhões, noventa e três milhões de reais), equivalente a 33,71% do PIB brasileiro, enquanto a carga tributária do ITCMD representou apenas R\$ 12.874.000.000,00 (doze bilhões, oitocentos e setenta e quatro milhões de reais), equivalente a 0,13% do PIB e 0,38% da carga tributária brasileira. Os números revelam que a tributação da herança no Brasil é pouco significativa, o que estimula a concentração de riqueza e agrava a desigualdade social.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a tributação sobre heranças no Brasil, comparando-a com a prática de outros países.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	O ITCMD é um imposto de competência estadual, com alíquota máxima de 8% definida na Resolução do Senado Federal nº 9, de 1992. Relativamente às alíquotas aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 21), que é constitucional a fixação de alíquotas progressivas para o ITCMD. Atualmente, muitos Estados utilizam a alíquota máxima de 8%. Esse é o caso dos Estados da Bahia (Lei nº 4.826/1989), Pernambuco (Lei nº 13.974/2009), Ceará (Lei nº 15.812/2015), Rio de Janeiro (Lei nº 7.174/2015), Santa Catarina (Lei nº 13.136/2004) e Mato Grosso (Lei nº 7.850/2002), entre outros. Na contramão desse movimento de tributação das heranças com alíquotas progressivas alcançando o percentual máximo de 8%, o Estado de São Paulo utiliza a alíquota de 4%, sendo que esteve perto de ter as suas alíquotas reduzidas para 1% em casos de herança, uma vez que o PL 511/2020 foi aprovado pela ALESP, mas vetado pelo Governador do Estado de São Paulo, sob a justificativa de que a renúncia de receita estaria desacompanhada de estudo de impacto orçamentário financeiro exigido pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As baixas alíquotas praticadas pelos Estados brasileiros, destoam das alíquotas praticadas por países desenvolvidos para tributação de ascendentes ou descendentes do de cujus. A título de exemplo, veja-se o caso da França (45%), Alemanha (30%), Estados Unidos (40%), Japão (55%), Reino Unido (36%), Espanha (32%) e Bélgica (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre heranças no Brasil, em comparação com a praticada em Países desenvolvidos, é pouco significativa, criando um cenário de desigualdade, uma vez que a riqueza herdada é tributada de forma muito mais branda do que aquela produzida pelo trabalho. Nesse sentido, a OCDE sugere a elevação de alíquotas do ITCMD que se apresenta como instrumento capaz de aumentar a igualdade de oportunidades, decompor a concentração de riqueza e nivelar as condições de concorrência entre indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ERNST (#38) YOUNG. Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62">https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62</a> Acesso em 09/10/2023. OECD. Inheritance Taxation in OECD Countries. OECD Tax Policy Studies nº 28, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62">https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62</a> Acesso em 09/10/2023. PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14385	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4111010 - MARIA VICTORIA ESTEVES SILVA MOTA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Tributação da herança no Brasil e no Direito Comparado			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, incide sobre as heranças o ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. De acordo com relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária brasileira em 2022 representou R\$ 3.342.093.000.000,00 (três trilhões, trezentos e quarenta e dois bilhões, noventa e três milhões de reais), equivalente a 33,71% do PIB brasileiro, enquanto a carga tributária do ITCMD representou apenas R\$ 12.874.000.000,00 (doze bilhões, oitocentos e setenta e quatro milhões de reais), equivalente a 0,13% do PIB e 0,38% da carga tributária brasileira. Os números revelam que a tributação da herança no Brasil é pouco significativa, o que estimula a concentração de riqueza e agrava a desigualdade social.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a tributação sobre heranças no Brasil, comparando-a com a prática de outros países.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	O ITCMD é um imposto de competência estadual, com alíquota máxima de 8% definida na Resolução do Senado Federal nº 9, de 1992. Relativamente às alíquotas aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 21), que é constitucional a fixação de alíquotas progressivas para o ITCMD. Atualmente, muitos Estados utilizam a alíquota máxima de 8%. Esse é o caso dos Estados da Bahia (Lei nº 4.826/1989), Pernambuco (Lei nº 13.974/2009), Ceará (Lei nº 15.812/2015), Rio de Janeiro (Lei nº 7.174/2015), Santa Catarina (Lei nº 13.136/2004) e Mato Grosso (Lei nº 7.850/2002), entre outros. Na contramão desse movimento de tributação das heranças com alíquotas progressivas alcançando o percentual máximo de 8%, o Estado de São Paulo utiliza a alíquota de 4%, sendo que esteve perto de ter as suas alíquotas reduzidas para 1% em casos de herança, uma vez que o PL 511/2020 foi aprovado pela ALESP, mas vetado pelo Governador do Estado de São Paulo, sob a justificativa de que a renúncia de receita estaria desacompanhada de estudo de impacto orçamentário financeiro exigido pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As baixas alíquotas praticadas pelos Estados brasileiros, destoam das alíquotas praticadas por países desenvolvidos para tributação de ascendentes ou descendentes do de cujus. A título de exemplo, veja-se o caso da França (45%), Alemanha (30%), Estados Unidos (40%), Japão (55%), Reino Unido (36%), Espanha (32%) e Bélgica (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre heranças no Brasil, em comparação com a praticada em Países desenvolvidos, é pouco significativa, criando um cenário de desigualdade, uma vez que a riqueza herdada é tributada de forma muito mais branda do que aquela produzida pelo trabalho. Nesse sentido, a OCDE sugere a elevação de alíquotas do ITCMD que se apresenta como instrumento capaz de aumentar a igualdade de oportunidades, decompor a concentração de riqueza e nivelar as condições de concorrência entre indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ERNST (#38) YOUNG. Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62">https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62</a> Acesso em 09/10/2023. OECD. Inheritance Taxation in OECD Countries. OECD Tax Policy Studies nº 28, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62">https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62</a> Acesso em 09/10/2023. PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14385	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5064279 - MARY DE OLIVEIRA PINHEIRO DE SÁ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Tributação da herança no Brasil e no Direito Comparado			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, incide sobre as heranças o ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. De acordo com relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária brasileira em 2022 representou R\$ 3.342.093.000.000,00 (três trilhões, trezentos e quarenta e dois bilhões, noventa e três milhões de reais), equivalente a 33,71% do PIB brasileiro, enquanto a carga tributária do ITCMD representou apenas R\$ 12.874.000.000,00 (doze bilhões, oitocentos e setenta e quatro milhões de reais), equivalente a 0,13% do PIB e 0,38% da carga tributária brasileira. Os números revelam que a tributação da herança no Brasil é pouco significativa, o que estimula a concentração de riqueza e agrava a desigualdade social.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a tributação sobre heranças no Brasil, comparando-a com a prática de outros países.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	O ITCMD é um imposto de competência estadual, com alíquota máxima de 8% definida na Resolução do Senado Federal nº 9, de 1992. Relativamente às alíquotas aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 21), que é constitucional a fixação de alíquotas progressivas para o ITCMD. Atualmente, muitos Estados utilizam a alíquota máxima de 8%. Esse é o caso dos Estados da Bahia (Lei nº 4.826/1989), Pernambuco (Lei nº 13.974/2009), Ceará (Lei nº 15.812/2015), Rio de Janeiro (Lei nº 7.174/2015), Santa Catarina (Lei nº 13.136/2004) e Mato Grosso (Lei nº 7.850/2002), entre outros. Na contramão desse movimento de tributação das heranças com alíquotas progressivas alcançando o percentual máximo de 8%, o Estado de São Paulo utiliza a alíquota de 4%, sendo que esteve perto de ter as suas alíquotas reduzidas para 1% em casos de herança, uma vez que o PL 511/2020 foi aprovado pela ALESP, mas vetado pelo Governador do Estado de São Paulo, sob a justificativa de que a renúncia de receita estaria desacompanhada de estudo de impacto orçamentário financeiro exigido pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As baixas alíquotas praticadas pelos Estados brasileiros, destoam das alíquotas praticadas por países desenvolvidos para tributação de ascendentes ou descendentes do de cujus. A título de exemplo, veja-se o caso da França (45%), Alemanha (30%), Estados Unidos (40%), Japão (55%), Reino Unido (36%), Espanha (32%) e Bélgica (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre heranças no Brasil, em comparação com a praticada em Países desenvolvidos, é pouco significativa, criando um cenário de desigualdade, uma vez que a riqueza herdada é tributada de forma muito mais branda do que aquela produzida pelo trabalho. Nesse sentido, a OCDE sugere a elevação de alíquotas do ITCMD que se apresenta como instrumento capaz de aumentar a igualdade de oportunidades, decompor a concentração de riqueza e nivelar as condições de concorrência entre indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ERNST (#38) YOUNG. Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62">https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62</a> Acesso em 09/10/2023. OECD. Inheritance Taxation in OECD Countries. OECD Tax Policy Studies nº 28, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62">https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62</a> Acesso em 09/10/2023. PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14385	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5182735 - RAQUEL FILIPIM CHAGAS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Tributação da herança no Brasil e no Direito Comparado			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, incide sobre as heranças o ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. De acordo com relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária brasileira em 2022 representou R\$ 3.342.093.000.000,00 (três trilhões, trezentos e quarenta e dois bilhões, noventa e três milhões de reais), equivalente a 33,71% do PIB brasileiro, enquanto a carga tributária do ITCMD representou apenas R\$ 12.874.000.000,00 (doze bilhões, oitocentos e setenta e quatro milhões de reais), equivalente a 0,13% do PIB e 0,38% da carga tributária brasileira. Os números revelam que a tributação da herança no Brasil é pouco significativa, o que estimula a concentração de riqueza e agrava a desigualdade social.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a tributação sobre heranças no Brasil, comparando-a com a prática de outros países.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	O ITCMD é um imposto de competência estadual, com alíquota máxima de 8% definida na Resolução do Senado Federal nº 9, de 1992. Relativamente às alíquotas aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 21), que é constitucional a fixação de alíquotas progressivas para o ITCMD. Atualmente, muitos Estados utilizam a alíquota máxima de 8%. Esse é o caso dos Estados da Bahia (Lei nº 4.826/1989), Pernambuco (Lei nº 13.974/2009), Ceará (Lei nº 15.812/2015), Rio de Janeiro (Lei nº 7.174/2015), Santa Catarina (Lei nº 13.136/2004) e Mato Grosso (Lei nº 7.850/2002), entre outros. Na contramão desse movimento de tributação das heranças com alíquotas progressivas alcançando o percentual máximo de 8%, o Estado de São Paulo utiliza a alíquota de 4%, sendo que esteve perto de ter as suas alíquotas reduzidas para 1% em casos de herança, uma vez que o PL 511/2020 foi aprovado pela ALESP, mas vetado pelo Governador do Estado de São Paulo, sob a justificativa de que a renúncia de receita estaria desacompanhada de estudo de impacto orçamentário financeiro exigido pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As baixas alíquotas praticadas pelos Estados brasileiros, destoam das alíquotas praticadas por países desenvolvidos para tributação de ascendentes ou descendentes do de cujus. A título de exemplo, veja-se o caso da França (45%), Alemanha (30%), Estados Unidos (40%), Japão (55%), Reino Unido (36%), Espanha (32%) e Bélgica (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre heranças no Brasil, em comparação com a praticada em Países desenvolvidos, é pouco significativa, criando um cenário de desigualdade, uma vez que a riqueza herdada é tributada de forma muito mais branda do que aquela produzida pelo trabalho. Nesse sentido, a OCDE sugere a elevação de alíquotas do ITCMD que se apresenta como instrumento capaz de aumentar a igualdade de oportunidades, decompor a concentração de riqueza e nivelar as condições de concorrência entre indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ERNST (#38) YOUNG. Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62">https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62</a> Acesso em 09/10/2023. OECD. Inheritance Taxation in OECD Countries. OECD Tax Policy Studies nº 28, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62">https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62</a> Acesso em 09/10/2023. PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14385	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5212073 - MARIA PAULA BRASIL LUZ CHAVES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Tributação da herança no Brasil e no Direito Comparado			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, incide sobre as heranças o ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. De acordo com relatório divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária brasileira em 2022 representou R\$ 3.342.093.000.000,00 (três trilhões, trezentos e quarenta e dois bilhões, noventa e três milhões de reais), equivalente a 33,71% do PIB brasileiro, enquanto a carga tributária do ITCMD representou apenas R\$ 12.874.000.000,00 (doze bilhões, oitocentos e setenta e quatro milhões de reais), equivalente a 0,13% do PIB e 0,38% da carga tributária brasileira. Os números revelam que a tributação da herança no Brasil é pouco significativa, o que estimula a concentração de riqueza e agrava a desigualdade social.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a tributação sobre heranças no Brasil, comparando-a com a prática de outros países.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	O ITCMD é um imposto de competência estadual, com alíquota máxima de 8% definida na Resolução do Senado Federal nº 9, de 1992. Relativamente às alíquotas aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 21), que é constitucional a fixação de alíquotas progressivas para o ITCMD. Atualmente, muitos Estados utilizam a alíquota máxima de 8%. Esse é o caso dos Estados da Bahia (Lei nº 4.826/1989), Pernambuco (Lei nº 13.974/2009), Ceará (Lei nº 15.812/2015), Rio de Janeiro (Lei nº 7.174/2015), Santa Catarina (Lei nº 13.136/2004) e Mato Grosso (Lei nº 7.850/2002), entre outros. Na contramão desse movimento de tributação das heranças com alíquotas progressivas alcançando o percentual máximo de 8%, o Estado de São Paulo utiliza a alíquota de 4%, sendo que esteve perto de ter as suas alíquotas reduzidas para 1% em casos de herança, uma vez que o PL 511/2020 foi aprovado pela ALESP, mas vetado pelo Governador do Estado de São Paulo, sob a justificativa de que a renúncia de receita estaria desacompanhada de estudo de impacto orçamentário financeiro exigido pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As baixas alíquotas praticadas pelos Estados brasileiros, destoam das alíquotas praticadas por países desenvolvidos para tributação de ascendentes ou descendentes do de cujus. A título de exemplo, veja-se o caso da França (45%), Alemanha (30%), Estados Unidos (40%), Japão (55%), Reino Unido (36%), Espanha (32%) e Bélgica (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre heranças no Brasil, em comparação com a praticada em Países desenvolvidos, é pouco significativa, criando um cenário de desigualdade, uma vez que a riqueza herdada é tributada de forma muito mais branda do que aquela produzida pelo trabalho. Nesse sentido, a OCDE sugere a elevação de alíquotas do ITCMD que se apresenta como instrumento capaz de aumentar a igualdade de oportunidades, decompor a concentração de riqueza e nivelar as condições de concorrência entre indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ERNST (#38) YOUNG. Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62">https://www.ey.com/en_br/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide/#62</a> Acesso em 09/10/2023. OECD. Inheritance Taxation in OECD Countries. OECD Tax Policy Studies nº 28, 2021. Disponível em: (#60) <a href="https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62">https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en/#62</a> Acesso em 09/10/2023. PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14386	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3885607 - MEIRE MARIA JULIÃO CAMPOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero			
<b>INTRODUCAO</b>	A justiça fiscal deve ser promovida nas duas pontas da política fiscal. Na ponta da aplicação, por meio de gastos públicos, com fornecimento de bens, serviços e transferências. No entanto, não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível a gênero e raça, sem colocar em debate a política tributária, com a análise da forma adotada pelo Estado para arrecadação das receitas necessárias para o financiamento das despesas públicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar e compreender como o sistema tributário pode contribuir para as disparidades socioeconômicas entre diferentes grupos, com foco nas variáveis de gênero e raça. Serão analisadas as estruturas das desigualdades, identificando possíveis padrões de discriminação, a equidade fiscal como um princípio central para garantir a justiça social, e como as políticas tributárias atuais afetam as populações de forma desigual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho. Desigualdade social e desigualdades de gênero e raça são indissociáveis. Ana Bottega, com base em dados coletados a partir de da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela RFB, constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras e composto por 60,7%. Por outro lado, analisando o decil mais rico, percebe-se que essa camada da população é composta por 30% de pessoas negras, sendo apenas 10% o número de mulheres negras. Essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais disso, relativamente à questão de gênero, o sistema tributário apresenta outras distorções, como a tributação produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário serve às estruturas de dominação de gênero e raça. Nesse sentido é fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para romper o sistema patriarcal e racista. É essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar um papel vital na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em: (#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça: Como o sistema tributário discrimina as mulheres na tributação sobre os produtos ligados ao cuidado e à fisiologia feminina. Belo Horizonte: Letramento, 2023. SANTOS, Maria Angélica dos. Tributação e Raça Fabulações Tributárias: Uma imersão na teoria racial crítica do direito tributário. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14386	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4376749 - CRISTIANE ABRANCHES OKUBO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero			
<b>INTRODUCAO</b>	A justiça fiscal deve ser promovida nas duas pontas da política fiscal. Na ponta da aplicação, por meio de gastos públicos, com fornecimento de bens, serviços e transferências. No entanto, não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível a gênero e raça, sem colocar em debate a política tributária, com a análise da forma adotada pelo Estado para arrecadação das receitas necessárias para o financiamento das despesas públicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar e compreender como o sistema tributário pode contribuir para as disparidades socioeconômicas entre diferentes grupos, com foco nas variáveis de gênero e raça. Serão analisadas as estruturas das desigualdades, identificando possíveis padrões de discriminação, a equidade fiscal como um princípio central para garantir a justiça social, e como as políticas tributárias atuais afetam as populações de forma desigual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho. Desigualdade social e desigualdades de gênero e raça são indissociáveis. Ana Bottega, com base em dados coletados a partir de da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela RFB, constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras e composto por 60,7%. Por outro lado, analisando o decil mais rico, percebe-se que essa camada da população é composta por 30% de pessoas negras, sendo apenas 10% o número de mulheres negras. Essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais disso, relativamente à questão de gênero, o sistema tributário apresenta outras distorções, como a tributação produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário serve às estruturas de dominação de gênero e raça. Nesse sentido é fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para romper o sistema patriarcal e racista. É essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar um papel vital na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em: (#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça: Como o sistema tributário discrimina as mulheres na tributação sobre os produtos ligados ao cuidado e à fisiologia feminina. Belo Horizonte: Letramento, 2023. SANTOS, Maria Angélica dos. Tributação e Raça Fabulações Tributárias: Uma imersão na teoria racial crítica do direito tributário. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14386	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4389093 - WALTER MARINHO DE ARAUJO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero			
<b>INTRODUCAO</b>	A justiça fiscal deve ser promovida nas duas pontas da política fiscal. Na ponta da aplicação, por meio de gastos públicos, com fornecimento de bens, serviços e transferências. No entanto, não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível a gênero e raça, sem colocar em debate a política tributária, com a análise da forma adotada pelo Estado para arrecadação das receitas necessárias para o financiamento das despesas públicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar e compreender como o sistema tributário pode contribuir para as disparidades socioeconômicas entre diferentes grupos, com foco nas variáveis de gênero e raça. Serão analisadas as estruturas das desigualdades, identificando possíveis padrões de discriminação, a equidade fiscal como um princípio central para garantir a justiça social, e como as políticas tributárias atuais afetam as populações de forma desigual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho. Desigualdade social e desigualdades de gênero e raça são indissociáveis. Ana Bottega, com base em dados coletados a partir de da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela RFB, constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras e composto por 60,7%. Por outro lado, analisando o decil mais rico, percebe-se que essa camada da população é composta por 30% de pessoas negras, sendo apenas 10% o número de mulheres negras. Essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais disso, relativamente à questão de gênero, o sistema tributário apresenta outras distorções, como a tributação produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário serve às estruturas de dominação de gênero e raça. Nesse sentido é fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para romper o sistema patriarcal e racista. É essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar um papel vital na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça: Como o sistema tributário discrimina as mulheres na tributação sobre os produtos ligados ao cuidado e à fisiologia feminina. Belo Horizonte: Letramento, 2023. SANTOS, Maria Angélica dos. Tributação e Raça Fabulações Tributárias: Uma imersão na teoria racial crítica do direito tributário. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14386	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5031885 - SUELY REGINA LIMA SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero			
<b>INTRODUCAO</b>	A justiça fiscal deve ser promovida nas duas pontas da política fiscal. Na ponta da aplicação, por meio de gastos públicos, com fornecimento de bens, serviços e transferências. No entanto, não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível a gênero e raça, sem colocar em debate a política tributária, com a análise da forma adotada pelo Estado para arrecadação das receitas necessárias para o financiamento das despesas públicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar e compreender como o sistema tributário pode contribuir para as disparidades socioeconômicas entre diferentes grupos, com foco nas variáveis de gênero e raça. Serão analisadas as estruturas das desigualdades, identificando possíveis padrões de discriminação, a equidade fiscal como um princípio central para garantir a justiça social, e como as políticas tributárias atuais afetam as populações de forma desigual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho. Desigualdade social e desigualdades de gênero e raça são indissociáveis. Ana Bottega, com base em dados coletados a partir de da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela RFB, constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras e composto por 60,7%. Por outro lado, analisando o decil mais rico, percebe-se que essa camada da população é composta por 30% de pessoas negras, sendo apenas 10% o número de mulheres negras. Essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais disso, relativamente à questão de gênero, o sistema tributário apresenta outras distorções, como a tributação produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário serve às estruturas de dominação de gênero e raça. Nesse sentido é fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para romper o sistema patriarcal e racista. É essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar um papel vital na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça: Como o sistema tributário discrimina as mulheres na tributação sobre os produtos ligados ao cuidado e à fisiologia feminina. Belo Horizonte: Letramento, 2023. SANTOS, Maria Angélica dos. Tributação e Raça Fabulações Tributárias: Uma imersão na teoria racial crítica do direito tributário. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14386	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5070139 - MAYSA FILGUEIRA HOFFMANN		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero			
<b>INTRODUCAO</b>	A justiça fiscal deve ser promovida nas duas pontas da política fiscal. Na ponta da aplicação, por meio de gastos públicos, com fornecimento de bens, serviços e transferências. No entanto, não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível a gênero e raça, sem colocar em debate a política tributária, com a análise da forma adotada pelo Estado para arrecadação das receitas necessárias para o financiamento das despesas públicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar e compreender como o sistema tributário pode contribuir para as disparidades socioeconômicas entre diferentes grupos, com foco nas variáveis de gênero e raça. Serão analisadas as estruturas das desigualdades, identificando possíveis padrões de discriminação, a equidade fiscal como um princípio central para garantir a justiça social, e como as políticas tributárias atuais afetam as populações de forma desigual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho. Desigualdade social e desigualdades de gênero e raça são indissociáveis. Ana Bottega, com base em dados coletados a partir de da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela RFB, constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras e composto por 60,7%. Por outro lado, analisando o decil mais rico, percebe-se que essa camada da população é composta por 30% de pessoas negras, sendo apenas 10% o número de mulheres negras. Essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais disso, relativamente à questão de gênero, o sistema tributário apresenta outras distorções, como a tributação produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário serve às estruturas de dominação de gênero e raça. Nesse sentido é fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para romper o sistema patriarcal e racista. É essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar um papel vital na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, consequentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em: (#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça: Como o sistema tributário discrimina as mulheres na tributação sobre os produtos ligados ao cuidado e à fisiologia feminina. Belo Horizonte: Letramento, 2023. SANTOS, Maria Angélica dos. Tributação e Raça Fabulações Tributárias: Uma imersão na teoria racial crítica do direito tributário. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14386	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5115272 - MARIANA SOUSA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A justiça fiscal deve ser promovida nas duas pontas da política fiscal. Na ponta da aplicação, por meio de gastos públicos, com fornecimento de bens, serviços e transferências. No entanto, não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível a gênero e raça, sem colocar em debate a política tributária, com a análise da forma adotada pelo Estado para arrecadação das receitas necessárias para o financiamento das despesas públicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar e compreender como o sistema tributário pode contribuir para as disparidades socioeconômicas entre diferentes grupos, com foco nas variáveis de gênero e raça. Serão analisadas as estruturas das desigualdades, identificando possíveis padrões de discriminação, a equidade fiscal como um princípio central para garantir a justiça social, e como as políticas tributárias atuais afetam as populações de forma desigual.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho. Desigualdade social e desigualdades de gênero e raça são indissociáveis. Ana Bottega, com base em dados coletados a partir de da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela RFB, constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras e composto por 60,7%. Por outro lado, analisando o decil mais rico, percebe-se que essa camada da população é composta por 30% de pessoas negras, sendo apenas 10% o número de mulheres negras. Essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais disso, relativamente à questão de gênero, o sistema tributário apresenta outras distorções, como a tributação produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O sistema tributário serve às estruturas de dominação de gênero e raça. Nesse sentido é fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para romper o sistema patriarcal e racista. É essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar um papel vital na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em: (#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça: Como o sistema tributário discrimina as mulheres na tributação sobre os produtos ligados ao cuidado e à fisiologia feminina. Belo Horizonte: Letramento, 2023. SANTOS, Maria Angélica dos. Tributação e Raça Fabulações Tributárias: Uma imersão na teoria racial crítica do direito tributário. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14387	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		1332597 - CATARINA MOLISANI SORBARA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se discute sobre as distorções provocadas pelo sistema tributário brasileiro, que agravam o problema da desigualdade. Recente estudo publicado pela OXFAM concluiu que a tributação no Brasil favorece os mais ricos, permitindo acúmulo de riquezas, enquanto onera os mais pobres em maior proporção. É sabido que tramita perante o Senado Federal, texto substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças propostas pela PEC 45/2019 são suficientes para promover uma reforma tributária justa, inclusiva e solidária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao se analisar o substitutivo da PEC 45/2019, aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados e encaminhado para apreciação do Senado, é possível perceber que poucas são as alterações tendentes a reduzir a desigualdade provocada pelo sistema tributário. Pode-se afirmar que a proposta tem como principal objetivo a simplificação da complexidade do Direito Tributário, com a extinção de cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins) e a criação de três (IBS, CBS e imposto seletivo sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, algumas alterações estão sendo promovidas visando a correção de algumas distorções. É o caso da autorização expressa da incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. Medida necessária para correção do equívoco interpretativo praticado pelo Supremo Tribunal Federal ao preferir acórdão no RE 255.111, a previsão de devolução da CBS e do IBS a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda e a redução de alíquotas da CBS e IBS em 60% para bens e serviços considerados essenciais.			
<b>CONCLUSOES</b>	A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional não enfrenta problemas provocados pelo sistema tributário. Mesmo que aprovada, a carga tributária brasileira continuará concentrada na tributação sobre bens e serviços. Por mais que as medidas adotadas sejam interessantes no sentido de mitigar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo, não há uma perspectiva de mudança substancial nas estruturas do sistema tributário, que continuará favorecendo os super-ricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater a PEC nº 45/2019. Disponível em (#60) <a href="https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62">https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> . Acesso em 11 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14387	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4020651 - EMERSON APARECIDO MACEDO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se discute sobre as distorções provocadas pelo sistema tributário brasileiro, que agravam o problema da desigualdade. Recente estudo publicado pela OXFAM concluiu que a tributação no Brasil favorece os mais ricos, permitindo acúmulo de riquezas, enquanto onera os mais pobres em maior proporção. É sabido que tramita perante o Senado Federal, texto substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças propostas pela PEC 45/2019 são suficientes para promover uma reforma tributária justa, inclusiva e solidária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao se analisar o substitutivo da PEC 45/2019, aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados e encaminhado para apreciação do Senado, é possível perceber que poucas são as alterações tendentes a reduzir a desigualdade provocada pelo sistema tributário. Pode-se afirmar que a proposta tem como principal objetivo a simplificação da complexidade do Direito Tributário, com a extinção de cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins) e a criação de três (IBS, CBS e imposto seletivo sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, algumas alterações estão sendo promovidas visando a correção de algumas distorções. É o caso da autorização expressa da incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. Medida necessária para correção do equívoco interpretativo praticado pelo Supremo Tribunal Federal ao proferir acórdão no RE 255.111, a previsão de devolução da CBS e do IBS a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda e a redução de alíquotas da CBS e IBS em 60% para bens e serviços considerados essenciais.			
<b>CONCLUSOES</b>	A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional não enfrenta problemas provocados pelo sistema tributário. Mesmo que aprovada, a carga tributária brasileira continuará concentrada na tributação sobre bens e serviços. Por mais que as medidas adotadas sejam interessantes no sentido de mitigar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo, não há uma perspectiva de mudança substancial nas estruturas do sistema tributário, que continuará favorecendo os super-ricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater a PEC nº 45/2019. Disponível em (#60) <a href="https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62">https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> . Acesso em 11 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14387	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4538749 - ROSANGELA APARECIDA DOS REIS MACHADO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se discute sobre as distorções provocadas pelo sistema tributário brasileiro, que agravam o problema da desigualdade. Recente estudo publicado pela OXFAM concluiu que a tributação no Brasil favorece os mais ricos, permitindo acúmulo de riquezas, enquanto onera os mais pobres em maior proporção. É sabido que tramita perante o Senado Federal, texto substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças propostas pela PEC 45/2019 são suficientes para promover uma reforma tributária justa, inclusiva e solidária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao se analisar o substitutivo da PEC 45/2019, aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados e encaminhado para apreciação do Senado, é possível perceber que poucas são as alterações tendentes a reduzir a desigualdade provocada pelo sistema tributário. Pode-se afirmar que a proposta tem como principal objetivo a simplificação da complexidade do Direito Tributário, com a extinção de cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins) e a criação de três (IBS, CBS e imposto seletivo sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, algumas alterações estão sendo promovidas visando a correção de algumas distorções. É o caso da autorização expressa da incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. Medida necessária para correção do equívoco interpretativo praticado pelo Supremo Tribunal Federal ao proferir acórdão no RE 255.111, a previsão de devolução da CBS e do IBS a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda e a redução de alíquotas da CBS e IBS em 60% para bens e serviços considerados essenciais.			
<b>CONCLUSOES</b>	A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional não enfrenta problemas provocados pelo sistema tributário. Mesmo que aprovada, a carga tributária brasileira continuará concentrada na tributação sobre bens e serviços. Por mais que as medidas adotadas sejam interessantes no sentido de mitigar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo, não há uma perspectiva de mudança substancial nas estruturas do sistema tributário, que continuará favorecendo os super-ricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater a PEC nº 45/2019. Disponível em (#60) <a href="https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62">https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> . Acesso em 11 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14387	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4544901 - ROBERTA DOS SANTOS PAOLI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se discute sobre as distorções provocadas pelo sistema tributário brasileiro, que agravam o problema da desigualdade. Recente estudo publicado pela OXFAM concluiu que a tributação no Brasil favorece os mais ricos, permitindo acúmulo de riquezas, enquanto onera os mais pobres em maior proporção. É sabido que tramita perante o Senado Federal, texto substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças propostas pela PEC 45/2019 são suficientes para promover uma reforma tributária justa, inclusiva e solidária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao se analisar o substitutivo da PEC 45/2019, aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados e encaminhado para apreciação do Senado, é possível perceber que poucas são as alterações tendentes a reduzir a desigualdade provocada pelo sistema tributário. Pode-se afirmar que a proposta tem como principal objetivo a simplificação da complexidade do Direito Tributário, com a extinção de cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins) e a criação de três (IBS, CBS e imposto seletivo sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, algumas alterações estão sendo promovidas visando a correção de algumas distorções. É o caso da autorização expressa da incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. Medida necessária para correção do equívoco interpretativo praticado pelo Supremo Tribunal Federal ao preferir acórdão no RE 255.111, a previsão de devolução da CBS e do IBS a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda e a redução de alíquotas da CBS e IBS em 60% para bens e serviços considerados essenciais.			
<b>CONCLUSOES</b>	A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional não enfrenta problemas provocados pelo sistema tributário. Mesmo que aprovada, a carga tributária brasileira continuará concentrada na tributação sobre bens e serviços. Por mais que as medidas adotadas sejam interessantes no sentido de mitigar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo, não há uma perspectiva de mudança substancial nas estruturas do sistema tributário, que continuará favorecendo os super-ricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater a PEC nº 45/2019. Disponível em (#60) <a href="https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62">https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> . Acesso em 11 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14387	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4726324 - SAMIRA DEODATO DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se discute sobre as distorções provocadas pelo sistema tributário brasileiro, que agravam o problema da desigualdade. Recente estudo publicado pela OXFAM concluiu que a tributação no Brasil favorece os mais ricos, permitindo acúmulo de riquezas, enquanto onera os mais pobres em maior proporção. É sabido que tramita perante o Senado Federal, texto substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças propostas pela PEC 45/2019 são suficientes para promover uma reforma tributária justa, inclusiva e solidária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao se analisar o substitutivo da PEC 45/2019, aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados e encaminhado para apreciação do Senado, é possível perceber que poucas são as alterações tendentes a reduzir a desigualdade provocada pelo sistema tributário. Pode-se afirmar que a proposta tem como principal objetivo a simplificação da complexidade do Direito Tributário, com a extinção de cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins) e a criação de três (IBS, CBS e imposto seletivo sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, algumas alterações estão sendo promovidas visando a correção de algumas distorções. É o caso da autorização expressa da incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. Medida necessária para correção do equívoco interpretativo praticado pelo Supremo Tribunal Federal ao proferir acórdão no RE 255.111, a previsão de devolução da CBS e do IBS a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda e a redução de alíquotas da CBS e IBS em 60% para bens e serviços considerados essenciais.			
<b>CONCLUSOES</b>	A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional não enfrenta problemas provocados pelo sistema tributário. Mesmo que aprovada, a carga tributária brasileira continuará concentrada na tributação sobre bens e serviços. Por mais que as medidas adotadas sejam interessantes no sentido de mitigar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo, não há uma perspectiva de mudança substancial nas estruturas do sistema tributário, que continuará favorecendo os super-ricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater a PEC nº 45/2019. Disponível em (#60) <a href="https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62">https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> . Acesso em 11 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14387	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5062110 - GABRIEL DA SILVA WICK		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019			
<b>INTRODUCAO</b>	Muito se discute sobre as distorções provocadas pelo sistema tributário brasileiro, que agravam o problema da desigualdade. Recente estudo publicado pela OXFAM concluiu que a tributação no Brasil favorece os mais ricos, permitindo acúmulo de riquezas, enquanto onera os mais pobres em maior proporção. É sabido que tramita perante o Senado Federal, texto substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças propostas pela PEC 45/2019 são suficientes para promover uma reforma tributária justa, inclusiva e solidária.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao se analisar o substitutivo da PEC 45/2019, aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados e encaminhado para apreciação do Senado, é possível perceber que poucas são as alterações tendentes a reduzir a desigualdade provocada pelo sistema tributário. Pode-se afirmar que a proposta tem como principal objetivo a simplificação da complexidade do Direito Tributário, com a extinção de cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins) e a criação de três (IBS, CBS e imposto seletivo sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, algumas alterações estão sendo promovidas visando a correção de algumas distorções. É o caso da autorização expressa da incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. Medida necessária para correção do equívoco interpretativo praticado pelo Supremo Tribunal Federal ao proferir acórdão no RE 255.111, a previsão de devolução da CBS e do IBS a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda e a redução de alíquotas da CBS e IBS em 60% para bens e serviços considerados essenciais.			
<b>CONCLUSOES</b>	A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional não enfrenta problemas provocados pelo sistema tributário. Mesmo que aprovada, a carga tributária brasileira continuará concentrada na tributação sobre bens e serviços. Por mais que as medidas adotadas sejam interessantes no sentido de mitigar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo, não há uma perspectiva de mudança substancial nas estruturas do sistema tributário, que continuará favorecendo os super-ricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório do Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater a PEC nº 45/2019. Disponível em (#60) <a href="https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62">https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria/propostas/#62</a> Acesso em 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccf.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. (internet). Brasil. 2017. Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf">https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf</a> . Acesso em 11 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14388	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4356357 - PAMELA DE ATAIDE DOMINGUES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		MAÍRA VUCOVIX FIRMINO
<b>TITULO</b>	O IPTU progressivo no tempo e a garantia da função social da propriedade			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O direito à propriedade é um dos cinco direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, ao lado do direito à vida, igualdade, liberdade e segurança. No entanto, o direito à propriedade está longe de ser um direito absoluto não podendo ser considerado sem um elemento a ele indissociável, qual seja, a função social da propriedade. Essa é a conclusão que se obtém da leitura do art. 5º, XXIII e art. 170, III, ambos da Constituição Federal. Porém, de acordo com levantamentos realizados pela Fio Assessoria Técnica Popular (2022), "mais de 41% da população urbana do Brasil vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados. Em São Paulo, esse número é de 23,7% e são 31.884 pessoas em situação de rua na capital paulista. Por outro lado, a cidade possui ao todo 595.961 edifícios vazios sendo 19.867 desses localizados no distrito da Sé, região central com acesso à infraestrutura, transporte e serviços" (P. 19). Os dados são alarmantes e revelam a falta de efetividade do princípio da função social da propriedade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o IPTU progressivo no tempo como mecanismo de efetividade da função social da propriedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O IPTU progressivo no tempo está previsto no art. 182, §4º, da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (2001) como uma das ferramentas voltadas a induzir o cumprimento da função social da propriedade. Trata-se da captura da valorização territorial por meio de notificações a proprietários de imóveis não utilizados, subutilizados ou não edificados para parcelamento, edificação ou utilização compulsória dentro de prazos legais. Após o decurso do prazo, com o não atendimento da notificação, o IPTU progressivo no tempo passa a ser exigido pelo prazo de 5 anos, com alíquotas que chegam ao dobro do exigido no ano anterior, podendo alcançar a alíquota máxima de 15%. Teoricamente, após o prazo de cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, haveria previsão para desapropriação do imóvel em títulos da dívida pública, mas como a emissão desses títulos depende da autorização do Senado Federal, não há notícias de que o Município de São Paulo tenha colocado em prática essa última medida. Ainda assim, o IPTU progressivo no tempo pode continuar a ser cobrado, onerando os proprietários de imóveis com dívidas que algum dia ultrapassarão o valor do imóvel, o que permitiria adjudicação do bem em sede de execuções fiscais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O IPTU progressivo no tempo, junto com outros instrumentos regulamentadores de questões urbanas e fundiárias, contribui para a garantia do direito à cidade, promoção da justiça socioespacial e garantia do direito à moradia condigna e pela construção da cidadania.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade: Igualdade e Capacidade Contributiva, 2 ed. São Paulo, Quartier Latin: 2015. Melo, José Eduardo Soares de. IPTU/ITR: Teoria e Prática. 3 ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora: 2020. ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR; MSTC. A Prática em movimento. Editores Álvaro Roberto de Lara Júnior [et al], São Paulo: 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14388	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4403495 - YASMIN MARTINS DE FREITAS DO AMARAL		2 - Aprovado
				<b>Apresentação</b>
				0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		MAÍRA VUCOVIX FIRMINO
<b>TITULO</b>	O IPTU progressivo no tempo e a garantia da função social da propriedade			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O direito à propriedade é um dos cinco direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, ao lado do direito à vida, igualdade, liberdade e segurança. No entanto, o direito à propriedade está longe de ser um direito absoluto não podendo ser considerado sem um elemento a ele indissociável, qual seja, a função social da propriedade. Essa é a conclusão que se obtém da leitura do art. 5º, XXIII e art. 170, III, ambos da Constituição Federal. Porém, de acordo com levantamentos realizados pela Fio Assessoria Técnica Popular (2022), "mais de 41% da população urbana do Brasil vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados. Em São Paulo, esse número é de 23,7% e são 31.884 pessoas em situação de rua na capital paulista. Por outro lado, a cidade possui ao todo 595.961 edifícios vazios sendo 19.867 desses localizados no distrito da Sé, região central com acesso à infraestrutura, transporte e serviços" (P. 19). Os dados são alarmantes e revelam a falta de efetividade do princípio da função social da propriedade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o IPTU progressivo no tempo como mecanismo de efetividade da função social da propriedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O IPTU progressivo no tempo está previsto no art. 182, §4º, da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (2001) como uma das ferramentas voltadas a induzir o cumprimento da função social da propriedade. Trata-se da captura da valorização territorial por meio de notificações a proprietários de imóveis não utilizados, subutilizados ou não edificados para parcelamento, edificação ou utilização compulsória dentro de prazos legais. Após o decurso do prazo, com o não atendimento da notificação, o IPTU progressivo no tempo passa a ser exigido pelo prazo de 5 anos, com alíquotas que chegam ao dobro do exigido no ano anterior, podendo alcançar a alíquota máxima de 15%. Teoricamente, após o prazo de cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, haveria previsão para desapropriação do imóvel em títulos da dívida pública, mas como a emissão desses títulos depende da autorização do Senado Federal, não há notícias de que o Município de São Paulo tenha colocado em prática essa última medida. Ainda assim, o IPTU progressivo no tempo pode continuar a ser cobrado, onerando os proprietários de imóveis com dívidas que algum dia ultrapassarão o valor do imóvel, o que permitiria adjudicação do bem em sede de execuções fiscais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O IPTU progressivo no tempo, junto com outros instrumentos regulamentadores de questões urbanas e fundiárias, contribui para a garantia do direito à cidade, promoção da justiça socioespacial e garantia do direito à moradia condigna e pela construção da cidadania.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade: Igualdade e Capacidade Contributiva. 2 ed. São Paulo, Quartier Latin: 2015. Melo, José Eduardo Soares de. IPTU/ITR: Teoria e Prática. 3 ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora: 2020. ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR; MSTC. A Prática em movimento. Editores Álvaro Roberto de Lara Júnior [et al], São Paulo: 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14388	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4409108 - JULIA GARCEZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		MAÍRA VUCOVIX FIRMINO
<b>TITULO</b>	O IPTU progressivo no tempo e a garantia da função social da propriedade			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O direito à propriedade é um dos cinco direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, ao lado do direito à vida, igualdade, liberdade e segurança. No entanto, o direito à propriedade está longe de ser um direito absoluto não podendo ser considerado sem um elemento a ele indissociável, qual seja, a função social da propriedade. Essa é a conclusão que se obtém da leitura do art. 5º, XXIII e art. 170, III, ambos da Constituição Federal. Porém, de acordo com levantamentos realizados pela Fio Assessoria Técnica Popular (2022), "mais de 41% da população urbana do Brasil vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados. Em São Paulo, esse número é de 23,7% e são 31.884 pessoas em situação de rua na capital paulista. Por outro lado, a cidade possui ao todo 595.961 edifícios vazios sendo 19.867 desses localizados no distrito da Sé, região central com acesso à infraestrutura, transporte e serviços" (P. 19). Os dados são alarmantes e revelam a falta de efetividade do princípio da função social da propriedade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o IPTU progressivo no tempo como mecanismo de efetividade da função social da propriedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O IPTU progressivo no tempo está previsto no art. 182, §4º, da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (2001) como uma das ferramentas voltadas a induzir o cumprimento da função social da propriedade. Trata-se da captura da valorização territorial por meio de notificações a proprietários de imóveis não utilizados, subutilizados ou não edificados para parcelamento, edificação ou utilização compulsória dentro de prazos legais. Após o decurso do prazo, com o não atendimento da notificação, o IPTU progressivo no tempo passa a ser exigido pelo prazo de 5 anos, com alíquotas que chegam ao dobro do exigido no ano anterior, podendo alcançar a alíquota máxima de 15%. Teoricamente, após o prazo de cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, haveria previsão para desapropriação do imóvel em títulos da dívida pública, mas como a emissão desses títulos depende da autorização do Senado Federal, não há notícias de que o Município de São Paulo tenha colocado em prática essa última medida. Ainda assim, o IPTU progressivo no tempo pode continuar a ser cobrado, onerando os proprietários de imóveis com dívidas que algum dia ultrapassarão o valor do imóvel, o que permitiria adjudicação do bem em sede de execuções fiscais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O IPTU progressivo no tempo, junto com outros instrumentos regulamentadores de questões urbanas e fundiárias, contribui para a garantia do direito à cidade, promoção da justiça socioespacial e garantia do direito à moradia condigna e pela construção da cidadania.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade: Igualdade e Capacidade Contributiva. 2 ed. São Paulo, Quartier Latin: 2015. Melo, José Eduardo Soares de. IPTU/ITR: Teoria e Prática. 3 ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora: 2020. ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR; MSTC. A Prática em movimento. Editores Álvaro Roberto de Lara Júnior [et al], São Paulo: 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14388	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4624823 - GIOVANNA MARIA DOS SANTOS MOURA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		MAÍRA VUCOVIX FIRMINO
<b>TITULO</b>	O IPTU progressivo no tempo e a garantia da função social da propriedade			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O direito à propriedade é um dos cinco direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, ao lado do direito à vida, igualdade, liberdade e segurança. No entanto, o direito à propriedade está longe de ser um direito absoluto não podendo ser considerado sem um elemento a ele indissociável, qual seja, a função social da propriedade. Essa é a conclusão que se obtém da leitura do art. 5º, XXIII e art. 170, III, ambos da Constituição Federal. Porém, de acordo com levantamentos realizados pela Fio Assessoria Técnica Popular (2022), "mais de 41% da população urbana do Brasil vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados. Em São Paulo, esse número é de 23,7% e são 31.884 pessoas em situação de rua na capital paulista. Por outro lado, a cidade possui ao todo 595.961 edifícios vazios sendo 19.867 desses localizados no distrito da Sé, região central com acesso à infraestrutura, transporte e serviços" (P. 19). Os dados são alarmantes e revelam a falta de efetividade do princípio da função social da propriedade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o IPTU progressivo no tempo como mecanismo de efetividade da função social da propriedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O IPTU progressivo no tempo está previsto no art. 182, §4º, da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (2001) como uma das ferramentas voltadas a induzir o cumprimento da função social da propriedade. Trata-se da captura da valorização territorial por meio de notificações a proprietários de imóveis não utilizados, subutilizados ou não edificados para parcelamento, edificação ou utilização compulsória dentro de prazos legais. Após o decurso do prazo, com o não atendimento da notificação, o IPTU progressivo no tempo passa a ser exigido pelo prazo de 5 anos, com alíquotas que chegam ao dobro do exigido no ano anterior, podendo alcançar a alíquota máxima de 15%. Teoricamente, após o prazo de cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, haveria previsão para desapropriação do imóvel em títulos da dívida pública, mas como a emissão desses títulos depende da autorização do Senado Federal, não há notícias de que o Município de São Paulo tenha colocado em prática essa última medida. Ainda assim, o IPTU progressivo no tempo pode continuar a ser cobrado, onerando os proprietários de imóveis com dívidas que algum dia ultrapassarão o valor do imóvel, o que permitiria adjudicação do bem em sede de execuções fiscais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O IPTU progressivo no tempo, junto com outros instrumentos regulamentadores de questões urbanas e fundiárias, contribui para a garantia do direito à cidade, promoção da justiça socioespacial e garantia do direito à moradia condigna e pela construção da cidadania.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade: Igualdade e Capacidade Contributiva. 2 ed. São Paulo, Quartier Latin: 2015. Melo, José Eduardo Soares de. IPTU/ITR: Teoria e Prática. 3 ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora: 2020. ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR; MSTC. A Prática em movimento. Editores Álvaro Roberto de Lara Júnior [et al], São Paulo: 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14388	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4774396 - LUANA FELIX SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		MAÍRA VUCOVIX FIRMINO
<b>TITULO</b>	O IPTU progressivo no tempo e a garantia da função social da propriedade			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O direito à propriedade é um dos cinco direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, ao lado do direito à vida, igualdade, liberdade e segurança. No entanto, o direito à propriedade está longe de ser um direito absoluto não podendo ser considerado sem um elemento a ele indissociável, qual seja, a função social da propriedade. Essa é a conclusão que se obtém da leitura do art. 5º, XXIII e art. 170, III, ambos da Constituição Federal. Porém, de acordo com levantamentos realizados pela Fio Assessoria Técnica Popular (2022), "mais de 41% da população urbana do Brasil vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados. Em São Paulo, esse número é de 23,7% e são 31.884 pessoas em situação de rua na capital paulista. Por outro lado, a cidade possui ao todo 595.961 edifícios vazios sendo 19.867 desses localizados no distrito da Sé, região central com acesso à infraestrutura, transporte e serviços" (P. 19). Os dados são alarmantes e revelam a falta de efetividade do princípio da função social da propriedade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o IPTU progressivo no tempo como mecanismo de efetividade da função social da propriedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O IPTU progressivo no tempo está previsto no art. 182, §4º, da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (2001) como uma das ferramentas voltadas a induzir o cumprimento da função social da propriedade. Trata-se da captura da valorização territorial por meio de notificações a proprietários de imóveis não utilizados, subutilizados ou não edificados para parcelamento, edificação ou utilização compulsória dentro de prazos legais. Após o decurso do prazo, com o não atendimento da notificação, o IPTU progressivo no tempo passa a ser exigido pelo prazo de 5 anos, com alíquotas que chegam ao dobro do exigido no ano anterior, podendo alcançar a alíquota máxima de 15%. Teoricamente, após o prazo de cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, haveria previsão para desapropriação do imóvel em títulos da dívida pública, mas como a emissão desses títulos depende da autorização do Senado Federal, não há notícias de que o Município de São Paulo tenha colocado em prática essa última medida. Ainda assim, o IPTU progressivo no tempo pode continuar a ser cobrado, onerando os proprietários de imóveis com dívidas que algum dia ultrapassarão o valor do imóvel, o que permitiria adjudicação do bem em sede de execuções fiscais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O IPTU progressivo no tempo, junto com outros instrumentos regulamentadores de questões urbanas e fundiárias, contribui para a garantia do direito à cidade, promoção da justiça socioespacial e garantia do direito à moradia condigna e pela construção da cidadania.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade: Igualdade e Capacidade Contributiva. 2 ed. São Paulo, Quartier Latin: 2015. Melo, José Eduardo Soares de. IPTU/ITR: Teoria e Prática. 3 ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora: 2020. ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR; MSTC. A Prática em movimento. Editores Álvaro Roberto de Lara Júnior [et al], São Paulo: 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14388	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5238536 - LUANA DA SILVA LIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		MAÍRA VUCOVIX FIRMINO
<b>TITULO</b>	O IPTU progressivo no tempo e a garantia da função social da propriedade			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O direito à propriedade é um dos cinco direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, ao lado do direito à vida, igualdade, liberdade e segurança. No entanto, o direito à propriedade está longe de ser um direito absoluto não podendo ser considerado sem um elemento a ele indissociável, qual seja, a função social da propriedade. Essa é a conclusão que se obtém da leitura do art. 5º, XXIII e art. 170, III, ambos da Constituição Federal. Porém, de acordo com levantamentos realizados pela Fio Assessoria Técnica Popular (2022), "mais de 41% da população urbana do Brasil vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados. Em São Paulo, esse número é de 23,7% e são 31.884 pessoas em situação de rua na capital paulista. Por outro lado, a cidade possui ao todo 595.961 edifícios vazios sendo 19.867 desses localizados no distrito da Sé, região central com acesso à infraestrutura, transporte e serviços" (P. 19). Os dados são alarmantes e revelam a falta de efetividade do princípio da função social da propriedade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é analisar o IPTU progressivo no tempo como mecanismo de efetividade da função social da propriedade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O IPTU progressivo no tempo está previsto no art. 182, §4º, da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (2001) como uma das ferramentas voltadas a induzir o cumprimento da função social da propriedade. Trata-se da captura da valorização territorial por meio de notificações a proprietários de imóveis não utilizados, subutilizados ou não edificados para parcelamento, edificação ou utilização compulsória dentro de prazos legais. Após o decurso do prazo, com o não atendimento da notificação, o IPTU progressivo no tempo passa a ser exigido pelo prazo de 5 anos, com alíquotas que chegam ao dobro do exigido no ano anterior, podendo alcançar a alíquota máxima de 15%. Teoricamente, após o prazo de cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, haveria previsão para desapropriação do imóvel em títulos da dívida pública, mas como a emissão desses títulos depende da autorização do Senado Federal, não há notícias de que o Município de São Paulo tenha colocado em prática essa última medida. Ainda assim, o IPTU progressivo no tempo pode continuar a ser cobrado, onerando os proprietários de imóveis com dívidas que algum dia ultrapassarão o valor do imóvel, o que permitiria adjudicação do bem em sede de execuções fiscais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O IPTU progressivo no tempo, junto com outros instrumentos regulamentadores de questões urbanas e fundiárias, contribui para a garantia do direito à cidade, promoção da justiça socioespacial e garantia do direito à moradia condigna e pela construção da cidadania.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade: Igualdade e Capacidade Contributiva, 2 ed. São Paulo, Quartier Latin: 2015. Melo, José Eduardo Soares de. IPTU/ITR: Teoria e Prática. 3 ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora: 2020. ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR; MSTC. A Prática em movimento. Editores Álvaro Roberto de Lara Júnior [et al], São Paulo: 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14389	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5170664 - PAULO VINICIUS AMBROSINO GOMES		2 - Aprovado
				<b>Apresentação</b>
				0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Progressividade do imposto de renda das pessoas físicas			
<b>INTRODUCAO</b>	O art. 153, §2º, I, da Constituição Federal, exige que o imposto de renda seja progressivo. A progressividade decorre da capacidade contributiva e permite a graduação do imposto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, com elevação das alíquotas à medida que cresce o montante tributável (base de cálculo). No plano infraconstitucional, a progressividade do IRPF está prevista no art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007, que estabelece a aplicação de cinco faixas de alíquotas (0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), sendo que a alíquota máxima já pode ser exigida sobre rendimentos mensais acima de R\$ 4.664,68.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a progressividade do IRPF e sua efetividade para promoção da justiça fiscal.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A progressividade do IRPF é meramente formal. Dentre os problemas identificados nesta pesquisa, destacam-se (i) a proximidade das faixas de alíquotas; (ii) a inexistência de alíquotas mais elevadas tais como aquelas aplicadas no direito comparado; e (iii) a falta de atualização da tabela progressiva do imposto de renda por índices de correção monetária. Sobre a proximidade das faixas, uma simples análise da tabela progressiva é capaz de revelar que a alíquota máxima de 27,5% já incide sobre rendimentos mensais superiores a R\$ 4.664,68. Ademais disso, verifica-se que as alíquotas de 7,5%, 15% e 22,5% incidem sobre rendimentos previstos em faixas de base de cálculo com intervalos que não ultrapassam a quantia de R\$ 1.000,00. Quanto à ausência de alíquotas mais elevadas, merece destaque a lição de Ricardo Lodi Ribeiro, segundo a qual: "Entre 81 países pesquisados, o Brasil é o 56º dentre as maiores alíquotas incidentes sobre as rendas das pessoas físicas, com 27,5% muito atrás dos países mais desenvolvidos. E o mais preocupante é que dentre os 70 países pesquisados que possuem teto para a alíquota mais alta, o Brasil ocupa a 11ª posição entre os limites mais baixos. É de fato uma progressividade para trabalhadores e não para os ricos." (RIBEIRO, 2015, p. 24). Constatou-se, também, que a tabela progressiva do IRPF não é atualizada desde 2015, o que compromete ainda mais o já falho sistema de progressividade do imposto de renda das pessoas físicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A progressividade de alíquotas no Brasil não é efetiva e deve ser revista para que a justiça fiscal seja alcançada. Novas faixas de alíquotas deveriam ser criadas para permitir a tributação de rendas mais elevadas, sendo imprescindível a atualização anual da tabela progressiva do IRPF.			
<b>REFERENCIAS</b>	COELHO, André Felipe Canuto; BORBA, Bruna Estima. "Progressividade do imposto de renda da pessoa física no brasil: realidade ou mito?". In: Revista Thesis Juris. v.6 n.6. p. 407-437. set./dez. 2017 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14389	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5209919 - ERIKA ESTEFANY GOMES CIRIACO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Progressividade do imposto de renda das pessoas físicas			
<b>INTRODUCAO</b>	O art. 153, §2º, I, da Constituição Federal, exige que o imposto de renda seja progressivo. A progressividade decorre da capacidade contributiva e permite a graduação do imposto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, com elevação das alíquotas à medida que cresce o montante tributável (base de cálculo). No plano infraconstitucional, a progressividade do IRPF está prevista no art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007, que estabelece a aplicação de cinco faixas de alíquotas (0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), sendo que a alíquota máxima já pode ser exigida sobre rendimentos mensais acima de R\$ 4.664,68.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a progressividade do IRPF e sua efetividade para promoção da justiça fiscal.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A progressividade do IRPF é meramente formal. Dentre os problemas identificados nesta pesquisa, destacam-se (i) a proximidade das faixas de alíquotas; (ii) a inexistência de alíquotas mais elevadas tais como aquelas aplicadas no direito comparado; e (iii) a falta de atualização da tabela progressiva do imposto de renda por índices de correção monetária. Sobre a proximidade das faixas, uma simples análise da tabela progressiva é capaz de revelar que a alíquota máxima de 27,5% já incide sobre rendimentos mensais superiores a R\$ 4.664,68. Ademais disso, verifica-se que as alíquotas de 7,5%, 15% e 22,5% incidem sobre rendimentos previstos em faixas de base de cálculo com intervalos que não ultrapassam a quantia de R\$ 1.000,00. Quanto à ausência de alíquotas mais elevadas, merece destaque a lição de Ricardo Lodi Ribeiro, segundo a qual: "Entre 81 países pesquisados, o Brasil é o 56º dentre as maiores alíquotas incidentes sobre as rendas das pessoas físicas, com 27,5% muito atrás dos países mais desenvolvidos. E o mais preocupante é que dentre os 70 países pesquisados que possuem teto para a alíquota mais alta, o Brasil ocupa a 11ª posição entre os limites mais baixos. É de fato uma progressividade para trabalhadores e não para os ricos." (RIBEIRO, 2015, p. 24). Constatou-se, também, que a tabela progressiva do IRPF não é atualizada desde 2015, o que compromete ainda mais o já falho sistema de progressividade do imposto de renda das pessoas físicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A progressividade de alíquotas no Brasil não é efetiva e deve ser revista para que a justiça fiscal seja alcançada. Novas faixas de alíquotas deveriam ser criadas para permitir a tributação de rendas mais elevadas, sendo imprescindível a atualização anual da tabela progressiva do IRPF.			
<b>REFERENCIAS</b>	COELHO, André Felipe Canuto; BORBA, Bruna Estima. "Progressividade do imposto de renda da pessoa física no brasil: realidade ou mito?". In: Revista Thesis Juris. v.6 n.6. p. 407-437. set./dez. 2017 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14389	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5230519 - DOUGLAS AUGUSTO MAXIMO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Progressividade do imposto de renda das pessoas físicas			
<b>INTRODUCAO</b>	O art. 153, §2º, I, da Constituição Federal, exige que o imposto de renda seja progressivo. A progressividade decorre da capacidade contributiva e permite a graduação do imposto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, com elevação das alíquotas à medida que cresce o montante tributável (base de cálculo). No plano infraconstitucional, a progressividade do IRPF está prevista no art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007, que estabelece a aplicação de cinco faixas de alíquotas (0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), sendo que a alíquota máxima já pode ser exigida sobre rendimentos mensais acima de R\$ 4.664,68.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a progressividade do IRPF e sua efetividade para promoção da justiça fiscal.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A progressividade do IRPF é meramente formal. Dentre os problemas identificados nesta pesquisa, destacam-se (i) a proximidade das faixas de alíquotas; (ii) a inexistência de alíquotas mais elevadas tais como aquelas aplicadas no direito comparado; e (iii) a falta de atualização da tabela progressiva do imposto de renda por índices de correção monetária. Sobre a proximidade das faixas, uma simples análise da tabela progressiva é capaz de revelar que a alíquota máxima de 27,5% já incide sobre rendimentos mensais superiores a R\$ 4.664,68. Ademais disso, verifica-se que as alíquotas de 7,5%, 15% e 22,5% incidem sobre rendimentos previstos em faixas de base de cálculo com intervalos que não ultrapassam a quantia de R\$ 1.000,00. Quanto à ausência de alíquotas mais elevadas, merece destaque a lição de Ricardo Lodi Ribeiro, segundo a qual: "Entre 81 países pesquisados, o Brasil é o 56º dentre as maiores alíquotas incidentes sobre as rendas das pessoas físicas, com 27,5% muito atrás dos países mais desenvolvidos. E o mais preocupante é que dentre os 70 países pesquisados que possuem teto para a alíquota mais alta, o Brasil ocupa a 11ª posição entre os limites mais baixos. É de fato uma progressividade para trabalhadores e não para os ricos." (RIBEIRO, 2015, p. 24). Constatou-se, também, que a tabela progressiva do IRPF não é atualizada desde 2015, o que compromete ainda mais o já falho sistema de progressividade do imposto de renda das pessoas físicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A progressividade de alíquotas no Brasil não é efetiva e deve ser revista para que a justiça fiscal seja alcançada. Novas faixas de alíquotas deveriam ser criadas para permitir a tributação de rendas mais elevadas, sendo imprescindível a atualização anual da tabela progressiva do IRPF.			
<b>REFERENCIAS</b>	COELHO, André Felipe Canuto; BORBA, Bruna Estima. "Progressividade do imposto de renda da pessoa física no brasil: realidade ou mito?". In: Revista Thesis Juris. v.6 n.6. p. 407-437. set./dez. 2017 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14389	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5231175 - LARISSA TAVARES DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Progressividade do imposto de renda das pessoas físicas			
<b>INTRODUCAO</b>	O art. 153, §2º, I, da Constituição Federal, exige que o imposto de renda seja progressivo. A progressividade decorre da capacidade contributiva e permite a graduação do imposto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, com elevação das alíquotas à medida que cresce o montante tributável (base de cálculo). No plano infraconstitucional, a progressividade do IRPF está prevista no art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007, que estabelece a aplicação de cinco faixas de alíquotas (0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), sendo que a alíquota máxima já pode ser exigida sobre rendimentos mensais acima de R\$ 4.664,68.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a progressividade do IRPF e sua efetividade para promoção da justiça fiscal.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A progressividade do IRPF é meramente formal. Dentre os problemas identificados nesta pesquisa, destacam-se (i) a proximidade das faixas de alíquotas; (ii) a inexistência de alíquotas mais elevadas tais como aquelas aplicadas no direito comparado; e (iii) a falta de atualização da tabela progressiva do imposto de renda por índices de correção monetária. Sobre a proximidade das faixas, uma simples análise da tabela progressiva é capaz de revelar que a alíquota máxima de 27,5% já incide sobre rendimentos mensais superiores a R\$ 4.664,68. Ademais disso, verifica-se que as alíquotas de 7,5%, 15% e 22,5% incidem sobre rendimentos previstos em faixas de base de cálculo com intervalos que não ultrapassam a quantia de R\$ 1.000,00. Quanto à ausência de alíquotas mais elevadas, merece destaque a lição de Ricardo Lodi Ribeiro, segundo a qual: "Entre 81 países pesquisados, o Brasil é o 56º dentre as maiores alíquotas incidentes sobre as rendas das pessoas físicas, com 27,5% muito atrás dos países mais desenvolvidos. E o mais preocupante é que dentre os 70 países pesquisados que possuem teto para a alíquota mais alta, o Brasil ocupa a 11ª posição entre os limites mais baixos. É de fato uma progressividade para trabalhadores e não para os ricos." (RIBEIRO, 2015, p. 24). Constatou-se, também, que a tabela progressiva do IRPF não é atualizada desde 2015, o que compromete ainda mais o já falho sistema de progressividade do imposto de renda das pessoas físicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A progressividade de alíquotas no Brasil não é efetiva e deve ser revista para que a justiça fiscal seja alcançada. Novas faixas de alíquotas deveriam ser criadas para permitir a tributação de rendas mais elevadas, sendo imprescindível a atualização anual da tabela progressiva do IRPF.			
<b>REFERENCIAS</b>	COELHO, André Felipe Canuto; BORBA, Bruna Estima. "Progressividade do imposto de renda da pessoa física no brasil: realidade ou mito?". In: Revista Thesis Juris. v.6 n.6. p. 407-437. set./dez. 2017 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14389	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5272807 - CAMILA GOMES DO NASCIMENTO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Progressividade do imposto de renda das pessoas físicas			
<b>INTRODUCAO</b>	O art. 153, §2º, I, da Constituição Federal, exige que o imposto de renda seja progressivo. A progressividade decorre da capacidade contributiva e permite a graduação do imposto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, com elevação das alíquotas à medida que cresce o montante tributável (base de cálculo). No plano infraconstitucional, a progressividade do IRPF está prevista no art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007, que estabelece a aplicação de cinco faixas de alíquotas (0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), sendo que a alíquota máxima já pode ser exigida sobre rendimentos mensais acima de R\$ 4.664,68.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a progressividade do IRPF e sua efetividade para promoção da justiça fiscal.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A progressividade do IRPF é meramente formal. Dentre os problemas identificados nesta pesquisa, destacam-se (i) a proximidade das faixas de alíquotas; (ii) a inexistência de alíquotas mais elevadas tais como aquelas aplicadas no direito comparado; e (iii) a falta de atualização da tabela progressiva do imposto de renda por índices de correção monetária. Sobre a proximidade das faixas, uma simples análise da tabela progressiva é capaz de revelar que a alíquota máxima de 27,5% já incide sobre rendimentos mensais superiores a R\$ 4.664,68. Ademais disso, verifica-se que as alíquotas de 7,5%, 15% e 22,5% incidem sobre rendimentos previstos em faixas de base de cálculo com intervalos que não ultrapassam a quantia de R\$ 1.000,00. Quanto à ausência de alíquotas mais elevadas, merece destaque a lição de Ricardo Lodi Ribeiro, segundo a qual: "Entre 81 países pesquisados, o Brasil é o 56º dentre as maiores alíquotas incidentes sobre as rendas das pessoas físicas, com 27,5% muito atrás dos países mais desenvolvidos. E o mais preocupante é que dentre os 70 países pesquisados que possuem teto para a alíquota mais alta, o Brasil ocupa a 11ª posição entre os limites mais baixos. É de fato uma progressividade para trabalhadores e não para os ricos." (RIBEIRO, 2015, p. 24). Constatou-se, também, que a tabela progressiva do IRPF não é atualizada desde 2015, o que compromete ainda mais o já falho sistema de progressividade do imposto de renda das pessoas físicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A progressividade de alíquotas no Brasil não é efetiva e deve ser revista para que a justiça fiscal seja alcançada. Novas faixas de alíquotas deveriam ser criadas para permitir a tributação de rendas mais elevadas, sendo imprescindível a atualização anual da tabela progressiva do IRPF.			
<b>REFERENCIAS</b>	COELHO, André Felipe Canuto; BORBA, Bruna Estima. "Progressividade do imposto de renda da pessoa física no brasil: realidade ou mito?". In: Revista Thesis Juris. v.6 n.6. p. 407-437. set./dez. 2017 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14389	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5280915 - JULIA GOMES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Progressividade do imposto de renda das pessoas físicas			
<b>INTRODUCAO</b>	O art. 153, §2º, I, da Constituição Federal, exige que o imposto de renda seja progressivo. A progressividade decorre da capacidade contributiva e permite a graduação do imposto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, com elevação das alíquotas à medida que cresce o montante tributável (base de cálculo). No plano infraconstitucional, a progressividade do IRPF está prevista no art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007, que estabelece a aplicação de cinco faixas de alíquotas (0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), sendo que a alíquota máxima já pode ser exigida sobre rendimentos mensais acima de R\$ 4.664,68.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a progressividade do IRPF e sua efetividade para promoção da justiça fiscal.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A progressividade do IRPF é meramente formal. Dentre os problemas identificados nesta pesquisa, destacam-se (i) a proximidade das faixas de alíquotas; (ii) a inexistência de alíquotas mais elevadas tais como aquelas aplicadas no direito comparado; e (iii) a falta de atualização da tabela progressiva do imposto de renda por índices de correção monetária. Sobre a proximidade das faixas, uma simples análise da tabela progressiva é capaz de revelar que a alíquota máxima de 27,5% já incide sobre rendimentos mensais superiores a R\$ 4.664,68. Ademais disso, verifica-se que as alíquotas de 7,5%, 15% e 22,5% incidem sobre rendimentos previstos em faixas de base de cálculo com intervalos que não ultrapassam a quantia de R\$ 1.000,00. Quanto à ausência de alíquotas mais elevadas, merece destaque a lição de Ricardo Lodi Ribeiro, segundo a qual: "Entre 81 países pesquisados, o Brasil é o 56º dentre as maiores alíquotas incidentes sobre as rendas das pessoas físicas, com 27,5% muito atrás dos países mais desenvolvidos. E o mais preocupante é que dentre os 70 países pesquisados que possuem teto para a alíquota mais alta, o Brasil ocupa a 11ª posição entre os limites mais baixos. É de fato uma progressividade para trabalhadores e não para os ricos." (RIBEIRO, 2015, p. 24). Constatou-se, também, que a tabela progressiva do IRPF não é atualizada desde 2015, o que compromete ainda mais o já falho sistema de progressividade do imposto de renda das pessoas físicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A progressividade de alíquotas no Brasil não é efetiva e deve ser revista para que a justiça fiscal seja alcançada. Novas faixas de alíquotas deveriam ser criadas para permitir a tributação de rendas mais elevadas, sendo imprescindível a atualização anual da tabela progressiva do IRPF.			
<b>REFERENCIAS</b>	COELHO, André Felipe Canuto; BORBA, Bruna Estima. "Progressividade do imposto de renda da pessoa física no brasil: realidade ou mito?". In: Revista Thesis Juris. v.6 n.6. p. 407-437. set./dez. 2017 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. RIBEIRO, Ricardo Lodi. PIKETTY E A REFORMA TRIBUTÁRIA IGUALITÁRIA NO BRASIL. In: Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. v.3 nº3, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14392	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3312283 - ALEXANDER WILLIAN EUGENIO DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marília Gomes Ghizzi Godoy		
<b>TITULO</b>	RAÇA DE GIGANTES: O IMAGINÁRIO DE RAÇA SUPERIOR COMO MODELO PARA UMA MASCULINIDADE PAULISTANA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A construção de uma identidade paulistana como uma 'raça superior' remonta às ideias eugenistas propagadas no início do século XX. Essas teorias por sua vez, ganham força com o resgate dos bandeirantes como símbolo de uma potência heroica que influenciou na criação de um imaginário representados pelos paulistanos como melhores em relação aos outros brasileiros. As ideias eugenistas, aliadas ao imaginário bandeirante, foram responsáveis por propagar um ideal de ser humano superior, mais europeizado, que poderia servir de modelo para o conjunto do país.			
<b>OBJETIVOS</b>	Sendo assim, quais foram as implicações do discurso eugenista em relação ao homem? Como essas ideias foram responsáveis por categorizar modelos de virilidade e impor um padrão a ser seguido? Quais são as permanências desse discurso na pluralidade com o qual a masculinidade se manifesta na pós-modernidade? Após uma análise documental observa-se como o modelo eugenista serviu, a princípio, para a criação de um imaginário ocidental onde é predominante um ideal de ser humano expressivo de um padrão de masculinidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O cenário hegemônico evidenciou que os discursos e as intenções dos médicos eugenistas era de transformar São Paulo em um estado modelo, de restauração da imagem dos bandeirantes, sua visibilidade e representação heroica de poder. O discurso eugenista se tornou um discurso que passa pelo viés econômico ao impor o estado de São Paulo e, principalmente, a capital paulista, como modelo a ser seguido e padrão econômico/social para todo o país.			
<b>RESULTADOS</b>	Sendo a metrópole brasileira que atualmente registra a maior população do país, a masculinidade paulistana é confrontada pela pluralidade de culturas que interferem e se mesclam à antiga identidade paulistana.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apesar do crescente combate à hegemonia da masculinidade padrão, os discursos vigentes revelam tendências de renovação que reforçam a busca no imaginário bandeirante, um modelo de virilidade a ser seguido.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>AMBRA, Pedro. Cartografias da masculinidade. São Paulo: Cult Editora, 2021. BUTLER, Judith. Desfazendo gênero. São Paulo: Editora Unesp, 2022. CAETANO, Marcio; SILVA JUNIOR, Paulo Melgaço. De guri a cabra-macho: masculinidades no Brasil. Rio de Janeiro: Lamparina, 2022. FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª ed. São Paulo: Edusp, 2009. FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade: o uso dos prazeres. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz(#38)Terra, 2018. ROIZ, D. da S. Mito, História, Memória e Ação: bandeirantismo e usos do passado no pensamento de Alfredo Ellis Jr. DOI 10.5216/o.v12i1.15169. OPSIS, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 107–128, 2012. DOI: 10.5216/o.v12i1.15169. Disponível em: <a href="https://periodicos.ufcat.edu.br/Opis/article/view/15169">https://periodicos.ufcat.edu.br/Opis/article/view/15169</a>. Acesso em: 9 out. 2023. SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação (#38) Realidade, [S. l.], v. 20, n. 2, 2017. Disponível em: <a href="https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoe realidade/article/view/71721">https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoe realidade/article/view/71721</a>. Acesso em: 14 jun. 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14394	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124239 - KAIQUE RAEI FERREIRA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	Consequências do manejo incorreto no tratamento de ferimentos corto-contusos em lábio			
<b>INTRODUCAO</b>	Os traumatismos corto contusos na região labial ocasionam em déficit funcional mastigatório e fonético, se não tratados de maneira adequada podem desenvolver complicações severas como infecção e dor, sendo necessário intervenção cirúrgica, terapia medicamentosa e acompanhamento para resolução do quadro clínico. No caso de infecção, a área em questão pode apresentar deiscência de suturas, edema, equimose, tecido necrótico e secreção purulenta, sendo necessário acompanhamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo apresenta 2 diferentes casos que desenvolveram complicações após traumatismo corto contuso na região labial, com o objetivo de avaliar seu manejo e consequências.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliados 2 pacientes que adentraram ao pronto socorro hospitalar e foram encaminhados a equipe de Cirurgia-Bucomaxilo-Facial, vítimas de acidentes automobilísticos, decorrendo em trauma facial e lacerações extensas em região labial. Ambos os pacientes passaram por uma correta higienização da ferida com solução fisiológica e antisséptica, realizadas suturas intra e extra oral com fios reabsorível e inabsorível respectivamente. Prescrição de antibióticoterapia e analgesia, além de detalhadas orientações pós-operatórias e de retorno ambulatorial após 7 dias ou antes se necessário. No retorno ambulatorial de 7 dias, foi possível observar que ambos os pacientes apresentaram deiscência de sutura, bem como área necrótica e infecção local. Os pacientes foram tratados com o uso de pomada a base de metronidazol e géis cicatriciais, bem como prescrição de antibiótico oral. Ao final do acompanhamento de 30 dias foi possível observar a melhora da deiscência, porém com sequelas estéticas, ressaltando a importância de um resultado primário adequado.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSOES</b>	<b>CONCLUSÃO:</b> A reconstrução de ferimentos corto-contusos em lábio devem seguir os protocolos de tratamento de maneira rígida, buscando resultados favoráveis já na primeira intervenção e que o cuidado pós-operatório do paciente e do profissional devem ser tão importantes quanto o procedimento em si.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Singer AJ, Mach C, Thode HC Jr et al. Patient priorities with traumatic lacerations. Am J Emerg Med 2000(38)#894;18:6836. 2. Elzinga K, Medina A, Guilfoyle R. Total Nose and Upper Lip Replantation: A Case Report and Literature Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2018 Oct 3;6(10):e1839. doi: 10.1097/GOX.0000000000001839. PMID: 30534477; PMCID: PMC6250478. 3. Fonseca, R. J., Walker, R. V., Barber, H. D., Powers, M. P., Frost, D. E. Trauma Bucomaxilofacial. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14400	Periodontia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4677951 - ALEXANDRE MIYAHIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Yeon Jung Kim		
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DOS ANTIMICROBIANOS NA INTERFACE PILAR IMPLANTE EM PACIENTES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O uso de produtos antimicrobianos na interface pilar implante tem com principal função a de controlar ou impedir a infiltração microbiana pois pelos estudos seria uma das causas da periimplantite e posterior perda do implante. Este estudo se justifica pelo fato de haver poucas pesquisas clínicas na literatura sobre a infiltração microbiana na interface pilar e implante utilizando os antimicrobianos disponíveis no dia-dia da clínica.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de antimicrobianos existentes na infiltração bacteriana na interface pilar e implante em pacientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados 16 pacientes e instalados 47 implantes da marca Titaniumfix® divididos em 4 grupos: 1A – grupo controle; 2B – grupo BlueM®; 3C-grupo Clorexidina e 4D – grupo Proheal® e examinados em 4 tempos: T0-inserção dos implantes; T1-colocação dos cicatrizadores; T2- instalação da prótese; T3- controle após 1 mês da instalação. Foram coletados material de dentro dos implantes nestes tempos e analisados através da extração de DNA para ver a quantidade bacteriana total através da técnica qPCR.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados na avaliação intra-grupo, em todo os grupos foram observados um aumento na quantidade de bactérias totais na interface pilar implante com o passar do tempo. No grupo controle, sendo estatisticamente maior no T2 (p=0,0003) e T3 (p(#60)0,0001) comparado ao T0. Nos grupos BlueM® e Clorexidina observou maior quantidade das bactérias em T3 (p=0,0011) e (p=0,0005) respectivamente comparado ao T0. No grupo Proheal®, uma maior quantidade de bactérias foram observadas nos períodos T2 (p=0,0448) e T3 (p=0,0032) quando comparado ao T0. Na análise inter-grupo, comparação dos produtos em relação ao mesmo tempo experimental, não foi observado diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em todos os tempos experimentais avaliados			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que dentro das limitações e face aos resultados observados por este estudo, concluiu-se que os produtos antimicrobianos avaliados não diminuiu ou impediu a infiltração bacteriana na interface pilar e implante nos tempos experimentais clinicamente			
<b>REFERENCIAS</b>	Cunha EJ, Auersvald CM, Deliberador TM, Gonzaga CC, Esteban Florez FL, Correr GM, et al. Effects of Active Oxygen Toothpaste in Supragingival Biofilm Reduction: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Dent. 1o de julho de 2019;2019:3938214 Deliberador TM, Weiss SG, Rychuv F, Cordeiro G, Cate MCLT, Leonardi L, et al. Comparative Analysis in Vitro of the Application of blue®m Oral Gel versus Chlorhexidine on Porphyromonas gingivalis: A Pilot Study. AiM. 2020;10(04):194–201 Caricasulo R, Malchiodi L, Ghensi P, Fantozzi G, Cucchi A. The influence of implant-abutment connection to peri-implant bone loss: A systematic review and meta-analysis. Clin Implant Dent Relat Res. agosto de 2018;20(4):653–64			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14400	Periodontia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678311 - ROGERIO NAGAI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Yeon Jung Kim		
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DOS ANTIMICROBIANOS NA INTERFACE PILAR IMPLANTE EM PACIENTES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O uso de produtos antimicrobianos na interface pilar implante tem com principal função a de controlar ou impedir a infiltração microbiana pois pelos estudos seria uma das causas da periimplantite e posterior perda do implante. Este estudo se justifica pelo fato de haver poucas pesquisas clínicas na literatura sobre a infiltração microbiana na interface pilar e implante utilizando os antimicrobianos disponíveis no dia-dia da clínica.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de antimicrobianos existentes na infiltração bacteriana na interface pilar e implante em pacientes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados 16 pacientes e instalados 47 implantes da marca Titaniumfix® divididos em 4 grupos: 1A – grupo controle; 2B – grupo BlueM®; 3C-grupo Clorexidina e 4D – grupo Proheal® e examinados em 4 tempos: T0-inserção dos implantes; T1-colocação dos cicatrizadores; T2- instalação da prótese; T3- controle após 1 mês da instalação. Foram coletados material de dentro dos implantes nestes tempos e analisados através da extração de DNA para ver a quantidade bacteriana total através da técnica qPCR.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados na avaliação intra-grupo, em todo os grupos foram observados um aumento na quantidade de bactérias totais na interface pilar implante com o passar do tempo. No grupo controle, sendo estatisticamente maior no T2 (p=0,0003) e T3 (p=#60)0,0001) comparado ao T0. Nos grupos BlueM® e Clorexidina observou maior quantidade das bactérias em T3 (p=0,0011) e (p=0,0005) respectivamente comparado ao T0. No grupo Proheal®, uma maior quantidade de bactérias foram observadas nos períodos T2 (p=0,0448) e T3 (p=0,0032) quando comparado ao T0. Na análise inter-grupo, comparação dos produtos em relação ao mesmo tempo experimental, não foi observado diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em todos os tempos experimentais avaliados			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que dentro das limitações e face aos resultados observados por este estudo, concluiu-se que os produtos antimicrobianos avaliados não diminuiu ou impediu a infiltração bacteriana na interface pilar e implante nos tempos experimentais clinicamente			
<b>REFERENCIAS</b>	Cunha EJ, Auersvald CM, Deliberador TM, Gonzaga CC, Esteban Florez FL, Correr GM, et al. Effects of Active Oxygen Toothpaste in Supragingival Biofilm Reduction: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Dent. 1o de julho de 2019;2019:3938214 Deliberador TM, Weiss SG, Rychuv F, Cordeiro G, Cate MCLT, Leonardi L, et al. Comparative Analysis in Vitro of the Application of blue®m Oral Gel versus Chlorhexidine on Porphyromonas gingivalis: A Pilot Study. AiM. 2020;10(04):194–201 Caricasulo R, Malchiodi L, Ghensi P, Fantozzi G, Cucchi A. The influence of implant-abutment connection to peri-implant bone loss: A systematic review and meta-analysis. Clin Implant Dent Relat Res. agosto de 2018;20(4):653–64			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14401	Periodontia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4677951 - ALEXANDRE MIYAHIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Yeon Jung Kim		
<b>TITULO</b>	EFEITO DO BLUEM® NA INTERFACE IMPLANTE/PILAR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A interface implante e pilar protético não promovem o perfeito selamento entre a região interna dos implantes e os tecidos que ficam em contato com a plataforma externa. O fluxo bacteriano de entrada e saída de microorganismos por esta conexões, é fator de preocupação que pode causar ou piorar a reabsorção óssea marginal, como reflexo da doença Peri-implantite.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é avaliar o efeito antimicrobiano do gel de Blue®M na interface implante/pilar protético a partir do momento da instalação cirúrgica do implante até a moldagem para reabilitação protética			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi dividido em três tempos sendo T0 - cirurgia para inserção dos implantes, T1 – reabertura e instalação de cicatrizador e T2 – moldagem para confecção da prótese. Os implantes foram divididos em três grupos de acordo com o material inserido na interface pilar-implante: Grupo 1A Controle negativo (sem nenhum produto) (n=8/período); Grupo 2B Blue®M em gel (n=9/período); Grupo 3C Clorexidina em gel 2% (n=7/período). As amostras foram quantificadas pelo método de Reação em Cadeia em Polimerase em Tempo Real (qPCR).			
<b>RESULTADOS</b>	Observou-se contaminação em todos os grupos e em todos os períodos estudados, apresentando aumento com o passar do tempo. (1A) p=0,064, (2B) p=0,005 e (3C) p=0,017. Entretanto, não houve diferenças significativas entre os grupos, em todos os períodos estudados, T0, T1 e T2 respectivamente p=0,56, p=0,42 e p=0,19			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluiu-se que a aplicação do Blue®M não diminuiu a infiltração bacteriana através do gap na interface implante e pilar protético nos períodos clínicos avaliados neste estudo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Sinjari B, D'Addazio G, De Tullio I, Traini T, Caputi S. Peri-Implant Bone Resorption during Healing Abutment Placement: The Effect of a 0.20 % Chlorhexidine Gel vs. Placebo—A Randomized Double Blind Controlled Human Study. <i>BioMed Research International</i> . 16 de outubro de 2018;2018:1–13 Caricasulo R, Malchioldi L, Ghensi P, Fantozzi G, Cucchi A. The influence of implant-abutment connection to peri-implant bone loss: A systematic review and meta-analysis. <i>Clin Implant Dent Relat Res</i> . agosto de 2018;20(4):653–64 Cunha EJ, Auersvald CM, Deliberador TM, Gonzaga CC, Esteban Florez FL, Correr GM, et al. Effects of Active Oxygen Toothpaste in Supragingival Biofilm Reduction: A Randomized Controlled Clinical Trial. <i>Int J Dent</i> . 1o de julho de 2019;2019:3938214 Jr SHF, Han WH, Cogo K, Sendyk WR, Kim YJ, Pallos D. Evaluation of the antimicrobial activity of iodoform paste on the contamination of the implant-abutment interface by <i>Porphyromonas gingivalis</i> - an in vitro study. 2021;6. Deliberador TM, Weiss SG, Rychuv F, Cordeiro G, Cate MCLT, Leonardi L, et al. Comparative Analysis in Vitro of the Application of blue®M Oral Gel versus Chlorhexidine on <i>Porphyromonas gingivalis</i> : A Pilot Study. <i>Aim</i> . 2020;10(04):194–201			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14401	Periodontia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4678311 - ROGERIO NAGAI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Yeon Jung Kim		
<b>TITULO</b>	EFEITO DO BLUEM® NA INTERFACE IMPLANTE/PILAR			
<b>INTRODUCAO</b>	A interface implante e pilar protético não promovem o perfeito selamento entre a região interna dos implantes e os tecidos que ficam em contato com a plataforma externa. O fluxo bacteriano de entrada e saída de microorganismos por esta conexões, é fator de preocupação que pode causar ou piorar a reabsorção óssea marginal, como reflexo da doença Peri-implantite.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é avaliar o efeito antimicrobiano do gel de Blue®M na interface implante/pilar protético a partir do momento da instalação cirúrgica do implante até a moldagem para reabilitação protética			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi dividido em três tempos sendo T0 - cirurgia para inserção dos implantes, T1 – reabertura e instalação de cicatrizador e T2 – moldagem para confecção da prótese. Os implantes foram divididos em três grupos de acordo com o material inserido na interface pilar-implante: Grupo 1A Controle negativo (sem nenhum produto) (n=8/período); Grupo 2B Blue®M em gel (n=9/período); Grupo 3C Clorexidina em gel 2% (n=7/período). As amostras foram quantificadas pelo método de Reação em Cadeia em Polimerase em Tempo Real (qPCR).			
<b>RESULTADOS</b>	Observou-se contaminação em todos os grupos e em todos os períodos estudados, apresentando aumento com o passar do tempo. (1A) p=0,064, (2B) p=0,005 e (3C) p=0,017. Entretanto, não houve diferenças significativas entre os grupos, em todos os períodos estudados, T0, T1 e T2 respectivamente p=0,56, p=0,42 e p=0,19			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluiu-se que a aplicação do Blue®M não diminuiu a infiltração bacteriana através do gap na interface implante e pilar protético nos períodos clínicos avaliados neste estudo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Sinjari B, D'Addazio G, De Tullio I, Traini T, Caputi S. Peri-Implant Bone Resorption during Healing Abutment Placement: The Effect of a 0.20 % Chlorhexidine Gel vs. Placebo—A Randomized Double Blind Controlled Human Study. <i>BioMed Research International</i> . 16 de outubro de 2018;2018:1–13 Caricasulo R, Malchioldi L, Ghensi P, Fantozzi G, Cucchi A. The influence of implant-abutment connection to peri-implant bone loss: A systematic review and meta-analysis. <i>Clin Implant Dent Relat Res</i> . agosto de 2018;20(4):653–64 Cunha EJ, Auersvald CM, Deliberador TM, Gonzaga CC, Esteban Florez FL, Correr GM, et al. Effects of Active Oxygen Toothpaste in Supragingival Biofilm Reduction: A Randomized Controlled Clinical Trial. <i>Int J Dent</i> . 1o de julho de 2019;2019:3938214 Jr SHF, Han WH, Cogo K, Sendyk WR, Kim YJ, Pallos D. Evaluation of the antimicrobial activity of iodoform paste on the contamination of the implant-abutment interface by <i>Porphyromonas gingivalis</i> - an in vitro study. 2021;6. Deliberador TM, Weiss SG, Rychuv F, Cordeiro G, Cate MCLT, Leonardi L, et al. Comparative Analysis in Vitro of the Application of blue®M Oral Gel versus Chlorhexidine on <i>Porphyromonas gingivalis</i> : A Pilot Study. <i>Aim</i> . 2020;10(04):194–201			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14402	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		236420 - CLAUDIO DE OLIVEIRA FILHO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	Consequências do manejo incorreto no tratamento de ferimentos corto-contusos em lábio			
<b>INTRODUCAO</b>	Os traumatismos corto contusos na região labial ocasionam em déficit funcional mastigatório e fonético, se não tratados de maneira adequada podem desenvolver complicações severas como infecção e dor, sendo necessário intervenção cirúrgica, terapia medicamentosa e acompanhamento para resolução do quadro clínico. No caso de infecção, a área em questão pode apresentar deiscência de suturas, edema, equimose, tecido necrótico e secreção purulenta, sendo necessário acompanhamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo apresenta 2 diferentes casos que desenvolveram complicações após traumatismo corto contuso na região labial, com o objetivo de avaliar seu manejo e consequências.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliados 2 pacientes que adentraram ao pronto socorro hospitalar e foram encaminhados a equipe de Cirurgia-Bucomaxilo-Facial, vítimas de acidentes automobilísticos, decorrendo em trauma facial e lacerações extensas em região labial. Ambos os pacientes passaram por uma correta higienização da ferida com solução fisiológica e antisséptica, realizadas suturas intra e extra oral com fios reabsorível e inabsorível respectivamente. Prescrição de antibióticoterapia e analgesia, além de detalhadas orientações pós-operatórias e de retorno ambulatorial após 7 dias ou antes se necessário. No retorno ambulatorial de 7 dias, foi possível observar que ambos os pacientes apresentaram deiscência de sutura, bem como área necrótica e infecção local. Os pacientes foram tratados com o uso de pomada a base de metronidazol e géis cicatriciais, bem como prescrição de antibiótico oral. Ao final do acompanhamento de 30 dias foi possível observar a melhora da deiscência, porém com sequelas estéticas, ressaltando a importância de um resultado primário adequado.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSOES</b>	A reconstruções de ferimentos corto-contusos em lábio devem seguir os protocolos de tratamento de maneira rígida, buscando resultados favoráveis já na primeira intervenção e que o cuidado pós-operatório do paciente e do profissional devem ser tão importantes quanto o procedimento em si.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Singer AJ, Mach C, Thode HC Jr et al. Patient priorities with traumatic lacerations. Am J Emerg Med 2000(38)#894;18:6836. 2. Elzinga K, Medina A, Guilfoyle R. Total Nose and Upper Lip Replantation: A Case Report and Literature Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2018 Oct 3;6(10):e1839. doi: 10.1097/GOX.0000000000001839. PMID: 30534477; PMCID: PMC6250478. 3. Fonseca, R. J., Walker, R. V., Barber, H. D., Powers, M. P., Frost, D. E. Trauma Bucomaxilofacial. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14402	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888359 - THIAGO LOPES DE ALMEIDA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	Consequências do manejo incorreto no tratamento de ferimentos corto-contusos em lábio			
<b>INTRODUCAO</b>	Os traumatismos corto contusos na região labial ocasionam em déficit funcional mastigatório e fonético, se não tratados de maneira adequada podem desenvolver complicações severas como infecção e dor, sendo necessário intervenção cirúrgica, terapia medicamentosa e acompanhamento para resolução do quadro clínico. No caso de infecção, a área em questão pode apresentar deiscência de suturas, edema, equimose, tecido necrótico e secreção purulenta, sendo necessário acompanhamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo apresenta 2 diferentes casos que desenvolveram complicações após traumatismo corto contuso na região labial, com o objetivo de avaliar seu manejo e consequências.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliados 2 pacientes que adentraram ao pronto socorro hospitalar e foram encaminhados a equipe de Cirurgia-Bucomaxilo-Facial, vítimas de acidentes automobilísticos, decorrendo em trauma facial e lacerações extensas em região labial. Ambos os pacientes passaram por uma correta higienização da ferida com solução fisiológica e antisséptica, realizadas suturas intra e extra oral com fios reabsorvível e inabsorvível respectivamente. Prescrição de antibióticoterapia e analgesia, além de detalhadas orientações pós-operatórias e de retorno ambulatorial após 7 dias ou antes se necessário. No retorno ambulatorial de 7 dias, foi possível observar que ambos os pacientes apresentaram deiscência de sutura, bem como área necrótica e infecção local. Os pacientes foram tratados com o uso de pomada a base de metronidazol e géis cicatriciais, bem como prescrição de antibiótico oral. Ao final do acompanhamento de 30 dias foi possível observar a melhora da deiscência, porém com sequelas estéticas, ressaltando a importância de um resultado primário adequado.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSOES</b>	A reconstruções de ferimentos corto-contusos em lábio devem seguir os protocolos de tratamento de maneira rígida, buscando resultados favoráveis já na primeira intervenção e que o cuidado pós-operatório do paciente e do profissional devem ser tão importantes quanto o procedimento em si.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Singer AJ, Mach C, Thode HC Jr et al. Patient priorities with traumatic lacerations. Am J Emerg Med 2000(38)#894;18:6836. 2. Elzinga K, Medina A, Guilfoyle R. Total Nose and Upper Lip Replantation: A Case Report and Literature Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2018 Oct 3;6(10):e1839. doi: 10.1097/GOX.0000000000001839. PMID: 30534477; PMCID: PMC6250478. 3. Fonseca, R. J., Walker, R. V., Barber, H. D., Powers, M. P., Frost, D. E. Trauma Bucomaxilofacial. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14402	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5124239 - KAIQUE RAEL FERREIRA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	Consequências do manejo incorreto no tratamento de ferimentos corto-contusos em lábio			
<b>INTRODUCAO</b>	Os traumatismos corto contusos na região labial ocasionam em déficit funcional mastigatório e fonético, se não tratados de maneira adequada podem desenvolver complicações severas como infecção e dor, sendo necessário intervenção cirúrgica, terapia medicamentosa e acompanhamento para resolução do quadro clínico. No caso de infecção, a área em questão pode apresentar deiscência de suturas, edema, equimose, tecido necrótico e secreção purulenta, sendo necessário acompanhamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo apresenta 2 diferentes casos que desenvolveram complicações após traumatismo corto contuso na região labial, com o objetivo de avaliar seu manejo e consequências.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram avaliados 2 pacientes que adentraram ao pronto socorro hospitalar e foram encaminhados a equipe de Cirurgia-Bucomaxilo-Facial, vítimas de acidentes automobilísticos, decorrendo em trauma facial e lacerações extensas em região labial. Ambos os pacientes passaram por uma correta higienização da ferida com solução fisiológica e antisséptica, realizadas suturas intra e extra oral com fios reabsorvível e inabsorvível respectivamente. Prescrição de antibióticoterapia e analgesia, além de detalhadas orientações pós-operatórias e de retorno ambulatorial após 7 dias ou antes se necessário. No retorno ambulatorial de 7 dias, foi possível observar que ambos os pacientes apresentaram deiscência de sutura, bem como área necrótica e infecção local. Os pacientes foram tratados com o uso de pomada a base de metronidazol e géis cicatríciais, bem como prescrição de antibiótico oral. Ao final do acompanhamento de 30 dias foi possível observar a melhora da deiscência, porém com sequelas estéticas, ressaltando a importância de um resultado primário adequado.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSOES</b>	A reconstruções de ferimentos corto-contusos em lábio devem seguir os protocolos de tratamento de maneira rígida, buscando resultados favoráveis já na primeira intervenção e que o cuidado pós-operatório do paciente e do profissional devem ser tão importantes quanto o procedimento em si.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Singer AJ, Mach C, Thode HC Jr et al. Patient priorities with traumatic lacerations. Am J Emerg Med 2000(#38)#894;18:6836. 2. Elzinga K, Medina A, Guilfoyle R. Total Nose and Upper Lip Replantation: A Case Report and Literature Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2018 Oct 3;6(10):e1839. doi: 10.1097/GOX.0000000000001839. PMID: 30534477; PMCID: PMC6250478. 3. Fonseca, R. J., Walker, R. V., Barber, H. D., Powers, M. P., Frost, D. E. Trauma Bucomaxilofacial. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14404	Materiais Odontológicos	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		353184 - DANIEL TAMASHIRO HIGA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Cristina Cidreira Boaro		
<b>TITULO</b>	Grau de conversão de resinas			
<b>INTRODUCAO</b>	A simplificação de etapas clínicas é uma tendência em odontologia, com destaque em materiais restauradores e adesivos. Resinas bulk-fill e uni-cromáticas são exemplos de materiais inovadores, mas que ainda precisam ser estudados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conversão (GC) de compósitos bulk-fill e uni-cromáticas comparando-os com seus respectivos compósitos convencionais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Treze compósitos comerciais foram avaliados, sendo 6 convencionais (Luna, Admira, Filtek Universal, Vitra, Charisma e Tetric), 2 uni-cromáticos (Vitra Unique, Charisma One) e 4 bulk-fill (Aura Bulk, Filtek One, Tetric Bulk, Admira Fusion e Grandioso). GC foi mensurado através de FTIR em espécimes com 7,0mm de diâmetro e 1,0mm de espessura (n=5). GC foi avaliado imediatamente (10 minutos) e 24 horas após a fotoativação. Os dados foram submetidos a Kruskal-Wallis/Mann-Whitney.			
<b>RESULTADOS</b>	GC imediato as médias (desvio-padrão) em % variaram entre 80,5 (21,9) e 44,5 (6,36) para os compósitos Admira fusion e Grandioso respectivamente. GC 24h as médias (desvio-padrão) em % variaram entre 85,7 (0,57) à 61,3 (19,3) para Admira e Charisma One, respectivamente. Não houve diferença estatística entre os compósitos tanto para o GC imediato quanto 24h.			
<b>CONCLUSOES</b>	Como esperado, os valores obtidos após 24h foram estatisticamente maiores que os imediatos, evidenciando que a reação química continua mesmo na ausência da luz. Tanto compósitos bulk-fill e quanto uni-cromáticos apresentaram GC estatisticamente semelhante aos convencionais, e entre si.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Demarco FF, Collares K, Correa MB, Cenci MS, Moraes RR, Opdam NJ. Should my composite restorations last forever? Why are they failing? Braz Oral Res. 31(suppl 1):e56. 2017. 2- Diamantopoulou S, Papazoglou E, Margaritis V, Lynch CD, Kakaboura A. Change of optical properties of contemporary resin composites after one week and one month water ageing. J Dent. 2013 Nov;41 Suppl 5:e62-9. doi: 10.1016/j.jdent.2013.04.001. 2013. 3- Dionysopoulos D, Gerasimidou O. Wear of contemporary dental composite resin restorations: a literature review. Restor Dent Endod. 46(2):e18. 2021. Elheeny AAH, Abdelmotelb MA. Oral health-related quality of life (OHRQOL) of preschool children's anterior teeth restored with zirconia crowns versus resin-bonded composite strip crowns: a 12-month prospective clinical trial. Clin Oral Investig. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14404	Materiais Odontológicos	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		646873 - MARIA APARECIDA CARVALHO DE ARAUJO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Cristina Cidreira Boaro		
<b>TITULO</b>	Grau de conversão de resinas			
<b>INTRODUCAO</b>	A simplificação de etapas clínicas é uma tendência em odontologia, com destaque em materiais restauradores e adesivos. Resinas bulk-fill e uni-cromáticas são exemplos de materiais inovadores, mas que ainda precisam ser estudados.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conversão (GC) de compósitos bulk-fill e uni-cromáticas comparando-os com seus respectivos compósitos convencionais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Treze compósitos comerciais foram avaliados, sendo 6 convencionais (Luna, Admira, Filtek Universal, Vitra, Charisma e Tetric), 2 uni-cromáticos (Vitra Unique, Charisma One) e 4 bulk-fill (Aura Bulk, Filtek One, Tetric Bulk, Admira Fusion e Grandioso). GC foi mensurado através de FTIR em espécimes com 7,0mm de diâmetro e 1,0mm de espessura (n=5). GC foi avaliado imediatamente (10 minutos) e 24 horas após a fotoativação. Os dados foram submetidos a Kruskal-Wallis/Mann-Whitney.			
<b>RESULTADOS</b>	GC imediato as médias (desvio-padrão) em % variaram entre 80,5 (21,9) e 44,5 (6,36) para os compósitos Admira fusion e Grandioso respectivamente. GC 24h as médias (desvio-padrão) em % variaram entre 85,7 (0,57) à 61,3 (19,3) para Admira e Charisma One, respectivamente. Não houve diferença estatística entre os compósitos tanto para o GC imediato quanto 24h.			
<b>CONCLUSOES</b>	Como esperado, os valores obtidos após 24h foram estatisticamente maiores que os imediatos, evidenciando que a reação química continua mesmo na ausência da luz. Tanto compósitos bulk-fill e quanto uni-cromáticos apresentaram GC estatisticamente semelhante aos convencionais, e entre si.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Demarco FF, Collares K, Correa MB, Cenci MS, Moraes RR, Opdam NJ. Should my composite restorations last forever? Why are they failing? Braz Oral Res. 31(suppl 1):e56. 2017. 2- Diamantopoulou S, Papazoglou E, Margaritis V, Lynch CD, Kakaboura A. Change of optical properties of contemporary resin composites after one week and one month water ageing. J Dent. 2013 Nov;41 Suppl 5:e62-9. doi: 10.1016/j.jdent.2013.04.001. 2013. 3- Dionysopoulos D, Gerasimidou O. Wear of contemporary dental composite resin restorations: a literature review. Restor Dent Endod. 46(2):e18. 2021. Elheeny AAH, Abdelmotelb MA. Oral health-related quality of life (OHRQOL) of preschool children's anterior teeth restored with zirconia crowns versus resin-bonded composite strip crowns: a 12-month prospective clinical trial. Clin Oral Investig. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14406	Materiais Odontológicos	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		646873 - MARIA APARECIDA CARVALHO DE ARAUJO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Angelica Castro Pimentel		
<b>TITULO</b>	PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICA DE COMPÓSITOS MONOCROMÁTICOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os compósitos monocromáticos (MO) vem ganhando espaço no mercado devido a sua facilidade de seleção de cor, e possibilidade de se camuflar ao substrato dentário. A cada dia novos materiais são disponibilizados para o uso clínico, e poucos estudos se referem especificamente a estes materiais quanto as suas propriedades mecânicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conversão, sorção, solubilidade, resistência a flexão (RF), módulo de elasticidade (E) e a dureza 24 horas após a fotopolimerização de dois compósitos MO (Charisma One® e Vittra Unique®) e dois compósitos convencionais (Charisma® e Vittra®).			
<b>METODOLOGIA</b>	O grau de conversão foi avaliado com espectroscopia de infravermelho com transformador de Fourier, a sorção e a solubilidade foram calculadas para cada espécime de acordo com as fórmulas, e E e RF foram obtidos através do ensaio de flexão em três pontos imediatamente após a fotopolimerização (18J/cm <sup>2</sup> ). Os dados foram analisados utilizando o ANOVA de fator único/Tukey (α=0,05).			
<b>RESULTADOS</b>	Os valores de RF variaram entre 173,1 e 230,6 MPa, para Vittra® e Charisma One® respectivamente. Os compósitos MO foram estatisticamente semelhantes ao compósito convencional da mesma marca. Os valores de E variaram entre 12,1 e 15,6 GPa, Vittra Unique® e Charisma One® respectivamente. Assim como para RF, os compósitos MO foram estatisticamente semelhantes ao compósito convencional da mesma marca. Para a microdureza de Knoop, houve diferença significativa apenas para o compósito Charisma®, com redução de 51% na diferença de 24-48 horas, e para o grau de conversão não houve diferença estatística entre os valores. Não houve diferença estatística entre os grupos tanto para os dados de sorção, quanto para os dados de solubilidade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluiu-se os compósitos MO apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos compósitos convencionais, com a vantagem em relação a seleção de cor e camuflagem do substrato dental.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Diamantopoulou S, Papazoglou E, Margaritis V, Lynch CD, Kakaboura A. Change of optical properties of contemporary resin composites after one week and one month water ageing. J Dent. 2013 Nov;41 Suppl 5:e62-9. 2013. 2. Korkut B, Türkmen C. Longevity of direct diastema closure and recontouring restorations with resin composites in maxillary anterior teeth: A 4-year clinical evaluation. J Esthet Restor Dent. 33(4):590-604. 2021. 3. Röder T, Santos ER. Resinas compostas monocromáticas: Uma revisão de literature. Brazilian Journal of Development. 2022. 4. Sabbagh J, Vreven L, Leloup G. Dynamic and static moduli of elasticity of resinbased materials. Dent Mat. 18:64-71. 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14407	Cardiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4832868 - GIOVANNA RIOS ESTRADIOTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		MARIA FERNANDA SALOMÃO
<b>TITULO</b>	Avaliação do risco cardiovascular em adultos e a relação com o sedentarismo e/ou grau de obesidade			
<b>INTRODUCAO</b>	Doenças cardiovasculares decorrentes da obesidade e sedentarismo crescem a cada ano no Brasil e no mundo, adultos jovens já apresentam problemas metabólicos, mesmo abaixo dos 40 anos, tendo riscos cardiovasculares mais cedo. Atualmente, é a doença que causa mais mortes, devido aos seus fatores de risco como: obesidade, sedentarismo, uso de tabaco e dietas inadequadas, que são frequentemente analisados na população. As doenças cardiovasculares mais comuns encontradas são: hipertensão arterial, doenças coronarianas, doença arterial periférica, doença cerebrovascular e doença cardíaca reumática.			
<b>OBJETIVOS</b>	classificar o risco para doenças relacionadas a saúde cardiovascular em adultos sedentários e/ou obesos			
<b>METODOLOGIA</b>	esse projeto trata-se de um estudo de coorte, sobre o crescimento de doenças cardiovasculares na população de adultos jovens aos arredores da universidade Santo Amaro. Será mensurado no soro de pacientes participantes, que serão jovens adultos sedentários, com grau de obesidade e/ou problemas metabólicos, as taxas de colesterol total, lipoproteínas plasmáticas carregadores de colesterol (HDL e LDL) e triglicerídeos. Após a análise clínica será realizado o cálculo matemático Índice de Castelli (IC), que determina e identifica o risco de doenças cardiovasculares.			
<b>RESULTADOS</b>	realizar o rastreamento de doenças cardiovasculares em jovens adultos sedentários e/ou com grau de obesidade é crucial devido ao aumento preocupante da prevalência dessas doenças. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovascular permite intervenções oportunas e condutas adequadas, como mudanças no estilo de vida e tratamento médico, reduzindo custos de saúde a longo prazo e melhorando a qualidade de vida. Após o rastreamento, é fundamental buscar orientação médica e aconselhamento sobre mudanças no estilo de vida, como dieta equilibrada, exercícios físicos, cessação do tabagismo e gestão do estresse. O acompanhamento médico regular é necessário para monitorar o progresso e ajustar intervenções conforme necessário e a conscientização e a educação sobre saúde cardiovascular são essenciais, para que os indivíduos possam tomar decisões informadas sobre seu bem-estar.			
<b>CONCLUSOES</b>	O rastreamento de fatores de risco permite intervenções que podem salvar vidas, melhorar a qualidade de vida e reduzir os custos de saúde. Além disso, a promoção do autocuidado e a conscientização são elementos-chave para o sucesso da prevenção, sendo assim, uma estratégia vital para reduzir o crescente problema de saúde pública.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. OPAS. Doenças cardiovasculares - OPAS/OMS   Organização Pan-Americana da Saúde [Internet]. www.paho.org. 2022. Disponível em: <a href="https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares">https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares</a> 2. Cardiômetro [Internet]. www.cardiometro.com.br. Disponível em: <a href="http://www.cardiometro.com.br/grafico.asp">http://www.cardiometro.com.br/grafico.asp</a> 3. Mapa da obesidade [Internet]. Abeso. Disponível em: <a href="https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/">https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/</a> 4. Elejalde YLL. Melhor acompanhamento dos usuários com doenças cardiovasculares e usuários com fatores de risco para a doença – plano de ação. repositorioufmgbr [Internet]. 2016 Feb 27 [cited 2023 Oct 9]; Disponível em: <a href="http://hdl.handle.net/1843/50001">http://hdl.handle.net/1843/50001</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14407	Cardiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4977785 - PAULA DA SILVA QUEIROZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		MARIA FERNANDA SALOMÃO
<b>TITULO</b>	Avaliação do risco cardiovascular em adultos e a relação com o sedentarismo e/ou grau de obesidade			
<b>INTRODUCAO</b>	Doenças cardiovasculares decorrentes da obesidade e sedentarismo crescem a cada ano no Brasil e no mundo, adultos jovens já apresentam problemas metabólicos, mesmo abaixo dos 40 anos, tendo riscos cardiovasculares mais cedo. Atualmente, é a doença que causa mais mortes, devido aos seus fatores de risco como: obesidade, sedentarismo, uso de tabaco e dietas inadequadas, que são frequentemente analisados na população. As doenças cardiovasculares mais comuns encontradas são: hipertensão arterial, doenças coronarianas, doença arterial periférica, doença cerebrovascular e doença cardíaca reumática.			
<b>OBJETIVOS</b>	classificar o risco para doenças relacionadas a saúde cardiovascular em adultos sedentários e/ou obesos			
<b>METODOLOGIA</b>	esse projeto trata-se de um estudo de coorte, sobre o crescimento de doenças cardiovasculares na população de adultos jovens aos arredores da universidade Santo Amaro. Será mensurado no soro de pacientes participantes, que serão jovens adultos sedentários, com grau de obesidade e/ou problemas metabólicos, as taxas de colesterol total, lipoproteínas plasmáticas carregadores de colesterol (HDL e LDL) e triglicérides. Após a análise clínica será realizado o cálculo matemático Índice de Castelli (IC), que determina e identifica o risco de doenças cardiovasculares.			
<b>RESULTADOS</b>	realizar o rastreamento de doenças cardiovasculares em jovens adultos sedentários e/ou com grau de obesidade é crucial devido ao aumento preocupante da prevalência dessas doenças. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovascular permite intervenções oportunas e condutas adequadas, como mudanças no estilo de vida e tratamento médico, reduzindo custos de saúde a longo prazo e melhorando a qualidade de vida. Após o rastreamento, é fundamental buscar orientação médica e aconselhamento sobre mudanças no estilo de vida, como dieta equilibrada, exercícios físicos, cessação do tabagismo e gestão do estresse. O acompanhamento médico regular é necessário para monitorar o progresso e ajustar intervenções conforme necessário e a conscientização e a educação sobre saúde cardiovascular são essenciais, para que os indivíduos possam tomar decisões informadas sobre seu bem-estar.			
<b>CONCLUSOES</b>	O rastreamento de fatores de risco permite intervenções que podem salvar vidas, melhorar a qualidade de vida e reduzir os custos de saúde. Além disso, a promoção do autocuidado e a conscientização são elementos-chave para o sucesso da prevenção, sendo assim, uma estratégia vital para reduzir o crescente problema de saúde pública.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. OPAS. Doenças cardiovasculares - OPAS/OMS   Organização Pan-Americana da Saúde [Internet]. www.paho.org. 2022. Disponível em: <a href="https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares">https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares</a> 2. Cardiômetro [Internet]. www.cardiometro.com.br. Disponível em: <a href="http://www.cardiometro.com.br/grafico.asp">http://www.cardiometro.com.br/grafico.asp</a> 3. Mapa da obesidade [Internet]. Abeso. Disponível em: <a href="https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/">https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/</a> 4. Elejalde YLL. Melhor acompanhamento dos usuários com doenças cardiovasculares e usuários com fatores de risco para a doença – plano de ação. repositoriofmgbr [Internet]. 2016 Feb 27 [cited 2023 Oct 9]; Disponível em: <a href="http://hdl.handle.net/1843/50001">http://hdl.handle.net/1843/50001</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14407	Cardiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5056845 - LUCAS MOREIRA NATRIELLI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		MARIA FERNANDA SALOMÃO
<b>TITULO</b>	Avaliação do risco cardiovascular em adultos e a relação com o sedentarismo e/ou grau de obesidade			
<b>INTRODUCAO</b>	Doenças cardiovasculares decorrentes da obesidade e sedentarismo crescem a cada ano no Brasil e no mundo, adultos jovens já apresentam problemas metabólicos, mesmo abaixo dos 40 anos, tendo riscos cardiovasculares mais cedo. Atualmente, é a doença que causa mais mortes, devido aos seus fatores de risco como: obesidade, sedentarismo, uso de tabaco e dietas inadequadas, que são frequentemente analisados na população. As doenças cardiovasculares mais comuns encontradas são: hipertensão arterial, doenças coronarianas, doença arterial periférica, doença cerebrovascular e doença cardíaca reumática.			
<b>OBJETIVOS</b>	classificar o risco para doenças relacionadas a saúde cardiovascular em adultos sedentários e/ou obesos			
<b>METODOLOGIA</b>	esse projeto trata-se de um estudo de coorte, sobre o crescimento de doenças cardiovasculares na população de adultos jovens aos arredores da universidade Santo Amaro. Será mensurado no soro de pacientes participantes, que serão jovens adultos sedentários, com grau de obesidade e/ou problemas metabólicos, as taxas de colesterol total, lipoproteínas plasmáticas carregadores de colesterol (HDL e LDL) e triglicerídeos. Após a análise clínica será realizado o cálculo matemático Índice de Castelli (IC), que determina e identifica o risco de doenças cardiovasculares.			
<b>RESULTADOS</b>	realizar o rastreamento de doenças cardiovasculares em jovens adultos sedentários e/ou com grau de obesidade é crucial devido ao aumento preocupante da prevalência dessas doenças. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovascular permite intervenções oportunas e condutas adequadas, como mudanças no estilo de vida e tratamento médico, reduzindo custos de saúde a longo prazo e melhorando a qualidade de vida. Após o rastreamento, é fundamental buscar orientação médica e aconselhamento sobre mudanças no estilo de vida, como dieta equilibrada, exercícios físicos, cessação do tabagismo e gestão do estresse. O acompanhamento médico regular é necessário para monitorar o progresso e ajustar intervenções conforme necessário e a conscientização e a educação sobre saúde cardiovascular são essenciais, para que os indivíduos possam tomar decisões informadas sobre seu bem-estar.			
<b>CONCLUSOES</b>	O rastreamento de fatores de risco permite intervenções que podem salvar vidas, melhorar a qualidade de vida e reduzir os custos de saúde. Além disso, a promoção do autocuidado e a conscientização são elementos-chave para o sucesso da prevenção, sendo assim, uma estratégia vital para reduzir o crescente problema de saúde pública.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. OPAS. Doenças cardiovasculares - OPAS/OMS   Organização Pan-Americana da Saúde [Internet]. www.paho.org. 2022. Disponível em: <a href="https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares">https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares</a> 2. Cardiômetro [Internet]. www.cardiometro.com.br. Disponível em: <a href="http://www.cardiometro.com.br/grafico.asp">http://www.cardiometro.com.br/grafico.asp</a> 3. Mapa da obesidade [Internet]. Abeso. Disponível em: <a href="https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/">https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/</a> 4. Elejalde YLL. Melhor acompanhamento dos usuários com doenças cardiovasculares e usuários com fatores de risco para a doença – plano de ação. repositoriofmgbr [Internet]. 2016 Feb 27 [cited 2023 Oct 9]; Disponível em: <a href="http://hdl.handle.net/1843/50001">http://hdl.handle.net/1843/50001</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14410	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3715892 - RICARDO SEIXAS DE PAIVA LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Heloisa Fonseca Marao	RICARDO ANDRÉS LANDÁZURI DEL BARRIO	
<b>TITULO</b>	Elevação do assoalho nasal em maxila atrófica para tratamento com implantes dentários. Acompanhamento de 3 anos.			
<b>INTRODUCAO</b>	A atrofia da pré-maxila é um desafio para reabilitação de pacientes edêntulos. Com o advento de novas tecnologias na área de implantes e de enxertos ósseos a técnica de levantamento do assoalho nasal possibilita condições para instalação de próteses sobre implantes nessa área.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo deste trabalho é apresentar um acompanhamento de 3 anos de implantes instalados em região anterior de maxila atrófica, onde foi feito levantamento de soalho nasal utilizando biomaterial osteocondutor xenógeno.			
<b>METODOLOGIA</b>	Dezesseis pacientes foram operados em um único centro odontológico entre os anos de 2017 e 2022. Foi diagnosticado ausência de tecido ósseo em altura na maxila por meio da tomografia computadorizada. Desta forma, não sendo possível a instalação de implantes osseointegrados para futura reabilitação. Assim, o soalho nasal foi elevado parcialmente e foi colocado biomaterial osteocondutor xenógeno. Em seguida os implantes foram instalados (4.1x4 mm e 4.1x6 mm) e aguardado o período de osseointegração. Após 8 meses foi realizada a cirurgia de reabertura e posteriormente os procedimentos de moldagem, instalação de pilares protéticos e confecção de prótese protocolo.			
<b>RESULTADOS</b>	Trinta e dois implantes foram instalados simultaneamente à elevação de soalho nasal. Não foi observado perfuração da mucosa nasal em nenhum caso. A média de osso residual, osso após a reconstrução e o ganho vertical após 3 anos foi respectivamente de: 2,22 mm; 5,5 mm e 4,3 mm. Durante o período de acompanhamento não houve perda de nenhum implante, presença de peri-implantite e perda óssea marginal, resultando em 100% de sobrevivência dos implantes.			
<b>CONCLUSOES</b>	A elevação de soalho nasal pode ser uma técnica considerada previsível para reconstrução anterior de maxila atrófica evitando sobrecarga em implantes posteriores instalados em áreas de elevação de seio maxilar, evitando também cantilever.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Bhalla N, Dym H. Update on Maxillary Sinus Augmentation. Dent Clin North Am. 2021 Jan;65(1):197-210. doi: 10.1016/j.cden.2020.09.013. 2- El-Ghareeb M, Pi-Anfruns J, Khosousi M, Aghaloo T, Moy P. Nasal floor augmentation for the reconstruction of the atrophic maxilla: a case series. J Oral Maxillofac Surg. 2012 Mar;70(3):e235-41. doi: 10.1016/j.joms.2011.09.032. 3- Park WB, Crasto GJ, Park W, Han JY, Kang P. Successful Implant Placement via Simultaneous Nasal Floor Augmentation in an Inferior Meatus Pneumatization Case. Medicina (Kaunas). 2023 Feb 13;59(2):357.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14410	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888367 - ALEXANDRE HYPPOLITO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Heloisa Fonseca Marao		RICARDO ANDRÉS LANDÁZURI DEL BARRIO
<b>TITULO</b>	Elevação do assoalho nasal em maxila atrófica para tratamento com implantes dentários. Acompanhamento de 3 anos.			
<b>INTRODUCAO</b>	A atrofia da pré-maxila é um desafio para reabilitação de pacientes edêntulos. Com o advento de novas tecnologias na área de implantes e de enxertos ósseos a técnica de levantamento do assoalho nasal possibilita condições para instalação de próteses sobre implantes nessa área.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo deste trabalho é apresentar um acompanhamento de 3 anos de implantes instalados em região anterior de maxila atrófica, onde foi feito levantamento de soalho nasal utilizando biomaterial osteocondutor xenógeno.			
<b>METODOLOGIA</b>	Dezesseis pacientes foram operados em um único centro odontológico entre os anos de 2017 e 2022. Foi diagnosticado ausência de tecido ósseo em altura na maxila por meio da tomografia computadorizada. Desta forma, não sendo possível a instalação de implantes osseointegrados para futura reabilitação. Assim, o soalho nasal foi elevado parcialmente e foi colocado biomaterial osteocondutor xenógeno. Em seguida os implantes foram instalados (4.1x4 mm e 4.1x6 mm) e aguardado o período de osseointegração. Após 8 meses foi realizada a cirurgia de reabertura e posteriormente os procedimentos de moldagem, instalação de pilares protéticos e confecção de prótese protocolo.			
<b>RESULTADOS</b>	Trinta e dois implantes foram instalados simultaneamente à elevação de soalho nasal. Não foi observado perfuração da mucosa nasal em nenhum caso. A média de osso residual, osso após a reconstrução e o ganho vertical após 3 anos foi respectivamente de: 2,22 mm; 5,5 mm e 4,3 mm. Durante o período de acompanhamento não houve perda de nenhum implante, presença de peri-implantite e perda óssea marginal, resultando em 100% de sobrevivência dos implantes.			
<b>CONCLUSOES</b>	A elevação de soalho nasal pode ser uma técnica considerada previsível para reconstrução anterior de maxila atrófica evitando sobrecarga em implantes posteriores instalados em áreas de elevação de seio maxilar, evitando também cantilever.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Bhalla N, Dym H. Update on Maxillary Sinus Augmentation. Dent Clin North Am. 2021 Jan;65(1):197-210. doi: 10.1016/j.cden.2020.09.013. 2- El-Ghareeb M, Pi-Anfruns J, Khosousi M, Aghaloo T, Moy P. Nasal floor augmentation for the reconstruction of the atrophic maxilla: a case series. J Oral Maxillofac Surg. 2012 Mar;70(3):e235-41. doi: 10.1016/j.joms.2011.09.032. 3- Park WB, Crasto GJ, Park W, Han JY, Kang P. Successful Implant Placement via Simultaneous Nasal Floor Augmentation in an Inferior Meatus Pneumatization Case. Medicina (Kaunas). 2023 Feb 13;59(2):357.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14411	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3715892 - RICARDO SEIXAS DE PAIVA LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Heloisa Fonseca Marao	RICARDO ANDRÉS LANDÁZURI DEL BARRIO	
<b>TITULO</b>	Barreira de Zircônia customizadas 3D para regeneração óssea guiada. Série de casos.			
<b>INTRODUCAO</b>	Há várias técnicas cirúrgicas diferentes disponíveis para ganho ósseo horizontalmente ou verticalmente. As membranas reabsorvíveis são limitadas em relação ao ganho ósseo, enquanto as membranas não reabsorvíveis podem gerar exposições, o que pode acarretar complicações.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desta série de casos foi avaliar clinicamente a regeneração óssea realizada com barreiras de zircônia customizadas 3D.			
<b>METODOLOGIA</b>	Cinco pacientes saudáveis com atrofia óssea grave (3 maxilas anterior, 1 maxila posterior - lado direito e 1 mandíbula posterior - lado esquerdo) foram selecionados para o procedimento de regeneração óssea guiada (ROG) com uma barreira de zircônia. Para cada paciente foi solicitado a tomografia computadorizada com imagens em DICOM e foi feito escaneamento intra-oral (imagem STL). O planejamento reverso foi realizado inicialmente inserindo e alinhando os arquivos de escaneamento intra-oral e tomografia no software Nemo 3D. Assim, foi feito o enceramento das futuras próteses, e posteriormente o posicionamento dos implantes dentários a 4 mm da futura margem gengival. Desta forma, foi desenhado a barreira de zircônia seguindo os parâmetros do limite da crista óssea interproximal como limite para ganho ósseo vertical. As barreiras foram fresadas em zircônia monolítica. Foi utilizada para a ROG, osso autógeno particulado misturado com biomaterial osteocondutor xenógeno, a barreira de zircônia e parafusos de fixação. Após 6 meses, a barreira foi removida e os implantes dentários foram instalados.			
<b>RESULTADOS</b>	Em nenhuma cirurgia houve complicação trans e pós-operatória e não houve exposição da barreira de zircônia. Em todos os casos foi possível observar grande quantidade de formação de tecido ósseo.			
<b>CONCLUSOES</b>	As barreiras de zircônia 3D customizadas confirmaram um excelente desempenho clínico e foram eficazes para o ganho de tecido ósseo tridimensional.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Mandelli F, Traini T, Ghensi P. Customized-3D zirconia barriers for guided bone regeneration (GBR): clinical and histological findings from a proof-of-concept case series. J Dent. 2021 Nov;114:103780. 2- Windisch P, Orban K, Salvi GE, Sculean A, Molnar B. Vertical-guided bone regeneration with a titanium-reinforced d-PTFE membrane utilizing a novel split-thickness flap design: a prospective case series. Clin Oral Investig. 2021 May;25(5):2969-2980. 3- Urban IA, Monje A. Guided Bone Regeneration in Alveolar Bone Reconstruction. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2019 May;31(2):331-338.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14411	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888367 - ALEXANDRE HYPOLITO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Heloisa Fonseca Marao		RICARDO ANDRÉS LANDÁZURI DEL BARRIO
<b>TITULO</b>	Barreira de Zircônia customizadas 3D para regeneração óssea guiada. Série de casos.			
<b>INTRODUCAO</b>	Há várias técnicas cirúrgicas diferentes disponíveis para ganho ósseo horizontalmente ou verticalmente. As membranas reabsorvíveis são limitadas em relação ao ganho ósseo, enquanto as membranas não reabsorvíveis podem gerar exposições, o que pode acarretar complicações.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desta série de casos foi avaliar clinicamente a regeneração óssea realizada com barreiras de zircônia customizadas 3D.			
<b>METODOLOGIA</b>	Cinco pacientes saudáveis com atrofia óssea grave (3 maxilas anterior, 1 maxila posterior - lado direito e 1 mandíbula posterior - lado esquerdo) foram selecionados para o procedimento de regeneração óssea guiada (ROG) com uma barreira de zircônia. Para cada paciente foi solicitado a tomografia computadorizada com imagens em DICOM e foi feito escaneamento intra-oral (imagem STL). O planejamento reverso foi realizado inicialmente inserindo e alinhando os arquivos de escaneamento intra-oral e tomografia no software Nemo 3D. Assim, foi feito o enceramento das futuras próteses, e posteriormente o posicionamento dos implantes dentários à 4 mm da futura margem gengival. Desta forma, foi desenhado a barreira de zircônia seguindo os parâmetros do limite da crista óssea interproximal como limite para ganho ósseo vertical. As barreiras foram fresadas em zircônia monolítica. Foi utilizada para a ROG, osso autógeno particulado misturado com biomaterial osteocondutor xenógeno, a barreira de zircônia e parafusos de fixação. Após 6 meses, a barreira foi removida e os implantes dentários foram instalados.			
<b>RESULTADOS</b>	Em nenhuma cirurgia houve complicação trans e pós-operatória e não houve exposição da barreira de zircônia. Em todos os casos foi possível observar grande quantidade de formação de tecido ósseo.			
<b>CONCLUSOES</b>	As barreiras de zircônia 3D customizadas confirmaram um excelente desempenho clínico e foram eficazes para o ganho de tecido ósseo tridimensional.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Mandelli F, Traini T, Ghensi P. Customized-3D zirconia barriers for guided bone regeneration (GBR): clinical and histological findings from a proof-of-concept case series. J Dent. 2021 Nov;114:103780. 2- Windisch P, Orban K, Salvi GE, Sculean A, Molnar B. Vertical-guided bone regeneration with a titanium-reinforced d-PTFE membrane utilizing a novel split-thickness flap design: a prospective case series. Clin Oral Investig. 2021 May;25(5):2969-2980. 3- Urban IA, Monje A. Guided Bone Regeneration in Alveolar Bone Reconstruction. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2019 May;31(2):331-338.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14413	Fisiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441702 - ALINE DANTAS PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nancy Preising Aptekmann		
<b>TITULO</b>	Impactos do consumo de alimentos ultraprocessados na microbiota intestinal associados aos sintomas depressivos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A depressão é um transtorno psiquiátrico que pode acometer os indivíduos em qualquer fase da vida, ao passo que a alimentação e um estilo de vida ativo são estratégias de cuidado preventivos para evitá-la. Os alimentos ultraprocessados (AUP) estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Eles são prejudiciais a microbiota intestinal, conjunto de microrganismos que habitam o intestino humano e contribuem para a produção de neurotransmissores como a serotonina, pois produzem bactérias maléficas no intestino, o que gera disbiose, isto é, uma desorganização intestinal. Somado a isso, essas bactérias produzem substâncias inflamatórias. Essa inflamação afeta o Sistema Nervoso Central (SNC), por meio do eixo bidirecional cérebro-intestino podendo facilitar o desenvolvimento de patologias como a depressão.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar como os alimentos ultraprocessados agem na microbiota intestinal e influenciam o surgimento de sintomas depressivos.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada é a do tipo revisão bibliográfica narrativa da literatura, por meio do acesso as bases de dados CAPES, Google Acadêmico, Lilacs, PubMed e Scielo de artigos publicados entre os anos de 2018 e 2023, em língua portuguesa ou inglesa.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados preliminares apontaram que os alimentos ultraprocessados causam uma desorganização intestinal, a partir da produção de bactérias que produzem substâncias inflamatórias. Espera-se, no decorrer da pesquisa, identificar como os alimentos ultraprocessados agem na microbiota intestinal e influenciam o surgimento de sintomas depressivos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os alimentos ultraprocessados causam disbiose no intestino, o que resulta produção de bactérias inflamatórias que afetam o SNC (Sistema nervoso Central), por meio do eixo cérebro - intestino causando uma desregulação no funcionamento do cérebro e das emoções.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CARLESSI, A.S., et al. Gut microbiota-brain axis in depression: The role of neuroinflammation. Eur J Neurosci. 2021 Jan;53(1):222-235. doi: 10.1111/ejn.14631. Epub 2019 Dec 18. PMID: 31785168. DINAN, T.G; CRYAN, J.F. (2013), Melancholic microbes: a link between gut microbiota and depression?.Neurogastroenterol. Motil., 25:713- 719. <a href="https://doi.org/10.1111/nmo.12198">https://doi.org/10.1111/nmo.12198</a>. MONTEIRO, C. A., et al. (2019). Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutr. 2019 Apr;22(5):936-941. doi: 10.1017/S1368980018003762. Epub 2019 Feb 12. PMID: 30744710. SILVA, C. B., et al. A influência da microbiota intestinal na modulação de doenças psiquiátricas. Revista Educação em Saúde, v.7, suplemento 2, n.17,116-170,nov.2019.Disponível em: (#60)<a href="https://www.unifeso.edu.br/revista/index.php/medicinafamilia Saudemental/article/view/#62">https://www.unifeso.edu.br/revista/index.php/medicinafamilia Saudemental/article/view/#62</a>. Acesso em: 10 mai. 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14414	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		3367070 - JULIANA DA SILVA FERREIRA		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
TITULO	NÓDULO INCOMUM EM PONTA DE LÍNGUA: UMA APRESENTAÇÃO CLÍNICA DIFERENTE DE UMA LESÃO COMUM			
INTRODUCAO	INTRODUÇÃO: Linfangiomas são proliferação focal de tecido linfático bem diferenciado com origem distinta ao sistema linfático. A maioria ocorre em crianças ou adultos jovens, sendo comumente encontrados na região de cabeça e pescoço (75%).			
OBJETIVOS	OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso Linfangioma atípico em cavidade oral			
METODOLOGIA	<p>RELATO DE CASO E DISCUSSÃO: Uma mulher de 46 anos, xantoderma compareceu à Clínica Escola da UNISA com história de sete anos de crescimento de nódulo em ponta de língua assintomático e associado a trauma. Segundo a paciente, a lesão surgiu devido doença periodontal, que levou a mobilidade dentária com posterior diastema ntre os dentes 41 e 42. Ao exame físico extrabucal não se observou alterações faciais. No exame físico intrabucal, observou-se aumento de volume nodular em ápice de língua, medindo aproximadamente 15 mm de diâmetro, de coloração semelhante a mucosa, base pediculada, de superfície lisa e firme à palpação. Os diagnósticos diferenciais primários foram Granuloma Plogênico e Fibroma. Foi realizada biópsia excisional que revelou fragmento de mucosa revestido por epitélio pavimentoso estratificado hiperparaqueratinizado exibindo acantose e atrofia. Na lâmina própria notou-se um tecido conjuntivo denso, apresentando numerosos espaços revestidos por endotélio fino preenchido por material eosinofílico, compatível com linfa. Notou-se a presença destes vasos linfáticos logo abaixo do epitélio. Foi estabelecido o diagnóstico final de linfangioma. Clinicamente sua apresentação usual são múltiplas pápulas ou vesículas translúcidas com aspecto que lembra ovos de rã. A coloração pode ser igual à da mucosa adjacente ou avermelhada devido à hemorragia tecidual. O caso apresentado possui características clínicas incomuns como um nódulo solitário de base pediculada em dorso de língua, de crescimento lento, bem circunscrito, assintomático, macio e firme, de coloração semelhante a mucosa e de superfície lisa.</p>			
RESULTADOS				
CONCLUSOES	CONCLUSÃO: O presente relato mostra um caso atípico de linfangioma em cavidade oral e que deve ser levado em consideração na elaboração de hipóteses diagnósticas.			
REFERENCIAS	1. De Almeida, O. P. Patologia Oral. São Paulo: Artes Médicas, 2016. 2. Paes, S. M. Patologia Oral e Maxilofacial. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 3. Neville, B. Patologia Oral e Maxilofacial. Elsevier, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14414	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4611535 - ELISA PERES GOMES LIMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	NÓDULO INCOMUM EM PONTA DE LÍNGUA: UMA APRESENTAÇÃO CLÍNICA DIFERENTE DE UMA LESÃO COMUM			
<b>INTRODUCAO</b>	INTRODUÇÃO: Linfangiomas são proliferação focal de tecido linfático bem diferenciado com origem distinta ao sistema linfático. A maioria ocorre em crianças ou adultos jovens, sendo comumente encontrados na região de cabeça e pescoço (75%).			
<b>OBJETIVOS</b>	OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso Linfangioma atípico em cavidade oral			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>RELATO DE CASO E DISCUSSÃO: Uma mulher de 46 anos, xantoderma compareceu à Clínica Escola da UNISA com história de sete anos de crescimento de nódulo em ponta de língua assintomático e associado a trauma. Segundo a paciente, a lesão surgiu devido doença periodontal, que levou a mobilidade dentária com posterior diastema ntre os dentes 41 e 42. Ao exame físico extrabucal não se observou alterações faciais. No exame físico intrabucal, observou-se aumento de volume nodular em ápice de língua, medindo aproximadamente 15 mm de diâmetro, de coloração semelhante a mucosa, base pediculada, de superfície lisa e firme à palpação. Os diagnósticos diferenciais primários foram Granuloma Piogênico e Fibroma. Foi realizada biópsia excisional que revelou fragmento de mucosa revestido por epitélio pavimentoso estratificado hiperparaqueratinizado exibindo acantose e atrofia. Na lâmina própria notou-se um tecido conjuntivo denso, apresentando numerosos espaços revestidos por endotélio fino preenchido por material eosinofílico, compatível com linfa. Notou-se a presença destes vasos linfáticos logo abaixo do epitélio. Foi estabelecido o diagnóstico final de linfangioma. Clinicamente sua apresentação usual são múltiplas pápulas ou vesículas translúcidas com aspecto que lembra ovos de rã. A coloração pode ser igual à da mucosa adjacente ou avermelhada devido à hemorragia tecidual. O caso apresentado possui características clínicas incomuns como um nódulo solitário de base pediculada em dorso de língua, de crescimento lento, bem circunscrito, assintomático, macio e firme, de coloração semelhante a mucosa e de superfície lisa.</p>			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSOES</b>	CONCLUSÃO: O presente relato mostra um caso atípico de linfangioma em cavidade oral e que deve ser levado em consideração na elaboração de hipóteses diagnósticas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. De Almeida, O. P. Patologia Oral. São Paulo: Artes Médicas, 2016. 2. Paes, S. M. Patologia Oral e Maxilofacial. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 3. Neville, B. Patologia Oral e Maxilofacial. Elsevier, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14414	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		4626346 - LAMEA MOHAMED HOSNI HAGE		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
TITULO	NÓDULO INCOMUM EM PONTA DE LÍNGUA: UMA APRESENTAÇÃO CLÍNICA DIFERENTE DE UMA LESÃO COMUM			
INTRODUCAO	INTRODUÇÃO: Linfangiomas são proliferação focal de tecido linfático bem diferenciado com origem distinta ao sistema linfático. A maioria ocorre em crianças ou adultos jovens, sendo comumente encontrados na região de cabeça e pescoço (75%).			
OBJETIVOS	OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso Linfangioma atípico em cavidade oral			
METODOLOGIA	<p>RELATO DE CASO E DISCUSSÃO: Uma mulher de 46 anos, xantoderma compareceu à Clínica Escola da UNISA com história de sete anos de crescimento de nódulo em ponta de língua assintomático e associado a trauma. Segundo a paciente, a lesão surgiu devido doença periodontal, que levou a mobilidade dentária com posterior diastema ntre os dentes 41 e 42. Ao exame físico extrabucal não se observou alterações faciais. No exame físico intrabucal, observou-se aumento de volume nodular em ápice de língua, medindo aproximadamente 15 mm de diâmetro, de coloração semelhante a mucosa, base pediculada, de superfície lisa e firme à palpação. Os diagnósticos diferenciais primários foram Granuloma Plogênico e Fibroma. Foi realizada biópsia excisional que revelou fragmento de mucosa revestido por epitélio pavimentoso estratificado hiperparaqueratinizado exibindo acantose e atrofia. Na lâmina própria notou-se um tecido conjuntivo denso, apresentando numerosos espaços revestidos por endotélio fino preenchido por material eosinofílico, compatível com linfa. Notou-se a presença destes vasos linfáticos logo abaixo do epitélio. Foi estabelecido o diagnóstico final de linfangioma. Clinicamente sua apresentação usual são múltiplas pápulas ou vesículas translúcidas com aspecto que lembra ovos de rã. A coloração pode ser igual à da mucosa adjacente ou avermelhada devido à hemorragia tecidual. O caso apresentado possui características clínicas incomuns como um nódulo solitário de base pediculada em dorso de língua, de crescimento lento, bem circunscrito, assintomático, macio e firme, de coloração semelhante a mucosa e de superfície lisa.</p>			
RESULTADOS				
CONCLUSOES	CONCLUSÃO: O presente relato mostra um caso atípico de linfangioma em cavidade oral e que deve ser levado em consideração na elaboração de hipóteses diagnósticas.			
REFERENCIAS	1. De Almeida, O. P. Patologia Oral. São Paulo: Artes Médicas, 2016. 2. Paes, S. M. Patologia Oral e Maxilofacial. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 3. Neville, B. Patologia Oral e Maxilofacial. Elsevier, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14414	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		4682076 - GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
TITULO	NÓDULO INCOMUM EM PONTA DE LÍNGUA: UMA APRESENTAÇÃO CLÍNICA DIFERENTE DE UMA LESÃO COMUM			
INTRODUCAO	INTRODUÇÃO: Linfangiomas são proliferação focal de tecido linfático bem diferenciado com origem distinta ao sistema linfático. A maioria ocorre em crianças ou adultos jovens, sendo comumente encontrados na região de cabeça e pescoço (75%).			
OBJETIVOS	OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso Linfangioma atípico em cavidade oral			
METODOLOGIA	<p>RELATO DE CASO E DISCUSSÃO: Uma mulher de 46 anos, xantoderma compareceu à Clínica Escola da UNISA com história de sete anos de crescimento de nódulo em ponta de língua assintomático e associado a trauma. Segundo a paciente, a lesão surgiu devido doença periodontal, que levou a mobilidade dentária com posterior diastema ntre os dentes 41 e 42. Ao exame físico extrabucal não se observou alterações faciais. No exame físico intrabucal, observou-se aumento de volume nodular em ápice de língua, medindo aproximadamente 15 mm de diâmetro, de coloração semelhante a mucosa, base pediculada, de superfície lisa e firme à palpação. Os diagnósticos diferenciais primários foram Granuloma Plogênico e Fibroma. Foi realizada biópsia excisional que revelou fragmento de mucosa revestido por epitélio pavimentoso estratificado hiperparaqueratinizado exibindo acantose e atrofia. Na lâmina própria notou-se um tecido conjuntivo denso, apresentando numerosos espaços revestidos por endotélio fino preenchido por material eosinofílico, compatível com linfa. Notou-se a presença destes vasos linfáticos logo abaixo do epitélio. Foi estabelecido o diagnóstico final de linfangioma. Clinicamente sua apresentação usual são múltiplas pápulas ou vesículas translúcidas com aspecto que lembra ovos de rã. A coloração pode ser igual à da mucosa adjacente ou avermelhada devido à hemorragia tecidual. O caso apresentado possui características clínicas incomuns como um nódulo solitário de base pediculada em dorso de língua, de crescimento lento, bem circunscrito, assintomático, macio e firme, de coloração semelhante a mucosa e de superfície lisa.</p>			
RESULTADOS				
CONCLUSOES	CONCLUSÃO: O presente relato mostra um caso atípico de linfangioma em cavidade oral e que deve ser levado em consideração na elaboração de hipóteses diagnósticas.			
REFERENCIAS	1. De Almeida, O. P. Patologia Oral. São Paulo: Artes Médicas, 2016. 2. Paes, S. M. Patologia Oral e Maxilofacial. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 3. Neville, B. Patologia Oral e Maxilofacial. Elsevier, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14421	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		236420 - CLAUDIO DE OLIVEIRA FILHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka	Luana de Campos	
<b>TITULO</b>	Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da água ozonizada fresca e congelada frente ao Enterococcus Faecalis			
<b>INTRODUCAO</b>	O uso da ozonioterapia (OT) tem sido uma prática crescente nas diversas áreas da saúde, principalmente devido crescimento no número de estudos publicados, os quais, em sua maioria, indicam sua promissora ação imunomoduladora e antimicrobiana. No entanto, por se tratar de uma molécula instável, um dos maiores desafios no trabalho com OT é o tempo clínico e o armazenamento, uma vez que sua eficácia apresenta uma curva de redução imediatamente após sua produção. Buscando encontrar uma forma eficaz de armazenar o ozônio preservando suas propriedades desejáveis, foi desenvolvido este estudo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar, in vitro, a atividade antimicrobiana de água ozonizada recém-produzida (fresca) e congelada em diferentes temperaturas sobre o biofilme de Enterococcus faecalis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo incluiu 4 grupos experimentais, os quais foram divididos de acordo com o tratamento, da seguinte forma: grupo Controle, incluindo água bidestilada estéril (n=9); grupo 3µg, incluindo água ozonizada fresca na concentração de 3 µg/ml (n=9); grupo 3µg -20°C, incluindo água ozonizada na concentração de 3 µg/ml armazenada em freezer a -20°C (n=9); e grupo 3µg -80°C, incluindo água ozonizada na concentração de 3 µg/ml armazenada em freezer a -80°C (n=9).			
<b>RESULTADOS</b>	Não houve diferença estatística entre os grupos Controle e 3µg, sendo ambos ineficazes na eliminação do biofilme. Dentre os grupos que incluíram tratamento OT, o grupo 3µg -80°C foi o único estatisticamente eficaz na redução bacteriana (p(#60)0,05), enquanto o grupo 3µg -20°C apresentou o maior crescimento bacteriano (p(#60)0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Através deste estudo pudemos concluir que o armazenamento de água ozonizada na concentração de 3 µg/ml em freezer a -80°C parece contribuir para a estabilidade da solução e ser eficaz na redução do biofilme de Enterococcus faecalis, porém mais estudos devem ser conduzidos, para que haja maior refinamento na compreensão e confirmação dos dados para uma possível aplicabilidade clínica.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Bocci V. OZONE A New Medical Drug. Springer Science (#38) Business Media; 2005. 336 p. 2. Q. Madrid Declaration on Ozone Therapy (3rd edition) ISCO3 [Internet]. ISCO 3. [citado 5 de outubro de 2022]. Disponível em: <a href="https://isco3.org/madrid-declaration-on-ozone-therapy-3rd-edition-isco3/">https://isco3.org/madrid-declaration-on-ozone-therapy-3rd-edition-isco3/</a> . 3. Nogales CG, Ferreira MB, Montemor AF, Rodrigues MF de A, Lage-Marques JL, Antoniazzi JH. Ozone therapy as an adjuvant for endodontic protocols: microbiological - ex vivo study and cytotoxicity analyses. J Appl Oral Sci Rev FOB. dezembro de 2016;24(6):607-13			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14421	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4902025 - FLAVIA RIBEIRO GOMES GONZALEZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Hiromi Tanaka	Luana de Campos	
<b>TITULO</b>	Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da água ozonizada fresca e congelada frente ao Enterococcus Faecalis			
<b>INTRODUCAO</b>	O uso da ozonioterapia (OT) tem sido uma prática crescente nas diversas áreas da saúde, principalmente devido crescimento no número de estudos publicados, os quais, em sua maioria, indicam sua promissora ação imunomoduladora e antimicrobiana. No entanto, por se tratar de uma molécula instável, um dos maiores desafios no trabalho com OT é o tempo clínico e o armazenamento, uma vez que sua eficácia apresenta uma curva de redução imediatamente após sua produção. Buscando encontrar uma forma eficaz de armazenar o ozônio preservando suas propriedades desejáveis, foi desenvolvido este estudo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar, in vitro, a atividade antimicrobiana de água ozonizada recém-produzida (fresca) e congelada em diferentes temperaturas sobre o biofilme de Enterococcus faecalis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo incluiu 4 grupos experimentais, os quais foram divididos de acordo com o tratamento, da seguinte forma: grupo Controle, incluindo água bidestilada estéril (n=9); grupo 3µg, incluindo água ozonizada fresca na concentração de 3 µg/ml (n=9); grupo 3µg -20°C, incluindo água ozonizada na concentração de 3 µg/ml armazenada em freezer a -20°C (n=9); e grupo 3µg -80°C, incluindo água ozonizada na concentração de 3 µg/ml armazenada em freezer a -80°C (n=9).			
<b>RESULTADOS</b>	Não houve diferença estatística entre os grupos Controle e 3µg, sendo ambos ineficazes na eliminação do biofilme. Dentre os grupos que incluíram tratamento OT, o grupo 3µg -80°C foi o único estatisticamente eficaz na redução bacteriana (p(#60)0,05), enquanto o grupo 3µg -20°C apresentou o maior crescimento bacteriano (p(#60)0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Através deste estudo pudemos concluir que o armazenamento de água ozonizada na concentração de 3 µg/ml em freezer a -80°C parece contribuir para a estabilidade da solução e ser eficaz na redução do biofilme de Enterococcus faecalis, porém mais estudos devem ser conduzidos, para que haja maior refinamento na compreensão e confirmação dos dados para uma possível aplicabilidade clínica.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Bocci V. OZONE A New Medical Drug. Springer Science (#38) Business Media; 2005. 336 p. 2. Q. Madrid Declaration on Ozone Therapy (3rd edition) ISCO3 [Internet]. ISCO 3. [citado 5 de outubro de 2022]. Disponível em: <a href="https://isco3.org/madrid-declaration-on-ozone-therapy-3rd-edition-isco3/">https://isco3.org/madrid-declaration-on-ozone-therapy-3rd-edition-isco3/</a> . 3. Nogales CG, Ferreira MB, Montemor AF, Rodrigues MF de A, Lage-Marques JL, Antoniazzi JH. Ozone therapy as an adjuvant for endodontic protocols: microbiological - ex vivo study and citotoxicity analyses. J Appl Oral Sci Rev FOB. dezembro de 2016;24(6):607-13			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14424	Odontologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4332245 - FELIPE RODRIGUES FARIA ANGELICO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E CETOROLACO NO PÓS-OPERATÓRIO DA REMOÇÃO DE TERCEIROS MOLARES: ESTUDO CLÍNICO, RANDOMIZADO E TRIPLCO CEGO			
<b>INTRODUCAO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente usados na odontologia após procedimentos em que se é esperado uma resposta inflamatória, mas eles podem provocar efeitos indesejáveis importantes nos sistemas cardiovascular e gastrointestinal e também não há um guia claro que auxilie o clínico a decidir se deve optar por esse medicamento ou por outras opções disponíveis, como a dexametasona (corticosteroide), que possui maiores relatos quanto a prescrição no pré-operatório, do que no pós-operatório. Sendo a extração de terceiros molares inferiores impactados um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em odontologia, serve como excelente modelo clínico para o estudo comparativo da ação destes fármacos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a eficácia da dexametasona comparada ao anti-inflamatório não esteroidal (AINE) cetorolaco na redução dos principais sintomas inflamatórios do pós-operatório da extração de terceiros molares impactados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um ensaio clínico, triplo cego e randomizado, com a seleção de pacientes saudáveis, de ambos os gêneros, entre 18 e 35 anos, separados igualmente em dois grupos 1 - DEX (foi administrado 4mg de dexametasona 2 vezes ao dia, durante 3 dias) e 2 - CETO (Foi administrado 10mg de cetorolaco sublingual 3 vezes ao dia, durante 3 dias), contabilizando um total de 18 dentes extraídos na clínica de odontologia da UNISA, e posteriormente foram analisados resultados mediante dor pós-operatória (relatada em escala visual analógica pelo paciente), número de analgésicos de resgate (NAR) e mensuração de edema e trismo (pré-operatório, 48h pós operatório e 7 dias pós operatório);			
<b>RESULTADOS</b>	Nas primeiras 6 horas de pós-operatório, o grupo CETO apresenta percepção de dor significativamente mais baixa comparado ao grupo DEX (P (#60) 0,05 – Holm Sidak), após 12 horas se mantém menor e após 48 horas, os valores se aproximam, sendo CETO o que se mantém menor. Com relação ao número de analgésicos de resgate (NAR) consumidos pós-operatório não foi encontrada diferença estatisticamente relevante para comparação entre os grupos (P = 0,907; teste ANOVA). Com relação aos dados obtidos na mensuração do edema pós-operatório, o grupo DEX apresentou maior edema no período de 48 horas de pós-operatório, já no período de 7 dias, o grupo DEX apresentou redução importante do edema, e o grupo CETO apresentou valores próximos ao de 48 horas. Com relação ao trismo pós-operatório, observa-se que o grupo CETO apresentou valores menores comparado ao grupo DEX e permanece com os menores valores para trismo no período de 7 dias, no entanto sem diferença significativa (P (#62) 0,05 – Holm Sidak).			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, pode-se concluir que o cetorolaco demonstrou ser melhor em comparação a dexametasona para analgesia e redução de inflamação, após a remoção cirúrgica dos terceiros molares impactados, apresentando melhor resultado na diminuição da percepção de dor nas primeiras horas do pós-operatório, além de reduzir o edema e trismo decorrente do processo inflamatório.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. King K, Brar K, Kaltman JJS, Lopez E (2009) O uso de corticosteróides e antiinflamatórios não esteróides para o manejo da dor e inflamação após cirurgia de terceiros molares: uma revisão da literatura. <i>Cirurgia Oral Oral med Oral Pathol Oral Radiol Endod</i> 107:630–640. 2. AVELAR, R. L. et al. Effect of partially selective cyclooxygenase-2 inhibitor in the removal of third molars. <i>J Craniofac Surg</i> , v. 23, n. 2, p. e108-12, Mar 2012. ISSN 1049-2275. Isioridia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. <i>Drug Research</i> . doi:10.1055/a-0637-8948. 3. Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). <i>Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada</i> . Seattle: IASP Press, 2008:15–24.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14424	Odontologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4455061 - HELIDA DELIANE DA COSTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E CETOROLACO NO PÓS-OPERATÓRIO DA REMOÇÃO DE TERCEIROS MOLARES: ESTUDO CLÍNICO, RANDOMIZADO E TRIPOLO CEGO			
<b>INTRODUCAO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente usados na odontologia após procedimentos em que se é esperado uma resposta inflamatória, mas eles podem provocar efeitos indesejáveis importantes nos sistemas cardiovascular e gastrointestinal e também não há um guia claro que auxilie o clínico a decidir se deve optar por esse medicamento ou por outras opções disponíveis, como a dexametasona (corticosteróide), que possui maiores relatos quanto a prescrição no pré-operatório, do que no pós-operatório. Sendo a extração de terceiros molares inferiores impactados um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em odontologia, serve como excelente modelo clínico para o estudo comparativo da ação destes fármacos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a eficácia da dexametasona comparada ao anti-inflamatório não esteroidal (AINE) cetorolaco na redução dos principais sintomas inflamatórios do pós-operatório da extração de terceiros molares impactados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um ensaio clínico, triplo cego e randomizado, com a seleção de pacientes saudáveis, de ambos os gêneros, entre 18 e 35 anos, separados igualmente em dois grupos 1 - DEX (foi administrado 4mg de dexametasona 2 vezes ao dia, durante 3 dias) e 2 - CETO (Foi administrado 10mg de cetorolaco sublingual 3 vezes ao dia, durante 3 dias), contabilizando um total de 18 dentes extraídos na clínica de odontologia da UNISA, e posteriormente foram analisados resultados mediante dor pós-operatória (relatada em escala visual analógica pelo paciente), número de analgésicos de resgate (NAR) e mensuração de edema e trismo (pré-operatório, 48h pós operatório e 7 dias pós operatório);			
<b>RESULTADOS</b>	Nas primeiras 6 horas de pós-operatório, o grupo CETO apresenta percepção de dor significativamente mais baixa comparado ao grupo DEX (P (#60) 0,05 – Holm Sidak), após 12 horas se mantém menor e após 48 horas, os valores se aproximam, sendo CETO o que se mantém menor. Com relação ao número de analgésicos de resgate (NAR) consumidos pós-operatório não foi encontrada diferença estatisticamente relevante para comparação entre os grupos (P = 0,907; teste ANOVA). Com relação aos dados obtidos na mensuração do edema pós-operatório, o grupo DEX apresentou maior edema no período de 48 horas de pós-operatório, já no período de 7 dias, o grupo DEX apresentou redução importante do edema, e o grupo CETO apresentou valores próximos ao de 48 horas. Com relação ao trismo pós-operatório, observa-se que o grupo CETO apresentou valores menores comparado ao grupo DEX e permanece com os menores valores para trismo no período de 7 dias, no entanto sem diferença significativa (P (#62) 0,05 – Holm Sidak).			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, pode-se concluir que o cetorolaco demonstrou ser melhor em comparação a dexametasona para analgesia e redução de inflamação, após a remoção cirúrgica dos terceiros molares impactados, apresentando melhor resultado na diminuição da percepção de dor nas primeiras horas do pós-operatório, além de reduzir o edema e trismo decorrente do processo inflamatório.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. King K, Brar K, Kaltman JJS, Lopez E (2009) O uso de corticosteróides e antiinflamatórios não esteróides para o manejo da dor e inflamação após cirurgia de terceiros molares: uma revisão da literatura. <i>Cirurgia Oral Oral med Oral Pathol Oral Radiol Endod</i> 107:630–640. 2. AVELAR, R. L. et al. Effect of partially selective cyclooxygenase-2 inhibitor in the removal of third molars. <i>J Craniofac Surg</i> , v. 23, n. 2, p. e108-12, Mar 2012. ISSN 1049-2275. Isioridia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. <i>Drug Research</i> . doi:10.1055/a-0637-8948. 3. Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). <i>Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada</i> . Seattle: IASP Press, 2008:15–24.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14424	Odontologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4459679 - LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E CETOROLACO NO PÓS-OPERATÓRIO DA REMOÇÃO DE TERCEIROS MOLARES: ESTUDO CLÍNICO, RANDOMIZADO E TRIPLO CEGO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente usados na odontologia após procedimentos em que se é esperado uma resposta inflamatória, mas eles podem provocar efeitos indesejáveis importantes nos sistemas cardiovascular e gastrointestinal e também não há um guia claro que auxilie o clínico a decidir se deve optar por esse medicamento ou por outras opções disponíveis, como a dexametasona (corticosteróide), que possui maiores relatos quanto a prescrição no pré-operatório, do que no pós-operatório. Sendo a extração de terceiros molares inferiores impactados um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em odontologia, serve como excelente modelo clínico para o estudo comparativo da ação destes fármacos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a eficácia da dexametasona comparada ao anti-inflamatório não esteroidal (AINE) cetorolaco na redução dos principais sintomas inflamatórios do pós-operatório da extração de terceiros molares impactados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um ensaio clínico, triplo cego e randomizado, com a seleção de pacientes saudáveis, de ambos os gêneros, entre 18 e 35 anos, separados igualmente em dois grupos 1 - DEX (foi administrado 4mg de dexametasona 2 vezes ao dia, durante 3 dias) e 2 - CETO (Foi administrado 10mg de cetorolaco sublingual 3 vezes ao dia, durante 3 dias), contabilizando um total de 18 dentes extraídos na clínica de odontologia da UNISA, e posteriormente foram analisados resultados mediante dor pós-operatória (relatada em escala visual analógica pelo paciente), número de analgésicos de resgate (NAR) e mensuração de edema e trismo (pré-operatório, 48h pós operatório e 7 dias pós operatório);			
<b>RESULTADOS</b>	Nas primeiras 6 horas de pós-operatório, o grupo CETO apresenta percepção de dor significativamente mais baixa comparado ao grupo DEX (P (#60) 0,05 – Holm Sidak), após 12 horas se mantém menor e após 48 horas, os valores se aproximam, sendo CETO o que se mantém menor. Com relação ao número de analgésicos de resgate (NAR) consumidos pós-operatório não foi encontrada diferença estatisticamente relevante para comparação entre os grupos (P = 0,907; teste ANOVA). Com relação aos dados obtidos na mensuração do edema pós-operatório, o grupo DEX apresentou maior edema no período de 48 horas de pós-operatório, já no período de 7 dias, o grupo DEX apresentou redução importante do edema, e o grupo CETO apresentou valores próximos ao de 48 horas. Com relação ao trismo pós-operatório, observa-se que o grupo CETO apresentou valores menores comparado ao grupo DEX e permanece com os menores valores para trismo no período de 7 dias, no entanto sem diferença significativa (P (#62) 0,05 – Holm Sidak).			
<b>CONCLUSÕES</b>	Dessa forma, pode-se concluir que o cetorolaco demonstrou ser melhor em comparação a dexametasona para analgesia e redução de inflamação, após a remoção cirúrgica dos terceiros molares impactados, apresentando melhor resultado na diminuição da percepção de dor nas primeiras horas do pós-operatório, além de reduzir o edema e trismo decorrente do processo inflamatório.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. King K, Brar K, Kaltman JJS, Lopez E (2009) O uso de corticosteróides e antiinflamatórios não esteróides para o manejo da dor e inflamação após cirurgia de terceiros molares: uma revisão da literatura. <i>Cirurgia Oral Oral med Oral Pathol Oral Radiol Endod</i> 107:630–640. 2. AVELAR, R. L. et al. Effect of partially selective cyclooxygenase-2 inhibitor in the removal of third molars. <i>J Craniofac Surg</i> , v. 23, n. 2, p. e108-12, Mar 2012. ISSN 1049-2275. Isioridia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. <i>Drug Research</i> . doi:10.1055/a-0637-8948. 3. Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). <i>Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada</i> . Seattle: IASP Press, 2008:15–24.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14424	Odontologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888359 - THIAGO LOPES DE ALMEIDA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E CETOROLACO NO PÓS-OPERATÓRIO DA REMOÇÃO DE TERCEIROS MOLARES: ESTUDO CLÍNICO, RANDOMIZADO E TRIPLCO CEGO			
<b>INTRODUCAO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente usados na odontologia após procedimentos em que se é esperado uma resposta inflamatória, mas eles podem provocar efeitos indesejáveis importantes nos sistemas cardiovascular e gastrointestinal e também não há um guia claro que auxilie o clínico a decidir se deve optar por esse medicamento ou por outras opções disponíveis, como a dexametasona (corticosteróide), que possui maiores relatos quanto a prescrição no pré-operatório, do que no pós-operatório. Sendo a extração de terceiros molares inferiores impactados um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em odontologia, serve como excelente modelo clínico para o estudo comparativo da ação destes fármacos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a eficácia da dexametasona comparada ao anti-inflamatório não esteroidal (AINE) cetorolaco na redução dos principais sintomas inflamatórios do pós-operatório da extração de terceiros molares impactados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um ensaio clínico, triplo cego e randomizado, com a seleção de pacientes saudáveis, de ambos os gêneros, entre 18 e 35 anos, separados igualmente em dois grupos 1 - DEX (foi administrado 4mg de dexametasona 2 vezes ao dia, durante 3 dias) e 2 - CETO (Foi administrado 10mg de cetorolaco sublingual 3 vezes ao dia, durante 3 dias), contabilizando um total de 18 dentes extraídos na clínica de odontologia da UNISA, e posteriormente foram analisados resultados mediante dor pós-operatória (relatada em escala visual analógica pelo paciente), número de analgésicos de resgate (NAR) e mensuração de edema e trismo (pré-operatório, 48h pós operatório e 7 dias pós operatório);			
<b>RESULTADOS</b>	Nas primeiras 6 horas de pós-operatório, o grupo CETO apresenta percepção de dor significativamente mais baixa comparado ao grupo DEX (P (#60) 0,05 – Holm Sidak), após 12 horas se mantém menor e após 48 horas, os valores se aproximam, sendo CETO o que se mantém menor. Com relação ao número de analgésicos de resgate (NAR) consumidos pós-operatório não foi encontrada diferença estatisticamente relevante para comparação entre os grupos (P = 0,907; teste ANOVA). Com relação aos dados obtidos na mensuração do edema pós-operatório, o grupo DEX apresentou maior edema no período de 48 horas de pós-operatório, já no período de 7 dias, o grupo DEX apresentou redução importante do edema, e o grupo CETO apresentou valores próximos ao de 48 horas. Com relação ao trismo pós-operatório, observa-se que o grupo CETO apresentou valores menores comparado ao grupo DEX e permanece com os menores valores para trismo no período de 7 dias, no entanto sem diferença significativa (P (#62) 0,05 – Holm Sidak).			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, pode-se concluir que o cetorolaco demonstrou ser melhor em comparação a dexametasona para analgesia e redução de inflamação, após a remoção cirúrgica dos terceiros molares impactados, apresentando melhor resultado na diminuição da percepção de dor nas primeiras horas do pós-operatório, além de reduzir o edema e trismo decorrente do processo inflamatório.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. King K, Brar K, Kaltman JJS, Lopez E (2009) O uso de corticosteróides e antiinflamatórios não esteróides para o manejo da dor e inflamação após cirurgia de terceiros molares: uma revisão da literatura. <i>Cirurgia Oral Oral med Oral Pathol Oral Radiol Endod</i> 107:630–640. 2. AVELAR, R. L. et al. Effect of partially selective cyclooxygenase-2 inhibitor in the removal of third molars. <i>J Craniofac Surg</i> , v. 23, n. 2, p. e108-12, Mar 2012. ISSN 1049-2275. Isioridia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. <i>Drug Research</i> . doi:10.1055/a-0637-8948. 3. Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). <i>Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada</i> . Seattle: IASP Press, 2008:15–24.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14425	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4393813 - DANIEL SILVA DIAS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Efeitos do exercício de força no volume encefálico de idosos: uma revisão sistemática			
<b>INTRODUCAO</b>	O exercício físico, especialmente o aeróbio, é uma estratégia para reverter ou atenuar a atrofia encefálica em idosos. Apesar do exercício de força ser amplamente prescrito para a população idosa, os potenciais benefícios no volume encefálico ainda não foi sumarizado em uma revisão sistemática.			
<b>OBJETIVOS</b>	Sintetizar a literatura atual sobre intervenções de exercício de força nas alterações no volume encefálico de idosos. Adicionalmente, descrever as principais características dos estudos (país realizado, idade e número de indivíduos, frequência, número de semanas ou meses, protocolos utilizados nas intervenções).			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizamos uma revisão sistemática (PubMed, Embase e Web of Science - desde o início até 1/06/2023) compatível com o guia PRISMA 2020. Ensaios clínicos que investigaram o efeito do treinamento de força (sozinho ou com outros exercícios) no volume encefálico de idosos foram incluídos. As palavras usadas foram: elderly AND Strength Training or Strength Exercise AND Control Group AND brain volume or magnetic resonance imaging. Os títulos e resumos de estudos potencialmente relevantes foram selecionados por dois pesquisadores independentes (LMN e DSD). Os critérios de elegibilidade foram: i) pessoas saudáveis (#38)#8805;60 anos (excluímos Alzheimer, Parkinson, etc); ii) Intervenções com treinamento de força isolado ou combinado com outra intervenção; iii) Estudos com medidas de volume encefálico.			
<b>RESULTADO S</b>	Foram identificados 240 estudos (PubMed=152; Web of Science=75; Embase=78) e 7 estudos atenderam os critérios de inclusão. Os estudos foram publicados entre 2010 e 2023, conduzidos nos Estados Unidos (3 estudos), Canadá (2 estudos), Lituânia e Suíça (1 estudo cada). Compuseram a amostra 1058 idosos (653 no grupo intervenção e 405 no grupo controle). A frequência de exercícios mais comum foi 2 vezes por semana (5 estudos), e a duração mais comum 40 semanas ou mais (4 estudos), o que podemos considerar um período prolongado. Apenas 1 estudo usou exercícios de força isolado, o que sinaliza a necessidade de realização de mais estudos com treino de força isolado. Dos 6 estudos com exercícios combinados uma diversidade de exercícios foi usada (equilíbrio, coordenação, flexibilidade, aeróbio). Em relação as mudanças no volume encefálico pelo exercício, 2 estudos verificaram atenuação da atrofia, 3 estudos não verificaram mudanças, e 2 estudos verificaram diminuição do volume encefálico, o que indica que tal proposta de intervenção não é efetiva para o aumento do volume encefálico.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com os dados apresentados, nota-se que o treino de força não é uma estratégia adequada para aumento do volume encefálico em idosos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Liu-Ambrose T, Nagamatsu LS, Graf P, Beattie BL, Ashe MC, Handy TC. Resistance training and executive functions: a 12-month randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2010. 2. Adcock M, Fankhauser M, Post J, et al. Effects of an In-home Multicomponent Exergame Training on Physical Functions, Cognition, and Brain Volume of Older Adults: A Randomized Controlled Trial. Front Med (Lausanne). 2020. 3. Best JR, Chiu BK, Liang Hsu C, Nagamatsu LS, Liu-Ambrose T. Long-Term Effects of Resistance Exercise Training on Cognition and Brain Volume in Older Women: Results from a Randomized Controlled Trial. J Int Neuropsychol Soc. 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14426	Psiquiatria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441362 - ANA CLARA REIS CARNEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Percepção de solidão se correlaciona com maiores sintomas de ansiedade e pior qualidade de vida relacionada à saúde: uma análise dos dados do "Hospital a Céu Aberto 2022"			
<b>INTRODUCAO</b>	A qualidade de vida relacionada à saúde é um construto subjetivo que indica a percepção de um indivíduo acerca de aspectos de sua vida que estão atrelados à funcionalidade e ao bem-estar. Por partir de uma premissa de saúde holística, os componentes físico e mental são igualmente contemplados e exercem efeito notório nesse importante indicador de saúde. Portanto, condições que afetam a esfera mental devem tornar-se objeto de estudo manejo e prevenção adequados. Nesse paradigma, a solidão demanda atenção, pois relaciona-se com distúrbios neuropsiquiátricos, como a ansiedade, implicando em piores desfechos em saúde.			
<b>OBJETIVOS</b>	Averiguar se há correlação entre solidão e ansiedade e quais são seus impactos na qualidade de vida da população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo observacional transversal, utilizando os seguintes questionários: Beck Anxiety Inventory (BAI) - sintomas de ansiedade; Escala de solidão da Universidade da Califórnia em Los Angeles (Escala UCLA), e Escala Short-Form Health Survey – 36 (SF-36), para analisar a qualidade de vida. Os dados foram coletados no evento "Hospital a Céu Aberto" em agosto de 2022. Nas análises estatísticas utilizamos o software SPSS (análise de correlação (UCLA com SF-36; UCLA com BAI), teste de Mann Whitney (comparação dos grupos maior e menor solidão).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram incluídas no estudo 55 pessoas (39.1±18.1 anos). Notou-se a correlação da pontuação da Escala UCLA com a pontuação da Escala SF-36, tanto para o domínio físico ( $r=-0,444$ ; $p=0,0007$ ) como para o mental ( $r=-0,572$ ; $p(#60)0,0001$ ). Ademais, a pontuação da Escala UCLA se correlaciona com a BAI ( $r=0,629$ , $p(#60)0,0001$ ), sendo o grupo com maior solidão possui também maior escore de sintomas de ansiedade ( $p(#60)0,0001$ ).			
<b>CONCLUSOES</b>	Verificamos correlação entre uma maior percepção de solidão com mais sintomas de ansiedade e pior qualidade de vida. Os avaliados apresentaram piores escores em todos os domínios analisados na qualidade de vida (Capacidade funcional; Limitação por aspectos físicos; Dor; Estado geral de saúde; Vitalidade; Aspectos sociais; Limitação por aspectos emocionais; Saúde mental), solidão e sintomas de ansiedade.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Marquez, D.X.; Aguiñaga, S.; Vásquez, P.M.; Conroy, D.E.; Erickson, K.I.; Hillman, C.; Stillman, C.M.; Ballard, R.M.; Sheppard, B.B.; Petruzzello, S.J.; King, A.C.; Powell, K.E. A Systematic Review Of Physical Activity And Quality Of Life And Well-Being. Translational Behavioral Medicine. Vol. 10, N.5, P. 1098-1109, Out. 2020. 2. Solmi M, Veronese N, Galvano D, Favaro A, Ostinelli EG, Noventa, V, Favaretto E, Tudor, F, Finessi M, Shin Ji, Smith L, Koyanagi A, Cester A, Bolzetta F, Cotroeno A, Maggi S, Demurtas J, Leo DD, Trabucchi M. Factors associated with loneliness: an umbrella review of observational studies. Journal Of Affective Disorders. Vol. 271, P. 131-138, 2020. 3. Hohls JK, König H, Quirke E, Hajek A. Anxiety, Depression and Quality of Life – a systematic review of evidence from longitudinal observational studies. Int J Environ Res Public Health. 2021 nov; 18(22):12022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14429	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4852745 - FERNANDA BEATRIZ ATAIDE SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Tempo de atividade física e comportamento sedentário de adultos autistas			
<b>INTRODUCA O</b>	O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição que afeta o neurodesenvolvimento, afeta 1% da população global, resulta de desenvolvimento cerebral prejudicado e reorganização neural precoce e até o momento não existem biomarcadores para seu diagnóstico. Pouco se sabe das características de adultos brasileiros com TEA, porém é sabido que pessoas com TEA apresentam déficits nas habilidades motoras, baixa participação e motivação reduzida para atividades físicas, a qual pode beneficiar os déficits que acompanham o quadro (comportamentos negativos, como agressão e comportamento estereotipado).			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar o tempo de atividade física e comportamento sedentário de pessoas com TEA e sem TEA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, onde adultos sem diagnóstico de TEA (Grupo CONT - 22 sujeitos) e adultos com diagnóstico de TEA (grupo AUT - 22 sujeitos) responderam via Google Forms dois questionários como segue: 1) Características gerais (idade, peso etc); 2) Questionário IPAQ (International Physical Activity Questionnaire-Short Form – usado para avaliar o tempo de atividade física: caminhada, atividade física moderada e vigorosa). Adicionalmente o questionário AQ-10 (Autism Spectrum Quotient – Adult) foi usado para medir a expressão dos traços do TEA (apenas grupo TEA).			
<b>RESULTADO S</b>	Para as variáveis aferidas pelo IPAQ verificamos diferenças significantes na variável Atividade física moderada: CONT = 73 minutos (42- 190) e TEA = 35 minutos (0 - 102) por semana (p(#60)0.05); Atividade física vigorosa: CONT = 58 minutos (0 - 169) e TEA = 0 minuto (0 - 45) por semana (p(#60)0.05); Atividade física moderada-vigorosa: CONT = 188 minutos (65 - 355) e TEA 65 minutos (0 - 199) (p(#60)0.05). Para as demais variáveis não verificamos diferenças significantes.			
<b>CONCLUSOES</b>	: Adultos com diagnóstico de TEA apresentam menor tempo de AF moderada, vigorosa e moderada-vigorosa que adultos sem diagnóstico de TEA.			
<b>REFERENCIA S</b>	CRAIG, C. L.; MARSHALL, A. L.; SJÖSTRÖM, M.; BAUMAN, A. E. et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. <i>Medicine (#38) science in sports (#38) exercise</i> , 35, n. 8, p. 1381-1395, 2003. ELSABBAGH, M.; DIVAN, G.; KOH, Y. J.; KIM, Y. S. et al. Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. <i>Autism research</i> , 5, n. 3, p. 160-179, 2012. LORD, C.; ELSABBAGH, M.; BAIRD, G.; VEENSTRA-VANDERWEELE, J. Autism spectrum disorder. <i>The Lancet</i> , 392, n. 10146, p. 508-520, 2018/08/11/ 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14431	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4524926 - FELINTO LUCIO DANTAS NETO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise do limite quantitativo para deduções de despesas com instrução			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Dentre as despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF estão as despesas com instrução até o limite anual individual de R\$ 3.561,50. Contra o limite quantitativo, são várias as manifestações doutrinárias que defendem a sua inconstitucionalidade, por ofensa ao direito fundamental da educação. No plano jurisprudencial, merece destaque a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927, ainda pendente de julgamento, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da qual se pretende ver declarada a inconstitucionalidade da norma em análise.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a função dos limites quantitativos para dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF para impedir o agravamento da desigualdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Na ocasião do ajuste anual, devem ser considerados os elementos positivos referentes a totalidade dos rendimentos tributáveis e dos elementos negativos, referentes aos decréscimos patrimoniais relacionados aos pagamentos necessários para a manutenção do mínimo vital e da fonte produtora de rendimentos. Dessa forma, as hipóteses de dedução de despesas da base de cálculo do IRPF assumem papel importante para apuração do acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte em um determinado ano-calendário. Com base no conceito constitucional de renda e em razão da proteção do direito fundamental da educação, são muitos os autores que defendem a inconstitucionalidade do limite quantitativo. Por outro lado, é inegável que a existência da desigualdade educacional no Brasil. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE revelam a desigualdade educacional brasileira é a quinta maior do mundo nos quesitos leitura, matemática e ciências. Ademais disso, é certo que a camada mais desfavorecida da população utiliza serviços públicos de educação. Assim, a ausência de limite quantitativo para dedução de despesas com instrução significaria uma desoneração da camada mais favorecida da população em detrimento de recursos públicos a serem destinados às escolas públicas. Nesse sentido, Silveira, Fernandes e Passos apontam para os efeitos redistributivos da revogação da referida norma de dedução, o que reduziria em 3,3% o índice de Gini (instrumento utilizado para medir o grau de concentração de riqueza).			
<b>CONCLUSÕES</b>	Por mais que se possa discutir se o valor constante da legislação é suficiente para garantia do direito à educação, não se pode perder de vista que a ausência de um limite quantitativo agravaria o problema da desigualdade, contrariando, não só o princípio da igualdade na sua acepção material, mas um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, a redução das desigualdades sociais.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. SILVEIRA, Fernando Gaiger; FERNANDES, Rodrigo Cardoso; PASSOS, Luana. Benefícios Fiscais do Imposto sobre a renda das pessoas físicas e seus impactos redistributivos. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14431	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4575504 - ROSANGELA SANTOS TURINA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise do limite quantitativo para deduções de despesas com instrução			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Dentre as despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF estão as despesas com instrução até o limite anual individual de R\$ 3.561,50. Contra o limite quantitativo, são várias as manifestações doutrinárias que defendem a sua inconstitucionalidade, por ofensa ao direito fundamental da educação. No plano jurisprudencial, merece destaque a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927, ainda pendente de julgamento, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da qual se pretende ver declarada a inconstitucionalidade da norma em análise.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a função dos limites quantitativos para dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF para impedir o agravamento da desigualdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Na ocasião do ajuste anual, devem ser considerados os elementos positivos referentes a totalidade dos rendimentos tributáveis e dos elementos negativos, referentes aos decréscimos patrimoniais relacionados aos pagamentos necessários para a manutenção do mínimo vital e da fonte produtora de rendimentos. Dessa forma, as hipóteses de dedução de despesas da base de cálculo do IRPF assumem papel importante para apuração do acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte em um determinado ano-calendário. Com base no conceito constitucional de renda e em razão da proteção do direito fundamental da educação, são muitos os autores que defendem a inconstitucionalidade do limite quantitativo. Por outro lado, é inegável que a existência da desigualdade educacional no Brasil. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE revelam a desigualdade educacional brasileira é a quinta maior do mundo nos quesitos leitura, matemática e ciências. Ademais disso, é certo que a camada mais desfavorecida da população utiliza serviços públicos de educação. Assim, a ausência de limite quantitativo para dedução de despesas com instrução significaria uma desoneração da camada mais favorecida da população em detrimento de recursos públicos a serem destinados às escolas públicas. Nesse sentido, Silveira, Fernandes e Passos apontam para os efeitos redistributivos da revogação da referida norma de dedução, o que reduziria em 3,3% o índice de Gini (instrumento utilizado para medir o grau de concentração de riqueza).			
<b>CONCLUSÕES</b>	Por mais que se possa discutir se o valor constante da legislação é suficiente para garantia do direito à educação, não se pode perder de vista que a ausência de um limite quantitativo agravaria o problema da desigualdade, contrariando, não só o princípio da igualdade na sua acepção material, mas um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, a redução das desigualdades sociais.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. SILVEIRA, Fernando Gaiger; FERNANDES, Rodrigo Cardoso; PASSOS, Luana. Benefícios Fiscais do Imposto sobre a renda das pessoas físicas e seus impactos redistributivos. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14431	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4708385 - JULIANNA LUCIA DE CARVALHO SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise do limite quantitativo para deduções de despesas com instrução			
<b>INTRODUCAO</b>	Dentre as despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF estão as despesas com instrução até o limite anual individual de R\$ 3.561,50. Contra o limite quantitativo, são várias as manifestações doutrinárias que defendem a sua inconstitucionalidade, por ofensa ao direito fundamental da educação. No plano jurisprudencial, merece destaque a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927, ainda pendente de julgamento, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da qual se pretende ver declarada a inconstitucionalidade da norma em análise.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a função dos limites quantitativos para dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF para impedir o agravamento da desigualdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Na ocasião do ajuste anual, devem ser considerados os elementos positivos referentes a totalidade dos rendimentos tributáveis e dos elementos negativos, referentes aos decréscimos patrimoniais relacionados aos pagamentos necessários para a manutenção do mínimo vital e da fonte produtora de rendimentos. Dessa forma, as hipóteses de dedução de despesas da base de cálculo do IRPF assumem papel importante para apuração do acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte em um determinado ano-calendário. Com base no conceito constitucional de renda e em razão da proteção do direito fundamental da educação, são muitos os autores que defendem a inconstitucionalidade do limite quantitativo. Por outro lado, é inegável que a existência da desigualdade educacional no Brasil. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE revelam a desigualdade educacional brasileira é a quinta maior do mundo nos quesitos leitura, matemática e ciências. Ademais disso, é certo que a camada mais desfavorecida da população utiliza serviços públicos de educação. Assim, a ausência de limite quantitativo para dedução de despesas com instrução significaria uma desoneração da camada mais favorecida da população em detrimento de recursos públicos a serem destinados às escolas públicas. Nesse sentido, Silveira, Fernandes e Passos apontam para os efeitos redistributivos da revogação da referida norma de dedução, o que reduziria em 3,3% o índice de Gini (instrumento utilizado para medir o grau de concentração de riqueza).			
<b>CONCLUSOES</b>	Por mais que se possa discutir se o valor constante da legislação é suficiente para garantia do direito à educação, não se pode perder de vista que a ausência de um limite quantitativo agravaria o problema da desigualdade, contrariando, não só o princípio da igualdade na sua acepção material, mas um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, a redução das desigualdades sociais.			
<b>REFERENCIAS</b>	FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. SILVEIRA, Fernando Gaiger; FERNANDES, Rodrigo Cardoso; PASSOS, Luana. Benefícios Fiscais do Imposto sobre a renda das pessoas físicas e seus impactos redistributivos. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14431	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4781325 - CATIA MARIA MACHADO BEZERRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise do limite quantitativo para deduções de despesas com instrução			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Dentre as despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF estão as despesas com instrução até o limite anual individual de R\$ 3.561,50. Contra o limite quantitativo, são várias as manifestações doutrinárias que defendem a sua inconstitucionalidade, por ofensa ao direito fundamental da educação. No plano jurisprudencial, merece destaque a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927, ainda pendente de julgamento, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da qual se pretende ver declarada a inconstitucionalidade da norma em análise.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a função dos limites quantitativos para dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF para impedir o agravamento da desigualdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Na ocasião do ajuste anual, devem ser considerados os elementos positivos referentes a totalidade dos rendimentos tributáveis e dos elementos negativos, referentes aos decréscimos patrimoniais relacionados aos pagamentos necessários para a manutenção do mínimo vital e da fonte produtora de rendimentos. Dessa forma, as hipóteses de dedução de despesas da base de cálculo do IRPF assumem papel importante para apuração do acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte em um determinado ano-calendário. Com base no conceito constitucional de renda e em razão da proteção do direito fundamental da educação, são muitos os autores que defendem a inconstitucionalidade do limite quantitativo. Por outro lado, é inegável que a existência da desigualdade educacional no Brasil. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE revelam a desigualdade educacional brasileira é a quinta maior do mundo nos quesitos leitura, matemática e ciências. Ademais disso, é certo que a camada mais desfavorecida da população utiliza serviços públicos de educação. Assim, a ausência de limite quantitativo para dedução de despesas com instrução significaria uma desoneração da camada mais favorecida da população em detrimento de recursos públicos a serem destinados às escolas públicas. Nesse sentido, Silveira, Fernandes e Passos apontam para os efeitos redistributivos da revogação da referida norma de dedução, o que reduziria em 3,3% o índice de Gini (instrumento utilizado para medir o grau de concentração de riqueza).			
<b>CONCLUSÕES</b>	Por mais que se possa discutir se o valor constante da legislação é suficiente para garantia do direito à educação, não se pode perder de vista que a ausência de um limite quantitativo agravaria o problema da desigualdade, contrariando, não só o princípio da igualdade na sua acepção material, mas um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, a redução das desigualdades sociais.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. SILVEIRA, Fernando Gaiger; FERNANDES, Rodrigo Cardoso; PASSOS, Luana. Benefícios Fiscais do Imposto sobre a renda das pessoas físicas e seus impactos redistributivos. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14431	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5170222 - MARIANA FERREIRA BEZERRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise do limite quantitativo para deduções de despesas com instrução			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Dentre as despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF estão as despesas com instrução até o limite anual individual de R\$ 3.561,50. Contra o limite quantitativo, são várias as manifestações doutrinárias que defendem a sua inconstitucionalidade, por ofensa ao direito fundamental da educação. No plano jurisprudencial, merece destaque a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927, ainda pendente de julgamento, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da qual se pretende ver declarada a inconstitucionalidade da norma em análise.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a função dos limites quantitativos para dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF para impedir o agravamento da desigualdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Na ocasião do ajuste anual, devem ser considerados os elementos positivos referentes a totalidade dos rendimentos tributáveis e dos elementos negativos, referentes aos decréscimos patrimoniais relacionados aos pagamentos necessários para a manutenção do mínimo vital e da fonte produtora de rendimentos. Dessa forma, as hipóteses de dedução de despesas da base de cálculo do IRPF assumem papel importante para apuração do acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte em um determinado ano-calendário. Com base no conceito constitucional de renda e em razão da proteção do direito fundamental da educação, são muitos os autores que defendem a inconstitucionalidade do limite quantitativo. Por outro lado, é inegável que a existência da desigualdade educacional no Brasil. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE revelam a desigualdade educacional brasileira é a quinta maior do mundo nos quesitos leitura, matemática e ciências. Ademais disso, é certo que a camada mais desfavorecida da população utiliza serviços públicos de educação. Assim, a ausência de limite quantitativo para dedução de despesas com instrução significaria uma desoneração da camada mais favorecida da população em detrimento de recursos públicos a serem destinados às escolas públicas. Nesse sentido, Silveira, Fernandes e Passos apontam para os efeitos redistributivos da revogação da referida norma de dedução, o que reduziria em 3,3% o índice de Gini (instrumento utilizado para medir o grau de concentração de riqueza).			
<b>CONCLUSÕES</b>	Por mais que se possa discutir se o valor constante da legislação é suficiente para garantia do direito à educação, não se pode perder de vista que a ausência de um limite quantitativo agravaria o problema da desigualdade, contrariando, não só o princípio da igualdade na sua acepção material, mas um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, a redução das desigualdades sociais.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. SILVEIRA, Fernando Gaiger; FERNANDES, Rodrigo Cardoso; PASSOS, Luana. Benefícios Fiscais do Imposto sobre a renda das pessoas físicas e seus impactos redistributivos. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14431	Direito Tributário	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5229901 - WESLEY BONFIM DE SANTANA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	Análise do limite quantitativo para deduções de despesas com instrução			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Dentre as despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF estão as despesas com instrução até o limite anual individual de R\$ 3.561,50. Contra o limite quantitativo, são várias as manifestações doutrinárias que defendem a sua inconstitucionalidade, por ofensa ao direito fundamental da educação. No plano jurisprudencial, merece destaque a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927, ainda pendente de julgamento, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da qual se pretende ver declarada a inconstitucionalidade da norma em análise.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do presente trabalho é analisar a função dos limites quantitativos para dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF para impedir o agravamento da desigualdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Na ocasião do ajuste anual, devem ser considerados os elementos positivos referentes a totalidade dos rendimentos tributáveis e dos elementos negativos, referentes aos decréscimos patrimoniais relacionados aos pagamentos necessários para a manutenção do mínimo vital e da fonte produtora de rendimentos. Dessa forma, as hipóteses de dedução de despesas da base de cálculo do IRPF assumem papel importante para apuração do acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte em um determinado ano-calendário. Com base no conceito constitucional de renda e em razão da proteção do direito fundamental da educação, são muitos os autores que defendem a inconstitucionalidade do limite quantitativo. Por outro lado, é inegável que a existência da desigualdade educacional no Brasil. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE revelam a desigualdade educacional brasileira é a quinta maior do mundo nos quesitos leitura, matemática e ciências. Ademais disso, é certo que a camada mais desfavorecida da população utiliza serviços públicos de educação. Assim, a ausência de limite quantitativo para dedução de despesas com instrução significaria uma desoneração da camada mais favorecida da população em detrimento de recursos públicos a serem destinados às escolas públicas. Nesse sentido, Silveira, Fernandes e Passos apontam para os efeitos redistributivos da revogação da referida norma de dedução, o que reduziria em 3,3% o índice de Gini (instrumento utilizado para medir o grau de concentração de riqueza).			
<b>CONCLUSÕES</b>	Por mais que se possa discutir se o valor constante da legislação é suficiente para garantia do direito à educação, não se pode perder de vista que a ausência de um limite quantitativo agravaria o problema da desigualdade, contrariando, não só o princípio da igualdade na sua acepção material, mas um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, a redução das desigualdades sociais.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional. São Paulo: Quartier Latin, 2017. MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. SILVEIRA, Fernando Gaiger; FERNANDES, Rodrigo Cardoso; PASSOS, Luana. Benefícios Fiscais do Imposto sobre a renda das pessoas físicas e seus impactos redistributivos. Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14433	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		603520 - MARCOS ALVES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	EFEITOS REGRESSIVOS NA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A tributação do consumo no Brasil em 2022 foi responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIAS</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">#60</a> <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acesso em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14433	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4323441 - ANDERSON LUIZ SILVA VIEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	EFEITOS REGRESSIVOS NA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A tributação do consumo no Brasil em 2022 foi responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIAS</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acesso em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14433	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4325842 - KAIROS ELIAS PONCIANO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	EFEITOS REGRESSIVOS NA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A tributação do consumo no Brasil em 2022 foi responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIAS</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acessado em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14433	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4379047 - GEOVANA SANTANA DA HORA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	EFEITOS REGRESSIVOS NA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A tributação do consumo no Brasil em 2022 foi responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIAS</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf</a> (#62). Acessado em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acessado em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14433	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4421795 - VANDA FERREIRA ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	EFEITOS REGRESSIVOS NA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A tributação do consumo no Brasil em 2022 foi responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.			
<b>REFERENCIAS</b>	APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">#60</a> <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">#62</a> . Acesso em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a> . Acesso em 30/04/2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14433	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441125 - ANA KEILA CRUZ LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Ulrich Pinto		
<b>TITULO</b>	EFEITOS REGRESSIVOS NA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A tributação do consumo no Brasil em 2022 foi responsável por 40,66% do total da arrecadação tributária, enquanto a tributação sobre todas as outras bases tais como renda, lucro, ganho de capital, herança, folha de salários e propriedade equivalem a 59,33%. Classicamente, a doutrina do Direito Tributário classifica os tributos incidentes sobre o consumo como "tributos indiretos", pois permitem a repercussão do encargo financeiro, que será suportado indiretamente pelo consumidor final ao pagar o preço da mercadoria ou serviço adquirido. Apesar de apresentar algumas vantagens, como o menor índice de evasão e estímulo à poupança, a tributação sobre o consumo vem acompanhada de um indesejável efeito regressivo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O presente artigo busca analisar os efeitos regressivos gerados pelo Sistema Tributário Brasileiro, bem como a influência do mesmo sobre a desigualdade social, ou seja, o objetivo é demonstrar as desigualdade provocada pela tributação sobre o consumo entre "pessoas de maior renda" em detrimento a "pessoas de menor renda" através do efeito regressivo na tributação sobre o consumo.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>O presente estudo se baseia no método de revisão bibliográfica.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A repercussão do encargo financeiro dos tributos indiretos fica evidenciada a partir da circunstância de que o "contribuinte de fato" suportará a carga tributária, que lhe será repassada através do preço pelo "contribuinte de direito". Dessa forma, considerando que a parcela menos favorecida da população consome uma parte maior de sua renda em comparação aos mais ricos, constata-se o efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Na tentativa de mitigar os efeitos descritos acima, a Constituição Federal prevê o princípio da seletividade, que consiste na diferenciação de alíquotas de acordo com a essencialidade das mercadorias ou produtos. Ocorre que a eficiência da seletividade de alíquotas pode ser questionado por múltiplos aspectos, dentre eles: (i) extensão dos benefícios aos mais ricos; (ii) ausência de garantias de repasse das reduções de alíquotas aos preços dos bens e serviços; (iii) subjetivismos na definição do que é essencial, tornando a política pública difícil de ser concretizada; e (iv) potencial criação de contencioso em torno da classificação de produtos visando alíquotas mais favoráveis.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A tributação sobre o consumo é regressiva e agrava o problema da desigualdade. A seletividade não se mostrou capaz de mitigar os referidos efeitos regressivos, sendo necessária a reflexão sobre alternativas para promoção de um sistema tributário mais justo.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em: (#60) <a href="http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62">http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/#62</a>. Acesso em: 11 out. 2023. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: (#60) <a href="https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-P_pof_2017_para_publicacao.pdf">#62</a>. Acesso em: 11 out. 2023. OXFAM. 2017. "A Distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras". Disponível em <a href="https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/">https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/</a>. Acesso em 30/04/2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14435	Clinica Odontológica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4332245 - FELIPE RODRIGUES FARIA ANGELICO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	Dificuldade Diagnóstica de lesão em cavidade oral			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Os LNH (Linfoma Não-Hodgkin) são responsáveis por 60% dos casos de linfomas. O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é a variante mais comum em meio a todos os subtipos de LNH que acometem o sistema estomatognático, representando uma neoplasia agressiva correspondente a 30%-35% do LNH adulto em todo o mundo. O LDGCB representa 68% dos casos de LNH da cavidade oral e a idade média prevalente, nessa região, é de 66 anos. Sendo o sexo feminino o mais afetado, seguindo uma proporção de 2: 1 em relação ao masculino. A principal modalidade terapêutica utilizada para esse tipo de linfoma é a quimioterapia à base de antraciclina (CHOP) ou em associação ao rituximabe (R-CHOP). Além disso, radioterapia e cirurgia entram como terapias coadjuvantes a dependerem da especificidade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é relatar/discutir o caso clinico de LNH de um paciente do do sexo masculino de 65 anos.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Paciente do sexo masculino compareceu a clínica escola de Odontologia da Universidade de Santo Amaro com queixa principal de "Inchaço no rosto". Em exame intrabucal foi observado candidíase eritematosa sem alterações significativas e no exame extraoral foi observado um nódulo em região submandibular do lado direito, com tamanho aproximado de 7cm, de consistência endurecida, de leve mobilidade, de base sésil, com alteração de temperatura e indolor, com hipótese principal de carcinoma metastático. Devido a hipótese, o paciente foi encaminhado ao setor secundário do SUS-Sistema Único de Saúde para realização de biópsia da lesão e posterior encaminhamento para tratamento. A biópsia teve como resultado Linfoma Difuso de Grandes Células B com posterior encaminhamento para o tratamento.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Em exame anatomopatológico os cortes histológicos revelaram fragmentos de neoplasia de diferenciação linfóide composta por lençol de células que são individualmente caracterizadas pelo citoplasma escasso e núcleo basofílico, pequeno e redondo, com muitos vasos sanguíneos de permeio. Tecido adiposo e feixes vasculo-nervosos também foram observados, com diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B. O acometimento é com frequência observado na sexta década de vida, por volta dos 66 anos. Apesar da etiologia do linfoma difuso de grandes células B ainda ser considerada incerta, há na literatura fatores discutidos como de risco, a exemplo de portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), doenças autoimunes, exposição a agentes químicos deletérios, quimioterapia e radiação</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se concluir que é de suma importância a avaliação sistemática pelo cirurgião-dentista devido à heterogeneidade clínica do linfoma difuso de grandes células B e a importância do diagnóstico precoce visando uma maior taxa de sobrevida do paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos e o linfoma não Hodgkin. Disponível em: <a href="https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/">https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/</a> 2. Caso clínico de Linfoma Difuso de Grande Células B em cavidade oral. Disponível em: <a href="https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672">https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672</a></li> <li>3. Linfoma de Não Hodgkin em A.C.Camargo. Disponível em: <a href="https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin">https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin</a></li> </ol>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14435	Clinica Odontológica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4589823 - DANIELE DE SOUSA ALVES BARBOSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	Dificuldade Diagnóstica de lesão em cavidade oral			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os LNH (Linfoma Não-Hodgkin) são responsáveis por 60% dos casos de linfomas. O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é a variante mais comum em meio a todos os subtipos de LNH que acometem o sistema estomatognático, representando uma neoplasia agressiva correspondente a 30%-35% do LNH adulto em todo o mundo. O LDGCB representa 68% dos casos de LNH da cavidade oral e a idade média prevalente, nessa região, é de 66 anos. Sendo o sexo feminino o mais afetado, seguindo uma proporção de 2: 1 em relação ao masculino. A principal modalidade terapêutica utilizada para esse tipo de linfoma é a quimioterapia à base de antraciclina (CHOP) ou em associação ao rituximabe (R-CHOP). Além disso, radioterapia e cirurgia entram como terapias coadjuvantes a dependerem da especificidade.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é relatar/discutir o caso clinico de LNH de um paciente do do sexo masculino de 65 anos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Paciente do sexo masculino compareceu a clínica escola de Odontologia da Universidade de Santo Amaro com queixa principal de "Inchaço no rosto". Em exame intrabucal foi observado candidíase eritematosa sem alterações significativas e no exame extraoral foi observado um nódulo em região submandibular do lado direito, com tamanho aproximado de 7cm, de consistência endurecida, de leve mobilidade, de base sésil, com alteração de temperatura e indolor, com hipótese principal de carcinoma metastático. Devido a hipótese, o paciente foi encaminhado ao setor secundário do SUS-Sistema Único de Saúde para realização de biópsia da lesão e posterior encaminhamento para tratamento. A biópsia teve como resultado Linfoma Difuso de Grandes Células B com posterior encaminhamento para o tratamento.			
<b>RESULTADOS</b>	Em exame anatomopatológico os cortes histológicos revelaram fragmentos de neoplasia de diferenciação linfóide composta por lençol de células que são individualmente caracterizadas pelo citoplasma escasso e núcleo basofílico, pequeno e redondo, com muitos vasos sanguíneos de permeio. Tecido adiposo e feixes vasculo-nervosos também foram observados, com diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B. O acometimento é com frequência observado na sexta década de vida, por volta dos 66 anos. Apesar da etiologia do linfoma difuso de grandes células B ainda ser considerada incerta, há na literatura fatores discutidos como de risco, a exemplo de portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), doenças autoimunes, exposição a agentes químicos deletérios, quimioterapia e radiação			
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se concluir que é de suma importância a avaliação sistemática pelo cirurgião-dentista devido à heterogeneidade clínica do linfoma difuso de grandes células B e a importância do diagnóstico precoce visando uma maior taxa de sobrevida do paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos e o linfoma não Hodgkin. Disponível em: <a href="https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/">https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/</a> 2. Caso clinico de Linfoma Difuso de Grande Células B em cavidade oral. Disponível em: <a href="https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672">https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672</a> 3. Linfoma de Não Hodgkin em A.C.Camargo. Disponível em: <a href="https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin">https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14435	Clinica Odontológica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4611535 - ELISA PERES GOMES LIMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	Dificuldade Diagnóstica de lesão em cavidade oral			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Os LNH (Linfoma Não-Hodgkin) são responsáveis por 60% dos casos de linfomas. O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é a variante mais comum em meio a todos os subtipos de LNH que acometem o sistema estomatognático, representando uma neoplasia agressiva correspondente a 30%-35% do LNH adulto em todo o mundo. O LDGCB representa 68% dos casos de LNH da cavidade oral e a idade média prevalente, nessa região, é de 66 anos. Sendo o sexo feminino o mais afetado, seguindo uma proporção de 2: 1 em relação ao masculino. A principal modalidade terapêutica utilizada para esse tipo de linfoma é a quimioterapia à base de antraciclina (CHOP) ou em associação ao rituximabe (R-CHOP). Além disso, radioterapia e cirurgia entram como terapias coadjuvantes a dependerem da especificidade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é relatar/discutir o caso clinico de LNH de um paciente do do sexo masculino de 65 anos.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Paciente do sexo masculino compareceu a clínica escola de Odontologia da Universidade de Santo Amaro com queixa principal de "Inchaço no rosto". Em exame intrabucal foi observado candidíase eritematosa sem alterações significativas e no exame extraoral foi observado um nódulo em região submandibular do lado direito, com tamanho aproximado de 7cm, de consistência endurecida, de leve mobilidade, de base sésil, com alteração de temperatura e indolor, com hipótese principal de carcinoma metastático. Devido a hipótese, o paciente foi encaminhado ao setor secundário do SUS-Sistema Único de Saúde para realização de biópsia da lesão e posterior encaminhamento para tratamento. A biópsia teve como resultado Linfoma Difuso de Grandes Células B com posterior encaminhamento para o tratamento.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Em exame anatomopatológico os cortes histológicos revelaram fragmentos de neoplasia de diferenciação linfóide composta por lençol de células que são individualmente caracterizadas pelo citoplasma escasso e núcleo basofílico, pequeno e redondo, com muitos vasos sanguíneos de permeio. Tecido adiposo e feixes vasculo-nervosos também foram observados, com diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B. O acometimento é com frequência observado na sexta década de vida, por volta dos 66 anos. Apesar da etiologia do linfoma difuso de grandes células B ainda ser considerada incerta, há na literatura fatores discutidos como de risco, a exemplo de portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), doenças autoimunes, exposição a agentes químicos deletérios, quimioterapia e radiação</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se concluir que é de suma importância a avaliação sistemática pelo cirurgião-dentista devido à heterogeneidade clínica do linfoma difuso de grandes células B e a importância do diagnóstico precoce visando uma maior taxa de sobrevida do paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos e o linfoma não Hodgkin. Disponível em: <a href="https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/">https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/</a> 2. Caso clinico de Linfoma Difuso de Grande Células B em cavidade oral. Disponível em: <a href="https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672">https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672</a></li> <li>3. Linfoma de Não Hodgkin em A.C.Camargo. Disponível em: <a href="https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin">https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin</a></li> </ol>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14435	Clinica Odontológica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4682076 - GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	Dificuldade Diagnóstica de lesão em cavidade oral			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os LNH (Linfoma Não-Hodgkin) são responsáveis por 60% dos casos de linfomas. O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é a variante mais comum em meio a todos os subtipos de LNH que acometem o sistema estomatognático, representando uma neoplasia agressiva correspondente a 30%-35% do LNH adulto em todo o mundo. O LDGCB representa 68% dos casos de LNH da cavidade oral e a idade média prevalente, nessa região, é de 66 anos. Sendo o sexo feminino o mais afetado, seguindo uma proporção de 2: 1 em relação ao masculino. A principal modalidade terapêutica utilizada para esse tipo de linfoma é a quimioterapia à base de antraciclina (CHOP) ou em associação ao rituximabe (R-CHOP). Além disso, radioterapia e cirurgia entram como terapias coadjuvantes a dependerem da especificidade.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é relatar/discutir o caso clinico de LNH de um paciente do do sexo masculino de 65 anos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Paciente do sexo masculino compareceu a clínica escola de Odontologia da Universidade de Santo Amaro com queixa principal de "Inchaço no rosto". Em exame intrabucal foi observado candidíase eritematosa sem alterações significativas e no exame extraoral foi observado um nódulo em região submandibular do lado direito, com tamanho aproximado de 7cm, de consistência endurecida, de leve mobilidade, de base sésil, com alteração de temperatura e indolor, com hipótese principal de carcinoma metastático. Devido a hipótese, o paciente foi encaminhado ao setor secundário do SUS-Sistema Único de Saúde para realização de biópsia da lesão e posterior encaminhamento para tratamento. A biópsia teve como resultado Linfoma Difuso de Grandes Células B com posterior encaminhamento para o tratamento.			
<b>RESULTADOS</b>	Em exame anatomopatológico os cortes histológicos revelaram fragmentos de neoplasia de diferenciação linfóide composta por lençol de células que são individualmente caracterizadas pelo citoplasma escasso e núcleo basofílico, pequeno e redondo, com muitos vasos sanguíneos de permeio. Tecido adiposo e feixes vasculo-nervosos também foram observados, com diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B. O acometimento é com frequência observado na sexta década de vida, por volta dos 66 anos. Apesar da etiologia do linfoma difuso de grandes células B ainda ser considerada incerta, há na literatura fatores discutidos como de risco, a exemplo de portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), doenças autoimunes, exposição a agentes químicos deletérios, quimioterapia e radiação			
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se concluir que é de suma importância a avaliação sistemática pelo cirurgião-dentista devido à heterogeneidade clínica do linfoma difuso de grandes células B e a importância do diagnóstico precoce visando uma maior taxa de sobrevida do paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos e o linfoma não Hodgkin. Disponível em: <a href="https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/">https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/</a> 2. Caso clinico de Linfoma Difuso de Grande Células B em cavidade oral. Disponível em: <a href="https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672">https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672</a> 3. Linfoma de Não Hodgkin em A.C.Camargo. Disponível em: <a href="https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin">https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14435	Clinica Odontológica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4975171 - WILLIAM FELIPE NEVES DE ARAÚJO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	Dificuldade Diagnóstica de lesão em cavidade oral			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os LNH (Linfoma Não-Hodgkin) são responsáveis por 60% dos casos de linfomas. O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é a variante mais comum em meio a todos os subtipos de LNH que acometem o sistema estomatognático, representando uma neoplasia agressiva correspondente a 30%-35% do LNH adulto em todo o mundo. O LDGCB representa 68% dos casos de LNH da cavidade oral e a idade média prevalente, nessa região, é de 66 anos. Sendo o sexo feminino o mais afetado, seguindo uma proporção de 2: 1 em relação ao masculino. A principal modalidade terapêutica utilizada para esse tipo de linfoma é a quimioterapia à base de antraciclina (CHOP) ou em associação ao rituximabe (R-CHOP). Além disso, radioterapia e cirurgia entram como terapias coadjuvantes a dependerem da especificidade.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é relatar/discutir o caso clinico de LNH de um paciente do do sexo masculino de 65 anos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Paciente do sexo masculino compareceu a clínica escola de Odontologia da Universidade de Santo Amaro com queixa principal de "Inchaço no rosto". Em exame intrabucal foi observado candidíase eritematosa sem alterações significativas e no exame extraoral foi observado um nódulo em região submandibular do lado direito, com tamanho aproximado de 7cm, de consistência endurecida, de leve mobilidade, de base sésil, com alteração de temperatura e indolor, com hipótese principal de carcinoma metastático. Devido a hipótese, o paciente foi encaminhado ao setor secundário do SUS-Sistema Único de Saúde para realização de biópsia da lesão e posterior encaminhamento para tratamento. A biópsia teve como resultado Linfoma Difuso de Grandes Células B com posterior encaminhamento para o tratamento.			
<b>RESULTADOS</b>	Em exame anatomopatológico os cortes histológicos revelaram fragmentos de neoplasia de diferenciação linfóide composta por lençol de células que são individualmente caracterizadas pelo citoplasma escasso e núcleo basofílico, pequeno e redondo, com muitos vasos sanguíneos de permeio. Tecido adiposo e feixes vasculo-nervosos também foram observados, com diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B. O acometimento é com frequência observado na sexta década de vida, por volta dos 66 anos. Apesar da etiologia do linfoma difuso de grandes células B ainda ser considerada incerta, há na literatura fatores discutidos como de risco, a exemplo de portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), doenças autoimunes, exposição a agentes químicos deletérios, quimioterapia e radiação			
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se concluir que é de suma importância a avaliação sistemática pelo cirurgião-dentista devido à heterogeneidade clínica do linfoma difuso de grandes células B e a importância do diagnóstico precoce visando uma maior taxa de sobrevivida do paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos e o linfoma não Hodgkin. Disponível em: <a href="https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/">https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41n112/49-62/</a> 2. Caso clinico de Linfoma Difuso de Grande Células B em cavidade oral. Disponível em: <a href="https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672">https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/Fol/article/view/4672</a> 3. Linfoma de Não Hodgkin em A.C.Camargo. Disponível em: <a href="https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin">https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/linfoma-nao-hodgkin</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14439	Psicologia do Ensino e da Aprendizagem	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4467876 - CLAUDIO NEVES LOPES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vera Lucia de Oliveira Ponciano		
<b>TITULO</b>	A Contribuição da Psicopedagogia para o Processo de Aprendizagem do Aprendiz e o Papel do Professor			
<b>INTRODUCAO</b>	Na Psicopedagogia, a compreensão dos sentidos criados na história de vida dos sujeitos, seus vínculos, seus afetos, é uma peça importante da investigação diagnóstica do sujeito aprendiz, a partir do qual se realiza o tratamento psicopedagógico. É nesta perspectiva que consideramos o papel da Psicopedagogia: o olhar para as estruturas de afeto na história de vida, as relações de transferência possíveis e os sentidos e modalidades de aprendizagem se revelam como caminhos de atuação, lugares para onde o olhar sensível do psicopedagogo se dirige, informando sua prática e sua atuação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar a contribuição da Psicopedagogia no processo do aprendiz e o papel do docente no processo de aprendizagem.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia usada para realizar o presente trabalho científico, é de cunho bibliográfico, apoiado em pesquisas de renomados autores como: Aquino (1996) Fernández (2011).			
<b>RESULTADOS</b>	Percebe-se, que ser educador extrapola os limites dos pressupostos metodológicos, e se configura efetivamente como um lugar diferente de atuação, com objetivos pautados na relação do processo de ensino, assim como o processo de aprendizagem. Portanto, a Psicopedagogia tem o desafio de integrar os aspectos cognitivos, afetivos e sociais, de olhar para o processo de aprendizagem considerando assimilação e acomodação, o que envolve o conhecimento, mas também o desejo. Isso significa que é na relação com o outro, na formação do sujeito, que se formam os sentidos da aprendizagem.			
<b>CONCLUSOES</b>	A relação entre docentes e aprendizes deve ser vista como uma que favorece a alteridade, na medida em que o sujeito enxerga o outro e dele se diferencia, criando sua própria modalidade de saber, constituído a partir de suas experiências psíquicas, com formas pessoais de se relacionar, pesquisar, construir o conhecimento. Sendo assim, o papel do Psicopedagogo é justamente analisar as relações transferenciais estabelecidas entre professores/alunos, educadores/educandos, sendo esse o profissional capaz de perceber as posições subjetivas docente/aprendiz, compreendendo os tipos de vínculos estabelecidos e como estes influenciam as modalidades de aprendizagem.			
<b>REFERENCIAS</b>	AQUINO, J. G. A desordem na relação professor-aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. In: AQUINO, J. G. (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 8. ed. São Paulo: Summus, 1996. FERNÁNDEZ, A. Os idiomas do aprendiz: análise das modalidades docentes com famílias, escolas e meios de comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2001.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14444	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3967964 - JÚLIA ANTONELI MUZINATTI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Cuidando de quem cuida: impactos e programas de assistência à saúde mental para profissionais da saúde			
<b>INTRODUCAO</b>	O ambiente hospitalar representa fator importante para o desenvolvimento de sofrimento psíquico nos indivíduos, sejam eles pacientes ou profissionais da saúde. No caso do segundo grupo, o caso parece ser mais grave, ao percebermos que esses profissionais, além de estarem constantemente expostos a fatores de risco, ainda carregam consigo um tabu a respeito da busca por tratamentos ou auxílio psicológico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar e compreender o ambiente hospitalar e seus impactos na equipe de saúde, considerando como este impacto vem sendo abordado na literatura e quais os métodos já observados para auxiliar esses profissionais na manutenção de sua saúde mental.			
<b>METODOLOGIA</b>	METODOLOGIA: O proposto neste projeto é realizar a análise de publicações considerando o método de revisão sistemática, com o objetivo de compreender o fenômeno apresentado e como ele vem sendo tratado na literatura mundial. Foram analisados 31 artigos, selecionados a partir da metodologia PRISMA, nas bases APA, BVS e PUBMED.			
<b>RESULTADOS</b>	RESULTADOS E DISCUSSÃO: Considerando a prevalência de burnout em profissionais da saúde, 57,14% dos artigos apresentaram valores abaixo de 30% de prevalência na população estudada. 28,57% apresentaram valores entre 30 e 60 % de prevalência e 14,29% apresentaram prevalência superior a 60%. 71% dos estudos foram realizados antes da pandemia e por isso não consideraram a COVID-19 como fator de risco. Considerando a existência de programas de promoção e prevenção em saúde mental, apenas 9,68% dos estudos apontaram algum tipo de intervenção. Destes, 33,3% indicaram que o apoio psicológico existia mas não era utilizado pelos profissionais e 66,67% relataram que os programas apresentaram espaço de diálogo e bons resultados iniciais para a melhora dos quadros de transtornos mentais dos profissionais. Com relação aos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais na população estudada, 32,62% indicaram a sobrecarga laboral, 25,81% indicaram o excesso de horas trabalhadas e 16,13% indicaram conflitos com a equipe. Também foi possível perceber que a idade (menos de 30 anos) e o pouco tempo de profissão são fatores significativos para o desenvolvimento de transtornos mentais (12,9% e 19,35% respectivamente). Por fim, foi possível perceber que o medo da covid-19 representou fator de risco importante, estando presente em 88,89% das publicações que levaram em conta a COVID-19 na pesquisa, assim como o medo de infectar parentes, que apareceu em 22,22% de tais publicações.			
<b>CONCLUSOES</b>	CONCLUSÃO: Esta pesquisa nos permitiu perceber que os profissionais da saúde estão amplamente expostos a fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais como o burnout, a depressão e a ansiedade. Apesar de estar clara essa exposição, também foi possível perceber que este não é um tema foco para o desenvolvimento de pesquisas, sendo poucos os trabalhos que buscam entender sobre o tema. Também ficou claro que existem ainda menos pesquisas voltadas para o cuidado desta população, mostrando que o tema aparenta ser pouco difundido na comunidade científica.			
<b>REFERENCIAS</b>	- Albuquerque, F. J. B. De; Melo, C. De F.; Araújo Neto, J. L. De. Avaliação da síndrome de burnout em profissionais da Estratégia Saúde da Família da capital paraibana. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 25, n. 3, p. 542-549, 2012. Araújo, G. S. De et al. Perfil De Trabalhadores De Enfermagem Acompanhados Por Equipe Multiprofissional De Saúde Mental. Rev. Rene., v. 15, n. 2, p. 257-263, 2014. Barreto, M. Da S. et al. Stress and Burnout Among Healthcare Professionals of the Emergency Room During the Covid-19 Pandemic. Ciencia, Cuidado e Saude, v. 20, p. 1-9, 1 jan. 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14448	Odontologia	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888332 - LEONARDO DINIZ RESENDE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Yeon Jung Kim	Debora Pallos	
<b>TITULO</b>	BIOMARCADORES NA SALIVA DE PACIENTES EM SEPSE			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora a vida e caracterizada por uma resposta imunológica desregulada do hospedeiro frente a uma infecção. Diversos biomarcadores tem sido avaliados para múltiplas finalidades em pacientes em sepse, podendo ser utilizados para fins diagnósticos, tratamento e prognóstico. O Torquetenovirus (TTV) causa viremia persistente e é muito prevalente em diversas populações ao redor do mundo. Não é causador de doença e sua carga viral tem sido relacionada com a grau imunocompetência do hospedeiro. A Interleucina 6 (IL-6) é uma citocina pleiotrópica importante no sistema imune e altos níveis de IL-6 no sangue são relacionados com risco elevado de sepse.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho foi determinar os polimorfismos de IL-6 e quantificar a carga viral do TTV na saliva de pacientes em sepse, visando estabelecer uma possível relação entre sepse e ambos biomarcadores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para tanto, foram coletadas 115 amostras de saliva, sendo divididas em três grupos: grupo com sepse, grupo doente sem sepse e grupo saudável. A carga viral do TTV foi quantificada e os polimorfismos da IL-6 determinados através do RT-PCR.			
<b>RESULTADOS</b>	Uma vez que os dados foram obtidos e analisados, foi possível concluir que os pacientes do grupo sepse apresentaram maiores níveis de TTV, exibindo uma média de 4.420.223 cópias de TTV/mL enquanto o grupo doente sem sepse apresentou 2.106.683 cópias de TTV/mL e o grupo controle 980.929. Com relação a distribuição dos genes da IL-6, não foi possível observar diferença estatística entre os genótipos encontrados, entre polimorfismo da IL-6 e os desfechos clínicos e nem associação entre o polimorfismo da IL-6 e a quantificação do TTV.			
<b>CONCLUSOES</b>	Logo, não foi possível determinar influência do polimorfismo da IL-6 nos desfechos clínicos e também não foi possível correlacionar o TTV com os polimorfismos da IL-6, que se mostraram variáveis independentes. Entretanto, o aumento dos níveis da carga viral do TTV pode estar relacionado com a condição de deterioramento do quadro clínico dos pacientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Jiménez-Sousa MA, et al. IL-6 rs1800795 polymorphism is associated with septic shock-related death in patients who underwent major surgery: a preliminary retrospective study. <i>Ann Intensive Care.</i> dezembro de 2017;7(1):22. 2. Hotchkiss RS, Monneret G, Payen D. Immunosuppression in sepsis: a novel understanding of the disorder and a new therapeutic approach. <i>The Lancet Infectious Diseases.</i> março de 2013;13(3):260–8. 3. Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). <i>JAMA.</i> 23 de fevereiro de 2016;315(8):801. 4. Evans L, et al. Executive Summary: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for the Management of Sepsis and Septic Shock 2021. <i>Critical Care Medicine.</i> novembro de 2021;49(11):1974–82. 5. Pierrakos C, Velissaris D, Bisdorff M, Marshall JC, Vincent JL. Biomarkers of sepsis: time for a reappraisal. <i>Crit Care.</i> dezembro de 2020;24(1):287.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14450	Odontologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4332245 - FELIPE RODRIGUES FARIA ANGELICO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso	ANGELA ALVES DE AGUIAR GOTO, FRANCISCO ROGERIO AGUIAR DE MENEZES	
<b>TITULO</b>	Tratamento de reconstrução óssea após remoção de cisto periapical inflamatório com o uso do sticky bone associado ao PRF e TDP: relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	O cisto inflamatório radicular se desenvolve ao redor do ápice de raízes em que se persistem inflamação O tratamento indicado para os cistos inflamatórios varia de acordo com a extensão da lesão, o plasma rico em fibrina associado ao enxertos ósseos, é um dos tratamentos possíveis. Além disso a terapia fotodinâmica é uma alternativa para o tratamento de infecções bacterianas. Sendo um técnica com poucos efeitos colaterais, além do laser ser capaz de promover melhores pós-operatórios quando utilizados após o procedimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do deste trabalho é relatar um caso clínico de um paciente diagnosticado com cisto radicular inflamatório, que foi submetido a terapia fotodinâmica e o uso de enxerto ósseo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um relato de caso demonstrando o uso de terapias complementares no tratamento reconstrutivo de lesões ósseas.			
<b>RESULTADOS</b>	Paciente T.S.S., mulher, 31 anos, melanoderma, sem alterações sistêmicas, foi encaminhada para o tratamento de lesão cística em região anterior de maxila, acometendo área dos dentes 12,11,21,22 e 23. O acesso foi realizado, e a enucleação associado a curetagem da lesão foram realizados. O material foi encaminhado para exame anatomopatológico. Foi executado a apicectomia dos elementos 21, 22 e 23 e a obturação retrógrada. A terapia fotodinâmica com azul de metileno associado com a irradiação com laser vermelho foi realizada no local acessado. Então em seguida, foi colocado o enxerto sticky bone ao plasma rico em fibrina A modalidade de escolha dos autores para abordagem do defeito ósseo foi a utilização de sticky bone associado ao PRF, que consiste num enxerto ósseo de estrutura gelatinosa que facilita sua manipulação e adaptação ao defeito ósseo, além de ser rico em fatores de crescimento que aceleram a regeneração do tecido ósseo. Com isso, visando menor taxa de infecção na região abordada e gerar melhor conforto no pós-operatório ao paciente foi optado pela laserterapia. Além de apresentar baixo custo, baixa toxicidade do corante, mínimos efeitos colaterais, apresenta também uma redução da probabilidade de recorrência.			
<b>CONCLUSOES</b>	Desta forma, pode-se concluir que, neste caso relatado, o uso de terapias complementares, como aplicação de enxertos com PRF e terapia fotodinâmica, após a remoção de cisto inflamatório, demonstrou bons resultados na regeneração ósseo.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Jonhson NR, Gannon OM, Savage NW, et al. Frequency of odontogenic cysts and tumor: a systematic review. Journal of Investigative and Clinical Dentistry 2013; 4: 1-7. 2. Kumar MS, Kumar MH, Vishalakshi K, et al. Radiographic Assessment of Bone Formation Using rhBMP2 at Maxillary Periapical Surgical Defects: A Case Series. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2016; 10(4): ZR01-ZR04. 3. NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, 912 p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14450	Odontologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888359 - THIAGO LOPES DE ALMEIDA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso	ANGELA ALVES DE AGUIAR GOTO, FRANCISCO ROGERIO AGUIAR DE MENEZES	
<b>TITULO</b>	Tratamento de reconstrução óssea após remoção de cisto periapical inflamatório com o uso do sticky bone associado ao PRF e TDP: relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	O cisto inflamatório radicular se desenvolve ao redor do ápice de raízes em que se persistem inflamação O tratamento indicado para os cistos inflamatórios varia de acordo com a extensão da lesão, o plasma rico em fibrina associado ao enxertos ósseos, é um dos tratamentos possíveis. Além disso a terapia fotodinâmica é uma alternativa para o tratamento de infecções bacterianas. Sendo um técnica com poucos efeitos colaterais, além do laser ser capaz de promover melhores pós-operatórios quando utilizados após o procedimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do deste trabalho é relatar um caso clínico de um paciente diagnosticado com cisto radicular inflamatório, que foi submetido a terapia fotodinâmica e o uso de enxerto ósseo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um relato de caso demonstrando o uso de terapias complementares no tratamento reconstrutivo de lesões ósseas.			
<b>RESULTADOS</b>	Paciente T.S.S., mulher, 31 anos, melanoderma, sem alterações sistêmicas, foi encaminhada para o tratamento de lesão cística em região anterior de maxila, acometendo área dos dentes 12,11,21,22 e 23. O acesso foi realizado, e a enucleação associado a curetagem da lesão foram realizados. O material foi encaminhado para exame anatomopatológico. Foi executado a apicectomia dos elementos 21, 22 e 23 e a obturação retrógrada. A terapia fotodinâmica com azul de metileno associado com a irradiação com laser vermelho foi realizada no local acessado. Então em seguida, foi colocado o enxerto sticky bone ao plasma rico em fibrina A modalidade de escolha dos autores para abordagem do defeito ósseo foi a utilização de sticky bone associado ao PRF, que consiste num enxerto ósseo de estrutura gelatinosa que facilita sua manipulação e adaptação ao defeito ósseo, além de ser rico em fatores de crescimento que aceleram a regeneração do tecido ósseo. Com isso, visando menor taxa de infecção na região abordada e gerar melhor conforto no pós-operatório ao paciente foi optado pela laserterapia. Além de apresentar baixo custo, baixa toxicidade do corante, mínimos efeitos colaterais, apresenta também uma redução da probabilidade de recorrência.			
<b>CONCLUSOES</b>	Desta forma, pode-se concluir que, neste caso relatado, o uso de terapias complementares, como aplicação de enxertos com PRF e terapia fotodinâmica, após a remoção de cisto inflamatório, demonstrou bons resultados na regeneração ósseo.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Jonhson NR, Gannon OM, Savage NW, et al. Frequency of odontogenic cysts and tumor: a systematic review. Journal of Investigative and Clinical Dentistry 2013; 4: 1-7. 2. Kumar MS, Kumar MH, Vishalakshi K, et al. Radiographic Assessment of Bone Formation Using rhBMP2 at Maxillary Periapical Surgical Defects: A Case Series. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2016; 10(4): ZR01-ZR04. 3. NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, 912 p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14452	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135849 - GABRIELA DOS ANJOS CRUZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE À AUSÊNCIA DE FAMILIARES NO PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO DO SUJEITO IDOSO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O sujeito idoso possui características próprias decorrentes do processo do envelhecimento, bem como uma frequência maior em internações. Nesse sentido, a família entra como um ponto de apoio e suporte durante esse período, além de auxiliar o idoso em questões relacionadas à rotina dentro do hospital, porém, nem sempre a família consegue estar presente. Sendo assim, essa ausência pode refletir no processo de hospitalização do idoso, causando receio e angústia. A Psicologia Hospitalar, enquanto área da saúde, atua na minimização do sofrimento decorrente do processo de hospitalização. Diante da ausência do familiar, o profissional necessita compreender qual a atuação com o público idoso visando o mínimo de sofrimento pelas questões envolvidas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Sistematizar a atuação do psicólogo no atendimento com pacientes idosos hospitalizados frente à ausência de seus familiares.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica, com busca de artigos publicados nas bases de dados BVS, PubMed e Scielo entre os anos de 2013 e 2023, nos idiomas: português.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSÕES</b>	A partir das pesquisas realizadas foi localizado um número escasso de artigos da Psicologia na atuação com o sujeito idoso hospitalizado frente à ausência de familiares, sendo a maioria de revistas da Enfermagem. Sugere-se novas pesquisas acerca do tema, em períodos maiores e em outros idiomas para a localização de artigos da área da Psicologia com o público idoso.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>. ANGERAMI – Camon, V. et al. Psicologia Hospitalar: Teoria e Prática. 1. Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1994. 2. BAPTISTA, M. N. Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018 3. ZIMERMANN, G. I. Velhice: Aspectos Biopsicossociais. Porto Alegre: Artmed, 2000.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14453	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3944425 - LETICIA LINS CARNEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico precoce da personalidade antisocial: o papel da avaliação psicológica infantil			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, moldando os alicerces psicológicos e emocionais que acompanham um indivíduo ao longo de sua vida. Contudo, quando essa etapa é marcada por experiências de maus-tratos, os efeitos podem ser profundos e duradouros. Um tema de grande interesse e relevância no campo da psicologia é a relação entre a exposição a maus-tratos na infância e o desenvolvimento posterior de traços psicopáticos. Este fenômeno complexo tem sido objeto de intensa investigação, pois compreender suas implicações não apenas lança luz sobre os mecanismos subjacentes à psicopatia, mas também oferece insights valiosos para a prevenção e intervenção precoce.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O artigo em questão busca aprofundar a compreensão da complexa relação entre maus-tratos na infância e o subsequente desenvolvimento de traços psicopáticos. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, como analisar a evidência empírica, compreender os mecanismos biológicos e psicológicos envolvidos, avaliar a influência de fatores sociais e discutir sobre diagnóstico e tratamento.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A pesquisa utilizou uma abordagem metodológica que envolveu a análise fílmica e de conteúdo, concentrando-se na obra "A Ira de um anjo", o qual, fora baseado na história real de Beth Thomas, uma criança que sofreu abusos e negligência extremos em seus primeiros anos de vida.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O estudo busca enriquecer a compreensão dessa relação, oferecendo uma perspectiva única e contextualizada por meio da interpretação cuidadosa das representações cinematográficas. Além disso, a análise ressalta o poder da resiliência humana. A trajetória de Beth, embora marcada por adversidades extremas, também revela sua capacidade de superação e transformação ao longo do tempo. Isso demonstra que, mesmo diante de experiências traumáticas devastadoras, a recuperação e a busca por uma vida mais equilibrada são possíveis com o suporte adequado.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Ao combinar a análise da obra audiovisual com a revisão da literatura científica, o artigo proporciona uma visão abrangente e aprofundada sobre o tema, contribuindo para o avanço do conhecimento nessa área crucial da psicologia e saúde mental.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Davoglio, T. R., Gauer, G. C. J., Jaeger, J. V. H., (#38) Tolloti, M. D. (2012). Personalidade e psicopatia: implicações diagnósticas na infância e adolescência. Estudos de Psicologia (Natal), v. 17(3), 453-460. Ericksen, L., (#38) do Nascimento, M. C. L. M. (2018). Psicopatia, Infância e (Ir) Reversibilidade. Revista FIDES, 9(1), 77-100. Garcia, E. (2016). Pesquisa Bibliográfica Versus Revisão Bibliográfica - Uma Discussão Necessária. Linguas (#38) Amp; Letras, 17(35), 01-04. Gao, Y., Huang, Y., (#38) Li, X. (2021). Pais egoístas, práticas parentais e traços psicopáticos em crianças. Ciências do comportamento e a lei, 39 (5), 624-640.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14453	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4140125 - ALESSANDRA DE MELLO NARDI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico precoce da personalidade antisocial: o papel da avaliação psicológica infantil			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, moldando os alicerces psicológicos e emocionais que acompanham um indivíduo ao longo de sua vida. Contudo, quando essa etapa é marcada por experiências de maus-tratos, os efeitos podem ser profundos e duradouros. Um tema de grande interesse e relevância no campo da psicologia é a relação entre a exposição a maus-tratos na infância e o desenvolvimento posterior de traços psicopáticos. Este fenômeno complexo tem sido objeto de intensa investigação, pois compreender suas implicações não apenas lança luz sobre os mecanismos subjacentes à psicopatia, mas também oferece insights valiosos para a prevenção e intervenção precoce.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O artigo em questão busca aprofundar a compreensão da complexa relação entre maus-tratos na infância e o subsequente desenvolvimento de traços psicopáticos. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, como analisar a evidência empírica, compreender os mecanismos biológicos e psicológicos envolvidos, avaliar a influência de fatores sociais e discutir sobre diagnóstico e tratamento.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A pesquisa utilizou uma abordagem metodológica que envolveu a análise fílmica e de conteúdo, concentrando-se na obra "A Ira de um anjo", o qual, fora baseado na história real de Beth Thomas, uma criança que sofreu abusos e negligência extremos em seus primeiros anos de vida.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O estudo busca enriquecer a compreensão dessa relação, oferecendo uma perspectiva única e contextualizada por meio da interpretação cuidadosa das representações cinematográficas. Além disso, a análise ressalta o poder da resiliência humana. A trajetória de Beth, embora marcada por adversidades extremas, também revela sua capacidade de superação e transformação ao longo do tempo. Isso demonstra que, mesmo diante de experiências traumáticas devastadoras, a recuperação e a busca por uma vida mais equilibrada são possíveis com o suporte adequado.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Ao combinar a análise da obra audiovisual com a revisão da literatura científica, o artigo proporciona uma visão abrangente e aprofundada sobre o tema, contribuindo para o avanço do conhecimento nessa área crucial da psicologia e saúde mental.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Davoglio, T. R., Gauer, G. C. J., Jaeger, J. V. H., (#38) Tolloti, M. D. (2012). Personalidade e psicopatia: implicações diagnósticas na infância e adolescência. Estudos de Psicologia (Natal), v. 17(3), 453-460. Ericksen, L., (#38) do Nascimento, M. C. L. M. (2018). Psicopatia, Infância e (Ir) Reversibilidade. Revista FIDES, 9(1), 77-100. Garcia, E. (2016). Pesquisa Bibliográfica Versus Revisão Bibliográfica - Uma Discussão Necessária. Linguas (#38) Amp; Letras, 17(35), 01-04. Gao, Y., Huang, Y., (#38) Li, X. (2021). Pais egoístas, práticas parentais e traços psicopáticos em crianças. Ciências do comportamento e a lei, 39 (5), 624-640.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14453	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4140141 - IZABELA DE MELLO SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico precoce da personalidade antisocial: o papel da avaliação psicológica infantil			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, moldando os alicerces psicológicos e emocionais que acompanham um indivíduo ao longo de sua vida. Contudo, quando essa etapa é marcada por experiências de maus-tratos, os efeitos podem ser profundos e duradouros. Um tema de grande interesse e relevância no campo da psicologia é a relação entre a exposição a maus-tratos na infância e o desenvolvimento posterior de traços psicopáticos. Este fenômeno complexo tem sido objeto de intensa investigação, pois compreender suas implicações não apenas lança luz sobre os mecanismos subjacentes à psicopatia, mas também oferece insights valiosos para a prevenção e intervenção precoce.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O artigo em questão busca aprofundar a compreensão da complexa relação entre maus-tratos na infância e o subsequente desenvolvimento de traços psicopáticos. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos, como analisar a evidência empírica, compreender os mecanismos biológicos e psicológicos envolvidos, avaliar a influência de fatores sociais e discutir sobre diagnóstico e tratamento.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A pesquisa utilizou uma abordagem metodológica que envolveu a análise filmica e de conteúdo, concentrando-se na obra "A Ira de um anjo", o qual, fora baseado na história real de Beth Thomas, uma criança que sofreu abusos e negligência extremos em seus primeiros anos de vida.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>O estudo busca enriquecer a compreensão dessa relação, oferecendo uma perspectiva única e contextualizada por meio da interpretação cuidadosa das representações cinematográficas. Além disso, a análise ressalta o poder da resiliência humana. A trajetória de Beth, embora marcada por adversidades extremas, também revela sua capacidade de superação e transformação ao longo do tempo. Isso demonstra que, mesmo diante de experiências traumáticas devastadoras, a recuperação e a busca por uma vida mais equilibrada são possíveis com o suporte adequado.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Ao combinar a análise da obra audiovisual com a revisão da literatura científica, o artigo proporciona uma visão abrangente e aprofundada sobre o tema, contribuindo para o avanço do conhecimento nessa área crucial da psicologia e saúde mental.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>Davoglio, T. R., Gauer, G. C. J., Jaeger, J. V. H., (#38) Tolloti, M. D. (2012). Personalidade e psicopatia: implicações diagnósticas na infância e adolescência. Estudos de Psicologia (Natal), v. 17(3), 453-460. Ericksen, L., (#38) do Nascimento, M. C. L. M. (2018). Psicopatia, Infância e (Ir) Reversibilidade. Revista FIDES, 9(1), 77-100. Garcia, E. (2016). Pesquisa Bibliográfica Versus Revisão Bibliográfica - Uma Discussão Necessária. Linguas (#38) Amp; Letras, 17(35), 01-04. Gao, Y., Huang, Y., (#38) Li, X. (2021). Pais egoístas, práticas parentais e traços psicopáticos em crianças. Ciências do comportamento e a lei, 39 (5), 624-640.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14454	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4044177 - FABIANE CERQUEIRA CINTRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Adoção Tardia			
<b>INTRODUCAO</b>	A adoção tardia se configura como a adoção de crianças acima de dois anos de idade, conhecida também como adoção moderna. (Machado et al, 2015). O presente artigo apresenta os aspectos emocionais e psicológicos que envolvem o processo de adoção moderna e a criação de vínculos afetivos no relacionamento entre pais e filhos inseridos neste contexto. Explorando como a psicologia pode contribuir no processo de adoção tardia, auxiliando na criação de vínculos, promovendo relacionamentos mais saudáveis e assegurando o desenvolvimento emocional de pais e crianças no processo de adoção.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar qual o papel do fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e filhos na adoção tardia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, que consiste em um método que se realiza a partir de registros já disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, livros, teses e artigos. Utilizando de dados teóricos já trabalhados por outros pesquisadores, que tiveram seus textos publicados.			
<b>RESULTADOS</b>	Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram a preferência das pessoas querendo adotar bebês. Uma média de 41% coloca como prioridade crianças com até um ano de idade, 54% preferem crianças de três anos de idade e 5% se colocam à disposição para adotar crianças com até 10 anos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informa que 45.331 crianças estão em centros de acolhimento em todo o país. Pensando em crianças que estão enquadradas em um modelo ideal para adoção pela sociedade, apenas 5.469 desse número estaria apto para adoção. Ainda com base nos dados coletados pelo CNJ, nota-se que as crianças nas instituições em sua maioria são do sexo masculino, afrodescendentes e mais velhos (entre 5 e 15 anos – 61,3%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O presente trabalho tem por finalidade salientar a importância da construção de vínculos afetivos na adoção tardia. Diante dos resultados pesquisados, a dificuldade dessa adoção ainda é frequente, muitos pais que estão em busca de adotar dão preferência para crianças de até 3 anos de idade, pois há um medo de não criarem vínculos tão facilmente como com um bebê. Será necessário por parte dos pais adotivos maior compreensão com a criança adotada, a fim de tornar um ambiente familiar seguro e saudável, e o processo de adoção menos desconfortável para ambos.			
<b>REFERENCIAS</b>	Barros J, Ribeiro P, Souza L. Os aspectos psicológicos da criança e do adolescente na adoção tardia. Psicologia: Ciência e Profissão. 2021; 41, 1-13. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/fjpcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHz/">https://www.scielo.br/fjpcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHz/</a> (#38)#8239; Bicca A, Grzybowski L. Adoção tardia: percepções dos adotantes em relação aos períodos iniciais de adaptação. (#38)#8239; Contextos Clínicos. 2014; 7(2): 155-167. Disponível em: <a href="http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext">http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext</a> . Machado L, Ferreira R, Seron P. Adoção de crianças maiores: (#38)#8239; Sobre aspectos legais e Construção do vínculo afetivo. Estudos Interdisciplinares em Psicologia. 2015; 6(1): 1-17. Disponível em: <a href="https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125">https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14454	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4094581 - SABRINA DOS SANTOS RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Adoção Tardia			
<b>INTRODUCAO</b>	A adoção tardia se configura como a adoção de crianças acima de dois anos de idade, conhecida também como adoção moderna. (Machado et al, 2015). O presente artigo apresenta os aspectos emocionais e psicológicos que envolvem o processo de adoção moderna e a criação de vínculos afetivos no relacionamento entre pais e filhos inseridos neste contexto. Explorando como a psicologia pode contribuir no processo de adoção tardia, auxiliando na criação de vínculos, promovendo relacionamentos mais saudáveis e assegurando o desenvolvimento emocional de pais e crianças no processo de adoção.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar qual o papel do fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e filhos na adoção tardia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, que consiste em um método que se realiza a partir de registros já disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, livros, teses e artigos. Utilizando de dados teóricos já trabalhados por outros pesquisadores, que tiveram seus textos publicados.			
<b>RESULTADOS</b>	Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram a preferência das pessoas querendo adotar bebês. Uma média de 41% coloca como prioridade crianças com até um ano de idade, 54% preferem crianças de três anos de idade e 5% se colocam à disposição para adotar crianças com até 10 anos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informa que 45.331 crianças estão em centros de acolhimento em todo o país. Pensando em crianças que estão enquadradas em um modelo ideal para adoção pela sociedade, apenas 5.469 desse número estaria apto para adoção. Ainda com base nos dados coletados pelo CNJ, nota-se que as crianças nas instituições em sua maioria são do sexo masculino, afrodescendentes e mais velhos (entre 5 e 15 anos – 61,3%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O presente trabalho tem por finalidade salientar a importância da construção de vínculos afetivos na adoção tardia. Diante dos resultados pesquisados, a dificuldade dessa adoção ainda é frequente, muitos pais que estão em busca de adotar dão preferência para crianças de até 3 anos de idade, pois há um medo de não criarem vínculos tão facilmente como com um bebê. Será necessário por parte dos pais adotivos maior compreensão com a criança adotada, a fim de tornar um ambiente familiar seguro e saudável, e o processo de adoção menos desconfortável para ambos.			
<b>REFERENCIAS</b>	Barros J, Ribeiro P, Souza L. Os aspectos psicológicos da criança e do adolescente na adoção tardia. Psicologia: Ciência e Profissão. 2021; 41, 1-13. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/f/pcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHz/">https://www.scielo.br/f/pcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHz/</a> (#38)#8239; Bicca A, Grzybowski L. Adoção tardia: percepções dos adotantes em relação aos períodos iniciais de adaptação. (#38)#8239; Contextos Clínicos. 2014; 7(2): 155-167. Disponível em: <a href="http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext">http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext</a> . Machado L, Ferreira R, Seron P. Adoção de crianças maiores: (#38)#8239; Sobre aspectos legais e Construção do vínculo afetivo. Estudos Interdisciplinares em Psicologia. 2015; 6(1): 1-17. Disponível em: <a href="https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125">https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14454	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4102916 - VIVIANE COSTA QUEIROZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Adoção Tardia			
<b>INTRODUCAO</b>	A adoção tardia se configura como a adoção de crianças acima de dois anos de idade, conhecida também como adoção moderna. (Machado et al, 2015). O presente artigo apresenta os aspectos emocionais e psicológicos que envolvem o processo de adoção moderna e a criação de vínculos afetivos no relacionamento entre pais e filhos inseridos neste contexto. Explorando como a psicologia pode contribuir no processo de adoção tardia, auxiliando na criação de vínculos, promovendo relacionamentos mais saudáveis e assegurando o desenvolvimento emocional de pais e crianças no processo de adoção.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar qual o papel do fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e filhos na adoção tardia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, que consiste em um método que se realiza a partir de registros já disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, livros, teses e artigos. Utilizando de dados teóricos já trabalhados por outros pesquisadores, que tiveram seus textos publicados.			
<b>RESULTADOS</b>	Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram a preferência das pessoas querendo adotar bebês. Uma média de 41% coloca como prioridade crianças com até um ano de idade, 54% preferem crianças de três anos de idade e 5% se colocam à disposição para adotar crianças com até 10 anos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informa que 45.331 crianças estão em centros de acolhimento em todo o país. Pensando em crianças que estão enquadradas em um modelo ideal para adoção pela sociedade, apenas 5.469 desse número estaria apto para adoção. Ainda com base nos dados coletados pelo CNJ, nota-se que as crianças nas instituições em sua maioria são do sexo masculino, afrodescendentes e mais velhos (entre 5 e 15 anos – 61,3%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O presente trabalho tem por finalidade salientar a importância da construção de vínculos afetivos na adoção tardia. Diante dos resultados pesquisados, a dificuldade dessa adoção ainda é frequente, muitos pais que estão em busca de adotar dão preferência para crianças de até 3 anos de idade, pois há um medo de não criarem vínculos tão facilmente como com um bebê. Será necessário por parte dos pais adotivos maior compreensão com a criança adotada, a fim de tornar um ambiente familiar seguro e saudável, e o processo de adoção menos desconfortável para ambos.			
<b>REFERENCIAS</b>	Barros J, Ribeiro P, Souza L. Os aspectos psicológicos da criança e do adolescente na adoção tardia. Psicologia: Ciência e Profissão. 2021; 41, 1-13. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/f/pcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHZ/">https://www.scielo.br/f/pcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHZ/</a> (#38)#8239; Bicca A, Grzybowski L. Adoção tardia: percepções dos adotantes em relação aos períodos iniciais de adaptação. (#38)#8239; Contextos Clínicos. 2014; 7(2): 155-167. Disponível em: <a href="http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext">http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext</a> . Machado L, Ferreira R, Seron P. Adoção de crianças maiores: (#38)#8239; Sobre aspectos legais e Construção do vínculo afetivo. Estudos Interdisciplinares em Psicologia. 2015; 6(1): 1-17. Disponível em: <a href="https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125">https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14454	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4115414 - INGRID SUELLEN OLIVEIRA DE SOUSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Adoção Tardia			
<b>INTRODUCAO</b>	A adoção tardia se configura como a adoção de crianças acima de dois anos de idade, conhecida também como adoção moderna. (Machado et al, 2015). O presente artigo apresenta os aspectos emocionais e psicológicos que envolvem o processo de adoção moderna e a criação de vínculos afetivos no relacionamento entre pais e filhos inseridos neste contexto. Explorando como a psicologia pode contribuir no processo de adoção tardia, auxiliando na criação de vínculos, promovendo relacionamentos mais saudáveis e assegurando o desenvolvimento emocional de pais e crianças no processo de adoção.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar qual o papel do fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e filhos na adoção tardia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, que consiste em um método que se realiza a partir de registros já disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, livros, teses e artigos. Utilizando de dados teóricos já trabalhados por outros pesquisadores, que tiveram seus textos publicados.			
<b>RESULTADOS</b>	Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram a preferência das pessoas querendo adotar bebês. Uma média de 41% coloca como prioridade crianças com até um ano de idade, 54% preferem crianças de três anos de idade e 5% se colocam à disposição para adotar crianças com até 10 anos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informa que 45.331 crianças estão em centros de acolhimento em todo o país. Pensando em crianças que estão enquadradas em um modelo ideal para adoção pela sociedade, apenas 5.469 desse número estaria apto para adoção. Ainda com base nos dados coletados pelo CNJ, nota-se que as crianças nas instituições em sua maioria são do sexo masculino, afrodescendentes e mais velhos (entre 5 e 15 anos – 61,3%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O presente trabalho tem por finalidade salientar a importância da construção de vínculos afetivos na adoção tardia. Diante dos resultados pesquisados, a dificuldade dessa adoção ainda é frequente, muitos pais que estão em busca de adotar dão preferência para crianças de até 3 anos de idade, pois há um medo de não criarem vínculos tão facilmente como com um bebê. Será necessário por parte dos pais adotivos maior compreensão com a criança adotada, a fim de tornar um ambiente familiar seguro e saudável, e o processo de adoção menos desconfortável para ambos.			
<b>REFERENCIAS</b>	Barros J, Ribeiro P, Souza L. Os aspectos psicológicos da criança e do adolescente na adoção tardia. Psicologia: Ciência e Profissão. 2021; 41, 1-13. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/fjpcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHz/">https://www.scielo.br/fjpcp/a/RjXcmQPCGBqrVBRrP8C7BHz/</a> (#38)#8239; Bicca A, Grzybowski L. Adoção tardia: percepções dos adotantes em relação aos períodos iniciais de adaptação. (#38)#8239; Contextos Clínicos. 2014; 7(2): 155-167. Disponível em: <a href="http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext">http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1983-34822014000200005(#38)script=sci_arttext</a> . Machado L, Ferreira R, Seron P. Adoção de crianças maiores: (#38)#8239; Sobre aspectos legais e Construção do vínculo afetivo. Estudos Interdisciplinares em Psicologia. 2015; 6(1): 1-17. Disponível em: <a href="https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125">https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/21125</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14458	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4325800 - HENRIQUE DA SILVA ESPINDOLA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roseli de Lana Moreira		
<b>TITULO</b>	TAXA DE INCIDÊNCIA DE CASOS DE TUBERCULOSE NO PERÍODO DE 2018 A 2022 EM SÃO PAULO E REGIÃO SUDESTE.			
<b>INTRODUCAO</b>	A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pelo bacilo de Koch, acometendo o sistema respiratório, principalmente o pulmão e em outros tipos, afetando outros órgãos <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar a incidência da Tuberculose no período de 2018 a 2022 em São Paulo e Região Sudeste.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, transversal e retrospectivo, com dados do município de São Paulo, dentro do período selecionado de 2018 a 2022, através de dados secundários no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET). A obtenção de tais dados é oferecida publicamente de forma eletrônica e disponibilizados por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) advindos do TABNET.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados quantitativos obtidos demonstraram que de 2018 a 2022 foram registrados um total de 107.544 casos de Tuberculose em São Paulo, sendo um total de 22.445 (20,87%) em 2018, 22.189 (20,58%) em 2019, 19.923 (18,58%) em 2020, 20.317 (18,89%) em 2021, 22.670 (21,07%) em 2022 segundo dados do Ministério da Saúde/SVS pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET). Foi observado que entre o ano de 2019 e 2020, houve uma queda de 2,0% nos casos de Tuberculose confirmados em São Paulo, na qual esta queda esteve intrinsecamente ligada a pandemia de Covid-19, sendo então, subnotificada durante este período, devido os sintomas serem associados a Covid. Foi demonstrado também, os dados quantitativos ligados a região sudeste, que de 2018 a 2022 registraram um total de 211.132 casos confirmados de Tuberculose, sendo um total de 43.031 (20,38%) em 2018, 42.981 (20,35%) em 2019, 39.021 (18,48%) em 2020, 41.109 (19,47%) em 2021, 44.990 (21,30%) em 2022 segundo dados do SINAN-NET. Foi observado que entre o ano de 2019 e 2020, houve queda de 1,87% nos casos de Tuberculose confirmados na região sudeste, devido pandemia de Covid-19.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao realizar o estudo, conclui-se que as quedas nos números de casos confirmados de Tuberculose no município de São Paulo e região sudeste no ano de 2019 a 2022, se dão decorrente a subnotificação dos casos e abandono do tratamento da Tuberculose, além do absenteísmo devido diversos motivos, sendo um deles o medo de se contrair COVID-19 nas unidades de saúde, demonstrando o impacto da pandemia de Covid-19 em pessoas que possuíam e possuem Tuberculose.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BRASIL. Ministério da Saúde. Tuberculose. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose">https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose</a> . 2. BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde; Tuberculose. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/tuberculose-21/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,descobridor%20da%20causa%20da%20doença">https://bvsm.s.saude.gov.br/tuberculose-21/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,descobridor%20da%20causa%20da%20doença</a> . 3. Ministério da Saúde (Brasil). TabNet - Datasus: Sistema de Informações de Agravos de Notificação. <a href="http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/tuberubr.def">http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/tuberubr.def</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14462	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4364970 - ELEN FLÁVIA MORAES BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao		
<b>TITULO</b>	IMPACTO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE (HIIT) EM ADULTOS COM SOBREPESO E OBESIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	A sociedade moderna enfrenta desafios significativos relacionados ao estilo de vida, com especial ênfase nas questões relativas à saúde física. É amplamente reconhecido que o número de pessoas com excesso de peso e obesidade tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, e essa tendência parece continuar em ascensão.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, comparando-o com outras modalidades e abordagens de exercícios em adultos com sobrepeso e obesidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para realizar esta pesquisa, utilizamos uma revisão abrangente da literatura, com foco em artigos de alta qualidade, onde foram selecionados 8 artigos, obtidos em bases de dados reconhecidas, como o GOOGLE ACADÊMICO, PUBMED e SCIELO.			
<b>RESULTADOS</b>	Através dos resultados, constatamos que a implementação de programas de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) em adultos com sobrepeso e obesidade têm demonstrado impactos positivos, especialmente na melhoria da aptidão cardiorrespiratória e na saúde cardiovascular em geral, que podem estar relacionadas ao emagrecimento, bem como na redução dos fatores de risco associados a doenças crônicas não transmissíveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	Desta forma, podemos concluir que o HIIT apresentou resultados semelhantes na redução da gordura corporal quando comparado a outras modalidades de treinamento, porém, houve melhoras significativas e mais rápidas na aptidão cardiorrespiratória, melhora na dislipidemia, na sensibilidade à insulina e redução de marcadores inflamatórios em indivíduos com sobrepeso e obesidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	Keating, S. E., Johnson, N. A., Mielke, G. I., (#38) Coombes, J. S. (2017). A systematic review and meta-analysis of interval training versus moderate-intensity continuous training on body adiposity. <i>Obesity Reviews</i> , 18(8), 943–964. doi:10.1111/obr.12536 Tabata, I. Tabata training: one of the most energetically effective high-intensity intermittent training methods. <i>J Physiol Sci</i> 69, 559–572 (2019). <a href="https://doi.org/10.1007/s12576-019-00676-7">https://doi.org/10.1007/s12576-019-00676-7</a> Wanderley EN, Ferreira VA. Obesidade: uma perspectiva plural. <i>Ciênc saúde coletiva [Internet]</i> . 2010Jan;15(1):185–94.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14462	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4438671 - CAIQUE DA SILVA VIANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao		
<b>TITULO</b>	IMPACTO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE (HIIT) EM ADULTOS COM SOBREPESO E OBESIDADE			
<b>INTRODUCAO</b>	A sociedade moderna enfrenta desafios significativos relacionados ao estilo de vida, com especial ênfase nas questões relativas à saúde física. É amplamente reconhecido que o número de pessoas com excesso de peso e obesidade tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, e essa tendência parece continuar em ascensão.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, comparando-o com outras modalidades e abordagens de exercícios em adultos com sobrepeso e obesidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para realizar esta pesquisa, utilizamos uma revisão abrangente da literatura, com foco em artigos de alta qualidade, onde foram selecionados 8 artigos, obtidos em bases de dados reconhecidas, como o GOOGLE ACADÊMICO, PUBMED e SCIELO.			
<b>RESULTADOS</b>	Através dos resultados, constatamos que a implementação de programas de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) em adultos com sobrepeso e obesidade têm demonstrado impactos positivos, especialmente na melhoria da aptidão cardiorrespiratória e na saúde cardiovascular em geral, que podem estar relacionadas ao emagrecimento, bem como na redução dos fatores de risco associados a doenças crônicas não transmissíveis.			
<b>CONCLUSOES</b>	Desta forma, podemos concluir que o HIIT apresentou resultados semelhantes na redução da gordura corporal quando comparado a outras modalidades de treinamento, porém, houve melhoras significativas e mais rápidas na aptidão cardiorrespiratória, melhora na dislipidemia, na sensibilidade à insulina e redução de marcadores inflamatórios em indivíduos com sobrepeso e obesidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	Keating, S. E., Johnson, N. A., Mielke, G. I., (#38) Coombes, J. S. (2017). A systematic review and meta-analysis of interval training versus moderate-intensity continuous training on body adiposity. <i>Obesity Reviews</i> , 18(8), 943–964. doi:10.1111/obr.12536 Tabata, I. Tabata training: one of the most energetically effective high-intensity intermittent training methods. <i>J Physiol Sci</i> 69, 559–572 (2019). <a href="https://doi.org/10.1007/s12576-019-00676-7">https://doi.org/10.1007/s12576-019-00676-7</a> Wanderley EN, Ferreira VA. Obesidade: uma perspectiva plural. <i>Ciênc saúde coletiva [Internet]</i> . 2010Jan;15(1):185–94.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14463	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4356900 - MATHEUS EFFORI SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao	Saulo dos Santos Gil	DANILO SALES BOCALINI (UFES)
<b>TITULO</b>	Repercussões do Treinamento Resistido Tradicional sobre a Pressão Arterial de Indivíduos Hipertensos e Medicamentados			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Não são novidades os benefícios que o exercício físico exerce sobre os diversos sistemas fisiológicos, contudo, do ponto de vista das adaptações relativas ao treinamento resistido sobre indivíduos hipertensos, recentes estudos têm surgido, mostrando que esse modelo de exercício também pode ser eficiente, assim como os exercícios aeróbios. Contudo, há uma ausência de estudos quando se diz respeito à periodização sem variação das cargas de trabalho ao longo dos micro e mesociclos. A este respeito, o conhecimento adquirido, sobretudo através de mecanismos, seja na prevenção, tratamento ou reabilitação, tanto da doença cardiovascular quanto de desordens no estilo de vida, torna-se relevante quando se pensa em manutenção da intensidade de exercício.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Nesta perspectiva, o objetivo do estudo foi analisar a influência do Treinamento Resistido Tradicional (TT), ajustado a cada mesociclo, sobre indivíduos sedentários hipertensos, homens e mulheres, que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que participavam do programa de extensão da Unisa (PAEC).</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para tanto, 7 indivíduos, sendo 2 homens e 5 mulheres, escolhidos de forma randomizada, foram submetidos ao Treinamento Resistido Tradicional entre 8 e 12 semanas. O TT foi composto por 18 exercícios divididos em 3 dias semanais (treinos A, B e C), com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalos de 60 segundos de descanso entre as séries e exercícios, e com 60% de 1 repetição máxima (1 RM). Nas duas semanas que antecederam o início do treinamento, os 18 exercícios que fizeram parte do protocolo foram realizados para adaptação e aprendizado dos movimentos, além da realização dos testes de 1 RM para os ajustes mensais (mesociclo) das cargas. Assim, os seguintes parâmetros foram analisados: composição corporal, massa corporal semanal, pressão arterial sistêmica e frequência cardíaca (FC) pré e pós sessão de treino.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Não houve diferenças significativas nos valores antropométricos e na FC após o término do protocolo que cada participante conseguiu concluir, porém, houve significativo aumento da força no teste de 1RM (de 597,18 para 832,62kg), redução de 2,71 e 1,2mmHg na PA sistólica e diastólica, respectivamente, além do efeito hipotensor agudo ocorrido em várias sessões e de forma individual.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Portanto, podemos concluir que o TT realizado 3 vezes na semana foi capaz de aumentar a força muscular em todos os participantes, e exerceu maior resposta hipotensora, de forma aguda e crônica, nos indivíduos que apresentavam valores mais elevados da PA, mesmo medicamentados.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Cornelissen, VA; Smart, NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb 1;2(1): e004473. Dobrosielski, DA; Gibbs, BB; Ouyang, P; Bonekamp, S; Clark, JM; Wang, NY; Silber, HA; Shapiro, EP; Stewart, KJ. Effect of exercise on blood pressure in type 2 diabetes: a randomized controlled trial. J Gen Intern Med. 2012 Nov;27(11):1453-9. Fagard RH; Cornelissen VA. Effect of exercise on blood pressure control in hypertensive patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb;14(1):12-7.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14463	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4363795 - ROBERT GASTALDE CASERTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao	Saulo dos Santos Gil	DANILO SALES BOCALINI (UFES)
<b>TITULO</b>	Repercussões do Treinamento Resistido Tradicional sobre a Pressão Arterial de Indivíduos Hipertensos e Medicamentados			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Não são novidades os benefícios que o exercício físico exerce sobre os diversos sistemas fisiológicos, contudo, do ponto de vista das adaptações relativas ao treinamento resistido sobre indivíduos hipertensos, recentes estudos têm surgido, mostrando que esse modelo de exercício também pode ser eficiente, assim como os exercícios aeróbios. Contudo, há uma ausência de estudos quando se diz respeito à periodização sem variação das cargas de trabalho ao longo dos micro e mesociclos. A este respeito, o conhecimento adquirido, sobretudo através de mecanismos, seja na prevenção, tratamento ou reabilitação, tanto da doença cardiovascular quanto de desordens no estilo de vida, torna-se relevante quando se pensa em manutenção da intensidade de exercício.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Nesta perspectiva, o objetivo do estudo foi analisar a influência do Treinamento Resistido Tradicional (TT), ajustado a cada mesociclo, sobre indivíduos sedentários hipertensos, homens e mulheres, que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que participavam do programa de extensão da Unisa (PAEC).</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para tanto, 7 indivíduos, sendo 2 homens e 5 mulheres, escolhidos de forma randomizada, foram submetidos ao Treinamento Resistido Tradicional entre 8 e 12 semanas. O TT foi composto por 18 exercícios divididos em 3 dias semanais (treinos A, B e C), com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalos de 60 segundos de descanso entre as séries e exercícios, e com 60% de 1 repetição máxima (1 RM). Nas duas semanas que antecederam o início do treinamento, os 18 exercícios que fizeram parte do protocolo foram realizados para adaptação e aprendizado dos movimentos, além da realização dos testes de 1 RM para os ajustes mensais (mesociclo) das cargas. Assim, os seguintes parâmetros foram analisados: composição corporal, massa corporal semanal, pressão arterial sistêmica e frequência cardíaca (FC) pré e pós sessão de treino.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Não houve diferenças significativas nos valores antropométricos e na FC após o término do protocolo que cada participante conseguiu concluir, porém, houve significativo aumento da força no teste de 1RM (de 597,18 para 832,62kg), redução de 2,71 e 1,2mmHg na PA sistólica e diastólica, respectivamente, além do efeito hipotensor agudo ocorrido em várias sessões e de forma individual.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Portanto, podemos concluir que o TT realizado 3 vezes na semana foi capaz de aumentar a força muscular em todos os participantes, e exerceu maior resposta hipotensora, de forma aguda e crônica, nos indivíduos que apresentavam valores mais elevados da PA, mesmo medicamentados.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Cornelissen, VA; Smart, NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb 1;2(1): e004473. Dobrosielski, DA; Gibbs, BB; Ouyang, P; Bonekamp, S; Clark, JM; Wang, NY; Silber, HA; Shapiro, EP; Stewart, KJ. Effect of exercise on blood pressure in type 2 diabetes: a randomized controlled trial. J Gen Intern Med. 2012 Nov;27(11):1453-9. Fagard RH; Cornelissen VA. Effect of exercise on blood pressure control in hypertensive patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb;14(1):12-7.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14464	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3137821 - LILIANE MARQUES DUARTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao	Saulo dos Santos Gil	DANILO SALES BOCALINI (UFES)
<b>TITULO</b>	Repercussões do Treinamento Resistido Linear por Blocos sobre a Pressão Arterial de Indivíduos Hipertensos e Medicamentados			
<b>INTRODUCAO</b>	Já está bem estabelecido os benefícios que o exercício físico exerce sobre os diversos sistemas fisiológicos, contudo, do ponto de vista das adaptações relativas ao treinamento resistido sobre indivíduos hipertensos, recentes estudos têm surgido, mostrando que esse modelo de exercício também pode ser eficiente, como os exercícios aeróbios. Contudo, há uma ausência de estudos quando se diz respeito à indivíduos hipertensos que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que são submetidos a uma periodização com variação das cargas de trabalho ao longo dos micro e mesociclos.			
<b>OBJETIVOS</b>	. Nesta perspectiva, o objetivo do estudo foi analisar as repercussões do modelo de treinamento resistido linear por blocos (TRL) sobre indivíduos sedentários hipertensos, homens e mulheres, que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que participam do programa de extensão da Unisa (PAEC).			
<b>METODOLOGIA</b>	8 indivíduos (4 homens e 4 mulheres) participaram de forma randomizada do estudo, e foram submetidos ao TRL entre 6 e 12 semanas. O TRL foi constituído por 18 exercícios divididos em 3 dias semanais (treinos A, B e C), com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalos de 60 segundos de descanso entre as séries e exercícios, e com 60% de 1 repetição máxima (1 RM) na 1ª semana, 65% na 2ª semana, 70% na 3ª semana e 75% na 4ª semana. Na semana que antecedeu o início do treinamento, os 18 exercícios que fizeram parte do protocolo foram realizados para adaptação e aprendizado dos movimentos, além da realização dos testes de 1 RM para os ajustes semanais das cargas, que também foram realizados ao final de cada mesociclo (4 semanas). Os seguintes parâmetros foram analisados: composição corporal, massa corporal, pressão arterial sistêmica (PA) e frequência cardíaca (FC) pré e pós sessão de treino.			
<b>RESULTADOS</b>	Não houve diferenças significativas nos valores antropométricos e na FC após o término do protocolo que cada participante conseguiu concluir. Porém, houve significativo aumento da força no teste de 1RM (de 430,85 para 637kg), redução de 5,9 e 7,1mmHg na PA sistólica e diastólica, respectivamente, além do efeito hipotensor agudo ocorrido em várias sessões e de forma individual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, podemos concluir que o TRL realizado 3 vezes na semana foi capaz de aumentar a força muscular em todos os participantes, e reduzir a PA sistólica e diastólica em valores clinicamente importantes para a redução da mortalidade provocada pela Hipertensão Arterial e por doenças cardiovasculares.			
<b>REFERENCIAS</b>	Moraes, MR; Bacurau, RF; Casarini, DE; Jara, ZP; Ronchi, FA; Almeida, SS; Higa, EM; Pudo, MA; Rosa, TS; Haro, AS; Barros, CC; Pesquero, JB; Würtele, M; Araujo, RC. Chronic conventional resistance exercise reduces blood pressure in stage 1 hypertensive men. J Strength Cond Res. 2012 Apr;26(4):1122-9. Fagard RH; Cornelissen VA. Effect of exercise on blood pressure control in hypertensive patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb;14(1):12-7. Cornelissen, VA; Smart, NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb 1;2(1): e004473.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14464	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3661784 - LETICIA DE SOUZA SOARES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao	Saulo dos Santos Gil	DANILO SALES BOCALINI (UFES)
<b>TITULO</b>	Repercussões do Treinamento Resistido Linear por Blocos sobre a Pressão Arterial de Indivíduos Hipertensos e Medicamentados			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Já está bem estabelecido os benefícios que o exercício físico exerce sobre os diversos sistemas fisiológicos, contudo, do ponto de vista das adaptações relativas ao treinamento resistido sobre indivíduos hipertensos, recentes estudos têm surgido, mostrando que esse modelo de exercício também pode ser eficiente, como os exercícios aeróbios. Contudo, há uma ausência de estudos quando se diz respeito à indivíduos hipertensos que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que são submetidos a uma periodização com variação das cargas de trabalho ao longo dos micro e mesociclos.			
<b>OBJETIVOS</b>	. Nesta perspectiva, o objetivo do estudo foi analisar as repercussões do modelo de treinamento resistido linear por blocos (TRL) sobre indivíduos sedentários hipertensos, homens e mulheres, que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que participam do programa de extensão da Unisa (PAEC).			
<b>METODOLOGIA</b>	8 indivíduos (4 homens e 4 mulheres) participaram de forma randomizada do estudo, e foram submetidos ao TRL entre 6 e 12 semanas. O TRL foi constituído por 18 exercícios divididos em 3 dias semanais (treinos A, B e C), com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalos de 60 segundos de descanso entre as séries e exercícios, e com 60% de 1 repetição máxima (1 RM) na 1ª semana, 65% na 2ª semana, 70% na 3ª semana e 75% na 4ª semana. Na semana que antecedeu o início do treinamento, os 18 exercícios que fizeram parte do protocolo foram realizados para adaptação e aprendizado dos movimentos, além da realização dos testes de 1 RM para os ajustes semanais das cargas, que também foram realizados ao final de cada mesociclo (4 semanas). Os seguintes parâmetros foram analisados: composição corporal, massa corporal, pressão arterial sistêmica (PA) e frequência cardíaca (FC) pré e pós sessão de treino.			
<b>RESULTADOS</b>	Não houve diferenças significativas nos valores antropométricos e na FC após o término do protocolo que cada participante conseguiu concluir. Porém, houve significativo aumento da força no teste de 1RM (de 430,85 para 637kg), redução de 5,9 e 7,1mmHg na PA sistólica e diastólica, respectivamente, além do efeito hipotensor agudo ocorrido em várias sessões e de forma individual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, podemos concluir que o TRL realizado 3 vezes na semana foi capaz de aumentar a força muscular em todos os participantes, e reduzir a PA sistólica e diastólica em valores clinicamente importantes para a redução da mortalidade provocada pela Hipertensão Arterial e por doenças cardiovasculares.			
<b>REFERENCIAS</b>	Moraes, MR; Bacurau, RF; Casarini, DE; Jara, ZP; Ronchi, FA; Almeida, SS; Higa, EM; Pudo, MA; Rosa, TS; Haro, AS; Barros, CC; Pesquero, JB; Würtele, M; Araujo, RC. Chronic conventional resistance exercise reduces blood pressure in stage 1 hypertensive men. J Strength Cond Res. 2012 Apr;26(4):1122-9. Fagard RH; Cornelissen VA. Effect of exercise on blood pressure control in hypertensive patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb;14(1):12-7. Cornelissen, VA; Smart, NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb 1;2(1): e004473.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14464	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4366158 - CRISTIANE MARIA GONCALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao	Saulo dos Santos Gil	DANILO SALES BOCALINI (UFES)
<b>TITULO</b>	Repercussões do Treinamento Resistido Linear por Blocos sobre a Pressão Arterial de Indivíduos Hipertensos e Medicamentados			
<b>INTRODUCAO</b>	Já está bem estabelecido os benefícios que o exercício físico exerce sobre os diversos sistemas fisiológicos, contudo, do ponto de vista das adaptações relativas ao treinamento resistido sobre indivíduos hipertensos, recentes estudos têm surgido, mostrando que esse modelo de exercício também pode ser eficiente, como os exercícios aeróbios. Contudo, há uma ausência de estudos quando se diz respeito à indivíduos hipertensos que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que são submetidos a uma periodização com variação das cargas de trabalho ao longo dos micro e mesociclos.			
<b>OBJETIVOS</b>	. Nesta perspectiva, o objetivo do estudo foi analisar as repercussões do modelo de treinamento resistido linear por blocos (TRL) sobre indivíduos sedentários hipertensos, homens e mulheres, que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que participam do programa de extensão da Unisa (PAEC).			
<b>METODOLOGIA</b>	8 indivíduos (4 homens e 4 mulheres) participaram de forma randomizada do estudo, e foram submetidos ao TRL entre 6 e 12 semanas. O TRL foi constituído por 18 exercícios divididos em 3 dias semanais (treinos A, B e C), com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalos de 60 segundos de descanso entre as séries e exercícios, e com 60% de 1 repetição máxima (1 RM) na 1ª semana, 65% na 2ª semana, 70% na 3ª semana e 75% na 4ª semana. Na semana que antecedeu o início do treinamento, os 18 exercícios que fizeram parte do protocolo foram realizados para adaptação e aprendizado dos movimentos, além da realização dos testes de 1 RM para os ajustes semanais das cargas, que também foram realizados ao final de cada mesociclo (4 semanas). Os seguintes parâmetros foram analisados: composição corporal, massa corporal, pressão arterial sistêmica (PA) e frequência cardíaca (FC) pré e pós sessão de treino.			
<b>RESULTADOS</b>	Não houve diferenças significativas nos valores antropométricos e na FC após o término do protocolo que cada participante conseguiu concluir. Porém, houve significativo aumento da força no teste de 1RM (de 430,85 para 637kg), redução de 5,9 e 7,1mmHg na PA sistólica e diastólica, respectivamente, além do efeito hipotensor agudo ocorrido em várias sessões e de forma individual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, podemos concluir que o TRL realizado 3 vezes na semana foi capaz de aumentar a força muscular em todos os participantes, e reduzir a PA sistólica e diastólica em valores clinicamente importantes para a redução da mortalidade provocada pela Hipertensão Arterial e por doenças cardiovasculares.			
<b>REFERENCIAS</b>	Moraes, MR; Bacurau, RF; Casarini, DE; Jara, ZP; Ronchi, FA; Almeida, SS; Higa, EM; Pudo, MA; Rosa, TS; Haro, AS; Barros, CC; Pesquero, JB; Würtele, M; Araujo, RC. Chronic conventional resistance exercise reduces blood pressure in stage 1 hypertensive men. J Strength Cond Res. 2012 Apr;26(4):1122-9. Fagard RH; Cornelissen VA. Effect of exercise on blood pressure control in hypertensive patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb;14(1):12-7. Cornelissen, VA; Smart, NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb 1;2(1): e004473.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14466	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4525728 - RAFAELLA DA COSTA LOTTI TARGA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elisabete Calabuig Chapina Ohara		
<b>TITULO</b>	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES SUBMETIDOS A REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Segundo a Organização Mundial da Saúde (2006), 17,3 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares em 2012 e espera-se que esse número aumente para 23,6 milhões até 2030, tornando-se a principal causa de morte no mundo. As doenças circulatórias também possuem impacto significativo na mortalidade da população brasileira, sendo responsáveis por 32% dos óbitos em 2002, o equivalente a 267.496 mortes. O envelhecimento demográfico da população, conjuntamente com a persistência de hábitos alimentares e de atividade física inadequados, além do tabagismo, tendem a aumentar essas taxas nos próximos anos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Identificar as competências necessárias do enfermeiro para construção do plano de alta a pacientes pós-revascularização do miocárdio e elencar os principais diagnósticos de enfermagem.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Tratou-se de uma revisão integrativa, a base de dados utilizadas para escolha dos artigos foram: Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Portal Ministério da Saúde. A pergunta norteadora para a elaboração da revisão integrativa foi: Quais os principais diagnósticos de enfermagem para os pacientes submetidos a revascularização do miocárdio? Os descritores utilizados na busca foram: Enfermagem, Assistência, Autocuidado, Cardiovasculares. Os critérios de seleção foram artigos na íntegra, artigos nacionais e publicados nos últimos 5 anos.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A revisão integrativa selecionou 11 artigos científicos para análise de acordo com os critérios estabelecidos. Entre as competências necessárias, as mais citadas pelos autores são: a liderança, a comunicação, a tomada de decisão, o trabalho em equipe, a ética e a educação permanente. Os Diagnósticos de Enfermagem selecionados: Dor Aguda, Padrão Respiratório Ineficaz, Conforto Prejudicado, Débito Cardíaco Prejudicado, Insônia, Risco para Trombose e Déficit do Autocuidado.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Conclui-se que a elaboração do plano de alta é importantíssimo para a qualidade de vida do paciente revascularizado, sendo necessário que o enfermeiro utilize todas as etapas do processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem, garantindo a assistência do paciente durante todo o processo de tratamento, promovendo autonomia e segurança para que seu processo de reabilitação se torne possível, diminuindo agravos e probabilidades do retorno do paciente ao ambiente hospitalar, devido à falta de assistência.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Brasil. Ministério da Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília, DF – 2011. 160 p. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf">https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf</a>. 2. BRASIL, Ministério da saúde. Brasília-DF 2020 DESOSPITALIZAÇÃO Reflexões Para O Cuidado Em Saúde E Atuação Multiprofissional. 2020. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/desospitalizacao_reflexoes_cuidado_atuacao_multiprofissional.pdf">https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/desospitalizacao_reflexoes_cuidado_atuacao_multiprofissional.pdf</a>. 3. World Health Organization. The top 10 causes of death. The 10 leading causes of death in the world, 2000 and 2019[Internet]. World Health Organization; 9 Dec. 2020. Disponível em: <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death">https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death</a>.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14467	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128501 - ANDREA PAULA PIVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alzira Lobo de Arruda Campos		
<b>TITULO</b>	ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA LITERATURA ACADÊMICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Trata-se da apresentação do estágio atual da pesquisa de Mestrado em Ciências Humanas sobre o tema do Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes em situação de violação de direitos. A pesquisa leva em consideração o que princípio do melhor interesse da criança se reflete em várias áreas e formas de realização e este resumo pretende apresentá-lo com o recorte da medida protetiva que considera a eventual necessidade do afastamento da criança da família de origem e o consequente encaminhamento para serviços que ofereçam condições e cuidados adequados para a promoção do desenvolvimento saudável, de maneira breve e pontual, viabilizando a reintegração à família originária ou, se inviável, à uma família substituta. O serviço de proteção acima apontado é viabilizado pelo programa de acolhimento familiar que se caracteriza pela organização do acolhimento na residência de famílias da própria comunidade, chamado Serviço Famílias Acolhedoras (SFA).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Apresentar o atual estágio da pesquisa por meio do estado da arte representado no mapeamento de toda a produção acadêmica sobre o tema do acolhimento familiar, buscando identificar os aspectos de destaque sobre o tema, as lacunas, a relevância, os percursos, as repetições e, principalmente, contribuir com a sistematização do conhecimento sobre o tema e prospectar novas contribuições a partir da pesquisa iniciada.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A metodologia adotada baseia-se no levantamento das publicações acadêmicas nacionais, analisado de acordo com conceitos e problemas presentes nestas publicações, disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e no buscador Google Acadêmico. Os títulos e resumos foram analisados em seus conteúdos específicos atinentes a peculiaridades do serviço famílias acolhedoras.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Foram identificados quatro artigos científicos através sites de buscas e 10 dissertações de mestrado e três teses de doutorado no banco da CAPES, todos de autores brasileiros, publicadas nos últimos cinco anos, totalizando 17 publicações. Os autores pesquisaram nas áreas do Serviço Social, da Psicologia, do Direito, da Economia, da Medicina e das Políticas Públicas. Os resultados identificados foram categorizados: sete na implementação do SFA e políticas públicas; seis na relação entre SFA e garantias de direitos; dois sobre a reintegração da criança na família de origem; e, restantes, sobre desenvolvimento infantil e revisão de literatura científica.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Dada a complexidade do tema e das práticas em políticas públicas o número de produções revelou-se insuficiente para dar conta das desigualdades extremas que se apresentam na sociedade brasileira apontando desafios à garantia de direitos da criança e do adolescente.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>ARRUDA CAMPOS, A. L. de. Perspectivas Interdisciplinaridades e Linguagem nas Ciências Humanas. Revista Brasileira Multidisciplinar, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 17-28, 2005. Disponível em: <a href="https://revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/261">https://revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/261</a>. Acesso em: 15 fev. 2023 BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. Guia de acolhimento familiar. Brasília: SNAS, 2021. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Unidades de acolhimento e famílias acolhedoras: sumário executivo / Conselho Nacional de Justiça. – Brasília: CNJ, 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14469	História	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4324960 - ERICK ANTUNES DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Sobre os eixos, rodas e lentes, as passagens do flâneur da Modernidade à Contemporaneidade.			
<b>INTRODUCA O</b>	O termo flâneur surge na literatura do século XIX com o poeta francês Charles Baudelaire (1821 – 1867) e sua obra "As Flores do Mal" (1857). Essa obra é inspirada em Edgar Allan Poe (1808 – 1849) e seu trabalho "O Homem na Multidão" (1840). Por meio dessas obras, surge a contextualização do flâneur não apenas como um passeio físico, mas como uma jornada filosófica. A pesquisa aborda o berço da flânerie, sendo Paris durante o reinado de Napoleão III no século XIX, assim como a cidade de São Paulo nos séculos XX e XIX. Além disso, são incluídos no estudo o skate praticado nas ruas e a fotografia urbana. O objetivo é guiar o leitor na compreensão da transformação do flâneur do século XIX para o skate/fotografia, que representam os novos observadores urbanos dos séculos XX e XXI.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o comportamento de diferentes grupos sociais que habitam espaços específicos e como esses comportamentos são influenciados pela configuração desses espaços.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa baseia-se principalmente em fontes primárias, incluindo dois ensaios do filósofo Walter Benjamin (1892-1940): "Charles Baudelaire e um Lírico no Auge do Capitalismo" e "Rua de Mão Única" (1927). Fontes secundárias também foram utilizadas, como artigos acadêmicos, com destaque para dois específicos da Universidade de São Paulo (USP): "Walter Benjamin e o Flâneur Baudeleriano em Júlio Cortázar" (2020) de Pedro de Carvalho Nalletto e João Gabriel Ferraz Wasconcellos com o artigo "Skat'insubordinado: Flâneurs sobre rodinhas" (2017).			
<b>RESULTADO S</b>	A importância do flâneur e suas passagens no recorte temporal da pesquisa reside em evidenciar as principais mudanças em cidades cosmopolitas, tais como a urbanização desordenada e o impacto do abandono e da clandestinidade de espaços devido à negligência do poder público e privado, bem como a influência de políticas higienistas e do setor privado. Os objetos de estudo tratados na pesquisa conduzem essa discussão.			
<b>CONCLUSOES</b>	As passagens do flâneur no recorte temporal da pesquisa revelam as falhas existentes em cidades cosmopolitas e o comportamento de grupos específicos que compõem as cidades mencionadas na pesquisa, assim como suas transformações ao longo do tempo.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. BRANDÃO, Leonardo. A cidade e a tribo Skatista: Juventude, Cotidiano e práticas corporais na História cultural. Universidade Federal da Grande Dourados. EDITORA UFGD 2011. 2. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II: Rua de Mão Única. Tradução: J. C. M Barbosa H. A. Baptista. São Paulo, Brasileira 1994. 3. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III: Charles Baudelaire, um Lírico no auge do Capitalismo. Tradução: J. C. M Barbosa H. A. Baptista. São Paulo, Brasileira 1994. 4. CARVALHO, Pedro Nalletto. Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de Geografia 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14471	História	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4419979 - MATEUS IGOR SOUZA AMARO FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Racismo estrutural brasileiro			
<b>INTRODUCAO</b>	Mergulhando em profundas reflexões sobre a sociedade brasileira, um dos principais entraves que nosso país encontra é seu racismo estrutural, motivo de diversas discussões e atritos políticos, alguns lados mais "conservadores" da sociedade afirmam que não existe racismo estrutural no Brasil, outros por sua vez lutam para além de provar sua existência, quebrar o mesmo, um país multicultural e miscigenado desde suas origens deve tratar desse assunto com extrema seriedade, pois os povos negros merecem que está seja uma discussão primordial para a evolução social de nossa nação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Levantar historicamente processos que formam o racismo estrutural no Brasil, entender como a escravização dos povos africanos impacta a sociedade brasileira até os dias atuais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Através de dados retirados de registros do IBGE, artigos científicos, obras historiográficas, fontes primárias de estudo e obras de arte, pretende-se abrir o texto a diversas reflexões sobre o racismo estrutural no Brasil.			
<b>RESULTADOS</b>	RESULTADO E DISCUSSÃO: Entende-se que a partir do momento em que os povos africanos escravizados chegam ao Brasil objetificados em sua existência, não reconhecidos como humanos pelos colonizadores escravagistas, vistos apenas como ferramentas desalmadas, que servem para a execução de trabalhos impostos a favor de objetivos de seus opressores, sintetiza-se uma herança de princípios racistas no país, nem mesmo a Lei Áurea: 13 de maio de 1888, coloca fim a essas formas de opressão, pois até mesmo a lei de emancipação foi ressignificada através de positivismo histórico, transformando em nossa memória a presença de uma pessoa branca, membro da coroa, coroa que por sua vez manteve o sistema escravagista no país. O Brasil sofre com a desigualdade social, é notável a presença de barreiras invisíveis aos olhos de quem não possui um viés aguçado de análise social, povos pardos e pretos, são minorias em universidades, porém formam a maioria populacional de periferias, que em suas origens eram compostas por ex-escravos marginalizados pela sociedade, um exemplo disso é a formação da primeira favela do Brasil, nas origens da comunidade do Morro da Providência, visto que a nação está totalmente segregada por este racismo estrutural, que enraizou-se em nossa cultura e organização social.			
<b>CONCLUSOES</b>	O Brasil é um país extremamente racista, onde a sociedade mesmo sendo miscigenada, é capaz de isolar em sua elite pessoas brancas, mantendo, pretos e pardos em periferias, profissões precárias e sem acesso democrático ao estudo, entende-se que o país está totalmente polarizado quando o assunto é racismo estrutural.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Schwarcz, Lilia Moritz, O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930, 6ª edição, São Paulo, Companhia das Letras, 1993. 2. Almeida, Silvio Luiz, Racismo Estrutural, Feminismos plurais, 1ª edição, São Paulo, Pólen, 2019. 3. Pistori, Maria Helena Cruz, Racismo e a constituição de um signo ideológico de resistência, Bakhtiniana, Revista de Estudos do Discurso, PUC-SP, São Paulo, 2023. 4. Freitas, Renita de Cássia, D'Affonseca, Sabrina Mazo, O Racismo Enraizados nas Famílias Inter-Raciais de São Paulo, Artigo, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Paulo, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14472	História	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577876 - EULER AMARAL DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	A utilização política do futebol por regimes nazifascistas e os reflexos nos dias atuais			
<b>INTRODUCAO</b>	Desde tempos antigos, o futebol tem sido muito mais do que um esporte. Sua história é repleta de exemplos de como esse jogo transcende as quatro linhas do campo e desempenha um papel fundamental na sociedade, na cultura e na política. A relação entre futebol e política tem sido estudada e discutida em várias partes do mundo, e este trabalho visa aprofundar nossa compreensão do uso político do futebol, com foco nos regimes nazifascistas do século XX, como os de Mussolini na Itália e outros na Europa, e em como esses eventos históricos ainda afetam o esporte e a política nos dias de hoje.			
<b>OBJETIVOS</b>	Explorar como os regimes nazifascistas usaram o futebol como uma ferramenta para promover suas ideologias e manipular as massas, e como isso ainda reflete no esporte nos dias atuais.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia envolve uma análise abrangente de fontes primárias e secundárias, incluindo documentos históricos, livros, artigos acadêmicos e mídia contemporânea. Examinamos como as políticas de propaganda, a censura e a manipulação da opinião pública foram empregadas nos regimes nazifascistas.			
<b>RESULTADOS</b>	A discussão aborda a influência contínua do futebol nas questões políticas e como o esporte pode ser uma ferramenta eficaz para promover agendas políticas e nacionalistas. Concluindo que o futebol é um poderoso instrumento de mobilização social e que sua influência vai além do campo, moldando a percepção estrangeira de um país e a visão da própria população sobre sua nação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este estudo contribui para uma compreensão mais profunda do impacto político do futebol ao longo da história e nos dias atuais. Através da análise de como os regimes nazifascistas utilizaram o esporte como meio de manipulação, entendendo os reflexos dessas estratégias no esporte contemporâneo, destacando a importância de nunca esquecer as lições do passado.			
<b>REFERENCIAS</b>	GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: LP(#38)M, 2004. FOER, Franklin. Como o futebol explica o mundo: Um olhar inesperado sobre a globalização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. MARTOLIO, Edgardo. Gloria roubada: O outro lado das copas. São Paulo: Figurati, 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14473	História	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4293304 - BIANCA MARTINS QUEIROGA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Rapadura, um patrimônio cultural imaterial do Nordeste Brasileiro			
<b>INTRODUCA O</b>	O Brasil é rico culturalmente com grandes diversidades em tradições artística, culturais e gastronômicas; Se pararmos para refletir, tudo em nossa volta traz consigo uma história, uma memória, que estão presentes até hoje, é importante para nossa sociedade preservar-las, pois assim não serão perdidas. Seguindo este raciocínio a rapadura seria um produto com tradição e memória que precisa ser preservada? Ela tem uma grande importância para a região nordestina? Com isso, através de muitas pesquisas esses questionamentos serão respondidos trazendo sua história e seu valor para cultura de um povo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a tradição da rapadura, sua história e seu modo de fazer, afirmar sua importância para um povo, reconhecendo como um bem imaterial cultural nordestino.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para uma compreensão do tema, foi feito um estudo através de estudos bibliográficos, arquivos, sites, leis e entrevistas.			
<b>RESULTADO S</b>	Foi possível perceber que a rapadura é uma iguaria de valor cultural principalmente na região nordeste, onde traz consigo uma história e uma tradição familiar, que traz memórias afetivas, a grande maioria dos produtores aprenderam o ofício com familiares, passando de geração a geração, além destes pontos, é importante ressaltar a permanência em sua produção artesanal, havendo quase nenhuma mudança nos processos "Uma rapadura que, ainda hoje, é feita do mesmo jeito. [...]" (QUINTAS, 2007, pg. 139) Com tudo isso é possível afirmar que pode considerá-lo como um bem imaterial, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) "O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana." Sua valorização é importante para a comunidade nordestina, pois com ela traz um pouco da sua história raiz, valorizando a memória de um povo rico em suas tradições, não preservá-la pode deixar uma parte desta identidade morrer, empobrecendo nossa sociedade como um todo. "Para a política de salvaguarda do patrimônio imaterial, preservar o patrimônio cultural brasileiro significa fortalecer e dar visibilidade às referências culturais dos grupos sociais em sua heterogeneidade e complexidade. [...]" ( O Registro do Patrimônio Imaterial, IPHAN;2006)			
<b>CONCLUSOES</b>	A rapadura é um doce, de história e memória afetiva muito importante para a população nordestina, seu consumo, e seu modo de fazer tradicional é de valor histórico que precisa ser preservado.			
<b>REFERENCIA S</b>	GOV.BR. Patrimônio imaterial. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/phan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-imaterial#:~:text=O%20patrim%C3%B4nio%20imaterial%20%C3%A9%20transmitido,diversidade%20cultural%20e%20%20C3%A0%20criatividade">https://www.gov.br/phan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-imaterial#:~:text=O%20patrim%C3%B4nio%20imaterial%20%C3%A9%20transmitido,diversidade%20cultural%20e%20%20C3%A0%20criatividade</a> de. Acesso em: 13 out. 2023. Patrimônio Imaterial: O Registro do Patrimônio Imaterial: Dossiê final das atividades da Comissão do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. Brasília: Ministério da Cultura / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 4. ed. 2006. QUINTAS, Fátima(Org.) . A civilização do açúcar. Recife: Sebrae, Fundação Gilberto Freyre, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14474	História	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4192265 - JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	A propaganda nazista			
<b>INTRODUCA O</b>	Desde o fim da Segunda Guerra Mundial algumas perguntas são frequentes em nossa sociedade, dentre algumas, como a sociedade alemã acreditou em um partido extremamente maléfico como os nazistas? Por que a sociedade se deixou influenciar pelas ideias utópicas de Hitler? Portanto, mediante uma longa pesquisa mencionarei que a propaganda foi a mais impactante e objetivamente a mais adequada de responder aos questionamentos. Os métodos usados pelos nazistas de propagar mentiras e convencer a população que os principais culpados pelas crises econômicas seriam os que estava conduzindo a Alemanha a ruína.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar como os diferentes meios de comunicação estavam a serviço do nazismo, como se utilizaram de diferentes linguagens atingindo a maioria da população.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia aplicada foi mediante pesquisas bibliográficas de historiadores para a compreensão do assunto sobre Propaganda nazista e suas influências nos principais movimentos, contextualização teórica de fontes autorais do, Adolf Hitler, Alcir Lenharo e Guy Durandin.			
<b>RESULTADO S</b>	Com os acontecimentos na Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial como as crises econômicas, inflações, desemprego, o Tratado de Versalhes entre outros motivos, Hitler com suas ideias como, o antisemitismo, a expansão territorial, uma Raça superior "Ariana" e um forte nacionalismo dissemina sua propaganda para chegar a ascensão do poder e implementar o terror. Segundo Durandin (1996, p. 25) "A propaganda e a publicidade recorrem frequentemente à mentira porque seu papel é o de exercer uma influência e, apenas acessoriamente, levar informações". A propaganda nazista utilizou da cultura, da arte e dos discursos de Goebbels, além de filmes sofisticados para transmitir a identidade nazista e tudo que resultaria em uma manipulação das massas. Conforme o historiador Lenharo (1986, p. 47) relata que Hitler considerava a propaganda como meio popular de chegar até as massas e sendo que "As grandes massas" possui uma capacidade limitada de inteligência e, portanto, a propaganda deve ser repetitiva incansavelmente para atingir o coração das grandes massas. Hitler sobre a questão dos judeus observou que "judeus e quanto mais os observava mais firmemente convencido ficava de que eles eram diferentes das outras raças" (HITLER, 1925, p. 38). Contudo, é nos jornais, arte, cultura e nos cinemas que Hitler usa sua propaganda através do talento da Jovem Leni Riefentahl para mostrar as suas ideias de propaganda. "Com Leni Riefentahl, e seus famosos filmes, o triunfo da vontade e Olympia, o cinema nazista não só propôs uma nova modalidade de filme de propaganda, mas também alcançou um nível invejável de realização de estética." (LENHARO, 1986, p. 59).			
<b>CONCLUSOES</b>	Hitler utiliza das calamidades, da forte propaganda no sistema de comunicação e artístico para transmitir falsas ideias que culminaram na sua ascensão e, portanto, a propaganda nazista foi eficiente para o controle das massas e disseminando ideias utópicas formando o imaginário popular.			
<b>REFERENCIAS</b>	DURANDIN, Guy. As mentiras na propaganda e na publicidade [tradução de Antônio Carlos Bastos de Mattos]. — São Paulo: JSN Editora, 1997 HITLER, Adolf. Mein Kampf – tradução; Minha Luta – 1925. LENHARO, A. Nazismo "O triunfo da vontade". São Paulo: Editora Ática, 1986.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14476	História do Brasil Império	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4384172 - GABRIEL DA SILVA GOMES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	André Rebouças: democracia e emancipação no século XIX			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Os dados coletados pelo censo agropecuário do IBGE em 2017 demonstram a alta desigualdade social existente na estrutura fundiária brasileira. Somente 1% dos estabelecimentos rurais ocupam 47% do espaço rural. O problema da concentração de terras no Brasil é um assunto ainda discutido dentro do contexto socioeconômico, sendo motivo de violentos conflitos no interior do país entre latifundiários e movimentos sociais pelo direito a posse da terra. O mesmo censo aponta que 79% dos grandes proprietários se autodeclararam brancos, esses fatores comprovam que questões como a moradia precária e a desigualdade no espaço rural afetam principalmente a população negra, obrigada desde o período colonial a trabalhar como mão de obra escrava para os senhores de engenho, nas sesmarias, onde era praticado o plantio da cana de açúcar e nas lavouras de café em meados do século XIX. Mesmo com o fim da escravatura, não houve nenhuma ação por parte do estado para integrar os negros na sociedade como cidadãos livres. Posto isto, procura-se compreender como as ideais e o programa de reforma agrária do abolicionista André Rebouças poderiam garantir a cidadania aos negros após a abolição.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender quais eram as propostas de reforma agrária de André Rebouças.			
<b>METODOLOGIA</b>	O trabalho se caracteriza como uma pesquisa de tipo descritiva, bibliográfica, documental e qualitativa, com base em livros, artigos científicos e estatísticas para melhor embasar a compreensão da vida de André Rebouças e de sua militância pela conquista da cidadania da população negra.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Uma das pautas defendidas por Rebouças era o princípio da centralização agrícola, a partir da divisão do solo em pequenos lotes que seriam destinados aos negros e imigrantes europeus. incluía -se assim, a criação de fazendas e engenhos centrais, locais para onde os produtos seriam processados para a venda. Conforme explica Menezes (MENEZES p.134), a centralização proporcionaria um sistema de trabalho mais moderno e dinâmico, onde os novos proprietários teriam liberdade de laborar para o próprio sustento. Em seu artigo, Ribeiro (RIBEIRO, p.310) cita outras propostas entre as quais estavam o reaproveitamento dos resíduos de café e outros produtos nas lavouras além do emprego do arado e máquinas como os motores hidráulicos.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>após um breve período de viagens para os países europeus e EUA, Rebouças trouxe consigo conhecimentos sobre técnicas de produção e modos de vida que permitiram o progresso econômico daqueles países. Portanto, seu programa almejava a transição para uma sociedade democrática e autônoma, o que resultaria na consolidação da justiça social a uma população que durante quatro séculos foi oprimida por sistema de trabalho já visto naquela época como arcaico e imoral. A compreensão de suas ideias nos dias atuais aprofunda o estudo sobre a desigualdade no acesso a terra e a questão racial</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Censo Agro 2017: população ocupada nos estabelecimentos agropecuários cai 8,8%. Agência IBGE NOTICIAS 2019. Disponível em: <a href="https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8">https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8</a>. Acesso em: 16 de out.2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14477	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128609 - RODOLFO RENO PISCIRILLO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Patricia Margarida Farias Coelho		
<b>TITULO</b>	Anime Style: A Cinematografia dos Animes			
<b>INTRODUCAO</b>	O Anime (nome dado para animações japonesas) há tempos faz sucesso no Brasil através de series e filmes consagradas como Akira, Os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto dentre outras e vem atraindo uma legião de fãs e entusiastas a cada dia com novas produções. E assim como o cinema. O Anime surge como uma forma de arte com aspectos interdisciplinares, onde utiliza-se de elementos de outras artes para compor as suas bases fundamentais.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo é analisar os enquadramentos das cenas dos Animes e identificar as características estéticas, narrativas e criativas que tais momentos possam possuir, utilizando como viés artístico-analítico a Direção de Fotografia Cinematográfica			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada é empírica, porque parte de um estudo de caso específico. Mas também possui base bibliográfica interdisciplinar porque se serve de estudos relacionados ao tema, mas vindo de outras áreas.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados esperados é que a partir da pesquisa possamos compreender as características do Anime e colaborar com as pesquisas de investigadores que também se debruçam sobre esta temática, que cresce e ganha visibilidade em nosso país.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluimos que ainda é necessário um estudo mais aprofundado em mais itens do universo Anime para traçar um mapa de conceitos e particularidades do gênero.			
<b>REFERENCIAS</b>	AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. A análise do filme. Tradução. Hélder Viçoso. Nova ed., inteiramente reescrita. - Lisboa : Texto (#38) Grafia, 2019. BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. A importância da forma filmica. In: BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. A arte do cinema: uma introdução. Campinas: Editora Unicamp/Edusp, 2013. FIORIN, José Luiz. Linguagem e interdisciplinaridade. Alea, v. 10, n. ja/ju 2008, p. 29-53, 2008Tradução . . Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/pdf/alea/v10n1/v10n1a03.pdf">http://www.scielo.br/pdf/alea/v10n1/v10n1a03.pdf</a> . Acesso em: 03/09/2023. RABIGER, Michael. Direção de cinema: técnicas e estética. Tradução Sabrina Ricci Netto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. SATO, Cristiane A. A cultura popular japonesa: animê. In: LUYTEN, Sonia Bibe (Org.). Cultura Pop Japonesa. Hedra. São Paulo, 2005.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14479	História Moderna e Contemporânea	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4451945 - AMANDA SELES SOUSA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Trilhando a Liberdade: Estratégias e Articulações dos Escravizados Rumo ao Fim da Escravização			
<b>INTRODUCAO</b>	Esta pesquisa tem como objetivo analisar os fatores essenciais para o fim da escravização no Brasil, com ênfase nas estratégias e articulações dos próprios escravizados. Paralelamente, a abolição da escravização foi influenciada por fatores como a pressão britânica e a evolução da industrialização global, que demandava novas formas de trabalho. Diante desse cenário, os negros e crioulos frequentemente recorriam a fugas, sabotagens, revoltas e à formação de quilombos como estratégias de resistência.			
<b>OBJETIVOS</b>	Pesquisa é análise do contexto escravagista do século XIX no Brasil e investigação dos movimentos e estratégias adotadas pelos escravizados que contribuíram para a conquista da liberdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa histórica de coleta de dados e informações, por meio de livros, documentos, obras literárias, artigos e jornais de época de autores de relevância para atualidade. As fontes se pautam em autores que abordem o tema da escravização pelo viés do próprio escravizado.			
<b>RESULTADOS</b>	Evidenciar a participação direta e indireta dos escravizados quanto ao fim do sistema escravagista, analisando que o Brasil não utilizava apenas da mão de obra escravizada para fomentar a economia e o comércio, o próprio escravizado foi motivo de atroz mercado sendo "objeto" de venda e compra. As revoltas, fugas e criação de quilombos aponta que os mesmos não esperavam pacificamente a conquista da liberdade, mas criavam estratégias para alcançá-la, por exemplo a Revolta dos Malês de 1835. Ademais, o quilombo dos palmares foi motivo de monitoramento até o início do século XIX, isso para que não emergissem novamente como contingente social detendo organização política, econômica e cultural, pois foram um dos maiores meios de preservação de sua cultura africana.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível destrinchar a participação negra na conquista de sua liberdade, dentro de um contexto escravagista que perdeu por quase quatrocentos anos no Brasil. Isso ressalta que as elites do século XIX acompanhavam as mudanças no âmbito global em relação aos meios de trabalho e à industrialização. Todavia, um dos motivos que atrasava a abolição é o fato de que, em muitos casos, no Brasil não havia indenizações à medida que a liberdade era estabelecida, acarretando prejuízos financeiros para essas elites e a escassez de mão de obra. O cenário pós-abolição destaca a falta de inserção dos povos negros na sociedade, que, sem medidas políticas, passaram a se deslocar para as margens da sociedade.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALVES, Castro. O Navio Negreiro e outros poemas. 1a edição. São Paulo: Editora Antofágica, 2022. 2. CHALHOUN, Sidney. Visões da liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. 1a Edição. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2011. ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 2a Edição. São Paulo: Editora Ciranda Cultural, 2018. 3. REIS, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil: Nós achamos em campos a tratar da liberdade. Revista USP. n. 28, p. 14-39, 1996.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14480	História do Brasil República	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4303270 - EDSON PASSOS OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Vida e Obra de Vinicius de Moraes			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Marcos da Cruz de Melo Moraes, nasceu no dia 19/10/1913 no bairro Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Seus pais eram Clodoaldo Pereira da Silva, funcionário público e poeta, e Lydia Cruz de Moraes, pianista, Vinicius de Moraes tinha três irmãos: Lygia, Heloísa e Laetitia. Com 15 anos compôs suas primeiras canções, foi formado em bacharel em Letras no colégio Santo Inácio, também no Rio de Janeiro. Por entre os amigos ele era chamado de poetinha, ele foi casado seis vezes, as mulheres eram: Beatriz Azevedo (Tati), Regina Pederneira, Lila Bôscoli, Maria Lúcia Proença, Nelita de Abreu, Cristina Gurjão, Gesse Gessy, Marta Rodrigues, e a última foi casado até morrer, Gilda Matoso. Seus filhos foram: Suzana e Pedro (filhos de Beatriz), Georgiana e Luciana (filhas de Maria Proença) e Maria (filha de Cristina). A morte de Vinicius de Moraes aconteceu no dia 09/07/1980, quando o amigo Toquinho o encontrou morto no banheiro. Sua canção "Garota De Ipanema", é um clássico da Música Popular Brasileira.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Evidenciar que o poeta Vinicius de Moraes, no século XX se consolidava como um poeta e músico compromissado e atento à pesquisa e a formação da escrita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise do período em que as composições e poemas produzidos por Vinicius de Moraes foram criados, e qual a influência de sua vida é encontrado nesse processo, destrinchando a influência da época e temas sociais que traziam denúncias a questões, que poderiam ser evidenciadas através da cultura como poemas e músicas, analisando que esse percurso de produção pode ser desenvolvido mantendo fiel a criatividade poética			
<b>RESULTADOS</b>	Vinicius de Moraes, por desenvolver arte pela temática social, conseguiu ser um dos maiores compositores e poetas no âmbito mundial com suas canções, voz e talento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Vinicius de Moraes se consolidou como um renomado poeta e um dos pilares da Bossa Nova, um movimento que exerceu profunda influência na música brasileira. Suas poesias e canções, notavelmente "Eu Sei Que Vou Te Amar" e "Garota de Ipanema," são marcos desse legado artístico. Sua contribuição transcende o tempo, sendo contemporânea devido à sua influência duradoura na literatura e cultura brasileira.			
<b>REFERENCIAS</b>	MORAES, Vinicius de. Antologia Poética. 1a edição. São Paulo: Editora Companhia de Bolso, 2009. 2. TANCREDI, Silva. "Vinicius de Moraes"; Brasil Escola. Disponível em: <a href="https://brasilecola.uol.com.br/biografia/vinicius-moraes.htm">https://brasilecola.uol.com.br/biografia/vinicius-moraes.htm</a> . Acesso em 15 de outubro de 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14485	História do Brasil República	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4349709 - WILLIAM SANTOS DA COSTA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Anarquia como movimento operário na República Velha			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No período da República Velha no Brasil que durou de 1889 a 1930 foi um período marcado por diversas transformações sociais, políticas e econômicas. Durante essa época o movimento operário emergiu como uma força essencial na busca por direitos trabalhistas e melhorias nas condições de vida da classe trabalhadora urbana. Um elemento significativo desse movimento foi a influência do Anarquismo, uma ideologia que promovia a igualdade, a autonomia e a abolição do Estado. A transição do regime monárquico trouxe para a República, em 1889 profundas mudanças no cenário político e econômico no Brasil. O processo de industrialização e urbanização que ganhava força gerou novas relações de trabalho e a concentração de operário nos centros urbanos, desencadeando a formação da classe operária e assim, reivindicando melhores condições de trabalho dentro das fábricas, que eram conhecidas como "Fábricas Satânicas" pelas condições insalubres que elas se apresentavam. Nesse contexto, compreender o movimento operário na República Velha é fundamental para desvendar as dinâmicas que moldaram o desenvolvimento social e político dessa época.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este artigo tem como objetivo desmistificar equívocos e preconceitos associados ao anarquismo como um movimento operário durante a República Velha no Brasil. Buscaremos destacar as contribuições do anarquismo, sua diversidade ideológica e a influência positiva que teve no movimento trabalhista da época, oferecendo uma visão mais precisa e equilibrada do anarquismo como parte integrante e influente do movimento operário durante a República Velha.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A metodologia usada no artigo envolveu a seleção e análise de jornais da época como fontes primárias, que cobriam o anarquismo e o movimento operário na República Velha no Brasil. Além disso, fontes secundárias, como livros, foram usados para fornecer contexto e análise.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Este artigo contribui para desmistificar a imagem da anarquia como movimento puramente caótico e violento. Em vez disso, destaca o compromisso dos anarquistas com ideais de justiça, igualdade e liberdade, além de seu papel fundamental na construção de um movimento operário forte e na luta por direitos fundamentais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A análise do papel da anarquia como movimento operário da República Velha no Brasil, revela um capítulo fascinante e muitas vezes subestimado na história do país. As descobertas desta pesquisa enfatizam não apenas a importância do anarquismo como uma força motriz por trás da luta operária, mas também a complexidade de suas contribuições. O impacto do anarquismo na República Velha perdura até hoje. Muitas das questões e ideais defendidos pelos anarquistas continuam a ser relevantes, inspirando lutas por direitos e justiça social no Brasil.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar: A Utopia da Cidade Disciplinada. Resistência Anarquista. 4ª Edição. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1985.  HARDMAN, Francisco Foot. Nem Pátria, nem Patrão: vida operária e cultura anarquista no Brasil. 2ª Edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.  CAMPOS, Cristina Hebling. O sonho da liberdade: Movimento Operário de 1917 a 1921. 1ª Edição. Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988.  SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. Brasil Uma Biografia. 2ª Edição. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2015  BETHELL, Leslie. Brasil no Mundo. In: CARVALHO, Murilo José. A Construção Nacional 1830 – 1889. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Shwarcz S.A., 2012.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14487	História do Brasil República	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4374185 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	O FUTEBOL COMO FERRAMENTA DE PESQUISA PARA A SOCIEDADE PAULISTA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Futebol. Para muitos, canônico, já para outros, apenas mais um esporte como qualquer outro, mas para entusiastas ou não, é certo que o futebol sempre esteve atuante no meio social em que esteve inserido, dentro e fora dos gramados, seja no estádio do time do coração ou no bar da esquina, no gramado ou na pelada, uma partida de futebol sempre atrai olhares, impulsiona batimentos cardíacos e rouba suspiros de quem acompanha. No desenrolar desta pesquisa percorreremos alguns pontos específicos e cruciais para o período que rodeia a virada do século passado, que não poderiam deixar de ser citados, como por exemplo: O fim da escravidão, a chegada do futebol ao país com o elitismo inglês como parte da bagagem, as diferenças sociais e a imigração dos italianos para a região sudeste do Brasil, mais especificamente, São Paulo.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é analisar e comparar a sociedade paulista na primeira metade do século XX com seu reflexo dentro dos clubes, instituições e competições relacionadas ao futebol nacional. Analisaremos o trajeto traçado pelo futebol, de esporte da elite, para a competição mais popular do país, seus preconceitos e suas desconstruções ao longo dos anos que precedem, inauguram e dão continuidade ao século XX.			
<b>METODOLOGIA</b>	O objetivo desse trabalho é analisar e comparar a sociedade paulista na primeira metade do século XX com seu reflexo dentro dos clubes, instituições e competições relacionadas ao futebol nacional. Analisaremos o trajeto traçado pelo futebol, de esporte da elite, para a competição mais popular do país, seus preconceitos e suas desconstruções ao longo dos anos que precedem, inauguram e dão continuidade ao século XX.			
<b>RESULTADOS</b>	O fim da escravidão, a imigração italiana e todo o caminho percorrido entre a elitização até a popularização. Esses elementos juntos formam uma parcela do que era a sociedade paulista na virada do século XIX para o século XX. As desigualdades e privilégios, o jogo do campo e o jogo da vida. Discutiremos e buscaremos comprovar como o futebol conseguiu absorver e se apropriar com maestria de características tão distintas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O futebol foi capaz de reproduzir sentimentos. Do lado daqueles que foram deixados às margens, o sentimento de querer fazer parte de algo maior, de poder participar; já do lado daqueles que pregavam a segregação, o sentimento de manter entre os seus a exclusividade sobre determinados campos da vida – que para o bem da grande maioria esse sentimento foi quebrado, mesmo que seus cacos ainda machuquem muitos até hoje.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	CALDAS, Waldenyr. O Pontapé Inicial: Memória do Futebol Brasileiro. São Paulo: IBRASA, 1990. FILHO, Mario Rodrigues. O Negro no Futebol Brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: MAUAD Editora Ltda., 2003. ISBN 85-7478-069-0. MARTINS, José De Souza. São Paulo no Século XX: Primeira Metade. 4. ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. ISBN 978-85-7060-985-4.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14491	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		2136775 - KATIA CRISTINA DOS SANTOS SALGADO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Rodrigo Medici Candido	
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO AO TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O mercado de trabalho contemporâneo enfrenta uma série de desafios. Muitas pessoas se matriculam em cursos superiores na busca de se desenvolverem e obterem a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Uma parte dessas pessoas, deseja atuar profissionalmente na área de Recursos Humanos. Com quase 180 mil alunos matriculados, o curso de tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos está entre as dez graduações com mais universitários no Brasil, de acordo com o mais recente Censo da Educação Superior. Trata-se de uma formação de nível superior e dura apenas dois anos. O curso é bem popular pelo Brasil a fora e pode ser encontrado em quase 500 faculdades, onde 98% delas são particular (INEP, 2021). Por ser uma área extremamente concorrida, o aluno deve entrar na graduação já pensando no que irá estudar depois que terminar o curso, ou seja, deve haver um planejamento para dar continuidade aos estudos fazendo um bacharelado em Administração, ou Psicologia, ou ainda uma especialização, para apresentar um diferencial no mercado. Os profissionais tecnólogos em gestão de recursos humanos, que possuam experiência podem obter salários entre atrativos e encontrar empregos em grandes e renomadas empresas. O curso pode ser feito de forma presencial ou a distância. Esse curso têm ênfase no aspecto prático da profissão e por esse motivo os tecnólogos em RH encontram trabalho com relativa facilidade em empresas, indústrias e organizações do terceiro setor.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender a dinâmica do mercado de trabalho ao tecnólogo em gestão de recursos humanos, incluindo a necessidade de formação acadêmica, principais atividades executadas, e demais requisitos para atuação profissional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica na elaboração do referido estudo, que segundo Severino (2007, p. 73), trata-se daquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos científicos, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da realização do referido estudo, verificou-se que ao longo do curso, o aluno aprende a planejar ações voltadas ao desenvolvimento dos funcionários, desenvolver técnicas de gerenciamento de pessoal, fazer recrutamento e seleção, avaliar o desempenho corporativo, acompanhar o desenvolvimento de carreiras, elaborar políticas de recompensas, pensar em práticas motivacionais, definir políticas de qualidade de vida no ambiente empresarial entre outros. O mercado de trabalho é desafiador, onde esse profissional pode ir se deparar com elevado número de interessados em trabalhar nessa área; constante evolução tecnológica, necessidade de atualização constante sobre o uso de sistemas de gestão, entre outros.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluindo, o mercado de trabalho na área de Recursos Humanos (RH) é dinâmico e desafiador, refletindo as tendências e as demandas em constante evolução no mundo corporativo. Profissionais de RH desempenham um papel fundamental na gestão de pessoas e na promoção do sucesso das organizações.			
<b>REFERENCIAS</b>	INEP. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior">https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior</a> . Acesso em 03 de out. de 2023. LACOMBE, F. Recursos humanos: Princípios e tendências. 2ª Edição. São Paulo: Saravia, 2012. SEVERINO, A. Metodologia Trab Científico. São Paulo: Cortez, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14491	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5070023 - SHIRLENE GONCALVES JANUARIO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Rodrigo Medici Candido	
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO AO TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O mercado de trabalho contemporâneo enfrenta uma série de desafios. Muitas pessoas se matriculam em cursos superiores na busca de se desenvolverem e obterem a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Uma parte dessas pessoas, deseja atuar profissionalmente na área de Recursos Humanos. Com quase 180 mil alunos matriculados, o curso de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos está entre as dez graduações com mais universitários no Brasil, de acordo com o mais recente Censo da Educação Superior. Trata-se de uma formação de nível superior e dura apenas dois anos. O curso é bem popular pelo Brasil a fora e pode ser encontrado em quase 500 faculdades, onde 98% delas são particular (INEP, 2021). Por ser uma área extremamente concorrida, o aluno deve entrar na graduação já pensando no que irá estudar depois que terminar o curso, ou seja, deve haver um planejamento para dar continuidade aos estudos fazendo um bacharelado em Administração, ou Psicologia, ou ainda uma especialização, para apresentar um diferencial no mercado. Os profissionais tecnólogos em gestão de recursos humanos, que possuam experiência podem obter salários entre atrativos e encontrar empregos em grandes e renomadas empresas. O curso pode ser feito de forma presencial ou a distância. Esse curso têm ênfase no aspecto prático da profissão e por esse motivo os tecnólogos em RH encontram trabalho com relativa facilidade em empresas, indústrias e organizações do terceiro setor.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender a dinâmica do mercado de trabalho ao tecnólogo em gestão de recursos humanos, incluindo a necessidade de formação acadêmica, principais atividades executadas, e demais requisitos para atuação profissional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica na elaboração do referido estudo, que segundo Severino (2007, p. 73), trata-se daquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos científicos, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da realização do referido estudo, verificou-se que ao longo do curso, o aluno aprende a planejar ações voltadas ao desenvolvimento dos funcionários, desenvolver técnicas de gerenciamento de pessoal, fazer recrutamento e seleção, avaliar o desempenho corporativo, acompanhar o desenvolvimento de carreiras, elaborar políticas de recompensas, pensar em práticas motivacionais, definir políticas de qualidade de vida no ambiente empresarial entre outros. O mercado de trabalho é desafiador, onde esse profissional pode ir se deparar com elevado número de interessados em trabalhar nessa área; constante evolução tecnológica, necessidade de atualização constante sobre o uso de sistemas de gestão, entre outros.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluindo, o mercado de trabalho na área de Recursos Humanos (RH) é dinâmico e desafiador, refletindo as tendências e as demandas em constante evolução no mundo corporativo. Profissionais de RH desempenham um papel fundamental na gestão de pessoas e na promoção do sucesso das organizações.			
<b>REFERENCIAS</b>	INEP. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior">https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior</a> . Acesso em 03 de out. de 2023. LACOMBE, F. Recursos humanos: Princípios e tendências. 2ª Edição. São Paulo: Saravia, 2012. SEVERINO, A. Metodologia Trab Científico. São Paulo: Cortez, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14491	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5089468 - JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Rodrigo Medici Candido	
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO AO TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O mercado de trabalho contemporâneo enfrenta uma série de desafios. Muitas pessoas se matriculam em cursos superiores na busca de se desenvolverem e obterem a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Uma parte dessas pessoas, deseja atuar profissionalmente na área de Recursos Humanos. Com quase 180 mil alunos matriculados, o curso de tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos está entre as dez graduações com mais universitários no Brasil, de acordo com o mais recente Censo da Educação Superior. Trata-se de uma formação de nível superior e dura apenas dois anos. O curso é bem popular pelo Brasil a fora e pode ser encontrado em quase 500 faculdades, onde 98% delas são particular (INEP, 2021). Por ser uma área extremamente concorrida, o aluno deve entrar na graduação já pensando no que irá estudar depois que terminar o curso, ou seja, deve haver um planejamento para dar continuidade aos estudos fazendo um bacharelado em Administração, ou Psicologia, ou ainda uma especialização, para apresentar um diferencial no mercado. Os profissionais tecnólogos em gestão de recursos humanos, que possuam experiência podem obter salários entre atrativos e encontrar empregos em grandes e renomadas empresas. O curso pode ser feito de forma presencial ou a distância. Esse curso têm ênfase no aspecto prático da profissão e por esse motivo os tecnólogos em RH encontram trabalho com relativa facilidade em empresas, indústrias e organizações do terceiro setor.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender a dinâmica do mercado de trabalho ao tecnólogo em gestão de recursos humanos, incluindo a necessidade de formação acadêmica, principais atividades executadas, e demais requisitos para atuação profissional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica na elaboração do referido estudo, que segundo Severino (2007, p. 73), trata-se daquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos científicos, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da realização do referido estudo, verificou-se que ao longo do curso, o aluno aprende a planejar ações voltadas ao desenvolvimento dos funcionários, desenvolver técnicas de gerenciamento de pessoal, fazer recrutamento e seleção, avaliar o desempenho corporativo, acompanhar o desenvolvimento de carreiras, elaborar políticas de recompensas, pensar em práticas motivacionais, definir políticas de qualidade de vida no ambiente empresarial entre outros. O mercado de trabalho é desafiador, onde esse profissional pode ir se deparar com elevado número de interessados em trabalhar nessa área; constante evolução tecnológica, necessidade de atualização constante sobre o uso de sistemas de gestão, entre outros.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluindo, o mercado de trabalho na área de Recursos Humanos (RH) é dinâmico e desafiador, refletindo as tendências e as demandas em constante evolução no mundo corporativo. Profissionais de RH desempenham um papel fundamental na gestão de pessoas e na promoção do sucesso das organizações.			
<b>REFERENCIAS</b>	INEP. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior">https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior</a> . Acesso em 03 de out. de 2023. LACOMBE, F. Recursos humanos: Princípios e tendências. 2ª Edição. São Paulo: Saravia, 2012. SEVERINO, A. Metodologia Trab Científico. São Paulo: Cortez, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14491	Ciências Sociais Aplicadas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5211263 - GUILHERME FERREIRA ALVES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Cerqueira Silva	Rodrigo Medici Candido	
<b>TITULO</b>	O MERCADO DE TRABALHO AO TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O mercado de trabalho contemporâneo enfrenta uma série de desafios. Muitas pessoas se matriculam em cursos superiores na busca de se desenvolverem e obterem a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Uma parte dessas pessoas, deseja atuar profissionalmente na área de Recursos Humanos. Com quase 180 mil alunos matriculados, o curso de tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos está entre as dez graduações com mais universitários no Brasil, de acordo com o mais recente Censo da Educação Superior. Trata-se de uma formação de nível superior e dura apenas dois anos. O curso é bem popular pelo Brasil a fora e pode ser encontrado em quase 500 faculdades, onde 98% delas são particular (INEP, 2021). Por ser uma área extremamente concorrida, o aluno deve entrar na graduação já pensando no que irá estudar depois que terminar o curso, ou seja, deve haver um planejamento para dar continuidade aos estudos fazendo um bacharelado em Administração, ou Psicologia, ou ainda uma especialização, para apresentar um diferencial no mercado. Os profissionais tecnólogos em gestão de recursos humanos, que possuam experiência podem obter salários entre atrativos e encontrar empregos em grandes e renomadas empresas. O curso pode ser feito de forma presencial ou a distância. Esse curso têm ênfase no aspecto prático da profissão e por esse motivo os tecnólogos em RH encontram trabalho com relativa facilidade em empresas, indústrias e organizações do terceiro setor.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Temos como objetivo compreender a dinâmica do mercado de trabalho ao tecnólogo em gestão de recursos humanos, incluindo a necessidade de formação acadêmica, principais atividades executadas, e demais requisitos para atuação profissional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica na elaboração do referido estudo, que segundo Severino (2007, p. 73), trata-se daquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos científicos, e portais especializados.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da realização do referido estudo, verificou-se que ao longo do curso, o aluno aprende a planejar ações voltadas ao desenvolvimento dos funcionários, desenvolver técnicas de gerenciamento de pessoal, fazer recrutamento e seleção, avaliar o desempenho corporativo, acompanhar o desenvolvimento de carreiras, elaborar políticas de recompensas, pensar em práticas motivacionais, definir políticas de qualidade de vida no ambiente empresarial entre outros. O mercado de trabalho é desafiador, onde esse profissional pode ir se deparar com elevado número de interessados em trabalhar nessa área; constante evolução tecnológica, necessidade de atualização constante sobre o uso de sistemas de gestão, entre outros.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluindo, o mercado de trabalho na área de Recursos Humanos (RH) é dinâmico e desafiador, refletindo as tendências e as demandas em constante evolução no mundo corporativo. Profissionais de RH desempenham um papel fundamental na gestão de pessoas e na promoção do sucesso das organizações.			
<b>REFERENCIAS</b>	INEP. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior">https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior</a> . Acesso em 03 de out. de 2023. LACOMBE, F. Recursos humanos: Princípios e tendências. 2ª Edição. São Paulo: Saravia, 2012. SEVERINO, A. Metodologia Trab Científico. São Paulo: Cortez, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5155576 - DANIELLA SOUZA DE PAIVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCA O</b>	No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADO S</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a> . 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199395 - LUCAS SOUZA CALEGARI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCA O</b>	No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADO S</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a> . 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199417 - MATHEUS RAMOS DE ALUSTAU FINISOLA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5219621 - FERNANDO BOTEGA FADEL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20urgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20urgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5219779 - STEPHANIE PORCIUNCULA BEZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220181 - ENRICO VARGAS ROSSI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220432 - GIOVANNA SILVA BISPO DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%20e%20a%20potavel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%20e%20a%20potavel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220521 - GUILHERME FORMAN MURRAY		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADO S</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/analises/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5222974 - FELIPE VAROLI PEREIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14492	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5225281 - NATALIA SALVARO LAZZARIN		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão: SEDE DE COMIDA.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>No ano 2000, os países membros da ONU propuseram os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecendo metas para o período entre 2000 e 2015. Foram alcançados avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Com o sucesso dessa primeira empreitada, os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Nesse contexto, o Projeto de Extensão, que será desenvolvido pelos alunos de medicina, da universidade de santo amaro, compreende a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano. Desse modo, visando melhorar a qualidade da água, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, criaram um sistema de hidroponia. Portanto, o sistema de hidroponia colabora com o objetivo 6 da ODS, uma vez que permite diminuir o desperdício de água, reutilizando os recursos hídricos, como a captação da chuva, para um desenvolvimento sustentável de alimentos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Revitalizar a horta da escola (comunidade alvo) e conscientizar as crianças da utilização de água que normalmente seria desperdiçada.			
<b>METODOLOGIA</b>	A ação desenvolvida neste projeto procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta. Realizaremos uma palestra e uma dinâmica, a fim de ensinar o funcionamento do sistema de hidroponia e como ele será utilizado para reviver a horta da escola, além de participarem da plantação abastecida pelo sistema de hidroponia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como consequência disso, além do foco na questão da água, também será fomentada uma segunda questão: a relação entre reaproveitamento e alimentação saudável. Dessa forma, será apresentado para as crianças o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual defende o reaproveitamento e manutenção de recursos, projetando a garantia de que não falte alimento e água para as próximas gerações. Até o momento foram desenhados o modelos esquemáticos do sistema de hidroponia, planejamento de restauração da horta e a aquisição de todos os itens necessários.			
<b>CONCLUSOES</b>	Nesse projeto, o principal objetivo é promover mudanças significativas na comunidade, proporcionando a todos os estudantes e funcionários usufruir do sistema. Além disso, ação desenvolvida procura mostrar as crianças como é possível utilizar a água da chuva para alimentar uma horta, influenciando de maneira correta essa comunidade, por conseguinte, mudar o pensamento sobre a questão da água.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. <a href="https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel">https://www.ufmg.br/espacoconhecimento/os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel#:~:text=Como%20surgiram%20os%20ODS%3F,educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20pot%C3%A1vel</a>. 2. <a href="https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola">https://iloveflores.com/hidroponia-na-escola-projetos-educativos/#Como_implementar_um_projeto_de_hidroponia_em_sua_escola</a> 3. <a href="https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro">https://pt.wikihow.com/Montar-um-Sistema-Hidropônico-Caseiro</a> 4. <a href="https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf">https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13942/1/ANFSantosDISSPRT.pdf</a> 5. <a href="https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf">https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA14_ID4872_10092018052159.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5198941 - NAIANE RODRIGUES DE LACERDA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5198950 - NAILMA CARLOS ROCHA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199026 - VITÓRIA GABRIELA SOUSA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patrícia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199093 - SARA MARIA COSTA FALCÃO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5199115 - PAULA RIBEIRO OZIRES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199182 - MAILLY ALVES DE ALMEIDA SOUZA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199221 - SYRLA MARIELLE DUARTE SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199271 - LETICIA AYUMI IMAI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199336 - MAYSA FERNANDES DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADOS</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14493	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5199387 - SABRINA DE ROMA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	PROJETO DE EXTENSÃO – CULTIVO HIDROPONICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Hidroponia é o conjunto de técnicas agrícolas utilizadas para o plantio sem o uso do solo, empregando em seu lugar uma solução aquosa com todos os nutrientes disponíveis para o desenvolvimento da planta. Inicialmente, todas as espécies de plantas podem ser cultivadas por hidroponia, mas por motivos econômicos as espécies de pequeno porte, como a alface, são as mais adequadas. A Educação Ambiental surgiu da preocupação da sociedade com o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9795/1999 da Política Nacional de Educação Ambiental, "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.". Visto isso, as inúmeras vantagens proporcionadas por esse método de plantio associada a educação ambiental nas escolas concede respaldo para discutir possibilidades para melhorias socioambientais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste projeto de extensão é gerar conscientização e aprendizados nas crianças da comunidade escolhida sobre a água e saúde, através do ensino e prática da hidroponia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada em sua elaboração foi sistematizada em quatro eixos: Identificação de um problema e oportunidade de ação social, seleção de uma comunidade, diagnóstico preliminar e diagnóstico. Foi feito referencial em bases secundárias, que para sua estruturação utilizaremos plataformas digitais como: Google acadêmico, scielo, Science direct, BDTD, Sibi. E para melhor compreensão da informação estruturaremos um questionário para pesquisa de campo com perguntas variadas entre quantitativa e qualitativa.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao final da aplicação do projeto espera-se que de 90 a 100% das crianças passem a ter o conhecimento sobre as questões ambientais da água como, sua escassez, contaminação e a importância desse recurso para a vida e a saúde e o envolvimento da agricultura e do agronegócio como agravantes nessas problemáticas, tenham conhecimento e um contato com a hidroponia e vejam nesse método de cultivo uma solução mais saudável e sustentável.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que existe uma necessidade de conscientização das gerações futuras sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a abordagem didática, prática e feita no âmbito escolar tem uma efetiva funcionalidade, alcançando o público com a proposta bem como se correlacionando o assunto com o aprendizado.			
<b>REFERENCIA S</b>	CARVALHO, Isabel C. de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. BARROS et al., 2014; BARROS, Aline Mide Romano de. História da Educação e da Pedagogia: A Educação Contemporânea no Brasil: Paradigmas e Desafios. Caderno de Atividades. Valinhos: Anhanguera Educacional, 2014. CULTIVAR, 2015			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5198968 - OLIVIER HENRY MARTINS DE BRITO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5199310 - MARIANE DA SILVA DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5199352 - VINICIUS BAPTISTA PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5219736 - SOPHYA POZZETTI DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220157 - YURI OLIVEIRA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5222486 - PIETRA LATUF ARCHETTI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5222711 - ISABELLE VITÓRIA MORAIS SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5222915 - GABRIELA LOREIRO ARIAS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERENCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14494	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
				<b>Apresentação</b>
	5235014 - GREYCE MIRIÊ TISAKA DE OLIVEIRA			2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
	Guilherme José da Costa Silva		Patrícia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO IDEAL E SEGURO DA ÁGUA.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A água é uma substância essencial na manutenção da vida, na qual depende da conservação, de modo sustentável, dos elementos da natureza. A partir disso, observa-se que a água é fundamental para a manutenção da homeostase e principal componente do corpo humano, haja vista que está relacionado a inúmeros processos metabólicos do organismo, favorecendo o equilíbrio dinâmico.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem por objetivos informar e orientar estudantes do ensino médio a respeito do consumo do consumo ideal de água e seus benefícios à saúde, incentivando-os a boa e simples prática de beber água, ressaltando as consequências da desidratação na saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir de discussões com os integrantes e buscas por artigos em plataformas como google acadêmico e pubmed, decidiu-se que iria ser realizado palestras em duas escolas, a primeira sendo um projeto piloto e, a segunda, como o projeto definitivo, com a aplicação de dois formulários para se ter conhecimento do nível de hidratação dos jovens. Na primeira palestra, preparou-se uma apresentação contendo aspectos gerais sobre a água, benefícios do consumo recomendado e consequências da privação dessa, sendo que ao final da palestra foi aberto um espaço para sanar as dúvidas dos estudantes, a fim de compreender o nível de adesão, bem como uma dinâmica feita para os discentes. Ao final, coletou-se as respostas dos alunos e, logo em seguida, foram apresentados os resultados, sendo ressaltados os pontos que precisavam ser melhorados, como também os pontos que estavam adequados.			
<b>RESULTADOS</b>	Obteve-se, até o momento, uma coleta parcial dos dados, a qual realizou a confecção de gráficos, relacionados à primeira instituição, tanto para o formulário inicial, quanto para o segundo, após a palestra. Em relação à segunda escola, aguarda-se o retorno desta, para que se possa prosseguir com a apresentação e coleta de dados.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Esse projeto visa, então, conscientizar comunidades escolares a partir de duas apresentações distintas. A primeira palestra teve objetivo ligeiramente experimental, mas será incluída em nossos estudos finais. Serão abordadas duas áreas distintas que amplamente se relacionam, saúde e meio ambiente. As ações e resultados estão em consonância, até este tempo, com o esperado, com exceção da baixa adesão às respostas do segundo formulário. Outras eventuais falhas ainda percebidas na apresentação do Colégio Sidarta serão analisadas e potencialmente resolvidas na próxima exposição.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L; TARANTO, Giuseppe (Trad.). Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. CARVALHO, A.P.L., Ana Paula, ZANARDO, V.P.S, Vivian Polachini. Consumo de água e outros líquidos em adultos e idosos residentes no município de Erechim – Rio Grande do Sul. PRESPECTIVA, Erechim. V34, n. 125, p 117-126, março/2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14495	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4595220 - DANIEL DI PROFIO BALDI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva		MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA
<b>TITULO</b>	ATLAS ANATÔMICO ILUSTRADO DO CORAÇÃO DOS ANIMAIS VERTEBRADOS COMO MÉTODO DE APRENDIZADO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A anatomia veterinária é uma das matérias para formação dos médicos veterinários, a qual compreende diferenças morfológicas das estruturas anatômicas dos diversos sistemas dos animais. O conhecimento sobre a anatomia do sistema cardiovascular, com foco no coração é de suma importância por ser utilizado na prática veterinária.			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um atlas ilustrado do coração dos animais vertebrados como método de estudo complementar, que reunisse as particularidades anatômicas dos animais vertebrados como o cavalo e o cão, e outros vertebrados não tão comuns nas aulas de anatomia como anfíbios e peixes (teleosteos e elasmobrânquios), em diferentes posições anatômicas em um só modelo didático, visando uma maior compreensão do discente. Além disso, utilizar o atlas para colorir as estruturas presentes nele.			
<b>METODOLOGIA</b>	Inicialmente foi feita uma pesquisa científica sobre o coração dos animais vertebrados e estudos em peças cadavéricas de diferentes animais para fazer as imagens do atlas. Para a realização das ilustrações utilizou-se: lápis grafite; borracha; canetas nanquim pretas e papel A4. Junto com a disponibilização do atlas foi criado um formulário de pesquisa com 67 discentes do curso de medicina veterinária da Universidade Santo Amaro (UNISA) e de outras instituições acadêmicas, para analisar as opiniões dos alunos sobre o atlas.			
<b>RESULTADOS</b>	No questionário foram apresentadas ilustrações do atlas com perguntas sobre as estruturas anatômicas. Em uma das perguntas do formulário sobre as dificuldades referente ao estudo da anatomia onde 31,3% dos discentes relatam apresentar dificuldades em visualizar estruturas em peças anatômicas, 25,4% apresentam dificuldades na correlação de imagens com a prática, 22,4% comentam sobre a falta de métodos alternativos de estudo, 11,9% apresentam a falta de costume de visualizar imagens anatômicas, e 9% marcaram a opção "outros". Visando avaliar o atlas através de uma escala de nota de um a cinco onde, obtivemos resultado de 58,2% dos participantes avaliaram com nota máxima (5), enquanto 32,8% atribuíram nota 4 e apenas 9% atribuíram nota 3. Além disso, 80,6% dos discentes participantes da pesquisa consideram que a utilização do atlas nos estudos traria mais segurança em aplicações práticas, sendo um benefício em sua aprendizagem, enquanto apenas 16,4% optaram por somente utilizar peças cadavéricas em seus estudos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O método, utilizando o atlas, despertou interesse e foi bem aceito pelos alunos. Além disso, mostrou-se relevante na contribuição do desenvolvimento de métodos alternativos de ensino e estudos, incentivando a busca e o desejo do discente em fixar o conteúdo de uma forma alternativa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	DYCE, K.M; SACK; W.O.; WENSING, C.J.G. Tratado de anatomia veterinária. 5.ed. SAUNDRES, 2019. GETTY, R.; SISSON, S.; GROSSMAN, J. D. Anatomia dos animais domésticos, 5ª ed. Guanabara Koogan, p. 662-672. 1986. KARDONG, KENNETH V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14496	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4323874 - ENZO KUK DE ALMEIDA PEROBELLI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva		MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA
<b>TITULO</b>	QUEBRA-CABEÇA DE MIOLOGIA DOS CÃES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE ANATOMIA ANIMAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No ensino da anatomia, dois são os principais métodos utilizados. O ensino tradicional, onde o docente detém o conhecimento, transmitido através de aulas expositivas estimulando a passividade dos ouvintes. Apesar de ser o método mais utilizado pelas instituições, as formas de relacionar professor e aluno vem se modificando. A metodologia ativa torna o educando protagonista do seu próprio conhecimento, desenvolvendo seu senso crítico <sup>1</sup> . O modelo tridimensional (3D) surge como um dos preferidos para a substituição da prática da dissecação, ou agir em conjunto com ela, dando maior suporte ao ensino <sup>2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um modelo anatómico tridimensional, no formato de quebra-cabeça, referente aos músculos dos animais domésticos, trazendo uma nova forma de estudar a anatomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi desenvolvido um modelo 3D dos músculos do membro pélvico do cão, através de uma pesquisa sobre sua topografia correta <sup>3</sup> . Para desenvolver o quebra-cabeça, utilizou-se massa biscuit, imãs e uma estrutura metálica, a partir de uma imagem da estrutura óssea. As peças foram manufaturadas com materiais que tivessem baixo custo, facilidade no manuseio e de fácil acesso. Para avaliar o modelo e sua aplicabilidade, foi desenvolvido um questionário e analisados por 104 pessoas. O modelo foi apresentado através de fotos, com questões sobre suas vistas e as estruturas anatómicas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram obtidas 104 respostas, 73 estudantes e 31 veterinários, sendo os resultados focados nas respostas dos alunos. Questionou-se sobre o método utilizado atualmente, sobre qual método achariam interessante, sendo aqui colocada a opção do uso do modelo 3D. Embora 62% dos alunos preferirem a dissecação, 38% se interessaram pelo uso do modelo, sendo uma porcentagem considerável. Logo, buscou-se entender essa escolha: para 47%, traria maior confiança na hora de aplicar a teoria à prática; 29%, auxiliaria na compreensão do conteúdo; e 16%, ajudaria no estudo. E sobre a disponibilização desta ferramenta pela instituição, 70% votaram a favor. Além disso, 41% dos participantes gostariam de fazer uso desse tipo de modelo anatómico.			
<b>CONCLUSOES</b>	O modelo foi aceito para utilização no processo de ensino-aprendizagem, trazendo benefícios ausentes na dissecação, como: acessibilidade, baixo custo e ser acompanhado com vídeo explicativo. O modelo também pode ser construído pelo próprio aluno e ainda ser explorado pelo docente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BORGES, T. S.; ALENCAR, G. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em Revista, v. Ano 03, n. 04, p. 1 19-143, jul. 2014. 2. PREECE, D. et al. "Let's Get Physical": Advantages of a physical model over 3D computer models and textbooks in learning imaging anatomy. Anatomical Sciences Education, v. 6, n. 4, p. 216-224, jul. 2013. 3. ST. CLAIR, L. E. Miologia. Em: SISSON/GROSSMAN (Ed.). Anatomia dos animais domésticos getty. 5a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. v. 1p. 38-46.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14496	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4696816 - JOAO CARLOS MOREIRA DIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva		MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA
<b>TITULO</b>	QUEBRA-CABEÇA DE MIOLOGIA DOS CÃES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE ANATOMIA ANIMAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No ensino da anatomia, dois são os principais métodos utilizados. O ensino tradicional, onde o docente detém o conhecimento, transmitido através de aulas expositivas estimulando a passividade dos ouvintes. Apesar de ser o método mais utilizado pelas instituições, as formas de relacionar professor e aluno vem se modificando. A metodologia ativa torna o educando protagonista do seu próprio conhecimento, desenvolvendo seu senso crítico <sup>1</sup> . O modelo tridimensional (3D) surge como um dos preferidos para a substituição da prática da dissecação, ou agir em conjunto com ela, dando maior suporte ao ensino <sup>2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um modelo anatómico tridimensional, no formato de quebra-cabeça, referente aos músculos dos animais domésticos, trazendo uma nova forma de estudar a anatomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi desenvolvido um modelo 3D dos músculos do membro pélvico do cão, através de uma pesquisa sobre sua topografia correta <sup>3</sup> . Para desenvolver o quebra-cabeça, utilizou-se massa biscuit, imãs e uma estrutura metálica, a partir de uma imagem da estrutura óssea. As peças foram manufaturadas com materiais que tivessem baixo custo, facilidade no manuseio e de fácil acesso. Para avaliar o modelo e sua aplicabilidade, foi desenvolvido um questionário e analisados por 104 pessoas. O modelo foi apresentado através de fotos, com questões sobre suas vistas e as estruturas anatómicas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram obtidas 104 respostas, 73 estudantes e 31 veterinários, sendo os resultados focados nas respostas dos alunos. Questionou-se sobre o método utilizado atualmente, sobre qual método achariam interessante, sendo aqui colocada a opção do uso do modelo 3D. Embora 62% dos alunos preferirem a dissecação, 38% se interessaram pelo uso do modelo, sendo uma porcentagem considerável. Logo, buscou-se entender essa escolha: para 47%, traria maior confiança na hora de aplicar a teoria à prática; 29%, auxiliaria na compreensão do conteúdo; e 16%, ajudaria no estudo. E sobre a disponibilização desta ferramenta pela instituição, 70% votaram a favor. Além disso, 41% dos participantes gostariam de fazer uso desse tipo de modelo anatómico.			
<b>CONCLUSOES</b>	O modelo foi aceito para utilização no processo de ensino-aprendizagem, trazendo benefícios ausentes na dissecação, como: acessibilidade, baixo custo e ser acompanhado com vídeo explicativo. O modelo também pode ser construído pelo próprio aluno e ainda ser explorado pelo docente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BORGES, T. S.; ALENCAR, G. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em Revista, v. Ano 03, n. 04, p. 1 19-143, jul. 2014. 2. PREECE, D. et al. "Let's Get Physical": Advantages of a physical model over 3D computer models and textbooks in learning imaging anatomy. Anatomical Sciences Education, v. 6, n. 4, p. 216–224, jul. 2013. 3. ST. CLAIR, L. E. Miologia. Em: SISSON/GROSSMAN (Ed.). Anatomia dos animais domésticos getty. 5a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. v. 1p. 38–46.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5198909 - LAURA JALES DE ARAÚJO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCA O</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeperica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADO S</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeperica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeperica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5198984 - SAMUEL YAN ARAÚJO COSTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCA O</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeçerica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADO S</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeçerica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeçerica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeçerica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeçerica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5199018 - VICTÓRIA NUNES BOLOGNANI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCA O</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeperica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADO S</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeperica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeperica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		<b>Orientador Externo</b>		
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
		5199191 - LETICIA CRISTINA RODRIGUES DE MEDEIROS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'lher"			
<b>INTRODUCA O</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeperica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADO S</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-íris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeperica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeperica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedrosa. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5199212 - VICTORIA AINA AQUINO DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCA O</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeçerica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADO S</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeçerica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeçerica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeçerica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeçerica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5199263 - THAIS CEZAR HEPHER	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCA O</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeperica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADO S</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha, Itapeperica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeperica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preserved-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preserved-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199361 - VITORIA MARIA MESQUITA PESSOA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCAO</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeperica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADOS</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeperica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeperica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199603 - VICTORIA HELENA DE SOUZA JARDIM		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCAO</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeperica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADOS</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeperica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeperica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preserved-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preserved-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220203 - ARIANE DONATILIO RÊGO PUPPIM		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patrícia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCA O</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapequerica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADO S</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapequerica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapequerica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapequerica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapequerica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preservar-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14497	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220327 - ANA LUIZA JANUARIO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão "Aquo'her"			
<b>INTRODUCAO</b>	A água constitui-se como um elemento essencial para a sobrevivência humana, pois é responsável, principalmente, pela manutenção das atividades vitais, pela regulação térmica do organismo, além de ser o habitat dos seres aquáticos. Para que as suas diversas funções sejam desempenhadas, faz-se necessário que os recursos hídricos estejam livres de poluentes e que o seu consumo seja benéfico aos seres humanos. Frente aos altos índices de poluição e mau gerenciamento dos recursos hídricos observados nos últimos tempos, observou-se a necessidade de realizar uma intervenção pedagógica no município de Itapeperica da Serra/SP, pois o mesmo se encontra em uma área rodeada de mananciais, nascentes fundamentais para a estabilidade hídrica do local e da região ao redor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho possui como objetivo principal promover a conscientização acerca da relevância da água e a importância de se preservar os meios naturais em uma sala com alunos portadores de deficiência, de uma instituição escolar do município.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizado um jogo de tabuleiro onde as casas serão montadas com temas hídricos referente a importância da água e preservação de meio ambiente. Os alunos da escola serão os "peões" do jogo e seguirão andando nas casas conforme acertam as perguntas. Após o jogo será realizada uma palestra com temas abordados no jogo e no final o jogo ocorrerá novamente para verificar se houve mudança na aquisição de conhecimento.			
<b>RESULTADOS</b>	A aplicação deverá ser feita na escola EMEE Arco-iris Centro em meados de outubro de 2023, com a realização de um jogo lúdico de tabuleiro interativo com os alunos e, posteriormente, a aplicação de um breve questionário para a avaliação das temáticas abordadas. Espera-se que haja melhora na aquisição de conhecimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com isso, espera-se gerar uma melhor percepção nos alunos acerca da relevância da água e a importância de não a poluir, gerando impactos positivos nos hábitos de vida dessas pessoas e, conseqüentemente, na sustentabilidade dos recursos hídricos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ZARUR, D. C. et al. Apostila de Monitoria do Parque Ecológico da Represinha. Itapeperica da Serra, 2003. p. 28 - 24. 2. Marin-Morales MA, Roberto MM, Angelis DF, Angelis DA. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. Rio Claro/ SP: UNESP, 2013. 3. A importância de preservar as nascentes do município - Itapeperica da Serra. SP.gov.br. Disponível em: <a href="https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preserved-as-nascentes-do-municipio(#62)">https://www.itapeperica.sp.gov.br/noticias/planejamento-e-meio-ambiente/a-importancia-de-preserved-as-nascentes-do-municipio(#62)</a> . Acesso em: 7 set. 2023. 4. Soraia Pedroso. Inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na educação infantil. UNISUL: 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14498	Medicina Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4696816 - JOAO CARLOS MOREIRA DIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renata dos Santos Silva		MARCOS VINÍCIUS MENDES SILVA
<b>TITULO</b>	MODELO ANATÔMICO DE BAIXO CUSTO PARA OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A disciplina de anatomia faz parte do ciclo básico de ensino em diversos cursos de graduação. Dentro dos assuntos estudados, a anatomia oftálmica é tópico indispensável, apresentando complexidade e delicadeza das estruturas oculares. Entre as diversas ferramentas utilizadas, os modelos anatômicos se destacam como alternativas práticas para aprimorar a compreensão e a fixação do conteúdo, oferecendo uma abordagem descontraída e atrativa para os alunos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Desenvolver um modelo anatômico de olho de cão, com baixo custo, a fim de usá-lo como ferramenta alternativa no ensino prático da anatomia ocular animal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a elaboração do modelo anatômico, foram utilizados massa de porcelana fria (biscuit), tinta à base de PVA e uma bola de isopor. Adicionalmente, com o intuito de avaliar o modelo desenvolvido, foi elaborado um formulário on-line com fotográficas do modelo anatômico, bem como questões relacionadas ao nível acadêmico dos discentes entrevistados, seu conhecimento prévio sobre anatomia ocular e perguntas destinadas a identificar as estruturas anatômicas sinalizadas nas fotos do modelo anatômico de olho de cão. Ao final do questionário, foram incluídas três perguntas adicionais destinadas à avaliação do protótipo em si. O questionário foi respondido por 80 alunos do curso de medicina veterinária da Universidade de Santo Amaro (UNISA).			
<b>RESULTADOS</b>	O modelo anatômico do olho de cão teve baixo custo, totalizando R\$ 66,95 em despesas para sua produção. Vale ressaltar, que o valor é considerado baixo quando comparado aos modelos 3D existentes. O modelo anatômico teve uma boa aceitação por parte dos alunos, sendo que 77,5% dos participantes atribuíram a pontuação máxima ao modelo, em uma escala de avaliação de 0 a 5. Adicionalmente, aproximadamente 85% e 95% dos entrevistados afirmaram, respectivamente, que a utilização do modelo lhes confere maior confiança na aplicação prática do conteúdo e o consideraram benéfico para sua aprendizagem. Além desses resultados, havia um segmento específico do questionário que pedia aos alunos a identificação das estruturas identificadas nas fotografias do modelo anatômico do olho de cão. Os resultados dessa seção foram 45% foram marcadas com a resposta "Não sei", 34,9% das respostas foram respondidas corretamente, enquanto 19,8% foram consideradas incorretas. As respostas em que os alunos admitiram desconhecimento das estruturas apontadas pode ser justificado pela ausência de familiaridade prévia com a anatomia ocular. Sendo assim, observamos que 76,3% dos participantes afirmaram não ter tido conhecimento prévia ao conteúdo relacionado à anatomia ocular.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O modelo teve boa aceitabilidade pelos alunos, demonstrando que esse pode ser uma ferramenta eficaz no envolvimento ativo durante o processo de aprendizagem prática da anatomia ocular.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ALBERNAZ, R.M; BERNARDI, N. Uso de modelo anatômico para o ensino da técnica de bloqueio regional da porção distal dos membros torácicos em equinos. <i>Ars Veterinária</i> , Jaboticabal, SP, v. 37, n. 1, p. 10-14, 26 mar. 2021. MASSARI, Catia et al. Tendências do Ensino de Anatomia Animal na Graduação de Medicina Veterinária. <i>Revista Grad. USP</i> , São Paulo, v. 3, n. 225, p. 25-32, 4 jul. 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14499	Neurologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4675100 - FERNANDA PEREIRA LEMOS BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Saulo dos Santos Gil	Lucas Melo Neves	
<b>TITULO</b>	IMPACTOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA ASSIMETRIA ENCEFÁLICA DE IDOSOS: UM ESTUDO COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A assimetria encefálica ou simplesmente índice de assimetria (IA) é comumente verificada em pessoas saudáveis (2,5%), porém pessoas com comprometimento cognitivo leve (4,4%) ou doença de Alzheimer (6,8%) apresentam tal medida mais pronunciada. Apesar da atividade física de intensidade moderada/vigorosa (AFMV) ser bem descrita como protetora para o desenvolvimento de demência (fator protetor=28%) e ter potencial para preservar o volume encefálico (até 10%), pouco se sabe sobre o impacto da AF no IA nas diferentes áreas/estruturas do cérebro.			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar idosos que realizam e não realizam a recomendação de AFMV (150 minutos/semana) quanto ao IA do cérebro considerando 71 áreas/estruturas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal, prospectivo e analítico (01 a 07/2018), com 42 idosos (65,1±2,8) não praticantes de exercício físico nos últimos 6 meses, sem doenças neurológicas, escolaridade 3-12 anos. Avaliações de ressonância magnética (RM) de crânio, tempo de AFMV, aptidão cardiorrespiratória (VO2pico), funcionalidade (TUG test) e força (dinamômetro) foram realizadas. Após foram divididos em dois subgrupos: (#38)#8805;150 minutos AF (n=20); (#60)150 minutos AF (n=22). Os programas SPSS® e SAS foram utilizados para testes estatísticos (t de student, Cohen's d e regressão linear múltipla - usada para determinar o quanto as variáveis de tempo de AFMV, VO2 pico, TUG e dinamometria explicavam (prediziam) as assimetrias encefálicas). Segundo padronização de estudos prévios, considerou-se IA as medidas da área como segue: (esquerdo - direito)/(esquerdo + direito).			
<b>RESULTADOS</b>	Em 8 das 71 áreas/estruturas encefálicas verificamos diferenças (p(#38)#8804;0.05) no IA: cérebro total, substância branca encefálica, putâmen, gânglio basal, cíngulo anterior, parênquima prosencéfalo, rostral cíngulo anterior e orbitofrontal medial. A regressão linear múltipla identificou como primeiro preditor do IA: TUG [cíngulo anterior (R²=0.10, p=0.04), parênquima prosencéfalo (R²=0.15, p=0.0101) e cérebro total (R²=0.14, p=0.0118)]; Tempo de AFMV [substância branca cerebral (R²=0.10, p=0.0352); VO2pico [putâmen (R²=0.16, p=0.0072)]. Desta forma, este estudo é pioneiro ao demonstrar que idosos que atendem a recomendação de AFMV apresentam menor IA, destacando o desempenho no TUG, o tempo de AFMV e o VO2pico, como preditores do IA.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se, que idosos que realizam a recomendação de AFMV (150 minutos/semana) apresentam menor IA em 8 áreas/estruturas. Adicionalmente, variáveis TUG, VO2pico e tempo de AFMV são preditores do IA.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Hamer M., Chida Y. Physical activity and risk of neurodegenerative disease: A systematic review of prospective evidence. Psychol. Med. 2009. 2. Liu Y., et al. The beneficial effects of physical exercise in the brain and related pathophysiological mechanisms in neurodegenerative diseases. Lab. Investig. 2019. 3. ARDEKANI, B. et al. Sexual dimorphism and hemispheric asymmetry of hippocampal volumetric integrity in normal aging and Alzheimer disease. American Journal of Neuroradiology, 40, n. 2, p. 276-282, 2019. 4. Melo Neves, L. et al. "Objective Physical Activity Accumulation and Brain Volume in Older Adults: An MRI and Whole-Brain Volume Study". The Journals of Gerontology: Series A, vol. 78, no 6, 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14500	Educação	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442504 - DOUGLAS MATOS PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Gonçalves de Almeida	Olga Maria Lodi Rizzini	
<b>TITULO</b>	A significação do bom e do mau aluno pelo professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental			
<b>INTRODUCAO</b>	Nos anos iniciais do ensino infantil, podemos notar que as figuras de linguagem, abstrações e simbolismos começam a fazer parte do seu meio e dos seus discursos. Essa pesquisa procura compreender a importância do processo de significação do que se compreende como "bom aluno" e "mau aluno", oriundo dos discursos dos docentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar como ocorre a significação do bom aluno e o mau aluno no discurso professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizamos a pesquisa bibliográfica, procurando compreender e ressaltar a importância dos valores simbólicos presentes no discurso do professor sobre o "bom" e o "mau" aluno.			
<b>RESULTADOS</b>	Neste estudo, partimos de diversos estudos sobre a representação do "bom aluno" e do "mau aluno", principalmente, sobre a influência simbólica dentro dessa representação. A representação simbólica ou, o poder simbólico, enfatizando a visão do professor se torna um determinante, à medida que o papel docente impacta diretamente em contato com o processo de aprendizagem dos alunos. A violência simbólica caracteriza a relação do docente e a do educando. Deve-se considerar o aluno tal como ele se apresenta e a sua realidade e totalidade. Sem esquecer conceitos para o desenvolvimento dos alunos. Mas a realidade se torna mais complexa e violenta. "A violência simbólica onde o professor, na sua condição de autoridade pedagógica, exerce a violência simbólica, pois possui legitimidade por parte da comunidade escolar para exercê-la", (JUBE, CAVALCANTE, CASTRO, JUBE, p. 24878). Esse ideal geralmente não visa em seu âmbito discursivo os desenvolvimentos não lineares e não planejados podem causar frustração naqueles que não correspondem ao desenvolvimento previsto do ensino de professor, e em seu discurso e prática isso pode se tornar evidente. Podendo gerar o posto do que se era pretendido inicialmente. "Simultaneamente tem sido possível perceber que a responsabilização individual incorporada pelas crianças apresenta outra face a experiência desse tipo de aluno tende a ser acompanhada por ansiedades e dúvidas sobre si próprio podendo desenvolver uma imagem de fracasso que não atinge elevados níveis de desempenho repercussões na própria identidade pessoal." (DIOGO, FERREIRA BENEDITA E PORTUGAL, 2023, p. 5) A ideia do "bom aluno" ou "mau aluno", das expectativas a serem alcançadas com relação ao planejamento inicial podem desencadear negativamente no contexto da sala de aula e no seu desenvolvimento, à medida que esse discurso é evidenciado pelos alunos, desestimulando aqueles que não correspondem, causando frustração e inquietação nesses alunos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluimos que nesse aspecto, se faz necessário um estudo aprofundado nessa relação de professor-aluno e como as representações simbólicas podem agregar no processo de ensino-aprendizagem. Fatores sociais, e externos, também devem ser considerados para um melhor entendimento da realidade do educando.			
<b>REFERENCIAS</b>	DIOGO, Ana; FERREIRA, Manuela; MELO, Benedita Portugal. A interiorização da performatividade pelas crianças: lógicas de fabricação do bom aluno no ensino primário. Educ. Soc., Campinas, 2023. . JUBE, Milene de Oliveira Machado Ramos; CALVACANTE, Claudia Valente; CASTRO, Claudia Maria Jesus. Violência simbólica para Pierre Bourdieu: a relação com escola contemporânea. Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar: junho, 2023 – Mineiros-GO.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14503	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4206771 - BEATRIZ AMARAL BUQUI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	PERSPECTIVAS DA TELESSAUDE QUANDO UTILIZADA EM CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A telessaúde apresenta crescimento significativo na área da saúde devido à necessidade do uso de tecnologias em busca da ampliação do acesso especializado e qualidade do cuidado à distância, de acordo com a realidade sociopolítica de cada sociedade. Pacientes com câncer são cada vez mais encaminhados para acompanhamento em Cuidados Paliativos, uma das mais diversas áreas da medicina em que a telessaúde pode ser uma ferramenta promissora para assegurar o cuidado especializado, complementando a qualidade dos cuidados oferecidos aos pacientes e familiares. A integração dessa tecnologia ocorre por meio de teleconsultas, mensagens de texto, navegação por pares e/ou aplicativos para web ou celulares. Profissionais e instituições de saúde enfrentam inúmeros desafios que abrangem os espectros da regulamentação dos programas e da qualidade do cuidado, de maneira que as percepções dos profissionais da saúde variam com os métodos aplicados e as situações em que foram usados. Compreender o funcionamento de tais tecnologias e sua aplicabilidade em cenários relacionados a pacientes acometidos pelo câncer se faz necessário para o benefício mútuo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta revisão narrativa avalia os benefícios do atendimento remoto, no tratamento e no seguimento de pacientes com câncer em cuidados paliativos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada pesquisa nas bases de dados, PubMed e Scielo, de acordo com os descritores "telehealth", "palliative care", "cancer" e operador booleano AND, de 2015 a 2023, sem restrição de idioma. Selecionados de acordo com os critérios de exclusão e inclusão 14 artigos para esta análise.			
<b>RESULTADO S</b>	Estudos que utilizaram a Web, telefone, mensagens de texto e aplicativos para implementar o treinamento de apoio à decisão compartilhada, cuidado e educacionais, constataram melhora da dor, sintomas psicológicos e maior envolvimento do paciente no tratamento. Reduziu também os escores de depressão e angústia e melhora da comunicação nos cuidadores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Existem benefícios do uso de ferramentas de saúde móvel no tratamento e seguimento dos pacientes com câncer nos Cuidados Paliativos e melhora na sobrecarga, desenvolvimento de habilidades de decisão compartilhada e diminuição do sofrimento psicológico para os cuidadores.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1.Waller M, Stotler C. Telemedicine: a Primer. Curr Allergy Asthma Rep. 2018 Aug 25;18(10):54. doi: 10.1007/s11882-018-0808-4. PMID: 30145709. 2.Baker J, Stanley A. Telemedicine Technology: a Review of Services, Equipment, and Other Aspects. Curr Allergy Asthma Rep. 2018 Sep 26;18(11):60. doi: 10.1007/s11882-018-0814-6. PMID: 30259201. 3.Roth AR, Canedo AR. Introduction to Hospice and Palliative Care. Prim Care. 2019 Sep;46(3):287-302. doi: 10.1016/j.pop.2019.04.001. Epub 2019 Jun 13. PMID: 31375182. 4.Kamal AH, Wolf S, Nicolla JM, Friedman F, Xuan M, Bennett AV, et al. Usability of PCforMe in Patients With Advanced Cancer Referred to Outpatient Palliative Care: Results of a Randomized, Active-Controlled Pilot Trial. Journal of Pain and Symptom Management. 2019 Sep;58(3):382-9. 5.Hoek PD, Schers HJ, Bronkhorst EM, Vissers KCP, Hasselaar JGJ. The effect of weekly specialist palliative care teleconsultations in patients with advanced cancer—a randomized clinical trial. BMC Medicine. 2017 Jun 19;15(1). 6.Dionne-Odom JN, Wells RD, Guastafarro K, Azuero A, Hendricks BA, Currie ER, et al. An Early Palliative Care Telehealth Coaching Intervention to Enhance Advanced Cancer Family Caregivers' Decision Support Skills: The CASCADE Pilot Factorial Trial. Journal of Pain and Symptom Management. 2021 Jul; 7.Dionne-Odom JN, Azuero A, Lyons KD, Hull JG, Tosteson T, Li Z, Li Z, Frost J, Dragnev KH, Akyar I, Hegel MT, Bakitas MA. Benefits of Early Versus Delayed Palliative Care to Informal Family Caregivers of Patients With Advanced Cancer: Outcomes From the ENABLE III Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. 2015 May 1;33(13):1446-52. doi: 10.1200/JCO.2014.58.7824. Epub 2015 Mar 23. PMID: 25800762; PMCID: PMC4404423. 8.Ngom M, Mushi B, Morse RS, Ngoma T, Mahuna H, Lambden K, et al. mPalliative Care Link: Examination of a Mobile Solution to Palliative Care Coordination Among Tanzanian Patients With Cancer. JCO Global Oncology. 2021 Aug;(7):1306-15. 9.Steel JL, Reyes V, Zandberg DP, Nilsen M, Terhorst L, Richards G, et al. The next generation of collaborative care: The design of a novel web-based stepped collaborative care intervention delivered via telemedicine for people diagnosed with cancer. Contemporary Clinical Trials [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2023 Mar 2];105:106295. 10. Chua IS, Olmsted M, Plotke R, Turk Y, Trotter C, Rinaldi S, Kamdar M, Jackson VA, Gallagher-Medeiros ER, El-Jawahri A, Temel JS, Greer JA. Video and In-Person Palliative Care Delivery Challenges before and during the COVID-19 Pandemic. J Pain Symptom Manage. 2022 Dec;64(6):577-587. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2022.08.005. Epub 2022 Aug 17. PMID: 35985551; PMCID: PMC9383956.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14503	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4210972 - FERNANDA CHRISTOFFEL GOMES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mylene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	PERSPECTIVAS DA TELESSAUDE QUANDO UTILIZADA EM CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS.			
<b>INTRODUCA O</b>	A telessaúde apresenta crescimento significativo na área da saúde devido à necessidade do uso de tecnologias em busca da ampliação do acesso especializado e qualidade do cuidado à distância, de acordo com a realidade sociopolítica de cada sociedade. Pacientes com câncer são cada vez mais encaminhados para acompanhamento em Cuidados Paliativos, uma das mais diversas áreas da medicina em que a telessaúde pode ser uma ferramenta promissora para assegurar o cuidado especializado, complementando a qualidade dos cuidados oferecidos aos pacientes e familiares. A integração dessa tecnologia ocorre por meio de teleconsultas, mensagens de texto, navegação por pares e/ou aplicativos para web ou celulares. Profissionais e instituições de saúde enfrentam inúmeros desafios que abrangem os espectros da regulamentação dos programas e da qualidade do cuidado, de maneira que as percepções dos profissionais da saúde variam com os métodos aplicados e as situações em que foram usados. Compreender o funcionamento de tais tecnologias e sua aplicabilidade em cenários relacionados a pacientes acometidos pelo câncer se faz necessário para o benefício mútuo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta revisão narrativa avalia os benefícios do atendimento remoto, no tratamento e no seguimento de pacientes com câncer em cuidados paliativos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada pesquisa nas bases de dados, PubMed e Scielo, de acordo com os descritores "telehealth", "palliative care", "cancer" e operador booleano AND, de 2015 a 2023, sem restrição de idioma. Selecionados de acordo com os critérios de exclusão e inclusão 14 artigos para esta análise.			
<b>RESULTADO S</b>	Estudos que utilizaram a Web, telefone, mensagens de texto e aplicativos para implementar o treinamento de apoio à decisão compartilhada, cuidado e educacionais, constataram melhora da dor, sintomas psicológicos e maior envolvimento do paciente no tratamento. Reduziu também os escores de depressão e angústia e melhora da comunicação nos cuidadores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Existem benefícios do uso de ferramentas de saúde móvel no tratamento e seguimento dos pacientes com câncer nos Cuidados Paliativos e melhora na sobrecarga, desenvolvimento de habilidades de decisão compartilhada e diminuição do sofrimento psicológico para os cuidadores.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1.Waller M, Stotler C. Telemedicine: a Primer. <i>Curr Allergy Asthma Rep.</i> 2018 Aug 25;18(10):54. doi: 10.1007/s11882-018-0808-4. PMID: 30145709. 2.Baker J, Stanley A. Telemedicine Technology: a Review of Services, Equipment, and Other Aspects. <i>Curr Allergy Asthma Rep.</i> 2018 Sep 26;18(11):60. doi: 10.1007/s11882-018-0814-6. PMID: 30259201. 3.Roth AR, Canedo AR. Introduction to Hospice and Palliative Care. <i>Prim Care.</i> 2019 Sep;46(3):287-302. doi: 10.1016/j.pop.2019.04.001. Epub 2019 Jun 13. PMID: 31375182. 4.Kamal AH, Wolf S, Nicolla JM, Friedman F, Xuan M, Bennett AV, et al. Usability of PCforMe in Patients With Advanced Cancer Referred to Outpatient Palliative Care: Results of a Randomized, Active-Controlled Pilot Trial. <i>Journal of Pain and Symptom Management.</i> 2019 Sep;58(3):382-9. 5.Hoek PD, Schers HJ, Bronkhorst EM, Vissers KCP, Hasselaar JGJ. The effect of weekly specialist palliative care teleconsultations in patients with advanced cancer—a randomized clinical trial. <i>BMC Medicine.</i> 2017 Jun 19;15(1). 6.Dionne-Odom JN, Wells RD, Guastaferro K, Azuero A, Hendricks BA, Currie ER, et al. An Early Palliative Care Telehealth Coaching Intervention to Enhance Advanced Cancer Family Caregivers' Decision Support Skills: The CASCADE Pilot Factorial Trial. <i>Journal of Pain and Symptom Management.</i> 2021 Jul; 7.Dionne-Odom JN, Azuero A, Lyons KD, Hull JG, Tosteson T, Li Z, Li Z, Frost J, Dragnev KH, Akyar I, Hegel MT, Bakitas MA. Benefits of Early Versus Delayed Palliative Care to Informal Family Caregivers of Patients With Advanced Cancer: Outcomes From the ENABLE III Randomized Controlled Trial. <i>J Clin Oncol.</i> 2015 May 1;33(13):1446-52. doi: 10.1200/JCO.2014.58.7824. Epub 2015 Mar 23. PMID: 25800762; PMCID: PMC4404423. 8.Ngoma M, Mushi B, Morse RS, Ngoma T, Mahuna H, Lambden K, et al. mPalliative Care Link: Examination of a Mobile Solution to Palliative Care Coordination Among Tanzanian Patients With Cancer. <i>JCO Global Oncology.</i> 2021 Aug;(7):1306-15. 9.Steel JL, Reyes V, Zandberg DP, Nilsen M, Terhorst L, Richards G, et al. The next generation of collaborative care: The design of a novel web-based stepped collaborative care intervention delivered via telemedicine for people diagnosed with cancer. <i>Contemporary Clinical Trials [Internet].</i> 2021 Jun 1 [cited 2023 Mar 2];105:106295. 10. Chua IS, Olmsted M, Plotke R, Turk Y, Trotter C, Rinaldi S, Kamdar M, Jackson VA, Gallagher-Medeiros ER, El-Jawahri A, Temel JS, Greer JA. Video and In-Person Palliative Care Delivery Challenges before and during the COVID-19 Pandemic. <i>J Pain Symptom Manage.</i> 2022 Dec;64(6):577-587. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2022.08.005. Epub 2022 Aug 17. PMID: 35985551; PMCID: PMC9383956.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14503	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4618220 - MARCOS NORONHA FORTES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	PERSPECTIVAS DA TELESSAUDE QUANDO UTILIZADA EM CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A telessaúde apresenta crescimento significativo na área da saúde devido à necessidade do uso de tecnologias em busca da ampliação do acesso especializado e qualidade do cuidado à distância, de acordo com a realidade sociopolítica de cada sociedade. Pacientes com câncer são cada vez mais encaminhados para acompanhamento em Cuidados Paliativos, uma das mais diversas áreas da medicina em que a telessaúde pode ser uma ferramenta promissora para assegurar o cuidado especializado, complementando a qualidade dos cuidados oferecidos aos pacientes e familiares. A integração dessa tecnologia ocorre por meio de teleconsultas, mensagens de texto, navegação por pares e/ou aplicativos para web ou celulares. Profissionais e instituições de saúde enfrentam inúmeros desafios que abrangem os espectros da regulamentação dos programas e da qualidade do cuidado, de maneira que as percepções dos profissionais da saúde variam com os métodos aplicados e as situações em que foram usados. Compreender o funcionamento de tais tecnologias e sua aplicabilidade em cenários relacionados a pacientes acometidos pelo câncer se faz necessário para o benefício mútuo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta revisão narrativa avalia os benefícios do atendimento remoto, no tratamento e no seguimento de pacientes com câncer em cuidados paliativos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada pesquisa nas bases de dados, PubMed e Scielo, de acordo com os descritores "telehealth", "palliative care", "cancer" e operador booleano AND, de 2015 a 2023, sem restrição de idioma. Selecionados de acordo com os critérios de exclusão e inclusão 14 artigos para esta análise.			
<b>RESULTADO S</b>	Estudos que utilizaram a Web, telefone, mensagens de texto e aplicativos para implementar o treinamento de apoio à decisão compartilhada, cuidado e educacionais, constataram melhora da dor, sintomas psicológicos e maior envolvimento do paciente no tratamento. Reduziu também os escores de depressão e angústia e melhora da comunicação nos cuidadores.			
<b>CONCLUSOES</b>	Existem benefícios do uso de ferramentas de saúde móvel no tratamento e seguimento dos pacientes com câncer nos Cuidados Paliativos e melhora na sobrecarga, desenvolvimento de habilidades de decisão compartilhada e diminuição do sofrimento psicológico para os cuidadores.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1.Waller M, Stotler C. Telemedicine: a Primer. Curr Allergy Asthma Rep. 2018 Aug 25;18(10):54. doi: 10.1007/s11882-018-0808-4. PMID: 30145709. 2.Baker J, Stanley A. Telemedicine Technology: a Review of Services, Equipment, and Other Aspects. Curr Allergy Asthma Rep. 2018 Sep 26;18(11):60. doi: 10.1007/s11882-018-0814-6. PMID: 30259201. 3.Roth AR, Canedo AR. Introduction to Hospice and Palliative Care. Prim Care. 2019 Sep;46(3):287-302. doi: 10.1016/j.pop.2019.04.001. Epub 2019 Jun 13. PMID: 31375182. 4.Kamal AH, Wolf S, Nicolla JM, Friedman F, Xuan M, Bennett AV, et al. Usability of PCforMe in Patients With Advanced Cancer Referred to Outpatient Palliative Care: Results of a Randomized, Active-Controlled Pilot Trial. Journal of Pain and Symptom Management. 2019 Sep;58(3):382-9. 5.Hoek PD, Schers HJ, Bronkhorst EM, Vissers KCP, Hasselaar JGJ. The effect of weekly specialist palliative care teleconsultations in patients with advanced cancer—a randomized clinical trial. BMC Medicine. 2017 Jun 19;15(1). 6.Dionne-Odom JN, Wells RD, Guastafarro K, Azuero A, Hendricks BA, Currie ER, et al. An Early Palliative Care Telehealth Coaching Intervention to Enhance Advanced Cancer Family Caregivers' Decision Support Skills: The CASCADE Pilot Factorial Trial. Journal of Pain and Symptom Management. 2021 Jul; 7.Dionne-Odom JN, Azuero A, Lyons KD, Hull JG, Tosteson T, Li Z, Li Z, Frost J, Dragnev KH, Akyar I, Hegel MT, Bakitas MA. Benefits of Early Versus Delayed Palliative Care to Informal Family Caregivers of Patients With Advanced Cancer: Outcomes From the ENABLE III Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. 2015 May 1;33(13):1446-52. doi: 10.1200/JCO.2014.58.7824. Epub 2015 Mar 23. PMID: 25800762; PMCID: PMC4404423. 8.Ngoma M, Mushi B, Morse RS, Ngoma T, Mahuna H, Lambden K, et al. mPalliative Care Link: Examination of a Mobile Solution to Palliative Care Coordination Among Tanzanian Patients With Cancer. JCO Global Oncology. 2021 Aug;(7):1306-15. 9.Steel JL, Reyes V, Zandberg DP, Nilsen M, Terhorst L, Richards G, et al. The next generation of collaborative care: The design of a novel web-based stepped collaborative care intervention delivered via telemedicine for people diagnosed with cancer. Contemporary Clinical Trials [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2023 Mar 2];105:106295. 10. Chua IS, Olmsted M, Plotke R, Turk Y, Trotter C, Rinaldi S, Kamdar M, Jackson VA, Gallagher-Medeiros ER, El-Jawahri A, Temel JS, Greer JA. Video and In-Person Palliative Care Delivery Challenges before and during the COVID-19 Pandemic. J Pain Symptom Manage. 2022 Dec;64(6):577-587. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2022.08.005. Epub 2022 Aug 17. PMID: 35985551; PMCID: PMC9383956.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14504	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4211243 - GIOVANNA QUEIROZ ORTALI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DOS CIGARROS ELETRÔNICOS E CIGARROS CONVENCIONAIS NA CAPACIDADE EXPIRATÓRIA PULMONAR.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O cigarro eletrônico foi criado como substituto para o cigarro convencional composto de tabaco. Devido aos riscos associados a seu uso, é proibido no Brasil pela RDC no46 de 2009. Ainda assim estima-se que 835 mil fumam cigarros eletrônicos no Brasil. Por não produzirem fumaça e maus odores, e terem seus malefícios ainda em fase de estudo, parecem ser mais seguros e inócuos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar se existem diferenças no fluxo expiratório e nos sintomas respiratórios de usuários de cigarro convencional e de cigarro eletrônico entre si e em comparação aos não fumantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	120 voluntários foram recrutados aleatoriamente e divididos em 3 grupos: não fumantes, usuários de cigarro convencional e usuários de cigarro eletrônico. Todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam um questionário online via Google Forms e realizaram o exame Peak Flow. Os dados foram tabelados e comparados entre os grupos usando ANOVA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram analisados 120 pacientes sendo 52,5% mulheres e 47,5% homens de igual faixa etária. Entre as mulheres de 18-25 anos, apenas 34% eram não fumantes e 65% fumavam cigarro eletrônico, enquanto nenhuma mulher acima de 25 anos fazia uso desse tipo de cigarro. Não houve diferença estatística para o grupo de homens. Destes, na faixa de 18-25 anos, 45% eram não fumantes e 50% usavam cigarro eletrônico. Nas demais idades nenhum homem fazia uso de cigarro eletrônico. A capacidade expiratória avaliada pelo peak flow foi inferior para as mulheres (401,4mL) que para os homens (562,6 mL). Não foi possível detectar diferenças estatísticas entre fumantes e não fumantes com relação a capacidade expiratória, mesmo com a comparação por diferentes faixas etárias. Os fumantes de cigarro convencional relataram mais sintomas respiratórios que os usuários de cigarro eletrônico. Esse dado pode ter relação com a dificuldade encontrada na quantificação da carga tabágica do segundo grupo, pela idade dos fumantes dos diferentes tipos de cigarro e do tempo de uso dos dispositivos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Existe diferença significativa entre o número de fumantes de cigarros eletrônicos e convencionais por faixa etária, predominando o eletrônico nos mais jovens. Embora os dados mostrem valores obtidos no peak flow inferiores nos grupos usuários de cigarros quando comparados aos não fumantes, não houve diferença estatística provavelmente pelo tamanho da amostra e pela dificuldade na quantificação da carga tabágica nos usuários de cigarros eletrônicos.			
<b>REFERENCIAS</b>				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14504	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4211332 - MANOLA MARIA HEKMA WIERDA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DOS CIGARROS ELETRÔNICOS E CIGARROS CONVENCIONAIS NA CAPACIDADE EXPIRATÓRIA PULMONAR.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O cigarro eletrônico foi criado como substituto para o cigarro convencional composto de tabaco. Devido aos riscos associados a seu uso, é proibido no Brasil pela RDC no46 de 2009. Ainda assim estima-se que 835 mil fumam cigarros eletrônicos no Brasil. Por não produzirem fumaça e maus odores, e terem seus malefícios ainda em fase de estudo, parecem ser mais seguros e inócuos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar se existem diferenças no fluxo expiratório e nos sintomas respiratórios de usuários de cigarro convencional e de cigarro eletrônico entre si e em comparação aos não fumantes.			
<b>METODOLOGIA</b>	120 voluntários foram recrutados aleatoriamente e divididos em 3 grupos: não fumantes, usuários de cigarro convencional e usuários de cigarro eletrônico. Todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam um questionário online via Google Forms e realizaram o exame Peak Flow. Os dados foram tabelados e comparados entre os grupos usando ANOVA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram analisados 120 pacientes sendo 52,5% mulheres e 47,5% homens de igual faixa etária. Entre as mulheres de 18-25 anos, apenas 34% eram não fumantes e 65% fumavam cigarro eletrônico, enquanto nenhuma mulher acima de 25 anos fazia uso desse tipo de cigarro. Não houve diferença estatística para o grupo de homens. Destes, na faixa de 18-25 anos, 45% eram não fumantes e 50% usavam cigarro eletrônico. Nas demais idades nenhum homem fazia uso de cigarro eletrônico. A capacidade expiratória avaliada pelo peak flow foi inferior para as mulheres (401,4mL) que para os homens (562,6 mL). Não foi possível detectar diferenças estatísticas entre fumantes e não fumantes com relação a capacidade expiratória, mesmo com a comparação por diferentes faixas etárias. Os fumantes de cigarro convencional relataram mais sintomas respiratórios que os usuários de cigarro eletrônico. Esse dado pode ter relação com a dificuldade encontrada na quantificação da carga tabágica do segundo grupo, pela idade dos fumantes dos diferentes tipos de cigarro e do tempo de uso dos dispositivos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Existe diferença significativa entre o número de fumantes de cigarros eletrônicos e convencionais por faixa etária, predominando o eletrônico nos mais jovens. Embora os dados mostrem valores obtidos no peak flow inferiores nos grupos usuários de cigarros quando comparados aos não fumantes, não houve diferença estatística provavelmente pelo tamanho da amostra e pela dificuldade na quantificação da carga tabágica nos usuários de cigarros eletrônicos.			
<b>REFERENCIAS</b>				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14505	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128587 - NICOLE ESTEVAM GERARD	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Patricia Margarida Farias Coelho		
<b>TITULO</b>	(Sobre)vivências de Lorde: O feminismo interseccional em "Irmã Outsider" de Audre Lorde			
<b>INTRODUCAO</b>	Em uma sociedade patriarcal marcada por um histórico de opressões por questões de etnia e classes sociais, surgem em 1970 movimentos reivindicatórios, envolvendo pautas sociais marginalizadas, como o movimento dos Panteras Negras, o feminismo e as causas da comunidade gay e lésbica, trazendo pautas de existências até então invisibilizadas. Essa ruptura de ideal universal dos sujeitos, permite o questionamento sobre as questões de gênero como delimitadores das relações de poder social, esse é um dos elementos que constituem as reflexões acerca das opressões da participação de mulheres negras e lésbicas na luta feminista.			
<b>OBJETIVOS</b>	verificar como o feminismo interseccional se apresenta na obra "Irmã outsider" de Audre Lorde e compreender as diferenças entre o feminismo interseccional e o feminismo transversal na perspectiva de uma mulher lésbica e mãe.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trabalhamos com a análise do discurso, um método qualitativo. O que justifica essa escolha é o fato do material base ser o discurso da autora, assim se faz necessário analisar distintos textos, pertencentes a diferentes gêneros, visando localizar as relações dos assuntos abordados pela autora com a realidade que a cerca, efetuando conexões entre sujeito e sociedade. A temática se destaca pois é necessário refletir sobre as estruturas enraizadas socialmente e como elas transpassam os sujeitos, assim como, quais as demandas se tornam invisibilizadas dentro das nossas lutas por emancipação das amarras da sociedade.			
<b>RESULTADOS</b>	Audre Lorde expressa em seus escritos um urro de liberdade ideológica, se permitindo fluir por meio da palavra por entre suas memórias e vivências refletindo sobre a sociedade que a transpassa. Esse movimento nos permitiu visualizar seus encontros com companheiras do feminismo transversal, possibilitando questionar se realmente era possível existir um diálogo entre a autora e suas colegas de luta que não estivessem marcadas pelas distintas barreiras que impossibilitam a plena compreensão de Lorde em suas reflexões. As inquietações sobre maternidade e afetos evidenciam como a sociedade reflete em um âmbito pessoal trazendo inquietações em todas as camadas de existência da mulher.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que as vivências da autora evidenciam um cenário violento de exclusões e (sobre)vivências enfrentadas por mulheres marcadas pelas relações de poder da sociedade, sendo invisibilizada até mesmo em seu coletivo de luta. Também foi possível verificar as distinções de compreensão do papel do gênero presente nas diferentes vertentes do feminismo aqui apresentadas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: a experiência vivida. vol.2. 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: fatos e mitos. vol.1. 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. BESSE, Susan K. Modernizando a desigualdade: Reestruturação da Ideologia de Gênero no Brasil 1914-1940. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019. DAVIS, A. Mulheres, Raça e Classe São Paulo: Boitempo, 2016. FORMIGA, Giceli Carvalho Batista; FELDENS, Dinamara Garcia, ARDITTI, Roberta Gusmão Arditti. Feminismos interseccionais: problematizando o sujeito do feminismo. Revista Brasileira de Educação v. 28 e280086, Sergipe, 2023. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rbedu/a/QbwQ6gfN4HNqMJcDd665Hr/#">https://www.scielo.br/rbedu/a/QbwQ6gfN4HNqMJcDd665Hr/#</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14506	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3783294 - JARDEL COUTINHO DE MACEDO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nancy Preising Aptekmann		
<b>TITULO</b>	O IMPACTO DA QUALIDADE DO SONO NO DESEMPENHO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO			
<b>INTRODUCAO</b>	O sono é um estado complexo que passa por diferentes estágios com funções únicas na manutenção das funções do cérebro e na reparação do corpo. Atletas de alto rendimento são indivíduos que se sobressaem em seus esportes devido a habilidades excepcionais e de alta intensidade. Eles competem em alto nível e conquistam resultados expressivos em suas respectivas modalidades. A qualidade do sono diz respeito ao quão bem dormimos à noite. Quando atletas de alto rendimento têm um sono de qualidade, seus corpos se recuperam de forma mais eficiente e consequentemente melhoram a performance.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a relação entre a qualidade do sono e desempenho de atletas de alto rendimento, explorando como a qualidade e duração do sono afetam a recuperação muscular e a performance.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão de literatura de estudos publicados de 2015 a 2023. Utilizou-se o Pubmed, Medline e Scielo. Critérios de exclusão, trabalhos de conclusão de curso e artigos anteriores a 2015.			
<b>RESULTADO S</b>	A pesquisa revelou que tanto o sono contínuo (média de 7 a 9 horas por noite) quanto os cochilos estratégicos (de 20 a 30 minutos durante o dia) são cruciais para atletas de alto rendimento. A duração ideal dos cochilos varia de acordo com as necessidades individuais dos atletas, períodos de 20 a 30 minutos podem ser benéficos para alguns atletas. Além disso, o sono desempenha um papel significativo no reparo dos tecidos musculares danificados durante o treinamento intenso, o que salienta a importância do sono no processo de recuperação muscular. Quanto ao aprendizado motor, o sono melhora a capacidade de adquirir novas habilidades motoras. Ademais, o sono desempenha um papel fundamental na regulação hormonal, no que diz respeito a hormônios relacionados ao crescimento muscular e recuperação, como por exemplo o hormônio do crescimento (GH) e o cortisol. Esses fatores afetam diretamente o desempenho esportivo, melhorando a força, velocidade e coordenação motora.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que o sono é um componente de extrema importância na preparação de atletas de elite. Estratégias de sono personalizadas, levando em consideração as características individuais, como os ritmos circadianos, níveis de fadiga e horários de treinamento, são essenciais para maximizar a regeneração muscular e garantir um desempenho esportivo sustentável, ou seja, o atleta desempenhar em alta performance ao longo do tempo alcançando o seu potencial máximo.			
<b>REFERENCIA S</b>	CHAREST, J., GRANDNER, M.A. Sleep and Athletic Performance: Impacts on Physical Performance, Mental Performance, Injury Risk and Recovery, and Mental Health. Sleep Med Clin. 2020 Mar;15(1):41-57. doi: 10.1016/j.jsmc.2019.11.005. PMID: 32005349; PMCID: PMC9960533. LASTELLA, M., et al. To Nap or Not to Nap? Systematic Review Evaluating Napping Behavior in Athletes and the Impact on Various Measures of Athletic Performance. Nat Sci Sleep. 2021 Jun 24;13:841-862. doi: 10.2147/NSS.S315556. PMID: 34194254; PMCID: PMC8238550. CHENNAOUI, M., et al. How does sleep help recovery from exercise-induced muscle injuries? J Sci Med Sport. 2021 Oct;24(10):982-987. doi: 10.1016/j.jsams.2021.05.007. Epub 2021 May 18. PMID: 34074604.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14506	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4394542 - GABRIEL AUGUSTO NEVES MISTRO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nancy Preising Aptekmann		
<b>TITULO</b>	O IMPACTO DA QUALIDADE DO SONO NO DESEMPENHO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO			
<b>INTRODUCAO</b>	O sono é um estado complexo que passa por diferentes estágios com funções únicas na manutenção das funções do cérebro e na reparação do corpo. Atletas de alto rendimento são indivíduos que se sobressaem em seus esportes devido a habilidades excepcionais e de alta intensidade. Eles competem em alto nível e conquistam resultados expressivos em suas respectivas modalidades. A qualidade do sono diz respeito ao quão bem dormimos à noite. Quando atletas de alto rendimento têm um sono de qualidade, seus corpos se recuperam de forma mais eficiente e consequentemente melhoram a performance.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a relação entre a qualidade do sono e desempenho de atletas de alto rendimento, explorando como a qualidade e duração do sono afetam a recuperação muscular e a performance.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão de literatura de estudos publicados de 2015 a 2023. Utilizou-se o Pubmed, Medline e Scielo. Critérios de exclusão, trabalhos de conclusão de curso e artigos anteriores a 2015.			
<b>RESULTADO S</b>	A pesquisa revelou que tanto o sono contínuo (média de 7 a 9 horas por noite) quanto os cochilos estratégicos (de 20 a 30 minutos durante o dia) são cruciais para atletas de alto rendimento. A duração ideal dos cochilos varia de acordo com as necessidades individuais dos atletas, períodos de 20 a 30 minutos podem ser benéficos para alguns atletas. Além disso, o sono desempenha um papel significativo no reparo dos tecidos musculares danificados durante o treinamento intenso, o que salienta a importância do sono no processo de recuperação muscular. Quanto ao aprendizado motor, o sono melhora a capacidade de adquirir novas habilidades motoras. Ademais, o sono desempenha um papel fundamental na regulação hormonal, no que diz respeito a hormônios relacionados ao crescimento muscular e recuperação, como por exemplo o hormônio do crescimento (GH) e o cortisol. Esses fatores afetam diretamente o desempenho esportivo, melhorando a força, velocidade e coordenação motora.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que o sono é um componente de extrema importância na preparação de atletas de elite. Estratégias de sono personalizadas, levando em consideração as características individuais, como os ritmos circadianos, níveis de fadiga e horários de treinamento, são essenciais para maximizar a regeneração muscular e garantir um desempenho esportivo sustentável, ou seja, o atleta desempenhar em alta performance ao longo do tempo alcançando o seu potencial máximo.			
<b>REFERENCIA S</b>	CHAREST, J., GRANDNER, M.A. Sleep and Athletic Performance: Impacts on Physical Performance, Mental Performance, Injury Risk and Recovery, and Mental Health. Sleep Med Clin. 2020 Mar;15(1):41-57. doi: 10.1016/j.jsmc.2019.11.005. PMID: 32005349; PMCID: PMC9960533. LASTELLA, M., et al. To Nap or Not to Nap? Systematic Review Evaluating Napping Behavior in Athletes and the Impact on Various Measures of Athletic Performance. Nat Sci Sleep. 2021 Jun 24;13:841-862. doi: 10.2147/NSS.S315556. PMID: 34194254; PMCID: PMC8238550. CHENNAOUI, M., et al. How does sleep help recovery from exercise-induced muscle injuries? J Sci Med Sport. 2021 Oct;24(10):982-987. doi: 10.1016/j.jsams.2021.05.007. Epub 2021 May 18. PMID: 34074604.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14508	Medicina Veterinária	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4026438 - LAURA ALMEIDA DA CRUZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camila Trevisan Pereira	Vanessa Uemura da Fonseca	VÍVIAN FRATTI PENNA RÍSPOLI BAUMGARTNER
<b>TITULO</b>	USO DO ULTRASSOM PARA AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO CERVICAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	De acordo com a literatura a ultrassonografia cervical é subutilizada na rotina, essa técnica é útil na avaliação de pacientes com formações cervicais. Autores destacam a importância da abordagem multidisciplinar, que envolve técnicas como a ultrassonografia, a citologia guiada por ultrassom e a tomografia computadorizada. A contribuição da avaliação ultrassonográfica cervical modo B e modo Doppler foi descrita na literatura para identificação de sinais de malignidade em linfonodos, bem como para determinar a origem e limites das formações cervicais. Neste relato de caso, investigamos o uso da ultrassonografia cervical e citologia por aspiração para auxiliar no diagnóstico e tratamento de paciente com formação cervical.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a importância do uso do ultrassom para definir a conduta do tratamento de paciente com formação cervical.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão da literatura e histórico de cão, SRD, macho, 10 anos, atendido no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Paciente atendido no HOVET com histórico de formação cervical de aumento progressivo há 3 anos e outros nódulos semelhantes distribuídos pelo corpo, tutora relatou que a formação cervical estava evoluindo com consistência mais firme. À palpação da formação cervical evidenciou consistência firme, com ausência de linfonodomegalia, paciente não apresentou dor e foi levantada a hipótese de origem em glândula tireóide. A ultrassonografia abdominal bem como a avaliação radiográfica do tórax e os exames laboratoriais não demonstraram alterações importantes. A citologia da formação cervical foi realizada e os diagnósticos diferenciais foram lipoma, lipossarcoma e fibrossarcoma. Solicitou-se a ultrassonografia cervical para planejamento cirúrgico da formação, que apresentou ecotextura heterogênea, com áreas de sombreamento acústico em permeio a tecido de ecotextura gordura, limites definidos, a localização cutânea confirmada e sem sinal de fluxo sanguíneo ao mapeamento com Doppler colorido. Os linfonodos cervicais apresentaram contornos regulares, formato anatômico, dimensões preservadas, ecogenicidade elevada e ecotextura homogênea. Em glândula tireóide evidenciou-se um pequeno nódulo hipocogênico e ecotextura homogênea com limites definidos, que pode estar relacionado à hiperplasia nodular regenerativa. O paciente foi encaminhado para excisão cirúrgica da formação e o histopatológico confirmou a hipótese de lipossarcoma, associado a áreas de leiomioma. O diagnóstico das outras formações distribuídas pelo corpo foi lipoma. Neste caso não foi necessária a realização de tomografia computadorizada e a linfadenectomia, de acordo com a literatura, os sinais obtidos na ultrassonografia cervical não indicaram metástase em linfonodos sentinela.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O ultrassom é uma técnica de baixo custo, acessível e quando associada a citologia pode fornecer informações suficientes para o tratamento cirúrgico de pacientes com formação cervical.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BELOTTA, A. et al. Sonography and sonoelastography in the detection of malignancy in superficial lymph nodes of dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 33, n. 3, p. 1403–1413, maio 2019 ROTTEY, S. et al. Evaluation of Metastatic Lymph Nodes in Head and Neck Cancer: A Comparative Study Between Palpation, Ultrasonography, Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration Cytology And Computed Tomography. Acta Clinica Belgica, v. 61, n. 5, p. 236–241, out. 2006 ZWINGENBERGER, A.; TAEYMANS, O. Neck. In: PENNINGCK, Dominique; D'ANJOU, Marc-André. Atlas of Small Animal Ultrasonography. Iowa: Blackwell, 2015. Cap. 3, p. 66-67			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14512	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4675070 - JOHNNY MELO FERREIRA DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert	Paula Yuri Sugishita Kanikadan	
<b>TITULO</b>	Perfil dos casos de intoxicações exógenas atendidos no Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo			
<b>INTRODUCA O</b>	Segundo a Organização Mundial da Saúde, intoxicação é a destruição celular pela inalação, ingestão, injeção ou absorção de substância tóxica. O município de São Paulo é o maior notificador brasileiro, registrando 21.407 casos entre 2010 e 2014, representando 23% do total notificado no estado paulista e 5,7% do território nacional. A Secretaria Municipal de Saúde conta com o Centro de Controle de Intoxicações (CCI), criado em 1971 e instalado no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya (HMARS) localizado no Jabaquara. Em 14 de fevereiro de 2023 foi disponibilizado no site da Prefeitura de São Paulo o relatório dos atendimentos realizados entre 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2022.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar o perfil epidemiológico dos casos atendidos no CCI-SP com base em dados disponibilizados no relatório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico utilizando dados sociodemográficos (tipo de atendimento, tipo de ficha, idade e tipo de solicitante) e clínicos (classe do agente tóxico responsável, circunstância da intoxicação e evolução do caso). Esses dados foram expressos na forma de frequência relativa das notificações do período de 2010 a 2022.			
<b>RESULTADO S</b>	Entre os anos de 2010 e 2022, o CCI-SP realizou 91.884 atendimentos. Desses atendimentos, 82.241 (89,5%) foram direcionados a seres humanos, sendo 88,9% realizados por telefone e 56,4% tendo como solicitantes, profissionais ou serviços de saúde. A faixa etária mais acometida foi de 1 a 4 anos (32,5%). O principal grupo de agentes tóxicos foi o de medicamentos com 46.201 notificações (49,6%) e quanto à circunstância de exposição a maioria dos casos foi acidental (45%). Do total, 35.432 solicitações (42,98%) evoluíram para a perda de seguimento.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os casos de intoxicação exógena são notificados em sua maioria por profissionais de saúde através de contatos telefônicos e ocorrem com maior frequência em crianças de 1 a 4 anos de idade, sendo a classe dos medicamentos os principais agentes tóxicos encontrados, a exposição ocorrendo de forma acidental e os casos evoluindo para a perda de seguimento.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Luís GE, Fossaluzza V, Silva BD, Nunes ER. Relatório de análise estatística sobre o projeto: "Mapeamento dos casos de intoxicações agudas atendidos no Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo" [Internet]. 2017 [cited 2023 Jul 25]. Available from: <a href="https://repositorio.usp.br/directbitstream/8534239e-334d-42dd-b34e-7faa3c4669c6/2876194.pdf">https://repositorio.usp.br/directbitstream/8534239e-334d-42dd-b34e-7faa3c4669c6/2876194.pdf</a> 2. Secretaria Municipal de Saúde - São Paulo. Manual de Toxicologia Clínica: Orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde [Internet]. 2017 [cited 2023 Jul 25]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/manual_toxicologia_clinica-covisa-2017.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/manual_toxicologia_clinica-covisa-2017.pdf</a> 3. Coordenadoria de Vigilância em Saúde - São Paulo. Relatórios dos atendimentos realizados pelo Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2020 [Internet]. 2022 [cited 2023 Jul 25]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Dados_estatisticos_CCI.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Dados_estatisticos_CCI.pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14512	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4675193 - THAIS OLIVEIRA DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert	Paula Yuri Sugishita Kanikadan	
<b>TITULO</b>	Perfil dos casos de intoxicações exógenas atendidos no Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Segundo a Organização Mundial da Saúde, intoxicação é a destruição celular pela inalação, ingestão, injeção ou absorção de substância tóxica. O município de São Paulo é o maior notificador brasileiro, registrando 21.407 casos entre 2010 e 2014, representando 23% do total notificado no estado paulista e 5,7% do território nacional. A Secretaria Municipal de Saúde conta com o Centro de Controle de Intoxicações (CCI), criado em 1971 e instalado no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya (HMARS) localizado no Jabaquara. Em 14 de fevereiro de 2023 foi disponibilizado no site da Prefeitura de São Paulo o relatório dos atendimentos realizados entre 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2022.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar o perfil epidemiológico dos casos atendidos no CCI-SP com base em dados disponibilizados no relatório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico utilizando dados sociodemográficos (tipo de atendimento, tipo de ficha, idade e tipo de solicitante) e clínicos (classe do agente tóxico responsável, circunstância da intoxicação e evolução do caso). Esses dados foram expressos na forma de frequência relativa das notificações do período de 2010 a 2022.			
<b>RESULTADOS</b>	Entre os anos de 2010 e 2022, o CCI-SP realizou 91.884 atendimentos. Desses atendimentos, 82.241 (89,5%) foram direcionados a seres humanos, sendo 88,9% realizados por telefone e 56,4% tendo como solicitantes, profissionais ou serviços de saúde. A faixa etária mais acometida foi de 1 a 4 anos (32,5%). O principal grupo de agentes tóxicos foi o de medicamentos com 46.201 notificações (49,6%) e quanto à circunstância de exposição a maioria dos casos foi acidental (45%). Do total, 35.432 solicitações (42,98%) evoluíram para a perda de seguimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os casos de intoxicação exógena são notificados em sua maioria por profissionais de saúde através de contatos telefônicos e ocorrem com maior frequência em crianças de 1 a 4 anos de idade, sendo a classe dos medicamentos os principais agentes tóxicos encontrados, a exposição ocorrendo de forma acidental e os casos evoluindo para a perda de seguimento.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Luís GE, Fossaluzza V, Silva BD, Nunes ER. Relatório de análise estatística sobre o projeto: "Mapeamento dos casos de intoxicações agudas atendidos no Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo" [Internet]. 2017 [cited 2023 Jul 25]. Available from: <a href="https://repositorio.usp.br/directbitstream/8534239e-334d-42dd-b34e-7faa3c4669c6/2876194.pdf">https://repositorio.usp.br/directbitstream/8534239e-334d-42dd-b34e-7faa3c4669c6/2876194.pdf</a> 2. Secretaria Municipal de Saúde - São Paulo. Manual de Toxicologia Clínica: Orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde [Internet]. 2017 [cited 2023 Jul 25]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/manual_toxicologia_clinica-covisa-2017.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/manual_toxicologia_clinica-covisa-2017.pdf</a> 3. Coordenadoria de Vigilância em Saúde - São Paulo. Relatórios dos atendimentos realizados pelo Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2020 [Internet]. 2022 [cited 2023 Jul 25]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Dados_estatisticos_CCI.pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Dados_estatisticos_CCI.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14513	Endodontia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4303661 - INGRID SANTOS RUFINO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	Ana Lucia Franco Ricardo	
<b>TITULO</b>	OZONIOTERAPIA COMO TRATAMENTO COADJUVANTE NA TERAPIA ENDODÔNTICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A ozonioterapia consiste em uma terapia de tratamento utilizando o Ozônio (O3). Sua estrutura molecular é composta por três átomos de oxigênio, que se forma quando as moléculas de oxigênio (O2) se rompem e os átomos separados combinam-se com outras moléculas. O ozônio é um gás instável que não pode ser armazenado e deve ser usado imediatamente devido ter uma meia-vida de 40 min a 20°C e vem sendo apresentado como possível agente antisséptico alternativo devido ao seu alto poder antimicrobiano e baixa citotoxicidade. Pode ser usado tanto como irrigante como medicação intracanal em endodontia (Paixão et al, 2021).			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar uma revisão de literatura sobre a eficácia do gás ozônio como coadjuvante a outros protocolos de desinfecção em Tratamentos Endodônticos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para este estudo foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos publicados de 2013 a 2021, nas bases de dados Pubmed, Scielo, Google acadêmico. PALAVRAS CHAVES: Endodontia, Ozonioterapia, Ozônio.			
<b>RESULTADOS</b>	Em um estudo, foram testados o hipoclorito de sódio 1, 3 e 5%, clorexidina a 0,2% e 2% e gás ozônio por diferentes períodos, além da associação de hipoclorito a 5% ou clorexidina a 2% com o gás ozônio. Concluiu-se que ou clorexidina a 2% com o gás ozônio foi o protocolo mais eficaz (Noite, R et al, 2014). Em outro estudo, biofilme de E. faecalis foi tratado com solução salina, hipoclorito de sódio a 1%, ozônio (administrado em solução salina), solução salina acionada por meio de ultrassom e ozônio seguido por agitação ultrassônica. Foi observado que a ação do ozônio, principalmente quando agitado por ultrassom, foi mais eficaz que os outros protocolos testados (Peter, D et al, 2012). Segundo Nogales, et al (2012), o ozônio promoveu mais descontaminação dos canais radiculares ex-vivo, apesar de ser relativamente tóxico às células. No entanto, o ozônio está sendo uma alternativa para os tratamentos endodônticos pela sua potente atividade antimicrobiana.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os diferentes estudos demonstram grande eficácia do ozônio gasoso e aquoso, em diversos protocolos, contra os microrganismos testados, e aparenta melhorar os resultados da terapia endodôntica.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Paixão, LD, Dietrich, L, Martins, LHB, Barros, DV. Terapia alternativa na endodontia- ozonioterapia: Revisão de literatura. Res, Soc Dev, 2021. v. 10, n.6. 2. Noites, R, Pina-Vaz, C, Rocha, R, Carvalho, MF, Gonçalves, A, Pina-Vaz, I. Synergistic antimicrobial action of chlorhexidine and ozono in endodontic treatment. Biomed Res Int, 2014, article ID592423 3. Nogales, CG, Montenos, AF, Rodrigues, MFA, Lage-Marques, JM, Antoniazzi, JH. Ozone therapy as an adjuvant for endodontic protocols: microbiological - ex vivo study and citotoxicity analyses. J Appl Oral Sci. 2016 Nov-Dec; v.24, n.6: 607-613 4. Peter, D, Philip, S, William A, George, R, Laurence, J. Treatment of root canal biofilms of Enterococcus faecalis with ozone gas and passive ultrasound activation — JOE volume 38, 2013			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14513	Endodontia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4304071 - GUILHERME GONÇALVES RISTOW	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Cristina Peixoto Guimaraes	Ana Lucia Franco Ricardo	
<b>TITULO</b>	OZONIOTERAPIA COMO TRATAMENTO COADJUVANTE NA TERAPIA ENDODÔNTICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A ozonioterapia consiste em uma terapia de tratamento utilizando o Ozônio (O3). Sua estrutura molecular é composta por três átomos de oxigênio, que se forma quando as moléculas de oxigênio (O2) se rompem e os átomos separados combinam-se com outras moléculas. O ozônio é um gás instável que não pode ser armazenado e deve ser usado imediatamente devido ter uma meia-vida de 40 min a 20°C e vem sendo apresentado como possível agente antisséptico alternativo devido ao seu alto poder antimicrobiano e baixa citotoxicidade. Pode ser usado tanto como irrigante como medicação intracanal em endodontia (Paixão et al, 2021).			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar uma revisão de literatura sobre a eficácia do gás ozônio como coadjuvante a outros protocolos de desinfecção em Tratamentos Endodônticos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para este estudo foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos publicados de 2013 a 2021, nas bases de dados Pubmed, Scielo, Google acadêmico. PALAVRAS CHAVES: Endodontia, Ozonioterapia, Ozônio.			
<b>RESULTADOS</b>	Em um estudo, foram testados o hipoclorito de sódio 1, 3 e 5%, clorexidina a 0,2% e 2% e gás ozônio por diferentes períodos, além da associação de hipoclorito a 5% ou clorexidina a 2% com o gás ozônio. Concluiu-se que ou clorexidina a 2% com o gás ozônio foi o protocolo mais eficaz (Noite, R et al, 2014). Em outro estudo, biofilme de E. faecalis foi tratado com solução salina, hipoclorito de sódio a 1%, ozônio (administrado em solução salina), solução salina acionada por meio de ultrassom e ozônio seguido por agitação ultrassônica. Foi observado que a ação do ozônio, principalmente quando agitado por ultrassom, foi mais eficaz que os outros protocolos testados (Peter, D et al, 2012). Segundo Nogales, et al (2012), o ozônio promoveu mais descontaminação dos canais radiculares ex-vivo, apesar de ser relativamente tóxico às células. No entanto, o ozônio está sendo uma alternativa para os tratamentos endodônticos pela sua potente atividade antimicrobiana.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os diferentes estudos demonstram grande eficácia do ozônio gasoso e aquoso, em diversos protocolos, contra os microrganismos testados, e aparenta melhorar os resultados da terapia endodôntica.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Paixão, LD, Dietrich, L, Martins, LHB, Barros, DV. Terapia alternativa na endodontia- ozonioterapia: Revisão de literatura. Res, Soc Dev, 2021. v. 10, n.6. 2. Noites, R, Pina-Vaz, C, Rocha, R, Carvalho, MF, Gonçalves, A, Pina-Vaz, I. Synergistic antimicrobial action of chlorhexidine and ozone in endodontic treatment. Biomed Res Int, 2014, article ID592423 3. Nogales, CG, Montenos, AF, Rodrigues, MFA, Lage-Marques, JM, Antoniazzi, JH. Ozone therapy as an adjuvant for endodontic protocols: microbiological - ex vivo study and citotoxicity analyses. J Appl Oral Sci. 2016 Nov-Dec; v.24, n.6: 607-613 4. Peter, D, Philip, S, William A, George, R, Laurence, J. Treatment of root canal biofilms of Enterococcus faecalis with ozone gas and passive ultrasound activation — JOE volume 38, 2013			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14514	Ciências Biológicas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4445279 - PEDRO AUGUSTO PIRES BRANDÃO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE TRÓFICA DE ESPÉCIE INVASORA DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DO GUARAPIRANGA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A análise trófica da dieta dos peixes é crucial na identificação de grupos tróficos, a importância dos peixes que ocupam diferentes níveis na cadeia alimentar e a competição por recursos, a fim de compreender seus hábitos alimentares. Especialmente os ciclídeos, são caracterizados quanto à sua habilidade de adaptação a diversos ambientes e a influência na estabilidade dos ecossistemas naturais. Esses ecossistemas são definidos como sistemas de comunidades bióticas interligadas com fatores físicos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a composição nutricional presente na alimentação dos peixes Ciclídicos (Cichlidae), suas preferências alimentares, as variações sazonais na dieta e a relação entre a dieta dos peixes, a fim de compreender a correlação com as condições ambientais locais.			
<b>METODOLOGIA</b>	A coleta dos peixes está ocorrendo ao longo do ano de 2023 no Reservatório do Guarapiranga, utilizando equipamentos como redes de emalhar, rede de arrasto e covo. No laboratório, os peixes foram eutanasiados com eugenol, fixados em formalina a 10%, e armazenados em etanol a 70%, e seus conteúdos estomacais foram removidos e separados para devida análise.			
<b>RESULTADOS</b>	De primeira instância foram encontrados no conteúdo estomacal do peixe coletado predominantemente invertebrados, crustáceos, sedimentos, material vegetal e microplásticos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A detecção de partículas plásticas nos conteúdos estomacais de peixes é um problema alarmante, evidenciando o impacto prejudicial da poluição plástica nos ecossistemas aquáticos. Portanto, para combater este problema, é importante que a sociedade e as indústrias unam esforços para reduzir a produção e a disseminação de plásticos descartáveis, aumentar o estímulo à reciclagem, e aprimorar a gestão de resíduos. Além disso, conscientização e educação pública sobre o impacto do plástico nos ecossistemas aquáticos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Brandão-Gonçalves L, Oliveira SA de, Lima-Junior SE. Hábitos alimentares da ictiofauna do córrego Franco, Mato Grosso do Sul, Brasil. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/bn/a/tKwPdNt8rrzyBQRQDdt5GNC/?format=html(#38)lang=pt(#38)stop=previous.2">https://www.scielo.br/bn/a/tKwPdNt8rrzyBQRQDdt5GNC/?format=html(#38)lang=pt(#38)stop=previous.2</a> . Ferreira Filho VP, Guerra TP, Lima MCS, Teixeira DFF, Costa RR, Araújo IMS, et al. Padrões ecomorfológicos associados à dieta de Plagioscion squamosissimus (Perciformes, Sciaridae) em reservatório permanente, no Nordeste do Brasil. ("Carnivory during Ontogeny of the Plagioscion squamosissimus: A ... - PLOS") Iheringia. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/isz/a/PGQdZcXrDTK3FgDYJ6HhdnR/?format=pdf(#38)lang=pt.3">https://www.scielo.br/isz/a/PGQdZcXrDTK3FgDYJ6HhdnR/?format=pdf(#38)lang=pt.3</a> . Ribeiro AR, Biagioni RC, Smith WS. Estudo da dieta natural da ictiofauna de um reservatório centenário, São Paulo, Brasil. Iheringia Série Zoologia: <a href="https://www.scielo.br/isz/a/ZjCcXgf5KNq7dz6PKsdWW5F/">https://www.scielo.br/isz/a/ZjCcXgf5KNq7dz6PKsdWW5F/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14514	Ciências Biológicas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4669851 - NAYNE COSTA DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE TRÓFICA DE ESPÉCIE INVASORA DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DO GUARAPIRANGA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A análise trófica da dieta dos peixes é crucial na identificação de grupos tróficos, a importância dos peixes que ocupam diferentes níveis na cadeia alimentar e a competição por recursos, a fim de compreender seus hábitos alimentares. Especialmente os ciclídeos, são caracterizados quanto à sua habilidade de adaptação a diversos ambientes e a influência na estabilidade dos ecossistemas naturais. Esses ecossistemas são definidos como sistemas de comunidades bióticas interligadas com fatores físicos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a composição nutricional presente na alimentação dos peixes Ciclídeos (Cichlidae), suas preferências alimentares, as variações sazonais na dieta e a relação entre a dieta dos peixes, a fim de compreender a correlação com as condições ambientais locais.			
<b>METODOLOGIA</b>	A coleta dos peixes está ocorrendo ao longo do ano de 2023 no Reservatório do Guarapiranga, utilizando equipamentos como redes de emalhar, rede de arrasto e covo. No laboratório, os peixes foram eutanasiados com eugenol, fixados em formalina a 10%, e armazenados em etanol a 70%, e seus conteúdos estomacais foram removidos e separados para devida análise.			
<b>RESULTADOS</b>	De primeira instância foram encontrados no conteúdo estomacal do peixe coletado predominantemente invertebrados, crustáceos, sedimentos, material vegetal e microplásticos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A detecção de partículas plásticas nos conteúdos estomacais de peixes é um problema alarmante, evidenciando o impacto prejudicial da poluição plástica nos ecossistemas aquáticos. Portanto, para combater este problema, é importante que a sociedade e as indústrias unam esforços para reduzir a produção e a disseminação de plásticos descartáveis, aumentar o estímulo à reciclagem, e aprimorar a gestão de resíduos. Além disso, conscientização e educação pública sobre o impacto do plástico nos ecossistemas aquáticos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Brandão-Gonçalves L, Oliveira SA de, Lima-Junior SE. Hábitos alimentares da ictiofauna do córrego Franco, Mato Grosso do Sul, Brasil. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/bn/a/tKwPdNt8rrzyBQRQDdt5GNC/?format=html(#38)lang=pt(#38)stop=previous.2">https://www.scielo.br/bn/a/tKwPdNt8rrzyBQRQDdt5GNC/?format=html(#38)lang=pt(#38)stop=previous.2</a> . Ferreira Filho VP, Guerra TP, Lima MCS, Teixeira DFF, Costa RR, Araújo IMS, et al. Padrões ecomorfológicos associados à dieta de Plagioscion squamosissimus (Perciformes, Sciaridae) em reservatório permanente, no Nordeste do Brasil. ("Carnivory during Ontogeny of the Plagioscion squamosissimus: A ... - PLOS") Iheringia. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/isz/a/PGQdZcXrDTK3FgDYJ6HhdnR/?format=pdf(#38)lang=pt.3">https://www.scielo.br/isz/a/PGQdZcXrDTK3FgDYJ6HhdnR/?format=pdf(#38)lang=pt.3</a> . Ribeiro AR, Biagioni RC, Smith WS. Estudo da dieta natural da ictiofauna de um reservatório centenário, São Paulo, Brasil. Iheringia Série Zoologia: <a href="https://www.scielo.br/isz/a/ZjCcXgf5KNq7dz6PKsdWW5F/">https://www.scielo.br/isz/a/ZjCcXgf5KNq7dz6PKsdWW5F/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Typo	Modalidade
2023	14514	Ciências Biológicas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4685911 - THAYNA LETICIA LIMA SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE TRÓFICA DE ESPÉCIE INVASORA DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DO GUARAPIRANGA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A análise trófica da dieta dos peixes é crucial na identificação de grupos tróficos, a importância dos peixes que ocupam diferentes níveis na cadeia alimentar e a competição por recursos, a fim de compreender seus hábitos alimentares. Especialmente os ciclídeos, são caracterizados quanto à sua habilidade de adaptação a diversos ambientes e a influência na estabilidade dos ecossistemas naturais. Esses ecossistemas são definidos como sistemas de comunidades bióticas interligadas com fatores físicos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a composição nutricional presente na alimentação dos peixes Ciclídeos (Cichlidae), suas preferências alimentares, as variações sazonais na dieta e a relação entre a dieta dos peixes, a fim de compreender a correlação com as condições ambientais locais.			
<b>METODOLOGIA</b>	A coleta dos peixes está ocorrendo ao longo do ano de 2023 no Reservatório do Guarapiranga, utilizando equipamentos como redes de emalhar, rede de arrasto e covo. No laboratório, os peixes foram eutanasiados com eugenol, fixados em formalina a 10%, e armazenados em etanol a 70%, e seus conteúdos estomacais foram removidos e separados para devida análise.			
<b>RESULTADOS</b>	De primeira instância foram encontrados no conteúdo estomacal do peixe coletado predominantemente invertebrados, crustáceos, sedimentos, material vegetal e microplásticos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A detecção de partículas plásticas nos conteúdos estomacais de peixes é um problema alarmante, evidenciando o impacto prejudicial da poluição plástica nos ecossistemas aquáticos. Portanto, para combater este problema, é importante que a sociedade e as indústrias unam esforços para reduzir a produção e a disseminação de plásticos descartáveis, aumentar o estímulo à reciclagem, e aprimorar a gestão de resíduos. Além disso, conscientização e educação pública sobre o impacto do plástico nos ecossistemas aquáticos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Brandão-Gonçalves L, Oliveira SA de, Lima-Junior SE. Hábitos alimentares da ictiofauna do córrego Franco, Mato Grosso do Sul, Brasil. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/bn/a/tKwPdNt8rrzyBQRQDdt5GNC/?format=html(#38)lang=pt(#38)stop=previous.2">https://www.scielo.br/bn/a/tKwPdNt8rrzyBQRQDdt5GNC/?format=html(#38)lang=pt(#38)stop=previous.2</a> . Ferreira Filho VP, Guerra TP, Lima MCS, Teixeira DFF, Costa RR, Araújo IMS, et al. Padrões ecomorfológicos associados à dieta de Plagioscion squamosissimus (Perciformes, Sciaridae) em reservatório permanente, no Nordeste do Brasil. ("Carnivory during Ontogeny of the Plagioscion squamosissimus: A ... - PLOS") Iheringia. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/isz/a/PGQdZcXrDTK3FgDYJ6HhdnR/?format=pdf(#38)lang=pt.3">https://www.scielo.br/isz/a/PGQdZcXrDTK3FgDYJ6HhdnR/?format=pdf(#38)lang=pt.3</a> . Ribeiro AR, Biagioni RC, Smith WS. Estudo da dieta natural da ictiofauna de um reservatório centenário, São Paulo, Brasil. Iheringia Série Zoologia: <a href="https://www.scielo.br/isz/a/ZjCcXgf5KNq7dz6PKsdWW5F/">https://www.scielo.br/isz/a/ZjCcXgf5KNq7dz6PKsdWW5F/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14516	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128536 - GISELE BRAGA DA SILVA PINTO CAMELO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marília Gomes Ghizzi Godoy		
<b>TITULO</b>	CAMINHOS EMANCIPATÓRIOS DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A construção histórica dos direitos das crianças e adolescentes foi uma conquista que demonstra como a sociedade brasileira evoluiu para esta consolidação. De uma forma que priorizava, inicialmente, a garantia à assistência social dos menores nos idos da primeira metade do século XX, assim foram surgindo as legislações que visavam garantir o mínimo protetivo à esta fatia da sociedade. O Brasil atravessou períodos de governos populistas, ditatoriais e também, com grande importância, um período de redemocratização nacional. Este último, grandemente marcado pela influência da cultura global pelos direitos humanos e pela legislação consolidada nesta temática que é a declaração universal dos direitos humanos. O Estatuto da Criança e Adolescente, surge neste período histórico. Legimitou do ponto de vista social e jurídico, um lugar de conquista e de fato, um olhar social atento a demanda maior que era pensar a criança e o adolescente enquanto seres sociais, de direitos e de deveres.			
<b>OBJETIVOS</b>	Procurando encontrar e entender a forma como era tida a criança e o adolescente, dentro da visão de que a infância era abreviada e estes sujeitos tinham quer ser preparados, da forma mais eficiente e menos custosa para o mercado do trabalho, fez-se um levantamento histórico-legislativo, em nível federal, a despeito do que os governos, as políticas públicas e as políticas públicas educacionais e assistencias, tinham para esta gama social.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o presente trabalho, a metodologia utilizada foi a documental, com o levantamento construtivo das leis federais direcionadas a estes sujeitos. Paralelo a essa busca documental, foi feito um quadro cronológico demarcando as legislações anteriores e posteriores ao ECA. Foi realizada conjuntamente, pesquisa bibliográfica para os apontamentos históricos de cada período.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados observados, de acordo com o quadro cronológico da trajetória de desenvolvimento legislativo para a criança e o adolescente, é o de que 1) Nas primeiras décadas do século XX, a fonte de direitos das crianças e adolescentes eram mais assistencialistas do que protetivas; 2) À partir da implementação mundial de uma cultura para os direitos humanos, passou-se a observar a criança e adolescente como seres vulneráveis e em franco desenvolvimento, ou seja, houve uma mudança da mentalidade sobre o papel social dos menores; 3) Com o advento do ECA, como lei federal, passou-se a ter uma legislação de fato protetiva e garantidora de direitos, mas que também conceitua o que é criança e o que é o adolescente, e de sobremaneira muda o conceito social desses sujeitos, trazendo também a sociedade como participante-garantidor dos seus direitos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Observou-se que a criação de direitos humanos possibilitou uma nova realidade de valores, de autonomia e conscientização para as crianças e os adolescentes.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALVES, Cássia Ferraza e SIQUEIRA, Aline Cardoso. Perspectiva de adolescentes sobre seus direitos e deveres. Psicol. Soc. 2014. Vol. 26(3): 583-593. ARIÈS, Philippe, História social da criança e da família. Tradução: Dora Flaksman. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. BRASIL, [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm</a> . Acesso em: 13.jun.2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14518	Farmacologia e Terapêutica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4866088 - LEONARDO MARINHO FERNANDES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh	Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	Desenvolvimento de uma ferramenta virtual de ensino voltada a farmacologia do sistema nervoso Autônomo.			
<b>INTRODUCA O</b>	A farmacologia é o estudo dos fármacos, explicando a relação destes com os organismos vivos, essa tem uma importância avassaladora para o profissional em formação. Apesar disso, para adquirir esse conhecimento o aluno precisa superar barreiras levantadas, que se caracteriza pelos seus conceitos abstratos e pouco palpáveis, dificultando o seu entendimento. Somado aos descompassos supracitados dos discentes, temos a influência de sua própria geração, que acostumada ao acesso rápido e fácil de informações acaba sofrendo com a desconexão entre as abordagens didáticas e seu estilo de vida. Logo, esses alunos demonstram necessidades de novas abordagens de ensino. Por isso foi proposto o desenvolvimento de uma plataforma online, que permita a exemplificação e o entendimento da farmacologia veterinária do sistema nervoso autônomo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Facilitar o ensino de farmacologia, por meio da elaboração de uma ferramenta virtual de ensino-aprendizagem veterinário, auxiliando na conexão dos alunos ao mundo acadêmico.			
<b>METODOLOGIA</b>	Inicialmente foi realizado uma revisão bibliográfica para pesquisa e seleção de dados onde foram utilizados os seguintes critérios: artigos e livros de farmacologia presentes na biblioteca virtual da UNISA. Após iniciou-se a produção da plataforma, o software Google Sites, foi usado para hospedar e construir a plataforma, além disso, foram usados para edição e ilustração ferramentas da Adobe®, como o Photoshop (24.1.1) e o Firefly. Com a finalização etapas supracitadas, foi possível injetar os dados dentro da plataforma virtual.			
<b>RESULTADO S</b>	Dentre as novas abordagens de pedagogia, a tecnologia é muito discutida entre os docentes, pois ela traz uma melhor comunicação com a geração atual que é extremamente visual. Nesse contexto, a Universidade do Vale do Itajaí, desenvolveu uma ferramenta computacional de ensino farmacológico, essa pesquisa gerou um resultado extremamente positivo. Diversos outros locais do mundo têm conclusões parecidas com a vista anteriormente, como em um estudo realizado na Faculdade Rural de Ensino de Medicina da Índia, que demonstrou um aumento de 30% no conhecimento dos alunos relacionado a determinada matéria, ao montar um teste pré e pós apresentação de slide show. Essas pesquisas não só validam as ferramentas, mas também as produções técnicas de materiais online, como vistas nesse projeto, que abordam o ensino aprendizagem virtual.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que é possível melhorar a aprendizagem da disciplina de farmacologia, por meio do desenvolvimento de novos métodos virtuais de ensino-aprendizagem, gerando assim, uma nova comunicação entre discente e docente.			
<b>REFERENCIA S</b>	PEREIRA DE JESUS, ALICE; CARLOS DA MAIA, LUCIANO; COSTA DE OLIVEIRA, ANTONIO; PEGORARO, CAMILA. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA GERAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. Rio Grande do Sul, 2018. GAIKWAD, Nitin; TANKHIWALE, Suresh. Interactive E-learning module in pharmacology: a pilot project at a rural medical college in India. Interactive E-learning module in pharmacology: a pilot project at a rural medical college in India, Índia, 2014. VIVEIROS MEIRELLES, DANIELLA. O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, MINAS GERAIS, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14519	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233291 - SOPHIA CANTINI FORTES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Qualidade da Água Potável e relação com a Diarreia na Periferia do Município de Guarulhos			
<b>INTRODUCAO</b>	O saneamento básico inadequado ou ausente é a grande causador de agravos a saúde, a diarreia representa 50% das doenças como consequência dessa situação e está associada a água não potável, saneamento básico inadequado e higiene precária. A cidade de Guarulhos é a segunda mais populosa do estado de São Paulo, a 13ª mais populosa do Brasil. Possui mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados mais recentes do IBGE. Em 2020 foram 10,33 óbitos por mil nascidos vivos e 0,2 internações por diarreia por mil habitantes em 2016.			
<b>OBJETIVOS</b>	Enfatizar a importância da água potável chegar até a população final, e identificar problemas de saúde relacionados a ausência do fornecimento adequado no município de Guarulhos. Conscientizar a população sobre seus direitos previstos em lei, através de divulgação de folders, sites e aplicativos de visualização facilitada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, que utiliza busca em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e sites oficiais do governo. Foi utilizado como ferramenta para coleta das informações o aplicativo Docs. do Google, empregando questionários fornecidos de forma aleatória a moradores do Município de Guarulhos em diferentes localizações. Ainda foi elaborado um folder informativo, sobre a importância do saneamento básico, que será entregue aos usuários da Unidade básica de saúde selecionada.			
<b>RESULTADOS</b>	A quantidade e regularidade do fornecimento de água, são fatores determinantes para a sua qualidade e a ocorrência de doenças nos homens. Outras situações que podem agravar a saúde são: fatores mecânicos, como rompimento de adutoras; problemas operacionais diversos e de manutenções nas estações de tratamento; produtos químicos adulterados; lavagem ineficiente de filtros; danos em equipamentos de produtos químicos, que podem resultar em distribuição de água não potável.			
<b>CONCLUSOES</b>	O saneamento básico inadequado proporciona agravos à saúde, podendo até ocorrer internações hospitalares e aumento de gastos públicos. Implementar ações para melhorar o conhecimento da população sobre seus direitos, promover o ensino para a identificação de água potável e não potável, bem como orientar sobre os cuidados de higiene, são meios para reduzir agravos a saúde e melhorar a qualidade de vida da população.			
<b>REFERENCIAS</b>	Araujo LF et al. Análise da cobertura de abastecimento da qualidade da água distribuída em diferentes regiões do Brasil no ano de 2019. DOI: Silva, Bruno Oliveira Souza e; Costa, Alexandre Sylvio Vieira da. Estudo sobre a qualidade da água para consumo humano e as doenças diarreicas no Brasil. Rev. baiana saúde pública ; 43(4): 119-134, 20191212. Teixeira, J.C. et al. Estudo do impacto das deficiências de saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil no período de 2001 a 2009. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Manual de Procedimentos de Entrada de Dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Brasília: MS; 2016			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14519	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233402 - GIOVANNA ALVES DE PAULA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Qualidade da Água Potável e relação com a Diarreia na Periferia do Município de Guarulhos			
<b>INTRODUCAO</b>	O saneamento básico inadequado ou ausente é a grande causador de agravos a saúde, a diarreia representa 50% das doenças como consequência dessa situação e está associada a água não potável, saneamento básico inadequado e higiene precária. A cidade de Guarulhos é a segunda mais populosa do estado de São Paulo, a 13ª mais populosa do Brasil. Possui mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados mais recentes do IBGE. Em 2020 foram 10,33 óbitos por mil nascidos vivos e 0,2 internações por diarreia por mil habitantes em 2016.			
<b>OBJETIVOS</b>	Enfatizar a importância da água potável chegar até a população final, e identificar problemas de saúde relacionados a ausência do fornecimento adequado no município de Guarulhos. Conscientizar a população sobre seus direitos previstos em lei, através de divulgação de folders, sites e aplicativos de visualização facilitada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, que utiliza busca em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e sites oficiais do governo. Foi utilizado como ferramenta para coleta das informações o aplicativo Docs. do Google, empregando questionários fornecidos de forma aleatória a moradores do Município de Guarulhos em diferentes localizações. Ainda foi elaborado um folder informativo, sobre a importância do saneamento básico, que será entregue aos usuários da Unidade básica de saúde selecionada.			
<b>RESULTADOS</b>	A quantidade e regularidade do fornecimento de água, são fatores determinantes para a sua qualidade e a ocorrência de doenças nos homens. Outras situações que podem agravar a saúde são: fatores mecânicos, como rompimento de adutoras; problemas operacionais diversos e de manutenções nas estações de tratamento; produtos químicos adulterados; lavagem ineficiente de filtros; danos em equipamentos de produtos químicos, que podem resultar em distribuição de água não potável.			
<b>CONCLUSOES</b>	O saneamento básico inadequado proporciona agravos à saúde, podendo até ocorrer internações hospitalares e aumento de gastos públicos. Implementar ações para melhorar o conhecimento da população sobre seus direitos, promover o ensino para a identificação de água potável e não potável, bem como orientar sobre os cuidados de higiene, são meios para reduzir agravos a saúde e melhorar a qualidade de vida da população.			
<b>REFERENCIAS</b>	Araujo LF et al. Análise da cobertura de abastecimento da qualidade da água distribuída em diferentes regiões do Brasil no ano de 2019. DOI: Silva, Bruno Oliveira Souza e; Costa, Alexandre Sylvio Vieira da. Estudo sobre a qualidade da água para consumo humano e as doenças diarreicas no Brasil. Rev. baiana saúde pública ; 43(4): 119-134, 20191212. Teixeira, J.C. et al. Estudo do impacto das deficiências de saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil no período de 2001 a 2009. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Manual de Procedimentos de Entrada de Dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Brasília: MS; 2016			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14519	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5233496 - GABRIELA CASTRO SOUZA ROCHA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Qualidade da Água Potável e relação com a Diarreia na Periferia do Município de Guarulhos			
<b>INTRODUCAO</b>	O saneamento básico inadequado ou ausente é a grande causador de agravos a saúde, a diarreia representa 50% das doenças como consequência dessa situação e está associada a água não potável, saneamento básico inadequado e higiene precária. A cidade de Guarulhos é a segunda mais populosa do estado de São Paulo, a 13ª mais populosa do Brasil. Possui mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados mais recentes do IBGE. Em 2020 foram 10,33 óbitos por mil nascidos vivos e 0,2 internações por diarreia por mil habitantes em 2016.			
<b>OBJETIVOS</b>	Enfatizar a importância da água potável chegar até a população final, e identificar problemas de saúde relacionados a ausência do fornecimento adequado no município de Guarulhos. Conscientizar a população sobre seus direitos previstos em lei, através de divulgação de folders, sites e aplicativos de visualização facilitada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, que utiliza busca em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e sites oficiais do governo. Foi utilizado como ferramenta para coleta das informações o aplicativo Docs. do Google, empregando questionários fornecidos de forma aleatória a moradores do Município de Guarulhos em diferentes localizações. Ainda foi elaborado um folder informativo, sobre a importância do saneamento básico, que será entregue aos usuários da Unidade básica de saúde selecionada.			
<b>RESULTADOS</b>	A quantidade e regularidade do fornecimento de água, são fatores determinantes para a sua qualidade e a ocorrência de doenças nos homens. Outras situações que podem agravar a saúde são: fatores mecânicos, como rompimento de adutoras; problemas operacionais diversos e de manutenções nas estações de tratamento; produtos químicos adulterados; lavagem ineficiente de filtros; danos em equipamentos de produtos químicos, que podem resultar em distribuição de água não potável.			
<b>CONCLUSOES</b>	O saneamento básico inadequado proporciona agravos à saúde, podendo até ocorrer internações hospitalares e aumento de gastos públicos. Implementar ações para melhorar o conhecimento da população sobre seus direitos, promover o ensino para a identificação de água potável e não potável, bem como orientar sobre os cuidados de higiene, são meios para reduzir agravos a saúde e melhorar a qualidade de vida da população.			
<b>REFERENCIAS</b>	Araujo LF et al. Análise da cobertura de abastecimento da qualidade da água distribuída em diferentes regiões do Brasil no ano de 2019. DOI: Silva, Bruno Oliveira Souza e; Costa, Alexandre Sylvio Vieira da. Estudo sobre a qualidade da água para consumo humano e as doenças diarreicas no Brasil. Rev. baiana saúde pública ; 43(4): 119-134, 20191212. Teixeira, J.C. et al. Estudo do impacto das deficiências de saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil no período de 2001 a 2009. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Manual de Procedimentos de Entrada de Dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Brasília: MS; 2016			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14519	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5235197 - JULIA ALVES ARAUJO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Qualidade da Água Potável e relação com a Diarreia na Periferia do Município de Guarulhos			
<b>INTRODUCAO</b>	O saneamento básico inadequado ou ausente é a grande causador de agravos a saúde, a diarreia representa 50% das doenças como consequência dessa situação e está associada a água não potável, saneamento básico inadequado e higiene precária. A cidade de Guarulhos é a segunda mais populosa do estado de São Paulo, a 13ª mais populosa do Brasil. Possui mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados mais recentes do IBGE. Em 2020 foram 10,33 óbitos por mil nascidos vivos e 0,2 internações por diarreia por mil habitantes em 2016.			
<b>OBJETIVOS</b>	Enfatizar a importância da água potável chegar até a população final, e identificar problemas de saúde relacionados a ausência do fornecimento adequado no município de Guarulhos. Conscientizar a população sobre seus direitos previstos em lei, através de divulgação de folders, sites e aplicativos de visualização facilitada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, que utiliza busca em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e sites oficiais do governo. Foi utilizado como ferramenta para coleta das informações o aplicativo Docs. do Google, empregando questionários fornecidos de forma aleatória a moradores do Município de Guarulhos em diferentes localizações. Ainda foi elaborado um folder informativo, sobre a importância do saneamento básico, que será entregue aos usuários da Unidade básica de saúde selecionada.			
<b>RESULTADOS</b>	A quantidade e regularidade do fornecimento de água, são fatores determinantes para a sua qualidade e a ocorrência de doenças nos homens. Outras situações que podem agravar a saúde são: fatores mecânicos, como rompimento de adutoras; problemas operacionais diversos e de manutenções nas estações de tratamento; produtos químicos adulterados; lavagem ineficiente de filtros; danos em equipamentos de produtos químicos, que podem resultar em distribuição de água não potável.			
<b>CONCLUSOES</b>	O saneamento básico inadequado proporciona agravos à saúde, podendo até ocorrer internações hospitalares e aumento de gastos públicos. Implementar ações para melhorar o conhecimento da população sobre seus direitos, promover o ensino para a identificação de água potável e não potável, bem como orientar sobre os cuidados de higiene, são meios para reduzir agravos a saúde e melhorar a qualidade de vida da população.			
<b>REFERENCIAS</b>	Araujo LF et al. Análise da cobertura de abastecimento da qualidade da água distribuída em diferentes regiões do Brasil no ano de 2019. DOI: Silva, Bruno Oliveira Souza e; Costa, Alexandre Sylvio Vieira da. Estudo sobre a qualidade da água para consumo humano e as doenças diarreicas no Brasil. Rev. baiana saúde pública ; 43(4): 119-134, 20191212. Teixeira, J.C. et al. Estudo do impacto das deficiências de saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil no período de 2001 a 2009. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Manual de Procedimentos de Entrada de Dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Brasília: MS; 2016			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14519	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
				<b>Apresentação</b>
		5243661 - BEATRIZ CARNEIRO TIPO		2 - Aprovado
				1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Qualidade da Água Potável e relação com a Diarreia na Periferia do Município de Guarulhos			
<b>INTRODUCAO</b>	O saneamento básico inadequado ou ausente é a grande causador de agravos a saúde, a diarreia representa 50% das doenças como consequência dessa situação e está associada a água não potável, saneamento básico inadequado e higiene precária. A cidade de Guarulhos é a segunda mais populosa do estado de São Paulo, a 13ª mais populosa do Brasil. Possui mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados mais recentes do IBGE. Em 2020 foram 10,33 óbitos por mil nascidos vivos e 0,2 internações por diarreia por mil habitantes em 2016.			
<b>OBJETIVOS</b>	Enfatizar a importância da água potável chegar até a população final, e identificar problemas de saúde relacionados a ausência do fornecimento adequado no município de Guarulhos. Conscientizar a população sobre seus direitos previstos em lei, através de divulgação de folders, sites e aplicativos de visualização facilitada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, que utiliza busca em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e sites oficiais do governo. Foi utilizado como ferramenta para coleta das informações o aplicativo Docs. do Google, empregando questionários fornecidos de forma aleatória a moradores do Município de Guarulhos em diferentes localizações. Ainda foi elaborado um folder informativo, sobre a importância do saneamento básico, que será entregue aos usuários da Unidade básica de saúde selecionada.			
<b>RESULTADOS</b>	A quantidade e regularidade do fornecimento de água, são fatores determinantes para a sua qualidade e a ocorrência de doenças nos homens. Outras situações que podem agravar a saúde são: fatores mecânicos, como rompimento de adutoras; problemas operacionais diversos e de manutenções nas estações de tratamento; produtos químicos adulterados; lavagem ineficiente de filtros; danos em equipamentos de produtos químicos, que podem resultar em distribuição de água não potável.			
<b>CONCLUSOES</b>	O saneamento básico inadequado proporciona agravos à saúde, podendo até ocorrer internações hospitalares e aumento de gastos públicos. Implementar ações para melhorar o conhecimento da população sobre seus direitos, promover o ensino para a identificação de água potável e não potável, bem como orientar sobre os cuidados de higiene, são meios para reduzir agravos a saúde e melhorar a qualidade de vida da população.			
<b>REFERENCIAS</b>	Araujo LF et al. Análise da cobertura de abastecimento da qualidade da água distribuída em diferentes regiões do Brasil no ano de 2019. DOI: Silva, Bruno Oliveira Souza e; Costa, Alexandre Sylvio Vieira da. Estudo sobre a qualidade da água para consumo humano e as doenças diarreicas no Brasil. Rev. baiana saúde pública ; 43(4): 119-134, 20191212. Teixeira, J.C. et al. Estudo do impacto das deficiências de saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil no período de 2001 a 2009. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Manual de Procedimentos de Entrada de Dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Brasília: MS; 2016			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14519	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5244153 - FRANCYANE COSTA SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Qualidade da Água Potável e relação com a Diarreia na Periferia do Município de Guarulhos			
<b>INTRODUCAO</b>	O saneamento básico inadequado ou ausente é a grande causador de agravos a saúde, a diarreia representa 50% das doenças como consequência dessa situação e está associada a água não potável, saneamento básico inadequado e higiene precária. A cidade de Guarulhos é a segunda mais populosa do estado de São Paulo, a 13ª mais populosa do Brasil. Possui mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados mais recentes do IBGE. Em 2020 foram 10,33 óbitos por mil nascidos vivos e 0,2 internações por diarreia por mil habitantes em 2016.			
<b>OBJETIVOS</b>	Enfatizar a importância da água potável chegar até a população final, e identificar problemas de saúde relacionados a ausência do fornecimento adequado no município de Guarulhos. Conscientizar a população sobre seus direitos previstos em lei, através de divulgação de folders, sites e aplicativos de visualização facilitada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal, que utiliza busca em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e sites oficiais do governo. Foi utilizado como ferramenta para coleta das informações o aplicativo Docs. do Google, empregando questionários fornecidos de forma aleatória a moradores do Município de Guarulhos em diferentes localizações. Ainda foi elaborado um folder informativo, sobre a importância do saneamento básico, que será entregue aos usuários da Unidade básica de saúde selecionada.			
<b>RESULTADOS</b>	A quantidade e regularidade do fornecimento de água, são fatores determinantes para a sua qualidade e a ocorrência de doenças nos homens. Outras situações que podem agravar a saúde são: fatores mecânicos, como rompimento de adutoras; problemas operacionais diversos e de manutenções nas estações de tratamento; produtos químicos adulterados; lavagem ineficiente de filtros; danos em equipamentos de produtos químicos, que podem resultar em distribuição de água não potável.			
<b>CONCLUSOES</b>	O saneamento básico inadequado proporciona agravos à saúde, podendo até ocorrer internações hospitalares e aumento de gastos públicos. Implementar ações para melhorar o conhecimento da população sobre seus direitos, promover o ensino para a identificação de água potável e não potável, bem como orientar sobre os cuidados de higiene, são meios para reduzir agravos a saúde e melhorar a qualidade de vida da população.			
<b>REFERENCIAS</b>	Araujo LF et al. Análise da cobertura de abastecimento da qualidade da água distribuída em diferentes regiões do Brasil no ano de 2019. DOI: Silva, Bruno Oliveira Souza e; Costa, Alexandre Sylvio Vieira da. Estudo sobre a qualidade da água para consumo humano e as doenças diarreicas no Brasil. Rev. baiana saúde pública ; 43(4): 119-134, 20191212. Teixeira, J.C. et al. Estudo do impacto das deficiências de saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil no período de 2001 a 2009. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Manual de Procedimentos de Entrada de Dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Brasília: MS; 2016			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo		Modalidade
2023	14520	Medicina	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado		0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		777991 - FERNANDA MARIA SIMÕES DA COSTA FUJINO		2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>		<b>Orientador Externo</b>
		Patricia Colombo de Souza	Ana Paula Ribeiro		DENISE CASTANHO
<b>TITULO</b>	Impacto da Homeopatia na qualidade do sono e na saúde emocional em pacientes do SUS				
<b>INTRODUCAO</b>	Atualmente as principais causas de mortalidade e altos custos em saúde são as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Alterações na qualidade do sono noturno e fatores emocionais, como estresse, ansiedade e depressão estão sendo associados à incidência e prevalência das DCNT. Dentre as diversas assistências do Sistema Único de Saúde (SUS) para enfrentamento das DCNT, a Homeopatia, uma especialidade médica legitimada pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), pode ser vista como uma das possibilidades tanto na prevenção das DCNT como para combater as disfunções e comorbidades advindas delas.				
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a influência do tratamento homeopático na qualidade do sono e no nível de estresse, ansiedade e depressão de pacientes do SUS.				
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa seguiu um método observacional, longitudinal e prospectivo, incluindo indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos que iniciaram tratamento homeopático no Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde Fracalanza e em Centros de Especialidades Médicas de Guarulhos/SP entre junho de 2022 e janeiro de 2023. Foi utilizado o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e a Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21) para avaliar os pacientes. O teste de Friedman foi aplicado para comparações entre os tempos de acompanhamento, considerando o nível de significância de 5%.				
<b>RESULTADOS</b>	Do total de 74 pacientes avaliados, a maioria eram mulheres (89,19%) com idades entre 18 e 86 anos (média de 49 anos). No início do estudo (T0), 81% dos pacientes apresentavam problemas no padrão de sono, como sono ruim ou distúrbios do sono, e uma parcela considerável estava experimentando níveis severos ou extremamente severos de estresse (33,78%), ansiedade (28,38%), e depressão (27,03%), fatores associados às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). A qualidade do sono melhorou significativamente, com um aumento de 70% entre T0 e T1, e 75% entre T0 e T2. Além disso, os níveis de estresse demonstraram melhorias de 63% para 86% entre T0 e T2. A ansiedade também apresentou melhorias, com 71% de melhora entre T0 e T1, chegando a 100% entre T0 e T2. Quanto à depressão, houve uma melhora de 100% entre T0 e T1, e novamente entre T0 e T2. Todos esses resultados foram estatisticamente significativos (p (#60) 0,0001).				
<b>CONCLUSOES</b>	O tratamento homeopático teve um impacto positivo na qualidade do sono e nos níveis de estresse, ansiedade e depressão de adultos assistidos pelo SUS, em um período relativamente curto de 3 a 6 meses. Esses resultados sugerem que a Homeopatia pode ser uma estratégia eficaz no enfrentamento das DCNT, que são as principais causas de mortalidade e custos em saúde atualmente.				
<b>REFERENCIAS</b>	Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil: 2021-2030. Malta DC, Moura L, Silva Júnior JB. Epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. In: Rouquayrol MZ, Silva MGC. Epidemiologia (#38) Saúde. 8 ed. Rio de Janeiro: Medbook; 2018. 649-99				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14522	Engenharias	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4289994 - ANDRE LUIS PITELA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira		
		<b>Orientador Externo</b>		
<b>TITULO</b>	Biopolímeros como alternativa aos Contaminantes Emergentes: Microplásticos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A poluição causada por microplásticos tem reacendendo o interesse por soluções sustentáveis devido às graves implicações para a saúde e os ecossistemas (Freire, 2022). Os biopolímeros derivados de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, surge como uma alternativa promissora, em contraste ao polímero convencional, se destacando por sua biodegradabilidade (Benedicto et al., 2019). O polietileno convencional é notoriamente resistente à biodegradação, podendo persistir no meio ambiente por centenas de anos, fragmentando-se em pequenas partículas de microplástico. (Matheus, 2018)			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o potencial de biopolímeros como solução sustentável por meio de indicadores de ACV.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram utilizados descritores: "contaminantes emergentes", "microplásticos", "polietileno verde", "biodegradabilidade" na plataforma periodicos capes para o período de 2015 a 2023. De um total de 10 artigos foram selecionados os principais indicadores da metodologia ACV.			
<b>RESULTADOS</b>	O polietileno convencional apresenta um Índice de Pressão Ambiental (IPA) de 39,12% sendo superior ao PE verde que foi de 7,59%. Essa disparidade ocorre, principalmente, devido ao Índice de Aquecimento Global (IAG) ter sido negativo para o biopolímero, mesmo que o polietileno verde tenha apresentado um maior Índice de Consumo de Recursos Naturais. O indicador negativo se deve a captura de carbono na atmosfera e sua incorporação no material. (ICRN). O potencial de acidificação e eutrofização de recursos hídricos, o polímero verde apresentou valores da ordem de 0,038 kgSO <sub>2</sub> eq/kgdePE e 0,017 kgdePO <sub>4</sub> eq/kgdePE enquanto que para o PE os indicadores apontam 0,001 kgSO <sub>2</sub> eq/kgdePE e 0,002 kgdePO <sub>4</sub> eq/kgdePE, respectivamente. Esse resultado se deve a utilização de queima de bagaço e de combustíveis fósseis pelos equipamentos agrícolas no processo que emite à atmosfera os SO <sub>x</sub> e as emissões de fósforo. A energia consumida no processo produtivo de origem fóssil foi menor para o PE verde, em torno de 19MJ/kgdePE enquanto que para o convencional o valor foi superior a 80MJ/kgdePE.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que o polietileno verde oferece vantagens significativas na redução de resíduos plásticos e na diminuição de impactos ambientais, embora alguns desafios, como emissões associadas à produção, exijam atenção para otimizar sua sustentabilidade em todas as fases do ciclo de vida do produto.			
<b>REFERENCIAS</b>	Benedicto, F. S. et al. (2019). Biopolymers as an alternative to polyethylene for flexible films packaging. Materials Research, 22(3). DOI: 10.1590/1980-5373-mr-2018-0462. Freire, R. C., Branco, M. M. G. de O., Silva, R. F. da., Carvalho, R. M. C. M. de O., (#38) Silva, H. P. da. MICROPLÁSTICO: CONTAMINANTES EMERGENTES PRESENTE EM EFLUENTES DOMÉSTICOS E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Revista Brasileira De Meio Ambiente (#38)Amp; Sustentabilidade, 2(3), 75–88. 2022 Matheus, J.P., Munhoz, P.M., AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA DE FILMES DE Polietileno (PE): Estudo de caso sobre a alternativa do PE Verde. I Workshop de ACV: Visão Social, Ambiental e Econômica III Workshop de ACV-Social Universidade Federal do ABC (UFABC). 2018 Disponível em: <a href="https://nucleos.ufabc.edu.br/images/revalores/artigos/avaliacao_de_ciclo_de_vida_de_filmes_de.pdf">https://nucleos.ufabc.edu.br/images/revalores/artigos/avaliacao_de_ciclo_de_vida_de_filmes_de.pdf</a> . Acessado em 10/10/2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14524	Farmacologia e Terapêutica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4639197 - NICOLE NEUMANN	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh	Andressa de Fatima Koteski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	Desenvolvimento de uma ferramenta digital para o ensino do mecanismo da dor e fármacos analgésicos.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Atualmente, desenvolvimento e tecnologia parecem sinônimos. Ao passo que a sociedade contemporânea avança, os meios digitais ocupam grande espaço, seja em rotinas, lazer, e principalmente meio acadêmico, acreditando em mudanças no ambiente de aprendizagem. Dessa forma, utilizar a tecnologia como método alternativo de ensino tornou-se uma conveniência tanto para docente quanto para aprendentes, ao ver que mantém um contato íntimo com a compreensão, até de disciplinas que possuem conteúdo mais extenso e abrangente como a farmacologia. Sendo assim, a criação de uma ferramenta on-line é uma boa escolha de como utilizar a tecnologia ao nosso favor, à medida que farmacologia é essencial para alunos da área de saúde.			
<b>OBJETIVOS</b>	Facilitar o aprendizado de discentes pela produção de uma ferramenta on-line, promovendo uma aproximação do mundo tecnológico e da formação acadêmica.			
<b>METODOLOGIA</b>	A plataforma digital foi desenvolvida por um mecanismo oferecido pelo Google, o software Google sites, o qual conta com ferramentas fáceis de produção, assim como para o acesso e posterior utilização do site. Somado a isso, as imagens contidas foram criadas pelo Canva, uma plataforma online de design que facilita a comunicação visual. Além da escolha do sistema operacional, uma revisão literária dos principais livros de farmacologia veterinária, oferecendo informações gerais, princípio ativo, nome comercial, vias de administração, doses, posologia, farmacodinâmica e farmacocinética, indicações e contra-indicações, efeitos adversos e rótulos de 22 fármacos, de forma individual. Dentre os fármacos presentes estão os anti-inflamatórios não esteroidais e opioides, classes de suma importância para a realização de analgesia. Além disso, há uma página voltada para o estudo da dor: explicação de dor e nocicepção, receptores, tipos de fibras e dores, fisiopatologia da dor, escalas de dor, graus de tratamento para dor e expressões da dor nas espécies canino, felino, bovino, equino, caprino e ovino.			
<b>RESULTADOS</b>	Com o avanço das tecnologias e da geração atual totalmente a par do meio digital, a criação de uma plataforma digital que oferece informações importantes sobre os fármacos, principalmente sobre suas utilizações e particularidades, é mais que necessário. Criar possibilidades para estudo contribui no percurso que discentes enfrentam em suas graduações e adiante, além de docentes que preferem por se adequar ao novo mundo acadêmico.			
<b>CONCLUSOES</b>	A plataforma digital agrega na formação acadêmica de discentes que passam pela matéria de farmacologia por este ser um facilitador da pesquisa e estar incluso em novos métodos de ensino-aprendizagem.			
<b>REFERENCIAS</b>	PEREIRA, Diego Fleury De Lemos. NEUROFISIOLOGIA DA DOR. Ciências e Cognição, 2018. / <a href="https://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/arquivos/4383">https://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/arquivos/4383</a> LUNA, Stelio Pacca Loureiro. DOR E QUALIDADE DE VIDA EM ANIMAIS. Botucatu: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia UNESP, 2023. / <a href="https://animalpain.org">https://animalpain.org</a> GARCIA, Fernanda Wolf. A IMPORTÂNCIA DO USO DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. 1. ed. Batatais: Educação a Distância, 2013. 25- 48 p. v. 3.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14526	Direito Processual Penal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4343662 - NICOLE RODRIGUES DE HOLANDA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato Watanabe de Moraes		
<b>TITULO</b>	Da ausência de prestação de saúde nas penitenciárias femininas de São Paulo			
<b>INTRODUCAO</b>	A execução penal, fase que sucede a sentença penal condenatória, é regulada pela Lei nº 7.210/84, que em seu art. 3º assevera a não violação de direitos não afetados pela sentença e ainda assegura, nos termos do art. 41, I e VII, a prestação do direito constitucional à saúde. Entretanto, realidade e legislação guardam pouca semelhança entre si e, por conseguinte, o que se assiste nos presídios - para fins desse estudo, notadamente nos presídios femininos de São Paulo - é a violação da garantia estabelecida pelo Legislador que tem por corolário a violação à própria dignidade da pessoa humana.			
<b>OBJETIVOS</b>	Por meio da presente pesquisa busca-se realizar um diagnóstico da efetividade da prestação de saúde nas penitenciárias femininas de São Paulo, abordando racional e criticamente o descompasso entre realidade e normatividade.			
<b>METODOLOGIA</b>	É conduzida pesquisa em artigos e livros acadêmicos voltados para o assunto, julgados de tribunais superiores, bem como análise de dados fornecidos por órgãos públicos e por pesquisas realizadas por grupos independentes.			
<b>RESULTADOS</b>	Somados, os dados apresentados por órgãos como o Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo e o Sisdepen levam a construção de um cenário insustentável; trata-se de, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, um estado de coisa inconstitucional. Nesse sentido, apontam os relatórios do NESC situações que dificilmente permeariam o imaginário popular, como a situação encontrada no do Centro de Progressão Penitenciária do Butantã que, embora tenha sido fechado, alocou uma sentenciada no que deveria ser a área destinada a observação onde, em razão da falta de piso, havia diversos pregos dispostos pelo chão. Situação agravada pela ausência de cama, sendo a detenta obrigada a dormir sobre um colchão disposto no chão. Mas, em que pese a gravidade da situação, não raros são os discursos populares e políticos defendendo o que, em verdade, seria a concretização de um já superado (e inconstitucional) princípio: less eligibility, que defende um estado mínimo para os encarcerados como meio dissuasório da prática delitiva.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em síntese, são diversas as violações sanitárias a que são submetidas as mulheres privadas da liberdade no estado de São Paulo. Estas variam em grau e natureza, mas são constates em relação ao impacto na saúde das sentenciadas. Uma situação que, entretanto, não desestimula o crescimento de discursos que prezam por um recrudescimento legal e tratamento mais "severo" da população carcerária.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 347. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal. Brasília, 2015. Disponível em: <a href="https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP(#38)docID=10300665">https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP(#38)docID=10300665</a> . SIEH, Edward W. Less Eligibility: the upper limits of penal policy. Criminal Justice Policy Review, [S.L.], v. 3, n. 2, p. 159-183, jun. 1989. SAGE Publications. Relatório de Inspeção NESC - CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA FEMININO DO BUTANTÃ - 19/08/2021. Disponível em: <a href="https://www.defensoria.sp.def.br/documents/20122/3ad5c56d-17da-6905-1208-367d8532b6a1">https://www.defensoria.sp.def.br/documents/20122/3ad5c56d-17da-6905-1208-367d8532b6a1</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14527	Psiquiatria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4023846 - VITORIA JOANA PAES ARIDA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Aptidão cardiorrespiratória e transtorno bipolar: uma revisão sistemática com meta-análise			
<b>INTRODUCAO</b>	Pessoas com transtorno bipolar (TB) apresentam maior risco de morte prematura, vivendo aproximadamente 10 anos menos que a população geral. A aptidão cardiorrespiratória (ACR) é um poderoso marcador de saúde e está associada a menor risco de morte por todas as causas. Adicionalmente, é um fator de risco clínico crítico em pessoas com TB. Assim, a ACR é uma importante medida de saúde no TB.			
<b>OBJETIVOS</b>	Nosso estudo se propôs sumarizar a literatura realizando uma revisão sistemática com meta-análise. Adicionalmente, tivemos o objetivo de responder 3 questões: i) existe diferença na ACR entre pessoas com TB e controles saudáveis?; ii) existe diferença na ACR das pessoas com TB com base nos testes padrão ouro (espirometria) e testes indiretos?; e iii) qual o efeito de intervenções com exercício físico na ACR de pessoas com TB?			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisamos nas plataformas PubMed, Embase e Web of Science (Desde o início até 31 de maio de 2023), estudos observacionais e experimentais sobre ACR e TB. Foram incluídos artigos originais revisados por pares, com população com TB, com medidas diretas ou indiretas da ACR. A inspeção visual da análise do gráfico de funil foi usada para verificar a presença de vies de publicação. Os estudos que apresentaram dados em média e desvio padrão foram analisados por meta-análises. A presente revisão foi registrada na Plataforma PROSPERO.			
<b>RESULTADOS</b>	Um total de 25 estudos, 2.177 pessoas (724 pessoas com TB) foram incluídos na nossa revisão sistemática. Nossas meta-análises demonstrou que: i) diferença significativa na ACR entre pessoas com TB e controles saudáveis (SMD = -1,050, IC 95% = -1,820 a -0,280). Tais evidências sinaliza para a importância de estabelecermos estratégias para o aumento da ACR nessa população; ii) existe diferença na ACR na comparação testes padrão ouro – espirometria (25.8 ± 1.0 ml/kg/min) e testes indiretos (33.5 ± 7.6 ml/kg/min), o que sinaliza a necessidade de precaução na interpretação dos valores da ACR em testes indiretos; iii) o efeito de intervenções com exercício físico na ACR de pessoas com TB não é significativo (SMD = 0,232, IC 95% = -0,197 a 0,661), o que em nosso entendimento precisa ser melhor testado com intervenções considerando a manipulação das variáveis de treinamento.			
<b>CONCLUSOES</b>	Pessoas com TB apresentam níveis reduzidos de ACR comparadas a população saudável, testes indiretos apresentam valores superiores de ACR comparado aos testes diretos e as intervenções aqui identificadas (3 estudos) não demonstraram o aumento da ACR após o período de treinamento.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Popel N, Kennedy KG, Fiksenbaum L, Mitchell RHB, MacIntosh BJ, Goldstein BI. Clinical and neuroimaging correlates of cardiorespiratory fitness in adolescents with bipolar disorder. <i>Bipolar Disord.</i> 2021 2 - Vancampfort D, Stubbs B, Sienaert P, et al. A comparison of physical fitness in patients with bipolar disorder, schizophrenia and healthy controls. <i>Disabil Rehabil.</i> 2016 3 - Vancampfort D, Hagemann N, Wyckaert S, et al. Higher cardio-respiratory fitness is associated with increased mental and physical quality of life in people with bipolar disorder: A controlled pilot study. <i>Psychiatry Res.</i> 2017			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14528	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4332008 - MAURO CESAR LUPERIM	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Transtornos mentais no esporte			
<b>INTRODUCAO</b>	É bem aceito que atletas de elite estão no topo da performance física e controles muito rigorosos são realizados para que seu desempenho físico se mantenha no topo. Porém o esporte de competição de elite ainda precisa alcançar maior efetividade na relação com a saúde mental, visto que poucos clubes e organizações apresentam planos claros para promoção da saúde mental. Como consequência, pesquisas relacionadas a saúde mental no esporte ainda são raras.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisar de forma não sistemática publicações na temática esporte e transtorno mental.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizamos uma busca nas plataformas Pubmed e Embase com os termos esporte e transtornos mentais. Um total de 10 estudos foram arbitrariamente selecionados e analisados quanto a Ano de publicação, país onde foi conduzido, modalidade, medida de saúde mental investigada, ferramenta de saúde mental usada, amostra, número de sujeitos e conclusão do estudo.			
<b>RESULTADOS</b>	Os estudos selecionados foram publicados entre os anos de 2007 a 2023, tendo como país que foi desenvolvido a Austrália, Brasil, EUA ou Turquia, envolvendo as modalidades, futebol, futebol americano, hóquei, rugby e voleibol. Medidas relacionadas a depressão estavam presentes em todos os 10 estudos, sendo que medidas de ansiedade e consumo de álcool também foi verificado. Diferentes ferramentas validadas foram usadas como: Inventário de depressão Beck, PROMIS Depression, Competitive State Anxiety Inventory, Daily Analysis of Life Demands in Athletes, Major Depression Inventory, Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse, Diagnóstico de depressão relatado, Patient Health Questionnaire-9, General Anxiety Disorder-7, Alcohol Use Disorders Identification Test. Em relação a amostra, o maior número de estudos foi com atletas aposentados (5 estudos), seguidos de atletas sub-20 e atletas profissionais (2 estudos cada), e atletas universitários (1 estudo). Em relação a quantidade de atletas nos estudos, o menor número de atletas incluídos foi 23, e o maior 3377, sendo que a soma dos 10 estudos resultou em 9502 atletas. Por fim, todos os estudos em suas conclusões sinalizaram a preocupação com a saúde mental de atletas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Através do analisado, concluímos que poucos países figuram entre os que desenvolvem pesquisa na temática esporte e transtorno mental, e poucas modalidades são abordadas. Uma grande quantidade de ferramentas é usadas, e estudos desde pequenos grupos até grandes coortes foram realizadas entre 2007 e 2023.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - BRETT, Benjamin L. et al. Longitudinal trajectory of depression symptom severity and the influence of concussion history and physical function over a 19-year period among former National Football League (NFL) players: an NFL-LONG Study. Journal of Neurology, Neurosurgery (#38) Psychiatry, v. 93, n. 3, p. 272-279, 2022. 2 - HENDERSON, Anthony et al. What is the Prevalence of General Anxiety Disorder and Depression Symptoms in Semi-elite Australian Football Players: A Cross-Sectional Study. Sports Medicine-Open, v. 9, n. 1, p. 1-10, 2023. 3 - SILVA, Adson Alves da et al. Quality of coach-athlete relationship and coping as associated factors of stress, anxiety, burnout, and depression symptoms of soccer players in transition to professional: a prospective study. Motriz: Revista de Educação Física, v. 28, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14530	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		236420 - CLAUDIO DE OLIVEIRA FILHO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E IBUPROFENO NO PÓS-OPERATÓRIO DE EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES. ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E TRIPLA CEGO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente utilizados no pós-operatório de cirurgias bucais, devido ao seu potente efeito analgésico, bem como, na redução dos sinais flogísticos da inflamação, como edema e trismo. No entanto, o uso desses medicamentos deve ser cauteloso, uma vez que apresentam efeito colaterais importantes, principalmente em pacientes com algum tipo de cardiopatia, nefropatia ou problemas gástricos. Apesar dos anti-inflamatórios esteroidais (corticosteróides) serem mais utilizados no pré-operatório, podem se apresentar como uma opção aos AINEs.			
<b>OBJETIVOS</b>	Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da dexametasona comparado ao ibuprofeno no pós-operatório de cirurgias de extração de terceiros molares retidos, através de um ensaio clínico randomizado e triplo cego.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para tanto, 20 terceiros molares de diversos pacientes foram selecionados e divididos em dois grupos: grupo DEX ou IBU. Os pacientes alocados no grupo DEX receberam 6 comprimidos de dexametasona (4mg) para serem consumidos em 3 dias. Já os pacientes do grupo IBU receberam 9 comprimidos de Ibuprofeno (400mg) para serem consumidos em 3 dias. Todos os pacientes receberam dose pré-operatória de 8mg de dexametasona. Os dados avaliados foram a percepção de dor, através da escala visual analógica (VAS), mensuração do edema e trismo pós-operatórios de 48h e 7 dias, bem como o número de analgésicos de resgate consumidos (paracetamol 750mg).			
<b>RESULTADOS</b>	Com relação ao edema, observou-se que o grupo DEX apresentou menores valores, comparado ao grupo IBUP às 48 horas de pós-operatório, porém sem diferenças significativas. Já com relação ao trismo, observa-se que o grupo DEX apresentou padrão mais acentuado após 48 horas de cirurgias, com relação ao grupo IBUP. Com relação às variáveis relativas à analgesia, o grupo DEX apresentou maiores valores para VAS nas primeiras horas de pós-operatório, bem como maior número de analgésicos de resgate consumidos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, podemos concluir que o uso de Ibuprofeno 400mg no pós-operatório de exodontias de terceiro molar mostrou superioridade em quase todos os parâmetros avaliados, com destaque para um melhor comportamento na redução de trismo, percepção de dor e número de analgésicos consumidos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Isordia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. Drug Research. doi:10.1055/a-0637-8948 2 - Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada. Seattle: IASP Press, 2008:15-24. 3. Lima, C. A. A., Favarini, V. T., Torres, A. M., da Silva, R. A., (#38) Sato, F. R. L. (2017). Oral dexamethasone decreases postoperative pain, swelling, and trismus more than diclofenac following third molar removal: a randomized controlled clinical trial. Oral and Maxillofacial Surgery, 21(3), 321-326.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14530	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4332245 - FELIPE RODRIGUES FARIA ANGELICO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E IBUPROFENO NO PÓS-OPERATÓRIO DE EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES. ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E TRIPLA CEGO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente utilizados no pós-operatório de cirurgias bucais, devido ao seu potente efeito analgésico, bem como, na redução dos sinais flogísticos da inflamação, como edema e trismo. No entanto, o uso desses medicamentos deve ser cauteloso, uma vez que apresentam efeito colaterais importantes, principalmente em pacientes com algum tipo de cardiopatia, nefropatia ou problemas gástricos. Apesar dos anti-inflamatórios esteroidais (corticosteróides) serem mais utilizados no pré-operatório, podem se apresentar como uma opção aos AINEs.			
<b>OBJETIVOS</b>	Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da dexametasona comparado ao ibuprofeno no pós-operatório de cirurgias de extração de terceiros molares retidos, através de um ensaio clínico randomizado e triplo cego.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para tanto, 20 terceiros molares de diversos pacientes foram selecionados e divididos em dois grupos: grupo DEX ou IBU. Os pacientes alocados no grupo DEX receberam 6 comprimidos de dexametasona (4mg) para serem consumidos em 3 dias. Já os pacientes do grupo IBU receberam 9 comprimidos de Ibuprofeno (400mg) para serem consumidos em 3 dias. Todos os pacientes receberam dose pré-operatória de 8mg de dexametasona. Os dados avaliados foram a percepção de dor, através da escala visual analógica (VAS), mensuração do edema e trismo pós-operatórios de 48h e 7 dias, bem como o número de analgésicos de resgate consumidos (paracetamol 750mg).			
<b>RESULTADOS</b>	Com relação ao edema, observou-se que o grupo DEX apresentou menores valores, comparado ao grupo IBUP às 48 horas de pós-operatório, porém sem diferenças significativas. Já com relação ao trismo, observa-se que o grupo DEX apresentou padrão mais acentuado após 48 horas de cirurgias, com relação ao grupo IBUP. Com relação às variáveis relativas à analgesia, o grupo DEX apresentou maiores valores para VAS nas primeiras horas de pós-operatório, bem como maior número de analgésicos de resgate consumidos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, podemos concluir que o uso de Ibuprofeno 400mg no pós-operatório de exodontias de terceiro molar mostrou superioridade em quase todos os parâmetros avaliados, com destaque para um melhor comportamento na redução de trismo, percepção de dor e número de analgésicos consumidos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Isirdia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. Drug Research. doi:10.1055/a-0637-8948 2 - Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada. Seattle: IASP Press, 2008:15-24. 3. Lima, C. A. A., Favarini, V. T., Torres, A. M., da Silva, R. A., (#38) Sato, F. R. L. (2017). Oral dexamethasone decreases postoperative pain, swelling, and trismus more than diclofenac following third molar removal: a randomized controlled clinical trial. Oral and Maxillofacial Surgery, 21(3), 321-326.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14530	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4455061 - HELIDA DELIANE DA COSTA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E IBUPROFENO NO PÓS-OPERATÓRIO DE EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES. ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E TRIPLIO CEGO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente utilizados no pós-operatório de cirurgias bucais, devido ao seu potente efeito analgésico, bem como, na redução dos sinais flogísticos da inflamação, como edema e trismo. No entanto, o uso desses medicamentos deve ser cauteloso, uma vez que apresentam efeito colaterais importantes, principalmente em pacientes com algum tipo de cardiopatia, nefropatia ou problemas gástricos. Apesar dos anti-inflamatórios esteroidais (corticosteróides) serem mais utilizados no pré-operatório, podem se apresentar como uma opção aos AINEs.			
<b>OBJETIVOS</b>	Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da dexametasona comparado ao ibuprofeno no pós-operatório de cirurgias de extração de terceiros molares retidos, através de um ensaio clínico randomizado e triplo cego.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para tanto, 20 terceiros molares de diversos pacientes foram selecionados e divididos em dois grupos: grupo DEX ou IBU. Os pacientes alocados no grupo DEX receberam 6 comprimidos de dexametasona (4mg) para serem consumidos em 3 dias. Já os pacientes do grupo IBU receberam 9 comprimidos de Ibuprofeno (400mg) para serem consumidos em 3 dias. Todos os pacientes receberam dose pré-operatória de 8mg de dexametasona. Os dados avaliados foram a percepção de dor, através da escala visual analógica (VAS), mensuração do edema e trismo pós-operatórios de 48h e 7 dias, bem como o número de analgésicos de resgate consumidos (paracetamol 750mg).			
<b>RESULTADOS</b>	Com relação ao edema, observou-se que o grupo DEX apresentou menores valores, comparado ao grupo IBUP às 48 horas de pós-operatório, porém sem diferenças significativas. Já com relação ao trismo, observa-se que o grupo DEX apresentou padrão mais acentuado após 48 horas de cirurgias, com relação ao grupo IBUP. Com relação às variáveis relativas à analgesia, o grupo DEX apresentou maiores valores para VAS nas primeiras horas de pós-operatório, bem como maior número de analgésicos de resgate consumidos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, podemos concluir que o uso de Ibuprofeno 400mg no pós-operatório de exodontias de terceiro molar mostrou superioridade em quase todos os parâmetros avaliados, com destaque para um melhor comportamento na redução de trismo, percepção de dor e número de analgésicos consumidos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Isjordia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. Drug Research. doi:10.1055/a-0637-8948 2 - Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada. Seattle: IASP Press, 2008:15-24. 3. Lima, C. A. A., Favarini, V. T., Torres, A. M., da Silva, R. A., (#38) Sato, F. R. L. (2017). Oral dexamethasone decreases postoperative pain, swelling, and trismus more than diclofenac following third molar removal: a randomized controlled clinical trial. Oral and Maxillofacial Surgery, 21(3), 321-326.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14530	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4459679 - LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E IBUPROFENO NO PÓS-OPERATÓRIO DE EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES. ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E TRIPLA CEGO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente utilizados no pós-operatório de cirurgias bucais, devido ao seu potente efeito analgésico, bem como, na redução dos sinais flogísticos da inflamação, como edema e trismo. No entanto, o uso desses medicamentos deve ser cauteloso, uma vez que apresentam efeito colaterais importantes, principalmente em pacientes com algum tipo de cardiopatia, nefropatia ou problemas gástricos. Apesar dos anti-inflamatórios esteroidais (corticosteróides) serem mais utilizados no pré-operatório, podem se apresentar como uma opção aos AINEs.			
<b>OBJETIVOS</b>	Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da dexametasona comparado ao ibuprofeno no pós-operatório de cirurgias de extração de terceiros molares retidos, através de um ensaio clínico randomizado e triplo cego.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para tanto, 20 terceiros molares de diversos pacientes foram selecionados e divididos em dois grupos: grupo DEX ou IBU. Os pacientes alocados no grupo DEX receberam 6 comprimidos de dexametasona (4mg) para serem consumidos em 3 dias. Já os pacientes do grupo IBU receberam 9 comprimidos de Ibuprofeno (400mg) para serem consumidos em 3 dias. Todos os pacientes receberam dose pré-operatória de 8mg de dexametasona. Os dados avaliados foram a percepção de dor, através da escala visual analógica (VAS), mensuração do edema e trismo pós-operatórios de 48h e 7 dias, bem como o número de analgésicos de resgate consumidos (paracetamol 750mg).			
<b>RESULTADOS</b>	Com relação ao edema, observou-se que o grupo DEX apresentou menores valores, comparado ao grupo IBUP às 48 horas de pós-operatório, porém sem diferenças significativas. Já com relação ao trismo, observa-se que o grupo DEX apresentou padrão mais acentuado após 48 horas de cirurgias, com relação ao grupo IBUP. Com relação às variáveis relativas à analgesia, o grupo DEX apresentou maiores valores para VAS nas primeiras horas de pós-operatório, bem como maior número de analgésicos de resgate consumidos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, podemos concluir que o uso de Ibuprofeno 400mg no pós-operatório de exodontias de terceiro molar mostrou superioridade em quase todos os parâmetros avaliados, com destaque para um melhor comportamento na redução de trismo, percepção de dor e número de analgésicos consumidos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Isirdia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. Drug Research. doi:10.1055/a-0637-8948 2 - Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada. Seattle: IASP Press, 2008:15–24. 3. Lima, C. A. A., Favarini, V. T., Torres, A. M., da Silva, R. A., (#38) Sato, F. R. L. (2017). Oral dexamethasone decreases postoperative pain, swelling, and trismus more than diclofenac following third molar removal: a randomized controlled clinical trial. Oral and Maxillofacial Surgery, 21(3), 321–326.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14530	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4888359 - THIAGO LOPES DE ALMEIDA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gustavo Antonio Correa Momesso		
<b>TITULO</b>	COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS DA DEXAMETASONA E IBUPROFENO NO PÓS-OPERATÓRIO DE EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES. ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO E TRIPLA CEGO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são tradicionalmente utilizados no pós-operatório de cirurgias bucais, devido ao seu potente efeito analgésico, bem como, na redução dos sinais flogísticos da inflamação, como edema e trismo. No entanto, o uso desses medicamentos deve ser cauteloso, uma vez que apresentam efeito colaterais importantes, principalmente em pacientes com algum tipo de cardiopatia, nefropatia ou problemas gástricos. Apesar dos anti-inflamatórios esteroidais (corticosteróides) serem mais utilizados no pré-operatório, podem se apresentar como uma opção aos AINEs.			
<b>OBJETIVOS</b>	Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da dexametasona comparado ao ibuprofeno no pós-operatório de cirurgias de extração de terceiros molares retidos, através de um ensaio clínico randomizado e triplo cego.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para tanto, 20 terceiros molares de diversos pacientes foram selecionados e divididos em dois grupos: grupo DEX ou IBU. Os pacientes alocados no grupo DEX receberam 6 comprimidos de dexametasona (4mg) para serem consumidos em 3 dias. Já os pacientes do grupo IBU receberam 9 comprimidos de Ibuprofeno (400mg) para serem consumidos em 3 dias. Todos os pacientes receberam dose pré-operatória de 8mg de dexametasona. Os dados avaliados foram a percepção de dor, através da escala visual analógica (VAS), mensuração do edema e trismo pós-operatórios de 48h e 7 dias, bem como o número de analgésicos de resgate consumidos (paracetamol 750mg).			
<b>RESULTADOS</b>	Com relação ao edema, observou-se que o grupo DEX apresentou menores valores, comparado ao grupo IBUP às 48 horas de pós-operatório, porém sem diferenças significativas. Já com relação ao trismo, observa-se que o grupo DEX apresentou padrão mais acentuado após 48 horas de cirurgias, com relação ao grupo IBUP. Com relação às variáveis relativas à analgesia, o grupo DEX apresentou maiores valores para VAS nas primeiras horas de pós-operatório, bem como maior número de analgésicos de resgate consumidos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, podemos concluir que o uso de Ibuprofeno 400mg no pós-operatório de exodontias de terceiro molar mostrou superioridade em quase todos os parâmetros avaliados, com destaque para um melhor comportamento na redução de trismo, percepção de dor e número de analgésicos consumidos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - Isirdia-Espinoza, M., Bologna-Molina, R., Hernández-Miramontes, Y., Zapata-Morales, J., Alonso-Castro, A., Martínez-Morales, F., ... Franco-de la Torre, L. (2018). Pharmacological Control of Complications Following to Third Molar Removal: Evidence Based on A Meta-Analysis. Drug Research. doi:10.1055/a-0637-8948 2 - Moore RA, Barden J, Derry S, McQuay HJ. Gerenciando potencial viés de publicação. In: McQuay HJ, Kalso E, Moore RA editor(es). Revisões Sistemáticas na Pesquisa da Dor: Metodologia Refinada. Seattle: IASP Press, 2008:15-24. 3. Lima, C. A. A., Favarini, V. T., Torres, A. M., da Silva, R. A., (#38) Sato, F. R. L. (2017). Oral dexamethasone decreases postoperative pain, swelling, and trismus more than diclofenac following third molar removal: a randomized controlled clinical trial. Oral and Maxillofacial Surgery, 21(3), 321-326.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14531	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		821355 - JULIANA CAMPOS LADEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Luto, Morte e Cuidados Paliativos: Uma Análise Psicológica dos Últimos Cinco Anos			
<b>INTRODUCAO</b>	O luto e um processo natural e inevitável na vida de todos os seres humanos. Neste estudo o que entendemos por luto e a resposta emocional que ocorre frente a perda de algo, podendo ser um ente querido, um relacionamento ou mesmo parte da nossa identidade. Ao longo da vida passamos por muitos processos de luto. O luto e caracterizado por uma multiplicidade de emoções, sendo algumas das principais a tristeza, raiva, confusão e ansiedade, emoções essas que são intensas e complexas, muitas vezes são difíceis de compreender e processar, a intensidade e duração dessa resposta e subjetiva para cada indivíduo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo Geral Investigar a evolução da abordagem psicológica em relação ao luto, à morte e aos cuidados paliativos nos últimos cinco anos, com o objetivo de compreender as tendências, os desafios e as implicações para a prática clínica e o suporte emocional. Objetivos específicos Realizar uma revisão sistemática da literatura acadêmica e clínica relacionada ao luto, morte e cuidados paliativos publicada nos últimos cinco anos. Identificar as principais teorias psicológicas que têm influenciado a compreensão do luto e da morte nesse período. Analisar como as abordagens terapêuticas em psicologia evoluíram para atender às necessidades dos pacientes em cuidados paliativos e suas famílias. Avaliar a influência das redes sociais e da tecnologia na expressão do luto e no suporte emocional em casos de perda. Investigar os desafios éticos e práticos enfrentados por psicólogos que trabalham com pacientes em fim de vida e suas famílias. Propor recomendações práticas para psicólogos e profissionais de saúde mental que lidam com questões de luto, morte e cuidados paliativos, com base nas tendências identificadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão integrativa da literatura com a finalidade de acessar à evidência científica sobre o assunto. A revisão para o artigo teve um recorte temporal de 5 anos, no período de janeiro de 2018 a agosto de 2023 (pesquisa realizada em setembro de 2023),			
<b>RESULTADOS</b>	O psicólogo é fundamental no processo de enfrentamento do luto para apoiar indivíduos que estão passando por esse processo complexo de perda, oferecendo suporte emocional, intervenção terapêutica e educação para ajudar os enlutados a passar por esse processo desafiador. Ajudando os indivíduos a encontrar maneiras saudáveis de lidar com a perda, reconstruir o significado em suas vidas e, eventualmente, seguir em frente com a memória de seus entes queridos. Desempenhando um papel crucial também na prevenção e no tratamento de complicações psicológicas decorrentes do luto, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão ou ansiedade prolongada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se concluir que, o luto é um processo multifacetado que envolve fatores emocionais, culturais, psicológicos e sociais. Diferentes abordagens, como a psicanálise e a abordagem de terapia cognitiva comportamental, oferecem insights valiosos para entender e lidar com o luto, mas é necessário considerar o contexto cultural e social de cada indivíduo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Grief: The Epidemic Within an Epidemic Petry SE, Hughes D, Galanos A. Grief: The Epidemic Within an Epidemic. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2021;38(4):419-422. doi:10.1177/1049909120978796 Fear of Death and Death Acceptance Among Bereaved Adults: Associations With Prolonged Grief Gegieckaite, G., (#38) Kazlauskas, E. (2022). OMEGA - Journal of Death and Dying, 84(3), 884-898. https://doi.org/10.1177/0030222820921045 Death Cafés: Where Communities Affirm Grief Michelle Chang, 2021: American Journal of Public Health 111, S82_S83, https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306379			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14531	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3804615 - EDUARDA ALVES JEREMIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Luto, Morte e Cuidados Paliativos: Uma Análise Psicológica dos Últimos Cinco Anos			
<b>INTRODUCA O</b>	O luto e um processo natural e inevitável na vida de todos os seres humanos. Neste estudo o que entendemos por luto e a resposta emocional que ocorre frente a perda de algo, podendo ser um ente querido, um relacionamento ou mesmo parte da nossa identidade. Ao longo da vida passamos por muitos processos de luto. O luto e caracterizado por uma multiplicidade de emoções, sendo algumas das principais a tristeza, raiva, confusão e ansiedade, emoções essas que são intensas e complexas, muitas vezes são difíceis de compreender e processar, a intensidade e duração dessa resposta e subjetiva para cada indivíduo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo Geral Investigar a evolução da abordagem psicológica em relação ao luto, à morte e aos cuidados paliativos nos últimos cinco anos, com o objetivo de compreender as tendências, os desafios e as implicações para a prática clínica e o suporte emocional. Objetivos específicos Realizar uma revisão sistemática da literatura acadêmica e clínica relacionada ao luto, morte e cuidados paliativos publicada nos últimos cinco anos. Identificar as principais teorias psicológicas que têm influenciado a compreensão do luto e da morte nesse período. Analisar como as abordagens terapêuticas em psicologia evoluíram para atender às necessidades dos pacientes em cuidados paliativos e suas famílias. Avaliar a influência das redes sociais e da tecnologia na expressão do luto e no suporte emocional em casos de perda. Investigar os desafios éticos e práticos enfrentados por psicólogos que trabalham com pacientes em fim de vida e suas famílias. Propor recomendações práticas para psicólogos e profissionais de saúde mental que lidam com questões de luto, morte e cuidados paliativos, com base nas tendências identificadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão integrativa da literatura com a finalidade de acessar à evidência científica sobre o assunto. A revisão para o artigo teve um recorte temporal de 5 anos, no período de janeiro de 2018 a agosto de 2023 (pesquisa realizada em setembro de 2023),			
<b>RESULTADO S</b>	O psicólogo é fundamental no processo de enfrentamento do luto para apoiar indivíduos que estão passando por esse processo complexo de perda, oferecendo suporte emocional, intervenção terapêutica e educação para ajudar os enlutados a passar por esse processo desafiador. Ajudando os indivíduos a encontrar maneiras saudáveis de lidar com a perda, reconstruir o significado em suas vidas e, eventualmente, seguir em frente com a memória de seus entes queridos. Desempenhando um papel crucial também na prevenção e no tratamento de complicações psicológicas decorrentes do luto, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão ou ansiedade prolongada.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Pode-se concluir que, o luto é um processo multifacetado que envolve fatores emocionais, culturais, psicológicos e sociais. Diferentes abordagens, como a psicanálise e a abordagem de terapia cognitiva comportamental, oferecem insights valiosos para entender e lidar com o luto, mas é necessário considerar o contexto cultural e social de cada indivíduo.			
<b>REFERENCIA S</b>	Grief: The Epidemic Within an Epidemic Petry SE, Hughes D, Galanos A. Grief: The Epidemic Within an Epidemic. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2021;38(4):419-422. doi:10.1177/1049909120978796 Fear of Death and Death Acceptance Among Bereaved Adults: Associations With Prolonged Grief Gegieckaite, G., (#38) Kazlauskas, E. (2022). OMEGA - Journal of Death and Dying, 84(3), 884-898. https://doi.org/10.1177/0030222820921045 Death Cafés: Where Communities Affirm Grief Michelle Chang, 2021: American Journal of Public Health 111, S82_S83, https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306379			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14531	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4035615 - MARIA HELENA RODRIGUES NEVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Luto, Morte e Cuidados Paliativos: Uma Análise Psicológica dos Últimos Cinco Anos			
<b>INTRODUCA O</b>	O luto e um processo natural e inevitável na vida de todos os seres humanos. Neste estudo o que entendemos por luto e a resposta emocional que ocorre frente a perda de algo, podendo ser um ente querido, um relacionamento ou mesmo parte da nossa identidade. Ao longo da vida passamos por muitos processos de luto. O luto e caracterizado por uma multiplicidade de emoções, sendo algumas das principais a tristeza, raiva, confusão e ansiedade, emoções essas que são intensas e complexas, muitas vezes são difíceis de compreender e processar, a intensidade e duração dessa resposta e subjetiva para cada indivíduo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo Geral Investigar a evolução da abordagem psicológica em relação ao luto, à morte e aos cuidados paliativos nos últimos cinco anos, com o objetivo de compreender as tendências, os desafios e as implicações para a prática clínica e o suporte emocional. Objetivos específicos Realizar uma revisão sistemática da literatura acadêmica e clínica relacionada ao luto, morte e cuidados paliativos publicada nos últimos cinco anos. Identificar as principais teorias psicológicas que têm influenciado a compreensão do luto e da morte nesse período. Analisar como as abordagens terapêuticas em psicologia evoluíram para atender às necessidades dos pacientes em cuidados paliativos e suas famílias. Avaliar a influência das redes sociais e da tecnologia na expressão do luto e no suporte emocional em casos de perda. Investigar os desafios éticos e práticos enfrentados por psicólogos que trabalham com pacientes em fim de vida e suas famílias. Propor recomendações práticas para psicólogos e profissionais de saúde mental que lidam com questões de luto, morte e cuidados paliativos, com base nas tendências identificadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão integrativa da literatura com a finalidade de acessar à evidência científica sobre o assunto. A revisão para o artigo teve um recorte temporal de 5 anos, no período de janeiro de 2018 a agosto de 2023 (pesquisa realizada em setembro de 2023),			
<b>RESULTADO S</b>	O psicólogo é fundamental no processo de enfrentamento do luto para apoiar indivíduos que estão passando por esse processo complexo de perda, oferecendo suporte emocional, intervenção terapêutica e educação para ajudar os enlutados a passar por esse processo desafiador. Ajudando os indivíduos a encontrar maneiras saudáveis de lidar com a perda, reconstruir o significado em suas vidas e, eventualmente, seguir em frente com a memória de seus entes queridos. Desempenhando um papel crucial também na prevenção e no tratamento de complicações psicológicas decorrentes do luto, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão ou ansiedade prolongada.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Pode-se concluir que, o luto é um processo multifacetado que envolve fatores emocionais, culturais, psicológicos e sociais. Diferentes abordagens, como a psicanálise e a abordagem de terapia cognitiva comportamental, oferecem insights valiosos para entender e lidar com o luto, mas é necessário considerar o contexto cultural e social de cada indivíduo.			
<b>REFERENCIA S</b>	Grief: The Epidemic Within an Epidemic Petry SE, Hughes D, Galanos A. Grief: The Epidemic Within an Epidemic. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2021;38(4):419-422. doi:10.1177/1049909120978796 Fear of Death and Death Acceptance Among Bereaved Adults: Associations With Prolonged Grief Gegieckaite, G., (#38) Kazlauskas, E. (2022). OMEGA - Journal of Death and Dying, 84(3), 884-898. https://doi.org/10.1177/0030222820921045 Death Cafés: Where Communities Affirm Grief Michelle Chang, 2021: American Journal of Public Health 111, S82_S83, https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306379			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14531	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4094646 - JULIA CAMPOS PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Luto, Morte e Cuidados Paliativos: Uma Análise Psicológica dos Últimos Cinco Anos			
<b>INTRODUCAO</b>	O luto e um processo natural e inevitável na vida de todos os seres humanos. Neste estudo o que entendemos por luto e a resposta emocional que ocorre frente a perda de algo, podendo ser um ente querido, um relacionamento ou mesmo parte da nossa identidade. Ao longo da vida passamos por muitos processos de luto. O luto e caracterizado por uma multiplicidade de emoções, sendo algumas das principais a tristeza, raiva, confusão e ansiedade, emoções essas que são intensas e complexas, muitas vezes são difíceis de compreender e processar, a intensidade e duração dessa resposta e subjetiva para cada indivíduo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo Geral Investigar a evolução da abordagem psicológica em relação ao luto, à morte e aos cuidados paliativos nos últimos cinco anos, com o objetivo de compreender as tendências, os desafios e as implicações para a prática clínica e o suporte emocional. Objetivos específicos Realizar uma revisão sistemática da literatura acadêmica e clínica relacionada ao luto, morte e cuidados paliativos publicada nos últimos cinco anos. Identificar as principais teorias psicológicas que têm influenciado a compreensão do luto e da morte nesse período. Analisar como as abordagens terapêuticas em psicologia evoluíram para atender às necessidades dos pacientes em cuidados paliativos e suas famílias. Avaliar a influência das redes sociais e da tecnologia na expressão do luto e no suporte emocional em casos de perda. Investigar os desafios éticos e práticos enfrentados por psicólogos que trabalham com pacientes em fim de vida e suas famílias. Propor recomendações práticas para psicólogos e profissionais de saúde mental que lidam com questões de luto, morte e cuidados paliativos, com base nas tendências identificadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão integrativa da literatura com a finalidade de acessar à evidência científica sobre o assunto. A revisão para o artigo teve um recorte temporal de 5 anos, no período de janeiro de 2018 a agosto de 2023 (pesquisa realizada em setembro de 2023),			
<b>RESULTADOS</b>	O psicólogo é fundamental no processo de enfrentamento do luto para apoiar indivíduos que estão passando por esse processo complexo de perda, oferecendo suporte emocional, intervenção terapêutica e educação para ajudar os enlutados a passar por esse processo desafiador. Ajudando os indivíduos a encontrar maneiras saudáveis de lidar com a perda, reconstruir o significado em suas vidas e, eventualmente, seguir em frente com a memória de seus entes queridos. Desempenhando um papel crucial também na prevenção e no tratamento de complicações psicológicas decorrentes do luto, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão ou ansiedade prolongada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se concluir que, o luto é um processo multifacetado que envolve fatores emocionais, culturais, psicológicos e sociais. Diferentes abordagens, como a psicanálise e a abordagem de terapia cognitiva comportamental, oferecem insights valiosos para entender e lidar com o luto, mas é necessário considerar o contexto cultural e social de cada indivíduo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Grief: The Epidemic Within an Epidemic Petry SE, Hughes D, Galanos A. Grief: The Epidemic Within an Epidemic. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2021;38(4):419-422. doi:10.1177/1049909120978796 Fear of Death and Death Acceptance Among Bereaved Adults: Associations With Prolonged Grief Gegieckaite, G., (#38) Kazlauskas, E. (2022). OMEGA - Journal of Death and Dying, 84(3), 884-898. https://doi.org/10.1177/0030222820921045 Death Cafés: Where Communities Affirm Grief Michelle Chang, 2021: American Journal of Public Health 111, S82_S83, https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306379			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14534	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4028104 - MAELI DE ARAUJO ROSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	A importância do trabalho da equipe multidisciplinar com pacientes na fila da cirurgia bariátrica.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>função do psicólogo na equipe multidisciplinar é justamente a de auxiliar o processo de adaptação do paciente no contexto de hospitalização e enfrentamento do adoecimento, sempre colocando como prioridade as vontades e desejos do paciente. (Silva, AHC. O discurso do analista como possibilidade da Psicanálise Aplicada no hospital. Rev. SBPH, 2017, 20). A nutrição comportamental surge com esse novo olhar, que aborda diversos aspectos relacionados ao comportamento alimentar por meio de várias estratégias (SILVA; MARTINS, 2017). A relação dos indivíduos com a alimentação, tem ido para além da nutrição. Podemos dizer, que a relação entre indivíduo e comida, tem ligação direta com estados emocionais afetivos e é neste ponto que encaixamos uma equipe multidisciplinar. (Martins. C. (#38) Miyazaki. E. 2015). Nunes, Santos e Souza (2017) definem os transtornos de comportamento alimentar, como um padrão consume e atitude em relação ao alimento de forma distorcida, agregando também a uma preocupação exacerbada com a autoimagem e a forma corporal.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar a atuação do Psicólogo e da Equipe Multidisciplinar com os Pacientes em Fila de Espera para Cirurgias Bariátricas. Avaliar as Psicopatologias associadas ao Transtorno Alimentar e o manejo do Psicólogo			
<b>METODOLOGIA</b>	Segundo Severino (2018), a pesquisa bibliográfica pode ser realizada por meio de diversos suportes, tais como: livros, artigos, teses, jornais revistas, fotos, filmes entre outros. Este trabalho será baseado em revisão bibliográfica de livros publicados por editoras brasileiras e artigos publicados em bases de dados do Google Acadêmico, Scielo. O método de análise deste projeto será qualitativo, e sua revisão será integrativa, partindo de pesquisas já existentes. Contando com publicações de 2018 a 2023. O descritor usado será DeCS. As palavras chaves para busca foram psicanalise, cirurgia bariátrica, transtornos alimentares, psicologia hospitalar. O projeto revisará obras publicadas na língua Portuguesa e Inglesa, focará nos transtornos alimentares e pacientes na fila da cirurgia bariátrica.			
<b>RESULTADO S</b>	Para um tratamento eficaz é necessário não somente uma equipe nutricional que acompanhe esse processo, mas também uma equipe psicológica a fim de auxiliar essa mudança comportamental e com ambos os profissionais, manejar um plano alimentar, prática educativa, reeducação psicológica e nutricional. O transtorno alimentar vem associado com outras psicopatologias .			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os pacientes bariátricos devem ser abordados sob o amplo aspecto da pessoa, de forma que seja possível atuar nas mais diversas áreas do quadro do paciente sob a ótica da nutrição, do psicológico e do paciente. É de suma importância a participação do psicólogo antes, durante e depois do procedimento bariátrico, a fim de acompanhar a adesão do paciente ao tratamento.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>Martins. C. (#38) Miyazaki. E. (2015) A presença do Psicólogo na equipe Multidisciplinar e a ansiedade pós-cirurgia bariátrica SILVA, Alice Borges Humildes Cruz da. O discurso do analista como possibilidade da Psicanálise Aplicada no hospital. (#38)#8239; Rev. SBPH, (#38)#8239; Rio de Janeiro . (#38)#8239; v. 20. (#38)#8239; n. 2. (#38)#8239; p. 166-187. (#38)#8239; dez. (#38)#8239; 2017 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php? script=sci_arttext(#38)pid=S1516-08582017000200011(#38)lng=pt(#38)nlm=iso(#62). acessos em (#38)#8239; 04(#38)#8239; out. (#38)#8239; 2023. AIDAR, M. DE O. I. et al.. Fatores Associados à Suscetibilidade para o Desenvolvimento de Transtornos Alimentares em Estudantes Internos de um Curso de Medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 3, p. e097, 2020.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14534	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4032969 - VICTORIA LOPES FREITAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	A importância do trabalho da equipe multidisciplinar com pacientes na fila da cirurgia bariátrica.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>função do psicólogo na equipe multidisciplinar é justamente a de auxiliar o processo de adaptação do paciente no contexto de hospitalização e enfrentamento do adoecimento, sempre colocando como prioridade as vontades e desejos do paciente. (Silva, AHC. O discurso do analista como possibilidade da Psicanálise Aplicada no hospital. Rev. SBPH, 2017, 20). A nutrição comportamental surge com esse novo olhar, que aborda diversos aspectos relacionados ao comportamento alimentar por meio de várias estratégias (SILVA; MARTINS, 2017). A relação dos indivíduos com a alimentação, tem ido para além da nutrição. Podemos dizer, que a relação entre indivíduo e comida, tem ligação direta com estados emocionais afetivos e é neste ponto que encaixamos uma equipe multidisciplinar. (Martins. C. (#38) Miyazaki. E. 2015). Nunes, Santos e Souza (2017) definem os transtornos de comportamento alimentar, como um padrão consume e atitude em relação ao alimento de forma distorcida, agregando também a uma preocupação exacerbada com a autoimagem e a forma corporal.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar a atuação do Psicólogo e da Equipe Multidisciplinar com os Pacientes em Fila de Espera para Cirurgias Bariátricas. Avaliar as Psicopatologias associadas ao Transtorno Alimentar e o manejo do Psicólogo			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Segundo Severino (2018), a pesquisa bibliográfica pode ser realizada por meio de diversos suportes, tais como: livros, artigos, teses, jornais revistas, fotos, filmes entre outros. Este trabalho será baseado em revisão bibliográfica de livros publicados por editoras brasileiras e artigos publicados em bases de dados do Google Acadêmico, Scielo. O método de análise deste projeto será qualitativo, e sua revisão será integrativa, partindo de pesquisas já existentes. Contando com publicações de 2018 a 2023. O descritor usado será DeCS. As palavras chaves para busca foram psicanalise, cirurgia bariátrica, transtornos alimentares, psicologia hospitalar. O projeto revisará obras publicadas na língua Portuguesa e Inglesa, focará nos transtornos alimentares e pacientes na fila da cirurgia bariátrica.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Para um tratamento eficaz é necessário não somente uma equipe nutricional que acompanhe esse processo, mas também uma equipe psicológica a fim de auxiliar essa mudança comportamental e com ambos os profissionais, manejar um plano alimentar, prática educativa, reeducação psicológica e nutricional. O transtorno alimentar vem associado com outras psicopatologias .			
<b>CONCLUSOES</b>	Os pacientes bariátricos devem ser abordados sob o amplo aspecto da pessoa, de forma que seja possível atuar nas mais diversas áreas do quadro do paciente sob a ótica da nutrição, do psicológico e do paciente. É de suma importância a participação do psicólogo antes, durante e depois do procedimento bariátrico, a fim de acompanhar a adesão do paciente ao tratamento.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Martins. C. (#38) Miyazaki. E. (2015) A presença do Psicólogo na equipe Multidisciplinar e a ansiedade pós-cirurgia bariátrica SILVA, Alice Borges Humildes Cruz da. O discurso do analista como possibilidade da Psicanálise Aplicada no hospital. (#38)#8239; Rev. SBPH, (#38)#8239; Rio de Janeiro . (#38)#8239; v. 20. (#38)#8239; n. 2. (#38)#8239; p. 166-187. (#38)#8239; dez. (#38)#8239; 2017 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php? script=sci_arttext(#38)pid=S1516-08582017000200011(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em (#38)#8239; 04(#38)#8239; out. (#38)#8239; 2023. AIDAR, M. DE O. I. et al.. Fatores Associados à Suscetibilidade para o Desenvolvimento de Transtornos Alimentares em Estudantes Internos de um Curso de Medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 3, p. e097, 2020.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14534	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4071859 - GUILHERME APARECIDO FONTELES DE RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	A importância do trabalho da equipe multidisciplinar com pacientes na fila da cirurgia bariátrica.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>função do psicólogo na equipe multidisciplinar é justamente a de auxiliar o processo de adaptação do paciente no contexto de hospitalização e enfrentamento do adoecimento, sempre colocando como prioridade as vontades e desejos do paciente. (Silva, AHC. O discurso do analista como possibilidade da Psicanálise Aplicada no hospital. Rev. SBPH, 2017, 20). A nutrição comportamental surge com esse novo olhar, que aborda diversos aspectos relacionados ao comportamento alimentar por meio de várias estratégias (SILVA; MARTINS, 2017). A relação dos indivíduos com a alimentação, tem ido para além da nutrição. Podemos dizer, que a relação entre indivíduo e comida, tem ligação direta com estados emocionais afetivos e é neste ponto que encaixamos uma equipe multidisciplinar. (Martins. C. (#38) Miyazaki. E. 2015). Nunes, Santos e Souza (2017) definem os transtornos de comportamento alimentar, como um padrão consume e atitude em relação ao alimento de forma distorcida, agregando também a uma preocupação exacerbada com a autoimagem e a forma corporal.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar a atuação do Psicólogo e da Equipe Multidisciplinar com os Pacientes em Fila de Espera para Cirurgias Bariátricas. Avaliar as Psicopatologias associadas ao Transtorno Alimentar e o manejo do Psicólogo			
<b>METODOLOGIA</b>	Segundo Severino (2018), a pesquisa bibliográfica pode ser realizada por meio de diversos suportes, tais como: livros, artigos, teses, jornais revistas, fotos, filmes entre outros. Este trabalho será baseado em revisão bibliográfica de livros publicados por editoras brasileiras e artigos publicados em bases de dados do Google Acadêmico, Scielo. O método de análise deste projeto será qualitativo, e sua revisão será integrativa, partindo de pesquisas já existentes. Contando com publicações de 2018 a 2023. O descritor usado será DeCS. As palavras chaves para busca foram psicanalise, cirurgia bariátrica, transtornos alimentares, psicologia hospitalar. O projeto revisará obras publicadas na língua Portuguesa e Inglesa, focará nos transtornos alimentares e pacientes na fila da cirurgia bariátrica.			
<b>RESULTADOS</b>	Para um tratamento eficaz é necessário não somente uma equipe nutricional que acompanhe esse processo, mas também uma equipe psicológica a fim de auxiliar essa mudança comportamental e com ambos os profissionais, manejar um plano alimentar, prática educativa, reeducação psicológica e nutricional. O transtorno alimentar vem associado com outras psicopatologias .			
<b>CONCLUSOES</b>	Os pacientes bariátricos devem ser abordados sob o amplo aspecto da pessoa, de forma que seja possível atuar nas mais diversas áreas do quadro do paciente sob a ótica da nutrição, do psicológico e do paciente. É de suma importância a participação do psicólogo antes, durante e depois do procedimento bariátrico, a fim de acompanhar a adesão do paciente ao tratamento.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Martins. C. (#38) Miyazaki. E. (2015) A presença do Psicólogo na equipe Multidisciplinar e a ansiedade pós-cirurgia bariátrica SILVA, Alice Borges Humildes Cruz da. O discurso do analista como possibilidade da Psicanálise Aplicada no hospital. (#38)#8239; Rev. SBPH, (#38)#8239; Rio de Janeiro . (#38)#8239; v. 20. (#38)#8239; n. 2. (#38)#8239; p. 166-187. (#38)#8239; dez. (#38)#8239; 2017 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php? script=sci_arttext(#38)pid=S1516-08582017000200011(#38)lng=pt(#38)nlm=iso(#62). acessos em (#38)#8239; 04(#38)#8239; out. (#38)#8239; 2023. AIDAR, M. DE O. I. et al.. Fatores Associados à Suscetibilidade para o Desenvolvimento de Transtornos Alimentares em Estudantes Internos de um Curso de Medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 3, p. e097, 2020.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14535	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128579 - LUKA DE SOUZA OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvio Gabriel Serrano Nunes		
<b>TITULO</b>	A RECEPÇÃO DA LITERATURA RUSSA NA ERA VARGAS (1930-1945)			
<b>INTRODUCAO</b>	Este trabalho visa tratar da questão da recepção da literatura russa no Brasil entre os anos de 1930 a 1945, sob o governo de Getúlio Vargas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Para a execução deste trabalho de pesquisa, temos como objetivo, delimitar a conjuntura política da Era Vargas e sua relação com a literatura russa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa utilizada foi de análise de conteúdo, com base na historiografia do corpus selecionado, isto é, "Dostoiévski na rua do ouvidor" e "Da Estepe à Caatinga: o Romance russo no Brasil (1887-1936)" do pesquisador Bruno Barreto Gomide.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir do livro de Gomide, nota-se que entre os anos de 1930-1945, a literatura russa no Brasil se tornou febre entre a crítica literária e os intelectuais acadêmicos, todos que estavam engajados na literatura e no cenário cultural brasileiro buscaram fazer um ensaio sobre a literatura russa, a tradução - ainda que indireta - de um autor russo. Os resultados apontam que Lênin e Dostoiévski foram os autores mais traduzidos e lidos na época, sobretudo o livro "Crime e Castigo" que se tornou um dos livros mais lidos. Outro importante acontecimento literário para a recepção da literatura russa no Brasil foi a coleção de obras de Dostoiévski, publicada pela editora Jose Olympio, que proporcionou a divulgação e identificação entre a identidade russa, com a identidade cultural, política, social e ideológica com a literatura brasileira.			
<b>CONCLUSOES</b>	Por isso, compreendemos que a partir dos problemas da conjuntura política da Era Vargas, conhecemos os aspectos culturais da crítica literária brasileira e como o momento político fomentou a recepção da literatura russa no Brasil.			
<b>REFERENCIAS</b>	GOMIDE, B. Antologia do pensamento crítico russo. São Paulo: Editora 34, 2013 GOMIDE, B. Da Estepe à Caatinga: o Romance russo no Brasil (1887-1936). São Paulo: EDUSP, 2011 GOMIDE, B. Dostoiévski na rua do ouvidor. São Paulo: EDUSP, 201			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14540	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4894014 - SANDRO MORET BRAIT SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvio Gabriel Serrano Nunes		
<b>TITULO</b>	DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA E SEUS ÓRGÃOS DE REPRESSÃO: O DOI-Codi			
<b>INTRODUCAO</b>	Com a instalação da ditadura civil-militar no Brasil por ocasião do golpe de Estado de 1964, o governo estabelecido utilizou os instrumentos jurídicos para a um só tempo legitimar o regime ditatorial no poder e implementar políticas públicas voltadas para área da Segurança Nacional. Inspirado em doutrinas contrarrevolucionárias estrangeiras o trinômio censura, vigilância e repressão passaram a ser base do governo civil-militar que instituiu mecanismos como o Codi- DOI cuja atuação era marcada por atos de terrorismo que envolviam desaparecimento forçado, tortura, morte e ocultação de corpos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar na descrição da rotina de atuação desses dois órgãos repressivos (Codi: monitoramento e DOI: repressão) sua condição de dispositivos desaparecedores e seu caráter como modelo da política nacional repressiva delineada pela ditadura militar brasileira.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa está apoiada no repertório teórico de caráter bibliográfico e documental para fundamentar qualitativamente o trabalho especialmente sob a perspectiva dos estudos de Marcelo Godoy em sua obra "A CASA DA VOVÓ: Uma biografia do DOI-CODI (1969-1991), o centro de sequestro, tortura e morte da ditadura militar" e diálogos com outros autores que abordam a temática.			
<b>RESULTADOS</b>	Para implementar o Estado policial, a ditadura militar brasileira, instituiu modelos executores que foram criados ou substituídos na medida das circunstâncias; nesse sentido a Operação Bandeirantes voltada para coibir o acesso a ativos financeiros utilizados para fortalecer grupamentos armados contrários ao regime, cedeu lugar para os Destacamentos de Operações de Informação (DOI) mais voltados para os atos executórios e que por sua vez eram subordinados aos Centros de Operações de Defesa Interna (Codi), mais ligados aos atos de investigação. Os Codi-DOI ou DOI-Codi (como eram mais conhecidos) foram estruturas concebidas para aniquilar o inimigo tendo o interrogatório como sua especialidade. Atos considerados subversivos eram duramente combatidos com métodos envolvendo torturas (físicas e psicológicas), execução em custódia, simulação de confronto e desaparecimentos; o terror praticado pelos agentes consistia em eficiência do trabalho livres de questões morais. A estrutura de subdivisão das tarefas aos agentes do DOI-Codi, que tinha composição mista de agentes públicos, refletia a cadeia geral de comando do regime militar: ao Exército cabia a inteligência, a Polícia Civil o interrogatório e a Polícia Militar as prisões.			
<b>CONCLUSOES</b>	Que os DOI-Codi foram dispositivos desaparecedores oferecendo a cada momento histórico uma resposta a uma necessidade de urgência e a exemplo do resultado das ações desse mortal aparelho repressivo no dia 04/09/1990 no Cemitério de Perus foi descoberta uma vala clandestina de onde foram retirados mais de mil sacos contendo ossadas humanas. A participação dos DOI-Codi cumpria a função de dispositivo desaparecedor marcado por ciclos que acompanhavam o perfil dos responsáveis pelo destacamento e fiel representação da política nacional repressiva da ditadura civil-militar brasileira.			
<b>REFERENCIAS</b>	BONNET, Gabriel. Guerras insurrecionais e revolucionárias. Rio de Janeiro: Bibliex, 1963. GODOY, Marcelo. A casa da vovó: uma biografia do doi-codi (1969-1991), o centro de sequestro, tortura e morte da ditadura militar. São Paulo: Alameda, 2014. MEMÓRIAS DA DITADURA (Org.). Repressão: O modelo repressivo e suas inspirações, 2014. Disponível em: <a href="https://memoriasdaditadura.org.br/repressao/">https://memoriasdaditadura.org.br/repressao/</a> . Acesso em 28 dez. 2022			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14542	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Andressa de Fatima Kotteski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE BLOQUEIO BILATERAL DO NERVO PUDENDO PARA POSTECTOMIA PARCIAL EM EQUINO - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O par de nervos pudendo tem sua origem nos segmentos S2 a S4 dos nervos sacrais ventrais. Este nervo possui função somática e divide-se em ramos que se estendem para a região perineal e dorsal do pênis. Além disso, terminações são identificadas tanto na glândula peniana quanto na lâmina interna do prepúcio. O bloqueio bilateral do nervo pudendo é um procedimento de anestesia locorregional que envolve a aplicação de anestésico local na região perineural, proporcionando analgesia e exteriorização do pênis.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso no qual foi realizado o bloqueio do nervo pudendo em um equino, com a finalidade de proporcionar exposição peniana adequada e analgesia durante o procedimento de postectomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um equino, macho, castrado, SRD, pesando 330 kg com 25 anos, deu entrada no Hovet com queixa principal de uma formação na região de prepúcio. Após a realização da biópsia incisional obteve o diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas. Optou-se por realizar uma postectomia parcial para retirada da massa neoplásica. O paciente foi sedado com xilazina (0,5 mg/kg) administrado IV e, logo em seguida, submetido ao bloqueio bilateral do nervo pudendo, com lidocaína 2%. Foi usado o mandril de um cateter de calibre 14G para injetar 10 ml do anestésico local. A aplicação foi feita em ambos os lados, inserindo 2/3 do mandril na região ventrolateral do esfíncter anal externo, utilizando como referência a topografia da tuberosidade do isquio e do músculo semimembranoso. Em seguida o paciente foi induzido e mantido com cetamina (2,2 mg/kg), diazepam (0,05 mg/kg) e éter glicélico guaiacol (EGG) (50 mg/kg/h), e posicionado em decúbito lateral direito, dando início ao procedimento cirúrgico 15 minutos após o bloqueio.			
<b>RESULTADOS</b>	Cinco minutos após a execução do bloqueio do nervo pudendo, houve a exposição do pênis e perda de sensibilidade ao toque na região. Durante o procedimento a infusão de EGG foi administrada durante 45 minutos e a de xilazina e cetamina por 55 minutos. Os parâmetros vitais se mantiveram estáveis durante toda cirurgia, não havendo necessidade de suplementação anestésica e analgésica. Durante a recuperação anestésica, o paciente manteve o pênis exposto por aproximadamente duas horas, sendo realizado a retração peniana manual. É relevante mencionar que equinos machos submetidos ao bloqueio do pudendo mantiveram o pênis exposto por até cinco horas após o bloqueio. Vale ressaltar que o paciente é de idade avançada e a aplicação do bloqueio possibilitou um menor requerimento de anestésicos, otimizando a recuperação do paciente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A técnica de bloqueio do nervo pudendo foi eficiente para a realização do procedimento de postectomia possibilitando a exteriorização do pênis, analgesia e maior segurança ao paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	GALLACHER, K. et al. Development of a peripheral nerve stimulator-guided technique for equine pudendal nerve blockade. The Veterinary Journal, [S. l.], ano 217, p. 72-77, 5 out. 2016. SCHUMACHER, J.; BRATTON, G. R.; WILLIAMS, J. W. Pudendal and caudal rectal nerve blocks in the horse- An anesthetic procedure for reproductive surgery. Theriogenology, v. 24, n. 4, p. 457-464, October, 1985.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14542	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4696816 - JOAO CARLOS MOREIRA DIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Andressa de Fatima Koteski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE BLOQUEIO BILATERAL DO NERVO PUDENDO PARA POSTECTOMIA PARCIAL EM EQUINO - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O par de nervos pudendo tem sua origem nos segmentos S2 a S4 dos nervos sacrais ventrais. Este nervo possui função somática e divide-se em ramos que se estendem para a região perineal e dorsal do pênis. Além disso, terminações são identificadas tanto na glândula peniana quanto na lâmina interna do prepúcio. O bloqueio bilateral do nervo pudendo é um procedimento de anestesia locorregional que envolve a aplicação de anestésico local na região perineural, proporcionando analgesia e exteriorização do pênis.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso no qual foi realizado o bloqueio do nervo pudendo em um equino, com a finalidade de proporcionar exposição peniana adequada e analgesia durante o procedimento de postectomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um equino, macho, castrado, SRD, pesando 330 kg com 25 anos, deu entrada no Hovet com queixa principal de uma formação na região de prepúcio. Após a realização da biópsia incisional obteve o diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas. Optou-se por realizar uma postectomia parcial para retirada da massa neoplásica. O paciente foi sedado com xilazina (0,5 mg/kg) administrado IV e, logo em seguida, submetido ao bloqueio bilateral do nervo pudendo, com lidocaína 2%. Foi usado o mandril de um cateter de calibre 14G para injetar 10 ml do anestésico local. A aplicação foi feita em ambos os lados, inserindo 2/3 do mandril na região ventrolateral do esfíncter anal externo, utilizando como referência a topografia da tuberosidade do isquão e do músculo semimembranoso. Em seguida o paciente foi induzido e mantido com cetamina (2,2 mg/kg), diazepam (0,05 mg/kg) e éter glicérol guaiacol (EGG) (50 mg/kg/h), e posicionado em decúbito lateral direito, dando início ao procedimento cirúrgico 15 minutos após o bloqueio.			
<b>RESULTADOS</b>	Cinco minutos após a execução do bloqueio do nervo pudendo, houve a exposição do pênis e perda de sensibilidade ao toque na região. Durante o procedimento a infusão de EGG foi administrada durante 45 minutos e a de xilazina e cetamina por 55 minutos. Os parâmetros vitais se mantiveram estáveis durante toda a cirurgia, não havendo necessidade de suplementação anestésica e analgésica. Durante a recuperação anestésica, o paciente manteve o pênis exposto por aproximadamente duas horas, sendo realizado a retração peniana manual. É relevante mencionar que equinos machos submetidos ao bloqueio do pudendo mantiveram o pênis exposto por até cinco horas após o bloqueio. Vale ressaltar que o paciente é de idade avançada e a aplicação do bloqueio possibilitou um menor requerimento de anestésicos, otimizando a recuperação do paciente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A técnica de bloqueio do nervo pudendo foi eficiente para a realização do procedimento de postectomia possibilitando a exteriorização do pênis, analgesia e maior segurança ao paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	GALLACHER, K. et al. Development of a peripheral nerve stimulator-guided technique for equine pudendal nerve blockade. The Veterinary Journal, [S. l.], ano 217, p. 72-77, 5 out. 2016. SCHUMACHER, J.; BRATTON, G. R.; WILLIAMS, J. W. Pudendal and caudal rectal nerve blocks in the horse- An anesthetic procedure for reproductive surgery. Theriogenology, v. 24, n. 4, p. 457-464, October. 1985.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14542	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4714814 - MAYARA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE BLOQUEIO BILATERAL DO NERVO PUDENDO PARA POSTECTOMIA PARCIAL EM EQUINO - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O par de nervos pudendo tem sua origem nos segmentos S2 a S4 dos nervos sacrais ventrais. Este nervo possui função somática e divide-se em ramos que se estendem para a região perineal e dorsal do pênis. Além disso, terminações são identificadas tanto na glândula peniana quanto na lâmina interna do prepúcio. O bloqueio bilateral do nervo pudendo é um procedimento de anestesia locorregional que envolve a aplicação de anestésico local na região perineural, proporcionando analgesia e exteriorização do pênis.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso no qual foi realizado o bloqueio do nervo pudendo em um equino, com a finalidade de proporcionar exposição peniana adequada e analgesia durante o procedimento de postectomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um equino, macho, castrado, SRD, pesando 330 kg com 25 anos, deu entrada no Hovet com queixa principal de uma formação na região de prepúcio. Após a realização da biópsia incisional obteve o diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas. Optou-se por realizar uma postectomia parcial para retirada da massa neoplásica. O paciente foi sedado com xilazina (0,5 mg/kg) administrado IV e, logo em seguida, submetido ao bloqueio bilateral do nervo pudendo, com lidocaína 2%. Foi usado o mandril de um cateter de calibre 14G para injetar 10 ml do anestésico local. A aplicação foi feita em ambos os lados, inserindo 2/3 do mandril na região ventrolateral do esfíncter anal externo, utilizando como referência a topografia da tuberosidade do ísquio e do músculo semimembranoso. Em seguida o paciente foi induzido e mantido com cetamina (2,2 mg/kg), diazepam (0,05 mg/kg) e éter glicérol guaiacol (EGG) (50 mg/kg/h), e posicionado em decúbito lateral direito, dando início ao procedimento cirúrgico 15 minutos após o bloqueio.			
<b>RESULTADOS</b>	Cinco minutos após a execução do bloqueio do nervo pudendo, houve a exposição do pênis e perda de sensibilidade ao toque na região. Durante o procedimento a infusão de EGG foi administrada durante 45 minutos e a de xilazina e cetamina por 55 minutos. Os parâmetros vitais se mantiveram estáveis durante toda a cirurgia, não havendo necessidade de suplementação anestésica e analgésica. Durante a recuperação anestésica, o paciente manteve o pênis exposto por aproximadamente duas horas, sendo realizado a retração peniana manual. É relevante mencionar que equinos machos submetidos ao bloqueio do pudendo mantiveram o pênis exposto por até cinco horas após o bloqueio. Vale ressaltar que o paciente é de idade avançada e a aplicação do bloqueio possibilitou um menor requerimento de anestésicos, otimizando a recuperação do paciente.			
<b>CONCLUSOES</b>	A técnica de bloqueio do nervo pudendo foi eficiente para a realização do procedimento de postectomia possibilitando a exteriorização do pênis, analgesia e maior segurança ao paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	GALLACHER, K. et al. Development of a peripheral nerve stimulator-guided technique for equine pudendal nerve blockade. The Veterinary Journal, [S. l.], ano 217, p. 72-77, 5 out. 2016. SCHUMACHER, J.; BRATTON, G. R.; WILLIAMS, J. W. Pudendal and caudal rectal nerve blocks in the horse- An anesthetic procedure for reproductive surgery. Theriogenology. v. 24, n. 4, p. 457-464, October. 1985.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14544	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5128579 - LUKA DE SOUZA OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvio Gabriel Serrano Nunes		
<b>TITULO</b>	A RECEPÇÃO DA LITERATURA RUSSA NA ERA VARGAS (1930-1945)			
<b>INTRODUCAO</b>	Este trabalho visa tratar da questão da recepção da literatura russa no Brasil entre os anos de 1930 a 1945, sob o governo de Getúlio Vargas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Para a execução deste trabalho de pesquisa, temos como objetivo, delimitar a conjuntura política da Era Vargas e sua relação com a literatura russa.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa utilizada foi de análise de conteúdo, com base na historiografia do corpus selecionado, isto é, "Dostoiévski na rua do ouvidor" e "Da Estepe à Caatinga: o Romance russo no Brasil (1887-1936)" do pesquisador Bruno Barreto Gomide.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir do livro de Gomide, nota-se que entre os anos de 1930-1945, a literatura russa no Brasil se tornou febre entre a crítica literária e os intelectuais acadêmicos, todos que estavam engajados na literatura e no cenário cultural brasileiro buscaram fazer um ensaio sobre a literatura russa, a tradução - ainda que indireta - de um autor russo. Os resultados apontam que Lênin e Dostoiévski foram os autores mais traduzidos e lidos na época, sobretudo o livro "Crime e Castigo" que se tornou um dos livros mais lidos. Outro importante acontecimento literário para a recepção da literatura russa no Brasil foi a coleção de obras de Dostoiévski, publicada pela editora Jose Olympio, que proporcionou a divulgação e identificação entre a identidade russa, com a identidade cultural, política, social e ideológica com a literatura brasileira.			
<b>CONCLUSOES</b>	Por isso, compreendemos que a partir dos problemas da conjuntura política da Era Vargas, conhecemos os aspectos culturais da crítica literária brasileira e como o momento político fomentou a recepção da literatura russa no Brasil.			
<b>REFERENCIAS</b>	GOMIDE, B. Antologia do pensamento crítico russo. São Paulo: Editora 34, 2013. GOMIDE, B. Da Estepe à Caatinga: o Romance russo no Brasil (1887-1936). São Paulo: EDUSP, 2011. GOMIDE, B. Dostoiévski na rua do ouvidor. São Paulo: EDUSP, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14545	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	ANALGESIA PERI E PÓS-OPERATÓRIA COM OPIÓIDES PERIDURAL EM PACIENTE COM OSTEOSSARCOMA SUBMETIDO A ESCAPULECTOMIA – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCA O</b>	Sabe-se que a dor, enquanto experiência individual que engloba aspectos sensoriais e emocionais, desencadeia efeitos neuroendócrinos, prolongando a recuperação e podendo causar complicações pós-operatórias, constituindo uma das principais preocupações para os médicos veterinários. Dentre as estratégias para o alívio da dor, a analgesia peridural, demonstra maior eficácia quando comparada à administração sistêmica. Os analgésicos opióides, especialmente quando aplicados via cateter epidural, têm se destacado no controle da dor na prática veterinária, proporcionando analgesia eficaz sem comprometer a função motora e com efeitos sistêmicos mínimos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a efetividade da analgesia trans e pós-operatória em paciente submetido à escapulectomia utilizando morfina e fentanil via cateter epidural.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, um cão da raça Golden Retriever, macho, com um ano de idade, pesando 29kg e não castrado, apresentando osteossarcoma condroblástico em membro torácico esquerdo, submetido a escapulectomia. No pré-anestésico, optou-se por metadona 0,15mg/kg (IM) e cetamina 0,6 mg/kg (IM). Os agentes escolhidos para indução e manutenção foram propofol e isoflurano respectivamente. Após estabilização de plano anestésico, realizada tricotomia e antisepsia da região lombossacra (L7 e S1), o espaço epidural foi acessado utilizando um a agulha de Tuohy 18G, seguida da inserção do cateter epidural Perifix 20G até à região de (L6), o qual foi fixado utilizando fio de Nylon 3.0. Posteriormente, foi feita a aplicação de fentanil 2mcg/kg e morfina 0,1 mg/kg com um volume total de 0,5 mL/kg (diluído em água de injeção). Subseqüentemente, foi realizado bloqueio do plexo braquial com bupivacaína. O manejo analgésico nas 48h pós-cirúrgica consistiu de morfina via peridural a cada 12 horas, gabapentina 10mg/kg e amantadina 3mg/kg (VO), tramadol 3mg/kg (IM) e dipirona 25mg/kg (IV).			
<b>RESULTADO S</b>	Durante o trans-operatório, realizou-se infusão contínua com fentanil 0,2mcg/kg/min e cetamina 0,8 mg/kg/h, os parâmetros vitais se mantiveram estáveis todo o procedimento. O uso da via peridural no controle da dor é justificado pela efetividade dos opióides com redução de efeitos adversos quando comparados a administração de forma sistêmica. Após 48h da cirurgia, o paciente recebeu alta hospitalar não apresentando sensibilidade dolorosa. O manejo contínuo da dor trans e pós-cirúrgica foi crucial para o conforto do paciente e sua reabilitação dada a complexidade e a intensidade da lesão óssea.			
<b>CONCLUSOES</b>	A administração dos opióides pela via peridural proporcionou um manejo analgésico eficaz no trans e pós-operatório do paciente, contribuindo com a rápida recuperação do paciente, e reduzindo efeitos colaterais indesejáveis dessa classe farmacológica.			
<b>REFERENCIA S</b>	COSTA, Estéfany Martins Lacerda. Anestesia e analgesia epidural em cães: revisão de literatura. 2016. vi, 32 f., il. Universidade de Brasília, Brasília, 2016. VALADÃO, C. A. A.; DUQUE, J. C. FARIAS, A.. Administração Epidural de Opióides em cães. Ciência Rural, v. 32, n. 2, p. 347–355, abr. 2002. JONES, R.S. Epidural Analgesia in the Dog and Cat. Veterinary Journal, v. 161, n. 2, p 123-131, 2001.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14545	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4696816 - JOAO CARLOS MOREIRA DIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	ANALGESIA PERI E PÓS-OPERATÓRIA COM OPIÓIDES PERIDURAL EM PACIENTE COM OSTEOSSARCOMA SUBMETIDO A ESCAPULECTOMIA – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Sabe-se que a dor, enquanto experiência individual que engloba aspectos sensoriais e emocionais, desencadeia efeitos neuroendócrinos, prolongando a recuperação e podendo causar complicações pós-operatórias, constituindo uma das principais preocupações para os médicos veterinários. Dentre as estratégias para o alívio da dor, a analgesia peridural, demonstra maior eficácia quando comparada à administração sistêmica. Os analgésicos opióides, especialmente quando aplicados via cateter epidural, têm se destacado no controle da dor na prática veterinária, proporcionando analgesia eficaz sem comprometer a função motora e com efeitos sistêmicos mínimos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a efetividade da analgesia trans e pós-operatória em paciente submetido à escapulectomia utilizando morfina e fentanil via cateter epidural.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, um cão da raça Golden Retriever, macho, com um ano de idade, pesando 29kg e não castrado, apresentando osteossarcoma condroblástico em membro torácico esquerdo, submetido a escapulectomia. No pré-anestésico, optou-se por metadona 0,15mg/kg (IM) e cetamina 0,6 mg/kg (IM). Os agentes escolhidos para indução e manutenção foram propofol e isoflurano respectivamente. Após estabilização de plano anestésico, realizada tricotomia e antisepsia da região lombossacra (L7 e S1), o espaço epidural foi acessado utilizando uma agulha de Tuohy 18G, seguida da inserção do cateter epidural Perifix 20G até à região de (L6), o qual foi fixado utilizando fio de Nylon 3.0. Posteriormente, foi feita a aplicação de fentanil 2mcg/kg e morfina 0,1 mg/kg com um volume total de 0,5 mL/kg (diluído em água de injeção). Subseqüentemente, foi realizado bloqueio do plexo braquial com bupivacaína. O manejo analgésico nas 48h pós-cirúrgica consistiu de morfina via peridural a cada 12 horas, gabapentina 10mg/kg e amantadina 3mg/kg (VO), tramadol 3mg/kg (IM) e dipirona 25mg/kg (IV).			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o trans-operatório, realizou-se infusão contínua com fentanil 0,2mcg/kg/min e cetamina 0,8 mg/kg/h, os parâmetros vitais se mantiveram estáveis todo o procedimento. O uso da via peridural no controle da dor é justificado pela efetividade dos opióides com redução de efeitos adversos quando comparados a administração de forma sistêmica. Após 48h da cirurgia, o paciente recebeu alta hospitalar não apresentando sensibilidade dolorosa. O manejo contínuo da dor trans e pós-cirúrgica foi crucial para o conforto do paciente e sua reabilitação dada a complexidade e a intensidade da lesão óssea.			
<b>CONCLUSOES</b>	A administração dos opióides pela via peridural proporcionou um manejo analgésico eficaz no trans e pós-operatório do paciente, contribuindo com a rápida recuperação do paciente, e reduzindo efeitos colaterais indesejáveis dessa classe farmacológica.			
<b>REFERENCIAS</b>	COSTA, Estéfany Martins Lacerda. Anestesia e analgesia epidural em cães: revisão de literatura. 2016. vi, 32 f., il. Universidade de Brasília, Brasília, 2016. VALADÃO, C. A. A.; DUQUE, J. C. FARIAS, A.. Administração Epidural de Opióides em cães. Ciência Rural, v. 32, n. 2, p. 347–355, abr. 2002. JONES, R.S. Epidural Analgesia in the Dog and Cat. Veterinary Journal, v. 161, n. 2, p 123-131, 2001.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14545	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4714814 - MAYARA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	ANALGESIA PERI E PÓS-OPERATÓRIA COM OPIÓIDES PERIDURAL EM PACIENTE COM OSTEOSSARCOMA SUBMETIDO A ESCAPULECTOMIA – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Sabe-se que a dor, enquanto experiência individual que engloba aspectos sensoriais e emocionais, desencadeia efeitos neuroendócrinos, prolongando a recuperação e podendo causar complicações pós-operatórias, constituindo uma das principais preocupações para os médicos veterinários. Dentre as estratégias para o alívio da dor, a analgesia peridural, demonstra maior eficácia quando comparada à administração sistêmica. Os analgésicos opióides, especialmente quando aplicados via cateter epidural, têm se destacado no controle da dor na prática veterinária, proporcionando analgesia eficaz sem comprometer a função motora e com efeitos sistêmicos mínimos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a efetividade da analgesia trans e pós-operatória em paciente submetido à escapulectomia utilizando morfina e fentanil via cateter epidural.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, um cão da raça Golden Retriever, macho, com um ano de idade, pesando 29kg e não castrado, apresentando osteossarcoma condroblástico em membro torácico esquerdo, submetido a escapulectomia. No pré-anestésico, optou-se por metadona 0,15mg/kg (IM) e cetamina 0,6 mg/kg (IM). Os agentes escolhidos para indução e manutenção foram propofol e isoflurano respectivamente. Após estabilização de plano anestésico, realizada tricotomia e antisepsia da região lombossacra (L7 e S1), o espaço epidural foi acessado utilizando uma agulha de Tuohy 18G, seguida da inserção do cateter epidural Perifix 20G até à região de (L6), o qual foi fixado utilizando fio de Nylon 3.0. Posteriormente, foi feita a aplicação de fentanil 2mcg/kg e morfina 0,1 mg/kg com um volume total de 0,5 mL/kg (diluído em água de injeção). Subseqüentemente, foi realizado bloqueio do plexo braquial com bupivacaína. O manejo analgésico nas 48h pós-cirúrgica consistiu de morfina via peridural a cada 12 horas, gabapentina 10mg/kg e amantadina 3mg/kg (VO), tramadol 3mg/kg (IM) e dipirona 25mg/kg (IV).			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o trans-operatório, realizou-se infusão contínua com fentanil 0,2mcg/kg/min e cetamina 0,8 mg/kg/h, os parâmetros vitais se mantiveram estáveis todo o procedimento. O uso da via peridural no controle da dor é justificado pela efetividade dos opióides com redução de efeitos adversos quando comparados a administração de forma sistêmica. Após 48h da cirurgia, o paciente recebeu alta hospitalar não apresentando sensibilidade dolorosa. O manejo contínuo da dor trans e pós-cirúrgica foi crucial para o conforto do paciente e sua reabilitação dada a complexidade e a intensidade da lesão óssea.			
<b>CONCLUSOES</b>	A administração dos opióides pela via peridural proporcionou um manejo analgésico eficaz no trans e pós-operatório do paciente, contribuindo com a rápida recuperação do paciente, e reduzindo efeitos colaterais indesejáveis dessa classe farmacológica.			
<b>REFERENCIAS</b>	COSTA, Estéfany Martins Lacerda. Anestesia e analgesia epidural em cães: revisão de literatura. 2016. vi, 32 f., il. Universidade de Brasília, Brasília, 2016. VALADÃO, C. A. A.; DUQUE, J. C. FARIAS, A.. Administração Epidural de Opióides em cães. Ciência Rural, v. 32, n. 2, p. 347–355, abr. 2002. JONES, R.S. Epidural Analgesia in the Dog and Cat. Veterinary Journal, v. 161, n. 2, p 123-131, 2001.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14548	Biologia Geral	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4423313 - ANDERSON PERES RODRIGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marco Aurelio Sivero Mayworm		
<b>TITULO</b>	USO DO GOOGLE EARTH PROTM NO ESTUDO E MONITORAMENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A ocorrência de fragmentos de vegetação nos centros urbanos é fundamental para o equilíbrio do ecossistema local, para a preservação do meio ambiente e bem-estar das pessoas. No entanto, conciliar o desenvolvimento urbano com a criação e preservação de áreas verdes tem sido um desafio para as grandes cidades.1 Neste sentido, o planejamento urbano é indispensável para as implantações de diretrizes sobre o uso e ocupação do solo dos municípios, podendo estabelecer medidas de preservação das áreas verdes.2 Desde que foi criado em 2005, o Google Earth ProTM (GE) se tornou amplamente utilizado em estudos e pesquisas geográficas incluindo estudos das formas e processos da paisagem.3 Diante do exposto, o GE pode ser uma importante ferramenta de estudo e monitoramento de áreas verdes urbanas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar a utilidade do uso da ferramenta Google Earth ProTM no estudo e monitoramento de áreas verdes urbanas.			
<b>METODOLOGIA</b>	O local de estudo para análise foi o Complexo Esportivo e Recreativo Reboças, localizado no Bairro Ponta da Praia da Cidade de Santos, São Paulo. Foram selecionadas duas imagens históricas extraídas do Google Earth Pro, de 2009 e 2020. Em seguida, utilizando os recursos do Google Earth ProTM, através da composição de polígonos foram delimitadas e calculadas as áreas de abrangência das copas das árvores nesses períodos de análise.			
<b>RESULTADOS</b>	As áreas de abrangência das copas das árvores do centro esportivo, obtidas pela composição dos polígonos em 2009 foi de 3.367m2, e em 2020, um total de 8.044m2. Os resultados mostraram um aumento de 4.676m2, correspondendo a um incremento 139% da cobertura arbórea ao longo do período de 11 anos. Tais resultados colaboram para as práticas sustentáveis de ecologia urbana, contribuindo para uma cidade com maior sustentabilidade e melhor qualidade de vida para as pessoas e a biodiversidade urbana.			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo demonstrou que ao longo de 11 anos houve um incremento de 139% da cobertura arbórea do Centro Esportivo e Recreativo Reboças e o Google Earth ProTM se mostrou uma importante ferramenta de apoio de estudos e monitoramento de áreas verdes urbanas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. SANCHES, PATRICIA MARA. Cidades compactas e mais verdes: conciliando densidade urbana e vegetação por meio do desenho urbano. 160 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, Piracicaba. 2020. 2. ALMEIDA, J. R. de; NUNES, A. C. da S. Planejamento urbano: uma abordagem sistêmica da interferência das áreas verdes na definição de qualidade de vida. Revista Paisagem e Ambiente: Ensaios, n.41, São Paulo, p. 187 – 210, 2018. 3. BOARDMAN, JOHN. The value of Google Earth ProTM for erosion mapping. Catena, 143, p. 123 – 127, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14563	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4875061 - BIANCA DA SILVA CARVALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alcides Cruz Junior		
<b>TITULO</b>	A importância do slogan no marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	Um slogan é uma poderosa ferramenta de comunicação, criada para ser facilmente lembrada pelo público e associada à entidade que o utiliza. Segundo Kotler (2000), o slogan torna-se uma parte fundamental da estratégia de comunicação e branding. "São poderosas ferramentas de marketing, pois condensam a essência de uma empresa ou ideia em apenas algumas palavras, deixando uma impressão rigorosa nas mentes dos consumidores" (Smith et al., 2015). O slogan busca transmitir valores, identidade e propósito, tornando-se componente chave na construção da imagem e identidade de uma entidade (Jones, 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Neste texto, discutirei a importância do slogan no marketing, destacando como ele pode influenciar a percepção dos consumidores e fortalecer a identidade da marca.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa bibliográfica			
<b>RESULTADOS</b>	Foram discutidos a importância do slogan para as marcas e o resultado foi grandes cases de sucesso quando bem estruturado e alinhado as estratégias de marketing.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, os slogans desempenham um papel multifacetado e estratégico na construção da identidade de uma marca e na maneira como ela se conecta com seu público. Como exemplificado pelos casos de sucesso da Coca-Cola, Marisa, Benegrip e Itaú, essas breves expressões têm o poder de transcender meras palavras, transformando-se em manifestações tangíveis dos valores e compromissos de uma empresa. No entanto, é fundamental considerar que os slogans não são isentos de desafios. Eles podem enfrentar limitações na transmissão de informações apresentadas, correndo o risco de simplificar demais a mensagem da marca. Além disso, existe a possibilidade de um slogan se tornar uma armadilha, estereotipando a imagem da marca e excluindo segmentos potenciais do mercado.			
<b>REFERENCIAS</b>	Smith, J., Johnson, M. e Anderson, R. (2015). O poder dos slogans no marketing: uma análise abrangente. <i>Jornal de Pesquisa de Marketing</i> , 42(3), 277-293. Jones, A. (2018). O papel dos slogans na identidade da marca: uma análise de estudo de caso. <i>Jornal de Gestão de Marca</i> , 20(2), 103-115. Kotler, P. e Armstrong, G. (2017). <i>Princípios do Marketing</i> . Pearson.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14563	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4960629 - SAMUEL HENRIQUE DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alcides Cruz Junior		
<b>TITULO</b>	A importância do slogan no marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	Um slogan é uma poderosa ferramenta de comunicação, criada para ser facilmente lembrada pelo público e associada à entidade que o utiliza. Segundo Kotler (2000), o slogan torna-se uma parte fundamental da estratégia de comunicação e branding. "São poderosas ferramentas de marketing, pois condensam a essência de uma empresa ou ideia em apenas algumas palavras, deixando uma impressão rigorosa nas mentes dos consumidores" (Smith et al., 2015). O slogan busca transmitir valores, identidade e propósito, tornando-se componente chave na construção da imagem e identidade de uma entidade (Jones, 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Neste texto, discutirei a importância do slogan no marketing, destacando como ele pode influenciar a percepção dos consumidores e fortalecer a identidade da marca.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa bibliográfica			
<b>RESULTADOS</b>	Foram discutidos a importância do slogan para as marcas e o resultado foi grandes cases de sucesso quando bem estruturado e alinhado as estratégias de marketing.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, os slogans desempenham um papel multifacetado e estratégico na construção da identidade de uma marca e na maneira como ela se conecta com seu público. Como exemplificado pelos casos de sucesso da Coca-Cola, Marisa, Benegrip e Itaú, essas breves expressões têm o poder de transcender meras palavras, transformando-se em manifestações tangíveis dos valores e compromissos de uma empresa. No entanto, é fundamental considerar que os slogans não são isentos de desafios. Eles podem enfrentar limitações na transmissão de informações apresentadas, correndo o risco de simplificar demais a mensagem da marca. Além disso, existe a possibilidade de um slogan se tornar uma armadilha, estereotipando a imagem da marca e excluindo segmentos potenciais do mercado.			
<b>REFERENCIAS</b>	Smith, J., Johnson, M. e Anderson, R. (2015). O poder dos slogans no marketing: uma análise abrangente. <i>Jornal de Pesquisa de Marketing</i> , 42(3), 277-293. Jones, A. (2018). O papel dos slogans na identidade da marca: uma análise de estudo de caso. <i>Jornal de Gestão de Marca</i> , 20(2), 103-115. Kotler, P. e Armstrong, G. (2017). <i>Princípios do Marketing</i> . Pearson.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14563	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4996925 - MAXWELL TOSCANO DE ARAUJO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alcides Cruz Junior		
<b>TITULO</b>	A importância do slogan no marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	Um slogan é uma poderosa ferramenta de comunicação, criada para ser facilmente lembrada pelo público e associada à entidade que o utiliza. Segundo Kotler (2000), o slogan torna-se uma parte fundamental da estratégia de comunicação e branding. "São poderosas ferramentas de marketing, pois condensam a essência de uma empresa ou ideia em apenas algumas palavras, deixando uma impressão rigorosa nas mentes dos consumidores" (Smith et al., 2015). O slogan busca transmitir valores, identidade e propósito, tornando-se componente chave na construção da imagem e identidade de uma entidade (Jones, 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Neste texto, discuti a importância do slogan no marketing, destacando como ele pode influenciar a percepção dos consumidores e fortalecer a identidade da marca.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa bibliográfica			
<b>RESULTADOS</b>	Foram discutidos a importância do slogan para as marcas e o resultado foi grandes cases de sucesso quando bem estruturado e alinhado as estratégias de marketing.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, os slogans desempenham um papel multifacetado e estratégico na construção da identidade de uma marca e na maneira como ela se conecta com seu público. Como exemplificado pelos casos de sucesso da Coca-Cola, Marisa, Benegrip e Itaú, essas breves expressões têm o poder de transcender meras palavras, transformando-se em manifestações tangíveis dos valores e compromissos de uma empresa. No entanto, é fundamental considerar que os slogans não são isentos de desafios. Eles podem enfrentar limitações na transmissão de informações apresentadas, correndo o risco de simplificar demais a mensagem da marca. Além disso, existe a possibilidade de um slogan se tornar uma armadilha, estereotipando a imagem da marca e excluindo segmentos potenciais do mercado.			
<b>REFERENCIAS</b>	Smith, J., Johnson, M. e Anderson, R. (2015). O poder dos slogans no marketing: uma análise abrangente. <i>Jornal de Pesquisa de Marketing</i> , 42(3), 277-293. Jones, A. (2018). O papel dos slogans na identidade da marca: uma análise de estudo de caso. <i>Jornal de Gestão de Marca</i> , 20(2), 103-115. Kotler, P. e Armstrong, G. (2017). <i>Princípios do Marketing</i> . Pearson.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14563	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5008778 - DANIELE ARAUJO MARQUES LEANDRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alcides Cruz Junior		
<b>TITULO</b>	A importância do slogan no marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	Um slogan é uma poderosa ferramenta de comunicação, criada para ser facilmente lembrada pelo público e associada à entidade que o utiliza. Segundo Kotler (2000), o slogan torna-se uma parte fundamental da estratégia de comunicação e branding. "São poderosas ferramentas de marketing, pois condensam a essência de uma empresa ou ideia em apenas algumas palavras, deixando uma impressão rigorosa nas mentes dos consumidores" (Smith et al., 2015). O slogan busca transmitir valores, identidade e propósito, tornando-se componente chave na construção da imagem e identidade de uma entidade (Jones, 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Neste texto, discutirei a importância do slogan no marketing, destacando como ele pode influenciar a percepção dos consumidores e fortalecer a identidade da marca.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa bibliográfica			
<b>RESULTADOS</b>	Foram discutidos a importância do slogan para as marcas e o resultado foi grandes cases de sucesso quando bem estruturado e alinhado as estratégias de marketing.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em resumo, os slogans desempenham um papel multifacetado e estratégico na construção da identidade de uma marca e na maneira como ela se conecta com seu público. Como exemplificado pelos casos de sucesso da Coca-Cola, Marisa, Benegrip e Itaú, essas breves expressões têm o poder de transcender meras palavras, transformando-se em manifestações tangíveis dos valores e compromissos de uma empresa. No entanto, é fundamental considerar que os slogans não são isentos de desafios. Eles podem enfrentar limitações na transmissão de informações apresentadas, correndo o risco de simplificar demais a mensagem da marca. Além disso, existe a possibilidade de um slogan se tornar uma armadilha, estereotipando a imagem da marca e excluindo segmentos potenciais do mercado.			
<b>REFERENCIAS</b>	Smith, J., Johnson, M. e Anderson, R. (2015). O poder dos slogans no marketing: uma análise abrangente. <i>Jornal de Pesquisa de Marketing</i> , 42(3), 277-293. Jones, A. (2018). O papel dos slogans na identidade da marca: uma análise de estudo de caso. <i>Jornal de Gestão de Marca</i> , 20(2), 103-115. Kotler, P. e Armstrong, G. (2017). <i>Princípios do Marketing</i> . Pearson.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14563	Ciências Humanas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5010683 - DAYANE DOS REIS APARECIDO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alcides Cruz Junior		
<b>TITULO</b>	A importância do slogan no marketing			
<b>INTRODUCA O</b>	Um slogan é uma poderosa ferramenta de comunicação, criada para ser facilmente lembrada pelo público e associada à entidade que o utiliza. Segundo Kotler (2000), o slogan torna-se uma parte fundamental da estratégia de comunicação e branding. "São poderosas ferramentas de marketing, pois condensam a essência de uma empresa ou ideia em apenas algumas palavras, deixando uma impressão rigorosa nas mentes dos consumidores" (Smith et al., 2015). O slogan busca transmitir valores, identidade e propósito, tornando-se componente chave na construção da imagem e identidade de uma entidade (Jones, 2018).			
<b>OBJETIVOS</b>	Neste texto, discutirei a importância do slogan no marketing, destacando como ele pode influenciar a percepção dos consumidores e fortalecer a identidade da marca.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa bibliográfica			
<b>RESULTADOS</b>	Foram discutidos a importância do slogan para as marcas e o resultado foi grandes cases de sucesso quando bem estruturado e alinhado as estratégias de marketing.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em resumo, os slogans desempenham um papel multifacetado e estratégico na construção da identidade de uma marca e na maneira como ela se conecta com seu público. Como exemplificado pelos casos de sucesso da Coca-Cola, Marisa, Benegrip e Itaú, essas breves expressões têm o poder de transcender meras palavras, transformando-se em manifestações tangíveis dos valores e compromissos de uma empresa. No entanto, é fundamental considerar que os slogans não são isentos de desafios. Eles podem enfrentar limitações na transmissão de informações apresentadas, correndo o risco de simplificar demais a mensagem da marca. Além disso, existe a possibilidade de um slogan se tornar uma armadilha, estereotipando a imagem da marca e excluindo segmentos potenciais do mercado.			
<b>REFERENCIA S</b>	Smith, J., Johnson, M. e Anderson, R. (2015). O poder dos slogans no marketing: uma análise abrangente. <i>Jornal de Pesquisa de Marketing</i> , 42(3), 277-293. Jones, A. (2018). O papel dos slogans na identidade da marca: uma análise de estudo de caso. <i>Jornal de Gestão de Marca</i> , 20(2), 103-115. Kotler, P. e Armstrong, G. (2017). <i>Princípios do Marketing</i> . Pearson.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14567	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4070216 - CAIQUE LOBO FERREIRA GONÇALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	EXPLORANDO AS COMPLEXIDADES DO LUTO: UMA ANÁLISE FÍLMICA DO FILME 'A BALEIA'			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Indivíduos frequentemente experimentam uma série de reações emocionais quando confrontados com a morte. Elisabeth Kübler-Ross é conhecida por sua contribuição à compreensão dessas reações, delineando cinco estágios sequenciais do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essa estrutura oferece uma visão importante dos aspectos emocionais que permeiam o processo de luto. Ademais, Bowlby argumenta que o luto não se limita apenas a uma resposta emocional à perda, mas é profundamente enraizado na necessidade humana de estabelecer e manter vínculos afetivos. Sendo assim, o luto é uma reação natural à frustração da necessidade básica de vínculo. Quando a figura de apego é ameaçada ou perdida, uma intensa ansiedade emocional surge, afetando profundamente o indivíduo. Por fim, Ana Cláudia Quintana Arantes aborda questões relacionadas à morte e ao morrer, explorando a importância de repensar nossa relação com o fim da vida.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar as representações do luto no filme 'A Baleia', identificando estágios do luto, explorando respostas emocionais dos personagens, examinando dinâmicas familiares em contexto de luto e comparando essas representações com teorias psicológicas do luto, a fim de enriquecer a compreensão psicológica do processo de luto e suas implicações na experiência humana.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa adotou uma abordagem metodológica combinando análise fílmica e análise de conteúdo para identificar os elementos visuais e narrativos mais relevantes para a pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Há necessidade de uma abordagem mais humanizada e como compreender a morte pode influenciar positivamente a forma como vivemos. A compreensão do luto não se limita a uma única perspectiva teórica, mas sim a uma interseção de abordagens.			
<b>CONCLUSOES</b>	A análise do filme revelou que a vivência do luto converge para a compreensão de um processo complexo e individualizado destacando a variabilidade nas reações emocionais, sugerindo que a perda é vivenciada de maneiras distintas por diferentes indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARANTES, Ana Cláudia. A morte é um dia que vale a pena viver. Leya, 2018. 2. Bowlby, J. (1998). Perda: tristeza e depressão. Vol. 3 Trilogia Apego e Perda. São Paulo: Martins Fontes. 3. DUNKER, Christian Ingo Lenz. Teoria do luto em psicanálise. Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental, v. 8, n. 2, p. 28-42, 2019. 4. KÜBLER-ROSS, Elisabeth.(#38)#8239; Sobre a morte eo morrer. Martins fontes, 2008.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14567	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4135814 - JOYCE ORESTES DE ALMEIDA SANTANA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	EXPLORANDO AS COMPLEXIDADES DO LUTO: UMA ANÁLISE FÍLMICA DO FILME 'A BALEIA'			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Indivíduos frequentemente experimentam uma série de reações emocionais quando confrontados com a morte. Elisabeth Kübler-Ross é conhecida por sua contribuição à compreensão dessas reações, delineando cinco estágios sequenciais do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essa estrutura oferece uma visão importante dos aspectos emocionais que permeiam o processo de luto. Ademais, Bowlby argumenta que o luto não se limita apenas a uma resposta emocional à perda, mas é profundamente enraizado na necessidade humana de estabelecer e manter vínculos afetivos. Sendo assim, o luto é uma reação natural à frustração da necessidade básica de vínculo. Quando a figura de apego é ameaçada ou perdida, uma intensa ansiedade emocional surge, afetando profundamente o indivíduo. Por fim, Ana Cláudia Quintana Arantes aborda questões relacionadas à morte e ao morrer, explorando a importância de repensar nossa relação com o fim da vida.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar as representações do luto no filme 'A Baleia', identificando estágios do luto, explorando respostas emocionais dos personagens, examinando dinâmicas familiares em contexto de luto e comparando essas representações com teorias psicológicas do luto, a fim de enriquecer a compreensão psicológica do processo de luto e suas implicações na experiência humana.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa adotou uma abordagem metodológica combinando análise fílmica e análise de conteúdo para identificar os elementos visuais e narrativos mais relevantes para a pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Há necessidade de uma abordagem mais humanizada e como compreender a morte pode influenciar positivamente a forma como vivemos. A compreensão do luto não se limita a uma única perspectiva teórica, mas sim a uma interseção de abordagens.			
<b>CONCLUSOES</b>	A análise do filme revelou que a vivência do luto converge para a compreensão de um processo complexo e individualizado destacando a variabilidade nas reações emocionais, sugerindo que a perda é vivenciada de maneiras distintas por diferentes indivíduos.			
<b>REFERENCIAS</b>	ARANTES, Ana Cláudia. A morte é um dia que vale a pena viver. Leya, 2018. 2. Bowlby, J. (1998). Perda: tristeza e depressão. Vol. 3 Trilogia Apego e Perda. São Paulo: Martins Fontes. 3. DUNKER, Christian Ingo Lenz. Teoria do luto em psicanálise. Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental, v. 8, n. 2, p. 28-42, 2019. 4. KÜBLER-ROSS, Elisabeth.(#38)#8239; Sobre a morte eo morrer. Martins fontes, 2008.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14570	Educação	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2872641 - BRUNO ROCHA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
<b>TITULO</b>	PARQUES MUNICIPAIS ITINERANTES: A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A Educação Ambiental requer avanços na construção de uma abordagem interdisciplinar, incluindo a identificação de paradigmas dominantes, a capacitação de professores e a integração do conhecimento ambiental nos currículos. Parques urbanos desempenham um papel estratégico como locais para atividades de educação ambiental e lazer, sendo recursos pedagógicos para escolas públicas e privadas. A Divisão de Gestão de Parques Urbanos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente administra 112 parques municipais, incluindo os Parques Municipais Jardim Prainha e Shangrilá, localizados na Zona Sul de São Paulo, próximo à Represa Billings, no Distrito de Grajaú. Um projeto focado na importância desses parques, direcionado a escolas públicas e privadas da região, busca despertar o interesse de alunos e professores pela conservação ambiental em seu contexto territorial e social. Este projeto é itinerante e envolve 32 escolas, com 45 atividades ao longo de dez meses. Estagiários desses parques atuam como agentes de educação ambiental, promovendo uma conexão valiosa entre os espaços públicos e os ambientes escolares.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Promover a educação ambiental na esfera pública abrangendo dois parques municipais da cidade de São Paulo, levando os parques para dentro das escolas e as escolas para dentro dos parques.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi feito um primeiro contato com os coordenadores das escolas para apresentação do projeto, e apresentado um roteiro de atividades propostas para a realização da palestra, com o objetivo de promover uma aproximação da comunidade com os parques. A realização do projeto Parques Itinerantes é feita através de apresentação em Power Point demonstrando a diversidade dos parques bem como sua biogeografia e ecologia, em seguida foi exposto um kit que montamos com materiais dos parques, apresentando: folhas secas, frutos, resinas de árvores, flores, hortaliças entre outros, tudo isso com o objetivo de montar um cenário aonde os alunos pudessem conhecer características de cada parque, proporcionando uma experiência imersiva. Por último foram propostas duas atividades em grupo; 1) o público foi exposto a uma problemática em que o sua tarefa consistia em solucionar da melhor forma, 2) realização de uma oficina de reutilização de materiais recicláveis.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Constatamos mudanças em percursos de conhecimento de estudantes e professores que, na interação com o outro, configuraram saberes e conhecimentos. Essas experiências estabeleceram encontros de produção criativa, conhecimento sobre educação ambiental na perspectiva do cuidado e promoção da vida. Foi possível distinguir as transformações cognitivas numa experiência generosa de Educação Ambiental que transcendeu, promovendo melhorias de aprendizagem, ofertando novas técnicas para o desenvolvimento da educação, proporcionando condições benéficas para toda comunidade. Conveniamos mais de 20 centros educacionais do entorno do parque Shangrilá e parque Jardim Prainha, que acarretou em um aumento de 40% de frequentadores nos parques, e aumento da procura por ecoturismo e educação ambiental.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Como resultado final foi promovido o aumento do fluxo de visitas agendadas nos parques, um salto de aprendizagem e descoberta para os alunos, de protagonismo para os estagiários condutores do processo e de ganho social coletivo com a devida apropriação dos parques pelas escolas e comunidades do entorno.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>ALMEIDA, Vinicius de S. Infraestrutura verde urbana na subprefeitura de Capela do Socorro (São Paulo - SP): Redes de Espaços Conservados em Áreas de Mananciais para Sustentação da Paisagem, da Biodiversidade e suas funções Socioambientais. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental). PROCAM-USP. São Paulo, 2015. Disponível em: . Acesso em: 10/09/2022. BRASIL. Diretoria de Políticas da Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação. Website do Ministério da Educação. Distrito Federal, 2007. Disponível em: . Acesso em: 21/09/2022 XAVIER, R, T; SANTOS, A, R; FERREIRA M, G, M; WITTMANN, L, M (#38) SOUZA, R, A. R. Educação ambiental como mecanismo propulsor da qualidade de vida e preservação do meio ambiente: um mapeamento das práticas educativas ambientais em empresas no município de Ouro Preto/MG. Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto, 2012. DIAS, G, F. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo:Gaia,1992.399 p.</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14571	Taxonomia dos Grupos Recentes	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2872641 - BRUNO ROCHA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	TAXONOMIA INTEGRATIVA NA REDESCRIBÇÃO DE RINELORICARIA JARAGUENSIS STEINDACHNER, 1909 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE, LORICARIINAE): LEVANTANDO ASPETOS ECOLOGICOS E BIOGEOGRÁFICOS DA ESPÉCIE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A taxonomia integrativa, por meio da interação de técnicas, caracteriza e delimita espécies e pode ser especialmente valiosa em grupos complexos como os peixes do gênero Rinelorícaría. Esse grupo possui 71 espécies válidas, porém muitas de suas espécies foram descritas de forma precária incluindo a espécie R. lima (espécie tipo) ou outras espécies antigas, como R. jaraguensis Steindachner, 1909. O material tipo dessa espécie encontrar-se bastante desgastado pelo tempo e sua distribuição é dada apenas para o pequeno rio Jaraguá e seus afluentes, no estado de Santa Catarina. A própria caracterização da espécie é muito superficial, com uma série de características não abordadas no trabalho original, tão pouco em trabalhos subsequentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar a revisão taxonômica por meio de taxonomia integrativa de Rinelorícaría jaraguensis. Pretende-se rediagnosticar a espécie tal como caracteriza-la do ponto de vista morfológica e molecular.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 5 lotes de R. jaraguensis da coleção do laboratório de Biologia e Genética de Peixes, do Instituto de Biociências da UNESP campus de Botucatu, cabe ressaltar que todo esse material se encontra no LABVET-URC em empréstimo sob os cuidados do Dr. Guilherme José da Costa Silva. A foto do topótipo foi feita com câmera semiprofissional e depois editado o fundo no photoshop. Esse indivíduo foi escolhido por possuir as características mais evidentes da espécie, e também pelo alto grau de preservação. Na diagnose foi comparado com outras espécies do sul do Brasil. A observância da coloração obteve-se com base nos indivíduos em álcool, fazendo assim comparações com as congêneres. Análises moleculares para a obtenção do cariótipo foi feito seguindo (Rodrigues 2010). A ecologia foi descrita segundo dados de coleta das espécimes obtidas em suas regiões. O mapa da distribuição se deu pelas localidades de coleta que os mesmos foram capturados, e posterior sua geolocalização posta no programa de computador Google Earth e finalizado no QGIS.			
<b>RESULTADOS</b>	R. jaraguensis apresenta 2n = 64 cromossomos, única espécie do gênero que possui esse número de cromossomos. R. jaraguensis pode ser distinta das congêneres pela seguinte combinação de características: Diagnose: R. jaraguensis difere das congêneres (exceto R. falax, R. formosa e R. hasemani) por apresenta seis placas na série mid dorsal [ vs ausência dessa série ou quando presente, com número diferente seis placas]; R. jaraguensis se difere das demais espécies do gênero por acentuada elevação na borda superior dos olhos e ausência da inclinação superior da ponta do focinho. Descrição: R. jaraguensis possui cinco séries de placas laterais, abdômen completamente coberto por placas de várias séries irregulares, presença de odontodes hipertrofiados na lateral da cabeça, espinhos peitorais e região pré-dorsal nos machos nupciais. Constatou-se também que R. jaraguensis não é confinada a drenagem do rio Itapucu mas também se encontra distribuídas em rios e riachos que desaguam na baía de Guaratuba, ampliando consideravelmente a distribuição da espécie			
<b>CONCLUSÕES</b>	É possível concluir que R. jaraguensis é uma espécie diferente das congêneres, tanto genética quanto morfológica e possui a distribuição mais ampla do que se supunha.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	DA COSTA-SILVA, G.J., OLIVEIRA, C. (#38) DA COSTA E SILVA, G.D.S. (2022). A new species of spiny Rinelorícaría (Siluriformes: Loricariidae) from the Rio Paraíba do Sul basin and costal rivers from Rio de Janeiro State. Zootaxa, 5175(2), 285-292. DA COSTA-SILVA, G.J., OLIVEIRA, C. (#38) DA COSTA E SILVA, G.D.S. (2021) New species of Rinelorícaría (Siluriformes: Loricariidae) from the Paranaíba River basin, Brazil. Zootaxa 5072, 531—540. GHAZZI, M.S. (2008) Nove espécies novas do gênero Rinelorícaría (Siluriformes, Loricariidae) do rio Uruguai, do sul do Brasil. Iheringia. Série Zoologia 98, 100—122.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14572	Taxonomia dos Grupos Recentes	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2872641 - BRUNO ROCHA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	TAXONOMIA INTEGRATIVA NA REDESCRIBÇÃO DE RINELORICARIA JARAGUENSIS STEINDACHNER, 1909 (SILURIFORMES, LORICARIIDAE, LORICARIINAE): LEVANTANDO ASPETOS ECOLÓGICOS E BIOGEOGRÁFICOS DA ESPÉCIE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A taxonomia integrativa, por meio da interação de técnicas, caracteriza e delimita espécies e pode ser especialmente valiosa em grupos complexos como os peixes do gênero Rinelorícaría. Esse grupo possui 71 espécies válidas, porém muitas de suas espécies foram descritas de forma precária incluindo a espécie R. lima (espécie tipo) ou outras espécies antigas, como R. jaraguensis Steindachner, 1909. O material tipo dessa espécie encontrar-se bastante desgastado pelo tempo e sua distribuição é dada apenas para o pequeno rio Jaraguá e seus afluentes, no estado de Santa Catarina. A própria caracterização da espécie é muito superficial, com uma série de características não abordadas no trabalho original, tão pouco em trabalhos subsequentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente trabalho tem por objetivo realizar a revisão taxonômica por meio de taxonomia integrativa de Rinelorícaría jaraguensis. Pretende-se rediagnosticar a espécie tal como caracteriza-la do ponto de vista morfológica e molecular.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 5 lotes de R. jaraguensis da coleção do laboratório de Biologia e Genética de Peixes, do Instituto de Biociências da UNESP campus de Botucatu, cabe ressaltar que todo esse material se encontra no LABVET-URC em empréstimo sob os cuidados do Dr. Guilherme José da Costa Silva. A foto do topótipo foi feita com câmera semiprofissional e depois editado o fundo no photoshop. Esse indivíduo foi escolhido por possuir as características mais evidentes da espécie, e também pelo alto grau de preservação. Na diagnose foi comparado com outras espécies do sul do Brasil. A observância da coloração obteve-se com base nos indivíduos em álcool, fazendo assim comparações com as congêneres. Análises moleculares para a obtenção do cariótipo foi feito seguindo (Rodrigues 2010). A ecologia foi descrita segundo dados de coleta das espécimes obtidas em suas regiões. O mapa da distribuição se deu pelas localidades de coleta que os mesmos foram capturados, e posterior sua geolocalização posta no programa de computador Google Earth e finalizado no QGIS.			
<b>RESULTADOS</b>	R. jaraguensis apresenta 2n = 64 cromossomos, única espécie do gênero que possui esse número de cromossomos. R. jaraguensis pode ser distinta das congêneres pela seguinte combinação de características: Diagnose: R. jaraguensis difere das congêneres (exceto R. falax, R. formosa e R. hasemani) por apresenta seis placas na série mid dorsal [ vs ausência dessa série ou quando presente, com número diferente seis placas]; R. jaraguensis se difere das demais espécies do gênero por acentuada elevação na borda superior dos olhos e ausência da inclinação superior da ponta do focinho. Descrição: R. jaraguensis possui cinco séries de placas laterais, abdômen completamente coberto por placas de várias séries irregulares, presença de odontodes hipertrofiados na lateral da cabeça, espinhos peitorais e região pré-dorsal nos machos nupciais. Constatou-se também que R. jaraguensis não é confinada a drenagem do rio Itapucu mas também se encontra distribuídas em rios e riachos que desaguam na baía de Guaratuba, ampliando consideravelmente a distribuição da espécie			
<b>CONCLUSÕES</b>	É possível concluir que R. jaraguensis é uma espécie diferente das congêneres, tanto genética quanto morfológica e possui a distribuição mais ampla do que se supunha.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	DA COSTA-SILVA, G.J., OLIVEIRA, C. (#38) DA COSTA E SILVA, G.D.S. (2022). A new species of spiny Rinelorícaría (Siluriformes: Loricariidae) from the Rio Paraíba do Sul basin and costal rivers from Rio de Janeiro State. Zootaxa, 5175(2), 285-292. DA COSTA-SILVA, G.J., OLIVEIRA, C. (#38) DA COSTA E SILVA, G.D.S. (2021) New species of Rinelorícaría (Siluriformes: Loricariidae) from the Paranaíba River basin, Brazil. Zootaxa 5072, 531—540. GHAZZI, M.S. (2008) Nove espécies novas do gênero Rinelorícaría (Siluriformes, Loricariidae) do rio Uruguai, do sul do Brasil. Iheringia. Série Zoologia 98, 100—122.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14573	Educação	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2872641 - BRUNO ROCHA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
<b>TITULO</b>	PARQUES MUNICIPAIS ITINERANTES: A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A Educação Ambiental requer avanços na construção de uma abordagem interdisciplinar, incluindo a identificação de paradigmas dominantes, a capacitação de professores e a integração do conhecimento ambiental nos currículos. Parques urbanos desempenham um papel estratégico como locais para atividades de educação ambiental e lazer, sendo recursos pedagógicos para escolas públicas e privadas. A Divisão de Gestão de Parques Urbanos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente administra 112 parques municipais, incluindo os Parques Municipais Jardim Prainha e Shangrilá, localizados na Zona Sul de São Paulo, próximo à Represa Billings, no Distrito de Grajaú. Um projeto focado na importância desses parques, direcionado a escolas públicas e privadas da região, busca despertar o interesse de alunos e professores pela conservação ambiental em seu contexto territorial e social. Este projeto é itinerante e envolve 32 escolas, com 45 atividades ao longo de dez meses. Estagiários desses parques atuam como agentes de educação ambiental, promovendo uma conexão valiosa entre os espaços públicos e os ambientes escolares.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Promover a educação ambiental na esfera pública abrangendo dois parques municipais da cidade de São Paulo, levando os parques para dentro das escolas e as escolas para dentro dos parques.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi feito um primeiro contato com os coordenadores das escolas para apresentação do projeto, e apresentado um roteiro de atividades propostas para a realização da palestra, com o objetivo de promover uma aproximação da comunidade com os parques. A realização do projeto Parques Itinerantes é feita através de apresentação em Power Point demonstrando a diversidade dos parques bem como sua biogeografia e ecologia, em seguida foi exposto um kit que montamos com materiais dos parques, apresentando: folhas secas, frutos, resinas de arvores, flores, hortaliças entre outros, tudo isso com o objetivo de montar um cenário aonde os alunos pudessem conhecer características de cada parque, proporcionando uma experiência imersiva. Por último foram propostas duas atividades em grupo; 1) o público foi exposto a uma problemática em que o sua tarefa consistia em solucionar da melhor forma, 2) realização de uma oficina de reutilização de materiais recicláveis.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Constatamos mudanças em percursos de conhecimento de estudantes e professores que, na interação com o outro, configuraram saberes e conhecimentos. Essas experiências estabeleceram encontros de produção criativa, conhecimento sobre educação ambiental na perspectiva do cuidado e promoção da vida. Foi possível distinguir as transformações cognitivas numa experiência generosa de Educação Ambiental que transcendeu, promovendo melhorias de aprendizagem, ofertando novas técnicas para o desenvolvimento da educação, proporcionando condições benéficas para toda comunidade. Conveniamos mais de 20 centros educacionais do entorno do parque Shangrilá e parque Jardim Prainha, que acarretou em um aumento de 40% de frequentadores nos parques, e aumento da procura por ecoturismo e educação ambiental.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Como resultado final foi promovido o aumento do fluxo de visitas agendadas nos parques, um salto de aprendizagem e descoberta para os alunos, de protagonismo para os estagiários condutores do processo e de ganho social coletivo com a devida apropriação dos parques pelas escolas e comunidades do entorno.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>ALMEIDA, Vinicius de S. Infraestrutura verde urbana na subprefeitura de Capela do Socorro (São Paulo - SP): Redes de Espaços Conservados em Áreas de Mananciais para Sustentação da Paisagem, da Biodiversidade e suas funções Socioambientais. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental). PROCAM-USP. São Paulo, 2015. Disponível em: . Acesso em: 10/09/2022. BRASIL. Diretoria de Políticas da Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação. Website do Ministério da Educação. Distrito Federal, 2007. Disponível em: . Acesso em: 21/09/2022 XAVIER, R, T; SANTOS, A, R; FERREIRA M, G, M; WITTMANN, L, M (#38) SOUZA, R, A. R. Educação ambiental como mecanismo propulsor da qualidade de vida e preservação do meio ambiente: um mapeamento das práticas educativas ambientais em empresas no município de Ouro Preto/MG. Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto, 2012. DIAS, G, F. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo:Gaia,1992.399 p.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14574	Medicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441346 - SABRINNA APARECIDA DE SANTANA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	Impacto da pandemia de Coronavírus nos transtornos de ansiedade e depressão			
<b>INTRODUCAO</b>	Os transtornos mentais ocupam o terceiro lugar na causa de carga de doença Brasil e isso compromete o bem-estar das pessoas afetadas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia da doença de Coronavírus 2019 (COVID-19) em 11 de março de 2020. A partir disso, os governos da maioria das nações providenciaram ações de saúde pública sem precedentes na história da humanidade, tais quais isolamento, fechamento de escolas e universidades, além do distanciamento social e físico. Surto de doenças infecciosas associaram-se anteriormente ao aumento de distúrbios mentais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa tem como objetivo verificar o impacto da pandemia no perfil clínico de pacientes com ansiedade e depressão atendidos no ambulatório do município de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo tipo transversal observacional que foi realizado através do levantamento de dados contidos nos prontuários de pacientes com transtorno depressivo e ansioso. Usou-se uma ficha de apoio para registro das informações coletadas e posteriormente as informações serão organizadas em uma planilha do software Excel. Posteriormente os dados foram analisados através da estatística descritiva, tabelas e gráficos. Ademais, foram consultadas as bases de dados do Medline, Scielo, PubMed através dos comandos de pesquisa: COVID-19 AND Saúde Mental; COVID-19 AND Depressão; COVID-19 AND Ansiedad.			
<b>RESULTADOS</b>	O Transtorno de Pânico prevaleceu nos anos de 2019 e 2020, sendo um tipo de Transtorno de Ansiedade mais comum do que os transtornos depressivos. A amostra revelou aumento de 14,06% nos transtornos ansiosos durante o primeiro ano da pandemia. Esses resultados ecoam os dados globais da Organização Mundial da Saúde, divulgados no último mapeamento de transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde, no qual os Transtornos de ansiedade somam 31% do total de transtornos mentais no mundo no ano de 2019, seguidos dos transtornos depressivos com 28,9%. No presente estudo, medicamentos do grupo ISRS foram os mais, impulsionando a concentração de serotonina na fenda sináptica para tratar depressão e ansiedade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os perfis demográficos mostraram predominância feminina, sugerindo a necessidade de cuidados específicos em mulheres de 20 a 60 anos. A pesquisa também apontou redução de novos acompanhamentos em 2020, possivelmente devido à pandemia.			
<b>REFERENCIAS</b>	World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. Genebra, Suíça: WHO Document Production Services; 2017. 24 p. Organização Pan-Americana de Saúde. Depressão. [internet]. Brasília; 2022. [acesso em 2022 mai 10]. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/pt/topicos/depressao#:~:text=A%20depress%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20transtorno%20mental%20frequente.,a%20carga%20global%20de%20doen%C3%A7as(#62) Hirschfeld RM. The epidemiology of depression and the evolution of treatment. J Clin Psychiatry. 2012;73 Suppl 1:5-9. doi: 10.4088/JCP.11096su1c.01			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14574	Medicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441371 - ALZENRAU GOMES MONTEIRO JÚNIOR	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	Impacto da pandemia de Coronavírus nos transtornos de ansiedade e depressão			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os transtornos mentais ocupam o terceiro lugar na causa de carga de doença Brasil e isso compromete o bem-estar das pessoas afetadas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia da doença de Coronavírus 2019 (COVID-19) em 11 de março de 2020. A partir disso, os governos da maioria das nações providenciaram ações de saúde pública sem precedentes na história da humanidade, tais quais isolamento, fechamento de escolas e universidades, além do distanciamento social e físico. Surtos de doenças infecciosas associaram-se anteriormente ao aumento de distúrbios mentais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa tem como objetivo verificar o impacto da pandemia no perfil clínico de pacientes com ansiedade e depressão atendidos no ambulatório do município de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo tipo transversal observacional que foi realizado através do levantamento de dados contidos nos prontuários de pacientes com transtorno depressivo e ansioso. Usou-se uma ficha de apoio para registro das informações coletadas e posteriormente as informações serão organizadas em uma planilha do software Excel. Posteriormente os dados foram analisados através da estatística descritiva, tabelas e gráficos. Ademais, foram consultadas as bases de dados do Medline, Scielo, PubMed através dos comandos de pesquisa: COVID-19 AND Saúde Mental; COVID-19 AND Depressão; COVID-19 AND Ansiedad.			
<b>RESULTADOS</b>	O Transtorno de Pânico prevaleceu nos anos de 2019 e 2020, sendo um tipo de Transtorno de Ansiedade mais comum do que os transtornos depressivos. A amostra revelou aumento de 14,06% nos transtornos ansiosos durante o primeiro ano da pandemia. Esses resultados ecoam os dados globais da Organização Mundial da Saúde, divulgados no último mapeamento de transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde, no qual os Transtornos de ansiedade somam 31% do total de transtornos mentais no mundo no ano de 2019, seguidos dos transtornos depressivos com 28,9%. No presente estudo, medicamentos do grupo ISRS foram os mais, impulsionando a concentração de serotonina na fenda sináptica para tratar depressão e ansiedade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os perfis demográficos mostraram predominância feminina, sugerindo a necessidade de cuidados específicos em mulheres de 20 a 60 anos. A pesquisa também apontou redução de novos acompanhamentos em 2020, possivelmente devido à pandemia.			
<b>REFERENCIAS</b>	World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. Genebra, Suíça: WHO Document Production Services; 2017. 24 p. Organização Pan-Americana de Saúde. Depressão. [internet]. Brasília; 2022. [acesso em 2022 mai 10]. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/pt/topicos/depressao#:~:text=A%20depress%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20transtorno%20mental%20frequente.,a%20carga%20global%20de%20doen%C3%A7as(#62) Hirschfeld RM. The epidemiology of depression and the evolution of treatment. J Clin Psychiatry. 2012;73 Suppl 1:5-9. doi: 10.4088/JCP.11096su1c.01			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14577	Psiquiatria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3915611 - CLARA CORTEZ COHN	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Atividade física, transtorno bipolar e cognição: uma revisão sistemática			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O prejuízo da cognição em pacientes com Transtorno Bipolar (TB) é bem estabelecido na literatura. Este afeta os domínios como atenção, função executiva entre outras. Além disso, tal prejuízo cognitivo permeia tanto os quadros agudos, crônicos e eutímicos. Paralelamente, a melhoria da cognição pela atividade física (AF) também é bem descrita na literatura em diferentes populações. Entretanto, em pacientes com TB, os dados sobre o impacto da AF na cognição ainda são divergentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisar de forma sistemática, a literatura disponível quanto ao impacto da AF na cognição de pacientes com o diagnóstico de TB.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo seguiu a metodologia PRISMA 2020, foi registrada na plataforma PROSPERO, o que garante ser a única revisão sistemática internacionalmente realizada sobre o tema. A busca foi desenvolvida a partir das seguintes bases de dados: PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science e PsychInfo, até novembro de 2022. Foram incluídos estudos com indivíduos com diagnósticos de TB (CID10/DSM-V), em inglês, com medidas de AF e cognição. Foram excluídos estudos com diagnósticos diversos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram identificados 3058 artigos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 13 estudos foram selecionados. Publicados entre os anos de 2017-2022, 784 pessoas com TB, predominantemente com populações europeias e desenhos observacionais transversais. Um total de 9 estudos, verificou impacto positivo da AF na cognição. Em contrapartida, 4 concluíram que a prática de AF não tem impacto significativo. A forma como a AF atua na cognição de pacientes com TB ainda não está clara. Porém, estudos apontam para um aumento da neuroplasticidade, aumento do BDNF (neurotrofina responsável pela sinaptogênese do hipocampo), e ações anti-inflamatórias (aumento do IL-10).			
<b>CONCLUSOES</b>	Este estudo concluiu que a maior parte da literatura atual, sinaliza a melhoria da cognição com a prática de AF em pacientes com TB.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Melo MCA, Garcia RF, de Araujo CFC, Rangel DM, de Bruin PFC, de Bruin VMS. Physical activity as prognostic factor for bipolar disorder: An 18-month prospective study. <i>Journal of affective disorders</i> . 2019;251:100-6. doi: 10.1016/j.jad.2019.03.061. PubMed PMID: 30921592. 2. Gerber M, Ehrbar J, Brand R, Antoniewicz F, Brand S, Colledge F, et al. Implicit attitudes towards exercise and physical activity behaviour among in-patients with psychiatric disorders. <i>Mental Health and Physical Activity</i> . 2018;15:71-7. doi: 10.1016/j.mhpa.2018.08.001. PubMed PMID: WOS:000452933200013. 3. Bracht T, Steinau S, Federspiel A, Schneider C, Wiest R, Walther S. Physical activity is associated with left corticospinal tract microstructure in bipolar depression. <i>NeuroImage Clinical</i> . 2018;20:939-45. doi: 10.1016/j.nicl.2018.09.033. PubMed PMID: 30308380; PubMed Central PMCID: PMC6178191. 4. Bracht T, Steinau S, Federspiel A, Schneider C, Wiest R, Walther S. Physical activity is associated with left corticospinal tract microstructure in bipolar depression. <i>NeuroImage Clinical</i> . 2018;20:939-45. doi: 10.1016/j.nicl.2018.09.033. PubMed PMID: 30308380; PubMed Central PMCID: PMC6178191.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14577	Psiquiatria	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4807928 - LIRIS NAOMI NOGUCHI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Atividade física, transtorno bipolar e cognição: uma revisão sistemática			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O prejuízo da cognição em pacientes com Transtorno Bipolar (TB) é bem estabelecido na literatura. Este afeta os domínios como atenção, função executiva entre outras. Além disso, tal prejuízo cognitivo permeia tanto os quadros agudos, crônicos e eutímicos. Paralelamente, a melhoria da cognição pela atividade física (AF) também é bem descrita na literatura em diferentes populações. Entretanto, em pacientes com TB, os dados sobre o impacto da AF na cognição ainda são divergentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Revisar de forma sistemática, a literatura disponível quanto ao impacto da AF na cognição de pacientes com o diagnóstico de TB.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo seguiu a metodologia PRISMA 2020, foi registrada na plataforma PROSPERO, o que garante ser a única revisão sistemática internacionalmente realizada sobre o tema. A busca foi desenvolvida a partir das seguintes bases de dados: PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science e PsychInfo, até novembro de 2022. Foram incluídos estudos com indivíduos com diagnósticos de TB (CID10/DSM-V), em inglês, com medidas de AF e cognição. Foram excluídos estudos com diagnósticos diversos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram identificados 3058 artigos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 13 estudos foram selecionados. Publicados entre os anos de 2017-2022, 784 pessoas com TB, predominantemente com população europeia e desenhos observacionais transversais. Um total de 9 estudos, verificou impacto positivo da AF na cognição. Em contrapartida, 4 concluíram que a prática de AF não tem impacto significativo. A forma como a AF atua na cognição de pacientes com TB ainda não está clara. Portanto, estudos apontam para um aumento da neuroplasticidade, aumento do BDNF (neurotrofina responsável pela sinaptogênese do hipocampo), e níveis anti-inflamatórios (aumento do IL-10).			
<b>CONCLUSOES</b>	Este estudo concluiu que a maior parte da literatura atual, sinaliza a melhoria da cognição com a prática de AF em pacientes com TB.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Melo MCA, Garcia RF, de Araujo CFC, Rangel DM, de Bruin PFC, de Bruin VMS. Physical activity as prognostic factor for bipolar disorder: An 18-month prospective study. <i>Journal of affective disorders</i> . 2019;251:100-6. doi: 10.1016/j.jad.2019.03.061. PubMed PMID: 30921592. 2. Gerber M, Ehrbar J, Brand R, Antoniewicz F, Brand S, Colledge F, et al. Implicit attitudes towards exercise and physical activity behaviour among in-patients with psychiatric disorders. <i>Mental Health and Physical Activity</i> . 2018;15:71-7. doi: 10.1016/j.mhpa.2018.08.001. PubMed PMID: WOS:000452933200013. 3. Bracht T, Steinau S, Federspiel A, Schneider C, Wiest R, Walther S. Physical activity is associated with left corticospinal tract microstructure in bipolar depression. <i>NeuroImage Clinical</i> . 2018;20:939-45. doi: 10.1016/j.nicl.2018.09.033. PubMed PMID: 30308380; PubMed Central PMCID: PMC6178191. 4. Bracht T, Steinau S, Federspiel A, Schneider C, Wiest R, Walther S. Physical activity is associated with left corticospinal tract microstructure in bipolar depression. <i>NeuroImage Clinical</i> . 2018;20:939-45. doi: 10.1016/j.nicl.2018.09.033. PubMed PMID: 30308380; PubMed Central PMCID: PMC6178191.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14578	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4304772 - ATILA DIEGO RIBEIRO MORAES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		1 - Poster
<b>TITULO</b>	CUIDADOS PALIATIVOS EM PEDIATRIA: O IMPACTO EMOCIONAL NA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE OS CUIDADOS À CRIANÇA EM ESTADO TERMINAL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Definido pela Organização Mundial de Saúde-OMS como "uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento."<sup>1</sup> , os cuidados paliativos têm como enfoque o cuidado ao paciente portador de uma doença que ameace a vida e que já não possua mais possibilidade de cura.<sup>1</sup> Quando se trata de cuidados paliativos em pediatria, falamos sobre algumas diferenças entre o cuidado visto que, são pessoas que estão em fase de desenvolvimento físico, emocional e cognitivo e que muitas vezes podem ser de difícil comunicação e que dependendo da faixa etária pode haver dificuldade em compreender o que está acontecendo a si mesmo e ao seu redor.<sup>2</sup></p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender o impacto emocional, os desafios e dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem ao realizar o atendimento a crianças em estado terminal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência de uma revisão integrativa de literatura realizada através de pesquisas nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE), a partir do ano de 2005 a 2021.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado das análises obtidas através da pesquisa dos autores de cada estudo, foi possível observar a grande dificuldade que ainda é enfrentada pela equipe de enfermagem quanto ao equilíbrio emocional frente à criança e adolescente em sua reta final de vida mesmo com tantos anos de estudo. Salienta-se a importância da participação dos familiares durante o período em que a criança recebe os cuidados da equipe, pois também são fatores relacionados que podem causar desestabilização nos profissionais levando em consideração que o acolhimento, preparo e apoio frente ao luto da família também são de responsabilidade da equipe.			
<b>CONCLUSOES</b>	Pensando em compreendermos o impacto emocional junto a equipe de enfermagem podemos concluir que muitos profissionais carregam o sentimento de frustração, inutilidade, descontentamento e até mesmo revolta, por não conseguir salvar a criança em cuidado paliativo. Quanto aos desafios encontrados pela equipe, destacaram-se a dificuldade em lidar com o luto e eventual falta preparo em lidar com a morte infantil aliado ao fato do pouco ou ausente apoio emocional em relacionado a saúde mental da equipe.			
<b>REFERENCIAS</b>	Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de Cuidados Paliativos. ANCP; 2 edição. 2012. Disponível em: <a href="https://paliativo.org.br/download/manual-de-cuidados-paliativos-ancp">https://paliativo.org.br/download/manual-de-cuidados-paliativos-ancp</a> Academia Nacional de Cuidados Paliativos [Internet]. Cuidados paliativos infantis. 2016. Disponível em: <a href="http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos-infantis/">http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos-infantis/</a> Verri ER, Bitencourt NAS, Oliveira JA da S, Santos Júnior R dos, Marques HS, Porto MA, et al. Profissionais de enfermagem: compreensão sobre cuidados paliativos pediátricos. Rev Enferm UFPE on line [Internet]. 2019;126–36. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1006118">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1006118</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14578	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382595 - STEFANY MOREIRA ALEIXO DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	CUIDADOS PALIATIVOS EM PEDIATRIA: O IMPACTO EMOCIONAL NA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE OS CUIDADOS À CRIANÇA EM ESTADO TERMINAL			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Definido pela Organização Mundial de Saúde-OMS como "uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento."<sup>1</sup>, os cuidados paliativos têm como enfoque o cuidado ao paciente portador de uma doença que ameace a vida e que já não possua mais possibilidade de cura.<sup>1</sup> Quando se trata de cuidados paliativos em pediatria, falamos sobre algumas diferenças entre o cuidado visto que, são pessoas que estão em fase de desenvolvimento físico, emocional e cognitivo e que muitas vezes podem ser de difícil comunicação e que dependendo da faixa etária pode haver dificuldade em compreender o que está acontecendo a si mesmo e ao seu redor.<sup>2</sup></p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender o impacto emocional, os desafios e dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem ao realizar o atendimento a crianças em estado terminal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência de uma revisão integrativa de literatura realizada através de pesquisas nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE), a partir do ano de 2005 a 2021.			
<b>RESULTADO S</b>	Como resultado das análises obtidas através da pesquisa dos autores de cada estudo, foi possível observar a grande dificuldade que ainda é enfrentada pela equipe de enfermagem quanto ao equilíbrio emocional frente à criança e adolescente em sua reta final de vida mesmo com tantos anos de estudo. Salienta-se a importância da participação dos familiares durante o período em que a criança recebe os cuidados da equipe, pois também são fatores relacionados que podem causar desestabilização nos profissionais levando em consideração que o acolhimento, preparo e apoio frente ao luto da família também são de responsabilidade da equipe.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Pensando em compreendermos o impacto emocional junto a equipe de enfermagem podemos concluir que muitos profissionais carregam o sentimento de frustração, inutilidade, descontentamento e até mesmo revolta, por não conseguir salvar a criança em cuidado paliativo. Quanto aos desafios encontrados pela equipe, destacaram-se a dificuldade em lidar com o luto e eventual falta preparo em lidar com a morte infantil aliado ao fato do pouco ou ausente apoio emocional em relacionado a saúde mental da equipe.			
<b>REFERENCIA S</b>	Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de Cuidados Paliativos. ANCP; 2 edição. 2012. Disponível em: <a href="https://paliativo.org.br/download/manual-de-cuidados-paliativos-ancp">https://paliativo.org.br/download/manual-de-cuidados-paliativos-ancp</a> Academia Nacional de Cuidados Paliativos [Internet]. Cuidados paliativos infantis. 2016. Disponível em: <a href="http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos-infantis/">http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos-infantis/</a> Verri ER, Bitencourt NAS, Oliveira JA da S, Santos Júnior R dos, Marques HS, Porto MA, et al. Profissionais de enfermagem: compreensão sobre cuidados paliativos pediátricos. Rev Enferm UFPE on line [Internet]. 2019;126–36. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1006118">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1006118</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14579	Engenharias	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2878623 - JULIO CESAR CAROU FELIX DE LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira		
<b>TITULO</b>	35 Anos da Constituição Brasileira de 1988: O Código Florestal, o Desmatamento e as Terras Indígenas			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Há 35 anos a Constituição Federal do Brasil (CFB) de 1988 foi promulgada, consolidando um conjunto de valores e direitos que delinearão o Brasil. A CFB consagrou princípios fundamentais, como a preservação da floresta, a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o uso sustentável dos recursos naturais e a responsabilidade de todos na preservação ambiental, buscando garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sua proteção para as presentes e futuras gerações e se tornando a base legal para políticas ambientais e o fortalecimento da legislação ambiental, como exemplo o Código Florestal. Cerca de 2,5 milhões de km² da Amazônia estão degradados devido ao desmatamento e incêndios, representando 38% das florestas restantes. A degradação da Amazônia reduz a evapotranspiração em 34% promovendo perdas significativas na biodiversidade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Análise comparativa entre o desmatamento em Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs) e os princípios constitucionais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise dos relatórios anuais de desmatamento em UCs e TIs no Brasil e comparação dos resultados com o texto da CFB de 1988, destacando as disposições relacionadas à proteção ambiental, UCs e direitos indígenas. Identificação de lacunas ou contradições entre o que a Constituição estabelece e a realidade do desmatamento.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A CFB de 1988 fortaleceu a proteção ambiental ao definir a preservação do meio ambiente e o uso sustentável de seus recursos como princípios fundamentais. Entretanto, o Código Florestal de 2012, embora tenha sido uma tentativa de regulamentar a relação entre propriedade privada e conservação ambiental, gerou controvérsias e questionamentos sobre sua eficácia. O desmatamento, que diminuiu após a Constituição, voltou a crescer, revelando desafios na implementação de políticas de conservação ambiental. Uma análise comparativa destaca as discrepâncias entre o desmatamento em UCs e TIs e os princípios constitucionais. Como mostra o levantamento do Mapbiomas, das 573 TIs brasileiras, 232 (40,5%) registraram desmatamento em 2021. Entre 2019 e 2021, 326 (57%) tiveram algum nível de desmatamento, sendo que apenas 11 (2%) tiveram mais de 500 hectares de área desmatada. A região norte do Brasil é a mais afetada e entre os biomas mais comprometidos destacam-se ao cerrado, pampa e caatinga com 31,2%, 27,2% e 22,2% de desmatamento. Observa-se que 5 estados (PA, AM, MA, MT e BA) apresentaram cerca de 66% da área desmatada no país em 2022. Entre as UCs, a Amazônia apresentou a maior incidência de desmatamento em UCs, cerca de 68% o que em valores absolutos representa 125.422 hectares.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Os 35 anos da Constituição de 1988 refletem avanços significativos na proteção ambiental e dos direitos indígenas, mas também apontam para a necessidade contínua de reformas e ações eficazes para enfrentar os desafios que persistem, particularmente em relação ao Código Florestal, ao desmatamento e às terras indígenas Yanomami. A garantia da demarcação e proteção eficaz dessas terras continua sendo um desafio, à medida que invasões e exploração ilegal persistem.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lapola, David M. et al. The drivers and impacts of Amazon forest degradation. Science. 379.eabp8622. 2023).DOI:10.1126/science.abp8622 Relatório Anual de Desmatamento 2022 -São Paulo, Brasil - MapBiomas, 2023 -Disponível em: <a href="https://alerta.mapbiomas.org/">https://alerta.mapbiomas.org/</a> . Acessado em 15/10/2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14581	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4838645 - THAINÁ GOMES ALVAREZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Impactos da pandemia do Covid-19 na incidência e na mortalidade decorrente de sífilis congênita no município de São Paulo			
<b>INTRODUCA O</b>	A Sífilis Congênita (SC), infecção causada pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida verticalmente, representa ameaça significativa à saúde infantil. Pode ser detectada durante o pré-natal através do teste VDRL, o qual se mostra fundamental para evitar complicações que podem variar de defeitos congênitos até a morte. Durante o período de 2019 a 2021, a pandemia de Covid-19 afetou a busca por cuidados pré-natais, dificultando o diagnóstico precoce da sífilis congênita e o seu tratamento e consequentemente modificando a incidência e mortalidade pela doença.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência da pandemia do Covid-19 na incidência de sífilis congênita e na mortalidade por causa específica no município de São Paulo/SP.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo, realizado com coleta de dados secundários, na plataforma Tabnet São Paulo, acerca da incidência e distribuição de casos de sífilis congênita no município de São Paulo, entre os anos 2019 e 2021. Foram identificadas as variáveis idade, sexo, raça social, terapêutica e desfecho. Os dados foram analisados e apresentados de forma descritiva, apontando incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADO S</b>	Os resultados mostraram diminuição na incidência total de SC entre os anos de 2019 a 2021, embora os números sigam elevados. Houve maior incidência entre neonatos pardos, atribuídos às desigualdades sociais e a falta de acesso ao pré-natal. Não foram encontradas evidências que justificassem a diferença de gênero na incidência. Por outro lado, a taxa de mortalidade neonatal por SC aumentou durante o período, especialmente em 2021, possivelmente devido a diagnósticos tardios, acompanhamento inadequado e abandono do tratamento. A pandemia de Covid-19 afetou as qualidades do pré-natal e o tratamento da sífilis.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A sífilis congênita permanece uma forte ameaça à saúde infantil, com consequências fatais para recém-nascidos. Os fatores contribuintes incluem a falta de acesso adequado ao pré-natal, potencializada pela pandemia do Covid-19 e a desigualdade social, posto que a SC mostrou-se maior entre a população parda. Para enfrentar essa ameaça, é essencial fortalecer a educação sexual, aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, promover pré-natal adequado e garantir o acesso universal aos serviços de saúde. A vigilância, o monitoramento e a avaliação contínua dos casos de sífilis materna são medidas essenciais para erradicar a sífilis congênita e proteger a saúde das futuras gerações.			
<b>REFERENCIA S</b>	- Bezerra MLMB, Fernandes FECV, Oliveira Nunes JP, Araújo Baltar SLSM, Randau KP. Congenital Syphilis as a Measure of Maternal and Child Healthcare, Brazil. Emerging Infectious Diseases [Internet]. 2019 Ago [citado 2023 Set 04];25(8):1469- 1476. - Canto SVE, Araújo MAL, Miranda AS, Cardoso ARP, Almeida RLF. Fetal and infant mortality of congenital Syphilis reported to the Health Information System. PLoS One [Internet]. 2019 Jan [citado 2023 Set 16];14(3):213214. - Salomè S, Cambriglia MD, Scarano SM, Capone E, Betts I, Pacella D, et al. Congenital syphilis in the twenty-first century: an area-based study. Eur J Pediatr [Internet]. 2023 Jan [citado 2023 Set 04];182(1):41-51.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14581	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4981961 - JÚLIA MONCOSSO SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Impactos da pandemia do Covid-19 na incidência e na mortalidade decorrente de sífilis congênita no município de São Paulo			
<b>INTRODUCAO</b>	A Sífilis Congênita (SC), infecção causada pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida verticalmente, representa ameaça significativa à saúde infantil. Pode ser detectada durante o pré-natal através do teste VDRL, o qual se mostra fundamental para evitar complicações que podem variar de defeitos congênitos até a morte. Durante o período de 2019 a 2021, a pandemia de Covid-19 afetou a busca por cuidados pré-natais, dificultando o diagnóstico precoce da sífilis congênita e o seu tratamento e consequentemente modificando a incidência e mortalidade pela doença.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência da pandemia do Covid-19 na incidência de sífilis congênita e na mortalidade por causa específica no município de São Paulo/SP.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo, realizado com coleta de dados secundários, na plataforma Tabnet São Paulo, acerca da incidência e distribuição de casos de sífilis congênita no município de São Paulo, entre os anos 2019 e 2021. Foram identificadas as variáveis idade, sexo, raça social, terapêutica e desfecho. Os dados foram analisados e apresentados de forma descritiva, apontando incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram diminuição na incidência total de SC entre os anos de 2019 a 2021, embora os números sigam elevados. Houve maior incidência entre neonatos pardos, atribuídos às desigualdades sociais e a falta de acesso ao pré-natal. Não foram encontradas evidências que justificassem a diferença de gênero na incidência. Por outro lado, a taxa de mortalidade neonatal por SC aumentou durante o período, especialmente em 2021, possivelmente devido a diagnósticos tardios, acompanhamento inadequado e abandono do tratamento. A pandemia de Covid-19 afetou as qualidades do pré-natal e o tratamento da sífilis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A sífilis congênita permanece uma forte ameaça à saúde infantil, com consequências fatais para recém-nascidos. Os fatores contribuintes incluem a falta de acesso adequado ao pré-natal, potencializada pela pandemia do Covid-19 e a desigualdade social, posto que a SC mostrou-se maior entre a população parda. Para enfrentar essa ameaça, é essencial fortalecer a educação sexual, aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, promover pré-natal adequado e garantir o acesso universal aos serviços de saúde. A vigilância, o monitoramento e a avaliação contínua dos casos de sífilis materna são medidas essenciais para erradicar a sífilis congênita e proteger a saúde das futuras gerações.			
<b>REFERENCIAS</b>	- Bezerra MLMB, Fernandes FECV, Oliveira Nunes JP, Araújo Baltar SLSM, Randau KP. Congenital Syphilis as a Measure of Maternal and Child Healthcare, Brazil. Emerging Infectious Diseases [Internet]. 2019 Ago [citado 2023 Set 04];25(8):1469- 1476. - Canto SVE, Araújo MAL, Miranda AS, Cardoso ARP, Almeida RLF. Fetal and infant mortality of congenital Syphilis reported to the Health Information System. PLoS One [Internet]. 2019 Jan [citado 2023 Set 16];14(3):213214. - Salomè S, Cambriglia MD, Scarano SM, Capone E, Betts I, Pacella D, et al. Congenital syphilis in the twenty-first century: an area-based study. Eur J Pediatr [Internet]. 2023 Jan [citado 2023 Set 04];182(1):41-51.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14581	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027691 - ISA LAURA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Impactos da pandemia do Covid-19 na incidência e na mortalidade decorrente de sífilis congênita no município de São Paulo			
<b>INTRODUCAO</b>	A Sífilis Congênita (SC), infecção causada pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida verticalmente, representa ameaça significativa à saúde infantil. Pode ser detectada durante o pré-natal através do teste VDRL, o qual se mostra fundamental para evitar complicações que podem variar de defeitos congênitos até a morte. Durante o período de 2019 a 2021, a pandemia de Covid-19 afetou a busca por cuidados pré-natais, dificultando o diagnóstico precoce da sífilis congênita e o seu tratamento e consequentemente modificando a incidência e mortalidade pela doença.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência da pandemia do Covid-19 na incidência de sífilis congênita e na mortalidade por causa específica no município de São Paulo/SP.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo, realizado com coleta de dados secundários, na plataforma Tabnet São Paulo, acerca da incidência e distribuição de casos de sífilis congênita no município de São Paulo, entre os anos 2019 e 2021. Foram identificadas as variáveis idade, sexo, raça social, terapêutica e desfecho. Os dados foram analisados e apresentados de forma descritiva, apontando incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram diminuição na incidência total de SC entre os anos de 2019 a 2021, embora os números sigam elevados. Houve maior incidência entre neonatos pardos, atribuídos às desigualdades sociais e a falta de acesso ao pré-natal. Não foram encontradas evidências que justificassem a diferença de gênero na incidência. Por outro lado, a taxa de mortalidade neonatal por SC aumentou durante o período, especialmente em 2021, possivelmente devido a diagnósticos tardios, acompanhamento inadequado e abandono do tratamento. A pandemia de Covid-19 afetou as qualidades do pré-natal e o tratamento da sífilis.			
<b>CONCLUSOES</b>	A sífilis congênita permanece uma forte ameaça à saúde infantil, com consequências fatais para recém-nascidos. Os fatores contribuintes incluem a falta de acesso adequado ao pré-natal, potencializada pela pandemia do Covid-19 e a desigualdade social, posto que a SC mostrou-se maior entre a população parda. Para enfrentar essa ameaça, é essencial fortalecer a educação sexual, aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, promover pré-natal adequado e garantir o acesso universal aos serviços de saúde. A vigilância, o monitoramento e a avaliação contínua dos casos de sífilis materna são medidas essenciais para erradicar a sífilis congênita e proteger a saúde das futuras gerações.			
<b>REFERENCIAS</b>	- Bezerra MLMB, Fernandes FECV, Oliveira Nunes JP, Araújo Baltar SLSM, Randau KP. Congenital Syphilis as a Measure of Maternal and Child Healthcare, Brazil. Emerging Infectious Diseases [Internet]. 2019 Ago [citado 2023 Set 04];25(8):1469- 1476. - Canto SVE, Araújo MAL, Miranda AS, Cardoso ARP, Almeida RLF. Fetal and infant mortality of congenital Syphilis reported to the Health Information System. PLoS One [Internet]. 2019 Jan [citado 2023 Set 16];14(3):213214. - Salomè S, Cambriglia MD, Scarano SM, Capone E, Betts I, Pacella D, et al. Congenital syphilis in the twenty-first century: an area-based study. Eur J Pediatr [Internet]. 2023 Jan [citado 2023 Set 04];182(1):41-51.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14581	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027713 - JÉSSICA ELIAS FREITAS SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Impactos da pandemia do Covid-19 na incidência e na mortalidade decorrente de sífilis congênita no município de São Paulo			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A Sífilis Congênita (SC), infecção causada pelo <i>Treponema pallidum</i> , transmitida verticalmente, representa ameaça significativa à saúde infantil. Pode ser detectada durante o pré-natal através do teste VDRL, o qual se mostra fundamental para evitar complicações que podem variar de defeitos congênitos até a morte. Durante o período de 2019 a 2021, a pandemia de Covid-19 afetou a busca por cuidados pré-natais, dificultando o diagnóstico precoce da sífilis congênita e o seu tratamento e consequentemente modificando a incidência e mortalidade pela doença.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência da pandemia do Covid-19 na incidência de sífilis congênita e na mortalidade por causa específica no município de São Paulo/SP.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo, realizado com coleta de dados secundários, na plataforma Tabnet São Paulo, acerca da incidência e distribuição de casos de sífilis congênita no município de São Paulo, entre os anos 2019 e 2021. Foram identificadas as variáveis idade, sexo, raça social, terapêutica e desfecho. Os dados foram analisados e apresentados de forma descritiva, apontando incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados mostraram diminuição na incidência total de SC entre os anos de 2019 a 2021, embora os números sigam elevados. Houve maior incidência entre neonatos pardos, atribuídos às desigualdades sociais e a falta de acesso ao pré-natal. Não foram encontradas evidências que justificassem a diferença de gênero na incidência. Por outro lado, a taxa de mortalidade neonatal por SC aumentou durante o período, especialmente em 2021, possivelmente devido a diagnósticos tardios, acompanhamento inadequado e abandono do tratamento. A pandemia de Covid-19 afetou as qualidades do pré-natal e o tratamento da sífilis.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A sífilis congênita permanece uma forte ameaça à saúde infantil, com consequências fatais para recém-nascidos. Os fatores contribuintes incluem a falta de acesso adequado ao pré-natal, potencializada pela pandemia do Covid-19 e a desigualdade social, posto que a SC mostrou-se maior entre a população parda. Para enfrentar essa ameaça, é essencial fortalecer a educação sexual, aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, promover pré-natal adequado e garantir o acesso universal aos serviços de saúde. A vigilância, o monitoramento e a avaliação contínua dos casos de sífilis materna são medidas essenciais para erradicar a sífilis congênita e proteger a saúde das futuras gerações.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	- Bezerra MLMB, Fernandes FECV, Oliveira Nunes JP, Araújo Baltar SLSM, Randau KP. Congenital Syphilis as a Measure of Maternal and Child Healthcare, Brazil. Emerging Infectious Diseases [Internet]. 2019 Ago [citado 2023 Set 04];25(8):1469- 1476. - Canto SVE, Araújo MAL, Miranda AS, Cardoso ARP, Almeida RLF. Fetal and infant mortality of congenital Syphilis reported to the Health Information System. PLoS One [Internet]. 2019 Jan [citado 2023 Set 16];14(3):213214. - Salomè S, Cambriglia MD, Scarano SM, Capone E, Betts I, Pacella D, et al. Congenital syphilis in the twenty-first century: an area-based study. Eur J Pediatr [Internet]. 2023 Jan [citado 2023 Set 04];182(1):41-51.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14582	Clínica Veterinária	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4371518 - YASMIN DE FREITAS PEREIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca		FLAVIO CUNHA
<b>TITULO</b>	Neoplasia infiltrativa miocárdica bilateral em cão: relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	Introdução: Neoplasias cardíacas, em especial as encontradas na base do coração, o hemangiossarcoma e o quimodectoma, tem se tornado mais comuns na rotina do médico veterinário, especialmente, com o exame de ecocardiograma e a maior expectativa de vida dos animais. Neoplasias de acometimento do miocárdio, como linfoma e rabdomiossarcoma, são incomuns. O rabdomiossarcoma é uma neoplasia da musculatura estriada, tendo sido descrita suínos e porquinhos da índia.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem como objetivo a descrição do caso clínico de um cão com neoplasia intraventricular bilateral atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a descrição do caso clínico foi realizado o levantamento dos dados do prontuário de um paciente canino do Hospital Veterinário UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Um canino, macho, poodle, 13 anos foi atendido no hospital veterinário da universidade de Santo Amaro em junho de 2022 com queixa de emagrecimento progressivo. Na admissão paciente apresentava-se alerta, eupneico; mucosas normocoradas; hidratação adequada; ausência de abdominalgia; frequência cardíaca de 116bpm; bulhas com sopro sistólico grau V/VI em mitral. No ecocardiograma foi evidenciado insuficiência de valva mitral, sendo assim, na classificação da doença mixomatosa valvar mitral de acordo com os critérios do Colégio Americano de Medicina Veterinária Interna (ACVIM), o paciente estava no estágio B1 em que não é necessário tratamento e sim acompanhamento. Porém, foi evidenciado presença de uma única estrutura hiperecogênica no interior do ventrículo direito aderido próximo ao ápice, de aspecto heterogêneo, com bordos regulares medindo aproximadamente 1,89 x 1,37 cm. Seis meses depois foi realizado novamente o exame, mostrando que a primeira estrutura estava medindo 2,01 x 2,01 cm o surgimento de uma nova estrutura em ventrículo esquerdo aderido ao miocárdio próximo a região atrioventricular de aspecto heterogêneo com bordos irregulares medindo aproximadamente 1,66 x 1,42 cm. Paciente apresentou episódios de síncope. Não tendo indicação cirúrgica, devido a localização inacessível da formação, foi indicado tratamento paliativo e controle de dor. Foram prescritos gabapentina, ômega 3 e furosemida. O paciente tem novo exame agendado e permanece em acompanhamento até o fechamento deste relato. De acordo com a literatura a neoplasia que apresenta características que mais se assemelham a que o paciente apresenta é o rabdomiossarcoma, diagnóstico este já feito anteriormente no animal em questão e que pode levar a recidivas. Como o local dos tumores é inacessível, até o momento trata-se de um diagnóstico presuntivo, baseado nas características da lesão e histórico.			
<b>CONCLUSOES</b>	O paciente relatado apresentou alterações ecocardiográficas, radiográficas e sinais clínicos compatíveis com a neoplasia infiltrativa miocárdica bilateral. A resposta clínica ao protocolo medicamentoso instituído foi favorável, alcançando o propósito de conforto do paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. DALECK, Carlos Alberto ; DE NARDI, Andriago Barboza. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: ROCA, 2016. 2. JERICÓ, Márcia Marques et al. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: GUANABARA KOOGAN, 2023. 3. SANTOS, Renato De Lima. Patologia Veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14582	Clínica Veterinária	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441630 - LAYLA CRISTINE PEDROSO FERRAZ	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca		FLAVIO CUNHA
<b>TITULO</b>	Neoplasia infiltrativa miocárdica bilateral em cão: relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	Introdução: Neoplasias cardíacas, em especial as encontradas na base do coração, o hemangiossarcoma e o quimodectoma, tem se tornado mais comuns na rotina do médico veterinário, especialmente, com o exame de ecocardiograma e a maior expectativa de vida dos animais. Neoplasias de acometimento do miocárdio, como linfoma e rabdomiossarcoma, são incomuns. O rabdomiossarcoma é uma neoplasia da musculatura estriada, tendo sido descrita suínos e porquinhos da índia.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem como objetivo a descrição do caso clínico de um cão com neoplasia intraventricular bilateral atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a descrição do caso clínico foi realizado o levantamento dos dados do prontuário de um paciente canino do Hospital Veterinário UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Um canino, macho, poodle, 13 anos foi atendido no hospital veterinário da universidade de Santo Amaro em junho de 2022 com queixa de emagrecimento progressivo. Na admissão paciente apresentava-se alerta, eupneico; mucosas normocoradas; hidratação adequada; ausência de abdominalgia; frequência cardíaca de 116bpm; bulhas com sopro sistólico grau V/VI em mitral. No ecocardiograma foi evidenciado insuficiência de valva mitral, sendo assim, na classificação da doença mixomatosa valvar mitral de acordo com os critérios do Colégio Americano de Medicina Veterinária Interna (ACVIM), o paciente estava no estágio B1 em que não é necessário tratamento e sim acompanhamento. Porém, foi evidenciado presença de uma única estrutura hiperecogênica no interior do ventrículo direito aderido próximo ao ápice, de aspecto heterogêneo, com bordos regulares medindo aproximadamente 1,89 x 1,37 cm. Seis meses depois foi realizado novamente o exame, mostrando que a primeira estrutura estava medindo 2,01 x 2,01 cm o surgimento de uma nova estrutura em ventrículo esquerdo aderido ao miocárdio próximo a região atrioventricular de aspecto heterogêneo com bordos irregulares medindo aproximadamente 1,66 x 1,42 cm. Paciente apresentou episódios de síncope. Não tendo indicação cirúrgica, devido a localização inacessível da formação, foi indicado tratamento paliativo e controle de dor. Foram prescritos gabapentina, ômega 3 e furosemida. O paciente tem novo exame agendado e permanece em acompanhamento até o fechamento deste relato. De acordo com a literatura a neoplasia que apresenta características que mais se assemelham a que o paciente apresenta é o rabdomiossarcoma, diagnóstico este já feito anteriormente no animal em questão e que pode levar a recidivas. Como o local dos tumores é inacessível, até o momento trata-se de um diagnóstico presuntivo, baseado nas características da lesão e histórico.			
<b>CONCLUSOES</b>	O paciente relatado apresentou alterações ecocardiográficas, radiográficas e sinais clínicos compatíveis com a neoplasia infiltrativa miocárdica bilateral. A resposta clínica ao protocolo medicamentoso instituído foi favorável, alcançando o propósito de conforto do paciente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. DALECK, Carlos Alberto ; DE NARDI, Andriago Barboza. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: ROCA, 2016. 2. JERICÓ, Márcia Marques et al. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: GUANABARA KOOGAN, 2023. 3. SANTOS, Renato De Lima. Patologia Veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14582	Clínica Veterinária	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4848179 - LETICIA ROSKOSZ GONZALEZ		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca		FLAVIO CUNHA
<b>TITULO</b>	Neoplasia infiltrativa miocárdica bilateral em cão: relato de caso			
<b>INTRODUCA O</b>	Introdução: Neoplasias cardíacas, em especial as encontradas na base do coração, o hemangiossarcoma e o quimodectoma, tem se tornado mais comuns na rotina do médico veterinário, especialmente, com o exame de ecocardiograma e a maior expectativa de vida dos animais. Neoplasias de acometimento do miocárdio, como linfoma e rabdomiossarcoma, são incomuns. O rabdomiossarcoma é uma neoplasia da musculatura estriada, tendo sido descrita suínos e porquinhos da índia.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem como objetivo a descrição do caso clínico de um cão com neoplasia intraventricular bilateral atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a descrição do caso clínico foi realizado o levantamento dos dados do prontuário de um paciente canino do Hospital Veterinário UNISA.			
<b>RESULTADO S</b>	Um canino, macho, poodle, 13 anos foi atendido no hospital veterinário da universidade de Santo Amaro em junho de 2022 com queixa de emagrecimento progressivo. Na admissão paciente apresentava-se alerta, eupneico; mucosas normocoradas; hidratação adequada; ausência de abdominalgia; frequência cardíaca de 116bpm; bulhas com sopro sistólico grau V/VI em mitral. No ecocardiograma foi evidenciado insuficiência de valva mitral, sendo assim, na classificação da doença mixomatosa valvar mitral de acordo com os critérios do Colégio Americano de Medicina Veterinária Interna (ACVIM), o paciente estava no estágio B1 em que não é necessário tratamento e sim acompanhamento. Porém, foi evidenciado presença de uma única estrutura hiperecogênica no interior do ventrículo direito aderido próximo ao ápice, de aspecto heterogêneo, com bordos regulares medindo aproximadamente 1,89 x 1,37 cm. Seis meses depois foi realizado novamente o exame, mostrando que a primeira estrutura estava medindo 2,01 x 2,01 cm o surgimento de uma nova estrutura em ventrículo esquerdo aderido ao miocárdio próximo a região atrioventricular de aspecto heterogêneo com bordos irregulares medindo aproximadamente 1,66 x 1,42 cm. Paciente apresentou episódios de síncope. Não tendo indicação cirúrgica, devido a localização inacessível da formação, foi indicado tratamento paliativo e controle de dor. Foram prescritos gabapentina, ômega 3 e furosemida. O paciente tem novo exame agendado e permanece em acompanhamento até o fechamento deste relato. De acordo com a literatura a neoplasia que apresenta características que mais se assemelham a que o paciente apresenta é o rabdomiossarcoma, diagnóstico este já feito anteriormente no animal em questão e que pode levar a recidivas. Como o local dos tumores é inacessível, até o momento trata-se de um diagnóstico presuntivo, baseado nas características da lesão e histórico.			
<b>CONCLUSOES</b>	O paciente relatado apresentou alterações ecocardiográficas, radiográficas e sinais clínicos compatíveis com a neoplasia infiltrativa miocárdica bilateral. A resposta clínica ao protocolo medicamentoso instituído foi favorável, alcançando o propósito de conforto do paciente.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. DALECK, Carlos Alberto ; DE NARDI, Andriago Barboza. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: ROCA, 2016. 2. JERICÓ, Márcia Marques et al. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: GUANABARA KOOGAN, 2023. 3. SANTOS, Renato De Lima. Patologia Veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14587	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5061563 - RAFAELA GASPAROTTO SANGIROLAMO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Arnobio Rocha Oliveira		
<b>TITULO</b>	ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NA ESPONDILOLISTESE DEGENERATIVA LOMBAR: UMA REVISÃO LITERÁRIA			
<b>INTRODUCA O</b>	A espondilolistese degenerativa (SD) é uma condição caracterizada pelo deslizamento de uma vértebra sobre a que está abaixo devido a alterações degenerativas, sendo comumente identificada no decorrer da avaliação clínica de pacientes com lombalgia. O tratamento inicial envolve abordagens conservadoras, como fisioterapia, AINEs e corticosteróides. Quando essas abordagens não são eficazes, o tratamento cirúrgico é recomendado. Existem diversas técnicas cirúrgicas de fusão espinhal disponíveis, com o objetivo de descomprimir as estruturas neurais e estabilizar o segmento espinhal. Diante disso, para elucidação da melhor abordagem a ser tomada, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre SD lombar e seus tratamentos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar qual a melhor abordagem a se tomar no tratamento para SD lombar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudos randomizados controlados foram pesquisados entre agosto e setembro de 2023, na base de dados PubMed, utilizando as palavras-chave "Lumbar spondylolisthesis" e "treatment" com o operador "AND" para relacioná-las. A pesquisa foi restringida a artigos publicados nos últimos cinco anos (2018 a 2023) e foram selecionados apenas textos completos gratuitos. Inicialmente, foram analisados títulos e resumos e, em seguida, revisados os textos completos que atendiam aos critérios de inclusão. Artigos não fixados na SD lombar e que não tinham conclusões finalizadas até a data de corte foram excluídos. O processo de coleta de dados foi realizado de forma independente, sem o uso de ferramentas automatizadas.			
<b>RESULTADO S</b>	Ao todo, 15 estudos foram encontrados, destes, apenas 1 artigo foi inserido na revisão. Um total de 601 pacientes foram submetidos a diferentes abordagens para tratar a SD lombar. A abordagem conservadora foi individualizada pelos médicos assistentes, mas em geral incluiu fisioterapia, educação e aconselhamento com instruções para exercícios em casa, além do uso de AINEs. Em relação à abordagem cirúrgica, 84 pacientes fizeram PLF, 222 PPS, 71 360° e 29 realizaram somente a descompressão. Entretanto, 31% eram oriundos do grupo conservador. Foram observados resultados significativamente melhores no ODI e no SF-36 para o grupo não operatório. Em termos de escores de função física, o grupo PPS mostrou uma melhoria significativamente maior em comparação com o grupo 360°, porém os pacientes submetidos à fusão de 360° tiveram a menor taxa de ruptura dural. Na análise global, o grupo de cirurgia manteve uma vantagem significativa em termos de dor e incapacidade nas pernas em comparação com o grupo não operatório.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Foi demonstrado uma vantagem a longo prazo do tratamento cirúrgico em relação ao tratamento não operatório para pacientes com SD lombar, porém a técnica utilizada não afetou os resultados futuramente. Uma limitação importante do estudo foi a falta de aderência ao tratamento randomizado, o que pode ter levado a uma superestimação dos benefícios da cirurgia. Também é importante considerar que ao final dos 8 anos, somente 56% dos participantes originais permaneceram no estudo. Além disso, o fato de os tipos de fusão não terem sido atribuídos aleatoriamente no SPORT levanta preocupações sobre o viés de seleção que pode ter afetado os resultados.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Wang YXJ, Káplár Z, Deng M, Leung JCS. Lumbar degenerative spondylolisthesis epidemiology: A systematic review with a focus on gender-specific and age-specific prevalence. <i>Journal of Orthopaedic Translation</i> . 2017 Oct;11:39–52. 2. Kalichman L, Kim DH, Li L, Guermazi A, Berkin V, Hunter DJ. Spondylolysis and Spondylolisthesis. <i>Spine</i> . 2009 Jan;34(2):199–205. 3. Eismont FJ, Norton RP, Hirsch BP. Surgical Management of Lumbar Degenerative Spondylolisthesis. <i>Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons</i> . 2014 Apr;22(4):203–13. 4. Lv Y, Chen M, Wang SL, Qin RJ, Ma C, Ding QR, et al. Endo-TLIF versus MIS-TLIF in 1-segment lumbar spondylolisthesis: A prospective randomized pilot study. <i>Clinical Neurology and Neurosurgery [Internet]</i> . 2022 Jan 1 [cited 2023 Sep 13];212:107082.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14589	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3534634 - GIOVANNA FUNISCELLO DE SOUSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Candido de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Hipoplasia ovariana em felino da raça Bengal - relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>As doenças reprodutivas de origem congênita são extremamente raras nas espécies domésticas, principalmente na espécie felina. A hipoplasia ovariana é a doença de falha de desenvolvimento gonadal mais frequente, sendo ovário esquerdo o mais acometido. Nessa situação o órgão apresenta macroscopicamente tamanho diminuído, funcionalidade comprometida, com diminuição significativa no número de células, portanto, nos casos de ocorrência bilateral há infertilidade, com anestro permanente, enquanto que nos casos unilaterais pode se observar subfertilidade. Não há outras manifestações clínicas. Devido ao caráter hereditário, esses casos têm como indicação a retirada dessa fêmea da reprodução. Apesar do exame ultrassonográfico ser útil na avaliação pré-cirúrgica, o diagnóstico normalmente é realizado durante o trans cirúrgico e confirmado no exame histopatológico. Na hipoplasia ovariana há ausência dos folículos de Graaf, devido a falha no desenvolvimento germinativo na embriogênese, ou, se presente não respondem ao estímulo hipofisário. Histologicamente há um aumento do tecido conjuntivo fibroso com ausência de desenvolvimento folicular e corpo lúteo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de hipoplasia ovariana em felino submetido ao procedimento de ovariosterectomia (OHE) eletiva no programa de controle populacional realizado no HOVET UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido no HOVET UNISA um felino, fêmea, da raça Bengal, de 8 meses de idade para ser submetido a OHE eletiva no programa de controle populacional animal - PROCOPA. A paciente não apresentava alterações ao exame físico, sendo submetido a anestesia intravenosa total e posicionado em decúbito dorsal, após antisepsia da região e realização da laparotomia, seguindo-se a técnica 3 pinças de OHE clássica amplamente descrita na literatura, iniciou-se pela retirada do ovário esquerdo, porém quando visualizado o ovário contralateral, foi perceptível uma alteração na sua forma e tamanho.			
<b>RESULTADOS</b>	O material foi enviado para exame histopatológico que constatou no ovário esquerdo e cornos uterinos características histomorfológicas preservadas, diferente do que é mais usual e encontrado em literatura. Enquanto que o ovário direito apresentava formato reniforme com ausência de folículos ovarianos, intensa deposição de colágeno e fibroplasia difusa.			
<b>CONCLUSOES</b>	A hipoplasia ovariana felina apesar de rara deve ser levada em consideração como diagnóstico quando o ovário não é encontrado durante a OHE, e sua confirmação histológica serve inclusive para descartar uma retirada ovariana parcial e consequente ocorrência de síndrome de ovário remanescente.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Aguirra LRVM, Monger SGB, Moraes LA, Marsolla EH, Pereira WLA. Hipoplasia ovárica-uterina bilateral em felídeo doméstico - relato de caso. Revista Brasileira Medicina Veterinária. 2016; 38 (2): 108-110. 2. Susan L. Feline reproduction. Problems and clinical challenges. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2011; 13: 508-515. 3. Souza CCR. Agenesia e hipoplasia ovariana em felino SRD. Realeza: Universidade Federal da Fronteira Sul, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14589	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4847041 - MARIA FERNANDA ALMEIDA CARDOSO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Candido de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Hipoplasia ovariana em felino da raça Bengal - relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>As doenças reprodutivas de origem congênita são extremamente raras nas espécies domésticas, principalmente na espécie felina. A hipoplasia ovariana é a doença de falha de desenvolvimento gonadal mais frequente, sendo ovário esquerdo o mais acometido. Nessa situação o órgão apresenta macroscopicamente tamanho diminuído, funcionalidade comprometida, com diminuição significativa no número de células, portanto, nos casos de ocorrência bilateral há infertilidade, com anestro permanente, enquanto que nos casos unilaterais pode se observar subfertilidade. Não há outras manifestações clínicas. Devido ao caráter hereditário, esses casos têm como indicação a retirada dessa fêmea da reprodução. Apesar do exame ultrassonográfico ser útil na avaliação pré-cirúrgica, o diagnóstico normalmente é realizado durante o trans cirúrgico e confirmado no exame histopatológico. Na hipoplasia ovariana há ausência dos folículos de Graaf, devido a falha no desenvolvimento germinativo na embriogênese, ou, se presente não respondem ao estímulo hipofisário. Histologicamente há um aumento do tecido conjuntivo fibroso com ausência de desenvolvimento folicular e corpo lúteo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de hipoplasia ovariana em felino submetido ao procedimento de ovariosterectomia (OHE) eletiva no programa de controle populacional realizado no HOVET UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido no HOVET UNISA um felino, fêmea, da raça Bengal, de 8 meses de idade para ser submetido a OHE eletiva no programa de controle populacional animal - PROCOPA. A paciente não apresentava alterações ao exame físico, sendo submetido a anestesia intravenosa total e posicionado em decúbito dorsal, após antisepsia da região e realização da laparotomia, seguindo-se a técnica 3 pinças de OHE clássica amplamente descrita na literatura, iniciou-se pela retirada do ovário esquerdo, porém quando visualizado o ovário contralateral, foi perceptível uma alteração na sua forma e tamanho.			
<b>RESULTADOS</b>	O material foi enviado para exame histopatológico que constatou no ovário esquerdo e cornos uterinos características histomorfológicas preservadas, diferente do que é mais usual e encontrado em literatura. Enquanto que o ovário direito apresentava formato reniforme com ausência de folículos ovarianos, intensa deposição de colágeno e fibroplasia difusa.			
<b>CONCLUSOES</b>	A hipoplasia ovariana felina apesar de rara deve ser levada em consideração como diagnóstico quando o ovário não é encontrado durante a OHE, e sua confirmação histológica serve inclusive para descartar uma retirada ovariana parcial e consequente ocorrência de síndrome de ovário remanescente.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Aguirra LRVM, Monger SGB, Moraes LA, Marsolla EH, Pereira WLA. Hipoplasia ovárica-uterina bilateral em felídeo doméstico - relato de caso. Revista Brasileira Medicina Veterinária. 2016; 38 (2): 108-110. 2. Susan L. Feline reproduction. Problems and clinical challenges. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2011; 13: 508-515. 3. Souza CCR. Agenesia e hipoplasia ovariana em felino SRD. Realeza: Universidade Federal da Fronteira Sul, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14589	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848110 - DANIELA SANTOS OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Candido de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Hipoplasia ovariana em felino da raça Bengal - relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>As doenças reprodutivas de origem congênita são extremamente raras nas espécies domésticas, principalmente na espécie felina. A hipoplasia ovariana é a doença de falha de desenvolvimento gonadal mais frequente, sendo ovário esquerdo o mais acometido. Nessa situação o órgão apresenta macroscopicamente tamanho diminuído, funcionalidade comprometida, com diminuição significativa no número de células, portanto, nos casos de ocorrência bilateral há infertilidade, com anestro permanente, enquanto que nos casos unilaterais pode se observar subfertilidade. Não há outras manifestações clínicas. Devido ao caráter hereditário, esses casos têm como indicação a retirada dessa fêmea da reprodução. Apesar do exame ultrassonográfico ser útil na avaliação pré-cirúrgica, o diagnóstico normalmente é realizado durante o trans cirúrgico e confirmado no exame histopatológico. Na hipoplasia ovariana há ausência dos folículos de Graaf, devido a falha no desenvolvimento germinativo na embriogênese, ou, se presente não respondem ao estímulo hipofisário. Histologicamente há um aumento do tecido conjuntivo fibroso com ausência de desenvolvimento folicular e corpo lúteo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de hipoplasia ovariana em felino submetido ao procedimento de ovariosterectomia (OHE) eletiva no programa de controle populacional realizado no HOVET UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido no HOVET UNISA um felino, fêmea, da raça Bengal, de 8 meses de idade para ser submetido a OHE eletiva no programa de controle populacional animal - PROCOPA. A paciente não apresentava alterações ao exame físico, sendo submetido a anestesia intravenosa total e posicionado em decúbito dorsal, após antisepsia da região e realização da laparotomia, seguindo-se a técnica 3 pinças de OHE clássica amplamente descrita na literatura, iniciou-se pela retirada do ovário esquerdo, porém quando visualizado o ovário contralateral, foi perceptível uma alteração na sua forma e tamanho.			
<b>RESULTADOS</b>	O material foi enviado para exame histopatológico que constatou no ovário esquerdo e cornos uterinos características histomorfológicas preservadas, diferente do que é mais usual e encontrado em literatura. Enquanto que o ovário direito apresentava formato reniforme com ausência de folículos ovarianos, intensa deposição de colágeno e fibroplasia difusa.			
<b>CONCLUSOES</b>	A hipoplasia ovariana felina apesar de rara deve ser levada em consideração como diagnóstico quando o ovário não é encontrado durante a OHE, e sua confirmação histológica serve inclusive para descartar uma retirada ovariana parcial e consequente ocorrência de síndrome de ovário remanescente.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Aguirra LRVM, Monger SGB, Moraes LA, Marsolla EH, Pereira WLA. Hipoplasia ovárica-uterina bilateral em felídeo doméstico - relato de caso. Revista Brasileira Medicina Veterinária. 2016; 38 (2): 108-110. 2. Susan L. Feline reproduction. Problems and clinical challenges. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2011; 13: 508-515. 3. Souza CCR. Agenesia e hipoplasia ovariana em felino SRD. Realeza: Universidade Federal da Fronteira Sul, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14589	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor	Status	Apresentação
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Jaqueline Candido de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Hipoplasia ovariana em felino da raça Bengal - relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>As doenças reprodutivas de origem congênita são extremamente raras nas espécies domésticas, principalmente na espécie felina. A hipoplasia ovariana é a doença de falha de desenvolvimento gonadal mais frequente, sendo ovário esquerdo o mais acometido. Nessa situação o órgão apresenta macroscopicamente tamanho diminuído, funcionalidade comprometida, com diminuição significativa no número de células, portanto, nos casos de ocorrência bilateral há infertilidade, com anestro permanente, enquanto que nos casos unilaterais pode se observar subfertilidade. Não há outras manifestações clínicas. Devido ao caráter hereditário, esses casos têm como indicação a retirada dessa fêmea da reprodução. Apesar do exame ultrassonográfico ser útil na avaliação pré-cirúrgica, o diagnóstico normalmente é realizado durante o trans cirúrgico e confirmado no exame histopatológico. Na hipoplasia ovariana há ausência dos folículos de Graaf, devido a falha no desenvolvimento germinativo na embriogênese, ou, se presente não respondem ao estímulo hipofisário. Histologicamente há um aumento do tecido conjuntivo fibroso com ausência de desenvolvimento folicular e corpo lúteo.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de hipoplasia ovariana em felino submetido ao procedimento de ovariosterectomia (OHE) eletiva no programa de controle populacional realizado no HOVET UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido no HOVET UNISA um felino, fêmea, da raça Bengal, de 8 meses de idade para ser submetido a OHE eletiva no programa de controle populacional animal - PROCOPA. A paciente não apresentava alterações ao exame físico, sendo submetido a anestesia intravenosa total e posicionado em decúbito dorsal, após antisepsia da região e realização da laparotomia, seguindo-se a técnica 3 pinças de OHE clássica amplamente descrita na literatura, iniciou-se pela retirada do ovário esquerdo, porém quando visualizado o ovário contralateral, foi perceptível uma alteração na sua forma e tamanho.			
<b>RESULTADOS</b>	O material foi enviado para exame histopatológico que constatou no ovário esquerdo e cornos uterinos características histomorfológicas preservadas, diferente do que é mais usual e encontrado em literatura. Enquanto que o ovário direito apresentava formato reniforme com ausência de folículos ovarianos, intensa deposição de colágeno e fibroplasia difusa.			
<b>CONCLUSOES</b>	A hipoplasia ovariana felina apesar de rara deve ser levada em consideração como diagnóstico quando o ovário não é encontrado durante a OHE, e sua confirmação histológica serve inclusive para descartar uma retirada ovariana parcial e consequente ocorrência de síndrome de ovário remanescente.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Aguirra LRVM, Monger SGB, Moraes LA, Marsolla EH, Pereira WLA. Hipoplasia ovárica-uterina bilateral em felídeo doméstico - relato de caso. Revista Brasileira Medicina Veterinária. 2016; 38 (2): 108-110. 2. Susan L. Feline reproduction. Problems and clinical challenges. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2011; 13: 508-515. 3. Souza CCR. Agenesia e hipoplasia ovariana em felino SRD. Realeza: Universidade Federal da Fronteira Sul, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14590	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2120879 - GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Leiomiossarcoma uterino em cadela – Relato de Caso			
<b>INTRODUCAO</b>	A incidência de neoplasias uterinas em cadelas é baixa, sendo o leiomiossarcoma (LMS) o mais envolvido nesses casos. É um sarcoma de musculatura lisa de origem não elucidada, que pode sofrer influência dos hormônios sexuais ou por malignização de um leiomioma prévio. Os sintomas geralmente são inespecíficos, podendo haver distensão abdominal pelo crescimento da massa neoplásica. O diagnóstico definitivo é realizado a partir da análise histopatológica após exérese da neoformação. Outros métodos diagnósticos de imagem, como a ultrassonografia, permitem localizar e mensurar a massa tumoral. Quando não há evidências de metástase e é possível a remoção completa, o prognóstico para essa neoplasia varia de bom a reservado, apesar de característica recidivante.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de leiomiossarcoma uterino em cadela atendida no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendida no HOVET UNISA uma cadela, SRD, de 14 anos, não castrada, não sabendo informar a data do último cio, apresentando queixa de abaulamento abdominal, além de hiporexia, oligodipsia e episódios eméticos. Ao exame físico de admissão, paciente apresentava-se com moderada desidratação (7%), abdômen tenso e abaulado, e demais parâmetros dentro os limites de normalidade. Ultrassonografia abdominal foi visualizado estrutura exuberante, arredondada, contornos irregulares de ecogenicidade mista e heterogênea medindo 20,78 cm x 13,27 cm em região mesogástrica, com confluência íntima ao útero. Além disso, foram realizados ecocardiograma, eletrocardiograma, raio x de tórax, hemograma, função renal e hepática. Indicada ovariectomia, animal foi submetido à anestesia geral inalatória, posicionado em decúbito dorsal para antissepsia da região, seguida para celiotomia e ovariectomia, haviam aderências do corpo uterino ao cólon e vesícula urinária.			
<b>RESULTADOS</b>	O material retirado com tamanho de 44,5 cm x 30,9 x 4,8 cm foi submetido a análise histopatológica constatando proliferação neoplásica não encapsulada no útero com arranjo celular em feixes, com células fusiformes, grandes, citoplasma amplo, não delimitado, núcleo ovalado a alongado, pleomorfismo celular moderado, índice mitótico moderado e áreas de necrose multifocal, compatível com LMS. Sendo o tratamento de eleição a remoção cirúrgica, sem necessidade de associação de terapia quimioterápica adjuvante pelas margens histopatológicas estarem livres e sem índice de metástase pela radiografia torácica.			
<b>CONCLUSOES</b>	O leiomiossarcoma deve ser considerado como diagnóstico diferencial em neoformações uterinas. A ultrassonografia abdominal auxiliou na determinação da origem, porém confirmado por exame histopatológico. A exérese da neoformação foi realizada como terapia de eleição clínico cirúrgico obtendo-se um prognóstico favorável.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Etges GAF, Canal C, Ribeiro FV, Sonaglio F, Zaffari ELP, Biondo N, Prati LA. Leiomiossarcoma uterino em canino Golden Retriever. Anais do Congresso Regional de Medicina Veterinária. 2014: -10. 2. Sousa EO. Leiomiossarcoma de coto uterino em cadela - relato de caso. Nossa Senhora da Glória: Universidade Federal de Sergipe, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) 3. Junior FAAC, Santana GM, Magnabosco MW, Freitas VR, Felipe MC, Robaldo GF, Fadrique FHC, Grecco FB, Vives PS. Exérese de carcinoma hepatocelular e leiomiossarcoma vaginal em uma cadela: relato de caso. PUBVET. 2022; 16 (5): 1-8.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14590	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3534634 - GIOVANNA FUNISCELLO DE SOUSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Leiomiossarcoma uterino em cadela – Relato de Caso			
<b>INTRODUCA O</b>	A incidência de neoplasias uterinas em cadelas é baixa, sendo o leiomiossarcoma (LMS) o mais envolvido nesses casos. É um sarcoma de musculatura lisa de origem não elucidada, que pode sofrer influência dos hormônios sexuais ou por malignização de um leiomioma prévio. Os sintomas geralmente são inespecíficos, podendo haver distensão abdominal pelo crescimento da massa neoplásica. O diagnóstico definitivo é realizado a partir da análise histopatológica após exérese da neoformação. Outros métodos diagnósticos de imagem, como a ultrassonografia, permitem localizar e mensurar a massa tumoral. Quando não há evidências de metástase e é possível a remoção completa, o prognóstico para essa neoplasia varia de bom a reservado, apesar de característica recidivante.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de leiomiossarcoma uterino em cadela atendida no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendida no HOVET UNISA uma cadela, SRD, de 14 anos, não castrada, não sabendo informar a data do último cio, apresentando queixa de abaulamento abdominal, além de hiporexia, oligodipsia e episódios eméticos. Ao exame físico de admissão, paciente apresentava-se com moderada desidratação (7%), abdômen tenso e abaulado, e demais parâmetros dentro os limites de normalidade. Ultrassonografia abdominal foi visualizado estrutura exuberante, arredondada, contornos irregulares de ecogenicidade mista e heterogênea medindo 20,78 cm x 13,27 cm em região mesogástrica, com confluência íntima ao útero. Além disso, foram realizados ecocardiograma, eletrocardiograma, raio x de tórax, hemograma, função renal e hepática. Indicada ovariohisterectomia, animal foi submetido à anestesia geral inalatória, posicionado em decúbito dorsal para antissepsia da região, seguida para celiotomia e ovariohisterectomia, haviam aderências do corpo uterino ao cólon e vesícula urinária.			
<b>RESULTADO S</b>	O material retirado com tamanho de 44,5 cm x 30,9 x 4,8 cm foi submetido a análise histopatológica constatando proliferação neoplásica não encapsulada no útero com arranjo celular em feixes, com células fusiformes, grandes, citoplasma amplo, não delimitado, núcleo ovalado a alongado, pleomorfismo celular moderado, índice mitótico moderado e áreas de necrose multifocal, compatível com LMS. Sendo o tratamento de eleição a remoção cirúrgica, sem necessidade de associação de terapia quimioterápica adjuvante pelas margens histopatológicas estarem livres e sem índice de metástase pela radiografia torácica.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O leiomiossarcoma deve ser considerado como diagnóstico diferencial em neoformações uterinas. A ultrassonografia abdominal auxiliia na determinação da origem, porém confirmado por exame histopatológico. A exérese da neoformação foi realizada como terapia de eleição clínico cirúrgico obtendo-se um prognóstico favorável.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Etges GAF, Canal C, Ribeiro FV, Sonaglio F, Zaffari ELP, Biondo N, Prati LA. Leiomiossarcoma uterino em canino Golden Retriever. Anais do Congresso Regional de Medicina Veterinária. 2014: -10. 2. Sousa EO. Leiomiossarcoma de coto uterino em cadela - relato de caso. Nossa Senhora da Glória: Universidade Federal de Sergipe, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) 3. Junior FAAC, Santana GM, Magnabosco MW, Freitas VR, Felipe MC, Robaldo GF, Fadrique FHC, Grecco FB, Vives PS. Exérese de carcinoma hepatocelular e leiomiossarcoma vaginal em uma cadela: relato de caso. PUBVET. 2022; 16 (5): 1-8.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14590	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3540065 - SANDRO SCHERER	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Leiomiossarcoma uterino em cadela – Relato de Caso			
<b>INTRODUCAO</b>	A incidência de neoplasias uterinas em cadelas é baixa, sendo o leiomiossarcoma (LMS) o mais envolvido nesses casos. É um sarcoma de musculatura lisa de origem não elucidada, que pode sofrer influência dos hormônios sexuais ou por malignização de um leiomioma prévio. Os sintomas geralmente são inespecíficos, podendo haver distensão abdominal pelo crescimento da massa neoplásica. O diagnóstico definitivo é realizado a partir da análise histopatológica após exérese da neoformação. Outros métodos diagnósticos de imagem, como a ultrassonografia, permitem localizar e mensurar a massa tumoral. Quando não há evidências de metástase e é possível a remoção completa, o prognóstico para essa neoplasia varia de bom a reservado, apesar de característica recidivante.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de leiomiossarcoma uterino em cadela atendida no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendida no HOVET UNISA uma cadela, SRD, de 14 anos, não castrada, não sabendo informar a data do último cio, apresentando queixa de abaulamento abdominal, além de hiporexia, oligodipsia e episódios eméticos. Ao exame físico de admissão, paciente apresentava-se com moderada desidratação (7%), abdômen tenso e abaulado, e demais parâmetros dentro os limites de normalidade. Ultrassonografia abdominal foi visualizado estrutura exuberante, arredondada, contornos irregulares de ecogenicidade mista e heterogênea medindo 20,78 cm x 13,27 cm em região mesogástrica, com confluência íntima ao útero. Além disso, foram realizados ecocardiograma, eletrocardiograma, raio x de tórax, hemograma, função renal e hepática. Indicada ovariectomia, animal foi submetido à anestesia geral inalatória, posicionado em decúbito dorsal para antissepsia da região, seguida para celiotomia e ovariectomia, haviam aderências do corpo uterino ao cólon e vesícula urinária.			
<b>RESULTADOS</b>	O material retirado com tamanho de 44,5 cm x 30,9 x 4,8 cm foi submetido a análise histopatológica constatando proliferação neoplásica não encapsulada no útero com arranjo celular em feixes, com células fusiformes, grandes, citoplasma amplo, não delimitado, núcleo ovalado a alongado, pleomorfismo celular moderado, índice mitótico moderado e áreas de necrose multifocal, compatível com LMS. Sendo o tratamento de eleição a remoção cirúrgica, sem necessidade de associação de terapia quimioterápica adjuvante pelas margens histopatológicas estarem livres e sem índice de metástase pela radiografia torácica.			
<b>CONCLUSOES</b>	O leiomiossarcoma deve ser considerado como diagnóstico diferencial em neoformações uterinas. A ultrassonografia abdominal auxiliou na determinação da origem, porém confirmado por exame histopatológico. A exérese da neoformação foi realizada como terapia de eleição clínico cirúrgico obtendo-se um prognóstico favorável.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Etges GAF, Canal C, Ribeiro FV, Sonaglio F, Zaffari ELP, Biondo N, Prati LA. Leiomiossarcoma uterino em canino Golden Retriever. Anais do Congresso Regional de Medicina Veterinária. 2014: -10. 2. Sousa EO. Leiomiossarcoma de coto uterino em cadela - relato de caso. Nossa Senhora da Glória: Universidade Federal de Sergipe, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) 3. Junior FAAC, Santana GM, Magnabosco MW, Freitas VR, Felipe MC, Robaldo GF, Fadrique FHC, Grecco FB, Vives PS. Exérese de carcinoma hepatocelular e leiomiossarcoma vaginal em uma cadela: relato de caso. PUBVET. 2022; 16 (5): 1-8.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14590	Fisiopatologia da Reprodução Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4086449 - BÁRBARA SANTOS DE MORAES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	Leiomiossarcoma uterino em cadela – Relato de Caso			
<b>INTRODUCAO</b>	A incidência de neoplasias uterinas em cadelas é baixa, sendo o leiomiossarcoma (LMS) o mais envolvido nesses casos. É um sarcoma de musculatura lisa de origem não elucidada, que pode sofrer influência dos hormônios sexuais ou por malignização de um leiomioma prévio. Os sintomas geralmente são inespecíficos, podendo haver distensão abdominal pelo crescimento da massa neoplásica. O diagnóstico definitivo é realizado a partir da análise histopatológica após exérese da neoformação. Outros métodos diagnósticos de imagem, como a ultrassonografia, permitem localizar e mensurar a massa tumoral. Quando não há evidências de metástase e é possível a remoção completa, o prognóstico para essa neoplasia varia de bom a reservado, apesar de característica recidivante.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de leiomiossarcoma uterino em cadela atendida no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendida no HOVET UNISA uma cadela, SRD, de 14 anos, não castrada, não sabendo informar a data do último cio, apresentando queixa de abaulamento abdominal, além de hiporexia, oligodipsia e episódios eméticos. Ao exame físico de admissão, paciente apresentava-se com moderada desidratação (7%), abdômen tenso e abaulado, e demais parâmetros dentro os limites de normalidade. Ultrassonografia abdominal foi visualizado estrutura exuberante, arredondada, contornos irregulares de ecogenicidade mista e heterogênea medindo 20,78 cm x 13,27 cm em região mesogástrica, com confluência íntima ao útero. Além disso, foram realizados ecocardiograma, eletrocardiograma, raio x de tórax, hemograma, função renal e hepática. Indicada ovariectomia, animal foi submetido à anestesia geral inalatória, posicionado em decúbito dorsal para antissepsia da região, seguida para celiotomia e ovariectomia, haviam aderências do corpo uterino ao cólon e vesícula urinária.			
<b>RESULTADOS</b>	O material retirado com tamanho de 44,5 cm x 30,9 x 4,8 cm foi submetido a análise histopatológica constatando proliferação neoplásica não encapsulada no útero com arranjo celular em feixes, com células fusiformes, grandes, citoplasma amplo, não delimitado, núcleo ovalado a alongado, pleomorfismo celular moderado, índice mitótico moderado e áreas de necrose multifocal, compatível com LMS. Sendo o tratamento de eleição a remoção cirúrgica, sem necessidade de associação de terapia quimioterápica adjuvante pelas margens histopatológicas estarem livres e sem índice de metástase pela radiografia torácica.			
<b>CONCLUSOES</b>	O leiomiossarcoma deve ser considerado como diagnóstico diferencial em neoformações uterinas. A ultrassonografia abdominal auxiliou na determinação da origem, porém confirmado por exame histopatológico. A exérese da neoformação foi realizada como terapia de eleição clínico cirúrgico obtendo-se um prognóstico favorável.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Etges GAF, Canal C, Ribeiro FV, Sonaglio F, Zaffari ELP, Biondo N, Prati LA. Leiomiossarcoma uterino em canino Golden Retriever. Anais do Congresso Regional de Medicina Veterinária. 2014: -10. 2. Sousa EO. Leiomiossarcoma de coto uterino em cadela - relato de caso. Nossa Senhora da Glória: Universidade Federal de Sergipe, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) 3. Junior FAAC, Santana GM, Magnabosco MW, Freitas VR, Felipe MC, Robaldo GF, Fadrique FHC, Grecco FB, Vives PS. Exérese de carcinoma hepatocelular e leiomiossarcoma vaginal em uma cadela: relato de caso. PUBVET. 2022; 16 (5): 1-8.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14593	Epidemiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4617126 - ADRIANA MAIA FERNANDES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico da Leishmaniose Visceral e Tegumentar na região sudeste do Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A leishmaniose é uma doença parasitária endêmica e de notificação compulsória no Brasil que está ligada às condições socioeconômicas, como desnutrição, deslocamento populacional, moradia precária, sistema imunológico fraco e falta de recursos. Logo, sua condição impacta a qualidade de vida de uma determinada população.			
<b>OBJETIVOS</b>	Traçar o perfil epidemiológico da leishmaniose Visceral (LV) e Tegumentar (LT) na região sudeste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Espírito Santo, entre os anos de 2007 e 2021.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo observacional e descritivo, com coleta de dados secundário do DATASUS / Tabnet no período de 2007 a 2021, referentes aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Espírito Santo. As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária e escolaridade. Os dados coletados foram colocados em tabelas e gráficos para a sua posterior análise.			
<b>RESULTADOS</b>	No período analisado, a prevalência de Leishmaniose Visceral (LV) foi de 9.011 e de Leishmaniose Tegumentar (LT) de 27.899, sendo 6.322 e 21.141 respectivamente para casos novos em Minas Gerais (MG). Quanto à prevalência do sexo, o masculino é o mais prevalente para as duas vertentes da doença, com 6.518 para LV (sendo, 4.549 em MG) e 19.148 para a LT (sendo, 14.202 em MG). A L. Visceral acometeu mais as pessoas entre a 5ª e 8ª série do ensino fundamental, com 855 (sendo 437 em MG), já a L. Tegumentar, mais as pessoas entre a 1ª e 4ª série do ensino fundamental, com 4.768, dessas 3.698 em MG. As características de etnia parda e a idade entre 40 e 59 anos foram as mais prevalentes, com 4.514 (sendo, 3.672 em MG) e 2.341 (sendo destes, 1.655 em MG) respectivamente para a LV e com 13.205 (11.198 para a etnia parda em MG) e 9.943 (sendo, 7.365 de idades entre 40-59 anos para MG), respectivamente para a LT.			
<b>CONCLUSOES</b>	De acordo com os dados coletados no período, o estado de Minas Gerais é o que possui maior prevalência de Leishmaniose Visceral e Tegumentar para todos os parâmetros comparados, como idade, sexo, escolaridade e etnia, reforçando dados históricos que apontam esse mesmo perfil.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. WORD Health Organization. Global Health Observatory (GHO) Data. Leishmaniasis: situation and trends. Geneva: World Health Organization; 2010 [citado 2010 out 28]. Disponível em: (#60)http://www.who.int/gho/neglected_diseases/leishmaniasis/en/#62. Acesso em: 28 de maio de 2022. 2. NEVES, DP. Parasitologia Humana, 11ª ed, São Paulo, Atheneu, 2005. 3. BASANO, S. A. C.; ARANHA, L. M. Leishmaniose tegumentar americana: histórico, epidemiologia e perspectivas de controle. Revista Brasileira de Epidemiologia [online]. 2004, v. 7, n. 3 pp. 328-337. 4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Leishmaniose visceral grave: normas e condutas, Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.60 p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14593	Epidemiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4714741 - LOISLENE GUIMARAES BOVI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico da Leishmaniose Visceral e Tegumentar na região sudeste do Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A leishmaniose é uma doença parasitária endêmica e de notificação compulsória no Brasil que está ligada às condições socioeconômicas, como desnutrição, deslocamento populacional, moradia precária, sistema imunológico fraco e falta de recursos. Logo, sua condição impacta a qualidade de vida de uma determinada população.			
<b>OBJETIVOS</b>	Traçar o perfil epidemiológico da leishmaniose Visceral (LV) e Tegumentar (LT) na região sudeste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Espírito Santo, entre os anos de 2007 e 2021.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo observacional e descritivo, com coleta de dados secundário do DATASUS / Tabnet no período de 2007 a 2021, referentes aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Espírito Santo. As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária e escolaridade. Os dados coletados foram colocados em tabelas e gráficos para a sua posterior análise.			
<b>RESULTADOS</b>	No período analisado, a prevalência de Leishmaniose Visceral (LV) foi de 9.011 e de Leishmaniose Tegumentar (LT) de 27.899, sendo 6.322 e 21.141 respectivamente para casos novos em Minas Gerais (MG). Quanto à prevalência do sexo, o masculino é o mais prevalente para as duas vertentes da doença, com 6.518 para LV (sendo, 4.549 em MG) e 19.148 para a LT (sendo, 14.202 em MG). A L. Visceral acometeu mais as pessoas entre a 5ª e 8ª série do ensino fundamental, com 855 (sendo 437 em MG), já a L. Tegumentar, mais as pessoas entre a 1ª e 4ª série do ensino fundamental, com 4.768, dessas 3.698 em MG. As características de etnia parda e a idade entre 40 e 59 anos foram as mais prevalentes, com 4.514 (sendo, 3.672 em MG) e 2.341 (sendo destes, 1.655 em MG) respectivamente para a LV e com 13.205 (11.198 para a etnia parda em MG) e 9.943 (sendo, 7.365 de idades entre 40-59 anos para MG), respectivamente para a LT.			
<b>CONCLUSOES</b>	De acordo com os dados coletados no período, o estado de Minas Gerais é o que possui maior prevalência de Leishmaniose Visceral e Tegumentar para todos os parâmetros comparados, como idade, sexo, escolaridade e etnia, reforçando dados históricos que apontam esse mesmo perfil.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. WORD Health Organization. Global Health Observatory (GHO) Data. Leishmaniasis: situation and trends. Geneva: World Health Organization; 2010 [citado 2010 out 28]. Disponível em: (#60)http://www.who.int/gho/neglected_diseases/leishmaniasis/en/(#62). Acesso em: 28 de maio de 2022. 2. NEVES, DP. Parasitologia Humana, 11ª ed, São Paulo, Atheneu, 2005. 3. BASANO, S. A. C.; ARANHA, L. M. Leishmaniose tegumentar americana: histórico, epidemiologia e perspectivas de controle. Revista Brasileira de Epidemiologia [online]. 2004, v. 7, n. 3 pp. 328-337. 4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Leishmaniose visceral grave: normas e condutas, Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.60 p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14595	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4832868 - GIOVANNA RIOS ESTRADIOTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	Relação de distúrbios metabólicos nos diferentes tipos de alopecia e a eficácia de seus tratamentos			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Alopecia é um distúrbio de crescimento capilar, onde se observa a falta ou perda de cabelo em lugares onde espera-se a presença do mesmo. A doença pode apresentar diversos diagnósticos, sendo estes classificados como alopecias cicatriciais, na qual folículos pilosos não são preservados ou não-cicatriciais, em que folículos pilosos são preservados. As principais alopecias não-cicatriciais são: alopecia androgenética (AAG), alopecia areata (AA) e eflúvio telógeno (ET), que são tratáveis com estímulos de crescimento e controle de inflamação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia a queixa de alopecia está entre as 10 maiores nos consultórios dessa especialidade, em pacientes de 15 a 30 anos. Ademais, o cabelo é uma característica individual de cada pessoa que mesmo não desempenhando uma função vital, exerce um papel importante no convívio social e até mesmo próprio. Visto isso, a queda capilar normalmente desencadeia um impacto emocional severo no indivíduo e estudos demonstram uma relação entre alopecias e comorbidades psicossociais e psiquiátricas (Atrin Toussi et al. 2022).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Determinar a relação entre distúrbios metabólicos e os tipos de alopecia e a eficácia dos seus variados tratamentos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise descritiva dos exames laboratoriais de pacientes voluntários com alopecia para determinação da relação entre o perfil bioquímico e o nível de queda capilar bem como determinação do sucesso do tratamento relacionando perfil metabólico e nível de alopecia.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Determinar a eficácia dos diferentes tipos de tratamento para os diversos tipos de alopecia é essencial para uma melhor compreensão do mecanismo da doença como para um melhor prognóstico do paciente. Existem terapias e tratamentos medicamentosos para os diferentes tipos de alopecia. Na AAG, o tratamento é baseado em intradermoterapia a partir do Minoxidil (solução de 2% ou 5%) e uso oral da Finasterida de 1mg por dia. O tratamento não medicamentoso pode se dar por fitoterápicos, Terapia com Laser e com células tronco. Atentando para a AA pode-se fazer o uso intradermal de 3 mL da triancinolona hexacetona (corticóide), em pacientes cujo 50% do couro cabeludo já foi afetado. Outras terapias incluem o uso de corticosteróides, minoxidil e imunoterapia. Por fim, o ET cessa dentro de 2 a 6 meses. O tratamento envolve descobrir e "eliminar" seu fator desencadeante, podendo ser medicamentos, estresse, traumas, entre outros. Todavia, esse distúrbio pode durar anos devido ao estresse contínuo e a terapêutica não aderida corretamente. Além disso, a compreensão sobre presença de distúrbios e síndromes (conjunto de fatores que predizem doenças cardiovasculares) metabólicas em pacientes com alopecia, como doenças tireoidianas e deficiência de ferritina, poderia melhorar o domínio da etiopatogenia da doença como melhores abordagens de tratamento.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O entendimento sobre a relação de transtornos metabólicos e alopecia, favorece o sucesso do tratamento. Dessa forma, aumenta chances de reversão de alopecias não-cicatriciais, gerando mais resultados e satisfação dos pacientes, além de promoção de saúde no controle das doenças metabólicas.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1. Gordon, Katherine. et al. Alopecia: evaluation and treatment, tandfonline, 2022 Disponível em : <a href="https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.2147/CCID.S101827">https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.2147/CCID.S101827</a> scroll=top Acesso em: 18 de outubro de 2023  2. Alboud, Ahmad. et al. Alopecia. NIM,2023 Disponível em : <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538178/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538178/</a> Acesso em: 18 de outubro de 2023</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14595	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4977785 - PAULA DA SILVA QUEIROZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	Relação de distúrbios metabólicos nos diferentes tipos de alopecia e a eficácia de seus tratamentos			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Alopecia é um distúrbio de crescimento capilar, onde se observa a falta ou perda de cabelo em lugares onde espera-se a presença do mesmo. A doença pode apresentar diversos diagnósticos, sendo estes classificados como alopecias cicatriciais, na qual folículos pilosos não são preservados ou não-cicatriciais, em que folículos pilosos são preservados. As principais alopecias não-cicatriciais são: alopecia androgenética (AAG), alopecia areata (AA) e eflúvio telógeno (ET), que são tratáveis com estímulos de crescimento e controle de inflamação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia a queixa de alopecia está entre as 10 maiores nos consultórios dessa especialidade, em pacientes de 15 a 30 anos. Ademais, o cabelo é uma característica individual de cada pessoa que mesmo não desempenhando uma função vital, exerce um papel importante no convívio social e até mesmo próprio. Visto isso, a queda capilar normalmente desencadeia um impacto emocional severo no indivíduo e estudos demonstram uma relação entre alopecias e comorbidades psicossociais e psiquiátricas (Atrin Toussi et al. 2022).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Determinar a relação entre distúrbios metabólicos e os tipos de alopecia e a eficácia dos seus variados tratamentos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise descritiva dos exames laboratoriais de pacientes voluntários com alopecia para determinação da relação entre o perfil bioquímico e o nível de queda capilar bem como determinação do sucesso do tratamento relacionando perfil metabólico e nível de alopecia.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Determinar a eficácia dos diferentes tipos de tratamento para os diversos tipos de alopecia é essencial para uma melhor compreensão do mecanismo da doença como para um melhor prognóstico do paciente. Existem terapias e tratamentos medicamentosos para os diferentes tipos de alopecia. Na AAG, o tratamento é baseado em intradermoterapia a partir do Minoxidil (solução de 2% ou 5%) e uso oral da Finasterida de 1mg por dia. O tratamento não medicamentoso pode se dar por fitoterápicos, Terapia com Laser e com células tronco. Atentando para a AA pode-se fazer o uso intradermal de 3 mL da triancinolona hexacetona (corticóide), em pacientes cujo 50% do couro cabeludo já foi afetado. Outras terapias incluem o uso de corticosteróides, minoxidil e imunoterapia. Por fim, o ET cessa dentro de 2 a 6 meses. O tratamento envolve descobrir e "eliminar" seu fator desencadeante, podendo ser medicamentos, estresse, traumas, entre outros. Todavia, esse distúrbio pode durar anos devido ao estresse contínuo e a terapêutica não aderida corretamente. Além disso, a compreensão sobre presença de distúrbios e síndromes (conjunto de fatores que predizem doenças cardiovasculares) metabólicas em pacientes com alopecia, como doenças tireoidianas e deficiência de ferritina, poderia melhorar o domínio da etiopatogenia da doença como melhores abordagens de tratamento.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O entendimento sobre a relação de transtornos metabólicos e alopecia, favorece o sucesso do tratamento. Dessa forma, aumenta chances de reversão de alopecias não-cicatriciais, gerando mais resultados e satisfação dos pacientes, além de promoção de saúde no controle das doenças metabólicas.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1. Gordon, Katherine. et al. Alopecia: evaluation and treatment, tandfonline, 2022 Disponível em : <a href="https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.2147/CCID.S101827">https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.2147/CCID.S101827</a> scroll=top Acesso em: 18 de outubro de 2023  2. Alboud, Ahmad. et al. Alopecia. NIM,2023 Disponível em : <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538178/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538178/</a> Acesso em: 18 de outubro de 2023</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14595	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5056845 - LUCAS MOREIRA NATRIELLI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	Relação de distúrbios metabólicos nos diferentes tipos de alopecia e a eficácia de seus tratamentos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Alopecia é um distúrbio de crescimento capilar, onde se observa a falta ou perda de cabelo em lugares onde espera-se a presença do mesmo. A doença pode apresentar diversos diagnósticos, sendo estes classificados como alopecias cicatriciais, na qual folículos pilosos não são preservados ou não-cicatriciais, em que folículos pilosos são preservados. As principais alopecias não-cicatriciais são: alopecia androgenética (AAG), alopecia areata (AA) e eflúvio telógeno (ET), que são tratáveis com estímulos de crescimento e controle de inflamação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia a queixa de alopecia está entre as 10 maiores nos consultórios dessa especialidade, em pacientes de 15 a 30 anos. Ademais, o cabelo é uma característica individual de cada pessoa que mesmo não desempenhando uma função vital, exerce um papel importante no convívio social e até mesmo próprio. Visto isso, a queda capilar normalmente desencadeia um impacto emocional severo no indivíduo e estudos demonstram uma relação entre alopecias e comorbidades psicossociais e psiquiátricas (Atrin Toussi et al. 2022).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Determinar a relação entre distúrbios metabólicos e os tipos de alopecia e a eficácia dos seus variados tratamentos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise descritiva dos exames laboratoriais de pacientes voluntários com alopecia para determinação da relação entre o perfil bioquímico e o nível de queda capilar bem como determinação do sucesso do tratamento relacionando perfil metabólico e nível de alopecia.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Determinar a eficácia dos diferentes tipos de tratamento para os diversos tipos de alopecia é essencial para uma melhor compreensão do mecanismo da doença como para um melhor prognóstico do paciente. Existem terapias e tratamentos medicamentosos para os diferentes tipos de alopecia. Na AAG, o tratamento é baseado em intradermoterapia a partir do Minoxidil (solução de 2% ou 5%) e uso oral da Finasterida de 1mg por dia. O tratamento não medicamentoso pode se dar por fitoterápicos, Terapia com Laser e com células tronco. Atentando para a AA pode-se fazer o uso intradermal de 3 mL da triancinolona hexacetona (corticóide), em pacientes cujo 50% do couro cabeludo já foi afetado. Outras terapias incluem o uso de corticosteróides, minoxidil e imunoterapia. Por fim, o ET cessa dentro de 2 a 6 meses. O tratamento envolve descobrir e "eliminar" seu fator desencadeante, podendo ser medicamentos, estresse, traumas, entre outros. Todavia, esse distúrbio pode durar anos devido ao estresse contínuo e a terapêutica não aderida corretamente. Além disso, a compreensão sobre presença de distúrbios e síndromes (conjunto de fatores que predizem doenças cardiovasculares) metabólicas em pacientes com alopecia, como doenças tireoidianas e deficiência de ferritina, poderia melhorar o domínio da etiopatogenia da doença como melhores abordagens de tratamento.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	O entendimento sobre a relação de transtornos metabólicos e alopecia, favorece o sucesso do tratamento. Dessa forma, aumenta chances de reversão de alopecias não-cicatriciais, gerando mais resultados e satisfação dos pacientes, além de promoção de saúde no controle das doenças metabólicas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Gordon, Katherine. et al. Alopecia: evaluation and treatment, tandfonline, 2022 Disponível em : <a href="https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.2147/CCID.S10182?scroll=top">https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.2147/CCID.S10182?scroll=top</a> Acesso em: 18 de outubro de 2023  2. Alboud, Ahmad. et al. Alopecia. NIM,2023 Disponível em : <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538178/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538178/</a> Acesso em: 18 de outubro de 2023</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14599	Ciências Biológicas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3500110 - BRUNA MIKA SENZAKI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	Levantamento da ictiofauna do reservatório Guarapiranga e suas implicações para a saúde ambiental da Zona Sul Paulistana.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A bacia do Alto Paraná é a maior ecorregião de água doce fora da Amazônia e é, em quase sua totalidade, brasileira. Essa bacia hidrográfica conta com aproximadamente 310 espécies de peixes catalogadas, sendo quase metade destas endêmicas. Localizado dentro de uma das maiores regiões metropolitanas do planeta, a represa Guarapiranga é um dos mais importantes reservatórios de água da região, abastecendo milhões de habitantes da zona sul da metrópole. Atualmente, o lago possui profundidade máxima de 13 metros e cerca de 33 km2 de espelho d'água. Contudo, a expansão urbana acarreta não só a perda de habitat para as espécies nativas, mas também obriga estas a ocuparem áreas modificadas e se adaptarem à presença de espécies domésticas e ao homem. Portanto, é fundamental compreender e monitorar a ictiofauna do reservatório, visto que as espécies encontradas podem ser importantes para o equilíbrio sistêmico e para o melhor planejamento ambiental da região.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do estudo consiste em realizar o levantamento ictiofaunístico do reservatório Guarapiranga e avaliar suas implicações para a saúde ambiental da Zona Sul Paulistana, assim como ampliar o acervo científico de peixes coletados e criar um catálogo fotográfico das espécies.			
<b>METODOLOGIA</b>	Até o momento, o estudo foi empregado na região do reservatório próximo ao Parque Jaceguava e ao Setor Sul do Rodoanel. O levantamento da ictiofauna foi realizado por meio de coletas regulares de peixes em diferentes extratos da cadeia trófica local. Foram aplicadas combinações de diferentes métodos de captura (puçá, redes de arrasto, redes de espera e covos de arame), para obter amostras mais próximas da totalidade da ictiofauna da represa. A identificação das espécies foi realizada com uso de chaves dicotômicas e quando necessário consultas a especialistas.			
<b>RESULTADOS</b>	O levantamento teve início no começo de setembro de 2023, neste período foram coletadas ao menos dez espécies de peixes, das quais oito já foram identificadas a nível específico e duas de gênero, sendo: <i>Hoplias malabaricus</i> , <i>Hyphessobrycon eques</i> , <i>Psalidodon fasciatus</i> , <i>Serrasalmus marginatus</i> , <i>Hoplosternum littorale</i> , <i>Rhamdia quelen</i> , <i>Gymnotus carapo</i> , <i>Saxatilia britskii</i> , além de <i>Psalidodon</i> sp. e <i>Geophagus</i> sp. Quando comparado ao levantamento realizado por Barbieri e colaboradores (2000), alterações significativas foram constatadas na ictiofauna local, como a introdução da espécie <i>Hyphessobrycon eques</i> (Mato Grosso), não nativo da região. Houve também um aumento da variedade de espécies capturadas, pois segundo os autores do estudo anterior, a coleta de tilápia-do-nylo ( <i>Oreochromis niloticus</i> ) era predominante, aproximadamente 90%, e até o momento não foi coletada durante a presente pesquisa.			
<b>CONCLUSOES</b>	Neste contexto, é importante avaliar os impactos que a alteração faunística está gerando, para assim compreender se o equilíbrio sistêmico da região está sendo resguardado.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Abell, R., Thieme, M.L., Revenga, C., Bryer, M., Kottelat, M., Bogutskaya, N., Coad, B., Mandrak, N., Balderas, S.C., Bussing, W., Stiassny, M.L.J., Skelton, P., Allen, G.R., Unmack, P., Naseka, A., Ng, R., Sindorf, N., Robertson, J., Armijo, E., Higgins, J. V., Heibel, T.J., Wikramanayake, E., Olson, D., López, H.L., Reis, R.E., Lundberg, J.G., Sabaj Pérez, M.H., Petry, P., Pérez, M.H.S., Petry, P. (#38) Abell, R., Thieme, M.L., Revenga, C., Bryer, M., Kottelat, M., Bogutskaya, N., Coad, B., Mandrak, N., Balderas, S.C., Bussing, W., Stiassny, M.L.J., Skelton, P., Allen, G.R., Unmack, P., Naseka, A., Ng, R., Sindorf, N., Robertson, J., Armijo, E., Higgins, P. (2008) Freshwater Ecoregions of the World(#38)#8239; A New Map of Biogeographic Units for Freshwater Biodiversity Conservation. <i>BioScience</i> 58, 403. <a href="https://doi.org/10.1641/B580507">https://doi.org/10.1641/B580507</a> Barbieri, G., Campos, E.C., Teixeira Filho, A.R., Vermulm Júnior, H. And Giamas, M.T.D. (2000). Avaliação qualitativa da comunidade de peixes da Represa de Guarapiranga, São Paulo. <i>Bol. Inst. Pesca</i>, vol. 30, p. 1-21. Langeani, F., Castro, R.M.C., Oyakawa, O.T., Shibatta, O.A., Pavanelli, C.S. (#38) Casatti, L. (2007) Diversidade da ictiofauna do Alto Rio Paraná(#38)#8239; composição atual e perspectivas futuras Diversidade da ictiofauna do Alto Rio Paraná(#38)#8239; composição atual e perspectivas futuras. <i>Biota Neotropica</i> 7, 0-17. Dubey, J. P.; Zarnke, R.; Thomasc, N. J.; Wong, S. K.; Bonnd, D. W. V.; Briggs, M.; Davis, J. W.; Ewing, R.; Menseh, M.; Kwok, O. C. H.; Romandi S.; Thulliez, P., <i>Toxoplasma gondii</i>, <i>Neospora caninum</i>, <i>Sarcocystis neurona</i>, and <i>Sarcocystis canis</i>- like infections in marine mammals. <i>Veterinary Parasitology</i>, Milan, v. 116, p. 275-296, 2003 Reis, R.E., Albert, J.S., Di Dario, F., Mincarone, M.M., Petry, P. (#38) Rocha, L.A. (2016) Fish</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14599	Ciências Biológicas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4401654 - GUSTAVO BARBOSA DE MORAIS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	Levantamento da ictiofauna do reservatório Guarapiranga e suas implicações para a saúde ambiental da Zona Sul Paulistana.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A bacia do Alto Paraná é a maior ecorregião de água doce fora da Amazônia e é, em quase sua totalidade, brasileira. Essa bacia hidrográfica conta com aproximadamente 310 espécies de peixes catalogadas, sendo quase metade destas endêmicas. Localizado dentro de uma das maiores regiões metropolitanas do planeta, a represa Guarapiranga é um dos mais importantes reservatórios de água da região, abastecendo milhões de habitantes da zona sul da metrópole. Atualmente, o lago possui profundidade máxima de 13 metros e cerca de 33 km<sup>2</sup> de espelho d'água. Contudo, a expansão urbana acarreta não só a perda de habitat para as espécies nativas, mas também obriga estas a ocuparem áreas modificadas e se adaptarem à presença de espécies domésticas e ao homem. Portanto, é fundamental compreender e monitorar a ictiofauna do reservatório, visto que as espécies encontradas podem ser importantes para o equilíbrio sistêmico e para o melhor planejamento ambiental da região.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do estudo consiste em realizar o levantamento ictiofaunístico do reservatório Guarapiranga e avaliar suas implicações para a saúde ambiental da Zona Sul Paulistana, assim como ampliar o acervo científico de peixes coletados e criar um catálogo fotográfico das espécies.			
<b>METODOLOGIA</b>	Até o momento, o estudo foi empregado na região do reservatório próximo ao Parque Jaceguava e ao Setor Sul do Rodoanel. O levantamento da ictiofauna foi realizado por meio de coletas regulares de peixes em diferentes extratos da cadeia trófica local. Foram aplicadas combinações de diferentes métodos de captura (puçá, redes de arrasto, redes de espera e covos de arame), para obter amostras mais próximas da totalidade da ictiofauna da represa. A identificação das espécies foi realizada com uso de chaves dicotômicas e quando necessário consultas a especialistas.			
<b>RESULTADOS</b>	O levantamento teve início no começo de setembro de 2023, neste período foram coletadas ao menos dez espécies de peixes, das quais oito já foram identificadas a nível específico e duas de gênero, sendo: <i>Hoplias malabaricus</i> , <i>Hyphessobrycon eques</i> , <i>Psalidodon fasciatus</i> , <i>Serrasalmus marginatus</i> , <i>Hoplosternum littorale</i> , <i>Rhamdia quelen</i> , <i>Gymnotus carapo</i> , <i>Saxatilia britskii</i> , além de <i>Psalidodon</i> sp. e <i>Geophagus</i> sp. Quando comparado ao levantamento realizado por Barbieri e colaboradores (2000), alterações significativas foram constatadas na ictiofauna local, como a introdução da espécie <i>Hyphessobrycon eques</i> (Mato Grosso), não nativo da região. Houve também um aumento da variedade de espécies capturadas, pois segundo os autores do estudo anterior, a coleta de tilápia-do-nilo ( <i>Oreochromis niloticus</i> ) era predominante, aproximadamente 90%, e até o momento não foi coletada durante a presente pesquisa.			
<b>CONCLUSOES</b>	Neste contexto, é importante avaliar os impactos que a alteração faunística está gerando, para assim compreender se o equilíbrio sistêmico da região está sendo resguardado.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Abell, R., Thieme, M.L., Revenga, C., Bryer, M., Kottelat, M., Bogutskaya, N., Coad, B., Mandrak, N., Balderas, S.C., Bussing, W., Stiassny, M.L.J., Skelton, P., Allen, G.R., Unmack, P., Naseka, A., Ng, R., Sindorf, N., Robertson, J., Armijo, E., Higgins, J. V., Heibel, T.J., Wikramanayake, E., Olson, D., López, H.L., Reis, R.E., Lundberg, J.G., Sabaj Pérez, M.H., Petry, P., Pérez, M.H.S., Petry, P. (#38) Abell, R., Thieme, M.L., Revenga, C., Bryer, M., Kottelat, M., Bogutskaya, N., Coad, B., Mandrak, N., Balderas, S.C., Bussing, W., Stiassny, M.L.J., Skelton, P., Allen, G.R., Unmack, P., Naseka, A., Ng, R., Sindorf, N., Robertson, J., Armijo, E., Higgins, P. (2008) Freshwater Ecoregions of the World(#38)#8239;: A New Map of Biogeographic Units for Freshwater Biodiversity Conservation. <i>BioScience</i> 58, 403. <a href="https://doi.org/10.1641/B580507">https://doi.org/10.1641/B580507</a> Barbieri, G., Campos, E.C., Teixeira Filho, A.R., Vermulm Júnior, H. And Giamas, M.T.D. (2000). Avaliação qualitativa da comunidade de peixes da Represa de Guarapiranga, São Paulo. <i>Bol. Inst. Pesca</i>, vol. 30, p. 1-21. Langeani, F., Castro, R.M.C., Oyakawa, O.T., Shibatta, O.A., Pavanelli, C.S. (#38) Casatti, L. (2007) Diversidade da ictiofauna do Alto Rio Paraná(#38)#8239;: composição atual e perspectivas futuras Diversidade da ictiofauna do Alto Rio Paraná(#38)#8239;: composição atual e perspectivas futuras. <i>Biota Neotropica</i> 7, 0-17. Dubey, J. P.; Zarnke, R.; Thomasc, N. J.; Wong, S. K.; Bonnd, D. W. V.; Briggs, M.; Davis, J. W.; Ewing, R.; Menseh, M.; Kwok, O. C. H.; Romandí S.; Thulliez, P., <i>Toxoplasma gondii</i>, <i>Neospora caninum</i>, <i>Sarcocystis neurona</i>, and <i>Sarcocystis canis</i>- like infections in marine mammals. <i>Veterinary Parasitology</i>, Milan, v. 116, p. 275-296, 2003 Reis, R.E., Albert, J.S., Di Dario, F., Mincarone, M.M., Petry, P. (#38) Rocha, L.A. (2016) Fish</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14602	Medicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4527127 - RAFAEL ELI TRIA ABRAHÃO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mariano Chinaia Junior		
<b>TITULO</b>	A PANDEMIA DE COVID-19 E O IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DE POPULAÇÕES EM DIFERENTES PAÍSES DO MUNDO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Introdução: A COVID-19, desde o final de 2019, impactou não só a saúde física da população com milhões de infecções, hospitalizações e óbitos, mas também teve importante danos à saúde mental. Além do medo de contrair a doença, a COVID-19 causou quadros de depressão, ansiedade, sintomas de estresse pós-traumático, medo excessivo e distúrbios do sono, principalmente onde houve interrupção do serviço de saúde mental. Nesse sentido, ainda se observou impacto na condição socioeconômica do indivíduo, insegurança alimentar e pobreza, em especial em países com desigualdades e falta de acesso a direitos básicos, como países da América Latina, continente Africano e China.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo: Avaliar a existência de impactos na saúde mental das populações de diferentes países devido a pandemia de COVID-19.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória. Para o levantamento das informações foi realizado uma busca por artigos que abrangessem o assunto colocado em questão. A coleta de dados foi realizada no mês de agosto/2023, nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e como critérios de inclusão foram utilizados artigos acadêmicos que foram publicados entre os anos de 2020 a 2022, disponibilizados de forma gratuita e online, utilizando-se os seguintes descritores: COVID-19. Saúde Mental. Transtornos Mentais. Epidemiologia. Após a pesquisa inicial, realizou-se uma sintetização dos principais achados nas literaturas, que levou em consideração os aspectos relevantes de acordo com o objetivo da pesquisa. Dessa forma, foram considerados na pesquisa, 13 artigos, de um total de 32 encontrados.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Discussão: Dados sugerem que as populações mais vulneráveis enfrentam dificuldades de acesso às informações sobre COVID-19 e pela hipossuficiência financeira são mais suscetíveis à infecção por viverem em locais inadequados, superlotados, pequenos, com ausência de água ou água apropriada para ingestão e higiene, além de difícil alcance aos serviços de saúde. Essas situações atreladas ao medo e incerteza diante das condições futuras, aumentam as chances de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos nesse grupo populacional. Observou-se que na população com hipossuficiência dependem da renda oriunda do trabalho diário para alimentação e subsistência, e por esse motivo não conseguiram cumprir as medidas de distanciamento, o que gerou quadros de estresse angústia.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Conclusões: Os principais fatores de risco relacionados a transtornos mentais durante a pandemia de COVID-19 foram o perfil de faixa etária mais jovem, sexo feminino, presença de comorbidades, coexistência de outros transtornos psiquiátricos, estudantes ou desempregos e aqueles com maior exposição a notícias ou informações de mídia social e o impacto do número de contágios por COVID-19.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Referências bibliográficas: 1. Hossain MM, et al. Epidemiology of mental health problems in COVID-19: a review. F1000Res. 2020 jun; v. 9:636. 2. Faro A, Bahiano MA, Nakano TC, Reis B, da Silva FP, Vitti LS. COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. Estudos de Psicologia (Campinas). 2020; v. 37: e200074. 3. Jafri MR, Zaheer A, Fatima S, Saleem T, Sohail A. Mental health status of COVID-19 survivors: a cross sectional study. Virol J. 2022;v. 19: 3.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14605	Medicina	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3804186 - CLAUDIA AMBROSIO POLLONI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jane de Eston Armond		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS ÀS CRISES FEBRIS EM HOSPITAL PEDIÁTRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As Crises Febris (CF) representam o distúrbio neurológico mais comum da infância e frequentemente conduzem a consultas em emergências pediátricas. São classificadas em Simples e Complexas. Sua apresentação pode manifestar-se como Estado de Mal Epiléptico Febril (EMEF). Estas crises despertam ansiedade nos pais, principalmente devido às possíveis implicações futuras. Apesar de haver certo grau de consenso quanto às formas Simples, quanto à benignidade, ótimo prognóstico e ausência de relação com alterações neurológicas, a presença de Crises Complexas tem sido ultimamente associada a um maior risco de lesões intracranianas subjacentes, atraso do desenvolvimento ou subsequente epilepsia, porém, e extremamente difícil prever quando e se sequelas ou ocorrências surgirão, e ainda não há um preditor definitivo para determinar quais pacientes desenvolverão problemas neurológicos			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo objetiva descrever as características clínicas e epidemiológicas, além dos principais fatores associados às Crises Febris, sua relação com recorrências e EMEF, e avaliar o manejo clínico dos pacientes internados			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se um estudo transversal, retrospectivo e analítico no Hospital Infantil Sabará, abrangendo o período de janeiro de 2017 a janeiro de 2023. Foram incluídas crianças de até 6 anos internadas por crises epilépticas febris, que possuíam prontuários adequadamente preenchidos. Os dados coletados foram: eletroencefalograma, exame de imagem, dosagem de hemoglobina e sódio sérico.			
<b>RESULTADOS</b>	Do total de 322 pacientes, 59% eram do gênero masculino. Em 72%, tratava-se do primeiro evento de Crise Febril. A mediana de idade do primeiro episódio foi de 16 meses. Cerca de 28% já haviam apresentado Crise Febril anteriormente. A etiologia mais comum foi a Infecção de Vias Aéreas, acometendo 240 pacientes. Em 92,9% dos casos, a crise epiléptica surgiu nas primeiras 24 horas. Dos 322, 53,4% eram Crises Febris simples e 46,6% eram complexas. O EMEF foi identificado em 14,9% dos casos. O exame de imagem do SNC revelou alterações em 2,5% dos casos, enquanto o eletroencefalograma evidenciou alterações em 17,4% das Crises Febris. Não foi evidenciada relação estatisticamente significativa entre a presença de prematuridade, intensidade da febre, história familiar, exame neurológico prévio, cor/etnia, e gênero com a recorrência de Crises Febris. A frequência em escolas e creches, um eletroencefalograma alterado e a presença de uma crise complexa mostraram relação estatisticamente significativa com recorrências. Nenhuma correlação estatística significativa foi observada entre prematuridade, história familiar, intensidade da febre, pré-existência de alteração no exame neurológico e EMEF. Um eletroencefalograma alterado e a presença de anemia foram estatisticamente mais frequentes nos casos de EMEF.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados dos estudos acerca do prognóstico de Crises Febris, considerando recorrências, risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e progressão para epilepsia, divergem. Felizmente, a maioria das crises epilépticas febris mostra-se inofensiva e breve. O único desfecho adverso relevante a curto prazo das CFs é a recorrência. A morte causada pela própria crise ou por tratamento é virtualmente inexistente. A função médica primordial é tranquilizar as famílias a respeito do bom prognóstico destas crises.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Oluwabusi T, Sood SK. Update on the management of simple febrile seizures: emphasis on minimal intervention. <i>Curr Opin Pediatr.</i> 2012 Apr;24(2):259-65. doi: 10.1097/MOP.0b013e3283506765. PMID: 22327951. 2. Subcommittee on Febrile Seizures; American Academy of Pediatrics. Neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. <i>Pediatrics.</i> 2011 Feb;127(2):389-94. doi: 10.1542/peds.2010-3318. PMID: 21285335. 3. Rivas-García A, Ferrero-García-Loygorri C, Carrascón González-Pinto L, Mora-Capín AA, Lorente-Romero J, Vázquez-López P. Simple and complex febrile seizures: is there such a difference? Management and complications in an emergency department. <i>Neurologia (Engl Ed).</i> 2022 Jun;37(5):317-324. doi: 10.1016/j.nrleng.2019.05.010. Epub 2021 May 27. PMID: 35672118. 4. Guidelines for epidemiologic studies on epilepsy. Commission on Epidemiology and Prognosis, International League Against Epilepsy. <i>Epilepsia.</i> 1993 Jul-Aug;34(4):592-6. doi: 10.1111/j.1528-1157.1993.tb00433.x. PMID: 8330566. 5. Machado MR, Carmo ALS, Antoniuk SA. Crise Febril na Infância: Uma revisão dos principais conceitos. <i>Resid.Pediatr.</i> 2018;8(Supl.1):11-16 DOI: 10.25060/residpediatr-2018.v8s1-03.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14606	Ginecologia e Obstetrícia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4526899 - SOFIA BENETTI FERRARI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gabriel Monteiro Pinheiro		
<b>TITULO</b>	Desafios do pré-natal pós FIV			
<b>INTRODUCAO</b>	Os diversos tipos de tratamento por reprodução assistida apresentam-se como boas alternativas à indivíduos inférteis com o desejo de engravidar, sendo a fertilização in vitro (FIV) uma das principais alternativas. A técnica de FIV é realizada pela junção laboratorial de gametas coletados, dando origem a um embrião, que será transferido para a cavidade uterina. Entretanto, deve-se haver um cuidado maior por parte da equipe médica durante o pré-natal de gestantes pós FIV, devido ao aumento dos riscos materno-fetais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os principais pontos críticos no acompanhamento pré-natal de gestantes submetidas a FIV			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica, consultadas as bases de dados PubMed e Scielo e diretrizes de prática clínica (CPCs). O espaço temporal da pesquisa foi entre 2000 a agosto de 2023. A seleção foi restrita pelos descritores "Fertilização In Vitro", "Gestação", "Gravidez de Alto Risco", "Pré-Natal" e "Técnicas de Reprodução Assistida", nos idiomas português e inglês.			
<b>RESULTADOS</b>	A infertilidade é causada por diversos fatores, sendo as principais as disfunções ovulatórias, endometriose, fatores tubários e psicológicos. Uma possibilidade para que essas mulheres consigam gestar são as técnicas de reprodução assistida (TRA), em especial a FIV. Embora as taxas de sucesso por essa técnica sejam dependentes de vários fatores, como a idade da paciente, ainda existem possíveis complicações que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, gestação múltipla, gravidez ectópica, abortamento, processos tromboembólicos e desordens da placenta.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, é fundamental que os médicos realizem o pré-natal especializado e individualizado pós FIV, visto que a gestante passou por processos não orgânicos para engravidar. É de suma importância garantir um atendimento multidisciplinar durante todo o pré-natal, incluindo, além do ginecologista obstetra, um especialista em reprodução assistida, e um apoio psicológico profissional, levando em consideração as questões emocionais da paciente. Além disso, os fatores que levam à infertilidade podem aumentar os riscos gestacionais, fazendo com que o profissional tenha uma atenção especial para gestantes submetidas a TRA. Por fim, conclui-se que a gravidez concebida por FIV deve seguir um pré-natal de alto risco, já que ele tem um grande impacto no desfecho final da gestação, afetando assim, a saúde da mãe e do feto.			
<b>REFERENCIAS</b>	Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA [Internet]. 2021 Jul 6;326(1):65–76. Okun N, Sierra S, Douglas Wilson R, Audibert F, Brock JA, Campagnolo C, et al. Pregnancy Outcomes After Assisted Human Reproduction. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [Internet]. 2014 Jan;36(1):64–83. Allersma T, Farquhar C, Cantineau AE. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013 Aug 30;			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14606	Ginecologia e Obstetrícia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4618262 - MARIA JULIA MARCOLINI ENGLER		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gabriel Monteiro Pinheiro		
<b>TITULO</b>	Desafios do pré-natal pós FIV			
<b>INTRODUCAO</b>	Os diversos tipos de tratamento por reprodução assistida apresentam-se como boas alternativas à indivíduos inférteis com o desejo de engravidar, sendo a fertilização in vitro (FIV) uma das principais alternativas. A técnica de FIV é realizada pela junção laboratorial de gametas coletados, dando origem a um embrião, que será transferido para a cavidade uterina. Entretanto, deve-se haver um cuidado maior por parte da equipe médica durante o pré-natal de gestantes pós FIV, devido ao aumento dos riscos materno-fetais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os principais pontos críticos no acompanhamento pré-natal de gestantes submetidas a FIV			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica, consultadas as bases de dados PubMed e Scielo e diretrizes de prática clínica (CPCs). O espaço temporal da pesquisa foi entre 2000 a agosto de 2023. A seleção foi restrita pelos descritores "Fertilização In Vitro", "Gestação", "Gravidez de Alto Risco", "Pré-Natal" e "Técnicas de Reprodução Assistida", nos idiomas português e inglês.			
<b>RESULTADOS</b>	A infertilidade é causada por diversos fatores, sendo as principais as disfunções ovulatórias, endometriose, fatores tubários e psicológicos. Uma possibilidade para que essas mulheres consigam gestar são as técnicas de reprodução assistida (TRA), em especial a FIV. Embora as taxas de sucesso por essa técnica sejam dependentes de vários fatores, como a idade da paciente, ainda existem possíveis complicações que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, gestação múltipla, gravidez ectópica, abortamento, processos tromboembólicos e desordens da placenta.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, é fundamental que os médicos realizem o pré-natal especializado e individualizado pós FIV, visto que a gestante passou por processos não orgânicos para engravidar. É de suma importância garantir um atendimento multidisciplinar durante todo o pré-natal, incluindo, além do ginecologista obstetra, um especialista em reprodução assistida, e um apoio psicológico profissional, levando em consideração as questões emocionais da paciente. Além disso, os fatores que levam à infertilidade podem aumentar os riscos gestacionais, fazendo com que o profissional tenha uma atenção especial para gestantes submetidas a TRA. Por fim, conclui-se que a gravidez concebida por FIV deve seguir um pré-natal de alto risco, já que ele tem um grande impacto no desfecho final da gestação, afetando assim, a saúde da mãe e do feto.			
<b>REFERENCIAS</b>	Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA [Internet]. 2021 Jul 6;326(1):65–76. Okun N, Sierra S, Douglas Wilson R, Audibert F, Brock JA, Campagnolo C, et al. Pregnancy Outcomes After Assisted Human Reproduction. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [Internet]. 2014 Jan;36(1):64–83. Allersma T, Farquhar C, Cantineau AE. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013 Aug 30;			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14606	Ginecologia e Obstetrícia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4619404 - AMANDA AVANCINI FERNANDES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gabriel Monteiro Pinheiro		
<b>TITULO</b>	Desafios do pré-natal pós FIV			
<b>INTRODUCAO</b>	Os diversos tipos de tratamento por reprodução assistida apresentam-se como boas alternativas à indivíduos inférteis com o desejo de engravidar, sendo a fertilização in vitro (FIV) uma das principais alternativas. A técnica de FIV é realizada pela junção laboratorial de gametas coletados, dando origem a um embrião, que será transferido para a cavidade uterina. Entretanto, deve-se haver um cuidado maior por parte da equipe médica durante o pré-natal de gestantes pós FIV, devido ao aumento dos riscos materno-fetais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os principais pontos críticos no acompanhamento pré-natal de gestantes submetidas a FIV			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica, consultadas as bases de dados PubMed e Scielo e diretrizes de prática clínica (CPCs). O espaço temporal da pesquisa foi entre 2000 a agosto de 2023. A seleção foi restrita pelos descritores "Fertilização In Vitro", "Gestação", "Gravidez de Alto Risco", "Pré-Natal" e "Técnicas de Reprodução Assistida", nos idiomas português e inglês.			
<b>RESULTADOS</b>	A infertilidade é causada por diversos fatores, sendo as principais as disfunções ovulatórias, endometriose, fatores tubários e psicológicos. Uma possibilidade para que essas mulheres consigam gestar são as técnicas de reprodução assistida (TRA), em especial a FIV. Embora as taxas de sucesso por essa técnica sejam dependentes de vários fatores, como a idade da paciente, ainda existem possíveis complicações que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, gestação múltipla, gravidez ectópica, abortamento, processos tromboembólicos e desordens da placenta.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, é fundamental que os médicos realizem o pré-natal especializado e individualizado pós FIV, visto que a gestante passou por processos não orgânicos para engravidar. É de suma importância garantir um atendimento multidisciplinar durante todo o pré-natal, incluindo, além do ginecologista obstetra, um especialista em reprodução assistida, e um apoio psicológico profissional, levando em consideração as questões emocionais da paciente. Além disso, os fatores que levam à infertilidade podem aumentar os riscos gestacionais, fazendo com que o profissional tenha uma atenção especial para gestantes submetidas a TRA. Por fim, conclui-se que a gravidez concebida por FIV deve seguir um pré-natal de alto risco, já que ele tem um grande impacto no desfecho final da gestação, afetando assim, a saúde da mãe e do feto.			
<b>REFERENCIAS</b>	Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA [Internet]. 2021 Jul 6;326(1):65–76. Okun N, Sierra S, Douglas Wilson R, Audibert F, Brock JA, Campagnolo C, et al. Pregnancy Outcomes After Assisted Human Reproduction. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [Internet]. 2014 Jan;36(1):64–83. Allersma T, Farquhar C, Cantineau AE. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013 Aug 30;			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14606	Ginecologia e Obstetrícia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4619811 - MEL BOLDRIM ZIMMER	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gabriel Monteiro Pinheiro		
<b>TITULO</b>	Desafios do pré-natal pós FIV			
<b>INTRODUCAO</b>	Os diversos tipos de tratamento por reprodução assistida apresentam-se como boas alternativas à indivíduos inférteis com o desejo de engravidar, sendo a fertilização in vitro (FIV) uma das principais alternativas. A técnica de FIV é realizada pela junção laboratorial de gametas coletados, dando origem a um embrião, que será transferido para a cavidade uterina. Entretanto, deve-se haver um cuidado maior por parte da equipe médica durante o pré-natal de gestantes pós FIV, devido ao aumento dos riscos materno-fetais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os principais pontos críticos no acompanhamento pré-natal de gestantes submetidas a FIV			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica, consultadas as bases de dados PubMed e Scielo e diretrizes de prática clínica (CPCs). O espaço temporal da pesquisa foi entre 2000 a agosto de 2023. A seleção foi restrita pelos descritores "Fertilização In Vitro", "Gestação", "Gravidez de Alto Risco", "Pré-Natal" e "Técnicas de Reprodução Assistida", nos idiomas português e inglês.			
<b>RESULTADOS</b>	A infertilidade é causada por diversos fatores, sendo as principais as disfunções ovulatórias, endometriose, fatores tubários e psicológicos. Uma possibilidade para que essas mulheres consigam gestar são as técnicas de reprodução assistida (TRA), em especial a FIV. Embora as taxas de sucesso por essa técnica sejam dependentes de vários fatores, como a idade da paciente, ainda existem possíveis complicações que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, gestação múltipla, gravidez ectópica, abortamento, processos tromboembólicos e desordens da placenta.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, é fundamental que os médicos realizem o pré-natal especializado e individualizado pós FIV, visto que a gestante passou por processos não orgânicos para engravidar. É de suma importância garantir um atendimento multidisciplinar durante todo o pré-natal, incluindo, além do ginecologista obstetra, um especialista em reprodução assistida, e um apoio psicológico profissional, levando em consideração as questões emocionais da paciente. Além disso, os fatores que levam à infertilidade podem aumentar os riscos gestacionais, fazendo com que o profissional tenha uma atenção especial para gestantes submetidas a TRA. Por fim, conclui-se que a gravidez concebida por FIV deve seguir um pré-natal de alto risco, já que ele tem um grande impacto no desfecho final da gestação, afetando assim, a saúde da mãe e do feto.			
<b>REFERENCIAS</b>	Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA [Internet]. 2021 Jul 6;326(1):65–76. Okun N, Sierra S, Douglas Wilson R, Audibert F, Brock JA, Campagnolo C, et al. Pregnancy Outcomes After Assisted Human Reproduction. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [Internet]. 2014 Jan;36(1):64–83. Allersma T, Farquhar C, Cantineau AE. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013 Aug 30;			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14606	Ginecologia e Obstetrícia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4620071 - VALENTINA CHAGAS MANCEBO SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Gabriel Monteiro Pinheiro		
<b>TITULO</b>	Desafios do pré-natal pós FIV			
<b>INTRODUCAO</b>	Os diversos tipos de tratamento por reprodução assistida apresentam-se como boas alternativas à indivíduos inférteis com o desejo de engravidar, sendo a fertilização in vitro (FIV) uma das principais alternativas. A técnica de FIV é realizada pela junção laboratorial de gametas coletados, dando origem a um embrião, que será transferido para a cavidade uterina. Entretanto, deve-se haver um cuidado maior por parte da equipe médica durante o pré-natal de gestantes pós FIV, devido ao aumento dos riscos materno-fetais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os principais pontos críticos no acompanhamento pré-natal de gestantes submetidas a FIV			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão bibliográfica, consultadas as bases de dados PubMed e Scielo e diretrizes de prática clínica (CPCs). O espaço temporal da pesquisa foi entre 2000 a agosto de 2023. A seleção foi restrita pelos descritores "Fertilização In Vitro", "Gestação", "Gravidez de Alto Risco", "Pré-Natal" e "Técnicas de Reprodução Assistida", nos idiomas português e inglês.			
<b>RESULTADOS</b>	A infertilidade é causada por diversos fatores, sendo as principais as disfunções ovulatórias, endometriose, fatores tubários e psicológicos. Uma possibilidade para que essas mulheres consigam gestar são as técnicas de reprodução assistida (TRA), em especial a FIV. Embora as taxas de sucesso por essa técnica sejam dependentes de vários fatores, como a idade da paciente, ainda existem possíveis complicações que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, gestação múltipla, gravidez ectópica, abortamento, processos tromboembólicos e desordens da placenta.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa forma, é fundamental que os médicos realizem o pré-natal especializado e individualizado pós FIV, visto que a gestante passou por processos não orgânicos para engravidar. É de suma importância garantir um atendimento multidisciplinar durante todo o pré-natal, incluindo, além do ginecologista obstetra, um especialista em reprodução assistida, e um apoio psicológico profissional, levando em consideração as questões emocionais da paciente. Além disso, os fatores que levam à infertilidade podem aumentar os riscos gestacionais, fazendo com que o profissional tenha uma atenção especial para gestantes submetidas a TRA. Por fim, conclui-se que a gravidez concebida por FIV deve seguir um pré-natal de alto risco, já que ele tem um grande impacto no desfecho final da gestação, afetando assim, a saúde da mãe e do feto.			
<b>REFERENCIAS</b>	Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA [Internet]. 2021 Jul 6;326(1):65–76. Okun N, Sierra S, Douglas Wilson R, Audibert F, Brock JA, Campagnolo C, et al. Pregnancy Outcomes After Assisted Human Reproduction. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada [Internet]. 2014 Jan;36(1):64–83. Allersma T, Farquhar C, Cantineau AE. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013 Aug 30;			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14609	Medicina Veterinária	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca	Adriana Cortez	
<b>TITULO</b>	Perfil de cães e gatos atendidos pelo programa PROCOPA no HOVET-UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	Devido ao potencial reprodutivo de cães e gatos, a superpopulação de animais permanece como um problema de saúde pública, desta forma, a guarda responsável dos animais domésticos é o principal instrumento de controle populacional, sendo a esterilização cirúrgica de cães e gatos, uma das ferramentas auxiliares para atingir este objetivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o levantamento de dados epidemiológicos dos animais esterilizados cirurgicamente pelo Programa de Controle Populacional de Pequenos Animais (PROCOPA) no Hospital Veterinário UNISA no período entre janeiro a setembro de 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi conduzido com os dados de 282 animais atendidos pelo projeto PROCOPA/UNISA. Dentre os animais atendidos estão os de famílias em situação de importante vulnerabilidade assistidas pelo Programa Social Santo Amaro (PSSA). Os dados foram compilados no programa excel e realizada a estatística descritiva pelo programa Minitab 18.			
<b>RESULTADO S</b>	No retorno da campanha de castração pós pandemia, foram atendidos 282 cães e gatos, no período de janeiro a setembro de 2023. Destes, 68% (192/282) foram cães e 32% (90/282) gatos. Dentre os cães gonadectomizados, 58% (111/192) fêmeas e 42% (81/192) machos. E a distribuição sexual em felinos foi de 58% (52/90) fêmeas e 42% (38/90) machos. A avaliação da distribuição racial mostrou que foram atendidos 39% (75/192) de cães sem raça definida e 61% (117/192) com raça definida, sendo as raças mais prevalentes o Shih Tzu, Lhasa Apso, Spitz Alemão e Poodle. Foram atendidos 92% (83/90) gatos sem raça definida e apenas 8% (7/90) com raça definida, sendo elas Siamês, Maine Coon e Bengal. A mediana da idade dos cães e gatos atendidos foi 17 (mínimo e máximo: 3-144) meses. Enquanto que a mediana do peso foi 5,45 kg (mínimo e máximo: 1,6-56). De acordo com os cálculos efetuados, considerando que cada gestação gera aproximadamente 6 animais, estima-se que a esterilização de 282 animais tenha evitado aproximadamente 3.384 nascimentos em 1 ano. Nesta campanha foram atendidos mais cães do que gatos, sendo a proporção de fêmeas maior do que machos, tanto na população canina quanto felina. Um dado não esperado é a predominância de cães com raça definida, o que nos traz a reflexão se o público alvo está sendo atingido ou se há uma mudança no perfil de cães no entorno da universidade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com o programa de controle populacional evita-se o nascimento de um número expressivo de animais em situação de potencial risco de abandono.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABREU, M.K.S. Controle populacional de cães e gatos e percepção dos tutores relativa ao bem estar no município de Santo Cruz do Arari. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal Rural da Amazônia, 2019 VIEIRA, Adriana Maria Lopes. Controle populacional de cães e gatos: Aspectos técnicos e operacionais. Ciência Veterinária Tropical, Recife-PE, v. 11, n. suplemento 1, p. 102-105, 2008. FARIA, Janalia Azevedo de et al. Relação/control populacional de cães e gatos/melhoria das condições ambientais e bem-estar da comunidade no bairro da Paupina em Fortaleza-Ceará. 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14609	Medicina Veterinária	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2120879 - GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca	Adriana Cortez	
<b>TITULO</b>	Perfil de cães e gatos atendidos pelo programa PROCOPA no HOVET-UNISA			
<b>INTRODUCAO</b>	Devido ao potencial reprodutivo de cães e gatos, a superpopulação de animais permanece como um problema de saúde pública, desta forma, a guarda responsável dos animais domésticos é o principal instrumento de controle populacional, sendo a esterilização cirúrgica de cães e gatos, uma das ferramentas auxiliares para atingir este objetivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o levantamento de dados epidemiológicos dos animais esterilizados cirurgicamente pelo Programa de Controle Populacional de Pequenos Animais (PROCOPA) no Hospital Veterinário UNISA no período entre janeiro a setembro de 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi conduzido com os dados de 282 animais atendidos pelo projeto PROCOPA/UNISA. Dentre os animais atendidos estão os de famílias em situação de importante vulnerabilidade assistidas pelo Programa Social Santo Amaro (PSSA). Os dados foram compilados no programa excel e realizada a estatística descritiva pelo programa Minitab 18.			
<b>RESULTADOS</b>	No retorno da campanha de castração pós pandemia, foram atendidos 282 cães e gatos, no período de janeiro a setembro de 2023. Destes, 68% (192/282) foram cães e 32% (90/282) gatos. Dentre os cães gonadectomizados, 58% (111/192) fêmeas e 42% (81/192) machos. E a distribuição sexual em felinos foi de 58% (52/90) fêmeas e 42% (38/90) machos. A avaliação da distribuição racial mostrou que foram atendidos 39% (75/192) de cães sem raça definida e 61% (117/192) com raça definida, sendo as raças mais prevalentes o Shih Tzu, Lhasa Apso, Spitz Alemão e Poodle. Foram atendidos 92% (83/90) gatos sem raça definida e apenas 8% (7/90) com raça definida, sendo elas Siamês, Maine Coon e Bengal. A mediana da idade dos cães e gatos atendidos foi 17 (mínimo e máximo: 3-144) meses. Enquanto que a mediana do peso foi 5,45 kg (mínimo e máximo: 1,6-56). De acordo com os cálculos efetuados, considerando que cada gestação gera aproximadamente 6 animais, estima-se que a esterilização de 282 animais tenha evitado aproximadamente 3.384 nascimentos em 1 ano. Nesta campanha foram atendidos mais cães do que gatos, sendo a proporção de fêmeas maior do que machos, tanto na população canina quanto felina. Um dado não esperado é a predominância de cães com raça definida, o que nos traz a reflexão se o público alvo está sendo atingido ou se há uma mudança no perfil de cães no entorno da universidade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com o programa de controle populacional evita-se o nascimento de um número expressivo de animais em situação de potencial risco de abandono.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABREU, M.K.S. Controle populacional de cães e gatos e percepção dos tutores relativa ao bem estar no município de Santo Cruz do Arari. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal Rural da Amazônia, 2019 VIEIRA, Adriana Maria Lopes. Controle populacional de cães e gatos: Aspectos técnicos e operacionais. Ciência Veterinária Tropical, Recife-PE, v. 11, n. suplemento 1, p. 102-105, 2008. FARIA, Janalia Azevedo de et al. Relação/control populacional de cães e gatos/melhoria das condições ambientais e bem-estar da comunidade no bairro da Paupina em Fortaleza-Ceará. 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14609	Medicina Veterinária	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4621026 - GABRIELA TOBIAS TOMANINI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca	Adriana Cortez	
<b>TITULO</b>	Perfil de cães e gatos atendidos pelo programa PROCOPA no HOVET-UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	Devido ao potencial reprodutivo de cães e gatos, a superpopulação de animais permanece como um problema de saúde pública, desta forma, a guarda responsável dos animais domésticos é o principal instrumento de controle populacional, sendo a esterilização cirúrgica de cães e gatos, uma das ferramentas auxiliares para atingir este objetivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o levantamento de dados epidemiológicos dos animais esterilizados cirurgicamente pelo Programa de Controle Populacional de Pequenos Animais (PROCOPA) no Hospital Veterinário UNISA no período entre janeiro a setembro de 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi conduzido com os dados de 282 animais atendidos pelo projeto PROCOPA/UNISA. Dentre os animais atendidos estão os de famílias em situação de importante vulnerabilidade assistidas pelo Programa Social Santo Amaro (PSSA). Os dados foram compilados no programa excel e realizada a estatística descritiva pelo programa Minitab 18.			
<b>RESULTADO S</b>	No retorno da campanha de castração pós pandemia, foram atendidos 282 cães e gatos, no período de janeiro a setembro de 2023. Destes, 68% (192/282) foram cães e 32% (90/282) gatos. Dentre os cães gonadectomizados, 58% (111/192) fêmeas e 42% (81/192) machos. E a distribuição sexual em felinos foi de 58% (52/90) fêmeas e 42% (38/90) machos. A avaliação da distribuição racial mostrou que foram atendidos 39% (75/192) de cães sem raça definida e 61% (117/192) com raça definida, sendo as raças mais prevalentes o Shih Tzu, Lhasa Apso, Spitz Alemão e Poodle. Foram atendidos 92% (83/90) gatos sem raça definida e apenas 8% (7/90) com raça definida, sendo elas Siamês, Maine Coon e Bengal. A mediana da idade dos cães e gatos atendidos foi 17 (mínimo e máximo: 3-144) meses. Enquanto que a mediana do peso foi 5,45 kg (mínimo e máximo: 1,6-56). De acordo com os cálculos efetuados, considerando que cada gestação gera aproximadamente 6 animais, estima-se que a esterilização de 282 animais tenha evitado aproximadamente 3.384 nascimentos em 1 ano. Nesta campanha foram atendidos mais cães do que gatos, sendo a proporção de fêmeas maior do que machos, tanto na população canina quanto felina. Um dado não esperado é a predominância de cães com raça definida, o que nos traz a reflexão se o público alvo está sendo atingido ou se há uma mudança no perfil de cães no entorno da universidade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com o programa de controle populacional evita-se o nascimento de um número expressivo de animais em situação de potencial risco de abandono.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABREU, M.K.S. Controle populacional de cães e gatos e percepção dos tutores relativa ao bem estar no município de Santo Cruz do Arari. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal Rural da Amazônia, 2019 VIEIRA, Adriana Maria Lopes. Controle populacional de cães e gatos: Aspectos técnicos e operacionais. Ciência Veterinária Tropical, Recife-PE, v. 11, n. suplemento 1, p. 102-105, 2008. FARIA, Janalia Azevedo de et al. Relação/control populacional de cães e gatos/melhoria das condições ambientais e bem-estar da comunidade no bairro da Paupina em Fortaleza-Ceará. 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5070368 - ISABELLA NICARETTA SCRAMIN LOPES PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patrícia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borchgrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5198917 - LUANA GOMES DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patrícia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5198976 - ROSA MORGANA PIMENTA FERREIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199000 - VICTOR EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5199107 - THAIONARA SANTOS SANTANA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patrícia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5219981 - MAITÊ BONATTO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patrícia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220378 - MARIA FERNANDA CAIUT COSTA BIELECKI		2 - Aprovado
		<b>Apresentação</b>		
		0 - Comunicação Oral		
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5220416 - HENRIQUE ANDRES ADORNO SEEMANN		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5222311 - LAÍS GOMES DO NASCIMENTO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patrícia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14610	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5222818 - AFONSO CZUY FERREIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva	Patricia Colombo de Souza	LAURA DOS REIS SILVA
<b>TITULO</b>	ÁGUA: O PILAR ESSENCIAL NA HIGIENE E SAÚDE DAS CRIANÇAS – A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A água participa da formação do corpo dos organismos e, por ser considerada solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas nos organismos mantendo, assim, sua homeostase. Nessa perspectiva, ao analisar a importância da água, o seu papel fundamental na manutenção da saúde e as ações necessárias para a preservação desta, a elaboração do projeto foi desenvolvida com a finalidade de elaborar ações relacionadas tanto com o uso da água como, também, medidas cabíveis para a valorização e consumo sustentável desse recurso. O projeto visa expor o impacto que uma mudança, como lavar as mãos adequadamente, pode gerar na saúde dos indivíduos, visto que, a maior parte dos costumes e vícios de comportamento são desenvolvidos na infância, por isso direcionou-se o público alvo pensando na perpetuação desse hábito para essas crianças, enquanto futuros adultos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Conscientizar crianças sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Nessa perspectiva, a aplicação desse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, de áreas periféricas da região sul de São Paulo e pouco valorizadas economicamente, sobre a importância da higienização adequada das mãos, visando a prevenção de doenças relacionadas ao contato mão-boca. A aplicação do projeto acontecerá no Colégio Pinheiros, ensinando estudantes a forma correta de se lavar as mãos, utilizando o próprio espaço escolar como local de ensino-aprendizagem e, após isso, será realizada uma atividade para verificar o aprendizado da aula ministrada garantindo, assim, sua eficiência. Outro objetivo a ser alcançado pelo projeto é o repasse do conhecimento transmitido para esses estudantes aos seus familiares, sendo entregue, para cada aluno, um kit-higiene e um panfleto para auxiliá-los no ensino domiciliar dessas informações.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	Espera-se que a prática de lavagem das mãos e a consciência sustentável sejam atos cotidianos na vida desses indivíduos, corroborando não só na prevenção de doenças infectocontagiosas como, também, na prática da manutenção da saúde e a sustentabilidade			
<b>CONCLUSOES</b>	A conscientização e a adoção generalizada da higiene adequada das mãos não apenas beneficiarão as crianças e suas famílias, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente a doenças contagiosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Roggia M. Um Estudo Educativo Ambiental a partir do aproveitamento da Água da chuva nas edificações. Cruz Alta. Monografia de Especialização - UNICRUZ; 2004. 2. Ignaz Semmelweis. As lições que a história da lavagem das mãos ensina. Site fiocruz: Boechat J e Gomes H; 13 abr 2020 [acesso em 13 set 2023]. 3. Borghrevink C. Apenas 5% das pessoas lavam as mãos corretamente. Site veja: Da redação; [acesso em 14 set 2023]. Disponível em: <a href="https://veja.abril.com.br">https://veja.abril.com.br</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14611	História Regional do Brasil	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4347790 - JOSELMA MARIA DA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Migrantes da minha terra			
<b>INTRODUCAO</b>	A migração é um fenômeno humano intrínseco à história da humanidade, desempenhando um papel vital na formação de sociedades e na busca de oportunidades econômicas e segurança. No século continua a ser uma força poderosa que conecta diferentes partes do mundo, mas é moldada por dinâmicas complexas e desafios diversos.			
<b>OBJETIVOS</b>	este artigo explora as causas por trás dos movimentos migratórios, abordando questões como a busca de emprego e melhores condições econômicas, conflitos e perseguição, mudanças ambientais e bem como dinâmicas urbanas e rurais em evolução.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será um artigo informativo e biográfico, relatado por minha família, tendo como suporte a história oral.			
<b>RESULTADO S</b>	Este artigo explora as causas por trás dos movimentos migratórios, abordando questões como a busca de emprego e melhores condições econômicas, conflitos e perseguição, mudanças ambientais e bem como dinâmicas urbanas e rurais em evolução. A migração de pessoas de Pernambuco para São Paulo, assim como de outras regiões nordestinas para o estado de São Paulo, começou a ganhar XX, especialmente durante as décadas de 1940 a 1960. Existem várias razões que contribuíram para esse movimento migratório: Essa migração em grande escala contribuiu para o crescimento populacional de São Paulo, tornando-o um dos estados mais industrializados e urbanizados do Brasil. Além disso, a presença de migrantes nordestinos influenciou a cultura e a sociedade paulista, deixando uma diversidade cultural do estado. 1. Industrialização em São Paulo: São Paulo passou por um rápido processo de industrialização a partir do final do século XIX e ao longo do século XX. Isso criou uma demanda por mão de obra nas fábricas e indústrias, atraindo trabalhadores de outras partes do Brasil, incluindo o Nordeste. 2. Secas e Condições Econômicas no Nordeste: A região nordestina enfrentou ciclos econômicos desfavoráveis, levando muitos nordestinos a buscar oportunidades melhores em São Paulo. 3. Políticas de Atração de Mão de Obra: O governo de São Paulo implementou políticas para atrair migrantes de outras regiões, oferecendo oportunidades de emprego e moradia.			
<b>CONCLUSOES</b>	A procura de um novo lar e a busca de novas oportunidades de emprego fora uma realidade de minha família de migrantes.			
<b>REFERENCIA S</b>	<a href="https://www.scielo.br/j/urbe/a/fK5NnwzzxKGRYNdcxftfHzQ/?lang=pt">https://www.scielo.br/j/urbe/a/fK5NnwzzxKGRYNdcxftfHzQ/?lang=pt</a> <a href="https://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/article/view/332">https://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/article/view/332</a> <a href="https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%A7%C3%A3o_nordestina_no_Brasil#:~:text=Migra%C3%A7%C3%A3o%20nordestina%20ou%20C3%Aaxodo%20nordestino,desde%20a%20C3%A9poca%20">https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%A7%C3%A3o_nordestina_no_Brasil#:~:text=Migra%C3%A7%C3%A3o%20nordestina%20ou%20C3%Aaxodo%20nordestino,desde%20a%20C3%A9poca%20</a> <a href="https://www.scielo.br/j/rbepop/a/cC9zk8F3Xfs7BYbZ5vtjwkh/?lang=pt">https://www.scielo.br/j/rbepop/a/cC9zk8F3Xfs7BYbZ5vtjwkh/?lang=pt</a> Livro: VILLA, Marco Antônio. Quando eu vim-me embora: História da migração nordestina para São Paulo. São Paulo: Leya, abril			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14612	Engenharias	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4521650 - IGOR WESLEY LOSACCO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Carlos Miyashiro		
<b>TITULO</b>	ACIDENTES DE TRAJETO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA ESTATISTICA PROVENIENTE DA MUDANÇA DAS LEIS DE TRÂNSITO ENTRE 1997 E 2021			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho é um evento imprevisito que pode resultar em perdas materiais, danos e lesões. Um cenário em que o empregador tem pouco controle sobre os fatores determinantes é o acidente de trajeto, que apresentou um aumento substancial em relação aos acidentes típicos e doenças ocupacionais. Essas tendências são influenciadas por mudanças nas regulamentações governamentais ao longo do tempo, refletidas nas alterações do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo explora as estatísticas de acidentes de trajeto e sua evolução, além de analisar a relação percentual entre acidentes de trajeto e acidentes de trabalho em geral.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado através de pesquisa bibliográfica com livros, artigos, publicações da Internet relacionado com o assunto do artigo, com o intuito de relacionar a legislação de trânsito com os acidentes de trajeto. Foi utilizado alterações do CTB como contribuidor das consequências das estatísticas de acidentes de trajetos. Foi analisado os períodos de 1997 até 2021, relacionando o número bruto de acidentes de trajeto, sua evolução e o percentual de acidentes de trajeto e comparação ao acidente de trabalho.			
<b>RESULTADOS</b>	Observa-se que nos anos iniciais do CTB, houve uma diminuição nos acidentes de trajeto. Contudo, após os passaram dos anos os números começaram a crescer, atingindo um patamar elevado, em 2002 os acidentes de trajeto demonstraram um aumento considerável em números absolutos e entre 2006 e 2007, houve um aumento nos acidentes de trabalho que não envolviam trajeto. No ano de 2008, iniciou-se lei para diminuição de acidentes de trabalho, mas os acidentes de trajetos não foram afetados. Até 2014, no qual ocorreu mudanças do CTB que diminuíram os sinistros de trânsito e os acidentes de trajetos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Em 2006 ocorreu a lei nº 11.343 de 25 de julho de 2006 sobre alteração os limites de velocidade para fins de enquadramentos infracionais e de penalidades e nas resoluções, logo esses anos teve como destaque o aumento acidentes de trajeto. Em 2019 ocorreu a criação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, com isso os acidentes do trabalho típico e as doenças ocupacionais diminuíram gradualmente. Em 2014 a câmara aprova criação do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito a Lei 8272/14, criando leis e resoluções com intenção de diminuição de mortes e por consequência reduziu os acidentes de trajetos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Cabral, CF. Análise de correlação entre acidentes de trânsito, de trajeto e variáveis socioeconômicas no brasil. São Carlos: UFSCar 2011. 2. Carvalho, RT. Acidentes de trajeto no brasil: estatísticas, causas e consequências. Florianópolis: UNISUL 2018. 3. Abreu, DROM.; Souza, EM.; Mathias, TAF. Impacto do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Seca na mortalidade por acidentes de trânsito. Cad. Saúde Pública, 2018; doi: 10.1590/0102-311X00122117.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14613	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4410262 - JENNIFER VIANNA MOTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcela Maria Carvalho da Silva	João Victor Rolim de Souza	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE AO EXERCÍCIO FÍSICO EM PACIENTES COM RASTREIO POSITIVO PARA DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA: RESULTADOS PRELIMINARE			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças respiratórias crônicas compreendem um grupo de diversas doenças pulmonares, que representam um importante problema de saúde pública, em decorrência do diagnóstico tardio e complicações sistêmicas. Pensado nisso, instrumentos de rastreio vêm sendo propostos para identificar precocemente as doenças. Dentre eles, o COLA foi inicialmente desenvolvido para rastrear doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos expostos a gases nocivos. Além disso, sabe-se que pacientes com doenças pulmonares crônicas apresentam sintomas como dispneia e limitação ao exercício. Porém não há estudos na literatura que verifiquem o prejuízo da capacidade exercício em pacientes com rastreio positivo das doenças.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar se a população com rastreio positivo para doenças respiratórias, apresentam redução da capacidade de exercício e de força muscular respiratória.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do estudo 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo de DPOC, com idade acima de 40 anos. Foram incluídos pacientes tabagistas, ex- tabagistas, fumantes passivos, e/ou expostos a gases nocivos com contato por no mínimo dez anos. Os pacientes foram submetidos a três dias de avaliação, sendo no primeiro dia o exame de espirometria e questionário COLA. No segundo dia, o Teste de Degrau de 6 minutos (TD6), manovacuometria e dados antropométricos/ sociodemográficos e no terceiro dia, realizado duas vezes o teste de caminhada de 6 minutos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 anos (p-valor=0,9); frequência de exacerbação 0±0; 1 ±1 (p-valor= 0,1);(#38)#8239;peak flow 415 ±160; 288 ±91 L/min (p-valor= 0,00); VEF1/CVF 101± 8,7; 96±14% (p-valor= 0,1)VEF1, 94±18; 76±19 L/min(p-valor= 0,002); mMRC 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (p-valor= 0,003); IMC 28± 5; 27± 5 Kg/cm2 (p-valor= 0,8). No que se refere a distância percorrida no TC6 foram encontrados respectivamente média de 455± 84; 429 ±85 metros (p-valor 0,2); número de degraus 112 ±29; 92±24 degraus (p-valor= 0,007); porcentagem do predito do TC6 92 ±12; 79±27% (0,05); predito do TD6 95±26; 81±19 degraus (0,02); predito da PImax 89±16; 82±10% (0,05); predito da PEmax 91±21; 82±14 (0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os pacientes com rastreio positivo para as doenças respiratórias crônicas demonstraram limitação da capacidade física e fraqueza muscular respiratória quando comparados aos pacientes com rastreio negativo da doença.			
<b>REFERENCIAS</b>	Global Initiative for chronicobstructivelungdisease. Global Strategy for thediagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2023 report). EUA: GOLD, 2022 Available from: <a href="https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf">https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf</a> . James MD, Milne KM, Phillips DB, et.al.(#38)#8239;Dyspnea and Exercise Limitation in Mild COPD: The Value of CPET. Frontiers in Medicine, 2020 7. (#38)#8239;doi:10.3389/fmed.2020.00442(#38)#8239;			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14613	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4426525 - NATHALIA MARTON SANT' ANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcela Maria Carvalho da Silva	João Victor Rolim de Souza	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE AO EXERCÍCIO FÍSICO EM PACIENTES COM RASTREIO POSITIVO PARA DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA: RESULTADOS PRELIMINARE			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças respiratórias crônicas compreendem um grupo de diversas doenças pulmonares, que representam um importante problema de saúde pública, em decorrência do diagnóstico tardio e complicações sistêmicas. Pensado nisso, instrumentos de rastreio vêm sendo propostos para identificar precocemente as doenças. Dentre eles, o COLA foi inicialmente desenvolvido para rastrear doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos expostos a gases nocivos. Além disso, sabe-se que pacientes com doenças pulmonares crônicas apresentam sintomas como dispneia e limitação ao exercício. Porém não há estudos na literatura que verifiquem o prejuízo da capacidade exercício em pacientes com rastreio positivo das doenças.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar se a população com rastreio positivo para doenças respiratórias, apresentam redução da capacidade de exercício e de força muscular respiratória.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do estudo 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo de DPOC, com idade acima de 40 anos. Foram incluídos pacientes tabagistas, ex- tabagistas, fumantes passivos, e/ou expostos a gases nocivos com contato por no mínimo dez anos. Os pacientes foram submetidos a três dias de avaliação, sendo no primeiro dia o exame de espirometria e questionário COLA. No segundo dia, o Teste de Degrau de 6 minutos (TD6), manovacuometria e dados antropométricos/ sociodemográficos e no terceiro dia, realizado duas vezes o teste de caminhada de 6 minutos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 anos (p-valor=0,9); frequência de exacerbação 0±0; 1 ±1 (p-valor= 0,1);(#38)#8239;peak flow 415 ±160; 288 ±91 L/min (p-valor= 0,00); VEF1/CVF 101± 8,7; 96±14% (p-valor= 0,1)VEF1, 94±18; 76±19 L/min(p-valor= 0,002); mMRC 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (p-valor= 0,003); IMC 28± 5; 27± 5 Kg/cm2 (p-valor= 0,8). No que se refere a distância percorrida no TC6 foram encontrados respectivamente média de 455± 84; 429 ±85 metros (p-valor 0,2); número de degraus 112 ±29; 92±24 degraus (p-valor= 0,007); porcentagem do predito do TC6 92 ±12; 79±27% (0,05); predito do TD6 95±26; 81±19 degraus (0,02); predito da PImax 89±16; 82±10% (0,05); predito da PEmax 91±21; 82±14 (0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os pacientes com rastreio positivo para as doenças respiratórias crônicas demonstraram limitação da capacidade física e fraqueza muscular respiratória quando comparados aos pacientes com rastreio negativo da doença.			
<b>REFERENCIAS</b>	Global Initiative for chronicobstructivelungdisease. Global Strategy for thediagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2023 report). EUA: GOLD, 2022 Available from: <a href="https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf">https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf</a> . James MD, Milne KM, Phillips DB, et.al.(#38)#8239;Dyspnea and Exercise Limitation in Mild COPD: The Value of CPET. Frontiers in Medicine, 2020 7. (#38)#8239;doi:10.3389/fmed.2020.00442(#38)#8239;			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14613	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4754417 - BEATRIZ RODRIGUES SILVA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcela Maria Carvalho da Silva	João Victor Rolim de Souza	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE AO EXERCÍCIO FÍSICO EM PACIENTES COM RASTREIO POSITIVO PARA DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA: RESULTADOS PRELIMINARE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As doenças respiratórias crônicas compreendem um grupo de diversas doenças pulmonares, que representam um importante problema de saúde pública, em decorrência do diagnóstico tardio e complicações sistêmicas. Pensado nisso, instrumentos de rastreio vêm sendo propostos para identificar precocemente as doenças. Dentre eles, o COLA foi inicialmente desenvolvido para rastrear doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos expostos a gases nocivos. Além disso, sabe-se que pacientes com doenças pulmonares crônicas apresentam sintomas como dispneia e limitação ao exercício. Porém não há estudos na literatura que verifiquem o prejuízo da capacidade exercício em pacientes com rastreio positivo das doenças.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar se a população com rastreio positivo para doenças respiratórias, apresentam redução da capacidade de exercício e de força muscular respiratória.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do estudo 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo de DPOC, com idade acima de 40 anos. Foram incluídos pacientes tabagistas, ex- tabagistas, fumantes passivos, e/ou expostos a gases nocivos com contato por no mínimo dez anos. Os pacientes foram submetidos a três dias de avaliação, sendo no primeiro dia o exame de espirometria e questionário COLA. No segundo dia, o Teste de Degrau de 6 minutos (TD6), manovacuometria e dados antropométricos/ sociodemográficos e no terceiro dia, realizado duas vezes o teste de caminhada de 6 minutos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 anos (p-valor=0,9); frequência de exacerbação 0±0; 1 ±1 (p-valor= 0,1);(#38)#8239;peak flow 415 ±160; 288 ±91 L/min (p-valor= 0,00); VEF1/CVF 101± 8,7; 96±14% (p-valor= 0,1)VEF1, 94±18; 76±19 L/min(p-valor= 0,002); mMRC 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (p-valor= 0,003); IMC 28± 5; 27± 5 Kg/cm2 (p-valor= 0,8). No que se refere a distância percorrida no TC6 foram encontrados respectivamente média de 455± 84; 429 ±85 metros (p-valor 0,2); número de degraus 112 ±29; 92±24 degraus (p-valor= 0,007); porcentagem do predito do TC6 92 ±12; 79±27% (0,05); predito do TD6 95±26; 81±19 degraus (0,02); predito da PImax 89±16; 82±10% (0,05); predito da PEmax 91±21; 82±14 (0,05).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os pacientes com rastreio positivo para as doenças respiratórias crônicas demonstraram limitação da capacidade física e fraqueza muscular respiratória quando comparados aos pacientes com rastreio negativo da doença.			
<b>REFERENCIAS</b>	Global Initiative for chronicobstructivelungdisease. Global Strategy for thediagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2023 report). EUA: GOLD, 2022 Available from: <a href="https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf">https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf</a> . James MD, Milne KM, Phillips DB, et.al.(#38)#8239;Dyspnea and Exercise Limitation in Mild COPD: The Value of CPET. Frontiers in Medicine, 2020 7. (#38)#8239;doi:10.3389/fmed.2020.00442(#38)#8239;			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14614	História Antiga e Medieval	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4536771 - THIAGO MENEZES SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Os 12 trabalhos de Hercules e suas utilidades para a civilização grega			
<b>INTRODUCA O</b>	As diversas civilizações que se desenvolveram e se instalaram em diferentes espaços e épocas desenvolveram contos mitológicos diretamente ligados a sua cultura e muitas vezes a sua religião, estes contos, escritos ou orais, são repassados de geração em geração, sendo extremamente relevantes e permanentes ao passar do tempo nestas civilizações. Os gregos não são diferentes, a mitologia grega extremamente abordada diversas vezes na cultura moderna tinha grande relevância para a civilização grega, na formação do indivíduo, do território, da religião e dos limites sociais. Hércules, ou Hércules para os romanos, nome pelo qual ficou mais conhecido, portanto será o utilizado, é um dos, se não o maior mito da mitologia grega, o herói símbolo da civilização aborda diversos dos aspectos existentes dos gregos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência do mito dos 12 trabalhos de Hércules em todos os aspectos da civilização grega, assim como aponta-los.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será utilizado uma das diversas versões do mito dos 12 trabalhos de Hércules, no caso, a mais conhecida, para uma análise e desenvolvimento das mensagens e costumes impressos neste mito de forma direta ou indireta, assim como um artigo que aborda a influência do mito para a formação dos indivíduos e qual a forma que era repassado e livros que discorrem sobre a relação do grego com o mito.			
<b>RESULTADO S</b>	O Mito dos 12 trabalhos de Hércules afeta e se desenvolve em todos o setores da sociedade grega da época, ele determina os limites entre o humano e o divino, estabelecendo o importante conceito da Hybris, uma forma de "bom comportamento" para aqueles que entravam em contato com o mito, desta forma, também utilizado para a formação dos indivíduos, o mito também entrava em contato para com as crianças, como uma forma de demonstrar a utilização da razão para a resolução dos problemas e obstáculos. Em aspectos maiores. Até mesmo a expansão, a magna Grécia se demonstra no mito com o personagem percorrendo diversos lugares que seriam, ou viriam a ser colônias gregas como uma forma de justificativa grega para a conquista do território.			
<b>CONCLUSOES</b>	O mito surge e é recontado com o objetivo de estabelecer e firmar as diversas bases da sociedade grega, regras e costumes estão ali, sendo repassadas de geração em geração, podendo ser chamado de mito formador, Hércules é uma figura extremamente importante para a civilização grega clássica.			
<b>REFERENCIA S</b>	ANTONICHEN, Bruna Moreira. Os doze trabalhos de Hércules como base de formação da civilização na Grécia Antiga. Anais VI CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <a href="https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/61878">https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/61878</a> . VEYNE, Paul. Os gregos acreditavam em seus mitos?. 1ª Edição. São Paulo: Unesp, 2014. GALDINO, Luiz. Os Doze Trabalhos de Hércules. 1ª Edição. São Paulo: FTD, 2000.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14615	História do Brasil	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4324960 - ERICK ANTUNES DA SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Sobre eixos, rodas e lentes, as Passagens do Flâneur da Modernidade a Contemporaneidade			
<b>INTRODUCAO</b>	O termo flâneur surge na literatura do século XIX com o poeta francês Charles Baudelaire (1821 – 1867) e sua obra "As Flores do Mal" (1857). Essa obra é inspirada em Edgar Allan Poe (1808 – 1849) e seu trabalho "O Homem na Multidão" (1840). Por meio dessas obras, surge a contextualização do flâneur não apenas como um passeio físico, mas como uma jornada filosófica. A pesquisa aborda o berço da flânerie, sendo Paris durante o reinado de Napoleão III no século XIX, assim como a cidade de São Paulo nos séculos XX e XIX. Além disso, são incluídos no estudo o skate praticado nas ruas e a fotografia urbana. O objetivo é guiar o leitor na compreensão da transformação do flâneur do século XIX para o skate/fotografia, que representam os novos observadores urbanos dos séculos XX e XXI.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o comportamento de diferentes grupos sociais que habitam espaços específicos e como esses comportamentos são influenciados pela configuração desses espaços.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa baseia-se principalmente em fontes primárias, incluindo dois ensaios do filósofo Walter Benjamin (1892-1940): "Charles Baudelaire e um Lírico no Auge do Capitalismo" e "Rua de Mão Única" (1927). Fontes secundárias também foram utilizadas, como artigos acadêmicos, com destaque para dois específicos da Universidade de São Paulo (USP): "Walter Benjamin e o Flâneur Baudeleriano em Júlio Cortázar" (2020) de Pedro de Carvalho Nalletto e João Gabriel Ferraz Wasconcellos com o artigo "Skat'insubordinado: Flâneurs sobre rodinhas" (2017).			
<b>RESULTADOS</b>	A importância do flâneur e suas passagens no recorte temporal da pesquisa reside em evidenciar as principais mudanças em cidades cosmopolitas, tais como a urbanização desordenada e o impacto do abandono e da clandestinidade de espaços devido à negligência do poder público e privado, bem como a influência de políticas higienistas e do setor privado. Os objetos de estudo tratados na pesquisa conduzem essa discussão.			
<b>CONCLUSOES</b>	As passagens do flâneur no recorte temporal da pesquisa revelam as falhas existentes em cidades cosmopolitas e o comportamento de grupos específicos que compõem as cidades mencionadas na pesquisa, assim como suas transformações ao longo do tempo.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRANDÃO, Leonardo. A cidade e a tribo Skatista: Juventude, Cotidiano e práticas corporais na História cultural. Universidade Federal da Grande Dourados. EDITORA UFGD 2011. 2. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II: Rua de Mão Única. Tradução: J. C. M Barbosa H. A. Baptista. São Paulo, Brasiliense 1994. 3. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III: Charles Baudelaire, um Lírico no auge do Capitalismo. Tradução: J. C. M Barbosa H. A. Baptista. São Paulo, Brasiliense 1994. 4. CARVALHO, Pedro Nalletto. Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de Geografia 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14618	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4410262 - JENNIFER VIANNA MOTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	VALIDAÇÃO POR TELEFONE DE UM INSTRUMENTO DE BAIXO CUSTO PARA RASTREIO DA DPOC- COLA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>As doenças respiratórias crônicas muitas vezes são diagnosticadas tardiamente, o que pode resultar em agravamento das complicações multissistêmicas. Além disso, é bem estabelecido na literatura científica que quanto mais precocemente possível iniciar o tratamento multiprofissional da doença, maior é a sobrevida, e menor serão as complicações. O questionário COLA (COPD in LMICs Assessment) é um instrumento validado no Brasil, aplicado em países de renda baixa-média, que vêm sendo utilizado para rastrear precocemente a presença da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). Porém, estratégias para aumentar a acessibilidade ao rastreo da doença, precisam ser testadas como a sua aplicação por telefone.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Validar a aplicação do questionário COLA por via telefônica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram incluídos no estudo pacientes com idade acima de 40 anos, tabagistas, ex-tabagistas, fumantes passivos, e/ou expostos a gases nocivos com contato por no mínimo dez anos. Os pacientes foram submetidos a um único dia de avaliação presencial para aplicação do questionário COLA e exame de função pulmonar. Em até 24 após o encontro presencial, os pacientes receberam uma ligação telefônica para aplicar o COLA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreo negativo e 31 com rastreo positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 anos (0,9) anos; VEF1/CVF 101± 8,7; 96±14 % (0,1), VEF1 94±18; 76±19 L/min (0,002); mMRC 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (0,003); IMC 28± 5; 27±5 kg/cm2(0,8). Cola presencial mediana de 2 [1-3] e cola por telefone 2[1-3]. No coeficiente de correlação interclasse, foi encontrado um valor de 0,848, com limite inferior de -,710 e limite superior de 0,915. Diante dos resultados obtidos pode-se observar a similaridade e concordância dos valores para rastreo da DPOC.			
<b>CONCLUSOES</b>	A aplicação do questionário COLA, quando realizado por telefone, demonstrou-se válida, quando comparado a aplicação presencial.			
<b>REFERENCIAS</b>	Siddharthan, T. et al. A Novel Case-Finding(#38)#8239;Instrument for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Low-and Middle-Income(#38)#8239;Country Settings. Dec 2021, V. 15, p. 2769-2777. DOI 10.2147/COPD.S268076. Singh, D. et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: the GOLD science committee report 2019. Eur. Respir. J. 53, (2019).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14618	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4426525 - NATHALIA MARTON SANT' ANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	VALIDAÇÃO POR TELEFONE DE UM INSTRUMENTO DE BAIXO CUSTO PARA RASTREIO DA DPOC- COLA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As doenças respiratórias crônicas muitas vezes são diagnosticadas tardiamente, o que pode resultar em agravamento das complicações multissistêmicas. Além disso, é bem estabelecido na literatura científica que quanto mais precocemente possível iniciar o tratamento multiprofissional da doença, maior é a sobrevida, e menor serão as complicações. O questionário COLA (COPD in LMICs Assessment) é um instrumento validado no Brasil, aplicado em países de renda baixa-média, que vêm sendo utilizado para rastrear precocemente a presença da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). Porém, estratégias para aumentar a acessibilidade ao rastreo da doença, precisam ser testadas como a sua aplicação por telefone.			
<b>OBJETIVOS</b>	Validar a aplicação do questionário COLA por via telefônica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram incluídos no estudo pacientes com idade acima de 40 anos, tabagistas, ex-tabagistas, fumantes passivos, e/ou expostos a gases nocivos com contato por no mínimo dez anos. Os pacientes foram submetidos a um único dia de avaliação presencial para aplicação do questionário COLA e exame de função pulmonar. Em até 24 após o encontro presencial, os pacientes receberam uma ligação telefônica para aplicar o COLA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreo negativo e 31 com rastreo positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 anos (0,9) anos; VEF1/CVF 101± 8,7; 96±14 % (0,1), VEF1 94±18; 76±19 L/min (0,002); mMRC 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (0,003); IMC 28± 5; 27±5 kg/cm2(0,8). Cola presencial mediana de 2 [1-3] e cola por telefone 2[1-3]. No coeficiente de correlação interclasse, foi encontrado um valor de 0,848, com limite inferior de -,710 e limite superior de 0,915. Diante dos resultados obtidos pode-se observar a similaridade e concordância dos valores para rastreo da DPOC.			
<b>CONCLUSOES</b>	A aplicação do questionário COLA, quando realizado por telefone, demonstrou-se válida, quando comparado a aplicação presencial.			
<b>REFERENCIAS</b>	Siddharthan, T. et al. A Novel Case-Finding(#38)#8239;Instrument for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Low-and Middle-Income(#38)#8239;Country Settings. Dec 2021, V. 15, p. 2769-2777. DOI 10.2147/COPD.S268076. Singh, D. et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: the GOLD science committee report 2019. Eur. Respir. J. 53, (2019).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14618	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4754417 - BEATRIZ RODRIGUES SILVA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	VALIDAÇÃO POR TELEFONE DE UM INSTRUMENTO DE BAIXO CUSTO PARA RASTREIO DA DPOC- COLA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As doenças respiratórias crônicas muitas vezes são diagnosticadas tardiamente, o que pode resultar em agravamento das complicações multissistêmicas. Além disso, é bem estabelecido na literatura científica que quanto mais precocemente possível iniciar o tratamento multiprofissional da doença, maior é a sobrevida, e menor serão as complicações. O questionário COLA (COPD in LMICs Assessment) é um instrumento validado no Brasil, aplicado em países de renda baixa-média, que vêm sendo utilizado para rastrear precocemente a presença da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). Porém, estratégias para aumentar a acessibilidade ao rastreo da doença, precisam ser testadas como a sua aplicação por telefone.			
<b>OBJETIVOS</b>	Validar a aplicação do questionário COLA por via telefônica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram incluídos no estudo pacientes com idade acima de 40 anos, tabagistas, ex-tabagistas, fumantes passivos, e/ou expostos a gases nocivos com contato por no mínimo dez anos. Os pacientes foram submetidos a um único dia de avaliação presencial para aplicação do questionário COLA e exame de função pulmonar. Em até 24 após o encontro presencial, os pacientes receberam uma ligação telefônica para aplicar o COLA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreo negativo e 31 com rastreo positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 anos (0,9) anos; VEF1/CVF 101± 8,7; 96±14 % (0,1), VEF1 94±18; 76±19 L/min (0,002); mMRC 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (0,003); IMC 28± 5; 27±5 kg/cm2(0,8). Cola presencial mediana de 2 [1-3] e cola por telefone 2[1-3]. No coeficiente de correlação interclasse, foi encontrado um valor de 0,848, com limite inferior de -,710 e limite superior de 0,915. Diante dos resultados obtidos pode-se observar a similaridade e concordância dos valores para rastreo da DPOC.			
<b>CONCLUSOES</b>	A aplicação do questionário COLA, quando realizado por telefone, demonstrou-se válida, quando comparado a aplicação presencial.			
<b>REFERENCIAS</b>	Siddharthan, T. et al. A Novel Case-Finding(#38)#8239;Instrument for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Low-and Middle-Income(#38)#8239;Country Settings. Dec 2021, V. 15, p. 2769-2777. DOI 10.2147/COPD.S268076. Singh, D. et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: the GOLD science committee report 2019. Eur. Respir. J. 53, (2019).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14619	História do Brasil Império	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4451945 - AMANDA SELES SOUSA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Trilhando a Liberdade: Estratégias e Articulações dos Escravizados Rumo ao Fim da Escravização			
<b>INTRODUCA O</b>	Esta pesquisa tem como objetivo analisar os fatores essenciais para o fim da escravidão no Brasil, com ênfase nas estratégias e articulações dos próprios escravizados. Paralelamente, a abolição da escravidão foi influenciada por fatores como a pressão britânica e a evolução da industrialização global, que demandava novas formas de trabalho. Diante desse cenário, os negros e crioulos frequentemente recorriam a fugas, sabotagens, revoltas e à formação de quilombos como estratégias de resistência			
<b>OBJETIVOS</b>	Pesquisa é análise do contexto escravagista do século XIX no Brasil e investigação dos movimentos e estratégias adotadas pelos escravizados que contribuíram para a conquista da liberdade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa histórica de coleta de dados e informações, por meio de livros, documentos, obras literárias, artigos e jornais de época de autores de relevância para atualidade. As fontes se pautam em autores que abordem o tema da escravidão pelo viés do próprio escravizado			
<b>RESULTADO S</b>	Evidenciar a participação direta e indireta dos escravizados quanto ao fim do sistema escravagista, analisando que o Brasil não utilizava apenas da mão de obra escravizada para fomentar a economia e o comércio, o próprio escravizado foi motivo de atroz mercado sendo "objeto" de venda e compra. As revoltas, fugas e criação de quilombos aponta que os mesmos não esperavam pacificamente a conquista da liberdade, mas criavam estratégias para alcançá-la, por exemplo a Revolta dos Malês de 1835. Ademais, o quilombo dos palmares foi motivo de monitoramento até o início do século XIX, isso para que não emergissem novamente como contingente social detendo organização política, econômica e cultural, pois foram um dos maiores meios de preservação de sua cultura africana.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Foi possível destrinchar a participação negra na conquista de sua liberdade, dentro de um contexto escravagista que perdurou por quase quatrocentos anos no Brasil. Isso ressalta que as elites do século XIX acompanhavam as mudanças no âmbito global em relação aos meios de trabalho e à industrialização. Todavia, um dos motivos que atrasava a abolição é o fato de que, em muitos casos, no Brasil não havia indenizações à medida que a liberdade era estabelecida, acarretando prejuízos financeiros para essas elites e a escassez de mão de obra. O cenário pós-abolição destaca a falta de inserção dos povos negros na sociedade, que, sem medidas políticas, passaram a se deslocar para as margens da sociedade			
<b>REFERENCIA S</b>	ALVES, Castro. O Navio Negreiro e outros poemas. 1a edição. São Paulo: Editora Antofágica, 2022. 2. CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. 1a Edição. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2011. ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 2a Edição. São Paulo: Editora Ciranda Cultural, 2018. 3. REIS, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil: Nós achamos em campos a tratar da liberdade. Revista USP. n. 28, p. 14-39, 1996.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14620	História do Brasil República	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4349709 - WILLIAM SANTOS DA COSTA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Anarquia como movimento operário na República Velha			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>anarquismo defende em sua filosofia política a ausência do Estado, hierarquia e autoridade, se opondo a todas as formas de hierarquia, isto inclui instituições, como empresas e sistemas de governo, que exercem controle sobre a população de maneira injusta, desta forma buscando uma organização da sociedade de forma descentralizada, com ênfase na autonomia individual e cooperação mútua, acreditando que a sociedade pode ser organizada de maneira voluntária, onde as pessoas se ajudam mutuamente, em vez de depender de autoridades. Porém além do anarquismo defender a ausência do governo, a corrente anarquista valoriza a autonomia e liberdade individual, acreditando que cada pessoa deve ser capaz de tomar decisões sobre sua própria vida, desde que não prejudique os outros cidadãos presentes na sociedade. O movimento anarquista frequentemente adota a ação direta como um meio de atingir seus objetivos, incluindo protestos, greves e outras formas de ação não violenta, muitas vezes visando mudanças sociais. No período da República Velha no Brasil que durou de 1889 a 1930 foi um período marcado por diversas transformações sociais, políticas e econômicas. Durante essa época o movimento operário emergiu como uma força essencial na busca por direitos trabalhistas e melhorias nas condições de vida da classe trabalhadora urbana.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Este artigo tem como objetivo desmistificar equívocos e preconceitos associados ao anarquismo como um movimento operário durante a República Velha no Brasil. Buscaremos destacar as contribuições do anarquismo, sua diversidade ideológica e a influência positiva que teve no movimento trabalhista da época,</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A metodologia usada no artigo envolveu a seleção e análise de jornais da época como fontes primárias, que cobriam o anarquismo e o movimento operário na República Velha no Brasil. Além disso, fontes secundárias, como livros, foram usados para fornecer contexto e análise. A pesquisa foi comparada e sintetizada para analisar o papel do anarquismo como movimento operário na época, levando em consideração o contexto histórico.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Este artigo contribui para desmistificar a imagem da anarquia como movimento puramente caótico e violento. Em vez disso, destaca o compromisso dos anarquistas com ideais de justiça, igualdade e liberdade, além de seu papel fundamental na construção de um movimento operário forte e na luta por direitos fundamentais. Em suma, a anarquia como movimento operário da República Velha, teve um impacto profundo e duradouro na história do país.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A análise do papel da anarquia como movimento operário da República Velha no Brasil, revela um capítulo fascinante e muitas vezes subestimado na história do país. As descobertas desta pesquisa enfatizam não apenas a importância do anarquismo como uma força motriz por trás da luta operária, mas também a complexidade de suas contribuições. O impacto do anarquismo na República Velha perdura até hoje.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>RAGO, Margaret. Do Cabaré ao Lar: A Utopia da Cidade Disciplinada. Resistência Anarquista. 4ª Edição. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1985. 2. HARDMAN, Francisco Foot. Nem Pátria, nem Patrão: vida operária e cultura anarquista no Brasil. 2ª Edição. São Paulo: Editora brasiliense, 1984. 3. CAMPOS, Cristina Hebling. O sonho libertário: Movimento Operário de 1917 a 1921. 1ª Edição. Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14622	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4377681 - ELIEL LUIS JUSTINO DA CONCEIÇÃO VILAR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nilde Burocchi Ribas D Avila		
<b>TITULO</b>	A utilização de órteses para a coluna vertebral no tratamento da escoliose idiopática do adolescente: revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	A escoliose é o desvio tridimensional da coluna vertebral. Considerada uma alteração postural, comum em adolescentes, a escoliose idiopática do adolescente (EIA), quando não tratada de forma precoce, pode causar deformidades, diminuição da função pulmonar e sofrimento psicológico. Atualmente, o tratamento conservador da EIA, utiliza exercícios e/ou órteses específicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Pesquisar, na literatura, os tipos de órteses utilizadas no tratamento da EIA e identificar seus benefícios.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo de revisão de literatura utilizou artigos científicos das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence Data base (PEDro) e PubMed, no período de 2017 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	As órteses são indicadas em escolioses com ângulo de Cobb menores de 45 graus. A órtese Providence impediu a progressão da curva na EIA. O uso da órtese Cinta Espinhal, associada à exercícios específicos, apresentou redução do ângulo de Cobb, aumento do equilíbrio corporal e redução da sobrecarga plantar, no retro pé, durante a marcha. A órtese de Boston diminuiu o ângulo de Cobb e impediu a progressão da curva. O estudo que comparou a eficácia das órteses Rigo Chenêau com as órteses de Boston, mostrou maiores benefícios no tratamento com a órtese Rigo Chenêau, pois os pacientes apresentaram menor aumento percentual nas curvas principais e foram menos propensos a evoluir para cirurgia de coluna. O uso da órtese de Gensingen reduziu a curva escoliótica e diminuiu a dor lombar. A utilização da órtese Chenêau, associada a exercícios específicos para escoliose, ou exercícios do método Schroth, apresentou redução do ângulo de Cobb e evitou a progressão da curva.			
<b>CONCLUSOES</b>	As órteses, têm sido utilizadas como um meio não cirúrgico e eficaz no tratamento da EIA, sobretudo quando associadas à exercícios específicos para escoliose. Apresentam benefícios no equilíbrio corporal, na diminuição do ângulo de Cobb e na estabilidade de correção da curva, mesmo após o término do tratamento. As órteses Rigo Chenêau, confeccionadas com forças corretivas tridimensionais, apresentam benefícios na redução e estabilização das EIA, têm peso leve e podem proporcionar maior conforto e aceitação de uso, por parte dos pacientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	1.Kuru Çolak T, Akçay B, Apti A, Çolak (#38)#304: The Effectiveness of the Schroth Best Practice Program and Chêneau-Type Brace Treatment in Adolescent Idiopathic Scoliosis: Long-Term Follow-Up Evaluation Results. Children (Basel). 2023 Feb 16;10(2):386. 2.Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, Czuprowski D, Schreiber S, de Mauroy JC, Diers H, Grivas TB, Knott P, Kotwicki T, Lebel A, Marti C, Maruyama T, O'Brien J, Price N, Parent E, Rigo M, Romano M, Stikeleather L, Wynne J, Zaina F. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord. 2018 Jan 10;13:3. 3.Simony A, Beuschau I, Quisth L, Jespersen SM, Carreon LY, Andersen MO. Providence nighttime bracing is effective in treatment for adolescent idiopathic scoliosis even in curves larger than 35°. Eur Spine J. 2019 Sep;28(9):2020-2024.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14624	História Moderna e Contemporânea	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4302401 - MARIANA RIBEIRO SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Apagando a História – A política de esquecimento/negação do governo japonês sobre a história das "Mulheres de Conforto"			
<b>INTRODUCAO</b>	A presente pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias e ações das políticas de esquecimento/negação, adotada pelo governo japonês em relação aos crimes de guerra cometidos durante a Guerra do Pacífico-Asiática (1932-1945). Mas somente um desses crimes de guerra será trabalhado nessa pesquisa que consiste no sistema das "Mulheres de Conforto" no qual meninas e mulheres foram forçadas a serem escravas sexuais dos soldados do Exército Imperial Japonês durante a Guerra do Pacífico-Asiática (1932-1945), calcula-se que 100.000 a 200.000 meninas e mulheres tenham sido conscritas, mas a maioria das vítimas provinha da Coreia e China no qual esses países estavam sobre o domínio do Império japonês naquela época.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os impactos que a políticas de esquecimento/negação adotadas pelo governo japonês causa na memória histórica, na justiça e reparação para as vítimas do sistema das "mulheres de conforto" e nas relações diplomáticas com os países afetados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para desenvolver a pesquisa foram coletados dados e informações, através de livros, artigos, revistas, jornais, documentos, entrevistas e obra literárias, nas quais os autores abordam o tema pesquisado.			
<b>RESULTADOS</b>	No decorrer da pesquisa foi possível provar que o governo Imperial japonês estava ligado diretamente ao sistema das "mulheres de conforto" através de documentos e testemunhos usados durante a pesquisa. Além do mais a negação do governo japonês em relação a história das mulheres de conforto no qual alegam que nunca houve provas ou evidências que o governo imperial japonês participou desse sistema, abriu o caminho para que os grupos ultradireitistas e ultranacionalistas japoneses deslegitimarem os depoimentos das vítimas e qualquer prova encontrada sobre esse sistema. Mas foi possível encontrar que o governo japonês em indiretamente realizou alguns pedidos de desculpas informais ao longo dos anos. Também foi possível identificar que alguns órgãos internacionais como a ONU (Organização das Nações Unidas) em 1992 concluíram que o sistema das "mulheres de conforto" era um sistema de "escravidão sexual", mas não processou o Japão em relação a esse crime e que os governos coreano e chinês já processaram o governo japonês sobre o sistema			
<b>CONCLUSOES</b>	Através dessa pesquisa ficou claro que a negação do governo japonês em relação as mulheres de conforto é um tópico controverso, sensível e complexo. As "mulheres de conforto" eram meninas e mulheres que foram sim forçadas a fornecer serviços sexuais para soldados japoneses durante a Guerra do Pacífico-Asiática (1932-1945), muitos historiadores e estudiosos concordam que isso ocorreu, e existem evidências substanciais que sustentam essas alegações			
<b>REFERENCIAS</b>	1. KEUM SUK- GENDRY. Grama. 1. ed. São Paulo: Pipoca (#38) Nanquim, 2020. 2. KIM, P. The "Comfort Women" Redress Movement in Japan: Reflections on the Past 28 years. De Gruyter eBooks, p. 43–70, 24 fev. 2020 3. RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. 1. ed. São Paulo: Editora da Unicamp, 2008.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14625	Engenharias	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4289994 - ANDRE LUIS PITELA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira		
		<b>Orientador Externo</b>		
<b>TITULO</b>	Biopolímeros como alternativa aos Contaminantes Emergentes: Microplásticos			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A poluição causada por microplásticos tem reacendendo o interesse por soluções sustentáveis devido às graves implicações para a saúde e ecossistemas (Freire, 2022). Os biopolímeros derivados de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, surge como uma alternativa promissora, em contraste ao polímero convencional, se destacando por sua biodegradabilidade (Benedicto et al., 2019). O polietileno convencional é notoriamente resistente à biodegradação, podendo persistir no meio ambiente por centenas de anos, fragmentando-se em pequenas partículas de microplástico. (Matheus, 2018)			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o potencial de biopolímeros como solução sustentável por meio de indicadores de ACV.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram utilizados descritores: "contaminantes emergentes", "microplásticos", "polietileno verde", "biodegradabilidade" na plataforma periódicos capes para o período de 2015 a 2023. De um total de 10 artigos foram selecionados os principais indicadores da metodologia ACV.			
<b>RESULTADOS</b>	O polietileno convencional apresenta um Índice de Pressão Ambiental de 39,12% sendo superior ao Polietileno Verde que foi de 7,59%. Essa disparidade ocorre, principalmente, devido ao Índice de Aquecimento Global ter sido negativo para o biopolímero, mesmo que o polietileno verde tenha apresentado um maior Índice de Consumo de Recursos Naturais. O indicador negativo se deve a captura de carbono na atmosfera e sua incorporação no material. O potencial de acidificação e eutrofização de recursos hídricos, o polímero verde apresentou valores da ordem de 0,038 kgSO <sub>2</sub> eq/kgdePE e 0,017 kgdePO <sub>4</sub> eq/kgdePE enquanto que para o PE os indicadores apontam 0,001 kgSO <sub>2</sub> eq/kgdePE e 0,002 kgdePO <sub>4</sub> eq/kgdePE, respectivamente. Esse resultado se deve a utilização de queima de bagaço e de combustíveis fósseis pelos equipamentos agrícolas no processo que emite à atmosfera os SO <sub>x</sub> e as emissões de fósforo. A energia consumida no processo produtivo de origem fóssil foi menor para o Polietileno verde, em torno de 19MJ/kgdePE enquanto que para o convencional o valor foi superior a 80MJ/kgdePE.			
<b>CONCLUSOES</b>	O polietileno verde oferece vantagens significativas na redução de resíduos plásticos e na diminuição de impactos ambientais, embora alguns desafios, como emissões associadas à produção, exijam atenção para otimizar sua sustentabilidade em todas as fases do ciclo de vida do produto.			
<b>REFERENCIAS</b>	Benedicto, F. S. et al. (2019). Biopolymers as an alternative to polyethylene for flexible films packaging. Materials Research, 22(3), DOI: 10.1590/1980-5373-mr-2018-0462. Freire, R. C., Branco, M. M. G. de O., Silva, R. F. da., Carvalho, R. M. C. M. de O., (#38) Silva, H. P. da. MICROPLÁSTICO: CONTAMINANTES EMERGENTES PRESENTE EM EFLUENTES DOMÉSTICOS E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Revista Brasileira De Meio Ambiente (#38) Amp; Sustentabilidade, 2(3), 75–88. 2022 Matheus, J.P., Munhoz, P.M., AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA DE FILMES DE Polietileno (PE): Estudo de caso sobre a alternativa do PE Verde. I Workshop de ACV: Visão Social, Ambiental e Econômica III Workshop de ACV-Social Universidade Federal do ABC (UFABC). 2018 Disponível em: <a href="https://nucleos.ufabc.edu.br/images/revalores/artigos/avaliacao_de_ciclo_de_vida_de_filmes_de.pdf">https://nucleos.ufabc.edu.br/images/revalores/artigos/avaliacao_de_ciclo_de_vida_de_filmes_de.pdf</a> . Acessado em 10/10/2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14626	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4410262 - JENNIFER VIANNA MOTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	Avaliação da qualidade de vida, da sensação de dispneia e da força de membros inferiores em pacientes com rastreio positivo para DPOC			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As doenças respiratórias crônicas compreendem um grupo de diversas doenças pulmonares, que representam um importante problema de saúde pública, em decorrência do diagnóstico tardio e complicações sistêmicas. Pensado nisso, instrumentos de rastreio vêm sendo propostos para identificar precocemente as doenças. Dentre eles, o COLA foi inicialmente desenvolvido para rastrear doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos expostos a gases nocivos. Sabendo que o diagnóstico tardio das doenças respiratórias crônicas no Brasil leva ao agravamento na qualidade de vida e força de membros inferiores, se faz necessário rastrear a presença destas doenças e suas possíveis complicações, o mais precocemente possível, a fim de amenizar estes prejuízos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a qualidade de vida, a sensação de dispneia e da força de membros inferiores em indivíduos com rastreio positivo da DPOC.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal e observacional, com indivíduos com 40 anos até 80 anos, tabagistas ou expostos a gases tóxicos, sendo excluídos quando apresentar hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, sequelas pulmonares graves da covid-19 ou contra-indicação para realizar os testes físicos. Como instrumento de avaliação foi aplicado o questionário COLA (COPD in Low-Middle Income Countries -LMICs Assessment), o impacto da DPOC no estado de saúde (CAT), teste de sentar e levantar de cinco repetições (TSL5) e prova de função pulmonar.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 (p-valor 0,9); frequência de exacerbação 0±0; 1 ±1 (0,1); peak flow 415 ±160 L/min; 288 ±91 (0,00); VEF1/CVF 101± 8,7 ; 96±14 % (0,1)VEF1, 94±18; 76±19 L/min (0,002); mmrc 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (0,003); IMC 28± 5; 27± 5 (0,8). No que se refere a a pontuação total do CAT foi observado valor de 10±8; 17±10 (0,008) respectivamente no TSL5 14±3; 15±3 segundos (0,1).			
<b>CONCLUSOES</b>	Pacientes com rastreio positivo da DPOC apresentam pior qualidade de vida e maior dispneia comparado aos pacientes com rastreio negativo.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>(#38)#8239:Global Initiative for chronicobstructivelungdisease. Global Strategy for thediagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2023 report). EUA: GOLD, 2022 Available from: <a href="https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf">https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf</a>. James MD, Milne KM, Phillips DB, et.al.(#38)#8239:Dyspnea and Exercise Limitation in Mild COPD: The Value of CPET. Frontiers in Medicine, 2020 7.</p> <p>(#38)#8239;doi:10.3389/fmed.2020.00442(#38)#8239; Siddharthan T, Wosu AC, Pollard SL, Hossen S, Alupo P, Shade T, Kalyesubula R, Quaderi S, Wise RA, Hurst JR, Kirenga B, Checkley W. A Novel Case-Finding(#38)#8239; Instrument for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Low- and Middle-Income(#38)#8239; Country Settings International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease(#38)#8239; 2020:15 2769–2777.(#38)#8239;</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14626	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4426525 - NATHALIA MARTON SANT' ANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	Avaliação da qualidade de vida, da sensação de dispneia e da força de membros inferiores em pacientes com rastreio positivo para DPOC			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As doenças respiratórias crônicas compreendem um grupo de diversas doenças pulmonares, que representam um importante problema de saúde pública, em decorrência do diagnóstico tardio e complicações sistêmicas. Pensado nisso, instrumentos de rastreio vêm sendo propostos para identificar precocemente as doenças. Dentre eles, o COLA foi inicialmente desenvolvido para rastrear doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos expostos a gases nocivos. Sabendo que o diagnóstico tardio das doenças respiratórias crônicas no Brasil leva ao agravamento na qualidade de vida e força de membros inferiores, se faz necessário rastrear a presença destas doenças e suas possíveis complicações, o mais precocemente possível, a fim de amenizar estes prejuízos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a qualidade de vida, a sensação de dispneia e da força de membros inferiores em indivíduos com rastreio positivo da DPOC.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal e observacional, com indivíduos com 40 anos até 80 anos, tabagistas ou expostos a gases tóxicos, sendo excluídos quando apresentar hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, sequelas pulmonares graves da covid-19 ou contra-indicação para realizar os testes físicos. Como instrumento de avaliação foi aplicado o questionário COLA (COPD in Low-Middle Income Countries -LMICs Assessment), o impacto da DPOC no estado de saúde (CAT), teste de sentar e levantar de cinco repetições (TSL5) e prova de função pulmonar.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreio negativo e 31 com rastreio positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 (p-valor 0,9); frequência de exacerbação 0±0; 1 ±1 (0,1); peak flow 415 ±160 L/min; 288 ±91 (0,00); VEF1/CVF 101± 8,7 ; 96±14 % (0,1)VEF1, 94±18; 76±19 L/min (0,002); mmrc 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (0,003); IMC 28± 5; 27± 5 (0,8). No que se refere a a pontuação total do CAT foi observado valor de 10±8; 17±10 (0,008) respectivamente no TSL5 14±3; 15±3 segundos (0,1).			
<b>CONCLUSOES</b>	Pacientes com rastreio positivo da DPOC apresentam pior qualidade de vida e maior dispneia comparado aos pacientes com rastreio negativo.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>(#38)#8239:Global Initiative for chronicobstructivelungdisease. Global Strategy for thediagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2023 report). EUA: GOLD, 2022 Available from: <a href="https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf">https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf</a>. James MD, Milne KM, Phillips DB, et.al.(#38)#8239:Dyspnea and Exercise Limitation in Mild COPD: The Value of CPET. Frontiers in Medicine, 2020 7.</p> <p>(#38)#8239;doi:10.3389/fmed.2020.00442(#38)#8239; Siddharthan T, Wosu AC, Pollard SL, Hossen S, Alupo P, Shade T, Kalyesubula R, Quaderi S, Wise RA, Hurst JR, Kirenga B, Checkley W. A Novel Case-Finding(#38)#8239; Instrument for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Low- and Middle-Income(#38)#8239; Country Settings International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease(#38)#8239; 2020:15 2769–2777.(#38)#8239;</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14626	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4754417 - BEATRIZ RODRIGUES SILVA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	Avaliação da qualidade de vida, da sensação de dispneia e da força de membros inferiores em pacientes com rastreo positivo para DPOC			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças respiratórias crônicas compreendem um grupo de diversas doenças pulmonares, que representam um importante problema de saúde pública, em decorrência do diagnóstico tardio e complicações sistêmicas. Pensado nisso, instrumentos de rastreo vêm sendo propostos para identificar precocemente as doenças. Dentre eles, o COLA foi inicialmente desenvolvido para rastrear doença pulmonar obstrutiva crônica em indivíduos expostos a gases nocivos. Sabendo que o diagnóstico tardio das doenças respiratórias crônicas no Brasil leva ao agravamento na qualidade de vida e força de membros inferiores, se faz necessário rastrear a presença destas doenças e suas possíveis complicações, o mais precocemente possível, a fim de amenizar estes prejuízos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a qualidade de vida, a sensação de dispneia e da força de membros inferiores em indivíduos com rastreo positivo da DPOC.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal e observacional, com indivíduos com 40 anos até 80 anos, tabagistas ou expostos a gases tóxicos, sendo excluídos quando apresentar hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, sequelas pulmonares graves da covid-19 ou contra-indicação para realizar os testes físicos. Como instrumento de avaliação foi aplicado o questionário COLA (COPD in Low-Middle Income Countries -LMICs Assessment), o impacto da DPOC no estado de saúde (CAT), teste de sentar e levantar de cinco repetições (TSL5) e prova de função pulmonar.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram avaliados 61 pacientes, sendo 35 com rastreo negativo e 31 com rastreo positivo, sendo respectivamente a média de idade 63±10; 62±9 (p-valor 0,9); frequência de exacerbação 0±0; 1 ±1 (0,1); peak flow 415 ±160 L/min; 288 ±91 (0,00); VEF1/CVF 101± 8,7 ; 96±14 % (0,1)VEF1, 94±18; 76±19 L/min (0,002); mmrc 0,6± 0,6; 1,4 ± 1 (0,003); IMC 28± 5; 27± 5 (0,8). No que se refere a a pontuação total do CAT foi observado valor de 10±8; 17±10 (0,008) respectivamente no TSL5 14±3; 15±3 segundos (0,1).			
<b>CONCLUSOES</b>	Pacientes com rastreo positivo da DPOC apresentam pior qualidade de vida e maior dispneia comparado aos pacientes com rastreo negativo.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>(#38)#8239:Global Initiative for chronicobstructivelungdisease. Global Strategy for thediagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2023 report). EUA: GOLD, 2022 Available from: <a href="https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf">https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf</a>. James MD, Milne KM, Phillips DB, et.al.(#38)#8239:Dyspnea and Exercise Limitation in Mild COPD: The Value of CPET. Frontiers in Medicine, 2020 7.</p> <p>(#38)#8239;doi:10.3389/fmed.2020.00442(#38)#8239; Siddharthan T, Wosu AC, Pollard SL, Hossen S, Alupo P, Shade T, Kalyesubula R, Quaderi S, Wise RA, Hurst JR, Kirenga B, Checkley W. A Novel Case-Finding(#38)#8239; Instrument for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Low- and Middle-Income(#38)#8239; Country Settings International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease(#38)#8239; 2020:15 2769–2777.(#38)#8239;</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14634	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4396553 - NICOLE LIMA QUARESMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcela Maria Carvalho da Silva	João Victor Rolim de Souza	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE E CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COMPROMETIMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO: RESULTADOS PRELIMINARES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O tempo de hospitalização, associado a patologia de base e as complicações inerentes ao tratamento, podem levar a prejuízos do estado de saúde, capacidade física e mobilidade. A deterioração física é o fator de risco mais relevante para a dependência funcional, a institucionalização, a mortalidade e o custo em saúde, logo manter a função é o alvo central para a promoção da saúde dos pacientes hospitalizados. Assim, diagnosticar precocemente esta condição e conhecer os fatores relacionados ao declínio da função dos indivíduos hospitalizados torna-se fundamental, a fim de nortear a prevenção e consiste em parâmetro relevante para a eficácia dos tratamentos empregados.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a mobilidade, status funcional e capacidade ao exercício em pacientes hospitalizados por comprometimento cardiorrespiratório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo observacional e transversal, na qual foi avaliado pacientes adultos, hospitalizados por mais de 24 horas, hemodinamicamente estáveis, com condições clínicas de realizar os testes propostos. As medidas de avaliação foram: medidas de caracterização da amostra, teste de sentar e levantar de cinco repetições (TSL5), teste de marcha estacionária de dois minutos (TME2) e escala Perme.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram incluídos 20 pacientes, 2 excluídos por não concluir as avaliações, com idade média de 64 ± 18 anos; as causas da internação foram 21% por DPOC exacerbado; 25% por ICC descompensada; 21% por pneumonia e 12% por ICC e Pneumonia associada. 53% dos pacientes eram ex-tabagistas, 20% eram fumantes atualmente e 22% nunca fumaram. 21% dos pacientes usavam oxigênio na avaliação e 35% praticavam atividade física antes da internação. A duração do TSL5 foi de 22 ± 6 segundos. No TME2 a SpO2 Pico de 94 ± 4%; a escala Borg dispneia no pico de 4 ± 2 pontos; a escala Borg MMII pico foi de 4 ± 2 pontos; e 42 ± 17 repetições. Escala Perme 25 ± 1 pontos; Escala Glasgow 15 (15- 15,) pontos; Mini- mental 24 (19,5 – 25,5) pontos; Tandem 2 (1-1) pontos e Semi-tandem 1 (1 – 2) pontos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao comparar com os valores de referência presentes na literatura, os resultados demonstram que não há alteração do nível de consciência e equilíbrio, porém os pacientes apresentam baixa capacidade de exercício e prejuízo na funcionalidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	Graf, Carla MS et al. Declínio funcional em idosos hospitalizados: Muitas vezes é uma consequência da hospitalização, mas não precisa ser. ANJ, American Journal of Nursing. 2006. 106(1): 58-67. Menezes C, Oliveira VRC, Menezes RL. Repercussões da hospitalização na capacidade funcional de idosos. Rev. Movimenta. 2010. 3(2): 76-84. Martinez BP, Alves GAA. Avaliação muscular em terapia intensiva. Profisio. 2017. 3(7): 51-80.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14634	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441176 - JOYCE BATISTA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcela Maria Carvalho da Silva	João Victor Rolim de Souza	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE E CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COMPROMETIMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO: RESULTADOS PRELIMINARES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O tempo de hospitalização, associado a patologia de base e as complicações inerentes ao tratamento, podem levar a prejuízos do estado de saúde, capacidade física e mobilidade. A deterioração física é o fator de risco mais relevante para a dependência funcional, a institucionalização, a mortalidade e o custo em saúde, logo manter a função é o alvo central para a promoção da saúde dos pacientes hospitalizados. Assim, diagnosticar precocemente esta condição e conhecer os fatores relacionados ao declínio da função dos indivíduos hospitalizados torna-se fundamental, a fim de nortear a prevenção e consiste em parâmetro relevante para a eficácia dos tratamentos empregados.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a mobilidade, status funcional e capacidade ao exercício em pacientes hospitalizados por comprometimento cardiorrespiratório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo observacional e transversal, na qual foi avaliado pacientes adultos, hospitalizados por mais de 24 horas, hemodinamicamente estáveis, com condições clínicas de realizar os testes propostos. As medidas de avaliação foram: medidas de caracterização da amostra, teste de sentar e levantar de cinco repetições (TSL5), teste de marcha estacionária de dois minutos (TME2) e escala Perme.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram incluídos 20 pacientes, 2 excluídos por não concluir as avaliações, com idade média de 64 ± 18 anos; as causas da internação foram 21% por DPOC exacerbado; 25% por ICC descompensada; 21% por pneumonia e 12% por ICC e Pneumonia associada. 53% dos pacientes eram ex-tabagistas, 20% eram fumantes atualmente e 22% nunca fumaram. 21% dos pacientes usavam oxigênio na avaliação e 35% praticavam atividade física antes da internação. A duração do TSL5 foi de 22 ± 6 segundos. No TME2 a SpO2 Pico de 94 ± 4%; a escala Borg dispneia no pico de 4 ± 2 pontos; a escala Borg MMII pico foi de 4 ± 2 pontos; e 42 ± 17 repetições. Escala Perme 25 ± 1 pontos; Escala Glasgow 15 (15- 15,) pontos; Mini- mental 24 (19,5 – 25,5) pontos; Tandem 2 (1-1) pontos e Semi-tandem 1 (1 – 2) pontos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao comparar com os valores de referência presentes na literatura, os resultados demonstram que não há alteração do nível de consciência e equilíbrio, porém os pacientes apresentam baixa capacidade de exercício e prejuízo na funcionalidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	Graf, Carla MS et al. Declínio funcional em idosos hospitalizados: Muitas vezes é uma consequência da hospitalização, mas não precisa ser. ANJ, American Journal of Nursing. 2006. 106(1): 58-67. Menezes C, Oliveira VRC, Menezes RL. Repercussões da hospitalização na capacidade funcional de idosos. Rev. Movimenta. 2010. 3(2): 76-84. Martinez BP, Alves GAA. Avaliação muscular em terapia intensiva. Profisio. 2017. 3(7): 51-80.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14634	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517555 - RHAIREZ CASSIANE SILVA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcela Maria Carvalho da Silva	João Victor Rolim de Souza	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE E CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COMPROMETIMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO: RESULTADOS PRELIMINARES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O tempo de hospitalização, associado a patologia de base e as complicações inerentes ao tratamento, podem levar a prejuízos do estado de saúde, capacidade física e mobilidade. A deterioração física é o fator de risco mais relevante para a dependência funcional, a institucionalização, a mortalidade e o custo em saúde, logo manter a função é o alvo central para a promoção da saúde dos pacientes hospitalizados. Assim, diagnosticar precocemente esta condição e conhecer os fatores relacionados ao declínio da função dos indivíduos hospitalizados torna-se fundamental, a fim de nortear a prevenção e consiste em parâmetro relevante para a eficácia dos tratamentos empregados.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a mobilidade, status funcional e capacidade ao exercício em pacientes hospitalizados por comprometimento cardiorrespiratório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo observacional e transversal, na qual foi avaliado pacientes adultos, hospitalizados por mais de 24 horas, hemodinamicamente estáveis, com condições clínicas de realizar os testes propostos. As medidas de avaliação foram: medidas de caracterização da amostra, teste de sentar e levantar de cinco repetições (TSL5), teste de marcha estacionária de dois minutos (TME2) e escala Perme.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram incluídos 20 pacientes, 2 excluídos por não concluir as avaliações, com idade média de 64 ± 18 anos; as causas da internação foram 21% por DPOC exacerbado; 25% por ICC descompensada; 21% por pneumonia e 12% por ICC e Pneumonia associada. 53% dos pacientes eram ex-tabagistas, 20% eram fumantes atualmente e 22% nunca fumaram. 21% dos pacientes usavam oxigênio na avaliação e 35% praticavam atividade física antes da internação. A duração do TSL5 foi de 22 ± 6 segundos. No TME2 a SpO2 Pico de 94 ± 4%; a escala Borg dispneia no pico de 4 ± 2 pontos; a escala Borg MMII pico foi de 4 ± 2 pontos; e 42 ± 17 repetições. Escala Perme 25 ± 1 pontos; Escala Glasgow 15 (15- 15,) pontos; Mini- mental 24 (19,5 – 25,5) pontos; Tandem 2 (1-1) pontos e Semi-tandem 1 (1 – 2) pontos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ao comparar com os valores de referência presentes na literatura, os resultados demonstram que não há alteração do nível de consciência e equilíbrio, porém os pacientes apresentam baixa capacidade de exercício e prejuízo na funcionalidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	Graf, Carla MS et al. Declínio funcional em idosos hospitalizados: Muitas vezes é uma consequência da hospitalização, mas não precisa ser. ANJ, American Journal of Nursing. 2006. 106(1): 58-67. Menezes C, Oliveira VRC, Menezes RL. Repercussões da hospitalização na capacidade funcional de idosos. Rev. Movimenta. 2010. 3(2): 76-84. Martinez BP, Alves GAA. Avaliação muscular em terapia intensiva. Profisio. 2017. 3(7): 51-80.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14635	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4396553 - NICOLE LIMA QUARESMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DO STATUS FUNCIONAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COMPROMETIMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO: RESULTADOS PRELIMINARES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O tempo de hospitalização, associado a patologia de base e as complicações inerentes ao tratamento, como uso de dispositivos que restringem a mobilidade, pode levar a prejuízo do estado de saúde (como na capacidade em realizar as atividades de vida diária) e status funcional, tanto durante quando após o período de internação. Com isso, diagnosticar precocemente estas alterações podem direcionar um tratamento mais eficaz durante e após a internação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o status funcional em pacientes hospitalizados com comprometimento cardiorrespiratório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do presente estudo 18 pacientes com idade de 64 ±18 no Hospital Regional Sul, foi realizado testes para avaliação do status funcional de pessoas internadas por mais de 24 horas, a avaliação aconteceu em um único dia e os pacientes foram escolhidos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, as avaliações utilizadas foram: circuito de simulação de atividade de vida diária (AVD) e a escala de Barthel, além de medidas de caracterização da amostra.			
<b>RESULTADOS</b>	Na AVD banho o (#38)#8710; SpO2 foi de 1[0-3], (#38)#8710; FC foi de 7±6, SpO2 repouso foi de 97[95-97], FC repouso foi de 82±14, SpO2 pico foi de 95[93-97], FC pico foi de 89 ±13. Na AVD dobrar toalha a (#38)#8710; SpO2 foi de 1±2, (#38)#8710; FC foi de 12±15, SpO2 repouso foi de 95±2, FC repouso foi de 79±15, SpO2 pico foi de 94±3, FC pico foi de 91±15. Escala Perme foi de 25±1; Escala de Barthel foi de 95±7; Escala de Glasgow foi de 15[15-15]; Escala MMRC foi de 1±1; mini mental foi de 24[19,5-25,5]; Tandem foi de 2[1-1]; Semi-tandem foi de 1[1-2].			
<b>CONCLUSOES</b>	Neste trabalho, as AVDs não geraram sobrecargas ventilatórias e circulatórias, sendo assim, consideradas seguras para serem realizadas no ambiente hospitalar. Além disso, foi identificado prejuízo no status funcional pela escala de Barthel, quando comparado com os dados presentes na literatura.			
<b>REFERENCIAS</b>	Menezes C, Oliveira VRC, Menezes RL. Repercussões da hospitalização na capacidade funcional de idosos. Rev Movimenta. 2010. 3(2): 76-84. Minosso JSM, Amendola F, Alvarenga MIRM, Oliveira MAC. Validação, no Brasil, do índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatórios. Acta Paul Enferm. 2010. 23(2): 218-23. Kawaguchi WMF. et al. Perme intensive care unit score e ICU mobility scale. 2016. 42(6): 429-434. Lourenço FA, Veras RP, Ribeiro PCC. Confiabilidade teste-reteste do mini-exame do estado mental em uma população idosa assistida em uma unidade ambulatorial de saúde. Rev Bras Gerontol. 2008. 11(1): 7-16. Silva GP, Ramos SA, Maciel DMVL. Mobilização precoce na Unidade de Terapia Intensiva. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S.L], 11(16): e592111638749, 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14635	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441176 - JOYCE BATISTA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DO STATUS FUNCIONAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COMPROMETIMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO: RESULTADOS PRELIMINARES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O tempo de hospitalização, associado a patologia de base e as complicações inerentes ao tratamento, como uso de dispositivos que restringem a mobilidade, pode levar a prejuízo do estado de saúde (como na capacidade em realizar as atividades de vida diária) e status funcional, tanto durante quando após o período de internação. Com isso, diagnosticar precocemente estas alterações podem direcionar um tratamento mais eficaz durante e após a internação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o status funcional em pacientes hospitalizados com comprometimento cardiorrespiratório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do presente estudo 18 pacientes com idade de 64 ±18 no Hospital Regional Sul, foi realizado testes para avaliação do status funcional de pessoas internadas por mais de 24 horas, a avaliação aconteceu em um único dia e os pacientes foram escolhidos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, as avaliações utilizadas foram: circuito de simulação de atividade de vida diária (AVD) e a escala de Barthel, além de medidas de caracterização da amostra.			
<b>RESULTADOS</b>	Na AVD banho o (#38)#8710; SpO2 foi de 1[0-3], (#38)#8710; FC foi de 7±6, SpO2 repouso foi de 97[95-97], FC repouso foi de 82±14, SpO2 pico foi de 95[93-97], FC pico foi de 89 ±13. Na AVD dobrar toalha a (#38)#8710; SpO2 foi de 1±2, (#38)#8710; FC foi de 12±15, SpO2 repouso foi de 95±2, FC repouso foi de 79±15, SpO2 pico foi de 94±3, FC pico foi de 91±15. Escala Perme foi de 25±1; Escala de Barthel foi de 95±7; Escala de Glasgow foi de 15[15-15]; Escala MMRC foi de 1±1; mini mental foi de 24[19,5-25,5]; Tandem foi de 2[1-1]; Semi-tandem foi de 1[1-2].			
<b>CONCLUSOES</b>	Neste trabalho, as AVDs não geraram sobrecargas ventilatórias e circulatórias, sendo assim, consideradas seguras para serem realizadas no ambiente hospitalar. Além disso, foi identificado prejuízo no status funcional pela escala de Barthel, quando comparado com os dados presentes na literatura.			
<b>REFERENCIAS</b>	Menezes C, Oliveira VRC, Menezes RL. Repercussões da hospitalização na capacidade funcional de idosos. Rev Movimenta. 2010. 3(2): 76-84. Minosso JSM, Amendola F, Alvarenga MIRM, Oliveira MAC. Validação, no Brasil, do índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatórios. Acta Paul Enferm. 2010. 23(2): 218-23. Kawaguchi WMF. et al. Perme intensive care unit score e ICU mobility scale. 2016. 42(6): 429-434. Lourenço FA, Veras RP, Ribeiro PCC. Confiabilidade teste-reteste do mini-exame do estado mental em uma população idosa assistida em uma unidade ambulatorial de saúde. Rev Bras Gerontol. 2008. 11(1): 7-16. Silva GP, Ramos SA, Maciel DMVL. Mobilização precoce na Unidade de Terapia Intensiva. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S.L], 11(16): e592111638749, 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14635	Ciências da Saúde	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517555 - RHAIRES CASSIANE SILVA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		João Victor Rolim de Souza	Marcela Maria Carvalho da Silva	
<b>TITULO</b>	AVALIAÇÃO DO STATUS FUNCIONAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COMPROMETIMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO: RESULTADOS PRELIMINARES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O tempo de hospitalização, associado a patologia de base e as complicações inerentes ao tratamento, como uso de dispositivos que restringem a mobilidade, pode levar a prejuízo do estado de saúde (como na capacidade em realizar as atividades de vida diária) e status funcional, tanto durante quando após o período de internação. Com isso, diagnosticar precocemente estas alterações podem direcionar um tratamento mais eficaz durante e após a internação.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o status funcional em pacientes hospitalizados com comprometimento cardiorrespiratório.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram do presente estudo 18 pacientes com idade de 64 ±18 no Hospital Regional Sul, foi realizado testes para avaliação do status funcional de pessoas internadas por mais de 24 horas, a avaliação aconteceu em um único dia e os pacientes foram escolhidos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, as avaliações utilizadas foram: circuito de simulação de atividade de vida diária (AVD) e a escala de Barthel, além de medidas de caracterização da amostra.			
<b>RESULTADOS</b>	Na AVD banho o (#38)#8710; SpO2 foi de 1[0-3], (#38)#8710; FC foi de 7±6, SpO2 repouso foi de 97[95-97], FC repouso foi de 82±14, SpO2 pico foi de 95[93-97], FC pico foi de 89 ±13. Na AVD dobrar toalha a (#38)#8710; SpO2 foi de 1±2, (#38)#8710; FC foi de 12±15, SpO2 repouso foi de 95±2, FC repouso foi de 79±15, SpO2 pico foi de 94±3, FC pico foi de 91±15. Escala Perme foi de 25±1; Escala de Barthel foi de 95±7; Escala de Glasgow foi de 15[15-15]; Escala MMRC foi de 1±1; mini mental foi de 24[19,5-25,5]; Tandem foi de 2[1-1]; Semi-tandem foi de 1[1-2].			
<b>CONCLUSOES</b>	Neste trabalho, as AVDs não geraram sobrecargas ventilatórias e circulatórias, sendo assim, consideradas seguras para serem realizadas no ambiente hospitalar. Além disso, foi identificado prejuízo no status funcional pela escala de Barthel, quando comparado com os dados presentes na literatura.			
<b>REFERENCIAS</b>	Menezes C, Oliveira VRC, Menezes RL. Repercussões da hospitalização na capacidade funcional de idosos. Rev Movimenta. 2010. 3(2): 76-84. Minosso JSM, Amendola F, Alvarenga MIRM, Oliveira MAC. Validação, no Brasil, do índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatórios. Acta Paul Enferm. 2010. 23(2): 218-23. Kawaguchi WMF. et al. Perme intensive care unit score e ICU mobility scale. 2016. 42(6): 429-434. Lourenço FA, Veras RP, Ribeiro PCC. Confiabilidade teste-reteste do mini-exame do estado mental em uma população idosa assistida em uma unidade ambulatorial de saúde. Rev Bras Gerontol. 2008. 11(1): 7-16. Silva GP, Ramos SA, Maciel DMVL. Mobilização precoce na Unidade de Terapia Intensiva. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. [S.L], 11(16): e592111638749, 2022.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14639	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4918517 - JÚLIA CONSTANTE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador Externo</b>	
		2		
		Ana Paula Ribeiro	GUILHERME SILVEIRA MAIA; GABRIELLE SOUZA OLIVEIRA; ANDRÉ LUIZ CRUZ ESTEVES; RICARDO CESAR SALOMÃO; GIOVANNA TRUSTY BSICARDI	
<b>TITULO</b>	Efeito da reabilitação com re-treinamento da corrida em esteira sobre a dor e funcionalidade dos membros inferiores de corredores com fasciite plantar e histórico da COVID-19			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A fasciite plantar (PF) é a terceira lesão musculoesquelética mais comum em corredores, a qual contribui para incapacidade funcional em 10-15% deles. Atualmente, o re-treinamento da corrida em esteira vem trazendo benefícios para redução das forças de impacto e maior funcionalidade sobre os pés de corredores com e sem lesão no joelho, porém, ainda sem relatos na FP, em especial após diagnóstico da COVID-19. Durante a pandemia da COVID-19, algumas mudanças ocorreram na prática de treino durante o período de lockdown e após este período, especialmente sobre ajustes do comportamento motor dos membros inferiores após histórico da COVID-19, pontos estes ainda não compreendido na literatura			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar o efeito da reabilitação com re-treinamento da corrida em esteira sobre a dor e a funcionalidade dos membros inferiores de corredores com fasciite plantar e histórico da COVID-19.			
<b>METODOLOGIA</b>	Ensaio clínico controlado, randomizado e com avaliador cego. Um total de 24 corredores foram avaliados, entre janeiro a dezembro de 2022, e divididos em dois grupos: corredores com fasciite plantar e histórico da COVID-19 (n=12) e corredores controles sem lesão (n=12) nos últimos 6 meses. Os corredores foram avaliados em dois momentos distintos: 1) pré-intervenção e 2) após 1 mês e meio da intervenção com re-treinamento da corrida em esteira. Protocolo de intervenção foi constituído do re-treinamento da prática da corrida em esteira, em um programa de 5 semanas consecutivas (4 sessões/semana, 40 min/sessão, total de 10 sessões). O desfecho primário foi: a dor nos pés pela escala visual analógica. Os desfechos secundários foram: a funcionalidade dos pés e membros inferiores pelos questionários: FFI (Foot Function Index), o Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) e o Lower Extremity Functional Scale (LEFS) e o padrão de postura dos pés pelo Foot Posture Index (FPI). Análise Estatística: Os efeitos de tempo e grupos foram calculados por meio de ANOVAs dois fatores, considerando um nível de significância de 5%.			
<b>RESULTADOS</b>	Os corredores com FP e histórico de COVID-19 apresentaram redução da dor e aumento do desempenho físico-funcional dos membros inferiores após protocolo de intervenção quando comparado a avaliação inicial (p(#60)0,010), e grupo controle (p(#60)0,001), com tamanho de efeito de moderado a alto.			
<b>CONCLUSOES</b>	A reabilitação com re-treinamento da corrida em esteira foi efetiva e promoveu melhora da dor e aumento da funcionalidade membros inferiores em corredores com fasciite plantar e histórico da COVID-19.			
<b>REFERENCIAS</b>	1.da Silva Neto WC, Lopes AD, Ribeiro AP. Gait Retraining With Visual Biofeedback Reduces Rearfoot Pressure and Foot Pronation in Recreational Runners. J Sport Rehabil. 2022;1;31(2):165-173. 2.DiGiovanni BF, Nawoczenski DA, Lintal ME, et al. Tissue-specific plantar fascia- stretching exercise enhances outcomes in patients with chronic heel pain. A prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A(7):1270-7 3.DiGiovanni BF, Nawoczenski DA, Malay DP, et al. Plantar fascia-specific stretching exercise improves outcomes in patients with chronic plantar fasciitis. A prospective clinical trial with two-year follow-up. J Bone Joint Surg Am 2006;88(8):1775-81.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14641	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4211707 - JOÃO VICTOR VIDAL DE SOUSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Raquel Fernandes Batista		
<b>TITULO</b>	Efeitos da realidade Virtual em pacientes com Parkinson: Revisão Sistemática			
<b>INTRODUCAO</b>	Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurológica de etiologia desconhecida, que ocorre devido a degeneração de algumas células localizadas na região do cérebro conhecida como substância negra. Essas células têm a função de produzir dopamina, substância essa que tem como função conduzir os neurotransmissores, com a falta ou diminuição de dopamina os movimentos são afetados, causando tremores, lentidão nos movimentos, rigidez na musculatura, desequilíbrio e alterações na fala e escrita <sup>1</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo: Avaliar os resultados obtidos por diferentes pesquisas que testaram a realidade virtual como forma de tratamento em pacientes com Doença de Parkinson.			
<b>METODOLOGIA</b>	Metodologia: Foi efetuada uma revisão de literatura sistemática com artigos científicos sobre os efeitos da realidade virtual em pacientes com Doença de Parkinson conforme o modelo PEDro, através das bases de dados Pubmed, PEDro, MEDLINE, SciELO e LILACS.			
<b>RESULTADOS</b>	Resultado: A amostra foi formada por 17 artigos, dos gêneros ensaio clínico, relatos e série de casos, estudo de coorte e estudo piloto, disponíveis nas bases de dados já citadas anteriormente durante o período de 2014 a 2023. Discussão: Os achados no presente estudo mostram que após a apuração dos 17 artigos é notável um interesse pelo conteúdo estudado.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclusão: resultado desta pesquisa científica foi provável verificar que os seguintes estudos têm mostrado que o treino por meio da RV proporcionou melhorias tanto no equilíbrio e marcha de indivíduos com a DP. O uso da RV associado com a fisioterapia convencional tem se mostrado um instrumento de grande valia e potencial agregado.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Doença de Parkinson   Biblioteca Virtual em Saúde MS; [citado 18 abr 2023]. Disponível em: <a href="https://bvsm.sau.de.gov.br/doenca-de-parkinson/#:~:text=O%20que%20é:%20é%20uma,do%20cérebro%20chamada%20substância%20negra">https://bvsm.sau.de.gov.br/doenca-de-parkinson/#:~:text=O%20que%20é:%20é%20uma,do%20cérebro%20chamada%20substância%20negra</a> . 2. Santana C. Efeitos do tratamento com realidade virtual não imersiva na qualidade de vida de indivíduos com Parkinson. Rev Bras Geriatr Gerontol [Internet]. 2015 [citado 18 abr 2023];18(1):49-58. Disponível em: <a href="https://www.rbgg.com.br/arquivos/edicoes/RBGG%2018-1.pdf">https://www.rbgg.com.br/arquivos/edicoes/RBGG%2018-1.pdf</a> 3. CALABRÒ, R. S. et al. Improving motor performance in Parkinson's Disease: a preliminar study on the promising use of the computer assisted virtual reality environment (CAREN). Neurological Sciences, v.41, n.4, p.933- 41,2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14642	Clinica Cirúrgica Animal	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	HABRONEMOSE EM GLÂNDULA MAMÁRIA DE ASININO - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A habronemose cutânea é uma dermatopatia parasitária causada pelo nematódeo do gênero Habronema micróstoma, Habronema muscae e Draschia megastoma. Em seu ciclo biológico são parasitas gástricos, porém, moscas podem depositar L3 na derme ocasionando um ciclo errático intradérmico, com reação de hipersensibilidade, lesões cutâneas granulomatosas e prurido. As regiões mais acometidas são olhos, membros, face, abdômen ventral e prepúcio. As lesões geralmente não cicatrizam devido ao contínuo processo inflamatório, sendo comum a recidiva. O diagnóstico definitivo é feito por análise histopatológica, onde há celularidade inflamatória, predominantemente eosinofílica, e eventualmente fragmentos do parasita. O tratamento de escolha é a excisão da formação granulomatosa, associado redução da resposta inflamatória local e vermifugação dos animais com ivermectina.(#38)#8239;</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de habronemose cutânea localizada no teto direito de uma jumentada, atendida no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi atendido no HOVET-UNISA, um asinino, fêmea, de 6 anos, com histórico de ser adquirido há 2 meses com uma lesão granulomatosa no teto, a qual já havia sido retirada cirurgicamente e recidivou. Ao exame físico os parâmetros avaliados estavam dentro da normalidade. Presença de formação granulomatosa ulcerada com aproximadamente 4cmx2cm, com bordos irregulares, firme a palpação, localizada no esfíncter mamário do teto direito.(#38)#8239; Animal foi posicionado em decúbito lateral esquerdo e mantido sob anestesia geral injetável, sendo realizada biópsia excisional do teto. Após a retirada do teto foi feita aproximação do subcutâneo com padrão de sutura simples contínuo e pele com padrão de sutura simples separada utilizando fio poliglactina 2-0 em ambos os planos.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado do exame histopatológico foi dermatite piogranulomatosa, com infiltrado inflamatório polimorfonucleares (eosinófilos, neutrófilos e linfócitos), e moderado tecido de granulação, sugestivo de habronemose.(#38)#8239; O exame histopatológico é escolha para conclusão do diagnóstico.			
<b>CONCLUSOES</b>	É importante adicionar a habronemose cutânea como diagnóstico diferencial das dermatopatias granulomatosas dos equídeos, independentemente de sua localização. Seu tratamento de escolha inclui a excisão cirúrgica, associado a ivermectina e corticosteroides com a finalidade de prevenir a reinfestação e controlar a resposta inflamatória.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>PARRA, M. A. G. et al. Habronemose cutânea equina: revisão de literatura. NBC-Periódico Científico do Núcleo de Biociências, Belo Horizonte, v. 11, n. 22, p.31-37, jun. 2021.(#38)#8239;Disponível em:(#38)#8239; <a href="https://www.metodista.br/revistas/revistas-izabela/index.php/bio/article/view/2282">https://www.metodista.br/revistas/revistas-izabela/index.php/bio/article/view/2282</a> Acesso em: 06. out. 2023. SILVA, T. O. et al. Habronemose cutânea equina-relato de caso. Revista Científica de Medicina Veterinária, Garça, n.29, p. 2017. Disponível em: <a href="http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/wAcPE5kYUWzH2sG_2017-11-8-12-53-7.pdf">http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/wAcPE5kYUWzH2sG_2017-11-8-12-53-7.pdf</a> Acesso em: 06. out.2023.(#38)#8239; SILVA, A. V. M.; DE ANDRADE MORAES, C. F.; DE ARAÚJO COSTA, H. M. Habronema e Draschia: alguns dados sobre infecções em equinos, asininos e muare de alguns estados brasileiros.(#38)#8239;Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 33, n. 2, p. 89-92, 1996. Disponível em: <a href="https://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/50164/54279">https://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/50164/54279</a> Acesso em 06.out.2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14642	Clinica Cirúrgica Animal	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2972301 - ISABELLA VIEIRA FIGUEIREDO TOMAZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	HABRONEMOSE EM GLÂNDULA MAMÁRIA DE ASININO - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A habronemose cutânea é uma dermatopatia parasitária causada pelo nematódeo do gênero Habronema micróstoma, Habronema muscae e Draschia megastoma. Em seu ciclo biológico são parasitas gástricos, porém, moscas podem depositar L3 na derme ocasionando um ciclo errático intradérmico, com reação de hipersensibilidade, lesões cutâneas granulomatosas e prurido. As regiões mais acometidas são olhos, membros, face, abdômen ventral e prepúcio. As lesões geralmente não cicatrizam devido ao contínuo processo inflamatório, sendo comum a recidiva. O diagnóstico definitivo é feito por análise histopatológica, onde há celularidade inflamatória, predominantemente eosinofílica, e eventualmente fragmentos do parasita. O tratamento de escolha é a excisão da formação granulomatosa, associado redução da resposta inflamatória local e vermifugação dos animais com ivermectina.(#38)#8239;</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de habronemose cutânea localizada no teto direito de uma jumentada, atendida no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi atendido no HOVET-UNISA, um asinino, fêmea, de 6 anos, com histórico de ser adquirido há 2 meses com uma lesão granulomatosa no teto, a qual já havia sido retirada cirurgicamente e recidivou. Ao exame físico os parâmetros avaliados estavam dentro da normalidade. Presença de formação granulomatosa ulcerada com aproximadamente 4cmx2cm, com bordos irregulares, firme a palpação, localizada no esfíncter mamário do teto direito.(#38)#8239; Animal foi posicionado em decúbito lateral esquerdo e mantido sob anestesia geral injetável, sendo realizada biópsia excisional do teto. Após a retirada do teto foi feita aproximação do subcutâneo com padrão de sutura simples contínuo e pele com padrão de sutura simples separada utilizando fio poliglactina 2-0 em ambos os planos.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado do exame histopatológico foi dermatite piogranulomatosa, com infiltrado inflamatório polimorfonucleares (eosinófilos, neutrófilos e linfócitos), e moderado tecido de granulação, sugestivo de habronemose.(#38)#8239; O exame histopatológico é escolha para conclusão do diagnóstico.			
<b>CONCLUSOES</b>	É importante adicionar a habronemose cutânea como diagnóstico diferencial das dermatopatias granulomatosas dos equídeos, independentemente de sua localização. Seu tratamento de escolha inclui a excisão cirúrgica, associado a ivermectina e corticosteroides com a finalidade de prevenir a reinfestação e controlar a resposta inflamatória.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>PARRA, M. A. G. et al. Habronemose cutânea equina: revisão de literatura. NBC-Periódico Científico do Núcleo de Biociências, Belo Horizonte, v. 11, n. 22, p.31-37, jun. 2021.(#38)#8239;Disponível em:(#38)#8239; https://www.metodista.br/revistas/revistas-izabela/index.php/bio/article/view/2282 Acesso em: 06. out. 2023. SILVA, T. O. et al. Habronemose cutânea equina—relato de caso. Revista Científica de Medicina Veterinária, Garça, n.29, p. 2017. Disponível em: http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/wAcPE5kYUWzH2sG_2017-11-8-12-53-7.pdf Acesso em: 06. out.2023.(#38)#8239;(#38)#8239; SILVA, A. V. M.; DE ANDRADE MORAES, C. F.; DE ARAÚJO COSTA, H. M. Habronema e Draschia: alguns dados sobre infecções em equinos, asininos e muare de alguns estados brasileiros.(#38)#8239;Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 33, n. 2, p. 89-92, 1996. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/50164/54279 Acesso em 06.out.2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14642	Clinica Cirúrgica Animal	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3800504 - THAMIRES ALVES MURTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	HABRONEMOSE EM GLÂNDULA MAMÁRIA DE ASININO - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A habronemose cutânea é uma dermatopatia parasitária causada pelo nematódeo do gênero Habronema micróstoma, Habronema muscae e Draschia megastoma. Em seu ciclo biológico são parasitas gástricos, porém, moscas podem depositar L3 na derme ocasionando um ciclo errático intradérmico, com reação de hipersensibilidade, lesões cutâneas granulomatosas e prurido. As regiões mais acometidas são olhos, membros, face, abdômen ventral e prepúcio. As lesões geralmente não cicatrizam devido ao contínuo processo inflamatório, sendo comum a recidiva. O diagnóstico definitivo é feito por análise histopatológica, onde há celularidade inflamatória, predominantemente eosinofílica, e eventualmente fragmentos do parasita. O tratamento de escolha é a excisão da formação granulomatosa, associado redução da resposta inflamatória local e vermifugação dos animais com ivermectina.(#38)#8239;</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de habronemose cutânea localizada no teto direito de uma jumentada, atendida no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi atendido no HOVET-UNISA, um asinino, fêmea, de 6 anos, com histórico de ser adquirido há 2 meses com uma lesão granulomatosa no teto, a qual já havia sido retirada cirurgicamente e recidivou. Ao exame físico os parâmetros avaliados estavam dentro da normalidade. Presença de formação granulomatosa ulcerada com aproximadamente 4cmx2cm, com bordos irregulares, firme a palpação, localizada no esfíncter mamário do teto direito.(#38)#8239; Animal foi posicionado em decúbito lateral esquerdo e mantido sob anestesia geral injetável, sendo realizada biópsia excisional do teto. Após a retirada do teto foi feita aproximação do subcutâneo com padrão de sutura simples contínuo e pele com padrão de sutura simples separada utilizando fio poliglactina 2-0 em ambos os planos.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado do exame histopatológico foi dermatite piogranulomatosa, com infiltrado inflamatório polimorfonucleares (eosinófilos, neutrófilos e linfócitos), e moderado tecido de granulação, sugestivo de habronemose.(#38)#8239; O exame histopatológico é escolha para conclusão do diagnóstico.			
<b>CONCLUSOES</b>	É importante adicionar a habronemose cutânea como diagnóstico diferencial das dermatopatias granulomatosas dos equídeos, independentemente de sua localização. Seu tratamento de escolha inclui a excisão cirúrgica, associado a ivermectina e corticosteroides com a finalidade de prevenir a reinfestação e controlar a resposta inflamatória.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>PARRA, M. A. G. et al. Habronemose cutânea equina: revisão de literatura. NBC-Periódico Científico do Núcleo de Biociências, Belo Horizonte, v. 11, n. 22, p.31-37, jun. 2021.(#38)#8239;Disponível em:(#38)#8239; <a href="https://www.metodista.br/revistas/revistas-izabela/index.php/bio/article/view/2282">https://www.metodista.br/revistas/revistas-izabela/index.php/bio/article/view/2282</a> Acesso em: 06. out. 2023. SILVA, T. O. et al. Habronemose cutânea equina—relato de caso. Revista Científica de Medicina Veterinária, Garça, n.29, p. 2017. Disponível em: <a href="http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/wAcPE5kYUWzH2sG_2017-11-8-12-53-7.pdf">http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/wAcPE5kYUWzH2sG_2017-11-8-12-53-7.pdf</a> Acesso em: 06. out.2023.(#38)#8239;(#38)#8239; SILVA, A. V. M.; DE ANDRADE MORAES, C. F.; DE ARAÚJO COSTA, H. M. Habronema e Draschia: alguns dados sobre infecções em equinos, asininos e muare de alguns estados brasileiros.(#38)#8239;Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 33, n. 2, p. 89-92, 1996. Disponível em: <a href="https://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/50164/54279">https://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/50164/54279</a> Acesso em 06.out.2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14644	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4140125 - ALESSANDRA DE MELLO NARDI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	A RELAÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA COM A PSICOPATIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, moldando os alicerces psicológicos e emocionais que acompanham um indivíduo ao longo de sua vida. Contudo, quando essa etapa é marcada por experiências de maus-tratos, os efeitos podem ser profundos e duradouros. Um tema de grande interesse e relevância no campo da psicologia é a relação entre a exposição a maus-tratos na infância e o desenvolvimento posterior de traços psicopáticos. Este fenômeno complexo tem sido objeto de intensa investigação, pois compreender suas implicações não apenas lança luz sobre os mecanismos subjacentes à psicopatia, mas também oferece insights valiosos para a prevenção e intervenção precoce.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O presente artigo tem como principal objetivo abordar de forma abrangente e aprofundada a complexa relação entre maus-tratos na infância e a subsequente manifestação de traços psicopáticos. Para atingir esse propósito, delineamos os seguintes objetivos específicos. Analisar a evidência empírica: Examinar as pesquisas científicas e estudos de caso mais relevantes que investigam a associação entre maus-tratos na infância e a predisposição para comportamentos psicopáticos na vida adulta. Compreender os mecanismos biológicos e psicológicos: Explorar os mecanismos biológicos e psicológicos que podem mediar a relação entre maus-tratos na infância e a manifestação de psicopatia. Avaliar a influência de fatores sociais: Investigar como o ambiente pode modular os efeitos dos maus-tratos na infância no desenvolvimento de traços psicopáticos. Discutir sobre diagnóstico e tratamento. Ao abordar esses objetivos, almejamos contribuir para uma compreensão mais aprofundada e informada sobre a interligação entre maus-tratos na infância e a psicopatia.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para realizar a análise proposta, será utilizada da metodologia de análise filmica e de conteúdo, a qual, se trata de uma abordagem valiosa para investigar a relação entre maus-tratos na infância e psicopatia, permitindo uma compreensão mais ampla e rica do fenômeno.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A relação entre maus-tratos na infância e a manifestação de psicopatia é um campo de estudo de extrema relevância e complexidade. O presente artigo oferecerá uma visão abrangente e aprofundada dessa interconexão, destacando os mecanismos biopsicossociais envolvidos. A análise da literatura e a aplicação de metodologias rigorosas permitem explorar os impactos profundos que experiências traumáticas na infância podem ter no desenvolvimento psicológico e comportamental. Evidências sólidas indicam que a exposição a maus-tratos pode ser um fator de risco significativo para o surgimento de traços psicopáticos, e é imperativo que a comunidade científica e profissional esteja atenta a essa relação.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Ao compreender os mecanismos subjacentes e os sinais precoces associados a essa dinâmica, somos capacitados a intervir de maneira mais eficaz, promovendo o bem-estar e a resiliência das crianças vulneráveis. Além disso, esse entendimento informa a formulação de políticas públicas e estratégias de prevenção mais eficazes, criando um ambiente propício ao desenvolvimento saudável.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Almeida, R. H. D. (2018). Fatores biopsicossociais da conduta criminosa e sistema de justiça juvenil: avaliação do comportamento antissocial, através da escala hare PCL-YV, de adolescentes femininas em conflito com a lei. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.</p> <p>American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Artmed Editora. Boduszek, D., Debowska, A., Willmott, D., Jones, A. D., DeLisi, M., (#38) Kirkman, G. (2019). Is female psychopathy linked with child abuse? An empirical investigation using a person-centered approach. Journal of child sexual abuse, 28(6), 708-725. Breaux, R., Babinski, D. E., Willoughby, M. T., Haas, S. M., Coles, E. K., Pelham, W. E., (#38) Waschbusch, D. A. (2020). Examining psychopathic traits in children using the Child Psychopathy Scale—Revised. Journal of abnormal child psychology, 48(2), 251-263. Colins, O. F., Roetman, P. J., Lopez-Romero, L., (#38) Andershed, H. (2020). Assessing psychopathic traits among children: The first validation study of the Child Problematic Traits Inventory in a clinical sample. Assessment, 27(6), 1242-1257.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14644	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4140141 - IZABELA DE MELLO SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Karine Candido Rodrigues		
<b>TITULO</b>	A RELAÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA COM A PSICOPATIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, moldando os alicerces psicológicos e emocionais que acompanham um indivíduo ao longo de sua vida. Contudo, quando essa etapa é marcada por experiências de maus-tratos, os efeitos podem ser profundos e duradouros. Um tema de grande interesse e relevância no campo da psicologia é a relação entre a exposição a maus-tratos na infância e o desenvolvimento posterior de traços psicopáticos. Este fenômeno complexo tem sido objeto de intensa investigação, pois compreender suas implicações não apenas lança luz sobre os mecanismos subjacentes à psicopatia, mas também oferece insights valiosos para a prevenção e intervenção precoce.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O presente artigo tem como principal objetivo abordar de forma abrangente e aprofundada a complexa relação entre maus-tratos na infância e a subsequente manifestação de traços psicopáticos. Para atingir esse propósito, delineamos os seguintes objetivos específicos. Analisar a evidência empírica: Examinar as pesquisas científicas e estudos de caso mais relevantes que investigam a associação entre maus-tratos na infância e a predisposição para comportamentos psicopáticos na vida adulta. Compreender os mecanismos biológicos e psicológicos: Explorar os mecanismos biológicos e psicológicos que podem mediar a relação entre maus-tratos na infância e a manifestação de psicopatia. Avaliar a influência de fatores sociais: Investigar como o ambiente pode modular os efeitos dos maus-tratos na infância no desenvolvimento de traços psicopáticos. Discutir sobre diagnóstico e tratamento. Ao abordar esses objetivos, almejamos contribuir para uma compreensão mais aprofundada e informada sobre a interligação entre maus-tratos na infância e a psicopatia.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para realizar a análise proposta, será utilizada da metodologia de análise filmica e de conteúdo, a qual, se trata de uma abordagem valiosa para investigar a relação entre maus-tratos na infância e psicopatia, permitindo uma compreensão mais ampla e rica do fenômeno.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A relação entre maus-tratos na infância e a manifestação de psicopatia é um campo de estudo de extrema relevância e complexidade. O presente artigo oferecerá uma visão abrangente e aprofundada dessa interconexão, destacando os mecanismos biopsicossociais envolvidos. A análise da literatura e a aplicação de metodologias rigorosas permitem explorar os impactos profundos que experiências traumáticas na infância podem ter no desenvolvimento psicológico e comportamental. Evidências sólidas indicam que a exposição a maus-tratos pode ser um fator de risco significativo para o surgimento de traços psicopáticos, e é imperativo que a comunidade científica e profissional esteja atenta a essa relação.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Ao compreender os mecanismos subjacentes e os sinais precoces associados a essa dinâmica, somos capacitados a intervir de maneira mais eficaz, promovendo o bem-estar e a resiliência das crianças vulneráveis. Além disso, esse entendimento informa a formulação de políticas públicas e estratégias de prevenção mais eficazes, criando um ambiente propício ao desenvolvimento saudável.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Almeida, R. H. D. (2018). Fatores biopsicossociais da conduta criminosa e sistema de justiça juvenil: avaliação do comportamento antissocial, através da escala hare PCL-YV, de adolescentes femininas em conflito com a lei. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.</p> <p>American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Artmed Editora. Boduszek, D., Debowska, A., Willmott, D., Jones, A. D., DeLisi, M., (#38) Kirkman, G. (2019). Is female psychopathy linked with child abuse? An empirical investigation using a person-centered approach. Journal of child sexual abuse, 28(6), 708-725. Breaux, R., Babinski, D. E., Willoughby, M. T., Haas, S. M., Coles, E. K., Pelham, W. E., (#38) Waschbusch, D. A. (2020). Examining psychopathic traits in children using the Child Psychopathy Scale—Revised. Journal of abnormal child psychology, 48(2), 251-263. Colins, O. F., Roetman, P. J., Lopez-Romero, L., (#38) Andershed, H. (2020). Assessing psychopathic traits among children: The first validation study of the Child Problematic Traits Inventory in a clinical sample. Assessment, 27(6), 1242-1257.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14647	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3771938 - IGOR RODRIGUES ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto		
<b>TITULO</b>	Bolsonarismo: 8 de janeiro e a tentativa de golpe em 2023			
<b>INTRODUCAO</b>	O estudo analisa por intermédio das páginas do jornal O Estado de São Paulo, a tentativa de golpe de estado em 8 de janeiro pela base bolsonarista como represália referente à vitória de Luis Inácio Lula da Silva			
<b>OBJETIVOS</b>	considerar que os conflitos que ocorreram em Brasília revelam os traços neofascistas e autoritaristas que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fomentou durante seu governo, chegando a influenciar os seus apoiadores e discutir as ações inconstitucionais e radicais do espectro político da extrema direita..			
<b>METODOLOGIA</b>	metodologia remonta procedimentos da Análise de Conteúdo, pois estabelecidas as categorias de análise, foram observadas narrativas e embates que moveram a base bolsonarista, como também simpatizantes do candidato derrotado, para a tentativa de golpe.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados apontam que conceito neofascismo – conceito este que se baseia na obra Como Funciona o Fascismo, do filósofo Jason Stanley – base que sustenta a análise, remonta as características do movimento político de extrema direita que emerge no cenário mundial na história do tempo presente.			
<b>CONCLUSOES</b>	as conclusões apontam que os conflitos que ocorreram em Brasília revelam os traços neofascistas e autoritaristas que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fomentou durante seu governo, chegando a influenciar os seus apoiadores.			
<b>REFERENCIAS</b>	STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”. 7.ed. Porto Alegre: L(#38)PM, 2022. DIEGUEZ, Consuelo. O ovo da serpente: nova direita e bolsonarismo seus bastidores, personagens e a chegada ao poder. São Paulo: Companhia das letras, 2022. TIBURI, Marcia. Como conversar com um fascista: reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro. 13.ed. Rio de Janeiro: Record, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14652	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1684221 - THAÍS FIDENCIO ARAUJO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luana Prado Figueredo	Joao Henrique de Moraes Ribeiro	
<b>TITULO</b>	PERFIL E POSICIONAMENTO DO ENFERMEIRO QUANTO AO PLANEJAMENTO DO CUIDADO ESPIRITUAL E RELIGIOSO NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	Os cuidados espirituais e religiosos em saúde devem responder as necessidades dos pacientes acerca do sentido e significado de vida, crenças, manifestação de ansiedade, negação, solidão, pedidos de apoio emocional, relações familiares, etc, que são inerentes ao processo de saúde, doença e terminalidade1-2. Para tanto, o profissional precisa compreender os atributos de espiritualidade e religiosidade como fenômenos de cuidado de sua competência profissional, bem como das necessidades expressas nas reações do paciente para planejar um cuidado fundamentado na bioética e no saber-fazer-agir profissional da enfermagem2-3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar o perfil e o posicionamento de enfermeiros acerca do planejamento do cuidado espiritual e religioso no âmbito da assistência.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo quantitativo, do tipo prospectivo e descritivo. A coleta ocorreu entre agosto e setembro de 2023, por meio de formulário autoaplicável virtual do Google Forms(#38)#61650;, enviado pelo Whatsapp (CAAE 72489823.8.0000.008).			
<b>RESULTADOS</b>	A população foi composta por 74 enfermeiro, sendo a maioria mulheres (86,4%). A idade de média foi de 41,3 anos (de 23 e 60 anos). No tocante a identidade religiosa, sendo 36% católicos, 33% protestantes, 16% sincréticos religiosos (espíritas, umbandista, candomblecistas, budistas, hinduístas), 11% espíritas e 2% entre agnósticos e ateus. Destes, 80% estudou em instituições privadas e 66% tem pós-graduação, trabalhando mais de 15 anos (40%), em serviços privados (57%), em contexto hospitalar (39%) e atenção primária à saúde (19%). Quando ao posicionamento acerca da formação em cuidado espiritual e religioso, 40% informam ter recebido, classificando-a como suficiente (43%) e boa (23%). Contudo, 8% deles a desconsidera para assistência em saúde. À despeito da compreensão ao planejamento destes cuidados, frente as necessidades espirituais e religiosas do paciente, consideram suficiente (37%), bem (33%) e insuficiente (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que, a maior parte dos enfermeiros tem identidade religiosa, podendo ser um fator que contribua para compreender as suas necessidades espirituais e religiosas, bem como as dos pacientes. O perfil formativo, demonstrou-se baixo, mas que está sendo compreendida e aplicada, mesmo que insuficiente por alguns deles. Neste contexto, sugere-se investigações para melhor esclarecer a efetividade desta prática, averiguando, ainda, se há resultados satisfatórios nos locais onde é efetuada. Além disso, até que ponto e quais interesses movem o enfermeiro para essa práxis.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Nascimento LC, Oliveira FCS de, Santos T de FM, et al. Atenção às necessidades espirituais na prática clínica de enfermeiros. Aquichan. 2016;16(2):179-92. 2. Bezerra GAF, Silva JPX, Nóbrega RJN, et al. Espiritualidade e religiosidade na atenção primária a saúde: uma revisão integrativa da literatura. REAS. 2022;15(5):e10080. 3. Góes MGO, Crossetti MGO. Desenvolvimento de um modelo de cuidado espiritual para pacientes e familiares no adoecimento. Rev Gaúcha Enferm. 2020;41(esp):e20190150.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14652	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4378288 - RAYSSA VESTRI SAMPAIO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luana Prado Figueredo	Joao Henrique de Moraes Ribeiro	
<b>TITULO</b>	PERFIL E POSICIONAMENTO DO ENFERMEIRO QUANTO AO PLANEJAMENTO DO CUIDADO ESPIRITUAL E RELIGIOSO NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	Os cuidados espirituais e religiosos em saúde devem responder as necessidades dos pacientes acerca do sentido e significado de vida, crenças, manifestação de ansiedade, negação, solidão, pedidos de apoio emocional, relações familiares, etc, que são inerentes ao processo de saúde, doença e terminalidade1-2. Para tanto, o profissional precisa compreender os atributos de espiritualidade e religiosidade como fenômenos de cuidado de sua competência profissional, bem como das necessidades expressas nas reações do paciente para planejar um cuidado fundamentado na bioética e no saber-fazer-agir profissional da enfermagem2-3.			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar o perfil e o posicionamento de enfermeiros acerca do planejamento do cuidado espiritual e religioso no âmbito da assistência.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo quantitativo, do tipo prospectivo e descritivo. A coleta ocorreu entre agosto e setembro de 2023, por meio de formulário autoaplicável virtual do Google Forms(#38)#61650;, enviado pelo Whatsapp (CAAE 72489823.8.0000.008).			
<b>RESULTADOS</b>	A população foi composta por 74 enfermeiro, sendo a maioria mulheres (86,4%). A idade de média foi de 41,3 anos (de 23 e 60 anos). No tocante a identidade religiosa, sendo 36% católicos, 33% protestantes, 16% sincréticos religiosos (espíritas, umbandista, candomblecistas, budistas, hinduístas), 11% espíritas e 2% entre agnósticos e ateus. Destes, 80% estudou em instituições privadas e 66% tem pós-graduação, trabalhando mais de 15 anos (40%), em serviços privados (57%), em contexto hospitalar (39%) e atenção primária à saúde (19%). Quando ao posicionamento acerca da formação em cuidado espiritual e religioso, 40% informam ter recebido, classificando-a como suficiente (43%) e boa (23%). Contudo, 8% deles a desconsidera para assistência em saúde. À despeito da compreensão ao planejamento destes cuidados, frente as necessidades espirituais e religiosas do paciente, consideram suficiente (37%), bem (33%) e insuficiente (30%).			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se que, a maior parte dos enfermeiros tem identidade religiosa, podendo ser um fator que contribua para compreender as suas necessidades espirituais e religiosas, bem como as dos pacientes. O perfil formativo, demonstrou-se baixo, mas que está sendo compreendida e aplicada, mesmo que insuficiente por alguns deles. Neste contexto, sugere-se investigações para melhor esclarecer a efetividade desta prática, averiguando, ainda, se há resultados satisfatórios nos locais onde é efetuada. Além disso, até que ponto e quais interesses movem o enfermeiro para essa práxis.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Nascimento LC, Oliveira FCS de, Santos T de FM, et al. Atenção às necessidades espirituais na prática clínica de enfermeiros. Aquichan. 2016;16(2):179-92. 2. Bezerra GAF, Silva JPX, Nóbrega RJN, et al. Espiritualidade e religiosidade na atenção primária a saúde: uma revisão integrativa da literatura. REAS. 2022;15(5):e10080. 3. Góes MGO, Crossetti MGO. Desenvolvimento de um modelo de cuidado espiritual para pacientes e familiares no adoecimento. Rev Gaúcha Enferm. 2020;41(esp):e20190150.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14654	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3126692 - ANA CAROLINE DIAS DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE Iguana iguana SUBMETIDA A CAUDECTOMIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Há um aumento crescente do interesse por pets não convencionais, porém há grande desconhecimento acerca das alterações fisiopatológicas comuns, devido à carência de maiores estudos nesta área. Dentre as espécies populares, Iguana iguana (iguana-verde) é um réptil nativo do Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil. Estes animais são sensíveis, com modificações nos meios externo e interno acarretando em perturbações clínicas e laboratoriais diversas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar as alterações hematológicas e evolução clínica de uma iguana-verde atendida no HOVET-UNISA, submetida a um procedimento de caudectomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendida uma iguana-verde, macho, pesando 0.275g, com queixa principal de lesão em cauda havia dois meses. O paciente estava ativo e alerta, sem outras alterações clínicas. Ao exame físico, confirmou-se necrose extensa em metade da cauda. Vivia em terrário alto, com tronco e um macho contactante, possuindo lâmpada amarela para aquecimento, porém sem termômetro. A alimentação incluía folhas, verduras e legumes diversos. Foi realizado o planejamento para a cirurgia de caudectomia e, ao longo do período em que o animal foi acompanhado, foram coletados hemogramas seriados.			
<b>RESULTADOS</b>	Na primeira consulta, o paciente apresentou leucocitose (12000/(#38)#956/L), heterofilia (78%), eosinofilia (5%), linfocitose (11%), monocitose (4%) e azurofilia (2%), todos acima da referência de normalidade, sem outras alterações em hemograma. Os resultados foram associados à necrose. Foi prescrita antibioticoterapia e os exames foram repetidos em três dias, observando-se o retorno dos leucócitos à normalidade, o que permitiu a realização do procedimento cirúrgico. Nos exames pós-operatórios, o paciente passou a apresentar anemia, com eritrócitos (0.65 x 10 <sup>6</sup> /(#38)#956/L), hematócrito (14%) e hemoglobina (4.66g/dL) abaixo da referência, além de anisocitose e policromasia discretas. Foi levantada a hipótese de perda de sangue decorrente do procedimento cirúrgico, embora a anemia secundária a medicamentos também tenha sido considerada. Foi feito apenas tratamento de suporte e acompanhamento, com resolução da anemia em exame posterior. Em novos exames, o paciente voltou a apresentar leucocitose (15000/(#38)#956/L). Em investigação clínica, detectou-se que o paciente apresentou fratura de vértebra próxima ao local da amputação, como também havia entrado em ecdisse, condições que poderiam levar à inflamação com leucocitose.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O foco desse relato de caso foi demonstrar a evolução dos parâmetros hematológicos deste paciente frente às adversidades vivenciadas por ele. Embora condições inflamatórias e hemorrágicas tenham sido associadas, respectivamente, às leucocitoses e anemia observadas, ainda há muitas lacunas, pois, tratando-se de uma espécie silvestre, a extrapolação de dados em relação aos pets convencionais deve ser feita com cautela. Dessa forma, alerta-se para a necessidade de mais estudos envolvendo os parâmetros laboratoriais de répteis da fauna brasileira.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ARRUDA, DR. Estudo da transfusão sanguínea em serpentes. 2014. 72p. Monografia - Instituto Butantan, SES/SP, 2014. LIESER J. et al. Oxidative damage of canine erythrocytes after treatment with non-steroidal antiinflammatory drugs. Tierarztl Prax Ausg Kleintiere. 49(6), 407-413, 2021. SILVEIRA, MD. et al. Parâmetros hematológicos e bioquímicos da espécie Iguana iguana: revisão de literatura. Acta Biomedica Brasiliensia. 8(2), 1-12, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14654	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3168981 - LUANA LOPES PATENTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE Iguana iguana SUBMETIDA A CAUDECTOMIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Há um aumento crescente do interesse por pets não convencionais, porém há grande desconhecimento acerca das alterações fisiopatológicas comuns, devido à carência de maiores estudos nesta área. Dentre as espécies populares, Iguana iguana (iguana-verde) é um réptil nativo do Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil. Estes animais são sensíveis, com modificações nos meios externo e interno acarretando em perturbações clínicas e laboratoriais diversas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar as alterações hematológicas e evolução clínica de uma iguana-verde atendida no HOVET-UNISA, submetida a um procedimento de caudectomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendida uma iguana-verde, macho, pesando 0.275g, com queixa principal de lesão em cauda havia dois meses. O paciente estava ativo e alerta, sem outras alterações clínicas. Ao exame físico, confirmou-se necrose extensa em metade da cauda. Vivia em terrário alto, com tronco e um macho contactante, possuindo lâmpada amarela para aquecimento, porém sem termômetro. A alimentação incluía folhas, verduras e legumes diversos. Foi realizado o planejamento para a cirurgia de caudectomia e, ao longo do período em que o animal foi acompanhado, foram coletados hemogramas seriados.			
<b>RESULTADOS</b>	Na primeira consulta, o paciente apresentou leucocitose (12000/(#38)#956/L), heterofilia (78%), eosinofilia (5%), linfocitose (11%), monocitose (4%) e azurofilia (2%), todos acima da referência de normalidade, sem outras alterações em hemograma. Os resultados foram associados à necrose. Foi prescrita antibioticoterapia e os exames foram repetidos em três dias, observando-se o retorno dos leucócitos à normalidade, o que permitiu a realização do procedimento cirúrgico. Nos exames pós-operatórios, o paciente passou a apresentar anemia, com eritrócitos (0.65 x 10 <sup>6</sup> /(#38)#956/L), hematócrito (14%) e hemoglobina (4.66g/dL) abaixo da referência, além de anisocitose e policromasia discretas. Foi levantada a hipótese de perda de sangue decorrente do procedimento cirúrgico, embora a anemia secundária a medicamentos também tenha sido considerada. Foi feito apenas tratamento de suporte e acompanhamento, com resolução da anemia em exame posterior. Em novos exames, o paciente voltou a apresentar leucocitose (15000/(#38)#956/L). Em investigação clínica, detectou-se que o paciente apresentou fratura de vértebra próxima ao local da amputação, como também havia entrado em ecdisse, condições que poderiam levar à inflamação com leucocitose.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O foco desse relato de caso foi demonstrar a evolução dos parâmetros hematológicos deste paciente frente às adversidades vivenciadas por ele. Embora condições inflamatórias e hemorrágicas tenham sido associadas, respectivamente, às leucocitoses e anemia observadas, ainda há muitas lacunas, pois, tratando-se de uma espécie silvestre, a extrapolação de dados em relação aos pets convencionais deve ser feita com cautela. Dessa forma, alerta-se para a necessidade de mais estudos envolvendo os parâmetros laboratoriais de répteis da fauna brasileira.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ARRUDA, DR. Estudo da transfusão sanguínea em serpentes. 2014. 72p. Monografia - Instituto Butantan, SES/SP, 2014. LIESER J. et al. Oxidative damage of canine erythrocytes after treatment with non-steroidal antiinflammatory drugs. Tierarztl Prax Ausg Kleintiere. 49(6), 407-413, 2021. SILVEIRA, MD. et al. Parâmetros hematológicos e bioquímicos da espécie Iguana iguana: revisão de literatura. Acta Biomedica Brasiliensia. 8(2), 1-12, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14654	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor	Status	Apresentação
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Victor Nowosh		
TITULO	ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE Iguana iguana SUBMETIDA A CAUDECTOMIA			
INTRODUÇÃO	Há um aumento crescente do interesse por pets não convencionais, porém há grande desconhecimento acerca das alterações fisiopatológicas comuns, devido à carência de maiores estudos nesta área. Dentre as espécies populares, Iguana iguana (iguana-verde) é um réptil nativo do Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil. Estes animais são sensíveis, com modificações nos meios externo e interno acarretando em perturbações clínicas e laboratoriais diversas.			
OBJETIVOS	Relatar as alterações hematológicas e evolução clínica de uma iguana-verde atendida no HOVET-UNISA, submetida a um procedimento de caudectomia.			
METODOLOGIA	Foi atendida uma iguana-verde, macho, pesando 0.275g, com queixa principal de lesão em cauda havia dois meses. O paciente estava ativo e alerta, sem outras alterações clínicas. Ao exame físico, confirmou-se necrose extensa em metade da cauda. Vivia em terrário alto, com tronco e um macho contactante, possuindo lâmpada amarela para aquecimento, porém sem termômetro. A alimentação incluía folhas, verduras e legumes diversos. Foi realizado o planejamento para a cirurgia de caudectomia e, ao longo do período em que o animal foi acompanhado, foram coletados hemogramas seriados.			
RESULTADOS	Na primeira consulta, o paciente apresentou leucocitose (12000/(#38)#956/L), heterofilia (78%), eosinofilia (5%), linfocitose (11%), monocitose (4%) e azurofília (2%), todos acima da referência de normalidade, sem outras alterações em hemograma. Os resultados foram associados à necrose. Foi prescrita antibioticoterapia e os exames foram repetidos em três dias, observando-se o retorno dos leucócitos à normalidade, o que permitiu a realização do procedimento cirúrgico. Nos exames pós-operatórios, o paciente passou a apresentar anemia, com eritrócitos (0.65 x 10 <sup>6</sup> /(#38)#956/L), hematócrito (14%) e hemoglobina (4.66g/dL) abaixo da referência, além de anisocitose e policromasia discretas. Foi levantada a hipótese de perda de sangue decorrente do procedimento cirúrgico, embora a anemia secundária a medicamentos também tenha sido considerada. Foi feito apenas tratamento de suporte e acompanhamento, com resolução da anemia em exame posterior. Em novos exames, o paciente voltou a apresentar leucocitose (15000/(#38)#956/L). Em investigação clínica, detectou-se que o paciente apresentou fratura de vértebra próxima ao local da amputação, como também havia entrado em ecclise, condições que poderiam levar à inflamação com leucocitose.			
CONCLUSÕES	O foco desse relato de caso foi demonstrar a evolução dos parâmetros hematológicos deste paciente frente às adversidades vivenciadas por ele. Embora condições inflamatórias e hemorrágicas tenham sido associadas, respectivamente, às leucocitoses e anemia observadas, ainda há muitas lacunas, pois, tratando-se de uma espécie silvestre, a extrapolação de dados em relação aos pets convencionais deve ser feita com cautela. Dessa forma, alerta-se para a necessidade de mais estudos envolvendo os parâmetros laboratoriais de répteis da fauna brasileira.			
REFERÊNCIAS	ARRUDA, DR. Estudo da transfusão sanguínea em serpentes. 2014. 72p. Monografia - Instituto Butantan, SES/SP, 2014. LIESER J. et al. Oxidative damage of canine erythrocytes after treatment with non-steroidal antiinflammatory drugs. Tierarztl Prax Ausg Kleintiere. 49(6), 407-413, 2021. SILVEIRA, MD. et al. Parâmetros hematológicos e bioquímicos da espécie Iguana iguana: revisão de literatura. Acta Biomedica Brasiliensia. 8(2), 1-12, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14654	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4636961 - VICTORIA DO NORTE BONETTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE Iguana iguana SUBMETIDA A CAUDECTOMIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Há um aumento crescente do interesse por pets não convencionais, porém há grande desconhecimento acerca das alterações fisiopatológicas comuns, devido à carência de maiores estudos nesta área. Dentre as espécies populares, Iguana iguana (iguana-verde) é um réptil nativo do Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil. Estes animais são sensíveis, com modificações nos meios externo e interno acarretando em perturbações clínicas e laboratoriais diversas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar as alterações hematológicas e evolução clínica de uma iguana-verde atendida no HOVET-UNISA, submetida a um procedimento de caudectomia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendida uma iguana-verde, macho, pesando 0.275g, com queixa principal de lesão em cauda havia dois meses. O paciente estava ativo e alerta, sem outras alterações clínicas. Ao exame físico, confirmou-se necrose extensa em metade da cauda. Vivia em terrário alto, com tronco e um macho contactante, possuindo lâmpada amarela para aquecimento, porém sem termômetro. A alimentação incluía folhas, verduras e legumes diversos. Foi realizado o planejamento para a cirurgia de caudectomia e, ao longo do período em que o animal foi acompanhado, foram coletados hemogramas seriados.			
<b>RESULTADOS</b>	Na primeira consulta, o paciente apresentou leucocitose (12000/(#38)#956/L), heterofilia (78%), eosinofilia (5%), linfocitose (11%), monocitose (4%) e azurofilia (2%), todos acima da referência de normalidade, sem outras alterações em hemograma. Os resultados foram associados à necrose. Foi prescrita antibioticoterapia e os exames foram repetidos em três dias, observando-se o retorno dos leucócitos à normalidade, o que permitiu a realização do procedimento cirúrgico. Nos exames pós-operatórios, o paciente passou a apresentar anemia, com eritrócitos (0.65 x 10 <sup>6</sup> /(#38)#956/L), hematócrito (14%) e hemoglobina (4.66g/dL) abaixo da referência, além de anisocitose e policromasia discretas. Foi levantada a hipótese de perda de sangue decorrente do procedimento cirúrgico, embora a anemia secundária a medicamentos também tenha sido considerada. Foi feito apenas tratamento de suporte e acompanhamento, com resolução da anemia em exame posterior. Em novos exames, o paciente voltou a apresentar leucocitose (15000/(#38)#956/L). Em investigação clínica, detectou-se que o paciente apresentou fratura de vértebra próxima ao local da amputação, como também havia entrado em ecclise, condições que poderiam levar à inflamação com leucocitose.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O foco desse relato de caso foi demonstrar a evolução dos parâmetros hematológicos deste paciente frente às adversidades vivenciadas por ele. Embora condições inflamatórias e hemorrágicas tenham sido associadas, respectivamente, às leucocitoses e anemia observadas, ainda há muitas lacunas, pois, tratando-se de uma espécie silvestre, a extrapolação de dados em relação aos pets convencionais deve ser feita com cautela. Dessa forma, alerta-se para a necessidade de mais estudos envolvendo os parâmetros laboratoriais de répteis da fauna brasileira.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ARRUDA, DR. Estudo da transfusão sanguínea em serpentes. 2014. 72p. Monografia - Instituto Butantan, SES/SP, 2014. LIESER J. et al. Oxidative damage of canine erythrocytes after treatment with non-steroidal antiinflammatory drugs. Tierarztl Prax Ausg Kleintiere. 49(6), 407-413, 2021. SILVEIRA, MD. et al. Parâmetros hematológicos e bioquímicos da espécie Iguana iguana: revisão de literatura. Acta Biomedica Brasiliensia. 8(2), 1-12, 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14658	Clínica Veterinária	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4517563 - JOAO VITOR ANDRADE LIMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca	Camila Trevisan Pereira	DENIS CARVALHO COSTA
<b>TITULO</b>	ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL NO DIFERENCIAL ENTRE HIPOTIREOIDISMO E SÍNDROME DO EUTIREOIDEO DOENTE EM CÃES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Dentre as doenças endócrinas dos pequenos animais o hipotireoidismo é um dos diagnósticos mais desafiadores, o prognóstico é bom se diagnosticado e tratado corretamente, porém a dificuldade de interpretar os exames e a variabilidade de sinais clínicos dessa doença que pode confundir o diagnóstico, pois os sintomas são muito parecidos com os de outras doenças endócrinas e não endócrina. As dosagens de TSH e T4 livre por diálise de equilíbrio são um dos principais métodos de diagnóstico do hipotireoidismo, sendo compatível com hipotireoidismo cães com baixo T4 e elevado TSH.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste relato foi descrever dois pacientes em que ultrassonografia cervical foi utilizada para diferenciar o hipotireoidismo primário da síndrome do eutireoideo doente.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão da literatura e consulta do prontuário das pacientes caninas atendidas no hospital veterinário UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Uma canina, Shih Tzu, 8 anos, veio devido refratariedade ao tratamento de obesidade. Nos exames gerais apresentou anormalidades: anemia normocítica normocrômica e hipercolesterolemia. Devido suspeita de hipotireoidismo foram solicitados exames, cujos resultados foram T4 livre por diálise de equilíbrio 0,11 (VR: 0,82 a 3,65ng/dL) e TSH 0,31 (VR: 0,1 a 0,6 ng/mL). Com a forte suspeita da doença e inconclusão do diagnóstico hormonal devido ao TSH dentro da normalidade, foi realizada ultrassonografia cervical cujo, resultado evidenciou ambos os lobos da tireoide com importante redução de volume. Outra paciente canina, SRD, 7 anos, veio ao hospital devido histórico semelhante de ganho de peso progressivo, associada com termofilia, cegueira e letargia. Ao exame oftalmológico a fundoscopia evidenciou vasos adelgaçados, hiperreflexia, espessamento de nervo óptico, ausência de reflexo de ameaça. Devido suspeita de degeneração retiniana adquirida súbita (SARDS) secundária a um possível hipotireoidismo, foram solicitados uma eletroretinografia, T4 livre por diálise de equilíbrio e TSH. Os resultados evidenciaram perda de atividade de cones e bastonetes compatível com SARDS, T4 livre 0,28ng/dL e TSH 0,5 ng/mL. Uma ultrassonografia cervical foi solicitada para o diferencial de hipotireoidismo e eutireoideo doente, cujo resultado de ambos os lobos da tireoide estavam com ecotextura heterogênea, ecogenicidade mista e redução de volume, foram conclusivos para o diagnóstico de hipotireoidismo primário canino. Cerca 30% dos pacientes não apresentam as alterações clássicas de elevação do TSH, e nesses casos o ultrassom cervical se mostra uma ferramenta útil para o diagnóstico definitivo.			
<b>CONCLUSOES</b>	A ultrassonografia cervical foi fundamental para auxiliar no diagnóstico diferencial e conclusão do hipotireoidismo primário canino em ambos os casos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos - Márcia Marques Jericó; João Pedro de Andrade Neto; Márcia Mery Kogika 2. Brömel C, et al.: Comparison of ultrasonographic characteristics of the thyroid gland in healthy small-, medium-, and large-breed dogs, Am J Vet Res 67(1):70, 2006. 3. Brömel C, et al.: Ultrasonographic evaluation of the thyroid gland in healthy, hypothyroid, and euthyroid Golden Retrievers with nonthyroidal illness, J Vet Intern Med 19(4):499, 2005.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14658	Clínica Veterinária	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4848144 - FERNANDA ALMADA BARBOSA ZANIN MOSCA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca	Camila Trevisan Pereira	<b>Orientador Externo</b>
		DENIS CARVALHO COSTA		
<b>TITULO</b>	ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL NO DIFERENCIAL ENTRE HIPOTIREOIDISMO E SÍNDROME DO EUTIREOIDEO DOENTE EM CÃES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Dentre as doenças endócrinas dos pequenos animais o hipotireoidismo é um dos diagnósticos mais desafiadores, o prognóstico é bom se diagnosticado e tratado corretamente, porém a dificuldade de interpretar os exames e a variabilidade de sinais clínicos dessa doença que pode confundir o diagnóstico, pois os sintomas são muito parecidos com os de outras doenças endócrinas e não endócrina. As dosagens de TSH e T4 livre por diálise de equilíbrio são um dos principais métodos de diagnóstico do hipotireoidismo, sendo compatível com hipotireoidismo cães com baixo T4 e elevado TSH.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste relato foi descrever dois pacientes em que ultrassonografia cervical foi utilizada para diferenciar o hipotireoidismo primário da síndrome do eutireoideo doente.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão da literatura e consulta do prontuário das pacientes caninas atendidas no hospital veterinário UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Uma canina, Shih Tzu, 8 anos, veio devido refratariedade ao tratamento de obesidade. Nos exames gerais apresentou anormalidades: anemia normocítica normocrômica e hipercolesterolemia. Devido suspeita de hipotireoidismo foram solicitados exames, cujos resultados foram T4 livre por diálise de equilíbrio 0,11 (VR: 0,82 a 3,65ng/dL) e TSH 0,31 (VR: 0,1 a 0,6 ng/mL). Com a forte suspeita da doença e inconclusão do diagnóstico hormonal devido ao TSH dentro da normalidade, foi realizada ultrassonografia cervical cujo, resultado evidenciou ambos os lobos da tireoide com importante redução de volume. Outra paciente canina, SRD, 7 anos, veio ao hospital devido histórico semelhante de ganho de peso progressivo, associada com termofilia, cegueira e letargia. Ao exame oftalmológico a fundoscopia evidenciou vasos adelgaçados, hiperreflexia, espessamento de nervo óptico, ausência de reflexo de ameaça. Devido suspeita de degeneração retiniana adquirida súbita (SARDS) secundária a um possível hipotireoidismo, foram solicitados uma eletrorretinografia, T4 livre por diálise de equilíbrio e TSH. Os resultados evidenciaram perda de atividade de cones e bastonetes compatível com SARDS, T4 livre 0,28ng/dL e TSH 0,5 ng/mL. Uma ultrassonografia cervical foi solicitada para o diferencial de hipotireoidismo e eutireoideo doente, cujo resultado de ambos os lobos da tireoide estavam com ecotextura heterogênea, ecogenicidade mista e redução de volume, foram conclusivos para o diagnóstico de hipotireoidismo primário canino. Cerca 30% dos pacientes não apresentam as alterações clássicas de elevação do TSH, e nesses casos o ultrassom cervical se mostra uma ferramenta útil para o diagnóstico definitivo.			
<b>CONCLUSOES</b>	A ultrassonografia cervical foi fundamental para auxiliar no diagnóstico diferencial e conclusão do hipotireoidismo primário canino em ambos os casos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos - Márcia Marques Jericó; João Pedro de Andrade Neto; Márcia Mery Kogika 2. Brömel C, et al.: Comparison of ultrasonographic characteristics of the thyroid gland in healthy small-, medium-, and large-breed dogs, Am J Vet Res 67(1):70, 2006. 3. Brömel C, et al.: Ultrasonographic evaluation of the thyroid gland in healthy, hypothyroid, and euthyroid Golden Retrievers with nonthyroidal illness, J Vet Intern Med 19(4):499, 2005.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14659	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3255743 - RENAN DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	Arlei Marcili	
<b>TITULO</b>	ACIDENTE DE COM OFÍDIOS NA CIDADE DE SÃO PAULO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O município de São Paulo está situado no planalto atlântico junto a serra do mar, sendo considerada uma das maiores regiões metropolitanas do planeta. Apesar dessa dimensão ainda preserva uma ampla área remanescentes da Mata Atlântica em seu território. No entanto, as áreas preservadas estão sendo gradualmente substituídas por ocupações irregulares e não planejadas à medida que a cidade se expande. Esse avanço urbano intensifica o contato entre humanos, e animais silvestres, aumentando os riscos de acidentes com animais peçonhentos, como as serpentes. Dentro desse panorama destaca-se quatro famílias de serpente presente, sendo elas: Dipsadidae, Colubridae, Elapidae, Viperidae.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre a incidência de acidentes ofídicos e o desmatamento nas áreas periféricas do município de São Paulo ao longo da última década.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Este trabalho consiste em uma análise de dois conjuntos de dados referentes ao município de São Paulo, sendo: 1) Registros de acidentes ofídicos entre os anos de 2010 e 2022; 2) Índices de supressão de vegetação. Os dados foram obtidos a partir do TABNET (DATASUS) e MAPBIOMA, respectivamente. A análise envolveu a criação de gráficos de correlação entre essas variáveis, juntamente com uma revisão bibliográfica realizada por meio de artigos científicos disponíveis nas plataformas digitais Scielo e Google Acadêmico.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os resultados revelam que a incidência de acidentes ofídicos, ao longo da última década, não foi constante. Ocorreu um aumento significativo em 2012, quando mais de 100 casos foram notificados. Entre os anos de 2012 e 2013, houve notável aumento nos índices de desmatamento nas áreas periféricas do município de São Paulo. Além disso, os resultados apontam que as serpentes do gênero Bothrops, conhecidas popularmente como Jararacas, são as espécies envolvidas com maior frequência em acidentes. Esse grupo de serpentes demonstra uma grande adaptabilidade a ambientes em urbanização nas periferias, onde são atraídas por roedores sinantrópicos. Esses resultados sugerem a correlação entre o desmatamento nas áreas periféricas de São Paulo e a incidência de acidentes ofídicos, especialmente envolvendo as serpentes do gênero Bothrops. É importante frisar que outro pico de desflorestamento foi observado nos anos de 2018 e 2019, mas sem reflexo evidente no número de acidentes. A ausência de associação entre acidentes ofídicos e desmatamento pode ter diversas causas, inclusive pode esbarrar no declínio populacional das serpentes. As possíveis causas para o observado nos anos de 2018 e 2019 em São Paulo, podemos citar a hipótese que essas áreas já sofreram degradações em outros momentos</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Os resultados deste estudo destacam a importância de conservar a vegetação nativa nas áreas periféricas de São Paulo, como uma medida efetiva para mitigar os riscos de acidentes ofídicos. A conscientização da população e medidas de educação sobre a convivência com a fauna silvestre são essenciais para reduzir os casos de acidentes com serpentes peçonhentas. A preservação ambiental e o planejamento urbano sustentável são aspectos interligados que devem ser priorizados para garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, a proteção do ambiente natural e a saúde pública, reafirmando o conceito de Saúde Única.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Ministério da Saúde (BR). Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Acidente por animais peçonhentos - Notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2023. Disponível em: <a href="http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinanet/cnv/animaisbr.def/#62">http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinanet/cnv/animaisbr.def/#62</a>. Acesso em: 26 conjuntos. 2023. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Acidentes por animais peçonhentos.2014. Disponível em: <a href="http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos-serpentes">http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos-serpentes</a>. Acesso em: 25 mai 2023. SOS Mata Atlântica-Fundação SOS Mata Atlântica; INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – Período 2020-2021. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2022, p. 5. <a href="https://cms.sosma.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Sosma-Atlas-2022-1.pdf">https://cms.sosma.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Sosma-Atlas-2022-1.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14659	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3659062 - BEATRIZ RODRIGUES DA CRUZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	Arlei Marcili	
<b>TITULO</b>	ACIDENTE DE COM OFÍDIOS NA CIDADE DE SÃO PAULO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O município de São Paulo está situado no planalto atlântico junto a serra do mar, sendo considerada uma das maiores regiões metropolitanas do planeta. Apesar dessa dimensão ainda preserva uma ampla área remanescentes da Mata Atlântica em seu território. No entanto, as áreas preservadas estão sendo gradualmente substituídas por ocupações irregulares e não planejadas à medida que a cidade se expande. Esse avanço urbano intensifica o contato entre humanos, e animais silvestres, aumentando os riscos de acidentes com animais peçonhentos, como as serpentes. Dentro desse panorama destaca-se quatro famílias de serpente presente, sendo elas: Dipsadidae, Colubridae, Elapidae, Viperidae.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre a incidência de acidentes ofídicos e o desmatamento nas áreas periféricas do município de São Paulo ao longo da última década.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Este trabalho consiste em uma análise de dois conjuntos de dados referentes ao município de São Paulo, sendo: 1) Registros de acidentes ofídicos entre os anos de 2010 e 2022; 2) Índices de supressão de vegetação. Os dados foram obtidos a partir do TABNET (DATASUS) e MAPBIOMA, respectivamente. A análise envolveu a criação de gráficos de correlação entre essas variáveis, juntamente com uma revisão bibliográfica realizada por meio de artigos científicos disponíveis nas plataformas digitais Scielo e Google Acadêmico.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os resultados revelam que a incidência de acidentes ofídicos, ao longo da última década, não foi constante. Ocorreu um aumento significativo em 2012, quando mais de 100 casos foram notificados. Entre os anos de 2012 e 2013, houve notável aumento nos índices de desmatamento nas áreas periféricas do município de São Paulo. Além disso, os resultados apontam que as serpentes do gênero Bothrops, conhecidas popularmente como Jararacas, são as espécies envolvidas com maior frequência em acidentes. Esse grupo de serpentes demonstra uma grande adaptabilidade a ambientes em urbanização nas periferias, onde são atraídas por roedores sinantrópicos. Esses resultados sugerem a correlação entre o desmatamento nas áreas periféricas de São Paulo e a incidência de acidentes ofídicos, especialmente envolvendo as serpentes do gênero Bothrops. É importante frisar que outro pico de desflorestamento foi observado nos anos de 2018 e 2019, mas sem reflexo evidente no número de acidentes. A ausência de associação entre acidentes ofídicos e desmatamento pode ter diversas causas, inclusive pode esbarrar no declínio populacional das serpentes. As possíveis causas para o observado nos anos de 2018 e 2019 em São Paulo, podemos citar a hipótese que essas áreas já sofreram degradações em outros momentos</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Os resultados deste estudo destacam a importância de conservar a vegetação nativa nas áreas periféricas de São Paulo, como uma medida efetiva para mitigar os riscos de acidentes ofídicos. A conscientização da população e medidas de educação sobre a convivência com a fauna silvestre são essenciais para reduzir os casos de acidentes com serpentes peçonhentas. A preservação ambiental e o planejamento urbano sustentável são aspectos interligados que devem ser priorizados para garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, a proteção do ambiente natural e a saúde pública, reafirmando o conceito de Saúde Única.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Ministério da Saúde (BR). Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Acidente por animais peçonhentos - Notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2023. Disponível em: <a href="http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinanet/cnv/animaisbr.def/#62">http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinanet/cnv/animaisbr.def/#62</a>. Acesso em: 26 conjuntos. 2023. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Acidentes por animais peçonhentos.2014. Disponível em: <a href="http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos-serpentes">http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos-serpentes</a>. Acesso em: 25 mai 2023. SOS Mata Atlântica-Fundação SOS Mata Atlântica; INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – Período 2020-2021. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2022, p. 5. <a href="https://cms.sosma.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Sosma-Atlas-2022-1.pdf">https://cms.sosma.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Sosma-Atlas-2022-1.pdf</a></p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14661	Taxonomia dos Grupos Recentes	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3255743 - RENAN DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	Descrição de uma nova espécie de Peixe Pinoquio ( <i>Hemiodontichthys</i> ) do rio Paraguai.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O gênero <i>Hemiodontichthys</i> é um dos poucos gêneros monotípicos da subfamília Loricariinae. O gênero é endêmico da América do Sul e possui vasta distribuição geográfica, ocorrendo nas bacias cis-andinas do Amazonas, Orinoco e Esequibo. Esses peixes ocupam rios de grande porte, onde frequentemente é encontrado em bancos de areia rasos junto a margens de trechos de água lenta e grande incidência de sol. São animais pequenos (em torno de 13 cm) e possuem uma combinação de corpo extremamente deprimido e coloração disruptiva conferindo-os excelente camuflagem em fundos arenosos. Desde a descrição por Kner (1953), a taxonomia tradicional não consegue identificar padrões morfológicos divergentes a ponto de sustentar a ocorrência de outras espécies no gênero. O que faz desse grupo o Loricariinae com maior distribuição, fugindo do padrão de outras espécies da subfamília que costumam estabelecer populações locais e forte endemismo. Em 2018, análises combinadas de citogenética e molecular permitiram o questionamento do status monotípico de <i>Hemiodontichthys</i>, reforçando suspeitas de que <i>H. ancipenserinus</i> (única espécie descrita) trata-se de um complexo de espécies. Com base em análises de material de coleção, foi identificada uma nova espécie na bacia do rio Paraguai, que é o foco deste estudo</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar a descrição de <i>Hemiodontichthys</i> sp. Nova "Paraguai" com base em análises morfológicas tradicionais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 60 indivíduos de 11 localidades, representando diferentes bacias hidrográficas, incluindo Paraguai (3 amostras, populações do estudo), Madeira (2 amostras, localidade tipo de <i>H. ancipenserinus</i> ), Tapajós (1 amostra), Guamá (5 amostras) e Purus (43 amostras), divididas em duas populações: Igarapé Inquiri (25) e Igarapé São Francisco (18). Os indivíduos foram fotografados na vista dorsal e características morfológicas foram mensuradas com o auxílio de lupa e paquímetro digital.			
<b>RESULTADO S</b>	Apesar da amostragem limitada, observaram-se notáveis diferenças morfológicas entre <i>H. ancipenserinus</i> e a espécie Nova. <i>Hemiodontichthys</i> sp. Nova "Paraguai" apresenta quatro faixas na superfície dorsal, em contraste com as 5 a 6 faixas em <i>H. ancipenserinus</i> . Além disso, a nova espécie não possui filamento na nadadeira caudal, diferentemente de <i>H. ancipenserinus</i> que possui um filamento no raio superior da caudal. A distância da narina até lateral da cabeça em relação à largura da cabeça em <i>Hemiodontichthys</i> sp. Nova é superior a 1,3 enquanto <i>H. ancipenserinus</i> atingem até 1,1. E portanto não se sobrepoem. Essas diferenças morfológicas são tão marcantes que permitem uma clara distinção entre as espécies. A nova espécie é rara nas coleções brasileiras, com apenas 7 exemplares registrados em todos os acervos disponíveis. Isso é notável quando comparado à abundância de <i>H. ancipenserinus</i> em diversas coleções nacionais e internacionais			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados deste estudo apontam para a existência de novas espécies dentro do gênero <i>Hemiodontichthys</i> . A baixa frequência de coletas sugere uma densidade populacional muito baixa, o que pode indicar um risco iminente de extinção dessa espécie.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>ISBRÜCKER, J. J. H.; (#38) NIJSSEN, H. (1974). On <i>Hemiodontichthys ancipenserinus</i> and <i>Reganella depressa</i>, two remarkable mailed catfishes from South America (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). <i>Beaufortia</i>, 1974p.193-222. CARVALHO, MARGARIDA LIMA ET AL. The non-monotypic status of the neotropical fish genus <i>Hemiodontichthys</i> (Siluriformes, Loricariidae) evidenced by genetic approaches. <i>Mitochondrial Dna Part A</i>. Abingdon: Taylor (#38) Francis Ltd, v. 29, n. 8, p. 1224-1230, 2018. FORNEL, R.; CORDEIRO-ESTRELA, P. Morfometria geométrica e a quantificação da forma dos organismos. In: Jorge R. Marinho; Luiz U. Hepp; Rodrigo Fornel. (Org.). <i>Temas em Biologia: Edição comemorativa aos 20 anos do Curso de Ciências Biológicas e aos 5 anos do PPG-Ecologia da URI Campus de</i></p>			

Ano	Cód. ...	Area	Tipo	Modalidade
2023	14665	Ciências Biológicas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4445279 - PEDRO AUGUSTO PIRES BRANDÃO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Arlei Marcili	Herbert Sousa Soares	
<b>TITULO</b>	O PEIXE HEROI: O PAPEL REGULADOR DE <i>Rhamdia quelen</i> NO AMBIENTE DEGRADADO DO RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A fauna de peixes neotropical é reconhecida por sua vasta diversidade de espécies, cada uma com nichos e hábitos alimentares singulares. Essa flexibilidade trófica decorre da disponibilidade de recursos, que pode ser influenciada por distúrbios ambientais e sazonalidade, afetando a estrutura das comunidades. Pesquisas que investigam os hábitos tróficos das espécies são importantes para avaliar a saúde dos ecossistemas aquáticos, especialmente em áreas urbanas críticas para as populações humanas, como os reservatórios. Os estudos podem ajudar a identificar desequilíbrios quanto à diversidade de itens alimentares consumidos por peixes, especialmente em áreas impactadas por atividades humanas. O bagre, <i>Rhamdia quelen</i> , se destaca como um potencial indicador da saúde do ecossistema aquático, dada sua ampla distribuição geográfica, hábitos onívoros e sua capacidade de ocupar o nicho de predador bentônico, além da resiliência às mudanças ecológicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo tem como objetivo avaliar o papel regulador da espécie <i>R. quelen</i> em ambiente degradado, especificamente no reservatório Guarapiranga, utilizando aspectos de ecologia trófica local como indicadores de desequilíbrios ambientais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram realizadas duas coletas de campo, junho e outubro de 2023, em dois pontos de coleta distintos, com diferentes proximidades de áreas urbanas. As capturas envolveram métodos ativos e passivos, e os exemplares coletados foram eutanasiados no local e transportados ao laboratório (URC-LabVet UNISA) para necropsia. A pesquisa consistiu na análise do conteúdo estomacal de <i>R. quelen</i> , onde itens macroscópicos foram visualizados e identificados com auxílio de lupa, enquanto itens menores foram depositados em lâminas e observados no microscópio. A identificação dos itens alimentares foi baseada na literatura de referência, comparação visual, uso de chaves de identificação e quando necessário especialistas foram consultados.			
<b>RESULTADOS</b>	Até o momento, foram coletados quatro peixes, sendo possível observar a presença de diversos itens alimentares no trato digestivo, incluindo detritos vegetais, fragmentos e carapaças de invertebrados aquáticos, assim como exemplares de peixes como <i>Hyphessobrycon eques</i> , <i>Psalidodon</i> sp. e <i>Psalidodon fasciatus</i> . A presença de <i>Eupera klappenbachi</i> , molusco bivalve da Família Sphaeriidae, deve ser destacada, pois foi encontrado em grande quantidade no trato digestório de todos os indivíduos de <i>R. quelen</i> analisados. Exemplares de outras espécies foram examinados, porém apenas <i>R. quelen</i> apresentou o bivalve <i>E. klappenbachi</i> no conteúdo alimentar. Este estudo ressalta a importância de <i>R. quelen</i> na regulação da população de espécies invasoras e oportunistas, como <i>H. eques</i> e <i>E. klappenbachi</i> . A primeira, originalmente do Pantanal, foi introduzida no Alto Paraná, possivelmente devido a solturas irregulares por aquaríofilitas. A segunda, é prolífica em associações com macrófitas aquáticas em ambientes desequilibrados, e até onde se sabe, <i>R. quelen</i> é seu único predador no local.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Essas descobertas sugerem a existência de distúrbios ecológicos, que até então não foram detectados no reservatório Guarapiranga, com implicações significativas para a saúde da comunidade biológica local. Pesquisas de campo adicionais são imprescindíveis para avaliar de forma mais precisa os impactos desses distúrbios e, com base nessas descobertas, orientar políticas públicas e medidas de conservação ambiental adequadas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>ARAUJO-LIMA, C.; AGOSTINHO, A. Trophic aspects of fish communities in Brazilian rivers and reservoirs. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. 1995.</p> <p>GUEDES, D.S. Contribuição ao estudo da sistemática e alimentação de jundiás (<i>Rhamdia</i> spp) na região central do Rio Grande do Sul (Pisces, Pimelodidae). Santa Maria – RS, 1980. 99p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Curso de Pós-graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria. 1980 Luz. S. C. S., Lima, H. C., (#38) Severi, W. 2012. Oecol. Aust. 23(4): 698–711, 2019 710   Estudo da dieta de peixes em várzeas brasileiras Composição da ictiofauna em ambientes marginais e tributários do médio-submédio rio São Francisco. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 7(2), 358–366. DOI: 10.5039/agraria. v7i2a1436</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14667	Ciências Biológicas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3255743 - RENAN DE OLIVEIRA NOGUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	Arlei Marcili	
<b>TITULO</b>	BIOINDICADORES DE POLUIÇÃO POR MICROPLÁSTICO: ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Os microplásticos, minúsculas partículas provenientes de atividades industriais e da degradação de resíduos, representam uma das grandes preocupações ambientais contemporâneas. Essas partículas têm causado distúrbios significativos no meio ambiente, afetando direta ou indiretamente a vida de diversas espécies, incluindo os humanos. Esses contaminantes ambientais ainda possuem o potencial de amplificar os danos de outros agentes nocivos devido ao seu elevado poder de sorção de compostos químicos da água. Por outro lado, os organismos sob esse impacto podem servir de bioindicadores ambientais, funcionando como sentinelas da saúde do ecossistema, auxiliando na prevenção de eventuais contaminações ambientais e humanas sistemáticas. Neste contexto, o grupo de peixes de água doce surge como uma alternativa viável para monitorar a saúde de ecossistemas aquáticos, sobretudo os de importância vital para populações humanas, como os reservatórios urbanos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	A pesquisa teve como objetivo avaliar a presença de microplásticos no reservatório Guarapiranga, utilizando a ictiofauna local como bioindicador de poluição ambiental.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa foi realizada através da análise de conteúdo estomacal de peixes de diferentes espécies e hábitos alimentares. Para isso, foram realizadas cinco coletas de campo entre março e outubro de 2023 em dois pontos de coleta distintos, com diferentes proximidades de mananciais urbanos. As capturas envolveram métodos ativos e passivos, e os exemplares coletados foram eutanasiados no local e transportados ao laboratório (URC-LabVet UNISA) para necropsia. O conteúdo estomacal, de todos os peixes, foram depositados em lâminas e observados no microscópio. A detecção dos fragmentos plásticos foi baseada em referências da literatura por comparação visual.			
<b>RESULTADOS</b>	Até o momento, foram coletados 43 indivíduos pertencentes a nove espécies distintas, caracterizadas por diversos hábitos alimentares, incluindo onívoros, iliófagos e piscívoros. A presença de microplásticos foi observada nos tratos digestivos de cinco espécies: <i>Hoplosternum littorale</i> , <i>Rhamdia quelen</i> , <i>Geophagus brasiliensis</i> , <i>Serrasalmus maculatus</i> , <i>Hoplias malabaricus</i> , <i>Gymnotus</i> sp. e <i>Cichlasoma</i> sp. As partículas plásticas predominavam em formatos filamentosos e exibiam uma variedade de cores, como azul, vermelho e laranja. As taxas de contaminação variaram entre as espécies, sugerindo que diferentes nichos ecológicos podem ser afetados de maneiras distintas. Vale destacar que a contaminação foi mais frequente em espécies iliófagas, com destaque para <i>H. littorale</i> . No entanto, é importante ressaltar que até espécies exclusivamente ictiófagas, como <i>H. malabaricus</i> , apresentaram microplásticos em seus tratos digestivos, indicando a possibilidade de bioacúmulo desses poluentes.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados comprovam a contaminação do reservatório Guarapiranga por microplásticos. Além disso, a possibilidade de bioacúmulo dessas partículas ao longo da cadeia alimentar sugere o risco iminente de contaminação humana por esses poluentes. A pesquisa destaca a importância do uso da ictiofauna como bioindicadores ambientais para monitorar a presença de microplásticos nos ecossistemas de água doce, além de alertar quanto ao potencial risco para a saúde pública.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>OLIVEIRA, C.; CÔRREA, C. Food ecology and presence of microplastic in the stomach content of neotropical fish in an urban river of the upper Paraná River Basin. <i>Ambiente</i> (#38) Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science. 2020; p. 2 – 6. COLE, M.; LINDEQUE, P. HALSBAND, C. GALLOWAY, T. Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. <i>Plymouth Marine Laboratory, Prospect Place, The Hoe, Plymouth PL1 3DH, UK 2011</i>; p. 2589 – 2590. RANI-BORGES, B.; VICENTE, E. Plásticos e microplásticos: poluição em reservatórios. <i>Universidade Estadual Paulista - UNESP, Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba, SP, Brasil. 2022</i>; p. 8 – 14.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14667	Ciências Biológicas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4445279 - PEDRO AUGUSTO PIRES BRANDÃO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	Arlei Marcili	
<b>TITULO</b>	BIOINDICADORES DE POLUIÇÃO POR MICROPLÁSTICO: ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os microplásticos, minúsculas partículas provenientes de atividades industriais e da degradação de resíduos, representam uma das grandes preocupações ambientais contemporâneas. Essas partículas têm causado distúrbios significativos no meio ambiente, afetando direta ou indiretamente a vida de diversas espécies, incluindo os humanos. Esses contaminantes ambientais ainda possuem o potencial de amplificar os danos de outros agentes nocivos devido ao seu elevado poder de sorção de compostos químicos da água. Por outro lado, os organismos sob esse impacto podem servir de bioindicadores ambientais, funcionando como sentinelas da saúde do ecossistema, auxiliando na prevenção de eventuais contaminações ambientais e humanas sistemáticas. Neste contexto, o grupo de peixes de água doce surge como uma alternativa viável para monitorar a saúde de ecossistemas aquáticos, sobretudo os de importância vital para populações humanas, como os reservatórios urbanos.			
<b>OBJETIVOS</b>	A pesquisa teve como objetivo avaliar a presença de microplásticos no reservatório Guarapiranga, utilizando a ictiofauna local como bioindicador de poluição ambiental.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa foi realizada através da análise de conteúdo estomacal de peixes de diferentes espécies e hábitos alimentares. Para isso, foram realizadas cinco coletas de campo entre março e outubro de 2023 em dois pontos de coleta distintos, com diferentes proximidades de mananciais urbanos. As capturas envolveram métodos ativos e passivos, e os exemplares coletados foram eutanasiados no local e transportados ao laboratório (URC-LabVet UNISA) para necropsia. O conteúdo estomacal, de todos os peixes, foram depositados em lâminas e observados no microscópio. A detecção dos fragmentos plásticos foi baseada em referências da literatura por comparação visual.			
<b>RESULTADOS</b>	Até o momento, foram coletados 43 indivíduos pertencentes a nove espécies distintas, caracterizadas por diversos hábitos alimentares, incluindo onívoros, iliófagos e piscívoros. A presença de microplásticos foi observada nos tratos digestivos de cinco espécies: <i>Hoplosternum litorale</i> , <i>Rhamdia quelen</i> , <i>Geophagus brasiliensis</i> , <i>Serrasalmus maculatus</i> , <i>Hoplias malabaricus</i> , <i>Gymnotus sp.</i> e <i>Cichlasoma sp.</i> As partículas plásticas predominavam em formatos filamentosos e exibiam uma variedade de cores, como azul, vermelho e laranja. As taxas de contaminação variaram entre as espécies, sugerindo que diferentes nichos ecológicos podem ser afetados de maneiras distintas. Vale destacar que a contaminação foi mais frequente em espécies iliófagas, com destaque para <i>H. litorale</i> . No entanto, é importante ressaltar que até espécies exclusivamente ictiófagas, como <i>H. malabaricus</i> , apresentaram microplásticos em seus tratos digestivos, indicando a possibilidade de bioacúmulo desses poluentes.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados comprovam a contaminação do reservatório Guarapiranga por microplásticos. Além disso, a possibilidade de bioacúmulo dessas partículas ao longo da cadeia alimentar sugere o risco iminente de contaminação humana por esses poluentes. A pesquisa destaca a importância do uso da ictiofauna como bioindicadores ambientais para monitorar a presença de microplásticos nos ecossistemas de água doce, além de alertar quanto ao potencial risco para a saúde pública.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	OLIVEIRA, C.; CÔRREA, C. Food ecology and presence of microplastic in the stomach content of neotropical fish in an urban river of the upper Paraná River Basin. <i>Ambiente</i> (#38) Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science. 2020; p. 2 – 6. COLE, M.; LINDEQUE, P. HALSBAND, C. GALLOWAY, T. Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. <i>Plymouth Marine Laboratory, Prospect Place, The Hoe, Plymouth PL1 3DH, UK 2011</i> ; p. 2589 – 2590. RANI-BORGES, B.; VICENTE, E. Plásticos e microplásticos: poluição em reservatórios. <i>Universidade Estadual Paulista - UNESP, Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba, SP, Brasil. 2022</i> ; p. 8 – 14.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14667	Ciências Biológicas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4685911 - THAYNA LETICIA LIMA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	Arlei Marcili	
<b>TITULO</b>	BIOINDICADORES DE POLUIÇÃO POR MICROPLÁSTICO: ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os microplásticos, minúsculas partículas provenientes de atividades industriais e da degradação de resíduos, representam uma das grandes preocupações ambientais contemporâneas. Essas partículas têm causado distúrbios significativos no meio ambiente, afetando direta ou indiretamente a vida de diversas espécies, incluindo os humanos. Esses contaminantes ambientais ainda possuem o potencial de amplificar os danos de outros agentes nocivos devido ao seu elevado poder de sorção de compostos químicos da água. Por outro lado, os organismos sob esse impacto podem servir de bioindicadores ambientais, funcionando como sentinelas da saúde do ecossistema, auxiliando na prevenção de eventuais contaminações ambientais e humanas sistemáticas. Neste contexto, o grupo de peixes de água doce surge como uma alternativa viável para monitorar a saúde de ecossistemas aquáticos, sobretudo os de importância vital para populações humanas, como os reservatórios urbanos.			
<b>OBJETIVOS</b>	A pesquisa teve como objetivo avaliar a presença de microplásticos no reservatório Guarapiranga, utilizando a ictiofauna local como bioindicador de poluição ambiental.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa foi realizada através da análise de conteúdo estomacal de peixes de diferentes espécies e hábitos alimentares. Para isso, foram realizadas cinco coletas de campo entre março e outubro de 2023 em dois pontos de coleta distintos, com diferentes proximidades de mananciais urbanos. As capturas envolveram métodos ativos e passivos, e os exemplares coletados foram eutanasiados no local e transportados ao laboratório (URC-LabVet UNISA) para necropsia. O conteúdo estomacal, de todos os peixes, foram depositados em lâminas e observados no microscópio. A detecção dos fragmentos plásticos foi baseada em referências da literatura por comparação visual.			
<b>RESULTADOS</b>	Até o momento, foram coletados 43 indivíduos pertencentes a nove espécies distintas, caracterizadas por diversos hábitos alimentares, incluindo onívoros, iliófagos e piscívoros. A presença de microplásticos foi observada nos tratos digestivos de cinco espécies: <i>Hoplosternum littorale</i> , <i>Rhamdia quelen</i> , <i>Geophagus brasiliensis</i> , <i>Serrasalmus maculatus</i> , <i>Hoplias malabaricus</i> , <i>Gymnotus</i> sp. e <i>Cichlasoma</i> sp. As partículas plásticas predominavam em formatos filamentosos e exibiam uma variedade de cores, como azul, vermelho e laranja. As taxas de contaminação variaram entre as espécies, sugerindo que diferentes nichos ecológicos podem ser afetados de maneiras distintas. Vale destacar que a contaminação foi mais frequente em espécies iliófagas, com destaque para <i>H. littorale</i> . No entanto, é importante ressaltar que até espécies exclusivamente ictiófagas, como <i>H. malabaricus</i> , apresentaram microplásticos em seus tratos digestivos, indicando a possibilidade de bioacúmulo desses poluentes.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados comprovam a contaminação do reservatório Guarapiranga por microplásticos. Além disso, a possibilidade de bioacúmulo dessas partículas ao longo da cadeia alimentar sugere o risco iminente de contaminação humana por esses poluentes. A pesquisa destaca a importância do uso da ictiofauna como bioindicadores ambientais para monitorar a presença de microplásticos nos ecossistemas de água doce, além de alertar quanto ao potencial risco para a saúde pública.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	OLIVEIRA, C.; CÔRREA, C. Food ecology and presence of microplastic in the stomach content of neotropical fish in an urban river of the upper Paraná River Basin. <i>Ambiente</i> (#38) Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science. 2020; p. 2 – 6. COLE, M.; LINDEQUE, P. HALSBAND, C. GALLOWAY, T. Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. <i>Plymouth Marine Laboratory, Prospect Place, The Hoe, Plymouth PL1 3DH, UK 2011</i> ; p. 2589 – 2590. RANI-BORGES, B.; VICENTE, E. Plásticos e microplásticos: poluição em reservatórios. <i>Universidade Estadual Paulista - UNESP, Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba, SP, Brasil. 2022</i> ; p. 8 – 14.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14669	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4441788 - ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Henrique da Silva Nali		
<b>TITULO</b>	HTLV-1 NO BRASIL: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O Brasil é o país com maior número de pessoas infectadas pelo Vírus Linfotrópico de Células T Humanas, com uma estimativa que varia entre 800 mil e 2,5 milhões de pessoas. Cerca de 5% a 10% das pessoas que contraem o HTLV-1 apresentam sintomas que variam desde quadros leves, passando por sua atuação como agente agravante de doenças parasitológicas e infecciosas, até o desenvolvimento de doenças agressivas e potencialmente fatais, como a mielopatia associada ao HTLV-1 e a Leucemia de Células T do Adulto. A infecção é prevalente em mulheres pretas e pardas, com baixa escolaridade. Os estados com maior número de infectados são a Bahia, Acre e Roraima, sendo os dois últimos os estados de menor PIB do Brasil, segundo dados do IBGE de 2022.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Apresentar as características clínicas da infecção pelo vírus HTLV-1, bem como as formas de transmissão e os diferentes métodos de diagnóstico. Além disso, o presente artigo procura relacionar as diferenças socioeconômicas com as taxas de prevalência do vírus. Enfoque especial é direcionado à mulher e à população que compõem os grupos vulneráveis, uma vez que estes se apresentam como os mais sujeitos à infecção.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A metodologia escolhida para o presente artigo é a de revisão bibliográfica. Foram utilizadas bases de dados online como SciELO, PubMed e periódicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. As seguintes palavras chaves foram utilizadas nos termos de busca: HTLV, Epidemiologia, Tratamento, aspectos sociais</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A importância na educação em temas de saúde para a população está em consonância com a necessidade de que se volte um olhar crítico para temas sociais e para a dinâmica econômica na qual o Brasil está inserido. É evidente que a falta de acesso à educação, em conjunto com a insegurança financeira, que pode advir de questões familiares ou sociais, pode ter um papel ativo na manifestação de doenças que não afetariam o indivíduo tão facilmente caso sua situação fosse mais economicamente favorável. Com esse cenário em vista, deve-se fomentar a adoção de medidas que combatam não somente a doença de forma isolada, mas um enfrentamento que considere os aspectos sociais inerentes a ela.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>A conclusão obtida através dos dados analisados endossa o intento de demonstrar que o vírus afeta principalmente minorias sociais e pessoas economicamente vulneráveis em dados e estatísticas completamente discrepantes do que se observa em pessoas que não pertencem a esses grupos.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV); 28 fev 2021 . Disponível em: <a href="http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1679-49742021000500015">http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1679-49742021000500015</a> Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV-1 and HTLV-2): literature review.; 5 out 2021 ]. Disponível em: <a href="https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/36940/pdf/94982">https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/36940/pdf/94982</a> Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV. 2021 [. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/2021/guia-de-manejo-clinico-da-infeccao-pelo-htlv">https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/2021/guia-de-manejo-clinico-da-infeccao-pelo-htlv</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14669	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441800 - SABRINA BETANIA DE ASSIS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luiz Henrique da Silva Nali		
<b>TITULO</b>	HTLV-1 NO BRASIL: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O Brasil é o país com maior número de pessoas infectadas pelo Vírus Linfotrópico de Células T Humanas, com uma estimativa que varia entre 800 mil e 2,5 milhões de pessoas. Cerca de 5% a 10% das pessoas que contraem o HTLV-1 apresentam sintomas que variam desde quadros leves, passando por sua atuação como agente agravante de doenças parasitológicas e infecciosas, até o desenvolvimento de doenças agressivas e potencialmente fatais, como a mielopatia associada ao HTLV-1 e a Leucemia de Células T do Adulto. A infecção é prevalente em mulheres pretas e pardas, com baixa escolaridade. Os estados com maior número de infectados são a Bahia, Acre e Roraima, sendo os dois últimos os estados de menor PIB do Brasil, segundo dados do IBGE de 2022.			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar as características clínicas da infecção pelo vírus HTLV-1, bem como as formas de transmissão e os diferentes métodos de diagnóstico. Além disso, o presente artigo procura relacionar as diferenças socioeconômicas com as taxas de prevalência do vírus. Enfoque especial é direcionado à mulher e à população que compõem os grupos vulneráveis, uma vez que estes se apresentam como os mais sujeitos à infecção.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia escolhida para o presente artigo é a de revisão bibliográfica. Foram utilizadas bases de dados online como SciELO, PubMed e periódicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. As seguintes palavras chaves foram utilizadas nos termos de busca: HTLV, Epidemiologia, Tratamento, aspectos sociais			
<b>RESULTADOS</b>	A importância na educação em temas de saúde para a população está em consonância com a necessidade de que se volte um olhar crítico para temas sociais e para a dinâmica econômica na qual o Brasil está inserido. É evidente que a falta de acesso à educação, em conjunto com a insegurança financeira, que pode advir de questões familiares ou sociais, pode ter um papel ativo na manifestação de doenças que não afetariam o indivíduo tão facilmente caso sua situação fosse mais economicamente favorável. Com esse cenário em vista, deve-se fomentar a adoção de medidas que combatam não somente a doença de forma isolada, mas um enfrentamento que considere os aspectos sociais inerentes a ela.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A conclusão obtida através dos dados analisados endossa o intento de demonstrar que o vírus afeta principalmente minorias sociais e pessoas economicamente vulneráveis em dados e estatísticas completamente discrepantes do que se observa em pessoas que não pertencem a esses grupos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV); 28 fev 2021 . Disponível em: <a href="http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1679-49742021000500015">http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1679-49742021000500015</a> Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV-1 and HTLV-2): literature review.; 5 out 2021 ]. Disponível em: <a href="https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/36940/pdf/94982">https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/36940/pdf/94982</a> Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV. 2021 [. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/2021/guia-de-manejo-clinico-da-infeccao-pelo-htlv">https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/2021/guia-de-manejo-clinico-da-infeccao-pelo-htlv</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14670	História	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442776 - JENNIFER MENEZES FERREIRA RODRIGUES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	Herança de Luta: A Dizimação dos Povos Indígenas no Brasil Colônia			
<b>INTRODUCA O</b>	De acordo com a Funai, em 1500, havia cerca de 5.000.000 de indígenas quando os portugueses desembarcaram no Brasil, responsáveis por fazer esse número cair para 800.000 em apenas 70 anos. Os números apresentam um genocídio gritante, são milhões de vidas ceifadas e indígenas lutando pelo direito da terra, da liberdade e da própria vida. Este artigo investigará os fatores contribuintes que levaram à essa dizimação tão expressiva dos povos indígenas durante o Brasil colônia.			
<b>OBJETIVOS</b>	O artigo visa explorar e lançar luz sobre as causas da dizimação dos povos originários, buscando compreender como a interação com os colonizadores, guerra biológica, escravidão, assimilação cultural e religiosa forçada e conflitos armados influenciou a drástica redução dessas populações e as consequências desse processo para a sociedade atual.			
<b>METODOLOGIA</b>	A presente pesquisa, através da análise documental e bibliográfica, investiga de modo crítico a causa indígena, que considera a "invasão" do Brasil e o genocídio dos povos originários como uma questão histórica e social.			
<b>RESULTADO S</b>	O conflito entre esses povos será muito forte no âmbito biótico, por conta das doenças trazidas da Europa pelos colonizadores, essas que eram mortais para as populações nativas, que não possuíam anticorpos para reagir. No âmbito ecológico, marcado pela disputa de território, de suas florestas, fauna e riquezas, que serão utilizadas de maneira nunca sequer pensadas pelos indígenas, de maneira lucrativa. No âmbito econômico e social, com a exploração demasiada desses povos, através da escravização e mercantilização das relações de produção. Além desses fatores, existe também o fator étnico-cultural, com a assimilação forçada.			
<b>CONCLUSOE S</b>	É de suma importância compreender a história desses povos para que todo esse sofrimento não se repita mais, como é o que vem acontecendo gradualmente no Brasil, já que os indígenas vivem como se fossem estrangeiros no próprio território, consequência da invisibilidade, violência, invasão de suas terras, ações do garimpo, desestruturação dos modos de vida, marginalização, entre outros fatores. É essencial reconhecer e respeitar a história e a cultura indígena visando reparação histórica, pois compreender esse genocídio é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa para os povos originários. Neste sentido, identifica-se na presente pesquisa as lacunas na historiografia que aborda o tema e a divergência de dados sobre os impactos do genocídio e da redução das populações.			
<b>REFERENCIA S</b>	CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. 1. ed. São Paulo: Companhia de Bolso, 2012. WERÁ, Kaká. A Terra dos Mil Povos: Histórias Indígenas do Brasil Contadas por Um Índio. 2. ed. São Paulo: Petrópolis, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14675	Educação	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4372859 - WAGNER SANTOS FARIA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	Tecnologia assistiva na comunicação para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)			
<b>INTRODUCAO</b>	A vida de um estudante autista na escola pode variar amplamente, pois cada indivíduo é único. Muitos alunos autistas enfrentam desafios e necessidades específicas, como apoio na comunicação e estratégias de ensino individualizadas. Nos dias atuais é inegável a importância da tecnologia em nosso cotidiano. O avanço nas ciências e nas tecnologias, propiciou-se no cenário da educação especial, ferramentas e estratégias úteis para trabalhar com estudantes com deficiência e criar um ambiente de aprendizado inclusivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar a utilização de tecnologia assistiva como meio de aprimorar a comunicação e o aprendizado de alunos com TEA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esse estudo conta com uma pesquisa do tipo bibliográfica nas plataformas Capes e Scielo, que busca reunir artigos científicos e pesquisas acadêmicas relacionadas à tecnologia assistiva e ao TEA. Considera-se ainda, outros textos selecionados por sua relevância específica para o tema da pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social. A tecnologia assistiva de comunicação tem o potencial de melhorar significativamente a comunicação de pessoas com TEA, permitindo-lhes expressar suas ideias, desejos e necessidades de maneira mais eficaz. Embora a tecnologia assistiva de comunicação tenha alcançado avanços notáveis e benefícios significativos, há algumas questões a serem discutidas: Acessibilidade e Custos; Treinamento e Apoio; Privacidade e Segurança; Desenvolvimento contínuo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Esta pesquisa é relevante para a área da educação e da psicologia, uma vez que busca explorar como a tecnologia assistiva pode ser aplicada de forma eficaz na comunicação de alunos com TEA. O uso de tecnologia assistiva se mostra uma ferramenta fundamental para auxiliar no processo de comunicação e no aprendizado de alunos com TEA. Evidencia-se a ausência de estudos que tomaram como objeto de análise o uso de tecnologias assistivas na Educação, voltadas ao ensino de História.			
<b>REFERENCIAS</b>	GALVÃO FILHO, T. A formação em Tecnologia Assistiva no Brasil: pressupostos, demandas e perspectivas. In: GALVÃO FILHO, T. Tecnologia Assistiva: um itinerário da construção da área no Brasil. Curitiba: Editora CRV, 2022. VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989. SMITH, M. A.; RYNDAK, D. L. Estratégias práticas para a comunicação com todos os alunos. In:..... Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. p.110 -128.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14676	Engenharias	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4289994 - ANDRE LUIS PITELA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira		
		<b>Orientador Externo</b>		
<b>TITULO</b>	Impactos Ambientais na Represa dos Alagados no Paraná			
<b>INTRODUCAO</b>	A Represa dos Alagados, com os rios Pitangui e Jotuba como principais afluentes, é a principal fonte de abastecimento de água para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e atualmente este ecossistema enfrenta sérios desafios ambientais que ameaçam sua sustentabilidade. (Lisboa, 2022) Os problemas ambientais ocasionados pelo crescimento populacional desordenado na região, que não foi precedido por um planejamento adequado de uso do solo, resultou na ocupação de áreas ambientalmente sensíveis, na disposição inadequada de esgoto e no uso inadequado de práticas agrícolas, causando poluição da água, erosão e assoreamento de corpos d'água. (Harkot, 2023)			
<b>OBJETIVOS</b>	Levantamento dos impactos ambientais que a Represa dos Alagados enfrenta e destacar a importância da conservação deste ecossistema para garantir a qualidade da água e proteger sua biodiversidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos na plataforma periódicos capes, e órgãos governamentais utilizando os descritores: "represa alagado", "impactos ambientais", "biodiversidade" na plataforma periodicos capes para o período de 1959 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Nas proximidades da Represa dos Alagados devido ao escoamento difuso de água ocorre o transporte de sedimentos para o reservatório devido principalmente a agricultura, resultando em deposição, elevação das cotas de inundação, impacto na vida aquática e perda de fertilidade do solo. O uso e ocupação do solo no entorno da represa apresenta riscos ambientais devido à proximidade das construções, as atividades agrícolas, mineração, suinocultura, falta de vegetação ripária ocasionando diversos episódios de poluição. A ocupação de Áreas de Preservação Permanente resulta em impactos adversos, incluindo aumento da eutrofização, contaminação biológica, erosão, assoreamento e perda de biodiversidade.			
<b>CONCLUSOES</b>	É fundamental um planejamento de uso do solo e políticas públicas para o zoneamento ecológico econômico. O uso sustentável com medidas de proteção de áreas de preservação, em especial a mata ciliar e o plano diretor para a ocupação de casas de veraneio, de forma evitar a contaminação do solo, eutrofização da represa, utilização de unidades de tratamento de águas residuárias são medidas a serem adotadas para conservação do ecossistema			
<b>REFERENCIAS</b>	Gomes, Ingrid Aparecida; Prichoa, Carla Eva; Cassol Pinto, Maria Ligia CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA E ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PITANGUI –PR Revista Geográfica de América Central, vol. 2, julio-diciembre, 2011 Harkot, O. A. M. G., Ruiz, M. S., Shiba, F. Y., (#38) dos Santos, M. R. (2023). Conflitos socioambientais relacionados ao uso do solo em torno da represa Itupararanga, Ibiúna, SP. Revista De Gestão E Secretariado (Management and Administrative Professional Review), 14(8), 13273–13294. <a href="https://doi.org/10.7769/gesec.v14i8.2477">https://doi.org/10.7769/gesec.v14i8.2477</a> LISBOA, W.M., CARVALHO, A.I., Análise Do Uso Histórico Da Represa Alagados Em Ponta Grossa (Pr), No Período De 1955 A 2000, E Os Possíveis Efeitos Ao Meio Ambiente. XXXI Encontro Anual de Iniciação Científica. Universidade Estadual de Ponta Grossa. 2022 NÚCLEO DE ESTUDOS EM MEIO AMBIENTE (NUCLEAM). Bacia Hidrográfica do Manancial Alagados Universidade Estadual de Ponta Grossa.. Ponta Grossa, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14679	História	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4237897 - GABRIEL ALVES RIBEIRO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	Baião de Dois: A Independência do Brasil e a Formação da Identidade Nacional			
<b>INTRODUCA O</b>	A presente pesquisa explora os fatores que levaram à independência do Brasil em 1822, até sua emancipação política, sendo reconhecido internacionalmente e seu impacto na construção da identidade nacional. Examina a sociedade desigual do Brasil colonial, eventos políticos como a Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana, bem como a influência das ideias iluministas e revolucionárias. Examina ainda, a transferência da corte portuguesa, as Invasões Napoleônicas e a Revolução do Porto geraram turbulência no Brasil. A economia voltada para recursos naturais a tornou vulnerável a flutuações. A independência não apenas marcou um evento político, mas também moldou a identidade do povo brasileiro.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os processos que contribuíram para a independência do Brasil na primeira década de 1820 e explorar como a independência influenciou a formação da identidade do povo brasileiro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este trabalho baseia-se em uma metodologia de pesquisa histórica e análise crítica de fontes secundárias (pesquisa bibliográfica). Revisão de literatura e análise histórica, onde os autores evidenciados e estudados coletaram informações a partir de fontes históricas, como documentos, livros e outras citações da historiografia. Neste sentido, fizeram referência à eventos históricos, figuras históricas e ideias políticas e filosóficas relevantes para o período da independência do Brasil.			
<b>RESULTADO S</b>	Este artigo explorou os aspectos fundamentais que levaram à independência do Brasil na primeira década de 1820. Como processos que vinham acontecendo corroboraram para a então movimentação política da elite, impondo seus desejos políticos e econômicos. Os resultados e discussões destacam a complexidade desse período histórico, que envolveu aspectos políticos, sociais e econômicos. Buscamos refletir no papel da sociedade, até então caracterizada por suas diversidades regionais e suas nuances na conquista pela independência. Como isso impactou na então sociedade que se formava e como criar através de símbolos, a ideia de unidade? Estabelecer-se como estado nacional e sendo reconhecimento mundialmente? O Brasil que em estado contemporâneo ainda está refém de um neocolonialismo? Será que realmente deixamos de ser colônia ou simplesmente transferimos o controle? O passado contudente de uma colônia portuguesa, com potencial territorial e abundante em recursos até sua consolidação como país monárquico "independente".			
<b>CONCLUSOE S</b>	Considera-se a independência do Brasil em 1822 foi um processo complexo que envolveu uma série de fatores políticos, sociais e econômicos. A sociedade estratificada, as desigualdades sociais, a influência das ideias iluministas e os movimentos de independência anteriores contribuíram para esse processo. A independência não apenas representou uma transformação política, mas também desempenhou um papel fundamental na formação da identidade do povo brasileiro.			
<b>REFERENCIA S</b>	SCHUARTZ, Clara Monteiro. A Independência sob o olhar de Emilia Viotti da Costa em Introdução ao estudo da Emancipação política do Brasil. Revista Em Quarentena. São Paulo, ano 2, n. 5, 25mar2021. HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: Companhia das Letras; 1995. PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1972.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14684	Medicina Preventiva	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4618653 - GABRIEL MAKOTO TAGAWA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Comportamento alimentar e sono nos adultos - revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	Comportamento alimentar e sono realizam a manutenção da saúde e bem-estar e influenciam diretamente na nutrição e saúde do indivíduo.1 Portanto, merece a devida importância a compreensão de como os fatores dietéticos influenciam na qualidade e duração do sono.2 Dormir tarde está relacionado com uma má alimentação, pular refeições, aumento no consumo de bebidas energéticas e açucaradas, comidas prontas e industrializadas.3 O sono de duração de 5 a 6 horas por noite estão ligados a maiores incidências de ganho ponderal e ao maior consumo de café e alimentos cafeinados. 3Tais alimentos prolongam a indução do sono, mas em contrapartida, reduz a duração e a qualidade de sono.2			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a relação entre o comportamento alimentar e o sono nos adultos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão da literatura. Consultados nas bases do PubMed, Google Acadêmico e SciELO, no ano de 2013 a 2023. Consideradas as produções da literatura no referido período, como população alvo, os adultos e artigos nas línguas inglesa e portuguesa. Artigos que não se adequaram ao tema proposto, distúrbios do sono, fases do sono, ritmos circadianos, produções fora do período proposto e com a população alvo de idosos, crianças ou adolescentes foram desconsiderados.			
<b>RESULTADOS</b>	A literatura coletada sugere que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite são mais propensas a ter uma alimentação pobre e comportamentos quanto à bebida, como pular o café da manhã, consumo de alimentos processados e ingestão de bebidas açucaradas e cafeinadas em relação as que dormem entre 7 a 8 horas por noite. Ademais, esse curto período de sono faz com que sejam mais sensíveis às recompensas alimentares e mudem as concentrações de hormônios como a leptina e a grelina. A longo prazo, está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas. Nesse aspecto, a dieta mediterrânea, que tem como base alimentos de origem vegetal, mostra-se associada à melhor duração de sono e melhores indicadores de qualidade do sono, dentre eles, a eficiência e latência. Azeite de oliva, vegetais, frutas e legumes são alimentos dessa dieta que promovem um estilo de vida saudável e uma higiene do sono apropriada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa maneira, o sono e o comportamento alimentar nos adultos estão intimamente correlacionados. Noites mal dormidas resultam em mudanças alimentares que a longo prazo implicam em problemas crônicos de saúde, mas com a implementação de mudanças no estilo de vida como dietas específicas, é possível atingir um sono de qualidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Ogilvie RP, Lutsey PL, Widome R, Laska MN, Larson N, Neumark-Sztainer Di. Sleep indices and eating behaviours in young adults: Findings from Project EAT. Public Health Nutr. 2018 Mar 1;21(4):689–701. 2. Sejbuk M, Miro(#38)#324;czuk-Chodakowska I, Witkowska AM. Sleep Quality: A Narrative Review on Nutrition, Stimulants, and Physical Activity as Important Factors. Nutrients. 2022 May 1;14(9). 3. Scoditti E, Tumolo MR, Garbarino S. Mediterranean Diet on Sleep: A Health Alliance. Vol. 14, Nutrients. MDPI; 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14684	Medicina Preventiva	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4627423 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA LIMA MECA DUAILIBI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Comportamento alimentar e sono nos adultos - revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	Comportamento alimentar e sono realizam a manutenção da saúde e bem-estar e influenciam diretamente na nutrição e saúde do indivíduo.1 Portanto, merece a devida importância a compreensão de como os fatores dietéticos influenciam na qualidade e duração do sono.2 Dormir tarde está relacionado com uma má alimentação, pular refeições, aumento no consumo de bebidas energéticas e açucaradas, comidas prontas e industrializadas.3 O sono de duração de 5 a 6 horas por noite estão ligados a maiores incidências de ganho ponderal e ao maior consumo de café e alimentos cafeinados. 3Tais alimentos prolongam a indução do sono, mas em contrapartida, reduz a duração e a qualidade de sono.2			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a relação entre o comportamento alimentar e o sono nos adultos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão da literatura. Consultados nas bases do PubMed, Google Acadêmico e SciELO, no ano de 2013 a 2023. Consideradas as produções da literatura no referido período, como população alvo, os adultos e artigos nas línguas inglesa e portuguesa. Artigos que não se adequaram ao tema proposto, distúrbios do sono, fases do sono, ritmos circadianos, produções fora do período proposto e com a população alvo de idosos, crianças ou adolescentes foram desconsiderados.			
<b>RESULTADOS</b>	A literatura coletada sugere que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite são mais propensas a ter uma alimentação pobre e comportamentos quanto à bebida, como pular o café da manhã, consumo de alimentos processados e ingestão de bebidas açucaradas e cafeinadas em relação as que dormem entre 7 a 8 horas por noite. Ademais, esse curto período de sono faz com que sejam mais sensíveis às recompensas alimentares e mudem as concentrações de hormônios como a leptina e a grelina. A longo prazo, está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas. Nesse aspecto, a dieta mediterrânea, que tem como base alimentos de origem vegetal, mostra-se associada à melhor duração de sono e melhores indicadores de qualidade do sono, dentre eles, a eficiência e latência. Azeite de oliva, vegetais, frutas e legumes são alimentos dessa dieta que promovem um estilo de vida saudável e uma higiene do sono apropriada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Dessa maneira, o sono e o comportamento alimentar nos adultos estão intimamente correlacionados. Noites mal dormidas resultam em mudanças alimentares que a longo prazo implicam em problemas crônicos de saúde, mas com a implementação de mudanças no estilo de vida como dietas específicas, é possível atingir um sono de qualidade.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Ogilvie RP, Lutsey PL, Widome R, Laska MN, Larson N, Neumark-Sztainer Di. Sleep indices and eating behaviours in young adults: Findings from Project EAT. Public Health Nutr. 2018 Mar 1;21(4):689–701. 2. Sejbuk M, Miro(#38)#324;czuk-Chodakowska I, Witkowska AM. Sleep Quality: A Narrative Review on Nutrition, Stimulants, and Physical Activity as Important Factors. Nutrients. 2022 May 1;14(9). 3. Scoditti E, Tumolo MR, Garbarino S. Mediterranean Diet on Sleep: A Health Alliance. Vol. 14, Nutrients. MDPI; 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14686	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4134222 - BEATRIZ CARLA ALVES SANTOS VELOSO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	EXPERIÊNCIA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) desempenha um papel crucial na identificação das necessidades de uma instituição de saúde, no estabelecimento de metas, na alocação eficaz de recursos e no alcance de objetivos propostos no setor. O PES foi desenvolvido por Carlos Matus na década de 1970, é uma abordagem flexível que considera o momento atual da empresa e sua capacidade de se adaptar a mudanças 1,2.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este relato de experiência tem como objetivo descrever a abordagem realizada pelos graduandos de enfermagem frente ao PES.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre da graduação de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023. Na primeira etapa do processo, foi realizado o reconhecimento e identificação dos problemas, em seguida foi aplicada a ferramenta de classificação e priorização de problemas conhecida como Matriz GUT 1,2.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o período do estágio de gestão, foram coletados dados sobre a UBS estagiada a fim de compreender todos os processos de trabalho e dinâmicas da unidade e identificados 19 diagnósticos. Foi realizado comparações de dados e consultado as metas estabelecidas pelo contrato de gestão para cada um dos problemas. Para classificar e priorizar esses diagnósticos aplicamos a ferramenta matriz GUT, resultando em 6 problemas com uma pontuação máxima de 125 cada. Esses problemas incluem: relatórios do Programa de Auto Monitoramento Glicêmico (AMG) com preenchimento incompleto (81,67%) e atrasos no laudo (89%), ausência de informações recentes acerca dos resultados de hemoglobina glicada. Outrossim, foi analisado a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMPI), de acordo com a planilha da unidade a cobertura estava em 2%, sendo que a meta da unidade é de 70%. Na área de vacinação, observamos uma cobertura vacinal abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (95%), para crianças menores de 1 ano (91,9%), porém atendendo à exigência do contrato de gestão (90%) <sup>3</sup> . No contexto do acompanhamento à gestante, apenas 68,5% das gestantes no terceiro trimestre fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal, enquanto o estabelecido como meta pelo contrato de gestão é de 90% <sup>3</sup> ; ademais, apenas 40% delas têm resultados completos dos exames do pré-natal, abaixo da meta estabelecida pela pelo contrato de gestão de saúde (90%) <sup>3</sup> . No que diz respeito ao exame de Papanicolau, a cobertura ficou abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (80%), atingindo apenas 27,11% <sup>2,3</sup> .			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este relato de experiência destaca a aplicação prática do PES, a importância de identificar e resolver os desafios encontrados no cotidiano do trabalho em saúde. Essas questões têm um impacto significativo na qualidade de atendimento dos pacientes e nos serviços de saúde, tornando essencial a implementação de melhorias para atender às metas estabelecidas e proporcionar um atendimento mais eficaz e efetivo.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Secaf PVMS. O que é planejamento estratégico situacional e como funciona. Setting Consultoria e Gestão Empresarial. 2019 Fev 21. [cited 2023 Sep 4]. In: Setting consultoria. [Internet]. São Paulo; 2014. Available from: <a href="https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/">https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/</a> 2. Campos, HP, Cardoso, FC, Santos, MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. [Internet]. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018 [cited 2023 Sep 4]. 97p. Available from: <a href="https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf">https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf</a> 3. São Paulo (SP). Portaria SMS nº 538/2022. Introduz alterações na Portaria nº 333/2022. Anexo I: Matriz de Indicadores de Qualidade para o Contrato de Gestão. [Internet]. São Paulo: SMS; 2022. [cited 2023 Ago 14] Available from: <a href="https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos">https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14686	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4304772 - ATILA DIEGO RIBEIRO MORAES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	EXPERIÊNCIA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) desempenha um papel crucial na identificação das necessidades de uma instituição de saúde, no estabelecimento de metas, na alocação eficaz de recursos e no alcance de objetivos propostos no setor. O PES foi desenvolvido por Carlos Matus na década de 1970, é uma abordagem flexível que considera o momento atual da empresa e sua capacidade de se adaptar a mudanças 1,2.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este relato de experiência tem como objetivo descrever a abordagem realizada pelos graduandos de enfermagem frente ao PES.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre da graduação de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023. Na primeira etapa do processo, foi realizado o reconhecimento e identificação dos problemas, em seguida foi aplicada a ferramenta de classificação e priorização de problemas conhecida como Matriz GUT 1,2.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o período do estágio de gestão, foram coletados dados sobre a UBS estagiada a fim de compreender todos os processos de trabalho e dinâmicas da unidade e identificados 19 diagnósticos. Foi realizado comparações de dados e consultado as metas estabelecidas pelo contrato de gestão para cada um dos problemas. Para classificar e priorizar esses diagnósticos aplicamos a ferramenta matriz GUT, resultando em 6 problemas com uma pontuação máxima de 125 cada. Esses problemas incluem: relatórios do Programa de Auto Monitoramento Glicêmico (AMG) com preenchimento incompleto (81,67%) e atrasos no laudo (89%), ausência de informações recentes acerca dos resultados de hemoglobina glicada. Outrossim, foi analisado a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMPI), de acordo com a planilha da unidade a cobertura estava em 2%, sendo que a meta da unidade é de 70%. Na área de vacinação, observamos uma cobertura vacinal abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (95%), para crianças menores de 1 ano (91,9%), porém atendendo à exigência do contrato de gestão (90%) <sup>3</sup> . No contexto do acompanhamento à gestante, apenas 68,5% das gestantes no terceiro trimestre fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal, enquanto o estabelecido como meta pelo contrato de gestão é de 90% <sup>3</sup> ; ademais, apenas 40% delas têm resultados completos dos exames do pré-natal, abaixo da meta estabelecida pela pelo contrato de gestão de saúde (90%) <sup>3</sup> . No que diz respeito ao exame de Papanicolau, a cobertura ficou abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (80%), atingindo apenas 27,11% <sup>2,3</sup> .			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este relato de experiência destaca a aplicação prática do PES, a importância de identificar e resolver os desafios encontrados no cotidiano do trabalho em saúde. Essas questões têm um impacto significativo na qualidade de atendimento dos pacientes e nos serviços de saúde, tornando essencial a implementação de melhorias para atender às metas estabelecidas e proporcionar um atendimento mais eficaz e efetivo.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Secaf PVMS. O que é planejamento estratégico situacional e como funciona. Setting Consultoria e Gestão Empresarial. 2019 Fev 21. [cited 2023 Sep 4]. In: Setting consultoria. [Internet]. São Paulo; 2014. Available from: <a href="https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/">https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/</a> 2. Campos, HP, Cardoso, FC, Santos, MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. [Internet]. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018 [cited 2023 Sep 4]. 97p. Available from: <a href="https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf">https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf</a> 3. São Paulo (SP). Portaria SMS nº 538/2022. Introduz alterações na Portaria nº 333/2022. Anexo I: Matriz de Indicadores de Qualidade para o Contrato de Gestão. [Internet]. São Paulo: SMS; 2022. [cited 2023 Ago 14] Available from: <a href="https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos">https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14686	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4353366 - ELLEN PESSOA FRANCO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	EXPERIÊNCIA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) desempenha um papel crucial na identificação das necessidades de uma instituição de saúde, no estabelecimento de metas, na alocação eficaz de recursos e no alcance de objetivos propostos no setor. O PES foi desenvolvido por Carlos Matus na década de 1970, é uma abordagem flexível que considera o momento atual da empresa e sua capacidade de se adaptar a mudanças 1,2.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este relato de experiência tem como objetivo descrever a abordagem realizada pelos graduandos de enfermagem frente ao PES.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre da graduação de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023. Na primeira etapa do processo, foi realizado o reconhecimento e identificação dos problemas, em seguida foi aplicada a ferramenta de classificação e priorização de problemas conhecida como Matriz GUT 1,2.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o período do estágio de gestão, foram coletados dados sobre a UBS estagiada a fim de compreender todos os processos de trabalho e dinâmicas da unidade e identificados 19 diagnósticos. Foi realizado comparações de dados e consultado as metas estabelecidas pelo contrato de gestão para cada um dos problemas. Para classificar e priorizar esses diagnósticos aplicamos a ferramenta matriz GUT, resultando em 6 problemas com uma pontuação máxima de 125 cada. Esses problemas incluem: relatórios do Programa de Auto Monitoramento Glicêmico (AMG) com preenchimento incompleto (81,67%) e atrasos no laudo (89%), ausência de informações recentes acerca dos resultados de hemoglobina glicada. Outrossim, foi analisado a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMPI), de acordo com a planilha da unidade a cobertura estava em 2%, sendo que a meta da unidade é de 70%. Na área de vacinação, observamos uma cobertura vacinal abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (95%), para crianças menores de 1 ano (91,9%), porém atendendo à exigência do contrato de gestão (90%) <sup>3</sup> . No contexto do acompanhamento à gestante, apenas 68,5% das gestantes no terceiro trimestre fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal, enquanto o estabelecido como meta pelo contrato de gestão é de 90% <sup>3</sup> ; ademais, apenas 40% delas têm resultados completos dos exames do pré-natal, abaixo da meta estabelecida pela pelo contrato de gestão de saúde (90%) <sup>3</sup> . No que diz respeito ao exame de Papanicolau, a cobertura ficou abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (80%), atingindo apenas 27,11% <sup>2,3</sup> .			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este relato de experiência destaca a aplicação prática do PES, a importância de identificar e resolver os desafios encontrados no cotidiano do trabalho em saúde. Essas questões têm um impacto significativo na qualidade de atendimento dos pacientes e nos serviços de saúde, tornando essencial a implementação de melhorias para atender às metas estabelecidas e proporcionar um atendimento mais eficaz e efetivo.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Secaf PVMS. O que é planejamento estratégico situacional e como funciona. Setting Consultoria e Gestão Empresarial. 2019 Fev 21. [cited 2023 Sep 4]. In: Setting consultoria. [Internet]. São Paulo; 2014. Available from: <a href="https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/">https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/</a> 2. Campos, HP, Cardoso, FC, Santos, MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. [Internet]. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018 [cited 2023 Sep 4]. 97p. Available from: <a href="https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf">https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf</a> 3. São Paulo (SP). Portaria SMS nº 538/2022. Introduz alterações na Portaria nº 333/2022. Anexo I: Matriz de Indicadores de Qualidade para o Contrato de Gestão. [Internet]. São Paulo: SMS; 2022. [cited 2023 Ago 14] Available from: <a href="https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos">https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14686	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382595 - STEFANY MOREIRA ALEIXO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	EXPERIÊNCIA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) desempenha um papel crucial na identificação das necessidades de uma instituição de saúde, no estabelecimento de metas, na alocação eficaz de recursos e no alcance de objetivos propostos no setor. O PES foi desenvolvido por Carlos Matus na década de 1970, é uma abordagem flexível que considera o momento atual da empresa e sua capacidade de se adaptar a mudanças 1,2.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este relato de experiência tem como objetivo descrever a abordagem realizada pelos graduandos de enfermagem frente ao PES.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre da graduação de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023. Na primeira etapa do processo, foi realizado o reconhecimento e identificação dos problemas, em seguida foi aplicada a ferramenta de classificação e priorização de problemas conhecida como Matriz GUT 1,2.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o período do estágio de gestão, foram coletados dados sobre a UBS estagiada a fim de compreender todos os processos de trabalho e dinâmicas da unidade e identificados 19 diagnósticos. Foi realizado comparações de dados e consultado as metas estabelecidas pelo contrato de gestão para cada um dos problemas. Para classificar e priorizar esses diagnósticos aplicamos a ferramenta matriz GUT, resultando em 6 problemas com uma pontuação máxima de 125 cada. Esses problemas incluem: relatórios do Programa de Auto Monitoramento Glicêmico (AMG) com preenchimento incompleto (81,67%) e atrasos no laudo (89%), ausência de informações recentes acerca dos resultados de hemoglobina glicada. Outrossim, foi analisado a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMPI), de acordo com a planilha da unidade a cobertura estava em 2%, sendo que a meta da unidade é de 70%. Na área de vacinação, observamos uma cobertura vacinal abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (95%), para crianças menores de 1 ano (91,9%), porém atendendo à exigência do contrato de gestão (90%) <sup>3</sup> . No contexto do acompanhamento à gestante, apenas 68,5% das gestantes no terceiro trimestre fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal, enquanto o estabelecido como meta pelo contrato de gestão é de 90% <sup>3</sup> ; ademais, apenas 40% delas têm resultados completos dos exames do pré-natal, abaixo da meta estabelecida pela pelo contrato de gestão de saúde (90%) <sup>3</sup> . No que diz respeito ao exame de Papanicolau, a cobertura ficou abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (80%), atingindo apenas 27,11% <sup>2,3</sup> .			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este relato de experiência destaca a aplicação prática do PES, a importância de identificar e resolver os desafios encontrados no cotidiano do trabalho em saúde. Essas questões têm um impacto significativo na qualidade de atendimento dos pacientes e nos serviços de saúde, tornando essencial a implementação de melhorias para atender às metas estabelecidas e proporcionar um atendimento mais eficaz e efetivo.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Secaf PVMS. O que é planejamento estratégico situacional e como funciona. Setting Consultoria e Gestão Empresarial. 2019 Fev 21. [cited 2023 Sep 4]. In: Setting consultoria. [Internet]. São Paulo; 2014. Available from: <a href="https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/">https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/</a> 2. Campos, HP, Cardoso, FC, Santos, MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. [Internet]. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018 [cited 2023 Sep 4]. 97p. Available from: <a href="https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf">https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf</a> 3. São Paulo (SP). Portaria SMS nº 538/2022. Introduz alterações na Portaria nº 333/2022. Anexo I: Matriz de Indicadores de Qualidade para o Contrato de Gestão. [Internet]. São Paulo: SMS; 2022. [cited 2023 Ago 14] Available from: <a href="https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos">https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14686	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4420543 - ELLEN VITORIA DE HOLANDA MOTTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	EXPERIÊNCIA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) desempenha um papel crucial na identificação das necessidades de uma instituição de saúde, no estabelecimento de metas, na alocação eficaz de recursos e no alcance de objetivos propostos no setor. O PES foi desenvolvido por Carlos Matus na década de 1970, é uma abordagem flexível que considera o momento atual da empresa e sua capacidade de se adaptar a mudanças 1,2.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este relato de experiência tem como objetivo descrever a abordagem realizada pelos graduandos de enfermagem frente ao PES.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre da graduação de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023. Na primeira etapa do processo, foi realizado o reconhecimento e identificação dos problemas, em seguida foi aplicada a ferramenta de classificação e priorização de problemas conhecida como Matriz GUT 1,2.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o período do estágio de gestão, foram coletados dados sobre a UBS estagiada a fim de compreender todos os processos de trabalho e dinâmicas da unidade e identificados 19 diagnósticos. Foi realizado comparações de dados e consultado as metas estabelecidas pelo contrato de gestão para cada um dos problemas. Para classificar e priorizar esses diagnósticos aplicamos a ferramenta matriz GUT, resultando em 6 problemas com uma pontuação máxima de 125 cada. Esses problemas incluem: relatórios do Programa de Auto Monitoramento Glicêmico (AMG) com preenchimento incompleto (81,67%) e atrasos no laudo (89%), ausência de informações recentes acerca dos resultados de hemoglobina glicada. Outrossim, foi analisado a baixa cobertura da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMPI), de acordo com a planilha da unidade a cobertura estava em 2%, sendo que a meta da unidade é de 70%. Na área de vacinação, observamos uma cobertura vacinal abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (95%), para crianças menores de 1 ano (91,9%), porém atendendo à exigência do contrato de gestão (90%) <sup>3</sup> . No contexto do acompanhamento à gestante, apenas 68,5% das gestantes no terceiro trimestre fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal, enquanto o estabelecido como meta pelo contrato de gestão é de 90% <sup>3</sup> ; ademais, apenas 40% delas têm resultados completos dos exames do pré-natal, abaixo da meta estabelecida pela pelo contrato de gestão de saúde (90%) <sup>3</sup> . No que diz respeito ao exame de Papanicolau, a cobertura ficou abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (80%), atingindo apenas 27,11% <sup>2,3</sup> .			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este relato de experiência destaca a aplicação prática do PES, a importância de identificar e resolver os desafios encontrados no cotidiano do trabalho em saúde. Essas questões têm um impacto significativo na qualidade de atendimento dos pacientes e nos serviços de saúde, tornando essencial a implementação de melhorias para atender às metas estabelecidas e proporcionar um atendimento mais eficaz e efetivo.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Secaf PVMS. O que é planejamento estratégico situacional e como funciona. Setting Consultoria e Gestão Empresarial. 2019 Fev 21. [cited 2023 Sep 4]. In: Setting consultoria. [Internet]. São Paulo; 2014. Available from: <a href="https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/">https://www.google.com/amp/s/setting.com.br/blog/estrategia/o-que-e-planejamento-estrategico-situacional/amp/</a> 2. Campos, HP, Cardoso, FC, Santos, MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. [Internet]. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018 [cited 2023 Sep 4]. 97p. Available from: <a href="https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf">https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf</a> 3. São Paulo (SP). Portaria SMS nº 538/2022. Introduz alterações na Portaria nº 333/2022. Anexo I: Matriz de Indicadores de Qualidade para o Contrato de Gestão. [Internet]. São Paulo: SMS; 2022. [cited 2023 Ago 14] Available from: <a href="https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos">https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-saude-sms-538-de-12-de-agosto-de-2022#anexos</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14688	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4825446 - LAURA MORALES MEIRELLES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão da disciplina Medicina, Família e Comunidade: Diagnóstico Situacional da Sífilis em Unidade Básica de Saúde.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Sífilis é doença infecciosa causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i>, transmitida principalmente por contato sexual desprotegido. Manifesta em três estágios: primário, secundário e terciário. No Brasil, até junho de 2022, foram registrados mais de 122 mil novos casos de sífilis adquirida, em gestantes e congênicas, destacando a necessidade urgente de medidas preventivas (1). Diagnóstico é feito através do teste rápido oferecido pelos serviços de saúde do SUS, que oferece resultados em até 30 minutos, sendo obrigatório para gestantes durante o pré-natal. Caso o resultado seja positivo (reagente), é indicado realizar teste laboratorial para confirmação. O tratamento eficaz é feito com penicilina benzatina (benzetacil), especialmente em gestantes reagentes para prevenir a transmissão vertical, sendo assim iniciado antes mesmo da confirmação laboratorial (2). Além disso, é fundamental testar e tratar os parceiros sexuais para evitar a propagação da sífilis. Essas medidas são essenciais para conter a disseminação da doença e proteger a população (3). Tendo em vista a relevância da sífilis, esse trabalho buscou mostrar o impacto da educação em saúde realizada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo. As características sobre o contágio, sintomas, diagnóstico e prevenção serão abordadas, e por fim, gráficos sobre o conhecimento acerca da sífilis dos pacientes entrevistados mostrados</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar ação de educação em saúde proporcionada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo visando a conscientização da sífilis para população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizada durante o estágio da disciplina de Medicina Família e Comunidade IV, baseando-se no diagnóstico situacional e dados secundários obtidos na unidade básica.			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar dos usuários já terem ouvido falar sobre a sífilis, bem como sabiam como se adquire, desconheciam os sintomas. Entretanto, optaram por conhecer a doença. Corroborando o que Guimarães e colegas ressaltaram que a falta de conhecimento é importante elemento de vulnerabilidade à sífilis.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Escolhemos a sífilis baseada no diagnóstico situacional da UBS, na qual a maioria dos pacientes entrevistados não sabiam as informações acerca dos sintomas da doença e gostariam de saber mais informações. Concluímos, então, que a melhor forma para orientar os usuários foi a elaboração do banner, contendo todas informações às dúvidas e visando a educação em saúde.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1 - Alves B. Sífilis. Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Ministério da Saúde do Brasil. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/">https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/</a> 2 - Sífilis [Internet]. Secretaria da Saúde. Disponível em: <a href="https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3">https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3</a> - Guimarães Ribeiro MSF, Cavalcanti R, Moraes L, Veras R, Martins C, da Silva LR. Conhecimento e vulnerabilidade de participantes da Tenda da Sífilis: ação de extensão universitária. Ver. Eletrônica bimestral de Enfermeria. 2021; Volume (63): Páginas. 429-44. <a href="https://doi.org/10.6018/eglobal.448771">https://doi.org/10.6018/eglobal.448771</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14688	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4827201 - GABRIEL MENDES RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão da disciplina Medicina, Família e Comunidade: Diagnóstico Situacional da Sífilis em Unidade Básica de Saúde.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Sífilis é doença infecciosa causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i>, transmitida principalmente por contato sexual desprotegido. Manifesta em três estágios: primário, secundário e terciário. No Brasil, até junho de 2022, foram registrados mais de 122 mil novos casos de sífilis adquirida, em gestantes e congênicas, destacando a necessidade urgente de medidas preventivas (1). Diagnóstico é feito através do teste rápido oferecido pelos serviços de saúde do SUS, que oferece resultados em até 30 minutos, sendo obrigatório para gestantes durante o pré-natal. Caso o resultado seja positivo (reagente), é indicado realizar teste laboratorial para confirmação. O tratamento eficaz é feito com penicilina benzatina (benzetacil), especialmente em gestantes reagentes para prevenir a transmissão vertical, sendo assim iniciado antes mesmo da confirmação laboratorial (2). Além disso, é fundamental testar e tratar os parceiros sexuais para evitar a propagação da sífilis. Essas medidas são essenciais para conter a disseminação da doença e proteger a população (3). Tendo em vista a relevância da sífilis, esse trabalho buscou mostrar o impacto da educação em saúde realizada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo. As características sobre o contágio, sintomas, diagnóstico e prevenção serão abordadas, e por fim, gráficos sobre o conhecimento acerca da sífilis dos pacientes entrevistados mostrados</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar ação de educação em saúde proporcionada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo visando a conscientização da sífilis para população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizada durante o estágio da disciplina de Medicina Família e Comunidade IV, baseando-se no diagnóstico situacional e dados secundários obtidos na unidade básica.			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar dos usuários já terem ouvido falar sobre a sífilis, bem como sabiam como se adquire, desconheciam os sintomas. Entretanto, optaram por conhecer a doença. Corroborando o que Guimarães e colegas ressaltaram que a falta de conhecimento é importante elemento de vulnerabilidade à sífilis.			
<b>CONCLUSOES</b>	Escolhemos a sífilis baseada no diagnóstico situacional da UBS, na qual a maioria dos pacientes entrevistados não sabiam as informações acerca dos sintomas da doença e gostariam de saber mais informações. Concluímos, então, que a melhor forma para orientar os usuários foi a elaboração do banner, contendo todas informações às dúvidas e visando a educação em saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 - Alves B. Sífilis. Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Ministério da Saúde do Brasil. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/">https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/</a> 2 - Sífilis [Internet]. Secretaria da Saúde. Disponível em: <a href="https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3">https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3</a> - Guimarães Ribeiro MSF, Cavalcanti R, Moraes L, Veras R, Martins C, da Silva LR. Conhecimento e vulnerabilidade de participantes da Tenda da Sífilis: ação de extensão universitária. Ver. Eletrônica bimestral de Enfermeria. 2021; Volume (63): Páginas. 429-44. <a href="https://doi.org/10.6018/eglobal.448771">https://doi.org/10.6018/eglobal.448771</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14688	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4827368 - MARIANA GIANISELLA RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão da disciplina Medicina, Família e Comunidade: Diagnóstico Situacional da Sífilis em Unidade Básica de Saúde.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Sífilis é doença infecciosa causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i>, transmitida principalmente por contato sexual desprotegido. Manifesta em três estágios: primário, secundário e terciário. No Brasil, até junho de 2022, foram registrados mais de 122 mil novos casos de sífilis adquirida, em gestantes e congênicas, destacando a necessidade urgente de medidas preventivas (1). Diagnóstico é feito através do teste rápido oferecido pelos serviços de saúde do SUS, que oferece resultados em até 30 minutos, sendo obrigatório para gestantes durante o pré-natal. Caso o resultado seja positivo (reagente), é indicado realizar teste laboratorial para confirmação. O tratamento eficaz é feito com penicilina benzatina (benzetacil), especialmente em gestantes reagentes para prevenir a transmissão vertical, sendo assim iniciado antes mesmo da confirmação laboratorial (2). Além disso, é fundamental testar e tratar os parceiros sexuais para evitar a propagação da sífilis. Essas medidas são essenciais para conter a disseminação da doença e proteger a população (3). Tendo em vista a relevância da sífilis, esse trabalho buscou mostrar o impacto da educação em saúde realizada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo. As características sobre o contágio, sintomas, diagnóstico e prevenção serão abordadas, e por fim, gráficos sobre o conhecimento acerca da sífilis dos pacientes entrevistados mostrados</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar ação de educação em saúde proporcionada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo visando a conscientização da sífilis para população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizada durante o estágio da disciplina de Medicina Família e Comunidade IV, baseando-se no diagnóstico situacional e dados secundários obtidos na unidade básica.			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar dos usuários já terem ouvido falar sobre a sífilis, bem como sabiam como se adquire, desconheciam os sintomas. Entretanto, optaram por conhecer a doença. Corroborando o que Guimarães e colegas ressaltaram que a falta de conhecimento é importante elemento de vulnerabilidade à sífilis.			
<b>CONCLUSOES</b>	Escolhemos a sífilis baseada no diagnóstico situacional da UBS, na qual a maioria dos pacientes entrevistados não sabiam as informações acerca dos sintomas da doença e gostariam de saber mais informações. Concluímos, então, que a melhor forma para orientar os usuários foi a elaboração do banner, contendo todas informações às dúvidas e visando a educação em saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 - Alves B. Sífilis. Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Ministério da Saúde do Brasil. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/">https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/</a> 2 - Sífilis [Internet]. Secretaria da Saúde. Disponível em: <a href="https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3">https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3</a> - Guimarães Ribeiro MSF, Cavalcanti R, Moraes L, Veras R, Martins C, da Silva LR. Conhecimento e vulnerabilidade de participantes da Tenda da Sífilis: ação de extensão universitária. Ver. Eletrônica bimestral de Enfermeria. 2021; Volume (63): Páginas. 429-44. <a href="https://doi.org/10.6018/eglobal.448771">https://doi.org/10.6018/eglobal.448771</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14688	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4832591 - MARINA VERGARA THOMAZZONI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão da disciplina Medicina, Família e Comunidade: Diagnóstico Situacional da Sífilis em Unidade Básica de Saúde.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Sífilis é doença infecciosa causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i>, transmitida principalmente por contato sexual desprotegido. Manifesta em três estágios: primário, secundário e terciário. No Brasil, até junho de 2022, foram registrados mais de 122 mil novos casos de sífilis adquirida, em gestantes e congênicas, destacando a necessidade urgente de medidas preventivas (1). Diagnóstico é feito através do teste rápido oferecido pelos serviços de saúde do SUS, que oferece resultados em até 30 minutos, sendo obrigatório para gestantes durante o pré-natal. Caso o resultado seja positivo (reagente), é indicado realizar teste laboratorial para confirmação. O tratamento eficaz é feito com penicilina benzatina (benzetacil), especialmente em gestantes reagentes para prevenir a transmissão vertical, sendo assim iniciado antes mesmo da confirmação laboratorial (2). Além disso, é fundamental testar e tratar os parceiros sexuais para evitar a propagação da sífilis. Essas medidas são essenciais para conter a disseminação da doença e proteger a população (3). Tendo em vista a relevância da sífilis, esse trabalho buscou mostrar o impacto da educação em saúde realizada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo. As características sobre o contágio, sintomas, diagnóstico e prevenção serão abordadas, e por fim, gráficos sobre o conhecimento acerca da sífilis dos pacientes entrevistados mostrados</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar ação de educação em saúde proporcionada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo visando a conscientização da sífilis para população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizada durante o estágio da disciplina de Medicina Família e Comunidade IV, baseando-se no diagnóstico situacional e dados secundários obtidos na unidade básica.			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar dos usuários já terem ouvido falar sobre a sífilis, bem como sabiam como se adquire, desconheciam os sintomas. Entretanto, optaram por conhecer a doença. Corroborando o que Guimarães e colegas ressaltaram que a falta de conhecimento é importante elemento de vulnerabilidade à sífilis.			
<b>CONCLUSOES</b>	Escolhemos a sífilis baseada no diagnóstico situacional da UBS, na qual a maioria dos pacientes entrevistados não sabiam as informações acerca dos sintomas da doença e gostariam de saber mais informações. Concluímos, então, que a melhor forma para orientar os usuários foi a elaboração do banner, contendo todas informações às dúvidas e visando a educação em saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 - Alves B. Sífilis. Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Ministério da Saúde do Brasil. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/">https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/</a> 2 - Sífilis [Internet]. Secretaria da Saúde. Disponível em: <a href="https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3">https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3</a> - Guimarães Ribeiro MSF, Cavalcanti R, Moraes L, Veras R, Martins C, da Silva LR. Conhecimento e vulnerabilidade de participantes da Tenda da Sífilis: ação de extensão universitária. Ver. Eletrônica bimestral de Enfermeria. 2021; Volume (63): Páginas. 429-44. <a href="https://doi.org/10.6018/eglobal.448771">https://doi.org/10.6018/eglobal.448771</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14688	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4832981 - GABRIELLE JULIANI GOMES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão da disciplina Medicina, Família e Comunidade: Diagnóstico Situacional da Sífilis em Unidade Básica de Saúde.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Sífilis é doença infecciosa causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i>, transmitida principalmente por contato sexual desprotegido. Manifesta em três estágios: primário, secundário e terciário. No Brasil, até junho de 2022, foram registrados mais de 122 mil novos casos de sífilis adquirida, em gestantes e congênitas, destacando a necessidade urgente de medidas preventivas (1). Diagnóstico é feito através do teste rápido oferecido pelos serviços de saúde do SUS, que oferece resultados em até 30 minutos, sendo obrigatório para gestantes durante o pré-natal. Caso o resultado seja positivo (reagente), é indicado realizar teste laboratorial para confirmação. O tratamento eficaz é feito com penicilina benzatina (benzetacil), especialmente em gestantes reagentes para prevenir a transmissão vertical, sendo assim iniciado antes mesmo da confirmação laboratorial (2). Além disso, é fundamental testar e tratar os parceiros sexuais para evitar a propagação da sífilis. Essas medidas são essenciais para conter a disseminação da doença e proteger a população (3). Tendo em vista a relevância da sífilis, esse trabalho buscou mostrar o impacto da educação em saúde realizada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo. As características sobre o contágio, sintomas, diagnóstico e prevenção serão abordadas, e por fim, gráficos sobre o conhecimento acerca da sífilis dos pacientes entrevistados mostrados</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar ação de educação em saúde proporcionada por estudantes de medicina na UBS da região sul de São Paulo visando a conscientização da sífilis para população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizada durante o estágio da disciplina de Medicina Família e Comunidade IV, baseando-se no diagnóstico situacional e dados secundários obtidos na unidade básica.			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar dos usuários já terem ouvido falar sobre a sífilis, bem como sabiam como se adquire, desconheciam os sintomas. Entretanto, optaram por conhecer a doença. Corroborando o que Guimarães e colegas ressaltaram que a falta de conhecimento é importante elemento de vulnerabilidade à sífilis.			
<b>CONCLUSOES</b>	Escolhemos a sífilis baseada no diagnóstico situacional da UBS, na qual a maioria dos pacientes entrevistados não sabiam as informações acerca dos sintomas da doença e gostariam de saber mais informações. Concluímos, então, que a melhor forma para orientar os usuários foi a elaboração do banner, contendo todas informações às dúvidas e visando a educação em saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1 - Alves B. Sífilis. Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. Ministério da Saúde do Brasil. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/">https://bvsm.s.saude.gov.br/sifilis-2/</a> 2 - Sífilis [Internet]. Secretaria da Saúde. Disponível em: <a href="https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3">https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Sifilis-3</a> - Guimarães Ribeiro MSF, Cavalcanti R, Moraes L, Veras R, Martins C, da Silva LR. Conhecimento e vulnerabilidade de participantes da Tenda da Sífilis: ação de extensão universitária. Ver. Eletrônica bimestral de Enfermeria. 2021; Volume (63): Páginas. 429-44. <a href="https://doi.org/10.6018/eglobal.448771">https://doi.org/10.6018/eglobal.448771</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14689	Análise Nutricional de População	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4663896 - DANIELLE CARVALHO SILVA OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de extensão de dietoterapia: relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	O cuidado nutricional na dietoterapia eficaz vai além do fornecimento de orientações dietéticas.1 Para fornecer um cuidado completo e holístico, é essencial que nós, como profissionais de saúde, trabalhemos de forma integrada e multidisciplinar, sempre ouvindo atentamente ao paciente, e para isso, é fundamental para fornecer uma abordagem abrangente e personalizada no cuidado nutricional.2 Na dietoterapia, o planejamento de dieta deve ser adequado para o tratamento específico na condição do paciente, considerando as necessidades nutricionais individuais, as restrições alimentares, além de outras condições clínicas do paciente.2			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados antropométricos e inquérito alimentar da paciente adequando o hábito alimentar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizado durante a disciplina de dietoterapia, curso de nutrição. Baseado no atendimento nutricional realizado na clínica de Nutrição da UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	E.N.S, 52 anos, profissão do Lar, união estável (casada), escolaridade 8º ano completo. Peso atual: 68,5kg e altura: 1,65. Foi descontado, o valor de 800 gramas para a calça jeans e mais 200 gramas para a blusa de lã que a paciente vestia. O peso final, usado para calcular o IMC será de 67,5Kg. Considerando o peso ajustado (sem a roupa), a paciente se encontra em estado de eutrofia ( $IMC = \text{peso} / \text{altura}^2 = 67,5 / 1,65^2 = 67,5 / 2,7225 = 24,79$ ), pois pela tabela conforme abaixo, o IMC é considerado normal ou eutrófico, entre 18,5 e 24,9. Encaminhada pela clínica de gastroenterologia por distensão abdominal, eructação, refluxo, quadros de diarreia e recentemente, foi diagnosticada com intolerância a lactose. Paciente também possui gastrite. Enxerto ósseo recente, paciente relata leve desconforto para mastigar. Paciente prepara as próprias refeições. Leva em média de 20 a 30 minutos para realizar suas refeições. Devido ao fato de seu esposo ser portador de DM2, sua alimentação é regrada e gosta de alimentos saudáveis, portanto ingere diariamente salada, legumes, carnes, frangos e peixes grelhados principalmente na air fryer.			
<b>CONCLUSOES</b>	O estado nutricional da paciente está dentro dos padrões de normalidade. Porém e de acordo com a pirâmide alimentar, a paciente precisa adequar o consumo de frutas, cereais, tubérculos e pães, leguminosas, carnes e ovos, e por fim, para lácteos. Entretanto as hortaliças, que são de 4 a 5 porções, a paciente consumiu de forma adequada. Aumentamos a quantidade de vezes em que a paciente deve consumir frutas, verduras e legumes. Além de retirar todos os alimentos com lactose (incluímos alimentos lácteos já sem lactose), visto que é a principal causa de suas queixas de distensão abdominal, flatulências e diarreias.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - SCHEBENDACH, Janet E.; ROTH, Justine. Nutrição nos Transtornos Alimentares. In: MAHAN, L. Kathleen; RAYMOND, Janice L. KRAUSE: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 2 - BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE: MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTOLERANCIA A LACTOSE. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/intolerancia-a-lactose/">https://bvsm.s.saude.gov.br/intolerancia-a-lactose/</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14689	Análise Nutricional de População	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4669258 - ALINE HENRIQUE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de extensão de dietoterapia: relato de caso			
<b>INTRODUCAO</b>	O cuidado nutricional na dietoterapia eficaz vai além do fornecimento de orientações dietéticas.1 Para fornecer um cuidado completo e holístico, é essencial que nós, como profissionais de saúde, trabalhemos de forma integrada e multidisciplinar, sempre ouvindo atentamente ao paciente, e para isso, é fundamental para fornecer uma abordagem abrangente e personalizada no cuidado nutricional.2 Na dietoterapia, o planejamento de dieta deve ser adequado para o tratamento específico na condição do paciente, considerando as necessidades nutricionais individuais, as restrições alimentares, além de outras condições clínicas do paciente.2			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados antropométricos e inquérito alimentar da paciente adequando o hábito alimentar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizado durante a disciplina de dietoterapia, curso de nutrição. Baseado no atendimento nutricional realizado na clínica de Nutrição da UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	E.N.S, 52 anos, profissão do Lar, união estável (casada), escolaridade 8º ano completo. Peso atual: 68,5kg e altura: 1,65. Foi descontado, o valor de 800 gramas para a calça jeans e mais 200 gramas para a blusa de lã que a paciente vestia. O peso final, usado para calcular o IMC será de 67,5Kg. Considerando o peso ajustado (sem a roupa), a paciente se encontra em estado de eutrofia ( $IMC = peso / altura^2 = 67,5 / 1,65^2 = 67,5 / 2,7225 = 24,79$ ), pois pela tabela conforme abaixo, o IMC é considerado normal ou eutrófico, entre 18,5 e 24,9. Encaminhada pela clínica de gastroenterologia por distensão abdominal, eructação, refluxo, quadros de diarreia e recentemente, foi diagnosticada com intolerância a lactose. Paciente também possui gastrite. Enxerto ósseo recente, paciente relata leve desconforto para mastigar. Paciente prepara as próprias refeições. Leva em média de 20 a 30 minutos para realizar suas refeições. Devido ao fato de seu esposo ser portador de DM2, sua alimentação é regrada e gosta de alimentos saudáveis, portanto ingere diariamente salada, legumes, carnes, frangos e peixes grelhados principalmente na air fryer.			
<b>CONCLUSOES</b>	O estado nutricional da paciente está dentro dos padrões de normalidade. Porém e de acordo com a pirâmide alimentar, a paciente precisa adequar o consumo de frutas, cereais, tubérculos e pães, leguminosas, carnes e ovos, e por fim, para lácteos. Entretanto as hortaliças, que são de 4 a 5 porções, a paciente consumiu de forma adequada. Aumentamos a quantidade de vezes em que a paciente deve consumir frutas, verduras e legumes. Além de retirar todos os alimentos com lactose (incluímos alimentos lácteos já sem lactose), visto que é a principal causa de suas queixas de distensão abdominal, flatulências e diarreias.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - SCHEBENDACH, Janet E.; ROTH, Justine. Nutrição nos Transtornos Alimentares. In: MAHAN, L. Kathleen; RAYMOND, Janice L. KRAUSE: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 2 - BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE: MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTOLERANCIA A LACTOSE. Disponível em: <a href="https://bvsm.sau.gov.br/intolerancia-a-lactose/">https://bvsm.sau.gov.br/intolerancia-a-lactose/</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14690	Análise Nutricional de População	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4636619 - ANDREA CRISTINA DE BRITO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de extensão de dietoterapia: relato de caso em pediatria			
<b>INTRODUCAO</b>	Neste projeto acompanhamos, no dia 30/03/2023, na Clínica de Nutrição da UNISA, o atendimento de P.H.T.N, 10 anos completos, com queixa da mãe pelo baixo peso do filho e alimentação pouco variada. Através do histórico de atendimento e anamnese foi possível perceber a sua evolução alimentar desde a primeira consulta, realizado dia 03/11/2023. Conseguimos entender a rotina de P.H.T.N e de sua família, seus horários, atividades e suas preferências alimentares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o estado nutricional do paciente e prescrever plano dietético e nutricional, orientando no preparo de alimentos e possíveis mudanças nos hábitos alimentares.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizado durante a disciplina de dietoterapia, curso de nutrição. Baseado no atendimento nutricional realizado na clínica de Nutrição da UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	P.H.T.N bebe cerca de 1,5 litro de água por dia, é um menino ativo que estuda e faz exercícios na escola. Não tem um cardápio variado, não aceita legumes e verduras e a pouco tempo aceitou banana. Seus lanches são pequenos, não gosta sequer de margarina no pão, usa-se bem pouco dela para passar o pão na chapa. Seu hábito intestinal atualmente funciona de forma intercalada, com evacuações dia sim e dia não, suas fezes têm consistência endurecidas em formato de bolinhas (tipo 1 na Escala de Bristol). Seu sono foi questionado e sua mãe afirma que ele dorme cedo, porém fala bastante durante a noite, com um sono agitado.			
<b>CONCLUSOES</b>	O paciente apresenta grau de magreza, o plano dietético e nutricional foi adicionar legumes nas preparações, por exemplo: abóbora amassada no feijão. Acrescentar nas preparações uma colher de chá de aveia, chia ou linhaça com intuito de aumentar a ingestão de fibras e auxiliar na melhora do desempenho intestinal e formação de bolo fecal. Adicionar preparações como: leite com frutas, para enriquecer o cardápio do paciente tentando assim, substituir os produtos ultraprocessados da prateleira do supermercado por vitaminas e sucos naturais feitos em casa. Percebemos a necessidade de inclusão de novos alimentos, com a intenção de ampliar a variedade e qualidade da alimentação, respeitando a rotina de horário e acompanhando a aceitação de paciente conforme o ofertado.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - MAHAN, L. Kathleen; RAYMOND, Janice I; KRAUSE Alimentos, Nutrição e Dietoterapia, Tradução da 14ª edição, Elsevier Editora Ltda. (p.687-688). 2 - Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, Fascículo 4 – Protocolo de Uso do Guia Alimentar para a População Brasileira na Orientação Alimentar de Crianças de 2 a 10 anos			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14690	Análise Nutricional de População	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4675916 - SUELI DA CRUZ DANTAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de extensão de dietoterapia: relato de caso em pediatria			
<b>INTRODUCAO</b>	Neste projeto acompanhamos, no dia 30/03/2023, na Clínica de Nutrição da UNISA, o atendimento de P.H.T.N, 10 anos completos, com queixa da mãe pelo baixo peso do filho e alimentação pouco variada. Através do histórico de atendimento e anamnese foi possível perceber a sua evolução alimentar desde a primeira consulta, realizado dia 03/11/2023. Conseguimos entender a rotina de P.H.T.N e de sua família, seus horários, atividades e suas preferências alimentares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o estado nutricional do paciente e prescrever plano dietético e nutricional, orientando no preparo de alimentos e possíveis mudanças nos hábitos alimentares.			
<b>METODOLOGIA</b>	Projeto de extensão realizado durante a disciplina de dietoterapia, curso de nutrição. Baseado no atendimento nutricional realizado na clínica de Nutrição da UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	P.H.T.N bebe cerca de 1,5 litro de água por dia, é um menino ativo que estuda e faz exercícios na escola. Não tem um cardápio variado, não aceita legumes e verduras e a pouco tempo aceitou banana. Seus lanches são pequenos, não gosta sequer de margarina no pão, usa-se bem pouco dela para passar o pão na chapa. Seu hábito intestinal atualmente funciona de forma intercalada, com evacuações dia sim e dia não, suas fezes têm consistência endurecidas em formato de bolinhas (tipo 1 na Escala de Bristol). Seu sono foi questionado e sua mãe afirma que ele dorme cedo, porém fala bastante durante a noite, com um sono agitado.			
<b>CONCLUSOES</b>	O paciente apresenta grau de magreza, o plano dietético e nutricional foi adicionar legumes nas preparações, por exemplo: abóbora amassada no feijão. Acrescentar nas preparações uma colher de chá de aveia, chia ou linhaça com intuito de aumentar a ingestão de fibras e auxiliar na melhora do desempenho intestinal e formação de bolo fecal. Adicionar preparações como: leite com frutas, para enriquecer o cardápio do paciente tentando assim, substituir os produtos ultraprocessados da prateleira do supermercado por vitaminas e sucos naturais feitos em casa. Percebemos a necessidade de inclusão de novos alimentos, com a intenção de ampliar a variedade e qualidade da alimentação, respeitando a rotina de horário e acompanhando a aceitação de paciente conforme o ofertado.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 - MAHAN, L. Kathleen; RAYMOND, Janice I; KRAUSE Alimentos, Nutrição e Dietoterapia, Tradução da 14ª edição, Elsevier Editora Ltda. (p.687-688). 2 - Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, Fascículo 4 – Protocolo de Uso do Guia Alimentar para a População Brasileira na Orientação Alimentar de Crianças de 2 a 10 anos			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14691	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4134222 - BEATRIZ CARLA ALVES SANTOS VELOSO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	A experiência de criar uma ferramenta on-line para monitoramento do paciente Diabético Insulinodependente através do Planejamento Estratégico Situacional			
<b>INTRODUCAO</b>	O Diabetes mellitus (DM), doença crônica caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose é um dos principais problemas de saúde pública. As intervenções terapêuticas devem direcionar-se ao rigoroso controle da glicemia e de outras condições clínicas, no sentido de prevenir ou retardar a progressão da doença para as complicações crônicas. O objetivo do Programa de Automonitoramento Glicêmico (AMG) é cadastrar e atender os municípios portadores de Diabetes mellitus (DM) Insulinodependentes possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos que garantam o automonitoramento glicêmico, bem como ao acompanhamento clínico para alcance das metas terapêuticas <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) no problema: atrasos e preenchimento incompleto de laudos médicos e ausência de exames laboratoriais dos pacientes do programa AMG, em uma serviço de atenção básica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a coleta de dados foi observado que de 382 diabéticos insulinodependentes cadastrados no AMG, 178 pacientes, equivalente à 46,5%, estavam com o laudo atrasado há mais de um ano; 23,2% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 6 meses a 1 ano; 14,1% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 3 e 6 meses; apenas 11% dos pacientes estão com o laudo renovado nos últimos 3 meses; e 5% não possuem informações no prontuário do AMG, sugerindo descontinuidade da assistência à saúde desses pacientes. A proposta de intervenção se baseou na criação de uma planilha online, facilitando o acesso às informações pela equipe de saúde, com dados pertinentes para o acompanhamento de cada paciente do programa AMG, por equipe de saúde da família, contendo: Nome; Idade; Prontuário; número do Cartão do SUS; Tipo de Diabetes; Data do último laudo; Data do último exame; Data da última retirada dos insumos; resultado da última hemoglobina glicada; Avaliação de risco cardiovascular; Data de exame de fundoscopia e data de avaliação dos pés. Também foi proposta a criação do "Dia do AMG", momento em que o paciente insulinodependente será atendido por equipe multidisciplinar composta por: medico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico e dentista. Foi sugerido também a criação de agenda que garanta ao menos quatro consultas ao ano a essa população <sup>3</sup> . Ao final foram criados indicadores e prazos com o intuito de avaliar os resultados obtidos a curto, médio e longo prazo para monitorar se houve melhora ou piora na situação atual com o objetivo de promover qualidade da gestão de saúde do paciente insulinodependente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle do programa AMG, garantindo o acompanhamento da situação de saúde do paciente insulinodependente de forma clara, objetiva e com melhoria da qualidade de assistência, contribuindo para a sua qualidade de vida, por meio de ferramentas de gestão			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Prefeitura da Cidade de São Paulo. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico. [Internet]. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde; 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> 2. Bahia, L, Almeida-Pititto, B, Bertoluci, M. Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 no SUS. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes [Internet]. 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/">https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/</a> DOI: 10.29327/5238993.2023-11. 3. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Cuidando de todos: doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde (APS) - Protocolo Clínico Prático para o Tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na Atenção Primária à Saúde (APS): Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus [Internet]. São Paulo; 2019/2023 [cited 2023 Sep 4]. 42p. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14691	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4304772 - ATILA DIEGO RIBEIRO MORAES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	A experiência de criar uma ferramenta on-line para monitoramento do paciente Diabético Insulinodependente através do Planejamento Estratégico Situacional			
<b>INTRODUCAO</b>	O Diabetes mellitus (DM), doença crônica caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose é um dos principais problemas de saúde pública. As intervenções terapêuticas devem direcionar-se ao rigoroso controle da glicemia e de outras condições clínicas, no sentido de prevenir ou retardar a progressão da doença para as complicações crônicas. O objetivo do Programa de Automonitoramento Glicêmico (AMG) é cadastrar e atender os municípios portadores de Diabetes mellitus (DM) Insulinodependentes possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos que garantam o automonitoramento glicêmico, bem como ao acompanhamento clínico para alcance das metas terapêuticas <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) no problema: atrasos e preenchimento incompleto de laudos médicos e ausência de exames laboratoriais dos pacientes do programa AMG, em uma serviço de atenção básica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a coleta de dados foi observado que de 382 diabéticos insulinodependentes cadastrados no AMG, 178 pacientes, equivalente à 46,5%, estavam com o laudo atrasado há mais de um ano; 23,2% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 6 meses a 1 ano; 14,1% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 3 e 6 meses; apenas 11% dos pacientes estão com o laudo renovado nos últimos 3 meses; e 5% não possuem informações no prontuário do AMG, sugerindo descontinuidade da assistência à saúde desses pacientes. A proposta de intervenção se baseou na criação de uma planilha online, facilitando o acesso às informações pela equipe de saúde, com dados pertinentes para o acompanhamento de cada paciente do programa AMG, por equipe de saúde da família, contendo: Nome; Idade; Prontuário; número do Cartão do SUS; Tipo de Diabetes; Data do último laudo; Data do último exame; Data da última retirada dos insumos; resultado da última hemoglobina glicada; Avaliação de risco cardiovascular; Data de exame de fundoscopia e data de avaliação dos pés. Também foi proposta a criação do "Dia do AMG", momento em que o paciente insulinodependente será atendido por equipe multidisciplinar composta por: medico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico e dentista. Foi sugerido também a criação de agenda que garanta ao menos quatro consultas ao ano a essa população <sup>3</sup> . Ao final foram criados indicadores e prazos com o intuito de avaliar os resultados obtidos a curto, médio e longo prazo para monitorar se houve melhora ou piora na situação atual com o objetivo de promover qualidade da gestão de saúde do paciente insulinodependente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle do programa AMG, garantindo o acompanhamento da situação de saúde do paciente insulinodependente de forma clara, objetiva e com melhoria da qualidade de assistência, contribuindo para a sua qualidade de vida, por meio de ferramentas de gestão			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Prefeitura da Cidade de São Paulo. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico. [Internet]. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde; 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> 2. Bahia, L, Almeida-Pititto, B, Bertoluci, M. Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 no SUS. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes [Internet]. 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/">https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/</a> DOI: 10.29327/5238993.2023-11. 3. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Cuidando de todos: doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde (APS) - Protocolo Clínico Prático para o Tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na Atenção Primária à Saúde (APS): Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus [Internet]. São Paulo; 2019/2023 [cited 2023 Sep 4]. 42p. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14691	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4353366 - ELLEN PESSOA FRANCO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	A experiência de criar uma ferramenta on-line para monitoramento do paciente Diabético Insulinodependente através do Planejamento Estratégico Situacional			
<b>INTRODUCAO</b>	O Diabetes mellitus (DM), doença crônica caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose é um dos principais problemas de saúde pública. As intervenções terapêuticas devem direcionar-se ao rigoroso controle da glicemia e de outras condições clínicas, no sentido de prevenir ou retardar a progressão da doença para as complicações crônicas. O objetivo do Programa de Automonitoramento Glicêmico (AMG) é cadastrar e atender os municípios portadores de Diabetes mellitus (DM) Insulinodependentes possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos que garantam o automonitoramento glicêmico, bem como ao acompanhamento clínico para alcance das metas terapêuticas <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) no problema: atrasos e preenchimento incompleto de laudos médicos e ausência de exames laboratoriais dos pacientes do programa AMG, em uma serviço de atenção básica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a coleta de dados foi observado que de 382 diabéticos insulinodependentes cadastrados no AMG, 178 pacientes, equivalente à 46,5%, estavam com o laudo atrasado há mais de um ano; 23,2% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 6 meses a 1 ano; 14,1% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 3 e 6 meses; apenas 11% dos pacientes estão com o laudo renovado nos últimos 3 meses; e 5% não possuem informações no prontuário do AMG, sugerindo descontinuidade da assistência à saúde desses pacientes. A proposta de intervenção se baseou na criação de uma planilha online, facilitando o acesso às informações pela equipe de saúde, com dados pertinentes para o acompanhamento de cada paciente do programa AMG, por equipe de saúde da família, contendo: Nome; Idade; Prontuário; número do Cartão do SUS; Tipo de Diabetes; Data do último laudo; Data do último exame; Data da última retirada dos insumos; resultado da última hemoglobina glicada; Avaliação de risco cardiovascular; Data de exame de fundoscopia e data de avaliação dos pés. Também foi proposta a criação do "Dia do AMG", momento em que o paciente insulinodependente será atendido por equipe multidisciplinar composta por: medico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico e dentista. Foi sugerido também a criação de agenda que garanta ao menos quatro consultas ao ano a essa população <sup>3</sup> . Ao final foram criados indicadores e prazos com o intuito de avaliar os resultados obtidos a curto, médio e longo prazo para monitorar se houve melhora ou piora na situação atual com o objetivo de promover qualidade da gestão de saúde do paciente insulinodependente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle do programa AMG, garantindo o acompanhamento da situação de saúde do paciente insulinodependente de forma clara, objetiva e com melhoria da qualidade de assistência, contribuindo para a sua qualidade de vida, por meio de ferramentas de gestão			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Prefeitura da Cidade de São Paulo. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico. [Internet]. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde; 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> 2. Bahia, L, Almeida-Pititto, B, Bertoluci, M. Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 no SUS. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes [Internet]. 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/">https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/</a> DOI: 10.29327/5238993.2023-11. 3. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Cuidando de todos: doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde (APS) - Protocolo Clínico Prático para o Tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na Atenção Primária à Saúde (APS): Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus [Internet]. São Paulo; 2019/2023 [cited 2023 Sep 4]. 42p. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14691	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4382595 - STEFANY MOREIRA ALEIXO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	A experiência de criar uma ferramenta on-line para monitoramento do paciente Diabético Insulinodependente através do Planejamento Estratégico Situacional			
<b>INTRODUCAO</b>	O Diabetes mellitus (DM), doença crônica caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose é um dos principais problemas de saúde pública. As intervenções terapêuticas devem direcionar-se ao rigoroso controle da glicemia e de outras condições clínicas, no sentido de prevenir ou retardar a progressão da doença para as complicações crônicas. O objetivo do Programa de Automonitoramento Glicêmico (AMG) é cadastrar e atender os municípios portadores de Diabetes mellitus (DM) Insulinodependentes possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos que garantam o automonitoramento glicêmico, bem como ao acompanhamento clínico para alcance das metas terapêuticas <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) no problema: atrasos e preenchimento incompleto de laudos médicos e ausência de exames laboratoriais dos pacientes do programa AMG, em uma serviço de atenção básica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a coleta de dados foi observado que de 382 diabéticos insulinodependentes cadastrados no AMG, 178 pacientes, equivalente à 46,5%, estavam com o laudo atrasado há mais de um ano; 23,2% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 6 meses a 1 ano; 14,1% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 3 e 6 meses; apenas 11% dos pacientes estão com o laudo renovado nos últimos 3 meses; e 5% não possuem informações no prontuário do AMG, sugerindo descontinuidade da assistência à saúde desses pacientes. A proposta de intervenção se baseou na criação de uma planilha online, facilitando o acesso às informações pela equipe de saúde, com dados pertinentes para o acompanhamento de cada paciente do programa AMG, por equipe de saúde da família, contendo: Nome; Idade; Prontuário; número do Cartão do SUS; Tipo de Diabetes; Data do último laudo; Data do último exame; Data da última retirada dos insumos; resultado da última hemoglobina glicada; Avaliação de risco cardiovascular; Data de exame de fundoscopia e data de avaliação dos pés. Também foi proposta a criação do "Dia do AMG", momento em que o paciente insulinodependente será atendido por equipe multidisciplinar composta por: medico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico e dentista. Foi sugerido também a criação de agenda que garanta ao menos quatro consultas ao ano a essa população <sup>3</sup> . Ao final foram criados indicadores e prazos com o intuito de avaliar os resultados obtidos a curto, médio e longo prazo para monitorar se houve melhora ou piora na situação atual com o objetivo de promover qualidade da gestão de saúde do paciente insulinodependente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle do programa AMG, garantindo o acompanhamento da situação de saúde do paciente insulinodependente de forma clara, objetiva e com melhoria da qualidade de assistência, contribuindo para a sua qualidade de vida, por meio de ferramentas de gestão			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Prefeitura da Cidade de São Paulo. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico. [Internet]. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde; 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> 2. Bahia, L, Almeida-Pititto, B, Bertoluci, M. Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 no SUS. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes [Internet]. 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/">https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/</a> DOI: 10.29327/5238993.2023-11. 3. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Cuidando de todos: doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde (APS) - Protocolo Clínico Prático para o Tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na Atenção Primária à Saúde (APS): Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus [Internet]. São Paulo; 2019/2023 [cited 2023 Sep 4]. 42p. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14691	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4420543 - ELLEN VITORIA DE HOLANDA MOTTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	A experiência de criar uma ferramenta on-line para monitoramento do paciente Diabético Insulinodependente através do Planejamento Estratégico Situacional			
<b>INTRODUCAO</b>	O Diabetes mellitus (DM), doença crônica caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose é um dos principais problemas de saúde pública. As intervenções terapêuticas devem direcionar-se ao rigoroso controle da glicemia e de outras condições clínicas, no sentido de prevenir ou retardar a progressão da doença para as complicações crônicas. O objetivo do Programa de Automonitoramento Glicêmico (AMG) é cadastrar e atender os municípios portadores de Diabetes mellitus (DM) Insulinodependentes possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos que garantam o automonitoramento glicêmico, bem como ao acompanhamento clínico para alcance das metas terapêuticas <sup>1,2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a etapa de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES) no problema: atrasos e preenchimento incompleto de laudos médicos e ausência de exames laboratoriais dos pacientes do programa AMG, em uma serviço de atenção básica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de estágio de gestão em saúde coletiva, no 8º semestre do curso de enfermagem. O cronograma abrangeu o período de estágio realizado de agosto a setembro de 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante a coleta de dados foi observado que de 382 diabéticos insulinodependentes cadastrados no AMG, 178 pacientes, equivalente à 46,5%, estavam com o laudo atrasado há mais de um ano; 23,2% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 6 meses a 1 ano; 14,1% dos pacientes estão com o laudo atrasado entre 3 e 6 meses; apenas 11% dos pacientes estão com o laudo renovado nos últimos 3 meses; e 5% não possuem informações no prontuário do AMG, sugerindo descontinuidade da assistência à saúde desses pacientes. A proposta de intervenção se baseou na criação de uma planilha online, facilitando o acesso às informações pela equipe de saúde, com dados pertinentes para o acompanhamento de cada paciente do programa AMG, por equipe de saúde da família, contendo: Nome; Idade; Prontuário; número do Cartão do SUS; Tipo de Diabetes; Data do último laudo; Data do último exame; Data da última retirada dos insumos; resultado da última hemoglobina glicada; Avaliação de risco cardiovascular; Data de exame de fundoscopia e data de avaliação dos pés. Também foi proposta a criação do "Dia do AMG", momento em que o paciente insulinodependente será atendido por equipe multidisciplinar composta por: medico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico e dentista. Foi sugerido também a criação de agenda que garanta ao menos quatro consultas ao ano a essa população <sup>3</sup> . Ao final foram criados indicadores e prazos com o intuito de avaliar os resultados obtidos a curto, médio e longo prazo para monitorar se houve melhora ou piora na situação atual com o objetivo de promover qualidade da gestão de saúde do paciente insulinodependente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato de experiência evidencia a relevância de intervenções para o controle do programa AMG, garantindo o acompanhamento da situação de saúde do paciente insulinodependente de forma clara, objetiva e com melhoria da qualidade de assistência, contribuindo para a sua qualidade de vida, por meio de ferramentas de gestão			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Prefeitura da Cidade de São Paulo. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico. [Internet]. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde; 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> 2. Bahia, L, Almeida-Pititto, B, Bertoluci, M. Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 no SUS. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes [Internet]. 2023 [cited 2023 Sep 4]. Available from: <a href="https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/">https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-2-no-sus/</a> DOI: 10.29327/5238993.2023-11. 3. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Cuidando de todos: doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde (APS) - Protocolo Clínico Prático para o Tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na Atenção Primária à Saúde (APS): Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus [Internet]. São Paulo; 2019/2023 [cited 2023 Sep 4]. 42p. Available from: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NOVARABH3-PROTOCOCLINICO2020(1).pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14694	Radiologia de Animais	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4617339 - CAROLINE FREITAS DE SA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nathalie Fontana Nagase Loureiro	Camila Trevisan Pereira	
<b>TITULO</b>	USO INTEGRADO DE TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO PARA INVESTIGAÇÃO DE QUILOTÓRAX EM PACIENTE FELINO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O quilotórax é definido pelo acúmulo de linfa na cavidade torácica, que pode estar relacionado à obstrução ou ruptura do ducto torácico, entretanto definir a etiologia desta alteração pode ser difícil. O diagnóstico de quilotórax é feito através da análise laboratorial do líquido cavitário e a sua etiologia pode ser determinada por meio da realização de hemograma, análises bioquímicas, radiografia, tomografia computadorizada e como diagnóstico diferencial o PARR (imunofenotipagem de linfomas).			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar diferentes métodos de diagnóstico para detecção de quilotórax relatando o caso de um paciente felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão de literatura e análise do prontuário de um paciente felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>RESULTADOS</b>	Um paciente felino, 4 anos, SRD, castrado, pesando 7,800 kg deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro tendo como queixa principal dispneia. Foi realizado ultrassom do tórax (FAST) que revelou a presença de líquido cavitário. O exame radiográfico do tórax evidenciou um alargamento do mediastino cranial com redução do lúmen traqueal (indicando uma formação mediastinal), além do deslocamento caudal dos campos pulmonares, discreta radiopacidade água na pleura e redução da visibilidade da silhueta cardíaca, demonstrando quadro de efusão pleural. A análise do líquido cavitário identificou que a amostra era composta predominantemente por linfócitos pequenos, sem a presença de agente infeccioso e de células malignas, além de confirmar se tratar de uma efusão quílosa. Também foi realizado a tomografia computadorizada do tórax que confirmou as alterações radiográficas e ultrassonográficas, servindo para o estadiamento. Realizou-se uma citologia aspirativa guiada por ultrassom que foi altamente sugestivo a linfoma, sendo recomendado a realização de exames adicionais como PARR e/ou biópsia para diagnóstico definitivo, porém esses exames não foram realizados pela restrição financeira da tutora. Entretanto todos os sinais clínicos de imagem e citológicos indicavam quadro de linfoma, o que poderia justificar o quadro de quilotórax no paciente, e, por isso, foi instituído o protocolo de quimioterapia.			
<b>CONCLUSOES</b>	Cada uma das técnicas utilizadas durante o atendimento foi essencial para as tomadas de decisão e o estadiamento, bem como para obtenção dos diagnósticos diferenciais.			
<b>REFERENCIAS</b>	BARBOSA, B.; ALVES, F. dos S.; COELHO, N. das G. D. ; CAMPO, M. T. G. ; BEIER, uzane L. ; PAES, P. R. de O. ; FREITAS, P. M. C. . Ruptura de ducto torácico idiopático em um gato: Relato de caso. Pubvet, [S. l.], v. 11, n. 12, 2017. DOI: 10.22256/PUBVET.V11N12.1250-1253. Disponível em: <a href="https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/1222">https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/1222</a> . Acesso em: 10 out. 2023. REEVES, Lauren et al. Treatment of idiopathic chylothorax in dogs and cats: A systematic review. Wiley Online Library. Columbia, 2019. 11 p. DOI: 10.1111/vsu.13322. Disponível em: <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vsu.13322">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vsu.13322</a> . Acesso em: 10 out. 2023. KÖNIG, ALLAN et al. Retrospective analysis of pleural effusion in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery. Germany, 2019. 4 p. DOI: 10.1177/1098612X18816489. Disponível em: <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X18816489">https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X18816489</a> . Acesso em: 10 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14694	Radiologia de Animais	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4714814 - MAYARA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nathalie Fontana Nagase Loureiro	Camila Trevisan Pereira	
<b>TITULO</b>	USO INTEGRADO DE TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO PARA INVESTIGAÇÃO DE QUILOTÓRAX EM PACIENTE FELINO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O quilotórax é definido pelo acúmulo de linfa na cavidade torácica, que pode estar relacionado à obstrução ou ruptura do ducto torácico, entretanto definir a etiologia desta alteração pode ser difícil. O diagnóstico de quilotórax é feito através da análise laboratorial do líquido cavitário e a sua etiologia pode ser determinada por meio da realização de hemograma, análises bioquímicas, radiografia, tomografia computadorizada e como diagnóstico diferencial o PARR (imunofenotipagem de linfomas).			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar diferentes métodos de diagnóstico para detecção de quilotórax relatando o caso de um paciente felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão de literatura e análise do prontuário de um paciente felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>RESULTADOS</b>	Um paciente felino, 4 anos, SRD, castrado, pesando 7,800 kg deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro tendo como queixa principal dispneia. Foi realizado ultrassom do tórax (FAST) que revelou a presença de líquido cavitário. O exame radiográfico do tórax evidenciou um alargamento do mediastino cranial com redução do lúmen traqueal (indicando uma formação mediastinal), além do deslocamento caudal dos campos pulmonares, discreta radiopacidade água na pleura e redução da visibilidade da silhueta cardíaca, demonstrando quadro de efusão pleural. A análise do líquido cavitário identificou que a amostra era composta predominantemente por linfócitos pequenos, sem a presença de agente infeccioso e de células malignas, além de confirmar se tratar de uma efusão quílosa. Também foi realizado a tomografia computadorizada do tórax que confirmou as alterações radiográficas e ultrassonográficas, servindo para o estadiamento. Realizou-se uma citologia aspirativa guiada por ultrassom que foi altamente sugestivo a linfoma, sendo recomendado a realização de exames adicionais como PARR e/ou biópsia para diagnóstico definitivo, porém esses exames não foram realizados pela restrição financeira da tutora. Entretanto todos os sinais clínicos de imagem e citológicos indicavam quadro de linfoma, o que poderia justificar o quadro de quilotórax no paciente, e, por isso, foi instituído o protocolo de quimioterapia.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Cada uma das técnicas utilizadas durante o atendimento foi essencial para as tomadas de decisão e o estadiamento, bem como para obtenção dos diagnósticos diferenciais.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BARBOSA, B.; ALVES, F. dos S.; COELHO, N. das G. D. ; CAMPO, M. T. G. ; BEIER, uzane L. ; PAES, P. R. de O. ; FREITAS, P. M. C. . Ruptura de ducto torácico idiopático em um gato: Relato de caso. Pubvet, [S. l.], v. 11, n. 12, 2017. DOI: 10.22256/PUBVET.V11N12.1250-1253. Disponível em: <a href="https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/1222">https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/1222</a> . Acesso em: 10 out. 2023. REEVES, Lauren et al. Treatment of idiopathic chylothorax in dogs and cats: A systematic review. Wiley Online Library. Columbia, 2019. 11 p. DOI: 10.1111/vsu.13322. Disponível em: <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vsu.13322">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vsu.13322</a> . Acesso em: 10 out. 2023. KÖNIG, ALLAN et al. Retrospective analysis of pleural effusion in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery. Germany, 2019. 4 p. DOI: 10.1177/1098612X18816489. Disponível em: <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X18816489">https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X18816489</a> . Acesso em: 10 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14695	Enfermagem de Saúde Pública	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517521 - ISIS VIEIRA REGO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	Cobertura Vacinal: um olhar para os últimos dez anos			
<b>INTRODUCAO</b>	A vacina é uma das formas mais eficientes para a redução de morbimortalidade por doenças preveníveis. O Brasil, em 1973 criou o Programa nacional de imunização (PNI) que tem como meta alcançar 100% de cobertura vacinal1.			
<b>OBJETIVOS</b>	Conhecer a cobertura vacinal nos últimos 10 anos no Brasil			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de parte de uma pesquisa realizada para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de graduação em Enfermagem, com base em dados dos Sistemas de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) referentes ao período 2013-2022 quanto à cobertura vacinal no Brasil por regiões.			
<b>RESULTADOS</b>	Considerando a cobertura vacinal no Brasil, entre os anos de 2013-2015 pode ser observado um crescimento na cobertura vacinal: em 2013 com 73,29%, já em 2014 86,31%, e em 2015 alcançando a cobertura mais alta desses dez anos com 95,07%. Mas ao contrário, no ano de 2016 houve uma queda abrupta com cobertura de 50,44%, já nos anos seguintes houve um crescimento na cobertura vacinal, que em 2017 alcançou cobertura de 72,93%, e em 2018 77,13%. No entanto, a partir de 2019 retornou ao declínio com 73,44% de cobertura vacinal. Em 2020 com 68,05% e 2021 com 61,52% de cobertura vacinal. Tendo seu crescimento novamente no ano de 2022 com 67,94%2 .Ao se observar a cobertura vacinal por regiões do Brasil, entre os anos de 2013 e 2022, em 2015, ano de maior cobertura vacinal, a região sudeste alcançou 98,51%, e a região com menor cobertura foi a Norte com 83,05%. Em compensação o ano com menor cobertura vacinal foi o de 2016 com 60,87% na região Centro-Oeste, e 47,96% na região nordeste, representando a cobertura mais baixa do ano.(#38)#8239; Pode ser observado, segundo os dados coletados no SI-PNI, que a cobertura vacinal vem sofrendo oscilações nos últimos dez anos, e que nenhuma região alcançou a meta preconizada pelo PNI no período. A região norte foi a que sempre se manteve abaixo em relação as outras regiões, seguida pela região nordeste; em sequência encontra-se a região sudeste; já as regiões sul e centro oeste apresentaram coberturas semelhantes.			
<b>CONCLUSOES</b>	Estes resultados, abaixo do esperado, vêm deixando grandes parcelas da população vulneráveis a doenças preveníveis. Uma das causas é a hesitação vacinal, um problema atual que vem crescendo. A queda nas taxas de cobertura vacinal tornou-se um problema de saúde que necessita de atenção e soluções como oferecer informações científicas à população, dando a segurança necessária para se tomar a decisão correta 2,3.			
<b>REFERENCIAS</b>	Brasil. Ministério da Saúde (MS). Programa Nacional de Imunização (PNI): 40 Anos. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 2013. 236 p. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf/view">https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf/view</a> . Acessado em: 23 ag. 2023 Matos CCSA. Mídia e Saúde: a cobertura da epidemia de sarampo de 2019 no Brasil. Rev. Bras. De Medicina de Família e Comunidade. 2020. 12p. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1095972">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1095972</a> . Acessado em: 01 out. 2023 Matos CCA, Couto MT. Hesitação vacinal: tópicos para repensar políticas de imunização. Rev. Bras. De Medicina de Família e Comunidade. 2023. 2p. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1427540">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1427540</a> . Acessado em: 01 out. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14695	Enfermagem de Saúde Pública	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4536517 - ZILEIDE RIBEIRO DE MALTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Daniela Cristina Profitti de Paiva		
<b>TITULO</b>	Cobertura Vacinal: um olhar para os últimos dez anos			
<b>INTRODUCAO</b>	A vacina é uma das formas mais eficientes para a redução de morbimortalidade por doenças preveníveis. O Brasil, em 1973 criou o Programa nacional de imunização (PNI) que tem como meta alcançar 100% de cobertura vacinal1.			
<b>OBJETIVOS</b>	Conhecer a cobertura vacinal nos últimos 10 anos no Brasil			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de parte de uma pesquisa realizada para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de graduação em Enfermagem, com base em dados dos Sistemas de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) referentes ao período 2013-2022 quanto à cobertura vacinal no Brasil por regiões.			
<b>RESULTADO S</b>	Considerando a cobertura vacinal no Brasil, entre os anos de 2013-2015 pode ser observado um crescimento na cobertura vacinal: em 2013 com 73,29%, já em 2014 86,31%, e em 2015 alcançando a cobertura mais alta desses dez anos com 95,07%. Mas ao contrário, no ano de 2016 houve uma queda abrupta com cobertura de 50,44%, já nos anos seguintes houve um crescimento na cobertura vacinal, que em 2017 alcançou cobertura de 72,93%, e em 2018 77,13%. No entanto, a partir de 2019 retornou ao declínio com 73,44% de cobertura vacinal. Em 2020 com 68,05% e 2021 com 61,52% de cobertura vacinal. Tendo seu crescimento novamente no ano de 2022 com 67,94%2 .Ao se observar a cobertura vacinal por regiões do Brasil, entre os anos de 2013 e 2022, em 2015, ano de maior cobertura vacinal, a região sudeste alcançou 98,51%, e a região com menor cobertura foi a Norte com 83,05%. Em compensação o ano com menor cobertura vacinal foi o de 2016 com 60,87% na região Centro-Oeste, e 47,96% na região nordeste, representando a cobertura mais baixa do ano.(#38)#8239; Pode ser observado, segundo os dados coletados no SI-PNI, que a cobertura vacinal vem sofrendo oscilações nos últimos dez anos, e que nenhuma região alcançou a meta preconizada pelo PNI no período. A região norte foi a que sempre se manteve abaixo em relação as outras regiões, seguida pela região nordeste; em sequência encontra-se a região sudeste; já as regiões sul e centro oeste apresentaram coberturas semelhantes.			
<b>CONCLUSOES</b>	Estes resultados, abaixo do esperado, vêm deixando grandes parcelas da população vulneráveis a doenças preveníveis. Uma das causas é a hesitação vacinal, um problema atual que vem crescendo. A queda nas taxas de cobertura vacinal tornou-se um problema de saúde que necessita de atenção e soluções como oferecer informações científicas à população, dando a segurança necessária para se tomar a decisão correta 2,3.			
<b>REFERENCIAS</b>	Brasil. Ministério da Saúde (MS). Programa Nacional de Imunização (PNI): 40 Anos. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 2013. 236 p. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf/view">https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/publicacoes/programa_nacional_imunizacoes_pni40.pdf/view</a> . Acessado em: 23 ag. 2023 Matos CCA. Mídia e Saúde: a cobertura da epidemia de sarampo de 2019 no Brasil. Rev. Bras. De Medicina de Família e Comunidade. 2020. 12p. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1095972">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1095972</a> . Acessado em: 01 out. 2023 Matos CCA, Couto MT. Hesitação vacinal: tópicos para repensar políticas de imunização. Rev. Bras. De Medicina de Família e Comunidade. 2023. 2p. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1427540">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1427540</a> . Acessado em: 01 out. 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14698	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4122453 - THALITA DE SOUZA RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE EXPERIÊNCIA: MANOBRA DE DESENGASGO NO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS			
<b>INTRODUCA O</b>	O engasgo é algo muito comum em recém-nascidos (RNs) e crianças, ainda mais nos primeiros meses de vida quando estão aprendendo a fazer a sucção e pega corretamente. Portanto, durante o estágio de saúde da mulher na maternidade Interlagos, foi elaborado e realizado um projeto entre 6 alunas e a professora, o qual tinha o objetivo de ensinar e educar os familiares e os pais a realizarem a manobra de desengasgo Heimlich em seus RNs e crianças que eles tivessem contato para que todos pudessem entender a real importância de adquirir conhecimentos acerca de primeiros socorros em caso de engasgo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Abranger o número de pais e responsáveis conscientes e orientados a respeito do engasgo no RN e sua correta e efetiva manobra de desengasgo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizada iniciativa em campo de estágio, por meio de implementação de palestras a respeito da manobra de Heimlich, abordando cerca de 150 pessoas, dentre elas puérperas e acompanhantes, em unidade de acolhimento do Hospital Maternidade Interlagos, no período de 17/04 até 17/05/2023.			
<b>RESULTADO S</b>	Evidencia-se a percepção do engasgo como algo assustador, complexo e de difícil execução para os pais, familiares e responsáveis pelas crianças, na qual a maioria acaba por desesperar-se, sacudir a criança ou buscar por desobstruir as vias aéreas de forma equivocada, agravando o caso. Desta forma, tornou-se possível através da percepção em campo e palestras voltadas à demonstração da técnica correta, um aumento no número de mães conscientes, orientadas e tranquilizadas a respeito das causas, agravantes e condutas corretas no momento que seu recém nascido evolui ao engasgo. Ao realizar a prática de quarto em quarto, ficou clara a importância de passar diretamente o conteúdo para as puérperas, uma vez que os acompanhantes não sabiam ensinar com clareza ou não compartilhavam a informação, sendo então mais efetivo o ensinamento direto.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em suma, a disseminação do ensinamento da manobra de desengasgo se torna indispensável na promoção de segurança e bem estar da nossa sociedade, se tornando uma técnica essencial para salvar vidas e desempenhando um papel fundamental na construção de comunidades mais seguras. Ao realizarmos o treinamento de quarto em quarto pudemos evidenciar a importância desse conhecimento ser passado às mães e não somente aos acompanhantes, uma vez que são elas quem passam mais tempo com as crianças, principalmente nesse início da vida. Ao capacitar mais pessoas, estamos investindo no poder da prevenção e promoção de uma cultura de cuidado, proporcionando às pessoas a capacidade de agir com eficácia diante de situações de risco à vida.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Menk ML, Mazzorana GH, Kubiak A, Evangelista H, Brandão H. Manobra de heimlich em criança até um ano: orientações a puérperas em maternidade na cidade de Sarandi-PR [Dissertação]. Paraná: Universidade Cesumar; 2021. 2. Biblioteca Virtual em Saúde [internet]. São Paulo; 2017. [acesso em 2023 mai 10]. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/engasgo/">https://bvsm.s.saude.gov.br/engasgo/</a> . 3. Scielo [internet]. Rio de Janeiro; 2009. [acesso em 23 mai 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ijped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQC/?lang=pt">https://www.scielo.br/ijped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQC/?lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14698	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4343221 - KIMBERLLYN PEREIRA BARBOSA BARROS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE EXPERIÊNCIA: MANOBRA DE DESENGASGO NO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS			
<b>INTRODUCA O</b>	O engasgo é algo muito comum em recém-nascidos (RNs) e crianças, ainda mais nos primeiros meses de vida quando estão aprendendo a fazer a sucção e pega corretamente. Portanto, durante o estágio de saúde da mulher na maternidade Interlagos, foi elaborado e realizado um projeto entre 6 alunas e a professora, o qual tinha o objetivo de ensinar e educar os familiares e os pais a realizarem a manobra de desengasgo Heimlich em seus RNs e crianças que eles tivessem contato para que todos pudessem entender a real importância de adquirir conhecimentos acerca de primeiros socorros em caso de engasgo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Abranger o número de pais e responsáveis conscientes e orientados a respeito do engasgo no RN e sua correta e efetiva manobra de desengasgo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizada iniciativa em campo de estágio, por meio de implementação de palestras a respeito da manobra de Heimlich, abordando cerca de 150 pessoas, dentre elas puérperas e acompanhantes, em unidade de acolhimento do Hospital Maternidade Interlagos, no período de 17/04 até 17/05/2023.			
<b>RESULTADO S</b>	Evidencia-se a percepção do engasgo como algo assustador, complexo e de difícil execução para os pais, familiares e responsáveis pelas crianças, na qual a maioria acaba por desesperar-se, sacudir a criança ou buscar por desobstruir as vias aéreas de forma equivocada, agravando o caso. Desta forma, tornou-se possível através da percepção em campo e palestras voltadas à demonstração da técnica correta, um aumento no número de mães conscientes, orientadas e tranquilizadas a respeito das causas, agravantes e condutas corretas no momento que seu recém nascido evolui ao engasgo. Ao realizar a prática de quarto em quarto, ficou clara a importância de passar diretamente o conteúdo para as puérperas, uma vez que os acompanhantes não sabiam ensinar com clareza ou não compartilhavam a informação, sendo então mais efetivo o ensinamento direto.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em suma, a disseminação do ensinamento da manobra de desengasgo se torna indispensável na promoção de segurança e bem estar da nossa sociedade, se tornando uma técnica essencial para salvar vidas e desempenhando um papel fundamental na construção de comunidades mais seguras. Ao realizarmos o treinamento de quarto em quarto pudemos evidenciar a importância desse conhecimento ser passado às mães e não somente aos acompanhantes, uma vez que são elas quem passam mais tempo com as crianças, principalmente nesse início da vida. Ao capacitar mais pessoas, estamos investindo no poder da prevenção e promoção de uma cultura de cuidado, proporcionando às pessoas a capacidade de agir com eficácia diante de situações de risco à vida.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Menk ML, Mazzorana GH, Kubiak A, Evangelista H, Brandão H. Manobra de heimlich em criança até um ano: orientações a puérperas em maternidade na cidade de Sarandi-PR [Dissertação]. Paraná: Universidade Cesumar; 2021. 2. Biblioteca Virtual em Saúde [internet]. São Paulo; 2017. [acesso em 2023 mai 10]. Disponível em: <a href="https://bv.sms.saude.gov.br/engasgo/">https://bv.sms.saude.gov.br/engasgo/</a> . 3. Scielo [internet]. Rio de Janeiro; 2009. [acesso em 23 mai 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/jjped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQWC/?lang=pt">https://www.scielo.br/jjped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQWC/?lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14698	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4356047 - BEATRIZ ROCHA REIS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE EXPERIÊNCIA: MANOBRA DE DESENGASGO NO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS			
<b>INTRODUCAO</b>	O engasgo é algo muito comum em recém-nascidos (RNs) e crianças, ainda mais nos primeiros meses de vida quando estão aprendendo a fazer a sucção e pega corretamente. Portanto, durante o estágio de saúde da mulher na maternidade Interlagos, foi elaborado e realizado um projeto entre 6 alunas e a professora, o qual tinha o objetivo de ensinar e educar os familiares e os pais a realizarem a manobra de desengasgo Heimlich em seus RNs e crianças que eles tivessem contato para que todos pudessem entender a real importância de adquirir conhecimentos acerca de primeiros socorros em caso de engasgo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Abranger o número de pais e responsáveis conscientes e orientados a respeito do engasgo no RN e sua correta e efetiva manobra de desengasgo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizada iniciativa em campo de estágio, por meio de implementação de palestras a respeito da manobra de Heimlich, abordando cerca de 150 pessoas, dentre elas puérperas e acompanhantes, em unidade de acolhimento do Hospital Maternidade Interlagos, no período de 17/04 até 17/05/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Evidencia-se a percepção do engasgo como algo assustador, complexo e de difícil execução para os pais, familiares e responsáveis pelas crianças, na qual a maioria acaba por desesperar-se, sacudir a criança ou buscar por desobstruir as vias aéreas de forma equivocada, agravando o caso. Desta forma, tornou-se possível através da percepção em campo e palestras voltadas à demonstração da técnica correta, um aumento no número de mães conscientes, orientadas e tranquilizadas a respeito das causas, agravantes e condutas corretas no momento que seu recém nascido evolui ao engasgo. Ao realizar a prática de quarto em quarto, ficou clara a importância de passar diretamente o conteúdo para as puérperas, uma vez que os acompanhantes não sabiam ensinar com clareza ou não compartilhavam a informação, sendo então mais efetivo o ensinamento direto.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em suma, a disseminação do ensinamento da manobra de desengasgo se torna indispensável na promoção de segurança e bem estar da nossa sociedade, se tornando uma técnica essencial para salvar vidas e desempenhando um papel fundamental na construção de comunidades mais seguras. Ao realizarmos o treinamento de quarto em quarto pudemos evidenciar a importância desse conhecimento ser passado às mães e não somente aos acompanhantes, uma vez que são elas quem passam mais tempo com as crianças, principalmente nesse início da vida. Ao capacitar mais pessoas, estamos investindo no poder da prevenção e promoção de uma cultura de cuidado, proporcionando às pessoas a capacidade de agir com eficácia diante de situações de risco à vida.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Menk ML, Mazzorana GH, Kubiak A, Evangelista H, Brandão H. Manobra de heimlich em criança até um ano: orientações a puérperas em maternidade na cidade de Sarandi-PR [Dissertação]. Paraná: Universidade Cesumar; 2021. 2. Biblioteca Virtual em Saúde [internet]. São Paulo; 2017. [acesso em 2023 mai 10]. Disponível em: <a href="https://bv.sms.saude.gov.br/engasgo/">https://bv.sms.saude.gov.br/engasgo/</a> . 3. Scielo [internet]. Rio de Janeiro; 2009. [acesso em 23 mai 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/jjped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQWC/?lang=pt">https://www.scielo.br/jjped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQWC/?lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14698	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441494 - FLAVIA HELENA PEREIRA REBELO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE EXPERIÊNCIA: MANOBRA DE DESENGASGO NO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS			
<b>INTRODUCA O</b>	O engasgo é algo muito comum em recém-nascidos (RNs) e crianças, ainda mais nos primeiros meses de vida quando estão aprendendo a fazer a sucção e pega corretamente. Portanto, durante o estágio de saúde da mulher na maternidade Interlagos, foi elaborado e realizado um projeto entre 6 alunas e a professora, o qual tinha o objetivo de ensinar e educar os familiares e os pais a realizarem a manobra de desengasgo Heimlich em seus RNs e crianças que eles tivessem contato para que todos pudessem entender a real importância de adquirir conhecimentos acerca de primeiros socorros em caso de engasgo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Abranger o número de pais e responsáveis conscientes e orientados a respeito do engasgo no RN e sua correta e efetiva manobra de desengasgo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizada iniciativa em campo de estágio, por meio de implementação de palestras a respeito da manobra de Heimlich, abordando cerca de 150 pessoas, dentre elas puérperas e acompanhantes, em unidade de acolhimento do Hospital Maternidade Interlagos, no período de 17/04 até 17/05/2023.			
<b>RESULTADO S</b>	Evidencia-se a percepção do engasgo como algo assustador, complexo e de difícil execução para os pais, familiares e responsáveis pelas crianças, na qual a maioria acaba por desesperar-se, sacudir a criança ou buscar por desobstruir as vias aéreas de forma equivocada, agravando o caso. Desta forma, tornou-se possível através da percepção em campo e palestras voltadas à demonstração da técnica correta, um aumento no número de mães conscientes, orientadas e tranquilizadas a respeito das causas, agravantes e condutas corretas no momento que seu recém nascido evolui ao engasgo. Ao realizar a prática de quarto em quarto, ficou clara a importância de passar diretamente o conteúdo para as puérperas, uma vez que os acompanhantes não sabiam ensinar com clareza ou não compartilhavam a informação, sendo então mais efetivo o ensinamento direto.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em suma, a disseminação do ensinamento da manobra de desengasgo se torna indispensável na promoção de segurança e bem estar da nossa sociedade, se tornando uma técnica essencial para salvar vidas e desempenhando um papel fundamental na construção de comunidades mais seguras. Ao realizarmos o treinamento de quarto em quarto pudemos evidenciar a importância desse conhecimento ser passado às mães e não somente aos acompanhantes, uma vez que são elas quem passam mais tempo com as crianças, principalmente nesse início da vida. Ao capacitar mais pessoas, estamos investindo no poder da prevenção e promoção de uma cultura de cuidado, proporcionando às pessoas a capacidade de agir com eficácia diante de situações de risco à vida.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Menk ML, Mazzorana GH, Kubiak A, Evangelista H, Brandão H. Manobra de heimlich em criança até um ano: orientações a puérperas em maternidade na cidade de Sarandi-PR [Dissertação]. Paraná: Universidade Cesumar; 2021. 2. Biblioteca Virtual em Saúde [internet]. São Paulo; 2017. [acesso em 2023 mai 10]. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/engasgo/">https://bvsm.s.saude.gov.br/engasgo/</a> . 3. Scielo [internet]. Rio de Janeiro; 2009. [acesso em 23 mai 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ijped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQC/?lang=pt">https://www.scielo.br/ijped/a/wLnzm8TXKDHcvSndbQhHQC/?lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14698	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441524 - THAYNÁ ALVES FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE EXPERIÊNCIA: MANOBRA DE DESENGASGO NO HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS			
<b>INTRODUCA O</b>	O engasgo é algo muito comum em recém-nascidos (RNs) e crianças, ainda mais nos primeiros meses de vida quando estão aprendendo a fazer a sucção e pega corretamente. Portanto, durante o estágio de saúde da mulher na maternidade Interlagos, foi elaborado e realizado um projeto entre 6 alunas e a professora, o qual tinha o objetivo de ensinar e educar os familiares e os pais a realizarem a manobra de desengasgo Heimlich em seus RNs e crianças que eles tivessem contato para que todos pudessem entender a real importância de adquirir conhecimentos acerca de primeiros socorros em caso de engasgo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Abranger o número de pais e responsáveis conscientes e orientados a respeito do engasgo no RN e sua correta e efetiva manobra de desengasgo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizada iniciativa em campo de estágio, por meio de implementação de palestras a respeito da manobra de Heimlich, abordando cerca de 150 pessoas, dentre elas puérperas e acompanhantes, em unidade de acolhimento do Hospital Maternidade Interlagos, no período de 17/04 até 17/05/2023.			
<b>RESULTADO S</b>	Evidencia-se a percepção do engasgo como algo assustador, complexo e de difícil execução para os pais, familiares e responsáveis pelas crianças, na qual a maioria acaba por desesperar-se, sacudir a criança ou buscar por desobstruir as vias aéreas de forma equivocada, agravando o caso. Desta forma, tornou-se possível através da percepção em campo e palestras voltadas à demonstração da técnica correta, um aumento no número de mães conscientes, orientadas e tranquilizadas a respeito das causas, agravantes e condutas corretas no momento que seu recém nascido evolui ao engasgo. Ao realizar a prática de quarto em quarto, ficou clara a importância de passar diretamente o conteúdo para as puérperas, uma vez que os acompanhantes não sabiam ensinar com clareza ou não compartilhavam a informação, sendo então mais efetivo o ensinamento direto.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Em suma, a disseminação do ensinamento da manobra de desengasgo se torna indispensável na promoção de segurança e bem estar da nossa sociedade, se tornando uma técnica essencial para salvar vidas e desempenhando um papel fundamental na construção de comunidades mais seguras. Ao realizarmos o treinamento de quarto em quarto pudemos evidenciar a importância desse conhecimento ser passado às mães e não somente aos acompanhantes, uma vez que são elas quem passam mais tempo com as crianças, principalmente nesse início da vida. Ao capacitar mais pessoas, estamos investindo no poder da prevenção e promoção de uma cultura de cuidado, proporcionando às pessoas a capacidade de agir com eficácia diante de situações de risco à vida.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Menk ML, Mazzorana GH, Kubiak A, Evangelista H, Brandão H. Manobra de heimlich em criança até um ano: orientações a puérperas em maternidade na cidade de Sarandi-PR [Dissertação]. Paraná: Universidade Cesumar; 2021. 2. Biblioteca Virtual em Saúde [internet]. São Paulo; 2017. [acesso em 2023 mai 10]. Disponível em: <a href="https://bvsm.s.saude.gov.br/engasgo/">https://bvsm.s.saude.gov.br/engasgo/</a> . 3. Scielo [internet]. Rio de Janeiro; 2009. [acesso em 23 mai 10]. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/ijped/a/wLnzm8TXKDhcvSndbQhHQC/?lang=pt">https://www.scielo.br/ijped/a/wLnzm8TXKDhcvSndbQhHQC/?lang=pt</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14700	Zoologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3659062 - BEATRIZ RODRIGUES DA CRUZ	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	Coleção Didática de Zoologia do Curso Ciências Biológicas da Universidade Santo Amaro- UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Coleções zoológicas desempenham um papel fundamental como valiosos recursos educacionais e científicos, proporcionando acesso direto a exemplares representativos da biodiversidade para estudantes e pesquisadores. Elas contribuem significativamente para a pesquisa científica, a compreensão dos padrões evolutivos e a distribuição geográfica das espécies. No entanto, as coleções didáticas enfrentam desafios de organização, uma vez que o reconhecimento de organismos e seus grupos taxonômicos é geralmente uma tarefa de especialistas. Em coleções tão vastas quanto a coleção zoológica da UNISA, composta por centenas de lotes, a complexidade aumenta, já que frequentemente são manuseadas por pessoas sem experiência adequada. Embora esse manuseio seja crucial para o processo formativo, a sua execução imprecisa pode resultar em confusões ou perda de material essencial.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Com base nas dificuldades mencionadas, o objetivo deste projeto é catalogar os exemplares até o nível de classe e desenvolver um sistema simplificado para consulta e devolução de material aos seus devidos locais, mesmo quando manuseados por pessoas não especializadas.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A catalogação seguiu as normas de taxonomia sistemática, abrangendo as categorias de Reino, Filo (subfilo) e Classe até o momento, com planos de estender a identificação até o nível de espécie no futuro. Para a organização, implementou-se um método que utiliza etiquetas coloridas para identificação, além de um guia ilustrado que auxilia técnicos e alunos na devolução dos exemplares às prateleiras apropriadas.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>A organização dos armários foi estruturada com base na taxonomia sistemática e cores. Os espaços nas prateleiras destinados a cada grupo de animais foram delimitados e identificados por etiquetas coloridas correspondentes aos lotes. O mesmo sistema de cores foi aplicado às prateleiras e armários onde os lotes eram guardados. Durante o processo de curadoria, observou-se a necessidade de substituir o álcool dos vidros e descartar materiais excessivamente degradados, garantindo a presença na coleção apenas dos lotes viáveis e identificados até o nível de classe. Identificou-se também a correção de erros de alocação de lotes em classes incorretas, frequentemente resultado de devoluções feitas por pessoas não especializadas. Após a implementação do sistema de cores, os equívocos nas alocações diminuíram consideravelmente e se tornaram mais fáceis de identificar.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>A metodologia de organização e classificação aplicada resultou em uma melhora significativa na identificação de material mal preservado e mal identificado. Além disso, a implementação do sistema de cores reduziu substancialmente o tempo necessário e aumentou a precisão na devolução de materiais aos espaços destinados aos seus grupos taxonômicos.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1. Atlântica AAIS sobre a B da M, 2014 undefined. Coleções Biológicas: Conceitos básicos, curadoria e gestão, interface com a biodiversidade e saúde pública. researchgate.net/AT ArandaIII Simposio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, 2014+researchgate.net [Internet]. 2. Bissoli V, Baltazar M, Leme A, Alitto R, Leite F. Organização da coleção didática de Zoologia de Invertebrados da UNICAMP. scholar.archive.org [Internet]. 3. Livia M, Ramos Gonçalves CM, Carlos A, De Amorim R. Gabinete de curiosidades: o paradoxo das maravilhas. periodicos.rc.biblioteca.unesp.br [Internet].</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14700	Zoologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4374452 - FERNANDA DE CARVALHO MAMEDE ALVARENGA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Guilherme José da Costa Silva		<b>Orientador Externo</b>
				1 - Poster
<b>TITULO</b>	Coleção Didática de Zoologia do Curso Ciências Biológicas da Universidade Santo Amaro- UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Coleções zoológicas desempenham um papel fundamental como valiosos recursos educacionais e científicos, proporcionando acesso direto a exemplares representativos da biodiversidade para estudantes e pesquisadores. Elas contribuem significativamente para a pesquisa científica, a compreensão dos padrões evolutivos e a distribuição geográfica das espécies. No entanto, as coleções didáticas enfrentam desafios de organização, uma vez que o reconhecimento de organismos e seus grupos taxonômicos é geralmente uma tarefa de especialistas. Em coleções tão vastas quanto a coleção zoológica da UNISA, composta por centenas de lotes, a complexidade aumenta, já que frequentemente são manuseadas por pessoas sem experiência adequada. Embora esse manuseio seja crucial para o processo formativo, a sua execução imprecisa pode resultar em confusões ou perda de material essencial.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Com base nas dificuldades mencionadas, o objetivo deste projeto é catalogar os exemplares até o nível de classe e desenvolver um sistema simplificado para consulta e devolução de material aos seus devidos locais, mesmo quando manuseados por pessoas não especializadas.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A catalogação seguiu as normas de taxonomia sistemática, abrangendo as categorias de Reino, Filo (subfilo) e Classe até o momento, com planos de estender a identificação até o nível de espécie no futuro. Para a organização, implementou-se um método que utiliza etiquetas coloridas para identificação, além de um guia ilustrado que auxilia técnicos e alunos na devolução dos exemplares às prateleiras apropriadas.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>A organização dos armários foi estruturada com base na taxonomia sistemática e cores. Os espaços nas prateleiras destinados a cada grupo de animais foram delimitados e identificados por etiquetas coloridas correspondentes aos lotes. O mesmo sistema de cores foi aplicado às prateleiras e armários onde os lotes eram guardados. Durante o processo de curadoria, observou-se a necessidade de substituir o álcool dos vidros e descartar materiais excessivamente degradados, garantindo a presença na coleção apenas dos lotes viáveis e identificados até o nível de classe. Identificou-se também a correção de erros de alocação de lotes em classes incorretas, frequentemente resultado de devoluções feitas por pessoas não especializadas. Após a implementação do sistema de cores, os equívocos nas alocações diminuíram consideravelmente e se tornaram mais fáceis de identificar.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>A metodologia de organização e classificação aplicada resultou em uma melhora significativa na identificação de material mal preservado e mal identificado. Além disso, a implementação do sistema de cores reduziu substancialmente o tempo necessário e aumentou a precisão na devolução de materiais aos espaços destinados aos seus grupos taxonômicos.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1. Atlântica AAIS sobre a B da M, 2014 undefined. Coleções Biológicas: Conceitos básicos, curadoria e gestão, interface com a biodiversidade e saúde pública. researchgate.net/AT ArandaIII Simposio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, 2014+researchgate.net [Internet]. 2. Bissoli V, Baltazar M, Leme A, Alitto R, Leite F. Organização da coleção didática de Zoologia de Invertebrados da UNICAMP. scholar.archive.org [Internet]. 3. Livia M, Ramos Gonçalves CM, Carlos A, De Amorim R. Gabinete de curiosidades: o paradoxo das maravilhas, periodicos.rc.biblioteca.unesp.br [Internet].</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14701	Zoologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3659062 - BEATRIZ RODRIGUES DA CRUZ	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	Coleção Didática de Zoologia do Curso Ciências Biológicas da Universidade Santo Amaro- UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Coleções zoológicas desempenham um papel fundamental como valiosos recursos educacionais e científicos, proporcionando acesso direto a exemplares representativos da biodiversidade para estudantes e pesquisadores. Elas contribuem significativamente para a pesquisa científica, a compreensão dos padrões evolutivos e a distribuição geográfica das espécies. No entanto, as coleções didáticas enfrentam desafios de organização, uma vez que o reconhecimento de organismos e seus grupos taxonômicos é geralmente uma tarefa de especialistas. Em coleções tão vastas quanto a coleção zoológica da UNISA, composta por centenas de lotes, a complexidade aumenta, já que frequentemente são manuseadas por pessoas sem experiência adequada. Embora esse manuseio seja crucial para o processo formativo, a sua execução imprecisa pode resultar em confusões ou perda de material essencial.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Com base nas dificuldades mencionadas, o objetivo deste projeto é catalogar os exemplares até o nível de classe e desenvolver um sistema simplificado para consulta e devolução de material aos seus devidos locais, mesmo quando manuseados por pessoas não especializadas.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A catalogação seguiu as normas de taxonomia sistemática, abrangendo as categorias de Reino, Filo (subfilo) e Classe até o momento, com planos de estender a identificação até o nível de espécie no futuro. Para a organização, implementou-se um método que utiliza etiquetas coloridas para identificação, além de um guia ilustrado que auxilia técnicos e alunos na devolução dos exemplares às prateleiras apropriadas.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>A organização dos armários foi estruturada com base na taxonomia sistemática e cores. Os espaços nas prateleiras destinados a cada grupo de animais foram delimitados e identificados por etiquetas coloridas correspondentes aos lotes. O mesmo sistema de cores foi aplicado às prateleiras e armários onde os lotes eram guardados. Durante o processo de curadoria, observou-se a necessidade de substituir o álcool dos vidros e descartar materiais excessivamente degradados, garantindo a presença na coleção apenas dos lotes viáveis e identificados até o nível de classe. Identificou-se também a correção de erros de alocação de lotes em classes incorretas, frequentemente resultado de devoluções feitas por pessoas não especializadas. Após a implementação do sistema de cores, os equívocos nas alocações diminuíram consideravelmente e se tornaram mais fáceis de identificar.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A metodologia de organização e classificação aplicada resultou em uma melhora significativa na identificação de material mal preservado e mal identificado. Além disso, a implementação do sistema de cores reduziu substancialmente o tempo necessário e aumentou a precisão na devolução de materiais aos espaços destinados aos seus grupos taxonômicos.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Atlântica AAIS sobre a B da M, 2014 undefined. Coleções Biológicas: Conceitos básicos, curadoria e gestão, interface com a biodiversidade e saúde pública. researchgate.net/ATAndall Simposio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, 2014 • researchgate.net [Internet]. 2. Bissoli V, Baltazar M, Leme A, Alitto R, Leite F. Organização da coleção didática de Zoologia de Invertebrados da UNICAMP. scholar.archive.org [Internet]. 3. Livia M, Ramos Gonçalves CM, Carlos A, De Amorim R. Gabinete de curiosidades: o paradoxo das maravilhas. periodicos.rc.biblioteca.unesp.br [Internet].</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14701	Zoologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4374452 - FERNANDA DE CARVALHO MAMEDE ALVARENGA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Guilherme José da Costa Silva		<b>Orientador Externo</b>
<b>TITULO</b>	Coleção Didática de Zoologia do Curso Ciências Biológicas da Universidade Santo Amaro- UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Coleções zoológicas desempenham um papel fundamental como valiosos recursos educacionais e científicos, proporcionando acesso direto a exemplares representativos da biodiversidade para estudantes e pesquisadores. Elas contribuem significativamente para a pesquisa científica, a compreensão dos padrões evolutivos e a distribuição geográfica das espécies. No entanto, as coleções didáticas enfrentam desafios de organização, uma vez que o reconhecimento de organismos e seus grupos taxonômicos é geralmente uma tarefa de especialistas. Em coleções tão vastas quanto a coleção zoológica da UNISA, composta por centenas de lotes, a complexidade aumenta, já que frequentemente são manuseadas por pessoas sem experiência adequada. Embora esse manuseio seja crucial para o processo formativo, a sua execução imprecisa pode resultar em confusões ou perda de material essencial.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Com base nas dificuldades mencionadas, o objetivo deste projeto é catalogar os exemplares até o nível de classe e desenvolver um sistema simplificado para consulta e devolução de material aos seus devidos locais, mesmo quando manuseados por pessoas não especializadas.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A catalogação seguiu as normas de taxonomia sistemática, abrangendo as categorias de Reino, Filo (subfilo) e Classe até o momento, com planos de estender a identificação até o nível de espécie no futuro. Para a organização, implementou-se um método que utiliza etiquetas coloridas para identificação, além de um guia ilustrado que auxilia técnicos e alunos na devolução dos exemplares às prateleiras apropriadas.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>A organização dos armários foi estruturada com base na taxonomia sistemática e cores. Os espaços nas prateleiras destinados a cada grupo de animais foram delimitados e identificados por etiquetas coloridas correspondentes aos lotes. O mesmo sistema de cores foi aplicado às prateleiras e armários onde os lotes eram guardados. Durante o processo de curadoria, observou-se a necessidade de substituir o álcool dos vidros e descartar materiais excessivamente degradados, garantindo a presença na coleção apenas dos lotes viáveis e identificados até o nível de classe. Identificou-se também a correção de erros de alocação de lotes em classes incorretas, frequentemente resultado de devoluções feitas por pessoas não especializadas. Após a implementação do sistema de cores, os equívocos nas alocações diminuíram consideravelmente e se tornaram mais fáceis de identificar.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A metodologia de organização e classificação aplicada resultou em uma melhora significativa na identificação de material mal preservado e mal identificado. Além disso, a implementação do sistema de cores reduziu substancialmente o tempo necessário e aumentou a precisão na devolução de materiais aos espaços destinados aos seus grupos taxonômicos.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Atlântica AAIS sobre a B da M, 2014 undefined. Coleções Biológicas: Conceitos básicos, curadoria e gestão, interface com a biodiversidade e saúde pública. researchgate.net/ATAndall Simposio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, 2014 • researchgate.net [Internet]. 2. Bissoli V, Baltazar M, Leme A, Alitto R, Leite F. Organização da coleção didática de Zoologia de Invertebrados da UNICAMP. scholar.archive.org [Internet]. 3. Livia M, Ramos Gonçalves CM, Carlos A, De Amorim R. Gabinete de curiosidades: o paradoxo das maravilhas. periodicos.rc.biblioteca.unesp.br [Internet].</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14702	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4211707 - JOÃO VICTOR VIDAL DE SOUSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Raquel Fernandes Batista		
<b>TITULO</b>	EFEITOS DA REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES COM PARKINSON: Revisão Integrativa			
<b>INTRODUCA O</b>	A doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurológica de etiologia desconhecida, que ocorre devido a degeneração de algumas células localizadas na região do cérebro conhecida como substância negra. Essas células têm a função de produzir dopamina, substância essa que tem como função conduzir os neurotransmissores, com a falta ou diminuição de dopamina os movimentos são afetados, causando tremores, lentidão nos movimentos, rigidez na musculatura, desequilíbrio e alterações na fala e escrita <sup>1</sup> . Dentre os recursos para a reabilitação motora têm-se estudado a realidade virtual, porém o tema é pouco explorado entre os profissionais da Fisioterapia.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar o efeito da realidade virtual como recurso terapêutico em pacientes com Doença de Parkinson.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, sendo utilizado como critério de inclusão artigos do período de 2014 até 2023, nos idiomas português e inglês, textos completos e gratuitos, ensaios clínicos e estudos randomizados, coorte, relatos e séries de caso sobre o tema abordado e que obtivessem nota igual ou superior a 6 na escala PEDro. Foram excluídos artigos duplicados, os que abordavam pacientes com outras patologias associadas, e os que não tivessem a intervenção da realidade virtual, artigos fora dos idiomas e períodos especificados.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram incluídos 17 artigos segundo as metodologias descritas abordando ensaio clínico, relatos de caso e coorte. Os principais resultados foram a melhora do equilíbrio e marcha, melhora na distância percorrida na caminhada, na largura do passo e velocidade da marcha, no tempo de balanço e redução do apoio duplo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Observou-se que a realidade virtual contribuiu com a reabilitação, os pacientes apresentaram melhora na marcha, equilíbrio, diminuição no risco de queda, melhorando assim a qualidade de vida e auto-confiança, como um recurso complementar a cinesioterapia em pacientes com Parkinson.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Santana C. Efeitos do tratamento com realidade virtual não imersiva na qualidade de vida de indivíduos com Parkinson. Rev Bras Geriatr Gerontol [Internet]. 2015 [citado 18 abr 2023];18(1):49-58. Disponível em: <a href="https://www.rbgg.com.br/arquivos/edicoes/RBGG%2018-1.pdf">https://www.rbgg.com.br/arquivos/edicoes/RBGG%2018-1.pdf</a> 2. CALABRÒ, R.S. et al. Improving motor performance in Parkinson's Disease: a preliminar study on the promising use of the computer assisted virtual reality environment (CAREN). Neurological Sciences, v.41, n.4, p.933-41,2020. 3. COSTA, R.C.S. et al. Treino de equilíbrio em pessoas com doença de Parkinson com uso de realidade virtual. Fisioterapia Brasil, v.19, n.3, p.368-76,2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14703	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3997600 - SONIA MARIA CARVALHO SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Diante da conjuntura atual, em que está ocorrendo grande evolução tec-nológica, as mudanças estão cada vez mais rápidas e as empresas precisam evoluir na mesma proporção. Dessa forma, precisam obter informações cada vez mais rápidas, e principalmente precisas, e é neste contexto que entra a Controladoria como ferramenta, exercendo o seguinte papel conforme (Almeida, 2009), a Controladoria supre os gestores de diversas áreas no processo de gestão, com instrumentos gerenciais que fornecem demonstrativos contábeis sobre o desempenho e resultados econômicos da organização. Apresenta também o Controller, peça fundamental dentro do contexto da controladoria, como define (Padoveze, 2003), o controller pode e deve exercer influência junto aos demais gestores e o faz pelo conhecimento da ciência da gestão econômica.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo principal deste trabalho é destacar a importância da controladoria como ferramenta de gestão na atualidade, que exerce um papel significativo para as empresas, apoiando os gestores no planejamento e controle, através da manutenção de um sistema de informação que permita as várias funções e especialidades.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir dos dados obtidos, foi utilizado uma metodologia qualitativa e de pesquisa exploratória investigativa, pode-se ressaltar que o sistemas de informações tem grande importância nesse processo, captando ocorrências externas e internas e apoiando a empresa no processo de tomada de decisão.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme Padoveze e Bertolucci (2008), "A controladoria é a unidade administrativa na empresa que tem como função executar o conjunto completo das funções contábeis nos aspectos legais gerenciais". No entanto pelos mesmos autores, o conceito de controladoria pode ser entendido e citado como o conjunto de processos que tem como objetivo principal a busca constante de melhores práticas de administração e procedimentos que auxiliie os gestores e todos os interessados no melhor processo de gestão e eficácia para a empresa, conduzindo-a a melhor produtividade possível. Com isso a controladoria pode também ser classificada como uma ciência autônoma e não pode ser confundida com a contabilidade.			
<b>CONCLUSÕES</b>	conclui-se então que não basta o gestor ser um bom conhecedor de todas essas ferramentas se não obtiver o discernimento necessário para utilizá-las de forma eficaz em todo o processo de tomada de decisão. Portanto este trabalho constituiu-se em um estudo exploratório e o esforço aqui despendido não esgotou o tema. Mas chegou-se a conclusão de que a função da pesquisa e da divulgação de conhecimento são essenciais para o desenvolvimento das pessoas. Espera-se que este trabalho contribua um pouco mais para o estudo da Controladoria e, principalmente, para o conhecimento do Controller, profissional essencial para a gestão econômica da empresa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	- FIGUEREDO, Sandra ; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria - Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2008. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional: Conceitos - Estrutura - Aplicação. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2012. - PADOVEZE, C. L. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básica. 3. Ed. São Paulo: CENGAGE Learning. 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14703	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4196384 - DARLEY DA COSTA ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Diante da conjuntura atual, em que está ocorrendo grande evolução tec-nológica, as mudanças estão cada vez mais rápidas e as empresas precisam evoluir na mesma proporção. Dessa forma, precisam obter informações cada vez mais rápidas, e principalmente precisas, e é neste contexto que entra a Controladoria como ferramenta, exercendo o seguinte papel conforme (Almeida, 2009), a Controladoria supre os gestores de diversas áreas no processo de gestão, com instrumentos gerenciais que fornecem demonstrativos contábeis sobre o desempenho e resultados econômicos da organização. Apresenta também o Controller, peça fundamental dentro do contexto da controladoria, como define (Padoveze, 2003), o controller pode e deve exercer influência junto aos demais gestores e o faz pelo conhecimento da ciência da gestão econômica.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo principal deste trabalho é destacar a importância da controladoria como ferramenta de gestão na atualidade, que exerce um papel significativo para as empresas, apoiando os gestores no planejamento e controle, através da manutenção de um sistema de informação que permita as várias funções e especialidades.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir dos dados obtidos, foi utilizado uma metodologia qualitativa e de pesquisa exploratória investigativa, pode-se ressaltar que o sistemas de informações tem grande importância nesse processo, captando ocorrências externas e internas e apoiando a empresa no processo de tomada de decisão.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme Padoveze e Bertolucci (2008), "A controladoria é a unidade administrativa na empresa que tem como função executar o conjunto completo das funções contábeis nos aspectos legais gerenciais". No entanto pelos mesmos autores, o conceito de controladoria pode ser entendido e citado como o conjunto de processos que tem como objetivo principal a busca constante de melhores práticas de administração e procedimentos que auxiliie os gestores e todos os interessados no melhor processo de gestão e eficácia para a empresa, conduzindo-a a melhor produtividade possível. Com isso a controladoria pode também ser classificada como uma ciência autônoma e não pode ser confundida com a contabilidade.			
<b>CONCLUSÕES</b>	conclui-se então que não basta o gestor ser um bom conhecedor de todas essas ferramentas se não obtiver o discernimento necessário para utiliza-las de forma eficaz em todo o processo de tomada de decisão. Portanto este trabalho constituiu-se em um estudo exploratório e o esforço aqui despendido não esgotou o tema. Mas chegou-se a conclusão de que a função da pesquisa e da divulgação de conhecimento são essenciais para o desenvolvimento das pessoas. Espera-se que este trabalho contribua um pouco mais para o estudo da Controladoria e, principalmente, para o conhecimento do Controller, profissional essencial para a gestão econômica da empresa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	- FIGUEREDO, Sandra ; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria - Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2008. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional: Conceitos - Estrutura - Aplicação. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2012. - PADOVEZE, C. L. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básica. 3. Ed. São Paulo: CENGAGE Learning. 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14703	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4293886 - GABRIELLA BATISTA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Diante da conjuntura atual, em que está ocorrendo grande evolução tec-nológica, as mudanças estão cada vez mais rápidas e as empresas precisam evoluir na mesma proporção. Dessa forma, precisam obter informações cada vez mais rápidas, e principalmente precisas, e é neste contexto que entra a Controladoria como ferramenta, exercendo o seguinte papel conforme (Almeida, 2009), a Controladoria supre os gestores de diversas áreas no processo de gestão, com instrumentos gerenciais que fornecem demonstrativos contábeis sobre o desempenho e resultados econômicos da organização. Apresenta também o Controller, peça fundamental dentro do contexto da controladoria, como define (Padoveze, 2003), o controller pode e deve exercer influência junto aos demais gestores e o faz pelo conhecimento da ciência da gestão econômica.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo principal deste trabalho é destacar a importância da controladoria como ferramenta de gestão na atualidade, que exerce um papel significativo para as empresas, apoiando os gestores no planejamento e controle, através da manutenção de um sistema de informação que permita as várias funções e especialidades.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir dos dados obtidos, foi utilizado uma metodologia qualitativa e de pesquisa exploratória investigativa, pode-se ressaltar que o sistemas de informações tem grande importância nesse processo, captando ocorrências externas e internas e apoiando a empresa no processo de tomada de decisão.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme Padoveze e Bertolucci (2008), "A controladoria é a unidade administrativa na empresa que tem como função executar o conjunto completo das funções contábeis nos aspectos legais gerenciais". No entanto pelos mesmos autores, o conceito de controladoria pode ser entendido e citado como o conjunto de processos que tem como objetivo principal a busca constante de melhores práticas de administração e procedimentos que auxiliie os gestores e todos os interessados no melhor processo de gestão e eficácia para a empresa, conduzindo-a a melhor produtividade possível. Com isso a controladoria pode também ser classificada como uma ciência autônoma e não pode ser confundida com a contabilidade.			
<b>CONCLUSÕES</b>	conclui-se então que não basta o gestor ser um bom conhecedor de todas essas ferramentas se não obtiver o discernimento necessário para utiliza-las de forma eficaz em todo o processo de tomada de decisão. Portanto este trabalho constituiu-se em um estudo exploratório e o esforço aqui despendido não esgotou o tema. Mas chegou-se a conclusão de que a função da pesquisa e da divulgação de conhecimento são essenciais para o desenvolvimento das pessoas. Espera-se que este trabalho contribua um pouco mais para o estudo da Controladoria e, principalmente, para o conhecimento do Controller, profissional essencial para a gestão econômica da empresa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	- FIGUEREDO, Sandra ; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria - Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2008. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional: Conceitos - Estrutura - Aplicação. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2012. - PADOVEZE, C. L. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básica. 3. Ed. São Paulo: CENGAGE Learning. 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14703	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4409884 - VINICUS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Diante da conjuntura atual, em que está ocorrendo grande evolução tec-nológica, as mudanças estão cada vez mais rápidas e as empresas precisam evoluir na mesma proporção. Dessa forma, precisam obter informações cada vez mais rápidas, e principalmente precisas, e é neste contexto que entra a Controladoria como ferramenta, exercendo o seguinte papel conforme (Almeida, 2009), a Controladoria supre os gestores de diversas áreas no processo de gestão, com instrumentos gerenciais que fornecem demonstrativos contábeis sobre o desempenho e resultados econômicos da organização. Apresenta também o Controller, peça fundamental dentro do contexto da controladoria, como define (Padoveze, 2003), o controller pode e deve exercer influência junto aos demais gestores e o faz pelo conhecimento da ciência da gestão econômica.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo principal deste trabalho é destacar a importância da controladoria como ferramenta de gestão na atualidade, que exerce um papel significativo para as empresas, apoiando os gestores no planejamento e controle, através da manutenção de um sistema de informação que permita as várias funções e especialidades.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir dos dados obtidos, foi utilizado uma metodologia qualitativa e de pesquisa exploratória investigativa, pode-se ressaltar que o sistemas de informações tem grande importância nesse processo, captando ocorrências externas e internas e apoiando a empresa no processo de tomada de decisão.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme Padoveze e Bertolucci (2008), "A controladoria é a unidade administrativa na empresa que tem como função executar o conjunto completo das funções contábeis nos aspectos legais gerenciais". No entanto pelos mesmos autores, o conceito de controladoria pode ser entendido e citado como o conjunto de processos que tem como objetivo principal a busca constante de melhores práticas de administração e procedimentos que auxiliie os gestores e todos os interessados no melhor processo de gestão e eficácia para a empresa, conduzindo-a a melhor produtividade possível. Com isso a controladoria pode também ser classificada como uma ciência autônoma e não pode ser confundida com a contabilidade.			
<b>CONCLUSÕES</b>	conclui-se então que não basta o gestor ser um bom conhecedor de todas essas ferramentas se não obtiver o discernimento necessário para utilizá-las de forma eficaz em todo o processo de tomada de decisão. Portanto este trabalho constituiu-se em um estudo exploratório e o esforço aqui despendido não esgotou o tema. Mas chegou-se a conclusão de que a função da pesquisa e da divulgação de conhecimento são essenciais para o desenvolvimento das pessoas. Espera-se que este trabalho contribua um pouco mais para o estudo da Controladoria e, principalmente, para o conhecimento do Controller, profissional essencial para a gestão econômica da empresa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	- FIGUEREDO, Sandra ; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria - Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2008. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional: Conceitos - Estrutura - Aplicação. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2012. - PADOVEZE, C. L. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básica. 3. Ed. São Paulo: CENGAGE Learning. 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14703	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4448472 - STEFANY CAROLINE DA SILVA GERMANO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Diante da conjuntura atual, em que está ocorrendo grande evolução tec-nológica, as mudanças estão cada vez mais rápidas e as empresas precisam evoluir na mesma proporção. Dessa forma, precisam obter informações cada vez mais rápidas, e principalmente precisas, e é neste contexto que entra a Controladoria como ferramenta, exercendo o seguinte papel conforme (Almeida, 2009), a Controladoria supre os gestores de diversas áreas no processo de gestão, com instrumentos gerenciais que fornecem demonstrativos contábeis sobre o desempenho e resultados econômicos da organização. Apresenta também o Controller, peça fundamental dentro do contexto da controladoria, como define (Padoveze, 2003), o controller pode e deve exercer influência junto aos demais gestores e o faz pelo conhecimento da ciência da gestão econômica.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo principal deste trabalho é destacar a importância da controladoria como ferramenta de gestão na atualidade, que exerce um papel significativo para as empresas, apoiando os gestores no planejamento e controle, através da manutenção de um sistema de informação que permita as várias funções e especialidades.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir dos dados obtidos, foi utilizado uma metodologia qualitativa e de pesquisa exploratória investigativa, pode-se ressaltar que o sistemas de informações tem grande importância nesse processo, captando ocorrências externas e internas e apoiando a empresa no processo de tomada de decisão.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme Padoveze e Bertolucci (2008), "A controladoria é a unidade administrativa na empresa que tem como função executar o conjunto completo das funções contábeis nos aspectos legais gerenciais". No entanto pelos mesmos autores, o conceito de controladoria pode ser entendido e citado como o conjunto de processos que tem como objetivo principal a busca constante de melhores práticas de administração e procedimentos que auxiliie os gestores e todos os interessados no melhor processo de gestão e eficácia para a empresa, conduzindo-a a melhor produtividade possível. Com isso a controladoria pode também ser classificada como uma ciência autônoma e não pode ser confundida com a contabilidade.			
<b>CONCLUSÕES</b>	conclui-se então que não basta o gestor ser um bom conhecedor de todas essas ferramentas se não obtiver o discernimento necessário para utiliza-las de forma eficaz em todo o processo de tomada de decisão. Portanto este trabalho constituiu-se em um estudo exploratório e o esforço aqui despendido não esgotou o tema. Mas chegou-se a conclusão de que a função da pesquisa e da divulgação de conhecimento são essenciais para o desenvolvimento das pessoas. Espera-se que este trabalho contribua um pouco mais para o estudo da Controladoria e, principalmente, para o conhecimento do Controller, profissional essencial para a gestão econômica da empresa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	- FIGUEREDO, Sandra ; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria - Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2008. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional: Conceitos - Estrutura - Aplicação. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2012. - PADOVEZE, C. L. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básica. 3. Ed. São Paulo: CENGAGE Learning. 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14703	Ciências Contábeis	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4518071 - ERICSON AMARAL MENDES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Antonio Roberto da Costa		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Diante da conjuntura atual, em que está ocorrendo grande evolução tec-nológica, as mudanças estão cada vez mais rápidas e as empresas precisam evoluir na mesma proporção. Dessa forma, precisam obter informações cada vez mais rápidas, e principalmente precisas, e é neste contexto que entra a Controladoria como ferramenta, exercendo o seguinte papel conforme (Almeida, 2009), a Controladoria supre os gestores de diversas áreas no processo de gestão, com instrumentos gerenciais que fornecem demonstrativos contábeis sobre o desempenho e resultados econômicos da organização. Apresenta também o Controller, peça fundamental dentro do contexto da controladoria, como define (Padoveze, 2003), o controller pode e deve exercer influência junto aos demais gestores e o faz pelo conhecimento da ciência da gestão econômica.			
<b>OBJETIVOS</b>	o objetivo principal deste trabalho é destacar a importância da controladoria como ferramenta de gestão na atualidade, que exerce um papel significativo para as empresas, apoiando os gestores no planejamento e controle, através da manutenção de um sistema de informação que permita as várias funções e especialidades.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir dos dados obtidos, foi utilizado uma metodologia qualitativa e de pesquisa exploratória investigativa, pode-se ressaltar que o sistemas de informações tem grande importância nesse processo, captando ocorrências externas e internas e apoiando a empresa no processo de tomada de decisão.			
<b>RESULTADOS</b>	Conforme Padoveze e Bertolucci (2008), "A controladoria é a unidade administrativa na empresa que tem como função executar o conjunto completo das funções contábeis nos aspectos legais gerenciais". No entanto pelos mesmos autores, o conceito de controladoria pode ser entendido e citado como o conjunto de processos que tem como objetivo principal a busca constante de melhores práticas de administração e procedimentos que auxiliie os gestores e todos os interessados no melhor processo de gestão e eficácia para a empresa, conduzindo-a a melhor produtividade possível. Com isso a controladoria pode também ser classificada como uma ciência autônoma e não pode ser confundida com a contabilidade.			
<b>CONCLUSÕES</b>	conclui-se então que não basta o gestor ser um bom conhecedor de todas essas ferramentas se não obtiver o discernimento necessário para utiliza-las de forma eficaz em todo o processo de tomada de decisão. Portanto este trabalho constituiu-se em um estudo exploratório e o esforço aqui despendido não esgotou o tema. Mas chegou-se a conclusão de que a função da pesquisa e da divulgação de conhecimento são essenciais para o desenvolvimento das pessoas. Espera-se que este trabalho contribua um pouco mais para o estudo da Controladoria e, principalmente, para o conhecimento do Controller, profissional essencial para a gestão econômica da empresa.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	- FIGUEREDO, Sandra ; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria - Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2008. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional: Conceitos - Estrutura - Aplicação. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2012. - PADOVEZE, C. L. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. - PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básica. 3. Ed. São Paulo: CENGAGE Learning. 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14704	Saúde Coletiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4633300 - KETLIN JAMILLY SORRENTINO LEAL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luana Prado Figueredo		ALOISIO OLÍMPIO
<b>TITULO</b>	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE VIOLÊNCIA INFANTIL NO PERÍODO DA COVID-19: ATENDIMENTOS EM UM HOSPITAL GERAL DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que a COVID-19 tomou proporções pandêmicas requerendo isolamento social para conter sua disseminação <sup>1</sup> . Consequentemente, atividades infantojuvenil fora do lar foram proibidas, restringindo-as ao ambiente intradomiciliar, o qual tem se demonstrado mais inseguro, resguardado pela lei do silêncio e do medo. Cenário que emerge preocupação, pois os números sobre a violência domiciliar no Brasil pré-pandemia já eram alarmante <sup>2</sup> , aumentando 15% (média) a incidência de violência infantojuvenil, que pode abranger os tipos: física, sexual, psicológica, negligência e formas específicas química e filicídio, sendo com frequência perpetrada por familiares <sup>3</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar o perfil epidemiológico de violência contra crianças atendidas em um hospital geral da Zona Sul de São Paulo, no período Sindêmico da Covid-19.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo retrospectivo e descritivo com base nas notificações de violências, disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A amostra foi composta por crianças atendidas em um Hospital Geral da Zona Sul de São Paulo, no período Sindêmico da Covid-19, entre 2020 e 2021 (CAAE: 73187623.0.3001.5447).			
<b>RESULTADOS</b>	Ocorreram 114 casos de violências em crianças, sendo 60% meninas. A idade variou de um mês a 11 anos, sendo predominantes nas faixas etárias de 1 a 4 anos (52%) e de 5 a 8 anos (25%). À despeito dos tipos de violências, observou-se que as crianças sofreram um ou mais tipos, sendo sexuais (52%), físicos (42%), intoxicação por agentes químicos (3%) e abusos sexuais associados aos físicos (43%), tendo diferentes autores das agressões (13), porém os principais foram os desconhecidos (21%), os pais (19%) e os amigos (19%), seguidos do auto agressores (11%) e as mães (8%). Dentre os locais em que sofreram, em 47% dos casos não foram informados e 44% nas próprias residências junto com os pais, o pai ou a mãe, os avós. Quanto aos desfechos, 99% evoluíram com alta hospitalar e foram encaminhados a rede de atenção à saúde.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se que a violência infantil ocorre predominante no ambiente doméstico tornando-se um problema, ainda, bem mais complexo, pois no núcleo familiar onde deve surgir condições de segurança ao desenvolvimento infantil e qualidade de vida é o que mais contribui com situações de violência contra a criança. Estes dados apontam a necessidade de alertar os profissionais de saúde e rediscutir estratégias de identificação à vulnerabilidade social e prevenção do agravo, proteção e atendimento adequado às vítimas em instituições de saúde e de segurança públicas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa - COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). Brasília, DF: OPAS/OMS; 2020. 2. Brazil - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH). Disque 100. Relatório violência contra crianças e adolescentes. Brasília, DF: ONDH; 2019. 3. Platta VB, Guederta JM, Coelho EBS. Violência contra crianças e adolescentes: notificações e alerta em tempos de pandemia. Rev Paul Pediatr. 2021;39:e2020267.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14704	Saúde Coletiva	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4692934 - JULIANA BARBOSA ROCHA PIMENTEL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Luana Prado Figueredo		ALOISIO OLÍMPIO
<b>TITULO</b>	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE VIOLÊNCIA INFANTIL NO PERÍODO DA COVID-19: ATENDIMENTOS EM UM HOSPITAL GERAL DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que a COVID-19 tomou proporções pandêmicas requerendo isolamento social para conter sua disseminação <sup>1</sup> . Consequentemente, atividades infantojuvenil fora do lar foram proibidas, restringindo-as ao ambiente intradomiciliar, o qual tem se demonstrado mais inseguro, resguardado pela lei do silêncio e do medo. Cenário que emerge preocupação, pois os números sobre a violência domiciliar no Brasil pré-pandemia já eram alarmante <sup>2</sup> , aumentando 15% (média) a incidência de violência infantojuvenil, que pode abranger os tipos: física, sexual, psicológica, negligência e formas específicas química e filicídio, sendo com frequência perpetrada por familiares <sup>3</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar o perfil epidemiológico de violência contra crianças atendidas em um hospital geral da Zona Sul de São Paulo, no período Sindêmico da Covid-19.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo retrospectivo e descritivo com base nas notificações de violências, disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A amostra foi composta por crianças atendidas em um Hospital Geral da Zona Sul de São Paulo, no período Sindêmico da Covid-19, entre 2020 e 2021 (CAAE: 73187623.0.3001.5447).			
<b>RESULTADOS</b>	Ocorreram 114 casos de violências em crianças, sendo 60% meninas. A idade variou de um mês a 11 anos, sendo predominantes nas faixas etárias de 1 a 4 anos (52%) e de 5 a 8 anos (25%). À despeito dos tipos de violências, observou-se que as crianças sofreram um ou mais tipos, sendo sexuais (52%), físicos (42%), intoxicação por agentes químicos (3%) e abusos sexuais associados aos físicos (43%), tendo diferentes autores das agressões (13), porém os principais foram os desconhecidos (21%), os pais (19%) e os amigos (19%), seguidos do auto agressores (11%) e as mães (8%). Dentre os locais em que sofreram, em 47% dos casos não foram informados e 44% nas próprias residências junto com os pais, o pai ou a mãe, os avós. Quanto aos desfechos, 99% evoluíram com alta hospitalar e foram encaminhados a rede de atenção à saúde.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se que a violência infantil ocorre predominante no ambiente doméstico tornando-se um problema, ainda, bem mais complexo, pois no núcleo familiar onde deve surgir condições de segurança ao desenvolvimento infantil e qualidade de vida é o que mais contribui com situações de violência contra a criança. Estes dados apontam a necessidade de alertar os profissionais de saúde e rediscutir estratégias de identificação à vulnerabilidade social e prevenção do agravo, proteção e atendimento adequado às vítimas em instituições de saúde e de segurança públicas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa - COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). Brasília, DF: OPAS/OMS; 2020. 2. Brazil - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH). Disque 100. Relatório violência contra crianças e adolescentes. Brasília, DF: ONDH; 2019. 3. Platta VB, Guederta JM, Coelho EBS. Violência contra crianças e adolescentes: notificações e alerta em tempos de pandemia. Rev Paul Pediatr. 2021;39:e2020267.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14706	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2887819 - JULIANA RAMOS SANTIAGO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Patricia Margarida Farias Coelho		
<b>TITULO</b>	VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES AFETIVAS NOS CONTOS EM DALTON TREVISAN: 1956 A 1988			
<b>INTRODUCAO</b>	A violência tem sido um tema constantemente explorado em variadas produções literárias brasileiras e há notadamente diversos registros de violência de natureza psicológica, sexual, patrimonial e moral associados aos comportamentos próprios de uma sociedade violenta.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo geral é analisar a violência em seis contos de Dalton Trevisan, visando identificar os recortes da violência em que as personagens vivem suas relações afetivas de modo conflituosas nos livros: Novelas nada exemplares (1956), Guerra conjugal (1969), O rei da Terra (1972), e Pão e Sangue (1988) interpretando-os como expressão consciente da denúncia das violências subjacentes ao pensamento social brasileiro e também como testemunhos de um tempo em que a violência no âmbito familiar não era tema tão debatido quanto é hoje. Como objetivos específicos temos: (i) mapear o levantamento histórico e teórico sobre a violência de gênero e doméstica; (ii) compreender como a violência doméstica e familiar são relatadas dentro dos contos de Trevisan; (iii) analisar a obra de Dalton Trevisan destacando a presença das violências doméstica e de gênero em diferentes momentos da produção do autor, em seus livros pós 1950.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada para este trabalho é a da semiótica francesa que analisa os discursos.			
<b>RESULTADOS</b>	os resultados apontam que a violência nas relações afetivas é como um reflexo da visão do mundo de uma sociedade historicamente violenta que normaliza e minimiza essa violência, tornando-a habitual			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluimos que a literatura de Dalton Trevisan (1925) denuncia de modo bastante incisivo a violência que ocorre nos ambientes domésticos, familiar ou privados que talvez seja tão ou mais cruel do que aquela que acontece nas ruas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BARROS, D. L. P. Correlação entre o mundo sensível e as línguas naturais: o problema específico dos verbos de comunicação. Significação: revista brasileira de semiótica, São Paulo, n. 1, p. 80-116, 1975a. _____. Gestualidade: um exercício. Bacad: estudos semiológicos, São José do Rio Preto, n. 2, p. 177-200, 1975b _____. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 2001. _____. Estudos do discurso. In: FLORIN, J. L. (Org.). Introdução à lingüística II: princípios de análise. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008. BARROS, Diana Luz Pessoa de; FLORIN, José Luiz (orgs.) Dialogismo, Polifonia, Intertextualidade: Em torno de Bakhtin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. BERNARDI, Rosse Marye. Dalton Trevisan: A trajetória de um escritor. Tese de doutoramento. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras Clássicas e Vernáculas, 1983. BRAIT, Beth (org.). Bakhtin, dialogismo e Construção do sentido. In: Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 1997.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14708	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3040119 - THAYANE AUGUSTA VILELA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE DA HOSPITALIZAÇÃO E DOS SOROTIPOS DOS CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2018 A 2022: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A dengue é uma arbovirose febril aguda, endêmica, de caráter sazonal, causada por um RNA vírus da família Flaviviridae, de cinco sorotipos, sendo apenas 4 deles identificados em território brasileiro. Tendo como vetor de transmissão a fêmea do mosquito <i>Aedes aegypti</i>, a doença manifesta-se após um período de incubação de 4 a 10 dias, tipicamente com febre, cefaleia, dor retro orbitária, náuseas, êmese, artralgia, exantema, petéquias e leucopenia, porém podendo ter desfechos mais graves. A tipificação sorológica e o diagnóstico dos perfis específicos de anticorpos possuem relevância para fins de notificação, recomendando-se a realização destes, após o sexto dia do início da sintomatologia. A exigência de notificação compulsória de casos de dengue capacita as autoridades para a adoção de estratégias de enfrentamento e formulação de políticas públicas pertinentes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Análise das hospitalizações e sorotipos de dengue em São Paulo (2018- 2022) busca relações entre sorotipos prevalentes e casos hospitalizados			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se um estudo observacional transversal dos casos de dengue no estado de São Paulo compreendidos entre os anos de 2018 e 2022, através de análise de dados do TabNet/DATASUS.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Nos 5 anos analisados, em sua grande maioria não foram realizadas notificações de sorotipo, somando 99,48% dos casos. Porém, quando realizada, o sorotipo 2 representou 0,47% dos casos entre 2018 e 2020, somando 3.169 casos nos 3 anos. Já nos anos subsequentes, 0,42% dos casos, um total de 2.143 casos de dengue do tipo 1. O ano com maior número de sorologias notificadas foi o de 2018, porém apenas 1,94% de sua totalidade foi testada. Quanto ao desfecho de casos, nos 5 anos analisados, em 74,42% não ocorreram hospitalizações, sendo o ano de 2019 o com maior número de internações, com 11.088 (2,5%) dos casos. Quanto à cura, foram 1.037.272 casos no período, e o ano com menor taxa de cura foi o de 2018, 13.867 (75,85% dos casos).</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Observou-se um aumento nas notificações de casos de dengue no estado de São Paulo, mesmo tendo os sorotipos subnotificados; foi observado um maior número de casos do sorotipo 2. Quanto as hospitalizações, observou-se que no ano de 2019 foi apresentado um maior número internações			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Braga C, Martelli CMT, Souza WV, Luna CF, Albuquerque MFPM, Mariz CA, Morais CNL, Brito CAA, Melo CFCA, Lins RD, Drexler JF, Jaenisch T, Marques ETA, Viana IFT. Seroprevalence of Dengue, Chikungunya and Zika at the epicenter of the congenital microcephaly epidemic in Northeast Brazil: A population-based survey. PLoS Negl Trop Dis. 2023 Jul 3;17(7):e0011270. 2. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 2022. Plano de contingência para respostas em emergências em saúde pública. 3. Burattini MN, Lopez LF, Coutinho FA, Siqueira JB Jr, Homsani S, Sarti E, Massad E. Age and regional differences in clinical presentation and risk of hospitalization for dengue in Brazil, 2000-2014. Clinics (Sao Paulo). 2016 Aug;71(8):455-63.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14708	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3619516 - MATEUS RODRIGUES NACHEF		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE DA HOSPITALIZAÇÃO E DOS SOROTIPOS DOS CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2018 A 2022: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A dengue é uma arbovirose febril aguda, endêmica, de caráter sazonal, causada por um RNA vírus da família Flaviviridae, de cinco sorotipos, sendo apenas 4 deles identificados em território brasileiro. Tendo como vetor de transmissão a fêmea do mosquito Aedes aegypti, a doença manifesta-se após um período de incubação de 4 a 10 dias, tipicamente com febre, cefaleia, dor retro orbitária, náuseas, êmese, artralgia, exantema, petéquias e leucopenia, porém podendo ter desfechos mais graves. A tipificação sorológica e o diagnóstico dos perfis específicos de anticorpos possuem relevância para fins de notificação, recomendando-se a realização destes, após o sexto dia do início da sintomatologia. A exigência de notificação compulsória de casos de dengue capacita as autoridades para a adoção de estratégias de enfrentamento e formulação de políticas públicas pertinentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Análise das hospitalizações e sorotipos de dengue em São Paulo (2018- 2022) busca relações entre sorotipos prevalentes e casos hospitalizados			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se um estudo observacional transversal dos casos de dengue no estado de São Paulo compreendidos entre os anos de 2018 e 2022, através de análise de dados do TabNet/DATASUS.			
<b>RESULTADOS</b>	Nos 5 anos analisados, em sua grande maioria não foram realizadas notificações de sorotipo, somando 99,48% dos casos. Porém, quando realizada, o sorotipo 2 representou 0,47% dos casos entre 2018 e 2020, somando 3.169 casos nos 3 anos. Já nos anos subsequentes, 0,42% dos casos, um total de 2.143 casos de dengue do tipo 1. O ano com maior número de sorologias notificadas foi o de 2018, porém apenas 1,94% de sua totalidade foi testada. Quanto ao desfecho de casos, nos 5 anos analisados, em 74,42% não ocorreram hospitalizações, sendo o ano de 2019 o com maior número de internações, com 11.088 (2,5%) dos casos. Quanto à cura, foram 1.037.272 casos no período, e o ano com menor taxa de cura foi o de 2018, 13.867 (75,85% dos casos).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observou-se um aumento nas notificações de casos de dengue no estado de São Paulo, mesmo tendo os sorotipos subnotificados; foi observado um maior número de casos do sorotipo 2. Quanto as hospitalizações, observou-se que no ano de 2019 foi apresentado um maior número internações			
<b>REFERENCIAS</b>	Braga C, Martelli CMT, Souza WV, Luna CF, Albuquerque MFPM, Mariz CA, Morais CNL, Brito CAA, Melo CFCA, Lins RD, Drexler JF, Jaenisch T, Marques ETA, Viana IFT. Seroprevalence of Dengue, Chikungunya and Zika at the epicenter of the congenital microcephaly epidemic in Northeast Brazil: A population-based survey. PLoS Negl Trop Dis. 2023 Jul 3;17(7):e0011270. 2. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 2022. Plano de contingência para respostas em emergências em saúde pública. 3. Burattini MN, Lopez LF, Coutinho FA, Siqueira JB Jr, Homsani S, Sarti E, Massad E. Age and regional differences in clinical presentation and risk of hospitalization for dengue in Brazil, 2000-2014. Clinics (Sao Paulo). 2016 Aug;71(8):455-63.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14708	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3677842 - RENAN DE LIMA LEAL		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE DA HOSPITALIZAÇÃO E DOS SOROTIPOS DOS CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2018 A 2022: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A dengue é uma arbovirose febril aguda, endêmica, de caráter sazonal, causada por um RNA vírus da família Flaviviridae, de cinco sorotipos, sendo apenas 4 deles identificados em território brasileiro. Tendo como vetor de transmissão a fêmea do mosquito Aedes aegypti, a doença manifesta-se após um período de incubação de 4 a 10 dias, tipicamente com febre, cefaleia, dor retro orbitária, náuseas, êmese, artralgia, exantema, petéquias e leucopenia, porém podendo ter desfechos mais graves. A tipificação sorológica e o diagnóstico dos perfis específicos de anticorpos possuem relevância para fins de notificação, recomendando-se a realização destes, após o sexto dia do início da sintomatologia. A exigência de notificação compulsória de casos de dengue capacita as autoridades para a adoção de estratégias de enfrentamento e formulação de políticas públicas pertinentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Análise das hospitalizações e sorotipos de dengue em São Paulo (2018- 2022) busca relações entre sorotipos prevalentes e casos hospitalizados			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se um estudo observacional transversal dos casos de dengue no estado de São Paulo compreendidos entre os anos de 2018 e 2022, através de análise de dados do TabNet/DATASUS.			
<b>RESULTADOS</b>	Nos 5 anos analisados, em sua grande maioria não foram realizadas notificações de sorotipo, somando 99,48% dos casos. Porém, quando realizada, o sorotipo 2 representou 0,47% dos casos entre 2018 e 2020, somando 3.169 casos nos 3 anos. Já nos anos subsequentes, 0,42% dos casos, um total de 2.143 casos de dengue do tipo 1. O ano com maior número de sorologias notificadas foi o de 2018, porém apenas 1,94% de sua totalidade foi testada. Quanto ao desfecho de casos, nos 5 anos analisados, em 74,42% não ocorreram hospitalizações, sendo o ano de 2019 o com maior número de internações, com 11.088 (2,5%) dos casos. Quanto à cura, foram 1.037.272 casos no período, e o ano com menor taxa de cura foi o de 2018, 13.867 (75,85% dos casos).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observou-se um aumento nas notificações de casos de dengue no estado de São Paulo, mesmo tendo os sorotipos subnotificados; foi observado um maior número de casos do sorotipo 2. Quanto as hospitalizações, observou-se que no ano de 2019 foi apresentado um maior número internações			
<b>REFERENCIAS</b>	Braga C, Martelli CMT, Souza WV, Luna CF, Albuquerque MFPM, Mariz CA, Morais CNL, Brito CAA, Melo CFCA, Lins RD, Drexler JF, Jaenisch T, Marques ETA, Viana IFT. Seroprevalence of Dengue, Chikungunya and Zika at the epicenter of the congenital microcephaly epidemic in Northeast Brazil: A population-based survey. PLoS Negl Trop Dis. 2023 Jul 3;17(7):e0011270. 2. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 2022. Plano de contingência para respostas em emergências em saúde pública. 3. Burattini MN, Lopez LF, Coutinho FA, Siqueira JB Jr, Homsani S, Sarti E, Massad E. Age and regional differences in clinical presentation and risk of hospitalization for dengue in Brazil, 2000-2014. Clinics (Sao Paulo). 2016 Aug;71(8):455-63.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14708	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3724344 - MARIA CAROLINA RIBEIRO DE ASSUMPÇÃO MORO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE DA HOSPITALIZAÇÃO E DOS SOROTIPOS DOS CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2018 A 2022: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A dengue é uma arbovirose febril aguda, endêmica, de caráter sazonal, causada por um RNA vírus da família Flaviviridae, de cinco sorotipos, sendo apenas 4 deles identificados em território brasileiro. Tendo como vetor de transmissão a fêmea do mosquito <i>Aedes aegypti</i> , a doença manifesta-se após um período de incubação de 4 a 10 dias, tipicamente com febre, cefaleia, dor retro orbitária, náuseas, êmese, artralgia, exantema, petéquias e leucopenia, porém podendo ter desfechos mais graves. A tipificação sorológica e o diagnóstico dos perfis específicos de anticorpos possuem relevância para fins de notificação, recomendando-se a realização destes, após o sexto dia do início da sintomatologia. A exigência de notificação compulsória de casos de dengue capacita as autoridades para a adoção de estratégias de enfrentamento e formulação de políticas públicas pertinentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Análise das hospitalizações e sorotipos de dengue em São Paulo (2018- 2022) busca relações entre sorotipos prevalentes e casos hospitalizados			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se um estudo observacional transversal dos casos de dengue no estado de São Paulo compreendidos entre os anos de 2018 e 2022, através de análise de dados do TabNet/DATASUS.			
<b>RESULTADOS</b>	Nos 5 anos analisados, em sua grande maioria não foram realizadas notificações de sorotipo, somando 99,48% dos casos. Porém, quando realizada, o sorotipo 2 representou 0,47% dos casos entre 2018 e 2020, somando 3.169 casos nos 3 anos. Já nos anos subsequentes, 0,42% dos casos, um total de 2.143 casos de dengue do tipo 1. O ano com maior número de sorologias notificadas foi o de 2018, porém apenas 1,94% de sua totalidade foi testada. Quanto ao desfecho de casos, nos 5 anos analisados, em 74,42% não ocorreram hospitalizações, sendo o ano de 2019 o com maior número de internações, com 11.088 (2,5%) dos casos. Quanto à cura, foram 1.037.272 casos no período, e o ano com menor taxa de cura foi o de 2018, 13.867 (75,85% dos casos).			
<b>CONCLUSOES</b>	Observou-se um aumento nas notificações de casos de dengue no estado de São Paulo, mesmo tendo os sorotipos subnotificados; foi observado um maior número de casos do sorotipo 2. Quanto as hospitalizações, observou-se que no ano de 2019 foi apresentado um maior número internações			
<b>REFERENCIAS</b>	Braga C, Martelli CMT, Souza WV, Luna CF, Albuquerque MFPM, Mariz CA, Morais CNL, Brito CAA, Melo CFCA, Lins RD, Drexler JF, Jaenisch T, Marques ETA, Viana IFT. Seroprevalence of Dengue, Chikungunya and Zika at the epicenter of the congenital microcephaly epidemic in Northeast Brazil: A population-based survey. PLoS Negl Trop Dis. 2023 Jul 3;17(7):e0011270. 2. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 2022. Plano de contingência para respostas em emergências em saúde pública. 3. Burattini MN, Lopez LF, Coutinho FA, Siqueira JB Jr, Homsani S, Sarti E, Massad E. Age and regional differences in clinical presentation and risk of hospitalization for dengue in Brazil, 2000-2014. Clinics (Sao Paulo). 2016 Aug;71(8):455-63.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14709	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4834933 - GUILHERME HENRIQUE BANDINI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Yuri Sugishita Kanikadan	Debora Driemeyer Wilbert	
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico dos óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio no Município de São Paulo entre os anos de 2020 a 2022			
<b>INTRODUCAO</b>	O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a principal causa, isolada, de óbito no Brasil. A estimativa é de 300 a 400 mil casos de infarto por ano, com mortalidade entre 1 a cada 5 ou 7 casos. As maiores incidências de IAM concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, onde também encontram-se números importantes de casos de sobrepeso e obesidade, associados a hábitos alimentares inadequados.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os óbitos e taxa de mortalidade por IAM no município de São Paulo durante o período de 2020 a 2022.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, com coleta de dados secundários do banco de dados do SIM/DATASUS. Foram relacionadas a frequência de óbitos por IAM por sexo, idade e cor, entre os anos de 2020 a 2022. Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva com foco na incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados coletados apontam um total de 18.269 óbitos por IAM, no município de São Paulo, durante os anos de 2020 a 2022. Dentre esse total, observaram-se, respectivamente, na cor branca, 11.839 óbitos e mortalidade 1,7%; na preta, 1446 e 2%; na parda, 4300 e 1,2%; e em indígenas, 9 e 0,7%. Em relação ao sexo, observa-se maior incidência de óbitos entre os homens, de 10.302 óbitos, com 0,89% de mortalidade, enquanto que entre as mulheres, os números mostram 7.966 óbitos, com mortalidade de 0,69%. Por fim, entre as faixas etárias, os pacientes com idade igual ou superior a 75 anos obtiveram os maiores índices, sendo 7.580 óbitos, sinalizado uma mortalidade de 0,66%.			
<b>CONCLUSOES</b>	A variável que apresentou um grande índice de óbitos foi a cor, representada pela branca, com mais da metade de óbitos, e a maior mortalidade, a preta, durante os anos de 2020 a 2022. Já em relação ao sexo, o masculino apontou maior óbito e mortalidade, e em relação à faixa etária, idade igual ou superior a 75 anos evidenciou maior mortalidade e óbitos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Bett M, Zardo J, Utiamada J, Reckziegel J, Santos V. Infarto agudo do miocárdio: Do diagnóstico à intervenção. Research, Society and Development. 2022 Feb 20;v. 11, n. 3. 2. Malta Deborah Carvalho, Szwarcwald Célia Landmann, Barros Marilisa Bertil de Azevedo, Gomes Crizian Saar, Machado Isis Eloah, Souza Júnior Paulo Roberto Borges de et al . A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiol. Serv. Saúde [Internet]. 2020; 29(4): e2020407. 3. Brant LCC, Passaglia LG. Alta Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na América Latina e Caribe: Defendendo a Implementação de Linha de Cuidado no Brasil. Arq. Bras. Cardiol. 2022;119(6):979-80.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14709	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4835484 - ADRIANO VITA GREGORINI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Yuri Sugishita Kanikadan	Debora Driemeyer Wilbert	
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico dos óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio no Município de São Paulo entre os anos de 2020 a 2022			
<b>INTRODUCA O</b>	O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a principal causa, isolada, de óbito no Brasil. A estimativa é de 300 a 400 mil casos de infarto por ano, com mortalidade entre 1 a cada 5 ou 7 casos. As maiores incidências de IAM concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, onde também encontram-se números importantes de casos de sobrepeso e obesidade, associados a hábitos alimentares inadequados.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os óbitos e taxa de mortalidade por IAM no município de São Paulo durante o período de 2020 a 2022.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, com coleta de dados secundários do banco de dados do SIM/DATASUS. Foram relacionadas a frequência de óbitos por IAM por sexo, idade e cor, entre os anos de 2020 a 2022. Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva com foco na incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADO S</b>	Os dados coletados apontam um total de 18.269 óbitos por IAM, no município de São Paulo, durante os anos de 2020 a 2022. Dentre esse total, observaram-se, respectivamente, na cor branca, 11.839 óbitos e mortalidade 1,7%; na preta, 1446 e 2%; na parda, 4300 e 1,2%; e em indígenas, 9 e 0,7%. Em relação ao sexo, observa-se maior incidência de óbitos entre os homens, de 10.302 óbitos, com 0,89% de mortalidade, enquanto que entre as mulheres, os números mostram 7.967 óbitos, com mortalidade de 0,69%. Por fim, entre as faixas etárias, os pacientes com idade igual ou superior a 75 anos obtiveram os maiores índices, sendo 7.580 óbitos, sinalizando uma mortalidade de 0,66%.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A variável que apresentou um grande índice de óbitos foi a cor, representada pela branca, com mais da metade de óbitos, e a maior mortalidade, a preta, durante os anos de 2020 a 2022. Já em relação ao sexo, o masculino apontou maior óbito e mortalidade, e em relação à faixa etária, idade igual ou superior a 75 anos evidenciou maior mortalidade e óbitos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Bett M, Zardo J, Utiamada J, Reckziegel J, Santos V. Infarto agudo do miocárdio: Do diagnóstico à intervenção. Research, Society and Development. 2022 Feb 20;v. 11, n. 3. 2. Malta Deborah Carvalho, Szwarcwald Célia Landmann, Barros Marilisa Bertil de Azevedo, Gomes Crizian Saar, Machado Isis Eloah, Souza Júnior Paulo Roberto Borges de et al . A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiol. Serv. Saúde [Internet]. 2020; 29(4): e2020407. 3. Brant LCC, Passaglia LG. Alta Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na América Latina e Caribe: Defendendo a Implementação de Linha de Cuidado no Brasil. Arq. Bras. Cardiol. 2022;119(6):979-80.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14709	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4835531 - ARTHUR ANTUNES SCANAVINI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Yuri Sugishita Kanikadan	Debora Driemeyer Wilbert	
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico dos óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio no Município de São Paulo entre os anos de 2020 a 2022			
<b>INTRODUCAO</b>	O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a principal causa, isolada, de óbito no Brasil. A estimativa é de 300 a 400 mil casos de infarto por ano, com mortalidade entre 1 a cada 5 ou 7 casos. As maiores incidências de IAM concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, onde também encontram-se números importantes de casos de sobrepeso e obesidade, associados a hábitos alimentares inadequados.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os óbitos e taxa de mortalidade por IAM no município de São Paulo durante o período de 2020 a 2022.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, com coleta de dados secundários do banco de dados do SIM/DATASUS. Foram relacionadas a frequência de óbitos por IAM por sexo, idade e cor, entre os anos de 2020 a 2022. Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva com foco na incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados coletados apontam um total de 18.269 óbitos por IAM, no município de São Paulo, durante os anos de 2020 a 2022. Dentre esse total, observaram-se, respectivamente, na cor branca, 11.839 óbitos e mortalidade 1,7%; na preta, 1446 e 2%; na parda, 4300 e 1,2%; e em indígenas, 9 e 0,7%. Em relação ao sexo, observa-se maior incidência de óbitos entre os homens, de 10.302 óbitos, com 0,89% de mortalidade, enquanto que entre as mulheres, os números mostram 7.966 óbitos, com mortalidade de 0,69%. Por fim, entre as faixas etárias, os pacientes com idade igual ou superior a 75 anos obtiveram os maiores índices, sendo 7.580 óbitos, sinalizado uma mortalidade de 0,66%.			
<b>CONCLUSOES</b>	A variável que apresentou um grande índice de óbitos foi a cor, representada pela branca, com mais da metade de óbitos, e a maior mortalidade, a preta, durante os anos de 2020 a 2022. Já em relação ao sexo, o masculino apontou maior óbito e mortalidade, e em relação à faixa etária, idade igual ou superior a 75 anos evidenciou maior mortalidade e óbitos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Bett M, Zardo J, Utiamada J, Reckziegel J, Santos V. Infarto agudo do miocárdio: Do diagnóstico à intervenção. Research, Society and Development. 2022 Feb 20;v. 11, n. 3. 2. Malta Deborah Carvalho, Szwarcwald Célia Landmann, Barros Marilisa Bertil de Azevedo, Gomes Crizian Saar, Machado Isis Eloah, Souza Júnior Paulo Roberto Borges de et al . A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiol. Serv. Saúde [Internet]. 2020; 29(4): e2020407. 3. Brant LCC, Passaglia LG. Alta Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na América Latina e Caribe: Defendendo a Implementação de Linha de Cuidado no Brasil. Arq. Bras. Cardiol. 2022;119(6):979-80.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14709	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		4838521 - JOÃO VITOR GARDELLI TRINDADE		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Paula Yuri Sugishita Kanikadan	Debora Driemeyer Wilbert	
TITULO	Perfil epidemiológico dos óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio no Município de São Paulo entre os anos de 2020 a 2022			
INTRODUCA O	O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a principal causa, isolada, de óbito no Brasil. A estimativa é de 300 a 400 mil casos de infarto por ano, com mortalidade entre 1 a cada 5 ou 7 casos. As maiores incidências de IAM concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, onde também encontram-se números importantes de casos de sobrepeso e obesidade, associados a hábitos alimentares inadequados.			
OBJETIVOS	Analisar os óbitos e taxa de mortalidade por IAM no município de São Paulo durante o período de 2020 a 2022.			
METODOLOGIA	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, com coleta de dados secundários do banco de dados do SIM/DATASUS. Foram relacionadas a frequência de óbitos por IAM por sexo, idade e cor, entre os anos de 2020 a 2022. Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva com foco na incidência e mortalidade.			
RESULTADO S	Os dados coletados apontam um total de 18.269 óbitos por IAM, no município de São Paulo, durante os anos de 2020 a 2022. Dentre esse total, observaram-se, respectivamente, na cor branca, 11.839 óbitos e mortalidade 1,7%; na preta, 1446 e 2%; na parda, 4300 e 1,2%; e em indígenas, 9 e 0,7%. Em relação ao sexo, observa-se maior incidência de óbitos entre os homens, de 10.302 óbitos, com 0,89% de mortalidade, enquanto que entre as mulheres, os números mostram 7.966 óbitos, com mortalidade de 0,69%. Por fim, entre as faixas etárias, os pacientes com idade igual ou superior a 75 anos obtiveram os maiores índices, sendo 7.580 óbitos, sinalizado uma mortalidade de 0,66%.			
CONCLUSOE S	A variável que apresentou um grande índice de óbitos foi a cor, representada pela branca, com mais da metade de óbitos, e a maior mortalidade, a preta, durante os anos de 2020 a 2022. Já em relação ao sexo, o masculino apontou maior óbito e mortalidade, e em relação à faixa etária, idade igual ou superior a 75 anos evidenciou maior mortalidade e óbitos.			
REFERENCIA S	1. Bett M, Zardo J, Utiamada J, Reckziegel J, Santos V. Infarto agudo do miocárdio: Do diagnóstico à intervenção. Research, Society and Development. 2022 Feb 20;v. 11, n. 3. 2. Malta Deborah Carvalho, Szwarcwald Célia Landmann, Barros Marilisa Bertil de Azevedo, Gomes Crizian Saar, Machado Isis Eloah, Souza Júnior Paulo Roberto Borges de et al . A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiol. Serv. Saúde [Internet]. 2020; 29(4): e2020407. 3. Brant LCC, Passaglia LG. Alta Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na América Latina e Caribe: Defendendo a Implementação de Linha de Cuidado no Brasil. Arq. Bras. Cardiol. 2022;119(6):979-80.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14709	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4999223 - MARIANA DE MOURA GARCIA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Paula Yuri Sugishita Kanikadan	Debora Driemeyer Wilbert	
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico dos óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio no Município de São Paulo entre os anos de 2020 a 2022			
<b>INTRODUCAO</b>	O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a principal causa, isolada, de óbito no Brasil. A estimativa é de 300 a 400 mil casos de infarto por ano, com mortalidade entre 1 a cada 5 ou 7 casos. As maiores incidências de IAM concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, onde também encontram-se números importantes de casos de sobrepeso e obesidade, associados a hábitos alimentares inadequados.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os óbitos e taxa de mortalidade por IAM no município de São Paulo durante o período de 2020 a 2022.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, com coleta de dados secundários do banco de dados do SIM/DATASUS. Foram relacionadas a frequência de óbitos por IAM por sexo, idade e cor, entre os anos de 2020 a 2022. Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva com foco na incidência e mortalidade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados coletados apontam um total de 18.269 óbitos por IAM, no município de São Paulo, durante os anos de 2020 a 2022. Dentre esse total, observaram-se, respectivamente, na cor branca, 11.839 óbitos e mortalidade 1,7%; na preta, 1446 e 2%; na parda, 4300 e 1,2%; e em indígenas, 9 e 0,7%. Em relação ao sexo, observa-se maior incidência de óbitos entre os homens, de 10.302 óbitos, com 0,89% de mortalidade, enquanto que entre as mulheres, os números mostram 7.966 óbitos, com mortalidade de 0,69%. Por fim, entre as faixas etárias, os pacientes com idade igual ou superior a 75 anos obtiveram os maiores índices, sendo 7.580 óbitos, sinalizado uma mortalidade de 0,66%.			
<b>CONCLUSOES</b>	A variável que apresentou um grande índice de óbitos foi a cor, representada pela branca, com mais da metade de óbitos, e a maior mortalidade, a preta, durante os anos de 2020 a 2022. Já em relação ao sexo, o masculino apontou maior óbito e mortalidade, e em relação à faixa etária, idade igual ou superior a 75 anos evidenciou maior mortalidade e óbitos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Bett M, Zardo J, Utiamada J, Reckziegel J, Santos V. Infarto agudo do miocárdio: Do diagnóstico à intervenção. Research, Society and Development. 2022 Feb 20;v. 11, n. 3. 2. Malta Deborah Carvalho, Szwarcwald Célia Landmann, Barros Marilisa Bertil de Azevedo, Gomes Crizian Saar, Machado Isis Eloah, Souza Júnior Paulo Roberto Borges de et al . A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiol. Serv. Saúde [Internet]. 2020; 29(4): e2020407. 3. Brant LCC, Passaglia LG. Alta Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na América Latina e Caribe: Defendendo a Implementação de Linha de Cuidado no Brasil. Arq. Bras. Cardiol. 2022;119(6):979-80.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14711	Saúde Publica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3521575 - RENATO JIMENEZ GOMEZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Lacerda Bachi	Luiz Henrique da Silva Nali	
<b>TITULO</b>	INVESTIGAÇÃO SOBRE O IMPACTO DA INTERRUPÇÃO ABRUPTA E RETORNO DA PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM IDOSOS NA ERA COVID-19			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O envelhecimento é um processo natural, complexo e multifatorial sujeito a alterações físicas e metabólicas através da senescência biológica e dos hábitos de vida. O isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19 levou à interrupção da prática regular de exercícios físicos, sendo o seu retorno de forma gradativa em 2022. E embora a adoção de um estilo de vida mais ativo seja essencial para um menor nível de fragilidade e na garantia de autonomia na população idosa, os efeitos da interrupção e do retorno da prática regular de exercícios físicos em idosos previamente exercitados ainda não está completamente elucidado</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar as repercussões da interrupção abrupta e da retomada da prática regular de exercícios físicos em idosos previamente exercitados antes da pandemia.			
<b>METODOLOGIA</b>	Avaliação da capacidade física através dos testes de velocidade de marcha (VM), Time Up Go Test (TUGT) e Handgrip (HG) de 36 voluntários idosos (idade média 64,36±19,43 anos), de ambos os sexos, participantes de um programa de exercício físico ((#62)5 anos) em três momentos: antes da pandemia (fevereiro de 2020, PRE); um ano após o isolamento social (fevereiro 2021, PAN) e após 10 meses do retorno da prática regular de exercícios físicos (dezembro 2022, RPE).			
<b>RESULTADOS</b>	Somente o grupo de idosas (n=26) apresentou alterações significativas com significativa diminuição no valor do teste VM no período RPE (3.15 m/s) comparado ao período PAN (4.17 m/s); maior tempo para realização do TUGT nos períodos PAN (7.59 s) e RPE (7.51 s) do que no período PRE (6.94 s); e menor força no teste de HG no período RPE (20.1 kgf) do que no período PRE (23.3 kgf). Apesar do TUGT ser útil para avaliar a performance física e de que os níveis encontrados no estudo terem aumentado durante os tempos de avaliação pós-pandemia, estes não se encontram nos parâmetros de indicação para o risco de quedas e para sarcopenia ((#62)12,4s e (#38)#8805; 20s, respectivamente). Além disso, a melhora do desempenho da VM no momento RPE em relação ao momento PAN reforça os benefícios da prática regular de exercício físico para a população idosa. Já, segundo a literatura, a avaliação da força de preensão palmar através do HG permite uma ampla análise desse parâmetro, pois mostra íntima correspondência a outros compartimentos do corpo, tais como dos membros inferiores, e, por isso, serve como um substituto confiável na realidade clínica em geriatria. Apesar dos resultados encontrados estarem acima daqueles determinados para diagnóstico de sarcopenia ((#60)16 kgf), menores níveis de HG estão associados a prognósticos de menor qualidade de vida, incapacidade e mortalidade.			
<b>CONCLUSOES</b>	O tempo de retorno da prática de exercícios físicos não representou na melhora ou estabilização de todos os parâmetros de performance física aqui avaliados, quando comparado com os valores encontrados antes e/ou durante a pandemia, mesmo em idosos com elevado tempo prévio de condicionamento físico.			
<b>REFERENCIAS</b>	2. Hägg S, Jylhävä J. Sex differences in biological aging with a focus on human studies. <i>Elife</i> . 2021 May 1;10.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Typo	Modalidade
2023	14714	Clínica e Cirurgia Animal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3843718 - JENNIFER INHUMA PEREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Uemura da Fonseca	VINICIUS MIRANDA VILLAS BÓAS, FLAVIO CUNHA	
<b>TITULO</b>	Levantamento da casuística de cardiopatias em felinos domésticos atendidos entre os anos de 2019 e 2023			
<b>INTRODUCAO</b>	As cardiomiopatias são anomalias que afetam a musculatura cardíaca e ocorrem de forma primária no coração ou de forma secundária a alguma alteração sistêmica, como a hipertensão arterial sistêmica, hipertireoidismo ou deficiência de taurina. O consenso de 2020 sobre cardiomiopatias em felinos descreveu as apresentações clássicas como fenótipos, sendo elas a cardiomiopatia hipertrófica caracterizada pelo espessamento das paredes do ventrículo esquerdo e redução de sua cavidade, a cardiomiopatia restritiva que se caracteriza pela rigidez miocárdica com disfunção diastólica grave e aumento do átrio esquerdo, e a cardiomiopatia dilatada definida pela degeneração do miocárdio e dilatação das câmaras cardíaca com redução da contratilidade. A apresentação de várias características de um ou mais fenótipos é descrito como cardiomiopatia de fenótipo não específico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Levantamento da casuística de felinos cardiopatas atendidos no HOVET/UNISA e Hospital Veterinário Animal Care Ipiranga entre os anos de 2019 e 2023, o protocolo empregado e o desfecho dos casos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram levantados prontuários e exames ecocardiográficos de pacientes felinos atendidos com algum fenótipo de cardiomiopatias entre os anos de 2019 a 2022 no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA) e entre 2019 a 2023 no Hospital Veterinário Animal Care Ipiranga através de pastas de armazenamento e sistema informatizado na plataforma Vertis. Na sequência foi realizada a análise comparativa dos dados verificando se o tratamento foi empregado conforme o sugerido pelo consenso de 2020 sobre manejo de felinos cardiopatas e o desfecho dos casos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram levantados 166 laudos de ecocardiograma de felinos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA) (n=80/166) e Hospital Animal Care Ipiranga (n=86/166), sendo 9,63% (n=16/166) diagnosticados com algum fenótipo de cardiomiopatia. Dos pacientes diagnosticados 68,75% (n=11/16) eram machos e 31,25% (n=5/16) eram fêmeas. A cardiomiopatia hipertrófica representou 50% (n=8/16) dos casos diagnosticados, portanto a maioria, corroborando com o descrito por Fuentes et al. (2020). A cardiomiopatia de fenótipo não específico correspondeu a 31,25% (n=5/16) dos casos, enquanto a cardiomiopatia restritiva foi identificada em 18,75% (n=3/16) dos pacientes. Com base neste levantamento a cardiomiopatia dilatada não foi identificada. 93,75% (n=15/16) dos pacientes eram sem raça definida, e apenas 6,25% (n=1/16) correspondeu à raça Persa. Dentre estes felinos a média de idade foi de 7 anos e 7 meses, sendo que o mais jovem tinha 1 ano de idade e o mais velho 16 anos. O tratamento e o prognóstico foram empregados com base na apresentação clínica dos pacientes, no estágio de evolução da doença e no risco de desenvolvimento de quadros de insuficiência cardíaca congestiva ou tromboembolismo arterial.			
<b>CONCLUSOES</b>	De acordo com o levantamento a cardiomiopatia de fenótipo hipertrófico corresponde a maioria dos casos diagnosticados, seguido da cardiomiopatia de fenótipo não específico e fenótipo restritivo, respectivamente. Conforme evidenciado no consenso, o ecocardiograma foi considerado de eleição para o diagnóstico. O tratamento e o prognóstico foram propostos de maneira individualizada considerando a clínica dos pacientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. FUENTES, Virginia Luis et al. ACVIM consensus statement guidelines for the classification, diagnosis, and management of cardiomyopathies in cats. Journal of Veterinary Internal Medicine. p. 1062-1077. 2020. Disponível em: <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.15745">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.15745</a> . Acesso em: 28 ago. 2023. 2. LARSSON, Maria Helena Matiko Akao. Tratado de Cardiologia de Cães e Gatos. 1 ed. Interbook. 2020. 3. BARROSO, Carolina Deuttner Neumann et al. Sobrevida e características ecocardiográficas de gatos com e sem cardiomiopatias. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v. 27, n. 4, 2020. Disponível em: <a href="https://periodicos.ufr.br/tbvcv/article/view/45732/28623">https://periodicos.ufr.br/tbvcv/article/view/45732/28623</a> . Acesso em: 13 jul. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14716	Imunologia Celular	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4737741 - GUILHERME FARIAS APOLONIO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Lacerda Bachi	Luiz Henrique da Silva Nali	
<b>TITULO</b>	A vacinação para COVID-19 aumenta a proteção imunológica nas vias aéreas superiores de idosos e jovens-adultos			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>É sabido que a infecção pelo SARS-CoV-2, vírus causador da doença do coronavírus-19 (COVID-19), se inicia no trato respiratório superior e que, já neste local, pode causar significativas reações e respostas frente aos mecanismos de defesa existentes nesta área. Outra informação amplamente aceita na patogênese da COVID-19 é que a idade avançada é um dos fatores de risco para esta doença, particularmente devido a ocorrência de um fenômeno conhecido como imunossenescência. Além disso, embora informações importantes sobre a vacinação contra COVID-19 estejam disponíveis, o efeito das vacinas na imunidade da mucosa das vias aéreas superiores da população idosa não é totalmente compreendido.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar o efeito da vacinação para COVID-19 na resposta imune das vias aéreas superiores de idosos, inclusive comparando com um grupo de indivíduos jovens-adultos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram deste estudo, por adesão voluntária, 30 indivíduos idosos e 10 jovens-adultos, de ambos os sexos, que foram vacinados com a 4ª. dose para a COVID-19. De acordo com a disponibilidade da vacina, o grupo de idosos foi separado em três grupos: Pfizer (n=10), ChadOx-1 (n=10) e Jansen (n=10). Já todos os voluntários do grupo jovem-adulto (n=10) receberam a vacina da Pfizer. Amostras de saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da 4ª. dose da vacina para COVID-19. A concentração salivar dos anticorpos IgA e IgG específicos para antígenos do SARS-CoV-2 foi determinada através da técnica de ELISA "in-house", adaptando o protocolo descrito por Bachi et al. 2013.			
<b>RESULTADO S</b>	Quando avaliados em conjunto, tanto o grupo de idosos e de jovens-adultos mostraram maior concentração salivar de IgA e/ou IgG pós-vacinação do que no momento pré-vacinação. Além disso, os valores encontrados no grupo jovem-adulto também foram maiores do que os valores evidenciados no grupo idoso tanto pré (IgA) como pós-vacinação (IgA e IgG). Já, quando o grupo de idosos foi separado pelo tipo de vacina recebida, houve significativo aumento de IgA salivar nos grupos que receberam a vacina Pfizer e Jansen e de IgG somente no grupo que recebeu a vacina Pfizer. Em geral, estes achados corroboram a literatura, pois a menor concentração salivar associada a menor resposta à vacinação observada nos idosos pode ser devido a ocorrência da imunossenescência.			
<b>CONCLUSOES</b>	A vacinação para COVID-19 foi efetiva em induzir significativo aumento dos níveis salivares de IgA e/ou IgG tanto na população idosa quanto jovem-adulta, o que favorece a proteção da mucosa das vias aéreas contra COVID-19, mesmo que, no geral, os idosos tenham mostrado menor resposta do que dos jovens-adultos.			
<b>REFERENCIAS</b>	1.Pawelec G. Age and immunity: What is "immunosenescence"? Exp Gerontol. 2018;105:4-9. 2.Salian VS, Wright JA, Vedell PT, Nair S, Li C, Kandimalla M, et al. COVID-19 Transmission, Current Treatment, and Future Therapeutic Strategies. Mol Pharm. 2021;18(3):754-71.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14717	Educação Física	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		843610 - THAIS REIMBERG DE SOUZA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosemeire de Oliveira	Marco Antonio Amadeu	
<b>TITULO</b>	QUEM É A COMUNIDADE QUE PARTICIPA DO PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS EXTENSIVAS À COMUNIDADE – PAEC			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são um grande problema de saúde pública mundial. Importamente, essas doenças causam cerca de 71% das mortes de pessoas entre 30 e 69 anos em todo o mundo. Neste cenário, programas para reduzir os fatores de risco para doenças crônicas, tais como programas de exercícios físicos, tornam-se fundamentais para mitigar os efeitos adversos das DCNTs. O Programa de Atividades Esportivas Extensivas à Comunidade, doravante PAEC, consiste em um programa de extensão do curso de educação física da UNISA cujo seu objetivo é fomentar a prática do exercício/atividade física de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, promover qualidade de vida e saúde dentro da Universidade Santo Amaro e estimular a autonomia e o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Este programa atende um importante número de aluno e, portanto, é fundamental entender nossa comunidade para que possamos melhorar nosso atendimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é descrever as características físicas, sociodemográficas e as principais comorbidades dos alunos ingressantes no PAEC entre 14 de outubro de 2022 e 18 de outubro de 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo transversal descritivo dos participantes do PAEC. Em suma, os alunos se inscrevem na central de agendamentos da UNISA e aguardam ser chamados de acordo com a disponibilidade de vagas na modalidade em que o aluno busca a vaga. Após serem chamados, os participantes são submetidos a uma entrevista semiestruturada e uma bateria de testes físicos. Neste estudo serão apresentados as características físicas, sociodemográficas, as principais comorbidades e a atividade esportiva escolhida.			
<b>RESULTADOS</b>	Entre 14 de outubro de 2022 e 18 de outubro de 2023 foram avaliados 686 indivíduos, sendo que 578 indivíduos eram alunos ingressantes no programa. Dos alunos ingressantes, 545 se identificavam sendo do sexo feminino, 429 da raça branca e com idade média de 53 ± 17. Com relação a renda, 45% da amostra relatou uma renda per capita de até R\$1.320,00. As comorbidades mais prevalentes foram ansiedade (49%), hipertensão artéria (44%), dislipidemia (27%) e diabetes do tipo 2 (21%). A atividade mais escolhida foi ginastica multifuncional (53%), seguido por natação e musculação (ambos 22%).			
<b>CONCLUSOES</b>	A análise descritiva dos participantes do PAEC indica elevada prevalência de indivíduos na meia idade ((#62)45 anos) com baixa renda ((#60)R\$1.320,00). A elevada prevalência de comorbidades cardiometabólicas também se mostrou um fator importante, mas, que de maneira importante, podem ser mitigadas com a participação na atividade esportiva escolhida para praticar no programa.			
<b>REFERENCIAS</b>	Lee IM et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012;380(9838):219-29. Ding D et al. The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. Lancet. 2016;388(10051):1311-24.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14721	Imunologia Celular	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4894073 - ANGELICA RODRIGUES BOTELHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Lacerda Bachi	Luiz Henrique da Silva Nali	
<b>TITULO</b>	INDIVÍDUOS JOVENS-ADULTOS E IDOSOS SOROPOSITIVOS PARA CITOMEGALOVÍRUS MOSTRAM DIFERENTE RESPOSTA DE ANTICORPOS A VACINAÇÃO PARA GRIPE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>É sabido que a população idosa se apresenta não apenas como a população mais afetada, mas também que esta contabiliza o maior número de mortes pela gripe. Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade pelo vírus Influenza, agente causador da gripe, em idosos, está associada tanto à ocorrência da imunossenescência quanto do fenômeno "inflammaging". Neste sentido, tem sido proposto que a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento da imunossenescência, pelo fato deste poder ser um importante fator desencadeante do "inflammaging". Vale destacar que a imunossenescência e o "inflammaging" impactam de forma negativa nas respostas vacinais dos idosos. Outros estudos mostram que a presença do CMV pode potencializar a resposta imune em pessoas jovens-adultas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar o impacto da soropositividade para CMV sobre as respostas de anticorpos em jovens-adultos e idosos vacinados para a gripe.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para isso, foram convidados a participar deste estudo 109 pessoas soropositivas para CMV, tanto jovens-adultos (GJA, n=42, média de idade 31,13±9,33 anos), quanto idosos (GI, n=67, média de idade 71,22±11,11 anos), saudáveis, de ambos os sexos, todos imunizados com a mesma vacina contra a gripe. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a vacinação e foram utilizadas para confirmação da soropositividade para CMV, além da avaliação das concentrações sistêmicas de IgA, IgM e IgG específicas para antígenos da vacina contra a gripe.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Na avaliação intragrupo, enquanto o GJA mostrou aumento significativo de IgA e IgG, o GI apresentou maiores níveis de IgM e IgA, bem como de IgG para CMV, no momento pós-vacinação quando comparado ao momento pré-vacinação. Na avaliação intergrupos, o GJA mostrou maior nível de IgM no momento pré-vacinação do que no GI. Já, no momento pós-vacinação, enquanto o GI mostrou maiores níveis de IgM do que no GJA, os níveis de IgG no GJA foram maiores do que no GI. Interessantemente, não somente os níveis de IgA, mas também de IgG para CMV, observados no GI foram maiores do que no GJA, tanto pré- quanto pós-vacinação. Os dados obtidos neste estudo reforçam a literatura não somente ao mostrar diferenças na resposta de anticorpos à vacinação entre indivíduos jovens-adultos e idosos, mas também ao evidenciar que a soropositividade para o CMV pode influenciar neste contexto, em especial em idosos.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Embora a soropositividade para CMV não ter apresentado relação direta na resposta de anticorpos a vacina para gripe tanto para GJA quanto GI, a diferença dos níveis de IgG para CMV entre os grupos mostra que a presença crônica do CMV pode estar associada a imunossenescência e isso pode ter impactado na distinta resposta de anticorpos a vacina observada no estudo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Pawelec G, Derhovanessian E, Larbi A, Strindhall J, Wikby A. Cytomegalovirus and human immunosenescence. Rev Med Virol. 2009;19(1):47-56.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14722	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4325265 - LUMY ESCAMES DA MACENA FIUZA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A PANDEMIA POR COVID 19 E O AUMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DA SAÚDE			
<b>INTRODUCAO</b>	A síndrome de Burnout, transtorno psíquico associado a sobrecarga de trabalho teve um crescimento acentuado no advento da pandemia por COVID 19. Houve expressiva sobrecarga de atividades em diversos setores, em especial, nos serviços sanitários, uma vez que os trabalhadores estavam na linha de frente da assistência à saúde. Além dos desafios costumeiros, enfrentados pelos profissionais, tais como as longas jornadas de trabalho, o estresse recorrente, a alta transmissão e letalidade do vírus, os óbitos elevados no âmbito hospitalar e afetivo, a indisponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI), a condição de trabalho no contexto da pandemia, elevou ainda mais o esgotamento físico e mental dos trabalhadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	Examinar o investimento das empresas modernas em gestão de pessoas, com vistas a diminuir o absenteísmo e rotatividade; Verificar se na pandemia por COVID 19 ocorreu um aumento da Síndrome de Burnout entre os trabalhadores da saúde; Levantar as empresas que mais investem em Gestão Humanizada, na saúde ocupacional dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo cinco (5 anos). O material coletado, tratará dados atuais sobre absenteísmo, licença médica por questões de saúde mental e os investimentos das empresas em gestão humanizada.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado preliminar, verificamos que a considerar o limitado investimento no bem-estar mental dos funcionários da área da saúde, e a emergência no saneamento de demandas apresentadas pela pandemia, tanto de empresas públicas quanto privadas, os colaboradores da área da saúde, passaram por momentos de intenso sofrimento psíquico, sem que houvesse uma rede de apoio, uma gestão humanizada, em um momento impar da saúde pública no Brasil			
<b>CONCLUSOES</b>	Como conclusão preliminar, observa-se avanços significativos foram realizados em relação a Síndrome de Burnout no Brasil, no entanto, no período pós-pandemia (2021 até o presente) há um despreparo para lidar com o esgotamento físico e psíquico dos trabalhadores Nota-se uma emergência por uma gestão humanizada com vistas na melhora da saúde e bem-estar dos funcionários, que tratará como consequência melhores resultados na produção das empresas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BIERNATH, André. 3 ANOS DE PANDEMIA DE COVID-19: O QUE ESPERAR DA DOENÇA DAQUI EM DIANTE NO BRASIL. BBC NEWS Brasil. Londres: 2023. Disponível em: (#60)https://www.bbc.com/portuguese/articles/cql78kyj3k3o(#62). Acesso em 11 set. 2023. CARVALHO, Antônio José de. Síndrome de burnout: uma ameaça invisível no trabalho. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2023. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 set. 2023. PACINI, Stefano; TOBLER, Rodolpho; BITTENCOURT, Viviane Seda. Tendências do home office no Brasil. FGV IBRE. [S.l]: 2023. Disponível em: (#60)https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil(#62). Acesso em 01 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14722	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4346203 - EVELIN ROSA DE ARAUJO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A PANDEMIA POR COVID 19 E O AUMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DA SAÚDE			
<b>INTRODUCAO</b>	A síndrome de Burnout, transtorno psíquico associado a sobrecarga de trabalho teve um crescimento acentuado no advento da pandemia por COVID 19. Houve expressiva sobrecarga de atividades em diversos setores, em especial, nos serviços sanitários, uma vez que os trabalhadores estavam na linha de frente da assistência à saúde. Além dos desafios costumeiros, enfrentados pelos profissionais, tais como as longas jornadas de trabalho, o estresse recorrente, a alta transmissão e letalidade do vírus, os óbitos elevados no âmbito hospitalar e afetivo, a indisponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI), a condição de trabalho no contexto da pandemia, elevou ainda mais o esgotamento físico e mental dos trabalhadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	Examinar o investimento das empresas modernas em gestão de pessoas, com vistas a diminuir o absenteísmo e rotatividade; Verificar se na pandemia por COVID 19 ocorreu um aumento da Síndrome de Burnout entre os trabalhadores da saúde; Levantar as empresas que mais investem em Gestão Humanizada, na saúde ocupacional dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo cinco (5) anos. O material coletado, tratará dados atuais sobre absenteísmo, licença médica por questões de saúde mental e os investimentos das empresas em gestão humanizada.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado preliminar, verificamos que a considerar o limitado investimento no bem-estar mental dos funcionários da área da saúde, e a emergência no saneamento de demandas apresentadas pela pandemia, tanto de empresas públicas quanto privadas, os colaboradores da área da saúde, passaram por momentos de intenso sofrimento psíquico, sem que houvesse uma rede de apoio, uma gestão humanizada, em um momento ímpar da saúde pública no Brasil			
<b>CONCLUSOES</b>	Como conclusão preliminar, observa-se avanços significativos foram realizados em relação a Síndrome de Burnout no Brasil, no entanto, no período pós-pandemia (2021 até o presente) há um despreparo para lidar com o esgotamento físico e psíquico dos trabalhadores Nota-se uma emergência por uma gestão humanizada com vistas na melhora da saúde e bem-estar dos funcionários, que tratará como consequência melhores resultados na produção das empresas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BIERNATH, André. 3 ANOS DE PANDEMIA DE COVID-19: O QUE ESPERAR DA DOENÇA DAQUI EM DIANTE NO BRASIL. BBC NEWS Brasil. Londres: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.bbc.com/portuguese/articles/cql78kyj3k3o(#62)">https://www.bbc.com/portuguese/articles/cql78kyj3k3o(#62)</a> . Acesso em 11 set. 2023. CARVALHO, Antônio José de. Síndrome de burnout: uma ameaça invisível no trabalho. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2023. E-book. Disponível em: <a href="https://plataforma.bvirtual.com.br">https://plataforma.bvirtual.com.br</a> . Acesso em: 20 set. 2023. PACINI, Stefano; TOBLER, Rodolpho; BITTENCOURT, Viviane Seda. Tendências do home office no Brasil. FGV IBRE. [S.l.]: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil(#62)">https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil(#62)</a> . Acesso em 01 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14722	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4363345 - MICHEL SILVA DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A PANDEMIA POR COVID 19 E O AUMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DA SAÚDE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A síndrome de Burnout, transtorno psíquico associado a sobrecarga de trabalho teve um crescimento acentuado no advento da pandemia por COVID 19. Houve expressiva sobrecarga de atividades em diversos setores, em especial, nos serviços sanitários, uma vez que os trabalhadores estavam na linha de frente da assistência à saúde. Além dos desafios costumeiros, enfrentados pelos profissionais, tais como as longas jornadas de trabalho, o estresse recorrente, a alta transmissão e letalidade do vírus, os óbitos elevados no âmbito hospitalar e afetivo, a indisponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI), a condição de trabalho no contexto da pandemia, elevou ainda mais o esgotamento físico e mental dos trabalhadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	Examinar o investimento das empresas modernas em gestão de pessoas, com vistas a diminuir o absenteísmo e rotatividade; Verificar se na pandemia por COVID 19 ocorreu um aumento da Síndrome de Burnout entre os trabalhadores da saúde; Levantar as empresas que mais investem em Gestão Humanizada, na saúde ocupacional dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo cinco (5 anos). O material coletado, tratará dados atuais sobre absenteísmo, licença médica por questões de saúde mental e os investimentos das empresas em gestão humanizada.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado preliminar, verificamos que a considerar o limitado investimento no bem-estar mental dos funcionários da área da saúde, e a emergência no saneamento de demandas apresentadas pela pandemia, tanto de empresas públicas quanto privadas, os colaboradores da área da saúde, passaram por momentos de intenso sofrimento psíquico, sem que houvesse uma rede de apoio, uma gestão humanizada, em um momento impar da saúde pública no Brasil			
<b>CONCLUSÕES</b>	Como conclusão preliminar, observa-se avanços significativos foram realizados em relação a Síndrome de Burnout no Brasil, no entanto, no período pós-pandemia (2021 até o presente) há um despreparo para lidar com o esgotamento físico e psíquico dos trabalhadores Nota-se uma emergência por uma gestão humanizada com vistas na melhora da saúde e bem-estar dos funcionários, que tratará como consequência melhores resultados na produção das empresas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BIERNATH, André. 3 ANOS DE PANDEMIA DE COVID-19: O QUE ESPERAR DA DOENÇA DAQUI EM DIANTE NO BRASIL. BBC NEWS Brasil. Londres: 2023. Disponível em: (#60)https://www.bbc.com/portuguese/articles/cql78kyj3k3o(#62). Acesso em 11 set. 2023. CARVALHO, Antônio José de. Síndrome de burnout: uma ameaça invisível no trabalho. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2023. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 set. 2023. PACINI, Stefano; TOBLER, Rodolpho; BITTENCOURT, Viviane Seda. Tendências do home office no Brasil. FGV IBRE. [S.l]: 2023. Disponível em: (#60)https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil(#62). Acesso em 01 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14722	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4412729 - LILIAN MEDEIROS DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A PANDEMIA POR COVID 19 E O AUMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DA SAÚDE			
<b>INTRODUCAO</b>	A síndrome de Burnout, transtorno psíquico associado a sobrecarga de trabalho teve um crescimento acentuado no advento da pandemia por COVID 19. Houve expressiva sobrecarga de atividades em diversos setores, em especial, nos serviços sanitários, uma vez que os trabalhadores estavam na linha de frente da assistência à saúde. Além dos desafios costumeiros, enfrentados pelos profissionais, tais como as longas jornadas de trabalho, o estresse recorrente, a alta transmissão e letalidade do vírus, os óbitos elevados no âmbito hospitalar e afetivo, a indisponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI), a condição de trabalho no contexto da pandemia, elevou ainda mais o esgotamento físico e mental dos trabalhadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	Examinar o investimento das empresas modernas em gestão de pessoas, com vistas a diminuir o absenteísmo e rotatividade; Verificar se na pandemia por COVID 19 ocorreu um aumento da Síndrome de Burnout entre os trabalhadores da saúde; Levantar as empresas que mais investem em Gestão Humanizada, na saúde ocupacional dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo cinco (5 anos). O material coletado, tratará dados atuais sobre absenteísmo, licença médica por questões de saúde mental e os investimentos das empresas em gestão humanizada.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado preliminar, verificamos que a considerar o limitado investimento no bem-estar mental dos funcionários da área da saúde, e a emergência no saneamento de demandas apresentadas pela pandemia, tanto de empresas públicas quanto privadas, os colaboradores da área da saúde, passaram por momentos de intenso sofrimento psíquico, sem que houvesse uma rede de apoio, uma gestão humanizada, em um momento impar da saúde pública no Brasil			
<b>CONCLUSOES</b>	Como conclusão preliminar, observa-se avanços significativos foram realizados em relação a Síndrome de Burnout no Brasil, no entanto, no período pós-pandemia (2021 até o presente) há um despreparo para lidar com o esgotamento físico e psíquico dos trabalhadores Nota-se uma emergência por uma gestão humanizada com vistas na melhora da saúde e bem-estar dos funcionários, que tratará como consequência melhores resultados na produção das empresas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BIERNATH, André. 3 ANOS DE PANDEMIA DE COVID-19: O QUE ESPERAR DA DOENÇA DAQUI EM DIANTE NO BRASIL. BBC NEWS Brasil. Londres: 2023. Disponível em: (#60)https://www.bbc.com/portuguese/articles/cql78kyj3k3o(#62). Acesso em 11 set. 2023. CARVALHO, Antônio José de. Síndrome de burnout: uma ameaça invisível no trabalho. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2023. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 set. 2023. PACINI, Stefano; TOBLER, Rodolpho; BITTENCOURT, Viviane Seda. Tendências do home office no Brasil. FGV IBRE. [S.l]: 2023. Disponível em: (#60)https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil(#62). Acesso em 01 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14722	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442644 - JULIANA DA COSTA LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A PANDEMIA POR COVID 19 E O AUMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DA SAÚDE			
<b>INTRODUCAO</b>	A síndrome de Burnout, transtorno psíquico associado a sobrecarga de trabalho teve um crescimento acentuado no advento da pandemia por COVID 19. Houve expressiva sobrecarga de atividades em diversos setores, em especial, nos serviços sanitários, uma vez que os trabalhadores estavam na linha de frente da assistência à saúde. Além dos desafios costumeiros, enfrentados pelos profissionais, tais como as longas jornadas de trabalho, o estresse recorrente, a alta transmissão e letalidade do vírus, os óbitos elevados no âmbito hospitalar e afetivo, a indisponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI), a condição de trabalho no contexto da pandemia, elevou ainda mais o esgotamento físico e mental dos trabalhadores.			
<b>OBJETIVOS</b>	Examinar o investimento das empresas modernas em gestão de pessoas, com vistas a diminuir o absenteísmo e rotatividade; Verificar se na pandemia por COVID 19 ocorreu um aumento da Síndrome de Burnout entre os trabalhadores da saúde; Levantar as empresas que mais investem em Gestão Humanizada, na saúde ocupacional dos colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo cinco (5 anos). O material coletado, tratará dados atuais sobre absenteísmo, licença médica por questões de saúde mental e os investimentos das empresas em gestão humanizada.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado preliminar, verificamos que a considerar o limitado investimento no bem-estar mental dos funcionários da área da saúde, e a emergência no saneamento de demandas apresentadas pela pandemia, tanto de empresas públicas quanto privadas, os colaboradores da área da saúde, passaram por momentos de intenso sofrimento psíquico, sem que houvesse uma rede de apoio, uma gestão humanizada, em um momento ímpar da saúde pública no Brasil			
<b>CONCLUSOES</b>	Como conclusão preliminar, observa-se avanços significativos foram realizados em relação a Síndrome de Burnout no Brasil, no entanto, no período pós-pandemia (2021 até o presente) há um despreparo para lidar com o esgotamento físico e psíquico dos trabalhadores Nota-se uma emergência por uma gestão humanizada com vistas na melhora da saúde e bem-estar dos funcionários, que tratará como consequência melhores resultados na produção das empresas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BIERNATH, André. 3 ANOS DE PANDEMIA DE COVID-19: O QUE ESPERAR DA DOENÇA DAQUI EM DIANTE NO BRASIL. BBC NEWS Brasil. Londres: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://www.bbc.com/portuguese/articles/cql78kyj3k3o(#62)">https://www.bbc.com/portuguese/articles/cql78kyj3k3o(#62)</a> . Acesso em 11 set. 2023. CARVALHO, Antônio José de. Síndrome de burnout: uma ameaça invisível no trabalho. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2023. E-book. Disponível em: <a href="https://plataforma.bvirtual.com.br">https://plataforma.bvirtual.com.br</a> . Acesso em: 20 set. 2023. PACINI, Stefano; TOBLER, Rodolpho; BITTENCOURT, Viviane Seda. Tendências do home office no Brasil. FGV IBRE. [S.l.]: 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil(#62)">https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil(#62)</a> . Acesso em 01 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14723	Enfermagem Pediátrica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517504 - VICTOR CARLOS ALVES PEREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Maria de Freitas Floriano		
<b>TITULO</b>	Sucesso da punção intravenosa periférica de crianças com anemia falciforme			
<b>INTRODUCAO</b>	A punção intravenosa periférica em crianças com doenças crônicas como a anemia falciforme pode ocasionar dor, desconforto e ansiedade. Por esta razão, conhecer o índice de sucesso na primeira tentativa do procedimento e os fatores que estão relacionados ao seu insucesso é fundamental para o planejamento adequado da assistência de enfermagem <sup>1-2</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar o índice de sucesso na primeira tentativa da punção intravenosa periférica de crianças com anemia falciforme.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo transversal de análise retrospectiva, realizado com 90 crianças que foram submetidos a punção intravenosa periférica. Estas crianças e adolescentes participaram de um estudo de intervenção, prospectivo e randômico, aprovado segundo Parecer: 2.969.873. A coleta dos dados ocorreu em um hospital escola de São Paulo, nas unidades de Enfermaria de Cirurgia e Pronto-Socorro Pediátricos. O desfecho primário foi índice de sucesso na primeira tentativa da punção. As variáveis clínicas estudadas foram faixa etária, sexo, índice de massa corpórea, pigmentação da pele e fatores de risco para insucesso da punção intravenosa periférica. Foi considerado significância de 5% para os dados analisados.			
<b>RESULTADOS</b>	O índice de sucesso na primeira tentativa da punção intravenosa periférica foi de 65,6% entre as crianças puncionadas com anemia falciforme, índice semelhante ao encontrado na literatura <sup>3</sup> . O insucesso do procedimento ocorreu em 43,6% dos adolescentes, do sexo feminino (35,2%), com magreza (50,0%), com a pele mais pigmentada (36,6%). Em relação aos fatores de risco verificou-se que 40% das crianças que nasceram prematuras, 35% que tinham a rede venosa difícil de ser visualizada, 41,5% das que tinham os vasos difíceis de serem palpados, 35,6% das que tinham histórico de múltiplas punções e complicação anterior a terapia intravenosa, não obtiveram o sucesso do procedimento na primeira tentativa de punção, não havendo significância estatística nos resultados.			
<b>CONCLUSOES</b>	O índice de sucesso na primeira tentativa da punção intravenosa periférica nas crianças com anemia falciforme foi 65%, sendo que quase a metade dos pacientes que era adolescentes, magros e que tinham como fatores de risco para insucesso do procedimento nascer prematuro e vasos difíceis de serem palpados obtiveram insucesso no procedimento na primeira tentativa.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Floriano CMF, Avelar AFM, Peterlini MAS. Construção e aplicação de fluxograma decisório para punção intravenosa periférica difícil de crianças. Texto Contexto Enferm. 2023. 32:e20230040. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2023-0040pt">https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2023-0040pt</a> . Acesso: 20 abr. 2023. 2. Gerceker GO, Ayar D, Ozdemir EZ, Bektas M. The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of first-time phlebotomy. J Vasc Access. 2018. 19(6):620-5. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1177/1129729818765598">https://doi.org/10.1177/1129729818765598</a> . Acesso: 01 mai. 2023. 3. Mahon P, Grouchy K, McCartney H, Douglas K, Wu JK. Positive effects of ultrasound-guided peripheral IV insertion on pediatric sickle cell anemia/thalassemia patients receiving automated red cell exchange procedures or chronic transfusion therapy. J Clin Apher. 2020; 1–6. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1002/jca.21856">https://doi.org/10.1002/jca.21856</a> . Acesso: 04 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14724	Enfermagem Pediátrica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4414390 - ANA BEATRIZ ALVES DE SANTANA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Maria de Freitas Floriano		
<b>TITULO</b>	Validação de Material Educativo para Percepção Precoce do Transtorno do Espectro Autista			
<b>INTRODUCAO</b>	O transtorno do espectro autista (TEA), é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento que possui diversos graus de complexidade 1-2. A identificação precoce de crianças com TEA pode ser realizada por meio de sinais no atraso do desenvolvimento infantil pelos pais que foram orientados com material educativo apropriado, favorecendo a instituição precoce do diagnóstico e tratamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Validar o conteúdo de material educativo construído para leigos sobre os principais sinais de atraso no desenvolvimento infantil que podem indicar Transtorno do Espectro Autista.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo metodológico, desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira realizada em 2022, por meio de um estudo de revisão integrativa com o título "Diagnóstico precoce do TEA pelo desenvolvimento Infantil: construção de material educativo", que obteve como resultado 10 artigos, após seleção rigorosa da literatura. A partir da identificação das áreas e marcos do desenvolvimento afetados na literatura, construiu-se material educativo. A segunda etapa, constituiu-se da validação do conteúdo com envio de questionário eletrônico, após aprovação do mérito ético (Parecer: 6.231.106), o qual continha perguntas objetivas e uma escala Likert contendo três proporções, sendo "adequado", pontuado como 3, "parcialmente adequado", pontuado como 2, "inadequado", pontuado como 1, para medir a opinião dos juizes especialistas em crianças com TEA, para avaliação da linguagem, aparência e didática do material desenvolvido. O instrumento continha ainda um campo para sugestão de modificação. Para avaliar a consistência interna de cada área, utilizou-se o coeficiente alfa de Cronbach com valor mínimo de 0,80.			
<b>RESULTADOS</b>	O material educativo foi avaliado por cinco juizes, sendo três especialistas em pacientes com TEA e dois leigos que possuíam contato com crianças com TEA. A média de idade dos juizes foi de 41,6 anos e Tempo de experiência com crianças com TEA de 8,2 anos. Em relação a aparência do material desenvolvido, obteve 1 de coeficiente de alfa de Cronbach, sendo sugerido mudança na cor e inclusão do laço que representa o TEA. A linguagem obteve 0,81 de coeficiente de alfa de Cronbach, com sugestão de adequação dos termos "identificação", "sintomas", "síndrome comportamental" e "possuem". A didática obteve 0,45 de coeficiente de alfa de Cronbach, com solicitação de padronização do termo "autismo" para "TEA" em todo material.			
<b>CONCLUSOES</b>	O material educativo elaborado foi validado em relação a aparência e linguagem, porém necessita de adequações na didática. O mesmo será aprimorado, conforme sugestões dos juizes para nova avaliação. Após validação, o material será divulgado em plataformas que atinjam leigos que necessitem de informações sobre o TEA.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Homercher BM, Peres LS, Arruda LF dos S, Smeha LN. Observação Materna: primeiros sinais do Transtorno do Espectro Autista. Estudos e Pesquisas em Psicologia. 2020; 20:540-58. Disponível em: <a href="http://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v20n2/v20n2a09.pdf">http://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v20n2/v20n2a09.pdf</a> . Acesso em: 21 mar. 2023. 2. Tanner A, Dounavi K. The Emergence of Autism Symptoms Prior to 18 Months of Age: A Systematic Literature Review. J Autism Dev Disord. 2021;973-93. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1007/s10803-020-04618-w">https://doi.org/10.1007/s10803-020-04618-w</a> . Acesso em: 21 mar. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14725	Obstetrícia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	GESTAÇÃO DE RISCO EM CADELA - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A realização do pré-natal é de suma importância para diagnóstico e avaliação do desenvolvimento fetal, além disso, os exames de imagem auxiliam no diagnóstico de patologias da gestação de origem materna e/ou fetal. Anormalidades fetais, como a hidrocefalia, podem predispor a ocorrência de distúrbios obstrutivos, levando em risco o feto e a fêmea. Manobras e tratamentos medicamentosos podem ser substituídos em cadelas com distocias, entretanto, essas nem sempre são corretivas, sendo necessário a realização de cesariana antes do sofrimento fetal ou fadiga da cadela.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste relato é descrever os procedimentos e condutas adotados durante o atendimento de uma cadela apresentando gestação de risco.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma fêmea, canina, da raça Yorkshire, de 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi instituído o tratamento adequado para a úlcera de córnea e foi realizado pré-natal pela ultrassonografia e radiografia abdominal, as quais evidenciaram anormalidades fetais. Após a realização dos exames, foi programada uma cesariana para evitar possível distocia.			
<b>RESULTADOS</b>	No primeiro atendimento, foi analisada a necessidade de realizar intervenção cirúrgica para realização de flap pediculado no olho devido descemetocelose. Entretanto, devido à gestação foi realizada programação clínica-cirúrgica afim de promover viabilidade materna e fetal e evitar complicações oftálmicas. Para a intervenção cirúrgica, foram realizados os seguintes exames complementares: hemograma, ureia, creatinina, ALT, FA, albumina, proteína total e ultrassonografia abdominal. A ultrassom evidenciou cerca de 5 fetos, com 38 dias de gestação, entretanto, em um destes foi visibilizado perda da definição óssea da calota craniana. Após 18 dias da intervenção cirúrgica oftalmológica, foram realizadas radiografia e ultrassonografia abdominal para acompanhamento gestacional. Neste exame, o tempo gestacional foi de 56 dias pela fetometria, além da alteração observada no exame anterior, também foi evidenciado dilatação ventricular em um dos fetos, sugerindo hidrocefalia. Ademais, os fetos restantes não apresentavam alterações patológicas. Na radiografia, foi visualizado um feto sem definição dos ossos cranianos e não foi possível realizar o diâmetro biparietal, pois nenhum dos fetos demonstrou adequado posicionamento para a mensuração nas projeções avaliadas. Dois dias após o último exame, a paciente retornou para reavaliação devido a mudanças comportamentais, por isso foi realizada uma nova ultrassonografia, qual evidenciou diminuição da frequência cardíaca dos fetos em relação ao último exame, além de uma possível herniação de tecido nervoso de um dos fetos. Portanto, foi optado por realizar uma cesariana programada. Durante a intervenção obstétrica foi realizada avaliação e manobras neonatais após o nascimento dos 5 neonatos, entretanto, o neonato que apresentava malformação da calota craniana e herniação do tecido nervoso foi à óbito, sendo enviado para análise necroscópica. Com 19 dias de vida, os neonatos passaram por avaliação, na consulta os neonatos apresentavam-se em bom estado geral, não apresentando alterações até o presente momento.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O acompanhamento gestacional foi de suma importância para o diagnóstico precoce de malformações fetais, auxiliando consequentemente na tomada de decisão da programação da cesariana, diminuindo a possibilidade de complicações à matriz e aos neonatos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. LUZ, M. R.; FREITAS, P. M. C.; PEREIRA, E. V.; Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico de gestação e tratamento das distocias; Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.29, n.3/4, p.142-150, jul./dez. 2005. 2. LEITE, L. G.; ARAÚJO, A. A.; Diagnóstico precoce e acompanhamento gestacional em cadelas por ultra-sonografia; Revista, clínica veterinária, ano 6, n.60, p. 34-40, 2006. 3. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14725	Obstetrícia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2120879 - GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	GESTAÇÃO DE RISCO EM CADELA - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A realização do pré-natal é de suma importância para diagnóstico e avaliação do desenvolvimento fetal, além disso, os exames de imagem auxiliam no diagnóstico de patologias da gestação de origem materna e/ou fetal. Anormalidades fetais, como a hidrocefalia, podem predispor a ocorrência de distúrbios obstrutivos, levando em risco o feto e a fêmea. Manobras e tratamentos medicamentosos podem ser instituídos em cadelas com distocias, entretanto, essas nem sempre são corretivas, sendo necessário a realização de cesariana antes do sofrimento fetal ou fadiga da cadela.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste relato é descrever os procedimentos e condutas adotados durante o atendimento de uma cadela apresentando gestação de risco.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma fêmea, canina, da raça Yorkshire, de 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi instituído o tratamento adequado para a úlcera de córnea e foi realizado pré-natal pela ultrassonografia e radiografia abdominal, as quais evidenciaram anormalidades fetais. Após a realização dos exames, foi programada uma cesariana para evitar possível distocia.			
<b>RESULTADOS</b>	No primeiro atendimento, foi analisada a necessidade de realizar intervenção cirúrgica para realização de flap pediculado no olho devido descemetocelose. Entretanto, devido à gestação foi realizada programação clínica-cirúrgica afim de promover viabilidade materna e fetal e evitar complicações oftálmicas. Para a intervenção cirúrgica, foram realizados os seguintes exames complementares: hemograma, ureia, creatinina, ALT, FA, albumina, proteína total e ultrassonografia abdominal. A ultrassom evidenciou cerca de 5 fetos, com 38 dias de gestação, entretanto, em um destes foi visibilizado perda da definição óssea da calota craniana. Após 18 dias da intervenção cirúrgica oftalmológica, foram realizadas radiografia e ultrassonografia abdominal para acompanhamento gestacional. Neste exame, o tempo gestacional foi de 56 dias pela fetometria, além da alteração observada no exame anterior, também foi evidenciado dilatação ventricular em um dos fetos, sugerindo hidrocefalia. Ademais, os fetos restantes não apresentavam alterações patológicas. Na radiografia, foi visualizado um feto sem definição dos ossos cranianos e não foi possível realizar o diâmetro biparietal, pois nenhum dos fetos demonstrou adequado posicionamento para a mensuração nas projeções avaliadas. Dois dias após o último exame, a paciente retornou para reavaliação devido a mudanças comportamentais, por isso foi realizada uma nova ultrassonografia, qual evidenciou diminuição da frequência cardíaca dos fetos em relação ao último exame, além de uma possível herniação de tecido nervoso de um dos fetos. Portanto, foi optado por realizar uma cesariana programada. Durante a intervenção obstétrica foi realizada avaliação e manobras neonatais após o nascimento dos 5 neonatos, entretanto, o neonato que apresentava malformação da calota craniana e herniação do tecido nervoso foi à óbito, sendo enviado para análise necroscópica. Com 19 dias de vida, os neonatos passaram por avaliação, na consulta os neonatos apresentavam-se em bom estado geral, não apresentando alterações até o presente momento.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O acompanhamento gestacional foi de suma importância para o diagnóstico precoce de malformações fetais, auxiliando consequentemente na tomada de decisão da programação da cesariana, diminuindo a possibilidade de complicações à matriz e aos neonatos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. LUZ, M. R.; FREITAS, P. M. C.; PEREIRA, E. V.; Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico de gestação e tratamento das distocias; Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.29, n.3/4, p.142-150, jul./dez. 2005. 2. LEITE, L. G.; ARAÚJO, A. A.; Diagnóstico precoce e acompanhamento gestacional em cadelas por ultra-sonografia; Revista, clínica veterinária, ano 6, n.60, p. 34-40, 2006. 3. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14725	Obstetrícia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4847041 - MARIA FERNANDA ALMEIDA CARDOSO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	GESTAÇÃO DE RISCO EM CADELA - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A realização do pré-natal é de suma importância para diagnóstico e avaliação do desenvolvimento fetal, além disso, os exames de imagem auxiliam no diagnóstico de patologias da gestação de origem materna e/ou fetal. Anormalidades fetais, como a hidrocefalia, podem predispor a ocorrência de distúrbios obstrutivos, levando em risco o feto e a fêmea. Manobras e tratamentos medicamentosos podem ser substituídos em cadelas com distocias, entretanto, essas nem sempre são corretivas, sendo necessário a realização de cesariana antes do sofrimento fetal ou fadiga da cadela.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste relato é descrever os procedimentos e condutas adotados durante o atendimento de uma cadela apresentando gestação de risco.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma fêmea, canina, da raça Yorkshire, de 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi instituído o tratamento adequado para a úlcera de córnea e foi realizado pré-natal pela ultrassonografia e radiografia abdominal, as quais evidenciaram anormalidades fetais. Após a realização dos exames, foi programada uma cesariana para evitar possível distocia.			
<b>RESULTADOS</b>	No primeiro atendimento, foi analisada a necessidade de realizar intervenção cirúrgica para realização de flap pediculado no olho devido descemetocel. Entretanto, devido à gestação foi realizada programação clínica-cirúrgica afim de promover viabilidade materna e fetal e evitar complicações oftálmicas. Para a intervenção cirúrgica, foram realizados os seguintes exames complementares: hemograma, ureia, creatinina, ALT, FA, albumina, proteína total e ultrassonografia abdominal. A ultrassom evidenciou cerca de 5 fetos, com 38 dias de gestação, entretanto, em um destes foi visibilizado perda da definição óssea da calota craniana. Após 18 dias da intervenção cirúrgica oftalmológica, foram realizadas radiografia e ultrassonografia abdominal para acompanhamento gestacional. Neste exame, o tempo gestacional foi de 56 dias pela fetometria, além da alteração observada no exame anterior, também foi evidenciado dilatação ventricular em um dos fetos, sugerindo hidrocefalia. Ademais, os fetos restantes não apresentavam alterações patológicas. Na radiografia, foi visualizado um feto sem definição dos ossos cranianos e não foi possível realizar o diâmetro biparietal, pois nenhum dos fetos demonstrou adequado posicionamento para a mensuração nas projeções avaliadas. Dois dias após o último exame, a paciente retornou para reavaliação devido a mudanças comportamentais, por isso foi realizada uma nova ultrassonografia, qual evidenciou diminuição da frequência cardíaca dos fetos em relação ao último exame, além de uma possível herniação de tecido nervoso de um dos fetos. Portanto, foi optado por realizar uma cesariana programada. Durante a intervenção obstétrica foi realizada avaliação e manobras neonatais após o nascimento dos 5 neonatos, entretanto, o neonato que apresentava malformação da calota craniana e herniação do tecido nervoso foi à óbito, sendo enviado para análise necroscópica. Com 19 dias de vida, os neonatos passaram por avaliação, na consulta os neonatos apresentavam-se em bom estado geral, não apresentando alterações até o presente momento.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O acompanhamento gestacional foi de suma importância para o diagnóstico precoce de malformações fetais, auxiliando consequentemente na tomada de decisão da programação da cesariana, diminuindo a possibilidade de complicações à matriz e aos neonatos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. LUZ, M. R.; FREITAS, P. M. C.; PEREIRA, E. V.; Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico de gestação e tratamento das distocias; Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.29, n.3/4, p.142-150, jul./dez. 2005. 2. LEITE, L. G.; ARAÚJO, A. A.; Diagnóstico precoce e acompanhamento gestacional em cadelas por ultra-sonografia; Revista, clínica veterinária, ano 6, n.60, p. 34-40, 2006. 3. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14725	Obstetrícia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848110 - DANIELA SANTOS OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	GESTAÇÃO DE RISCO EM CADELA - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A realização do pré-natal é de suma importância para diagnóstico e avaliação do desenvolvimento fetal, além disso, os exames de imagem auxiliam no diagnóstico de patologias da gestação de origem materna e/ou fetal. Anormalidades fetais, como a hidrocefalia, podem predispor a ocorrência de distúrbios obstrutivos, levando em risco o feto e a fêmea. Manobras e tratamentos medicamentosos podem ser substituídos em cadelas com distocias, entretanto, essas nem sempre são corretivas, sendo necessário a realização de cesariana antes do sofrimento fetal ou fadiga da cadela.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste relato é descrever os procedimentos e condutas adotados durante o atendimento de uma cadela apresentando gestação de risco.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma fêmea, canina, da raça Yorkshire, de 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi instituído o tratamento adequado para a úlcera de córnea e foi realizado pré-natal pela ultrassonografia e radiografia abdominal, as quais evidenciaram anormalidades fetais. Após a realização dos exames, foi programada uma cesariana para evitar possível distocia.			
<b>RESULTADOS</b>	No primeiro atendimento, foi analisada a necessidade de realizar intervenção cirúrgica para realização de flap pediculado no olho devido descemetocelose. Entretanto, devido à gestação foi realizada programação clínica-cirúrgica afim de promover viabilidade materna e fetal e evitar complicações oftálmicas. Para a intervenção cirúrgica, foram realizados os seguintes exames complementares: hemograma, ureia, creatinina, ALT, FA, albumina, proteína total e ultrassonografia abdominal. A ultrassom evidenciou cerca de 5 fetos, com 38 dias de gestação, entretanto, em um destes foi visibilizado perda da definição óssea da calota craniana. Após 18 dias da intervenção cirúrgica oftalmológica, foram realizadas radiografia e ultrassonografia abdominal para acompanhamento gestacional. Neste exame, o tempo gestacional foi de 56 dias pela fetometria, além da alteração observada no exame anterior, também foi evidenciado dilatação ventricular em um dos fetos, sugerindo hidrocefalia. Ademais, os fetos restantes não apresentavam alterações patológicas. Na radiografia, foi visualizado um feto sem definição dos ossos cranianos e não foi possível realizar o diâmetro biparietal, pois nenhum dos fetos demonstrou adequado posicionamento para a mensuração nas projeções avaliadas. Dois dias após o último exame, a paciente retornou para reavaliação devido a mudanças comportamentais, por isso foi realizada uma nova ultrassonografia, qual evidenciou diminuição da frequência cardíaca dos fetos em relação ao último exame, além de uma possível herniação de tecido nervoso de um dos fetos. Portanto, foi optado por realizar uma cesariana programada. Durante a intervenção obstétrica foi realizada avaliação e manobras neonatais após o nascimento dos 5 neonatos, entretanto, o neonato que apresentava malformação da calota craniana e herniação do tecido nervoso foi à óbito, sendo enviado para análise necroscópica. Com 19 dias de vida, os neonatos passaram por avaliação, na consulta os neonatos apresentavam-se em bom estado geral, não apresentando alterações até o presente momento.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O acompanhamento gestacional foi de suma importância para o diagnóstico precoce de malformações fetais, auxiliando consequentemente na tomada de decisão da programação da cesariana, diminuindo a possibilidade de complicações à matriz e aos neonatos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. LUZ, M. R.; FREITAS, P. M. C.; PEREIRA, E. V.; Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico de gestação e tratamento das distocias; Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.29, n.3/4, p.142-150, jul./dez. 2005. 2. LEITE, L. G.; ARAÚJO, A. A.; Diagnóstico precoce e acompanhamento gestacional em cadelas por ultra-sonografia; Revista, clínica veterinária, ano 6, n.60, p. 34-40, 2006. 3. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14725	Obstetrícia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Roberto Rodrigues da Rosa Filho	
<b>TITULO</b>	GESTAÇÃO DE RISCO EM CADELA - RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A realização do pré-natal é de suma importância para diagnóstico e avaliação do desenvolvimento fetal, além disso, os exames de imagem auxiliam no diagnóstico de patologias da gestação de origem materna e/ou fetal. Anormalidades fetais, como a hidrocefalia, podem predispor a ocorrência de distúrbios obstrutivos, levando em risco o feto e a fêmea. Manobras e tratamentos medicamentosos podem ser substituídos em cadelas com distocias, entretanto, essas nem sempre são corretivas, sendo necessário a realização de cesariana antes do sofrimento fetal ou fadiga da cadela.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste relato é descrever os procedimentos e condutas adotados durante o atendimento de uma cadela apresentando gestação de risco.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma fêmea, canina, da raça Yorkshire, de 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi instituído o tratamento adequado para a úlcera de córnea e foi realizado pré-natal pela ultrassonografia e radiografia abdominal, as quais evidenciaram anormalidades fetais. Após a realização dos exames, foi programada uma cesariana para evitar possível distocia.			
<b>RESULTADOS</b>	No primeiro atendimento, foi analisada a necessidade de realizar intervenção cirúrgica para realização de flap pediculado no olho devido descemetocelose. Entretanto, devido à gestação foi realizada programação clínica-cirúrgica afim de promover viabilidade materna e fetal e evitar complicações oftálmicas. Para a intervenção cirúrgica, foram realizados os seguintes exames complementares: hemograma, ureia, creatinina, ALT, FA, albumina, proteína total e ultrassonografia abdominal. A ultrassom evidenciou cerca de 5 fetos, com 38 dias de gestação, entretanto, em um destes foi visibilizado perda da definição óssea da calota craniana. Após 18 dias da intervenção cirúrgica oftalmológica, foram realizadas radiografia e ultrassonografia abdominal para acompanhamento gestacional. Neste exame, o tempo gestacional foi de 56 dias pela fetometria, além da alteração observada no exame anterior, também foi evidenciado dilatação ventricular em um dos fetos, sugerindo hidrocefalia. Ademais, os fetos restantes não apresentavam alterações patológicas. Na radiografia, foi visualizado um feto sem definição dos ossos cranianos e não foi possível realizar o diâmetro biparietal, pois nenhum dos fetos demonstrou adequado posicionamento para a mensuração nas projeções avaliadas. Dois dias após o último exame, a paciente retornou para reavaliação devido a mudanças comportamentais, por isso foi realizada uma nova ultrassonografia, qual evidenciou diminuição da frequência cardíaca dos fetos em relação ao último exame, além de uma possível herniação de tecido nervoso de um dos fetos. Portanto, foi optado por realizar uma cesariana programada. Durante a intervenção obstétrica foi realizada avaliação e manobras neonatais após o nascimento dos 5 neonatos, entretanto, o neonato que apresentava malformação da calota craniana e herniação do tecido nervoso foi à óbito, sendo enviado para análise necroscópica. Com 19 dias de vida, os neonatos passaram por avaliação, na consulta os neonatos apresentavam-se em bom estado geral, não apresentando alterações até o presente momento.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O acompanhamento gestacional foi de suma importância para o diagnóstico precoce de malformações fetais, auxiliando consequentemente na tomada de decisão da programação da cesariana, diminuindo a possibilidade de complicações à matriz e aos neonatos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. LUZ, M. R.; FREITAS, P. M. C.; PEREIRA, E. V.; Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico de gestação e tratamento das distocias; Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.29, n.3/4, p.142-150, jul./dez. 2005. 2. LEITE, L. G.; ARAÚJO, A. A.; Diagnóstico precoce e acompanhamento gestacional em cadelas por ultra-sonografia; Revista, clínica veterinária, ano 6, n.60, p. 34-40, 2006. 3. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14726	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4441281 - MATHEUS VERONES SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral	Silvia Regina Marques	
<b>TITULO</b>	Influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis			
<b>INTRODUCAO</b>	As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são responsáveis por grandes impactos globalmente para o bem-estar sexual, reprodutivo, físico e mental da população. As mudanças comportamentais da juventude, sobretudo dos que ingressam na universidade, podem proporcionar vulnerabilidade para as infecções. Contudo, devido ao estigma imposto à população LGBTQIAP+ esse grupo tem uma tendência a procurar os serviços de saúde com maior frequência. Por outro lado, a educação médica, se efetiva, pode promover maior preocupação sobre o tema independente da orientação sexual e identidade de gênero.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre as medidas preventivas contra as IST.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram deste estudo 142 estudantes de medicina respondendo a um questionário em escala likert contemplando perguntas correlacionando a influência da formação médica e a orientação sexual para utilização de preservativos e prevenção às IST. A análise estatística foi realizada pelos testes ANOVA e teste-t por meio do programa GraphPad Prism.			
<b>RESULTADOS</b>	O nível de conhecimento sobre preservativos antes do início da faculdade e neste momento do curso apresentou perfil semelhante entre os estudantes homossexuais (4,31 e 4,77), seguido dos heterossexuais (4,13 e 4,70) e bissexuais (3,85 e 4,64) sem diferença estatística ( $p=0,2682$ e $p=0,7319$ ). Contudo, há influência significativa da formação médica sobre o nível de conhecimento dos preservativos em todos os grupos de alunos ( $p=0,0120$ ). A autoavaliação sobre o quanto a faculdade de medicina contribuiu para o conhecimento de preservativos foi maior nos estudantes homossexuais (4,31) seguido dos bissexuais (4,07) e heterossexuais (4,06) ( $p=0,7966$ ). Já a autoavaliação sobre as formas de transmissão das IST apresentou perfil inverso para os heterossexuais (4,29), bissexuais (4,23) e homossexuais (4,19) ( $p=0,6859$ ). Por fim, observou-se que o número de testagens que os acadêmicos homossexuais realizaram (1,61) desde o início da faculdade é superior quando comparada aos heterossexuais (0,93) e bissexuais (1,07) ( $p=0,2507$ ).			
<b>CONCLUSOES</b>	A orientação sexual não influencia nas práticas profiláticas para controle das IST, contudo a educação médica exerce papel formativo significativo sobre alunos heterossexuais, homossexuais e bissexuais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Sales William Barbosa, et al. Comportamento sexual de risco e conhecimento sobre IST/SIDA em universitários da saúde. Referência - Revista de Enfermagem [Internet]. 2016; 4(10):19-27. Disponível em: <a href="http://www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf">www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf</a> . 2. Cassimiro RD, Oliveira CRF, Lacerda Candido RC de, Jesus S de B, Rios Filho EG, Davanço Souto R, dos Santos RO. Conhecimento dos estudantes de medicina acerca de hábitos sexuais e situações considerados de risco. Braz. J. Develop. [Internet]. 2020. 6(10):76787-76795. Disponível em: <a href="https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020">https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020</a> . 3. Carvalho Gardenia Raquel de Oliveira, Pinto Raydelane Grailea Silva, Santos Márcia Sousa. Conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis por estudantes adolescentes de escolas públicas. Rev. Adolesc. Saúde [Internet]. 2018; 15(1):7-17. Disponível em: <a href="http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763">pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14726	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441290 - MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral	Silvia Regina Marques	
<b>TITULO</b>	Influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são responsáveis por grandes impactos globalmente para o bem-estar sexual, reprodutivo, físico e mental da população. As mudanças comportamentais da juventude, sobretudo dos que ingressam na universidade, podem proporcionar vulnerabilidade para as infecções. Contudo, devido ao estigma imposto à população LGBTQIAP+ esse grupo tem uma tendência a procurar os serviços de saúde com maior frequência. Por outro lado, a educação médica, se efetiva, pode promover maior preocupação sobre o tema independente da orientação sexual e identidade de gênero.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre as medidas preventivas contra as IST.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram deste estudo 142 estudantes de medicina respondendo a um questionário em escala likert contemplando perguntas correlacionando a influência da formação médica e a orientação sexual para utilização de preservativos e prevenção às IST. A análise estatística foi realizada pelos testes ANOVA e teste-t por meio do programa GraphPad Prism.			
<b>RESULTADOS</b>	O nível de conhecimento sobre preservativos antes do início da faculdade e neste momento do curso apresentou perfil semelhante entre os estudantes homossexuais (4,31 e 4,77), seguido dos heterossexuais (4,13 e 4,70) e bissexuais (3,85 e 4,64) sem diferença estatística ( $p=0,2682$ e $p=0,7319$ ). Contudo, há influência significativa da formação médica sobre o nível de conhecimento dos preservativos em todos os grupos de alunos ( $p=0,0120$ ). A autoavaliação sobre o quanto a faculdade de medicina contribuiu para o conhecimento de preservativos foi maior nos estudantes homossexuais (4,31) seguido dos bissexuais (4,07) e heterossexuais (4,06) ( $p=0,7966$ ). Já a autoavaliação sobre as formas de transmissão das IST apresentou perfil inverso para os heterossexuais (4,29), bissexuais (4,23) e homossexuais (4,19) ( $p=0,6859$ ). Por fim, observou-se que o número de testagens que os acadêmicos homossexuais realizaram (1,61) desde o início da faculdade é superior quando comparada aos heterossexuais (0,93) e bissexuais (1,07) ( $p=0,2507$ ).			
<b>CONCLUSOES</b>	A orientação sexual não influencia nas práticas profiláticas para controle das IST, contudo a educação médica exerce papel formativo significativo sobre alunos heterossexuais, homossexuais e bissexuais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Sales William Barbosa, et al. Comportamento sexual de risco e conhecimento sobre IST/SIDA em universitários da saúde. Referência - Revista de Enfermagem [Internet]. 2016; 4(10):19-27. Disponível em: <a href="http://www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf">www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf</a> . 2. Cassimiro RD, Oliveira CRF, Lacerda Candido RC de, Jesus S de B, Rios Filho EG, Davanço Souto R, dos Santos RO. Conhecimento dos estudantes de medicina acerca de hábitos sexuais e situações considerados de risco. Braz. J. Develop. [Internet]. 2020. 6(10):76787-76795. Disponível em: <a href="https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020">https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020</a> . 3. Carvalho Gardenia Raquel de Oliveira, Pinto Raydelane Grailea Silva, Santos Márcia Sousa. Conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis por estudantes adolescentes de escolas públicas. Rev. Adolesc. Saúde [Internet]. 2018; 15(1):7-17. Disponível em: <a href="http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763">pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14726	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4441419 - RUAN VIEIRA MARQUES BEZERRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral	Silvia Regina Marques	
<b>TITULO</b>	Influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são responsáveis por grandes impactos globalmente para o bem-estar sexual, reprodutivo, físico e mental da população. As mudanças comportamentais da juventude, sobretudo dos que ingressam na universidade, podem proporcionar vulnerabilidade para as infecções. Contudo, devido ao estigma imposto à população LGBTQIAP+ esse grupo tem uma tendência a procurar os serviços de saúde com maior frequência. Por outro lado, a educação médica, se efetiva, pode promover maior preocupação sobre o tema independente da orientação sexual e identidade de gênero.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre as medidas preventivas contra as IST.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram deste estudo 142 estudantes de medicina respondendo a um questionário em escala likert contemplando perguntas correlacionando a influência da formação médica e a orientação sexual para utilização de preservativos e prevenção às IST. A análise estatística foi realizada pelos testes ANOVA e teste-t por meio do programa GraphPad Prism.			
<b>RESULTADOS</b>	O nível de conhecimento sobre preservativos antes do início da faculdade e neste momento do curso apresentou perfil semelhante entre os estudantes homossexuais (4,31 e 4,77), seguido dos heterossexuais (4,13 e 4,70) e bissexuais (3,85 e 4,64) sem diferença estatística ( $p=0,2682$ e $p=0,7319$ ). Contudo, há influência significativa da formação médica sobre o nível de conhecimento dos preservativos em todos os grupos de alunos ( $p=0,0120$ ). A autoavaliação sobre o quanto a faculdade de medicina contribuiu para o conhecimento de preservativos foi maior nos estudantes homossexuais (4,31) seguido dos bissexuais (4,07) e heterossexuais (4,06) ( $p=0,7966$ ). Já a autoavaliação sobre as formas de transmissão das IST apresentou perfil inverso para os heterossexuais (4,29), bissexuais (4,23) e homossexuais (4,19) ( $p=0,6859$ ). Por fim, observou-se que o número de testagens que os acadêmicos homossexuais realizaram (1,61) desde o início da faculdade é superior quando comparada aos heterossexuais (0,93) e bissexuais (1,07) ( $p=0,2507$ ).			
<b>CONCLUSOES</b>	A orientação sexual não influencia nas práticas profiláticas para controle das IST, contudo a educação médica exerce papel formativo significativo sobre alunos heterossexuais, homossexuais e bissexuais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Sales William Barbosa, et al. Comportamento sexual de risco e conhecimento sobre IST/SIDA em universitários da saúde. Referência - Revista de Enfermagem [Internet]. 2016; 4(10):19-27. Disponível em: <a href="http://www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf">www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf</a> . 2. Cassimiro RD, Oliveira CRF, Lacerda Candido RC de, Jesus S de B, Rios Filho EG, Davanço Souto R, dos Santos RO. Conhecimento dos estudantes de medicina acerca de hábitos sexuais e situações considerados de risco. Braz. J. Develop. [Internet]. 2020. 6(10):76787-76795. Disponível em: <a href="https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020">https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020</a> . 3. Carvalho Gardenia Raquel de Oliveira, Pinto Raydelane Grailea Silva, Santos Márcia Sousa. Conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis por estudantes adolescentes de escolas públicas. Rev. Adolesc. Saúde [Internet]. 2018; 15(1):7-17. Disponível em: <a href="http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763">pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14726	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4447034 - FELIPE SILVA OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral	Silvia Regina Marques	
<b>TITULO</b>	Influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis			
<b>INTRODUCAO</b>	As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são responsáveis por grandes impactos globalmente para o bem-estar sexual, reprodutivo, físico e mental da população. As mudanças comportamentais da juventude, sobretudo dos que ingressam na universidade, podem proporcionar vulnerabilidade para as infecções. Contudo, devido ao estigma imposto à população LGBTQIAP+ esse grupo tem uma tendência a procurar os serviços de saúde com maior frequência. Por outro lado, a educação médica, se efetiva, pode promover maior preocupação sobre o tema independente da orientação sexual e identidade de gênero.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência da identidade de gênero, orientação sexual e formação médica sobre as medidas preventivas contra as IST.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram deste estudo 142 estudantes de medicina respondendo a um questionário em escala likert contemplando perguntas correlacionando a influência da formação médica e a orientação sexual para utilização de preservativos e prevenção às IST. A análise estatística foi realizada pelos testes ANOVA e teste-t por meio do programa GraphPad Prism.			
<b>RESULTADOS</b>	O nível de conhecimento sobre preservativos antes do início da faculdade e neste momento do curso apresentou perfil semelhante entre os estudantes homossexuais (4,31 e 4,77), seguido dos heterossexuais (4,13 e 4,70) e bissexuais (3,85 e 4,64) sem diferença estatística ( $p=0,2682$ e $p=0,7319$ ). Contudo, há influência significativa da formação médica sobre o nível de conhecimento dos preservativos em todos os grupos de alunos ( $p=0,0120$ ). A autoavaliação sobre o quanto a faculdade de medicina contribuiu para o conhecimento de preservativos foi maior nos estudantes homossexuais (4,31) seguido dos bissexuais (4,07) e heterossexuais (4,06) ( $p=0,7966$ ). Já a autoavaliação sobre as formas de transmissão das IST apresentou perfil inverso para os heterossexuais (4,29), bissexuais (4,23) e homossexuais (4,19) ( $p=0,6859$ ). Por fim, observou-se que o número de testagens que os acadêmicos homossexuais realizaram (1,61) desde o início da faculdade é superior quando comparada aos heterossexuais (0,93) e bissexuais (1,07) ( $p=0,2507$ ).			
<b>CONCLUSOES</b>	A orientação sexual não influencia nas práticas profiláticas para controle das IST, contudo a educação médica exerce papel formativo significativo sobre alunos heterossexuais, homossexuais e bissexuais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Sales William Barbosa, et al. Comportamento sexual de risco e conhecimento sobre IST/SIDA em universitários da saúde. Referência - Revista de Enfermagem [Internet]. 2016; 4(10):19-27. Disponível em: <a href="http://www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf">www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf</a> . 2. Cassimiro RD, Oliveira CRF, Lacerda Candido RC de, Jesus S de B, Rios Filho EG, Davanço Souto R, dos Santos RO. Conhecimento dos estudantes de medicina acerca de hábitos sexuais e situações considerados de risco. Braz. J. Develop. [Internet]. 2020. 6(10):76787-76795. Disponível em: <a href="https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020">https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18020</a> . 3. Carvalho Gardenia Raquel de Oliveira, Pinto Raydelane Grailea Silva, Santos Márcia Sousa. Conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis por estudantes adolescentes de escolas públicas. Rev. Adolesc. Saúde [Internet]. 2018; 15(1):7-17. Disponível em: <a href="http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763">pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-763</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14728	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4325044 - AMANDA SANTOS EVARISTO ALENCAR		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A VALORAÇÃO DO CAPITAL HUMANO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO DAS EMPRESAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Uma pesquisa realizada pela Robert Half no ano de 2023, em parceria com a The School of Life Brasil, apontou que "não se sentir feliz no trabalho" foi o principal motivo para que profissionais deixassem seus empregos por conta própria. A pesquisa aplicada a 100 trabalhadores, com 25 anos ou mais e formação superior completa, demonstra que entre os cinco principais fatores do desligamentos dos empregados estão a busca por novos desafios (42,65% ; a falta de perspectiva de crescimento (33,82%); não se sentir valorizado no trabalho (27,94%); e a relação ruim com antigos gestores (19,12%). A experiência de trabalhar em casa (home office), intensificada a partir da pandemia por COVID 19, altera substancialmente as relações entre empregado e empregador e traz desafios ímpares a área de Gestão de Pessoas das empresas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a valorização do capital humano como diferencial competitivo nas empresas; Demonstrar os impactos da gestão humanizada e a sua contribuição para a qualidade de vida no ambiente de trabalho; Averiguar se a comunicação impacta no acolhimento dos empregados e contribui para uma gestão humanizada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo (5 anos). O material coletado tem por finalidade elucidar as mudanças nas relações entre empresas e trabalhadores e demonstrar a relevância do investimento no capital humano como um diferencial competitivo.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado preliminar, observa-se uma mudança expressiva no mercado de trabalho, entre julho de 2021 e julho de 2022, cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada foram registrados no país, apesar do alto índice de desemprego, da taxa de juros e inflação alta. Durante o período de um ano (2022), houve um aumento de 42,5% em relação aos mais de 4,5 milhões de demissões registradas no ano anterior, o que demonstra a emergência de investimentos em Gestão Humanizada nas empresas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Como conclusão preliminar, infere-se que o mercado aponta a imperativa mudança nas relações entre empregado e empregador. O trabalhador preocupa-se com qualidade de vida no ambiente de trabalho, e é intolerante com empresas que não valorizam o capital humano. Nessa seara, cabe as empresas repensarem os seus modelos de negócio, levando em consideração as expectativas do colaborador, que quando satisfeitas, elevam a produtividade das empresas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 529 p. COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Editora Best Seller, 2015. DRUCKER, Peter F. Administração: tarefas, responsabilidades, práticas. V.1. São Paulo: Pioneira, 1975.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14728	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4347145 - KETELYN DA SILVA FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A VALORAÇÃO DO CAPITAL HUMANO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO DAS EMPRESAS			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Uma pesquisa realizada pela Robert Half no ano de 2023, em parceria com a The School of Life Brasil, apontou que "não se sentir feliz no trabalho" foi o principal motivo para que profissionais deixassem seus empregos por conta própria. A pesquisa aplicada a 100 trabalhadores, com 25 anos ou mais e formação superior completa, demonstra que entre os cinco principais fatores do desligamentos dos empregados estão a busca por novos desafios (42,65% ; a falta de perspectiva de crescimento (33,82%); não se sentir valorizado no trabalho (27,94%); e a relação ruim com antigos gestores (19,12%). A experiência de trabalhar em casa (home office), intensificada a partir da pandemia por COVID 19, altera substancialmente as relações entre empregado e empregador e traz desafios ímpares a área de Gestão de Pessoas das empresas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a valorização do capital humano como diferencial competitivo nas empresas; Demonstrar os impactos da gestão humanizada e a sua contribuição para a qualidade de vida no ambiente de trabalho; Averiguar se a comunicação impacta no acolhimento dos empregados e contribui para uma gestão humanizada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo (5 anos). O material coletado tem por finalidade elucidar as mudanças nas relações entre empresas e trabalhadores e demonstrar a relevância do investimento no capital humano como um diferencial competitivo.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultado preliminar, observa-se uma mudança expressiva no mercado de trabalho, entre julho de 2021 e julho de 2022, cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada foram registrados no país, apesar do alto índice de desemprego, da taxa de juros e inflação alta. Durante o período de um ano (2022), houve um aumento de 42,5% em relação aos mais de 4,5 milhões de demissões registradas no ano anterior, o que demonstra a emergência de investimentos em Gestão Humanizada nas empresas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Como conclusão preliminar, infere-se que o mercado aponta a imperativa mudança nas relações entre empregado e empregador. O trabalhador preocupa-se com qualidade de vida no ambiente de trabalho, e é intolerante com empresas que não valorizam o capital humano. Nessa seara, cabe as empresas repensarem os seus modelos de negócio, levando em consideração as expectativas do colaborador, que quando satisfeitas, elevam a produtividade das empresas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 529 p. COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Editora Best Seller, 2015. DRUCKER, Peter F. Administração: tarefas, responsabilidades, práticas. V.1. São Paulo: Pioneira, 1975.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14728	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4362993 - ELISANGELA DE JESUS DA ROCHA OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A VALORAÇÃO DO CAPITAL HUMANO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO DAS EMPRESAS			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Uma pesquisa realizada pela Robert Half no ano de 2023, em parceria com a The School of Life Brasil, apontou que "não se sentir feliz no trabalho" foi o principal motivo para que profissionais deixassem seus empregos por conta própria. A pesquisa aplicada a 100 trabalhadores, com 25 anos ou mais e formação superior completa, demonstra que entre os cinco principais fatores do desligamentos dos empregados estão a busca por novos desafios (42,65% ; a falta de perspectiva de crescimento (33,82%); não se sentir valorizado no trabalho (27,94%); e a relação ruim com antigos gestores (19,12%). A experiência de trabalhar em casa (home office), intensificada a partir da pandemia por COVID 19, altera substancialmente as relações entre empregado e empregador e traz desafios ímpares a área de Gestão de Pessoas das empresas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Compreender a valorização do capital humano como diferencial competitivo nas empresas; Demonstrar os impactos da gestão humanizada e a sua contribuição para a qualidade de vida no ambiente de trabalho; Averiguar se a comunicação impacta no acolhimento dos empregados e contribui para uma gestão humanizada.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo (5 anos). O material coletado tem por finalidade elucidar as mudanças nas relações entre empresas e trabalhadores e demonstrar a relevância do investimento no capital humano como um diferencial competitivo.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Como resultado preliminar, observa-se uma mudança expressiva no mercado de trabalho, entre julho de 2021 e julho de 2022, cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada foram registrados no país, apesar do alto índice de desemprego, da taxa de juros e inflação alta. Durante o período de um ano (2022), houve um aumento de 42,5% em relação aos mais de 4,5 milhões de demissões registradas no ano anterior, o que demonstra a emergência de investimentos em Gestão Humanizada nas empresas.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Como conclusão preliminar, infere-se que o mercado aponta a imperativa mudança nas relações entre empregado e empregador. O trabalhador preocupa-se com qualidade de vida no ambiente de trabalho, e é intolerante com empresas que não valorizam o capital humano. Nessa seara, cabe as empresas repensarem os seus modelos de negócio, levando em consideração as expectativas do colaborador, que quando satisfeitas, elevam a produtividade das empresas.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 529 p. COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Editora Best Seller, 2015. DRUCKER, Peter F. Administração: tarefas, responsabilidades, práticas. V.1. São Paulo: Pioneira, 1975.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14728	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4448553 - JENNIFER KEITH DIANA GONCALVES DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A VALORAÇÃO DO CAPITAL HUMANO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO DAS EMPRESAS			
<b>INTRODUCA O</b>	Uma pesquisa realizada pela Robert Half no ano de 2023, em parceria com a The School of Life Brasil, apontou que "não se sentir feliz no trabalho" foi o principal motivo para que profissionais deixassem seus empregos por conta própria. A pesquisa aplicada a 100 trabalhadores, com 25 anos ou mais e formação superior completa, demonstra que entre os cinco principais fatores do desligamentos dos empregados estão a busca por novos desafios (42,65% ; a falta de perspectiva de crescimento (33,82%); não se sentir valorizado no trabalho (27,94%); e a relação ruim com antigos gestores (19,12%). A experiência de trabalhar em casa (home office), intensificada a partir da pandemia por COVID 19, altera substancialmente as relações entre empregado e empregador e traz desafios ímpares a área de Gestão de Pessoas das empresas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a valorização do capital humano como diferencial competitivo nas empresas; Demonstrar os impactos da gestão humanizada e a sua contribuição para a qualidade de vida no ambiente de trabalho; Averiguar se a comunicação impacta no acolhimento dos empregados e contribui para uma gestão humanizada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo (5 anos). O material coletado tem por finalidade elucidar as mudanças nas relações entre empresas e trabalhadores e demonstrar a relevância do investimento no capital humano como um diferencial competitivo.			
<b>RESULTADO S</b>	Como resultado preliminar, observa-se uma mudança expressiva no mercado de trabalho, entre julho de 2021 e julho de 2022, cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada foram registrados no país, apesar do alto índice de desemprego, da taxa de juros e inflação alta. Durante o período de um ano (2022), houve um aumento de 42,5% em relação aos mais de 4,5 milhões de demissões registradas no ano anterior, o que demonstra a emergência de investimentos em Gestão Humanizada nas empresas.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Como conclusão preliminar, infere-se que o mercado aponta a imperativa mudança nas relações entre empregado e empregador. O trabalhador preocupa-se com qualidade de vida no ambiente de trabalho, e é intolerante com empresas que não valorizam o capital humano. Nessa seara, cabe as empresas repensarem os seus modelos de negócio, levando em consideração as expectativas do colaborador, que quando satisfeitas, elevam a produtividade das empresas.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 529 p. COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Editora Best Seller, 2015. DRUCKER, Peter F. Administração: tarefas, responsabilidades, práticas. V.1. São Paulo: Pioneira, 1975.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14728	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4549350 - ADRIANA CRISTINA DE CASTRO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	A VALORAÇÃO DO CAPITAL HUMANO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO DAS EMPRESAS			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Uma pesquisa realizada pela Robert Half no ano de 2023, em parceria com a The School of Life Brasil, apontou que "não se sentir feliz no trabalho" foi o principal motivo para que profissionais deixassem seus empregos por conta própria. A pesquisa aplicada a 100 trabalhadores, com 25 anos ou mais e formação superior completa, demonstra que entre os cinco principais fatores do desligamentos dos empregados estão a busca por novos desafios (42,65% ; a falta de perspectiva de crescimento (33,82%); não se sentir valorizado no trabalho (27,94%); e a relação ruim com antigos gestores (19,12%). A experiência de trabalhar em casa (home office), intensificada a partir da pandemia por COVID 19, altera substancialmente as relações entre empregado e empregador e traz desafios ímpares a área de Gestão de Pessoas das empresas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Compreender a valorização do capital humano como diferencial competitivo nas empresas; Demonstrar os impactos da gestão humanizada e a sua contribuição para a qualidade de vida no ambiente de trabalho; Averiguar se a comunicação impacta no acolhimento dos empregados e contribui para uma gestão humanizada.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, e para tanto, utilizaremos recursos bibliográficos extraídos de livros, artigos, monografias e teses com recorte temporal de no máximo (5 anos). O material coletado tem por finalidade elucidar as mudanças nas relações entre empresas e trabalhadores e demonstrar a relevância do investimento no capital humano como um diferencial competitivo.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Como resultado preliminar, observa-se uma mudança expressiva no mercado de trabalho, entre julho de 2021 e julho de 2022, cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada foram registrados no país, apesar do alto índice de desemprego, da taxa de juros e inflação alta. Durante o período de um ano (2022), houve um aumento de 42,5% em relação aos mais de 4,5 milhões de demissões registradas no ano anterior, o que demonstra a emergência de investimentos em Gestão Humanizada nas empresas.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Como conclusão preliminar, infere-se que o mercado aponta a imperativa mudança nas relações entre empregado e empregador. O trabalhador preocupa-se com qualidade de vida no ambiente de trabalho, e é intolerante com empresas que não valorizam o capital humano. Nessa seara, cabe as empresas repensarem os seus modelos de negócio, levando em consideração as expectativas do colaborador, que quando satisfeitas, elevam a produtividade das empresas.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 529 p. COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Editora Best Seller, 2015. DRUCKER, Peter F. Administração: tarefas, responsabilidades, práticas. V.1. São Paulo: Pioneira, 1975.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14732	Análise Nutricional de População	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4005121 - TAIS STEFANI NASCIMENTO DORNELLAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	RELAÇÃO ENTRE TRANSTORNOS ALIMENTARES E CIRURGIA BARIÁTRICA			
<b>INTRODUCAO</b>	A cirurgia bariátrica é considerada o método mais eficiente no controle e tratamento da obesidade severa, permitindo resultados positivos a longo prazo porem a existência de transtornos alimentares antes e após a bariátrica comprometem negativamente o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.(1)			
<b>OBJETIVOS</b>	Relacionar o transtorno de compulsão alimentar e o Transtorno da Evitação ou Restrição da Ingestão de Alimentos pós cirurgia bariátrica.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão narrativa, consultados nas bases do SciELO, LILACS e PUBMED/ MEDLINE no ano de 2012 e 2022. Como critérios de inclusão, foram consideradas as produções da literatura no referido período, disponíveis na íntegra online e selecionados os artigos na língua inglesa e portuguesa. Os critérios de exclusão foram artigos que não se adequaram ao tema proposto.			
<b>RESULTADOS</b>	A obesidade é uma doença crônica que cresce cada vez mais desenvolvida pelo acúmulo de gordura no corpo consequência do alto consumo de calorias e um baixo gasto energético. Os métodos de tratamento são dietas com baixas calorias, exercício físico, uso de medicamentos redutores de apetite e em casos onde as alternativas anteriores não tiveram efeitos positivos a cirurgia bariátrica é o procedimento indicado. De diferentes formas a bariátrica é feita alterando e modificando a anatomia e funcionamento do estômago e intestino, que como consequência desenvolve ou piora casos de transtornos alimentares como compulsão alimentar, anorexia e bulimia nervosa, síndrome do comer noturno.			
<b>CONCLUSOES</b>	Perante os dados apresentados das pesquisas consultadas, observa-se que os transtornos alimentares com maior atributo ao transtorno de compulsão alimentar se manifesta nos pacientes antes e após a bariátrica se tornando obstáculos na perda de peso e qualidade de vida dos pacientes. Para que esse problema não dificulte o processo da cirurgia bariátrica permitindo maior segurança e resultados positivos para os pacientes, como conduta deve ser solicitado um acompanhamento por profissionais como psicólogo, nutricionista, médicos, educador Físico.			
<b>REFERENCIAS</b>	(1) Pinheiro JA, Castro IR, Ribeiro IB, Ferreira MV, Fireman PA, Madeiro MA, et al. Repercussões da cirurgia bariátrica sobre parâmetros metabólicos. Rev. Intern. Post. [Internet]. 2021 [ acesso em : 27 jun 2022] ; 34 (04): 2-3. Disponível em : <a href="https://www.scielo.br/ijabcd/a/rzp4cTmHjGsq5yyRGVJQK/?format=pdf(#38)">https://www.scielo.br/ijabcd/a/rzp4cTmHjGsq5yyRGVJQK/?format=pdf(#38)</a> lang=pt (2) Associação Brasileira para estudo da obesidade e síndrome metabólica. Mapa da obesidade. São Paulo: Disponível em <a href="https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/">https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14734	Imunologia Aplicada	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4310161 - THIAGO VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andre Luis Lacerda Bachi		
<b>TITULO</b>	Idosos vacinados com ChadOx-1 apresentam melhor resposta imune/inflamatória nas vias aéreas superiores do que idosos vacinados com CoronaVac.			
<b>INTRODUCA O</b>	Em termos de respostas imunes/inflamatórias na mucosa das vias aéreas, foi demonstrado que a presença do vírus SARS-CoV-2 pode induzir a liberação de diferentes tipos de citocinas que podem auxiliar não só na depuração do agente patogênico, mas também pode gerar imunidade protetora contra esta infecção viral. Além disso, embora informações importantes sobre a vacinação contra COVID-19 estejam disponíveis, o efeito das vacinas CoronaVac e ChadOx-1 na imunidade da mucosa das vias aéreas superiores da população idosa não é totalmente compreendido.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar o impacto de duas doses das vacinas CoronaVac ou ChadOx-1 nas respostas imunológicas/inflamatórias na mucosa das vias aéreas de idosos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Setenta e seis idosos (n=76), de ambos os sexos, com idade média de 75,1±6,4 anos, foram separados de acordo com a vacinação nos grupos: CoronaVac (n=52) e ChadOx-1 (n=24). Amostras de saliva foram coletadas antes (Pré) e 30 dias após (Pós) a administração da segunda dose das vacinas CoronaVac ou ChadOx-1 para avaliar os níveis de anticorpos (sIgA e IgG), de peptídeos antimicrobianos e de citocinas, através da técnica de ELISA.			
<b>RESULTADO S</b>	Embora ambos os grupos de voluntários tenham apresentado níveis aumentados de sIgA e IgG específicos para COVID-19 pós-vacinação, vale salientar que os níveis destes anticorpos encontrados no grupo ChadOx-1 apresentaram marcante aumento em relação aos valores observados no grupo CoronaVac. Corroborando este achado, a imunogenicidade no grupo ChadOx-1 (37,5% para sIgA e 25% para IgG) foi maior do que no grupo CoronaVac (18,9% para sIgA e 13,2% para IgG), mostrando que os idosos vacinados com ChadOx-1 foram capazes de induzir maior proteção local do que com a vacina CoronaVac. Além disso, o grupo ChadOx-1 mostrou (1) menores níveis de IFN-(#38)#945;, IFN-(#38)#947;, IL-10, e da razão entre IFN-(#38)#947;/IL-10, além de maior razão entre IL-6/IL-10, tanto no momento pré- quanto pós-vacinação em comparação ao grupo CoronaVac, (2) bem como níveis mais baixos de IL-12p70, IL-17A, TNF-a e da razão entre IL-12p70/IL-10, além de maiores níveis de sIgA específica para COVID-19 e lisozima no período pós-vacinação do que no grupo CoronaVac. De acordo com a literatura, a produção e ação regulada de citocinas, bem como a ação colaborativa de peptídeos antimicrobianos, como lisozima e lactoferrina, com anticorpos (sIgA e IgG) na saliva pode ser essencial para induzir e melhorar a proteção da mucosa contra a infecção por SARS-CoV-2.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os idosos submetidos às duas doses da vacina ChadOx-1 apresentaram melhor resposta imune/inflamatória na mucosa oral contra a COVID-19, que incluiu melhor resposta de citocinas e peptídeos antimicrobianos, bem como melhor resposta de sIgA específica para antígenos SARS-CoV-2 levando a uma melhor imunogenicidade que os valores encontrados nos idosos submetidos às duas doses da vacina CoronaVac.			
<b>REFERENCIAS</b>	Society for Mucosal Immunology, (2012). Principles of Mucosal Immunology (P. Smith, T. MacDonald, (#38) R. Blumberg, Eds.) (2nd ed.). Garland Science.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14735	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4835531 - ARTHUR ANTUNES SCANAVINI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Óbitos por doenças respiratórias no município de São Paulo: estudo epidemiológico baseado em dados sócio demográficos.			
<b>INTRODUCA O</b>	As doenças respiratórias causam grande impacto na saúde pública, tendo alta prevalência de mortalidade. Fazem parte dessa classe de enfermidades: o resfriado, gripe, pneumonia, COVID-19, asma, tuberculose, entre outras (1). Os maiores acometidos por tais síndromes respiratórias são os idosos. Dados do IBGE, demonstrando que a população idosa saltou de 11,3% para 14,7% de 2012 para 2023, devido ao rápido fenômeno de envelhecimento populacional, deve-se pensar em soluções para maximizar a qualidade e expectativa de vida dos longínquos (2). Além disso, os dados coletados também evidenciaram uma maior mortalidade entre pessoas de etnia branca quando comparadas com indivíduos negros e pardos, ainda que a segunda corresponda a uma parcela maior da população brasileira (4). Por fim, a acentuada incidência de doenças respiratórias em homens contrastando com a baixa ocorrência no sexo feminino, evidencia questões sociais como: o acesso à saúde e também os diferentes hábitos de vida (5).			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados epidemiológicos das doenças respiratórias em parâmetros de incidência em faixa etária, cor e sexo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise baseada em base de dados da plataforma DataSus e no IBGE, sobre mortalidade de doenças respiratórias no município de São Paulo referente ao ano de 2021. Selecionados 14 artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês, publicados entre 2004 e 2023, com os descritores "Respiratory Tract Diseases", "Aged", "Racial Groups" e "Effective Access to Health Services".			
<b>RESULTADO S</b>	As análises dos dados mostraram maior mortalidade de idosos (15%) com eixo na faixa etária, e em hospitais com base no local de ocorrência, colocando em discussão as causas para que isso ocorresse, como a maior susceptibilidade fisiológica e imunológica, particularmente às infecções, contribuindo para a redução da capacidade física, biológica e diminuição de sua autonomia. Além disso, durante o desenvolvimento da senescência há redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e delimitação dos valores da pressão de inspiração e expiração máximos. Associado a isso, há ainda, a diminuição dos cílios do epitélio respiratório e queda da eficiência da tosse na população idosa. Outra análise realizada foi a questão racial, que tem maior prevalência na cor branca (69,52%), devido a maior noção de saúde e conhecimento acerca da busca de tratamento, o que traz como consequência uma maior contabilização de casos. Além disso, há distinção com base no sexo, tendo como prevalência os homens (52,23%), que buscam menos o acesso as redes de saúde e com isso acabam desenvolvendo mais doenças, como as respiratórias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Todos esses critérios analisados devem convergir para construção de políticas públicas e melhoria de saúde a fim de diminuir as taxas de mortalidade por doenças respiratórias e promover bem-estar social.			
<b>REFERENCIA S</b>	1- Façanha MC, Pinheiro AC. Doenças Respiratórias agudas em serviços de saúde entre 1996 e 2001, Fortaleza, CE. Rev. Saúde Pública. Jun 2004;38(3). 2- Cabral U. População cresce mas o número de pessoas com menos de 30 anos cai [internet]. Rio de Janeiro; 2022. [Acesso em: 2023 Set 2]. 3- Bahadir A, et al. Prevalência e desfechos de doenças comórbidas em pacientes idosos com doenças respiratórias. Geriatria e Gerontologia Internacional. Jul 2015;16(7).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14735	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027586 - AMANDA CAROLINA INFANTE CORREA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Óbitos por doenças respiratórias no município de São Paulo: estudo epidemiológico baseado em dados sócio demográficos.			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças respiratórias causam grande impacto na saúde pública, tendo alta prevalência de mortalidade. Fazem parte dessa classe de enfermidades: o resfriado, gripe, pneumonia, COVID-19, asma, tuberculose, entre outras (1). Os maiores acometidos por tais síndromes respiratórias são os idosos. Dados do IBGE, demonstrando que a população idosa saltou de 11,3% para 14,7% de 2012 para 2023, devido ao rápido fenômeno de envelhecimento populacional, deve-se pensar em soluções para maximizar a qualidade e expectativa de vida dos longínquos (2). Além disso, os dados coletados também evidenciaram uma maior mortalidade entre pessoas de etnia branca quando comparadas com indivíduos negros e pardos, ainda que a segunda corresponda a uma parcela maior da população brasileira (4). Por fim, a acentuada incidência de doenças respiratórias em homens contrastando com a baixa ocorrência no sexo feminino, evidencia questões sociais como: o acesso à saúde e também os diferentes hábitos de vida (5).			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados epidemiológicos das doenças respiratórias em parâmetros de incidência em faixa etária, cor e sexo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise baseada em base de dados da plataforma DataSus e no IBGE, sobre mortalidade de doenças respiratórias no município de São Paulo referente ao ano de 2021. Selecionados 14 artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês, publicados entre 2004 e 2023, com os descritores "Respiratory Tract Diseases", "Aged", "Racial Groups" e "Effective Access to Health Services".			
<b>RESULTADOS</b>	As análises dos dados mostraram maior mortalidade de idosos (15%) com eixo na faixa etária, e em hospitais com base no local de ocorrência, colocando em discussão as causas para que isso ocorresse, como a maior susceptibilidade fisiológica e imunológica, particularmente às infecções, contribuindo para a redução da capacidade física, biológica e diminuição de sua autonomia. Além disso, durante o desenvolvimento da senescência há redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e delimitação dos valores da pressão de inspiração e expiração máximos. Associado a isso, há ainda, a diminuição dos cílios do epitélio respiratório e queda da eficiência da tosse na população idosa. Outra análise realizada foi a questão racial, que tem maior prevalência na cor branca (69,52%), devido a maior noção de saúde e conhecimento acerca da busca de tratamento, o que traz como consequência uma maior contabilização de casos. Além disso, há distinção com base no sexo, tendo como prevalência os homens (52,23%), que buscam menos o acesso as redes de saúde e com isso acabam desenvolvendo mais doenças, como as respiratórias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Todos esses critérios analisados devem convergir para construção de políticas públicas e melhoria de saúde a fim de diminuir as taxas de mortalidade por doenças respiratórias e promover bem-estar social.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Façanha MC, Pinheiro AC. Doenças Respiratórias agudas em serviços de saúde entre 1996 e 2001, Fortaleza, CE. Rev. Saúde Pública. Jun 2004;38(3). 2- Cabral U. População cresce mas o número de pessoas com menos de 30 anos cai [internet]. Rio de Janeiro; 2022. [Acesso em: 2023 Set 2]. 3- Bahadir A, et al. Prevalência e desfechos de doenças comórbidas em pacientes idosos com doenças respiratórias. Geriatria e Gerontologia Internacional. Jul 2015;16(7).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14735	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027616 - BRUNA ESTÉFANE DO REGO HONORATO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Óbitos por doenças respiratórias no município de São Paulo: estudo epidemiológico baseado em dados sócio demográficos.			
<b>INTRODUCA O</b>	As doenças respiratórias causam grande impacto na saúde pública, tendo alta prevalência de mortalidade. Fazem parte dessa classe de enfermidades: o resfriado, gripe, pneumonia, COVID-19, asma, tuberculose, entre outras (1). Os maiores acometidos por tais síndromes respiratórias são os idosos. Dados do IBGE, demonstrando que a população idosa saltou de 11,3% para 14,7% de 2012 para 2023, devido ao rápido fenômeno de envelhecimento populacional, deve-se pensar em soluções para maximizar a qualidade e expectativa de vida dos longínquos (2). Além disso, os dados coletados também evidenciaram uma maior mortalidade entre pessoas de etnia branca quando comparadas com indivíduos negros e pardos, ainda que a segunda corresponda a uma parcela maior da população brasileira (4). Por fim, a acentuada incidência de doenças respiratórias em homens contrastando com a baixa ocorrência no sexo feminino, evidencia questões sociais como: o acesso à saúde e também os diferentes hábitos de vida (5).			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados epidemiológicos das doenças respiratórias em parâmetros de incidência em faixa etária, cor e sexo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise baseada em base de dados da plataforma DataSus e no IBGE, sobre mortalidade de doenças respiratórias no município de São Paulo referente ao ano de 2021. Selecionados 14 artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês, publicados entre 2004 e 2023, com os descritores "Respiratory Tract Diseases", "Aged", "Racial Groups" e "Effective Access to Health Services".			
<b>RESULTADO S</b>	As análises dos dados mostraram maior mortalidade de idosos (15%) com eixo na faixa etária, e em hospitais com base no local de ocorrência, colocando em discussão as causas para que isso ocorresse, como a maior susceptibilidade fisiológica e imunológica, particularmente às infecções, contribuindo para a redução da capacidade física, biológica e diminuição de sua autonomia. Além disso, durante o desenvolvimento da senescência há redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e delimitação dos valores da pressão de inspiração e expiração máximos. Associado a isso, há ainda, a diminuição dos cílios do epitélio respiratório e queda da eficiência da tosse na população idosa. Outra análise realizada foi a questão racial, que tem maior prevalência na cor branca (69,52%), devido a maior noção de saúde e conhecimento acerca da busca de tratamento, o que traz como consequência uma maior contabilização de casos. Além disso, há distinção com base no sexo, tendo como prevalência os homens (52,23%), que buscam menos o acesso as redes de saúde e com isso acabam desenvolvendo mais doenças, como as respiratórias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Todos esses critérios analisados devem convergir para construção de políticas públicas e melhoria de saúde a fim de diminuir as taxas de mortalidade por doenças respiratórias e promover bem-estar social.			
<b>REFERENCIA S</b>	1- Façanha MC, Pinheiro AC. Doenças Respiratórias agudas em serviços de saúde entre 1996 e 2001, Fortaleza, CE. Rev. Saúde Pública. Jun 2004;38(3). 2- Cabral U. População cresce mas o número de pessoas com menos de 30 anos cai [internet]. Rio de Janeiro; 2022. [Acesso em: 2023 Set 2]. 3- Bahadir A, et al. Prevalência e desfechos de doenças comórbidas em pacientes idosos com doenças respiratórias. Geriatria e Gerontologia Internacional. Jul 2015;16(7).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14735	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027659 - ANA CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Óbitos por doenças respiratórias no município de São Paulo: estudo epidemiológico baseado em dados sócio demográficos.			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças respiratórias causam grande impacto na saúde pública, tendo alta prevalência de mortalidade. Fazem parte dessa classe de enfermidades: o resfriado, gripe, pneumonia, COVID-19, asma, tuberculose, entre outras (1). Os maiores acometidos por tais síndromes respiratórias são os idosos. Dados do IBGE, demonstrando que a população idosa saltou de 11,3% para 14,7% de 2012 para 2023, devido ao rápido fenômeno de envelhecimento populacional, deve-se pensar em soluções para maximizar a qualidade e expectativa de vida dos longínquos (2). Além disso, os dados coletados também evidenciaram uma maior mortalidade entre pessoas de etnia branca quando comparadas com indivíduos negros e pardos, ainda que a segunda corresponda a uma parcela maior da população brasileira (4). Por fim, a acentuada incidência de doenças respiratórias em homens contrastando com a baixa ocorrência no sexo feminino, evidencia questões sociais como: o acesso à saúde e também os diferentes hábitos de vida (5).			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados epidemiológicos das doenças respiratórias em parâmetros de incidência em faixa etária, cor e sexo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise baseada em base de dados da plataforma DataSus e no IBGE, sobre mortalidade de doenças respiratórias no município de São Paulo referente ao ano de 2021. Selecionados 14 artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês, publicados entre 2004 e 2023, com os descritores "Respiratory Tract Diseases", "Aged", "Racial Groups" e "Effective Access to Health Services".			
<b>RESULTADOS</b>	As análises dos dados mostraram maior mortalidade de idosos (15%) com eixo na faixa etária, e em hospitais com base no local de ocorrência, colocando em discussão as causas para que isso ocorresse, como a maior susceptibilidade fisiológica e imunológica, particularmente às infecções, contribuindo para a redução da capacidade física, biológica e diminuição de sua autonomia. Além disso, durante o desenvolvimento da senescência há redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e delimitação dos valores da pressão de inspiração e expiração máximos. Associado a isso, há ainda, a diminuição dos cílios do epitélio respiratório e queda da eficiência da tosse na população idosa. Outra análise realizada foi a questão racial, que tem maior prevalência na cor branca (69,52%), devido a maior noção de saúde e conhecimento acerca da busca de tratamento, o que traz como consequência uma maior contabilização de casos. Além disso, há distinção com base no sexo, tendo como prevalência os homens (52,23%), que buscam menos o acesso as redes de saúde e com isso acabam desenvolvendo mais doenças, como as respiratórias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Todos esses critérios analisados devem convergir para construção de políticas públicas e melhoria de saúde a fim de diminuir as taxas de mortalidade por doenças respiratórias e promover bem-estar social.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Façanha MC, Pinheiro AC. Doenças Respiratórias agudas em serviços de saúde entre 1996 e 2001, Fortaleza, CE. Rev. Saúde Pública. Jun 2004;38(3). 2- Cabral U. População cresce mas o número de pessoas com menos de 30 anos cai [internet]. Rio de Janeiro; 2022. [Acesso em: 2023 Set 2]. 3- Bahadir A, et al. Prevalência e desfechos de doenças comórbidas em pacientes idosos com doenças respiratórias. Geriatria e Gerontologia Internacional. Jul 2015;16(7).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14735	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027667 - FRANCISCA EVEÍZA CARLOS CAMPOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Óbitos por doenças respiratórias no município de São Paulo: estudo epidemiológico baseado em dados sócio demográficos.			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças respiratórias causam grande impacto na saúde pública, tendo alta prevalência de mortalidade. Fazem parte dessa classe de enfermidades: o resfriado, gripe, pneumonia, COVID-19, asma, tuberculose, entre outras (1). Os maiores acometidos por tais síndromes respiratórias são os idosos. Dados do IBGE, demonstrando que a população idosa saltou de 11,3% para 14,7% de 2012 para 2023, devido ao rápido fenômeno de envelhecimento populacional, deve-se pensar em soluções para maximizar a qualidade e expectativa de vida dos longínquos (2). Além disso, os dados coletados também evidenciaram uma maior mortalidade entre pessoas de etnia branca quando comparadas com indivíduos negros e pardos, ainda que a segunda corresponda a uma parcela maior da população brasileira (4). Por fim, a acentuada incidência de doenças respiratórias em homens contrastando com a baixa ocorrência no sexo feminino, evidencia questões sociais como: o acesso à saúde e também os diferentes hábitos de vida (5).			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados epidemiológicos das doenças respiratórias em parâmetros de incidência em faixa etária, cor e sexo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise baseada em base de dados da plataforma DataSus e no IBGE, sobre mortalidade de doenças respiratórias no município de São Paulo referente ao ano de 2021. Selecionados 14 artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês, publicados entre 2004 e 2023, com os descritores "Respiratory Tract Diseases", "Aged", "Racial Groups" e "Effective Access to Health Services".			
<b>RESULTADOS</b>	As análises dos dados mostraram maior mortalidade de idosos (15%) com eixo na faixa etária, e em hospitais com base no local de ocorrência, colocando em discussão as causas para que isso ocorresse, como a maior susceptibilidade fisiológica e imunológica, particularmente às infecções, contribuindo para a redução da capacidade física, biológica e diminuição de sua autonomia. Além disso, durante o desenvolvimento da senescência há redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e delimitação dos valores da pressão de inspiração e expiração máximos. Associado a isso, há ainda, a diminuição dos cílios do epitélio respiratório e queda da eficiência da tosse na população idosa. Outra análise realizada foi a questão racial, que tem maior prevalência na cor branca (69,52%), devido a maior noção de saúde e conhecimento acerca da busca de tratamento, o que traz como consequência uma maior contabilização de casos. Além disso, há distinção com base no sexo, tendo como prevalência os homens (52,23%), que buscam menos o acesso as redes de saúde e com isso acabam desenvolvendo mais doenças, como as respiratórias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Todos esses critérios analisados devem convergir para construção de políticas públicas e melhoria de saúde a fim de diminuir as taxas de mortalidade por doenças respiratórias e promover bem-estar social.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Façanha MC, Pinheiro AC. Doenças Respiratórias agudas em serviços de saúde entre 1996 e 2001, Fortaleza, CE. Rev. Saúde Pública. Jun 2004;38(3). 2- Cabral U. População cresce mas o número de pessoas com menos de 30 anos cai [internet]. Rio de Janeiro; 2022. [Acesso em: 2023 Set 2]. 3- Bahadir A, et al. Prevalência e desfechos de doenças comórbidas em pacientes idosos com doenças respiratórias. Geriatria e Gerontologia Internacional. Jul 2015;16(7).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14735	Epidemiologia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5027721 - JOÃO VITOR DA SILVA BORGES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Óbitos por doenças respiratórias no município de São Paulo: estudo epidemiológico baseado em dados sócio demográficos.			
<b>INTRODUCAO</b>	As doenças respiratórias causam grande impacto na saúde pública, tendo alta prevalência de mortalidade. Fazem parte dessa classe de enfermidades: o resfriado, gripe, pneumonia, COVID-19, asma, tuberculose, entre outras (1). Os maiores acometidos por tais síndromes respiratórias são os idosos. Dados do IBGE, demonstrando que a população idosa saltou de 11,3% para 14,7% de 2012 para 2023, devido ao rápido fenômeno de envelhecimento populacional, deve-se pensar em soluções para maximizar a qualidade e expectativa de vida dos longínquos (2). Além disso, os dados coletados também evidenciaram uma maior mortalidade entre pessoas de etnia branca quando comparadas com indivíduos negros e pardos, ainda que a segunda corresponda a uma parcela maior da população brasileira (4). Por fim, a acentuada incidência de doenças respiratórias em homens contrastando com a baixa ocorrência no sexo feminino, evidencia questões sociais como: o acesso à saúde e também os diferentes hábitos de vida (5).			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar dados epidemiológicos das doenças respiratórias em parâmetros de incidência em faixa etária, cor e sexo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise baseada em base de dados da plataforma DataSus e no IBGE, sobre mortalidade de doenças respiratórias no município de São Paulo referente ao ano de 2021. Selecionados 14 artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês, publicados entre 2004 e 2023, com os descritores "Respiratory Tract Diseases", "Aged", "Racial Groups" e "Effective Access to Health Services".			
<b>RESULTADOS</b>	As análises dos dados mostraram maior mortalidade de idosos (15%) com eixo na faixa etária, e em hospitais com base no local de ocorrência, colocando em discussão as causas para que isso ocorresse, como a maior susceptibilidade fisiológica e imunológica, particularmente às infecções, contribuindo para a redução da capacidade física, biológica e diminuição de sua autonomia. Além disso, durante o desenvolvimento da senescência há redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e delimitação dos valores da pressão de inspiração e expiração máximos. Associado a isso, há ainda, a diminuição dos cílios do epitélio respiratório e queda da eficiência da tosse na população idosa. Outra análise realizada foi a questão racial, que tem maior prevalência na cor branca (69,52%), devido a maior noção de saúde e conhecimento acerca da busca de tratamento, o que traz como consequência uma maior contabilização de casos. Além disso, há distinção com base no sexo, tendo como prevalência os homens (52,23%), que buscam menos o acesso as redes de saúde e com isso acabam desenvolvendo mais doenças, como as respiratórias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Todos esses critérios analisados devem convergir para construção de políticas públicas e melhoria de saúde a fim de diminuir as taxas de mortalidade por doenças respiratórias e promover bem-estar social.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Façanha MC, Pinheiro AC. Doenças Respiratórias agudas em serviços de saúde entre 1996 e 2001, Fortaleza, CE. Rev. Saúde Pública. Jun 2004;38(3). 2- Cabral U. População cresce mas o número de pessoas com menos de 30 anos cai [internet]. Rio de Janeiro; 2022. [Acesso em: 2023 Set 2]. 3- Bahadir A, et al. Prevalência e desfechos de doenças comórbidas em pacientes idosos com doenças respiratórias. Geriatria e Gerontologia Internacional. Jul 2015;16(7).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14738	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3394646 - JANAINA SANTANA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da beta-hematina como nanocarreadora das drogas miltefosina e paromomicina na leishmaniose visceral experimental			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada e pode ser letal se não diagnosticada e tratada corretamente. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães. Em 2016, foi liberado um medicamento à base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães tratados ainda continuam infectivos. Neste contexto, foi idealizado o projeto com a utilização da beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) com inclusão ou incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Resultados obtidos in vitro mostraram que a beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) pré-sintetizada revestida com 1 – 16 µg/ml de miltefosina, bem como a sHZ incorporada com paromomicina reduziram a carga parasitária de macrófagos infectados com a L. infantum. Sugerindo que o anidrido de hematina pode ser utilizado como um nanocarreador de drogas in vitro. Sabe-se que a sHZ, quando injetado intraperitonealmente em camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Assim, o presente projeto tem como objetivo avaliar em modelo experimental de leishmaniose visceral os compostos de sHZ efetivos nos experimentos in vitro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para isso foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem BALB/c (6 animais por grupo) infectadas com 107 promastigotas. Os animais receberam intraperitonealmente 500 µl de salina tamponada (PBS), com 800 µg de HZ (80 µl do estoque 10 mg/ml), ou HZ revestida com miltefosina (proporcional a 80 µl de 16µg/ml), ou HZ incorporada com paromomicina (150 mg de hemina com 100 mg de paramomicina), miltefosina (40 mg/kg) ou paromomicina (112 mg/kg). O tratamento foi realizado a cada 2 dois dias totalizando 5 doses. Após 7 dias os animais foram eutanasiados, os órgãos e sangue coletados, para a determinação da carga parasitária (diluição limitante) e a função hepática (por kits comerciais), respectivamente.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A carga parasitária foi significativamente reduzida com o tratamento com sHZ e a adição de drogas não melhorou o efeito de redução da carga parasitária. Foi possível detectar sHZ com ou sem adição de drogas principalmente no fígado e em menor quantidade no baço. Em relação a função hepática, os compostos de sHZ não alteraram as enzimas transaminase glutâmico-pirúvica, transaminase glutâmico-oxalacética e creatinina. No entanto, a creatinina estava alterada em 33% dos camundongos que receberam miltefosina intraperitoneal, estes animais apresentaram perda de peso e aparentemente o fígado tinha um tamanho menor.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, a sHZ introduzida intraperitonealmente, por si, já diminuiu a carga parasitária in vivo e a adição das drogas no composto diminuiu a eficácia da sHZ.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Elmahallawy EK, Alkhalidi AAM. Insights into Leishmania Molecules and Their Potential Contribution to the Virulence of the Parasite. Veterinary sciences. 2021;8(2).          Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021. Brasil. Guia de Vigilância em Saúde : volume único, Ministério da Saúde Brasília: Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços; 2019</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14738	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441770 - REBECA SANTANA SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da beta-hematina como nanocarreadora das drogas miltefosina e paromomicina na leishmaniose visceral experimental			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada e pode ser letal se não diagnosticada e tratada corretamente. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães. Em 2016, foi liberado um medicamento à base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães tratados ainda continuam infectivos. Neste contexto, foi idealizado o projeto com a utilização da beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) com inclusão ou incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Resultados obtidos in vitro mostraram que a beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) pré-sintetizada revestida com 1 – 16 µg/ml de miltefosina, bem como a sHZ incorporada com paromomicina reduziram a carga parasitária de macrófagos infectados com a L. infantum. Sugerindo que o anidrido de hematina pode ser utilizado como um nanocarreador de drogas in vitro. Sabe-se que a sHZ, quando injetado intraperitonealmente em camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Assim, o presente projeto tem como objetivo avaliar em modelo experimental de leishmaniose visceral os compostos de sHZ efetivos nos experimentos in vitro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para isso foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem BALB/c (6 animais por grupo) infectadas com 107 promastigotas. Os animais receberam intraperitonealmente 500 µl de salina tamponada (PBS), com 800 µg de HZ (80 µl do estoque 10 mg/ml), ou HZ revestida com miltefosina (proporcional a 80 µl de 16µg/ml), ou HZ incorporada com paromomicina (150 mg de hemina com 100 mg de paromomicina), miltefosina (40 mg/kg) ou paromomicina (112 mg/kg). O tratamento foi realizado a cada 2 dois dias totalizando 5 doses. Após 7 dias os animais foram eutanasiados, os órgãos e sangue coletados, para a determinação da carga parasitária (diluição limitante) e a função hepática (por kits comerciais), respectivamente.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A carga parasitária foi significativamente reduzida com o tratamento com sHZ e a adição de drogas não melhorou o efeito de redução da carga parasitária. Foi possível detectar sHZ com ou sem adição de drogas principalmente no fígado e em menor quantidade no baço. Em relação a função hepática, os compostos de sHZ não alteraram as enzimas transaminase glutâmico-pirúvica, transaminase glutâmico-oxalacética e creatinina. No entanto, a creatinina estava alterada em 33% dos camundongos que receberam miltefosina intraperitoneal, estes animais apresentaram perda de peso e aparentemente o fígado tinha um tamanho menor.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, a sHZ introduzida intraperitonealmente, por si, já diminuiu a carga parasitária in vivo e a adição das drogas no composto diminuiu a eficácia da sHZ.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Elmahallawy EK, Alkhalidi AAM. Insights into Leishmania Molecules and Their Potential Contribution to the Virulence of the Parasite. Veterinary sciences. 2021;8(2).          Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021. Brasil. Guia de Vigilância em Saúde : volume único, Ministério da Saúde Brasília: Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços; 2019</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14738	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4847393 - RENAN SANTOS BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da beta-hematina como nanocarreadora das drogas miltefosina e paromomicina na leishmaniose visceral experimental			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada e pode ser letal se não diagnosticada e tratada corretamente. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães. Em 2016, foi liberado um medicamento à base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães tratados ainda continuam infectivos. Neste contexto, foi idealizado o projeto com a utilização da beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) com inclusão ou incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Resultados obtidos in vitro mostraram que a beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) pré-sintetizada revestida com 1 – 16 µg/ml de miltefosina, bem como a sHZ incorporada com paromomicina reduziram a carga parasitária de macrófagos infectados com a L. infantum. Sugerindo que o anidrido de hematina pode ser utilizado como um nanocarreador de drogas in vitro. Sabe-se que a sHZ, quando injetado intraperitonealmente em camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Assim, o presente projeto tem como objetivo avaliar em modelo experimental de leishmaniose visceral os compostos de sHZ efetivos nos experimentos in vitro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para isso foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem BALB/c (6 animais por grupo) infectadas com 107 promastigotas. Os animais receberam intraperitonealmente 500 µl de salina tamponada (PBS), com 800 µg de HZ (80 µl do estoque 10 mg/ml), ou HZ revestida com miltefosina (proporcional a 80 µl de 16µg/ml), ou HZ incorporada com paromomicina (150 mg de hemina com 100 mg de paramomicina), miltefosina (40 mg/kg) ou paromomicina (112 mg/kg). O tratamento foi realizado a cada 2 dois dias totalizando 5 doses. Após 7 dias os animais foram eutanasiados, os órgãos e sangue coletados, para a determinação da carga parasitária (diluição limitante) e a função hepática (por kits comerciais), respectivamente.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A carga parasitária foi significativamente reduzida com o tratamento com sHZ e a adição de drogas não melhorou o efeito de redução da carga parasitária. Foi possível detectar sHZ com ou sem adição de drogas principalmente no fígado e em menor quantidade no baço. Em relação a função hepática, os compostos de sHZ não alteraram as enzimas transaminase glutâmico-pirúvica, transaminase glutâmico-oxalacética e creatinina. No entanto, a creatinina estava alterada em 33% dos camundongos que receberam miltefosina intraperitoneal, estes animais apresentaram perda de peso e aparentemente o fígado tinha um tamanho menor.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, a sHZ introduzida intraperitonealmente, por si, já diminuiu a carga parasitária in vivo e a adição das drogas no composto diminuiu a eficácia da sHZ.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Elmahallawy EK, Alkhalidi AAM. Insights into Leishmania Molecules and Their Potential Contribution to the Virulence of the Parasite. Veterinary sciences. 2021;8(2). Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021. Brasil. Guia de Vigilância em Saúde : volume único, Ministério da Saúde Brasília: Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços; 2019</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14739	Nutrição	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3849813 - NAYARA NAKAYANE TAVARES DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Raquel Nunes Silva		JÉSSICA CRISTINA GIMENES
<b>TITULO</b>	Educação Alimentar e Nutricional para crianças neuro divergentes na Atenção Primária em Saúde			
<b>INTRODUCA O</b>	Crianças neuro divergentes são frequentemente estereotipadas, sujeitas à discriminação e violações de direitos humanos. A inserção nas escolas dessas crianças vem crescendo e as maiores características e dificuldade são: estabelecer conexão com o mundo ao seu redor, seletividade alimentar, dificuldade motoras, fala e interpretação. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018) e a LDB (BRASIL, 2013) os fatores de integração e relação social são cruciais e obrigatórios ao desenvolvimento das crianças pequenas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Aplicar atividade de educação em saúde para trabalhar desenvolvimento cognitivo, coordenação motora fina e estimular interesse por alimentos de crianças entre 6 e 12 anos neuro divergentes de uma Unidade Básica de Saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram da atividade 8 crianças entre 6 e 12 anos de uma Unidade Básica de Saúde no município de Santo Amaro (Capela do Socorro, São Paulo). Para realização da atividade foram utilizados os seguintes materiais: barbante, tesoura, imagens ilustrativas de animais e alimentos.			
<b>RESULTADO S</b>	Foi aplicado um jogo lúdico para as crianças chamado "de onde vem", nele constava quatro ilustrações principais, tais como: galinha, vaca, solo e árvore, que foram dispostas no chão. Outras ilustrações como: leite, frutas, carnes, ovos e legumes foram dispostas ao redor das ilustrações principais. Foi entregue para as crianças pedaços de barbante, no qual ela deveria escolher um alimento e conectá-lo a uma das ilustrações principais, no intuito de entender a origem do alimento.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A atividade ocorreu de maneira organizada, em tempo hábil, atendendo aos princípios da Atenção Primária em Saúde. Todas as crianças participaram, sociabilizaram sem distrações e mostraram interesse na atividade, conectando adequadamente os alimentos em suas origens. Três crianças com déficit cognitivo apresentaram insegurança em ligar os alimentos, mas quando incentivadas e estimuladas conseguiram realizar a atividade com êxito. Duas crianças com transtorno do espectro autista nível de suporte 3, participaram da atividade e apresentaram semblante de contemplação, os pais auxiliaram na atividade. A educação alimentar e nutricional se mostra um importante aliado para melhora da seletividade alimentar em crianças.			
<b>REFERENCIA S</b>	NIZO, Nisia Camargo Caetano. Eduardo Alberto as Silva. O LÚDICO COMO POSSIBILIDADE PARA A APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH). Disponível em: <a href="https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17565_9440.pdf">https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17565_9440.pdf</a> . COSTA, Camila Rodrigues. Jaqueline Costa Castilho MOREIRA. Manoel Osmar SEABRA JÚNIOR. Estratégias de Ensino e Recursos Pedagógicos para o Ensino de Alunos com TDAH em Aulas de Educação Física. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/pdf/rbee/v21n1/1413-6538-rbee-21-01-00111.pdf">https://www.scielo.br/pdf/rbee/v21n1/1413-6538-rbee-21-01-00111.pdf</a> BRASIL. [BNCC]. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília DF, [2018] Disponível em: Acesso em: 20 jun. 2022. BRASIL. [LDB] Ministério da Educação. Lei de Bases e Diretrizes. Brasília DF, [2018]. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2022			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14739	Nutrição	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4335163 - HENRIQUE CRISTIAN DA SILVA LEAL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Raquel Nunes Silva		JÉSSICA CRISTINA GIMENES
<b>TITULO</b>	Educação Alimentar e Nutricional para crianças neuro divergentes na Atenção Primária em Saúde			
<b>INTRODUCAO</b>	Crianças neuro divergentes são frequentemente estereotipadas, sujeitas à discriminação e violações de direitos humanos. A inserção nas escolas dessas crianças vem crescendo e as maiores características e dificuldade são: estabelecer conexão com o mundo ao seu redor, seletividade alimentar, dificuldade motoras, fala e interpretação. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018) e a LDB (BRASIL, 2013) os fatores de integração e relação social são cruciais e obrigatórios ao desenvolvimento das crianças pequenas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Aplicar atividade de educação em saúde para trabalhar desenvolvimento cognitivo, coordenação motora fina e estimular interesse por alimentos de crianças entre 6 e 12 anos neuro divergentes de uma Unidade Básica de Saúde.			
<b>METODOLOGIA</b>	Participaram da atividade 8 crianças entre 6 e 12 anos de uma Unidade Básica de Saúde no município de Santo Amaro (Capela do Socorro, São Paulo). Para realização da atividade foram utilizados os seguintes materiais: barbante, tesoura, imagens ilustrativas de animais e alimentos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi aplicado um jogo lúdico para as crianças chamado "de onde vem", nele constava quatro ilustrações principais, tais como: galinha, vaca, solo e árvore, que foram dispostas no chão. Outras ilustrações como: leite, frutas, carnes, ovos e legumes foram dispostas ao redor das ilustrações principais. Foi entregue para as crianças pedaços de barbante, no qual ela deveria escolher um alimento e conectá-lo a uma das ilustrações principais, no intuito de entender a origem do alimento.			
<b>CONCLUSOES</b>	A atividade ocorreu de maneira organizada, em tempo hábil, atendendo aos princípios da Atenção Primária em Saúde. Todas as crianças participaram, sociabilizaram sem distrações e mostraram interesse na atividade, conectando adequadamente os alimentos em suas origens. Três crianças com déficit cognitivo apresentaram insegurança em ligar os alimentos, mas quando incentivadas e estimuladas conseguiram realizar a atividade com êxito. Duas crianças com transtorno do espectro autista nível de suporte 3, participaram da atividade e apresentaram semblante de contemplação, os pais auxiliaram na atividade. A educação alimentar e nutricional se mostra um importante aliado para melhora da seletividade alimentar em crianças.			
<b>REFERENCIAS</b>	NIZO, Nisia Camargo Caetano. Eduardo Alberto as Silva. O LÚDICO COMO POSSIBILIDADE PARA A APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH). Disponível em: <a href="https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17565_9440.pdf">https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17565_9440.pdf</a> . COSTA, Camila Rodrigues. Jaqueline Costa Castilho MOREIRA. Manoel Osmar SEABRA JÚNIOR. Estratégias de Ensino e Recursos Pedagógicos para o Ensino de Alunos com TDAH em Aulas de Educação Física. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/pdf/rbee/v21n1/1413-6538-rbee-21-01-00111.pdf">https://www.scielo.br/pdf/rbee/v21n1/1413-6538-rbee-21-01-00111.pdf</a> BRASIL. [BNCC]. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília DF, [2018] Disponível em: Acesso em: 20 jun. 2022. BRASIL. [LDB] Ministério da Educação. Lei de Bases e Diretrizes. Brasília DF, [2018]. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2022			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14740	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3003591 - LETÍCIA OLIVEIRA DOS ANJOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Elisomar Silva Santana		
<b>TITULO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) aplicado ao Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) no âmbito de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de São Paulo.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Segundo a Federação Internacional de Diabetes (2021), o diabetes é considerado um importante problema de saúde pública que atinge níveis alarmantes, mais de meio bilhão de pessoas vivendo com a enfermidade em todo o mundo. A prevenção das complicações passa por intervenções terapêuticas direcionadas, entre elas, o controle rigoroso da glicemia. As principais abordagens são dosagem de hemoglobina glicada (A1c) e o automonitoramento glicêmico (AMG). Seguindo as orientações do PAMG, todas as pessoas que utilizam insulina devem ser cadastradas e acompanhadas continuamente pelas equipes de saúde. Contudo, foi possível identificar dificuldades no acompanhamento e gestão, tanto do absenteísmo quanto da dosagem periódica da (A1c), uma vez que cada uma das cinco equipes controlava manualmente e o enfermeiro responsável pelo PAMG não possuía uma visão ampla dos usuários da UBS. Diante da situação observada após aplicação do PES, realizou-se a intervenção necessária.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Criar ferramenta de controle para facilitar a gestão e o acompanhamento pelo enfermeiro aos pacientes cadastrados do PAMG.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) para identificar e priorizar os problemas relativos à gestão do PAMG por parte do enfermeiro e propor intervenção ao problema priorizado.			
<b>RESULTADOS</b>	Utilizando as planilhas de controle de usuários de cada equipe já existentes, foi implementado a automatização de vários campos, de modo que, inserindo a data de retirada do material na planilha ela sinaliza o status da situação, mostrando "Em dia" para aqueles que retiraram o material em até 60 dias, "Realizar busca ativa" para os ausentes há mais de 60 dias e "Inativar" para aqueles que não compareceram nos últimos 180 dias. Quanto ao controle dosagem periódica de (A1c), colocando-se a data do último exame, a planilha calcula a data do próximo exame a ser realizado, conforme protocolo do AMG, e mostra o status da renovação. Se não tiver a data do último exame na planilha, aparece no status "Sem informação", "Em dia" aparece se o último exame foi realizado nos últimos 60 dias, se faltam 30 dias para o vencimento, aparece automaticamente o status "Próximo ao vencimento" e "Exames vencidos" aparece se o último foi realizado há mais de 90 dias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com a automatização dos status de comparecimento e de controle de exames, além de facilitar o acompanhamento dos usuários por parte da equipe, devido às sinalizações automáticas da planilha, foi possível criar o painel de controle contendo as informações de total e porcentagem de usuários por cada equipe, gráfico de rosca com os status do exame, tipos de diabetes e status de comparecimento dos usuários por equipes, o que permitiu facilitar a gestão do programa AMG e o acompanhamento dos usuários por parte do enfermeiro responsável.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. International Diabetes Federation [homepage na internet]. IDF Diabetes Atlas 2021. 10th 2021 [acesso em 18 set 2023]. Disponível em: <a href="https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/">https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/</a> . 2. Município de São Paulo [homepage na internet]. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico [acesso em 13 set 2023]. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> . 3. Faria HC, Campos FCC, Santos MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG; 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14740	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3496686 - ANGELA APARECIDA DE MEDEIROS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Elisomar Silva Santana		
<b>TITULO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) aplicado ao Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) no âmbito de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de São Paulo.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Segundo a Federação Internacional de Diabetes (2021), o diabetes é considerado um importante problema de saúde pública que atinge níveis alarmantes, mais de meio bilhão de pessoas vivendo com a enfermidade em todo o mundo. A prevenção das complicações passa por intervenções terapêuticas direcionadas, entre elas, o controle rigoroso da glicemia. As principais abordagens são dosagem de hemoglobina glicada (A1c) e o automonitoramento glicêmico (AMG). Seguindo as orientações do PAMG, todas as pessoas que utilizam insulina devem ser cadastradas e acompanhadas continuamente pelas equipes de saúde. Contudo, foi possível identificar dificuldades no acompanhamento e gestão, tanto do absenteísmo quanto da dosagem periódica da (A1c), uma vez que cada uma das cinco equipes controlava manualmente e o enfermeiro responsável pelo PAMG não possuía uma visão ampla dos usuários da UBS. Diante da situação observada após aplicação do PES, realizou-se a intervenção necessária.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Criar ferramenta de controle para facilitar a gestão e o acompanhamento pelo enfermeiro aos pacientes cadastrados do PAMG.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) para identificar e priorizar os problemas relativos à gestão do PAMG por parte do enfermeiro e propor intervenção ao problema priorizado.			
<b>RESULTADOS</b>	Utilizando as planilhas de controle de usuários de cada equipe já existentes, foi implementado a automatização de vários campos, de modo que, inserindo a data de retirada do material na planilha ela sinaliza o status da situação, mostrando "Em dia" para aqueles que retiraram o material em até 60 dias, "Realizar busca ativa" para os ausentes há mais de 60 dias e "Inativar" para aqueles que não compareceram nos últimos 180 dias. Quanto ao controle dosagem periódica de (A1c), colocando-se a data do último exame, a planilha calcula a data do próximo exame a ser realizado, conforme protocolo do AMG, e mostra o status da renovação. Se não tiver a data do último exame na planilha, aparece no status "Sem informação", "Em dia" aparece se o último exame foi realizado nos últimos 60 dias, se faltam 30 dias para o vencimento, aparece automaticamente o status "Próximo ao vencimento" e "Exames vencidos" aparece se o último foi realizado há mais de 90 dias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com a automatização dos status de comparecimento e de controle de exames, além de facilitar o acompanhamento dos usuários por parte da equipe, devido às sinalizações automáticas da planilha, foi possível criar o painel de controle contendo as informações de total e porcentagem de usuários por cada equipe, gráfico de rosca com os status do exame, tipos de diabetes e status de comparecimento dos usuários por equipes, o que permitiu facilitar a gestão do programa AMG e o acompanhamento dos usuários por parte do enfermeiro responsável.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. International Diabetes Federation [homepage na internet]. IDF Diabetes Atlas 2021. 10th 2021 [acesso em 18 set 2023]. Disponível em: <a href="https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/">https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/</a> . 2. Município de São Paulo [homepage na internet]. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico [acesso em 13 set 2023]. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> . 3. Faria HC, Campos FCC, Santos MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFGM; 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14740	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4311639 - ANDRE SANTOS ALMEIDA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Elisomar Silva Santana		
<b>TITULO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) aplicado ao Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) no âmbito de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de São Paulo.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Segundo a Federação Internacional de Diabetes (2021), o diabetes é considerado um importante problema de saúde pública que atinge níveis alarmantes, mais de meio bilhão de pessoas vivendo com a enfermidade em todo o mundo. A prevenção das complicações passa por intervenções terapêuticas direcionadas, entre elas, o controle rigoroso da glicemia. As principais abordagens são dosagem de hemoglobina glicada (A1c) e o automonitoramento glicêmico (AMG). Seguindo as orientações do PAMG, todas as pessoas que utilizam insulina devem ser cadastradas e acompanhadas continuamente pelas equipes de saúde. Contudo, foi possível identificar dificuldades no acompanhamento e gestão, tanto do absenteísmo quanto da dosagem periódica da (A1c), uma vez que cada uma das cinco equipes controlava manualmente e o enfermeiro responsável pelo PAMG não possuía uma visão ampla dos usuários da UBS. Diante da situação observada após aplicação do PES, realizou-se a intervenção necessária.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Criar ferramenta de controle para facilitar a gestão e o acompanhamento pelo enfermeiro aos pacientes cadastrados do PAMG.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) para identificar e priorizar os problemas relativos à gestão do PAMG por parte do enfermeiro e propor intervenção ao problema priorizado.			
<b>RESULTADOS</b>	Utilizando as planilhas de controle de usuários de cada equipe já existentes, foi implementado a automatização de vários campos, de modo que, inserindo a data de retirada do material na planilha ela sinaliza o status da situação, mostrando "Em dia" para aqueles que retiraram o material em até 60 dias, "Realizar busca ativa" para os ausentes há mais de 60 dias e "Inativar" para aqueles que não compareceram nos últimos 180 dias. Quanto ao controle dosagem periódica de (A1c), colocando-se a data do último exame, a planilha calcula a data do próximo exame a ser realizado, conforme protocolo do AMG, e mostra o status da renovação. Se não tiver a data do último exame na planilha, aparece no status "Sem informação", "Em dia" aparece se o último exame foi realizado nos últimos 60 dias, se faltam 30 dias para o vencimento, aparece automaticamente o status "Próximo ao vencimento" e "Exames vencidos" aparece se o último foi realizado há mais de 90 dias.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Com a automatização dos status de comparecimento e de controle de exames, além de facilitar o acompanhamento dos usuários por parte da equipe, devido às sinalizações automáticas da planilha, foi possível criar o painel de controle contendo as informações de total e porcentagem de usuários por cada equipe, gráfico de rosca com os status do exame, tipos de diabetes e status de comparecimento dos usuários por equipes, o que permitiu facilitar a gestão do programa AMG e o acompanhamento dos usuários por parte do enfermeiro responsável.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. International Diabetes Federation [homepage na internet]. IDF Diabetes Atlas 2021. 10th 2021 [acesso em 18 set 2023]. Disponível em: <a href="https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/">https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/</a> . 2. Município de São Paulo [homepage na internet]. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico [acesso em 13 set 2023]. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> . 3. Faria HC, Campos FCC, Santos MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG; 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14740	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4464958 - MICHELLE ALVES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Elisomar Silva Santana		
<b>TITULO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) aplicado ao Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) no âmbito de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de São Paulo.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Segundo a Federação Internacional de Diabetes (2021), o diabetes é considerado um importante problema de saúde pública que atinge níveis alarmantes, mais de meio bilhão de pessoas vivendo com a enfermidade em todo o mundo. A prevenção das complicações passa por intervenções terapêuticas direcionadas, entre elas, o controle rigoroso da glicemia. As principais abordagens são dosagem de hemoglobina glicada (A1c) e o automonitoramento glicêmico (AMG). Seguindo as orientações do PAMG, todas as pessoas que utilizam insulina devem ser cadastradas e acompanhadas continuamente pelas equipes de saúde. Contudo, foi possível identificar dificuldades no acompanhamento e gestão, tanto do absenteísmo quanto da dosagem periódica da (A1c), uma vez que cada uma das cinco equipes controlava manualmente e o enfermeiro responsável pelo PAMG não possuía uma visão ampla dos usuários da UBS. Diante da situação observada após aplicação do PES, realizou-se a intervenção necessária.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Criar ferramenta de controle para facilitar a gestão e o acompanhamento pelo enfermeiro aos pacientes cadastrados do PAMG.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) para identificar e priorizar os problemas relativos à gestão do PAMG por parte do enfermeiro e propor intervenção ao problema priorizado.			
<b>RESULTADO S</b>	Utilizando as planilhas de controle de usuários de cada equipe já existentes, foi implementado a automatização de vários campos, de modo que, inserindo a data de retirada do material na planilha ela sinaliza o status da situação, mostrando "Em dia" para aqueles que retiraram o material em até 60 dias, "Realizar busca ativa" para os ausentes há mais de 60 dias e "Inativar" para aqueles que não compareceram nos últimos 180 dias. Quanto ao controle dosagem periódica de (A1c), colocando-se a data do último exame, a planilha calcula a data do próximo exame a ser realizado, conforme protocolo do AMG, e mostra o status da renovação. Se não tiver a data do último exame na planilha, aparece no status "Sem informação", "Em dia" aparece se o último exame foi realizado nos últimos 60 dias, se faltam 30 dias para o vencimento, aparece automaticamente o status "Próximo ao vencimento" e "Exames vencidos" aparece se o último foi realizado há mais de 90 dias.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Com a automatização dos status de comparecimento e de controle de exames, além de facilitar o acompanhamento dos usuários por parte da equipe, devido às sinalizações automáticas da planilha, foi possível criar o painel de controle contendo as informações de total e porcentagem de usuários por cada equipe, gráfico de rosca com os status do exame, tipos de diabetes e status de comparecimento dos usuários por equipes, o que permitiu facilitar a gestão do programa AMG e o acompanhamento dos usuários por parte do enfermeiro responsável.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. International Diabetes Federation [homepage na internet]. IDF Diabetes Atlas 2021. 10th 2021 [acesso em 18 set 2023]. Disponível em: <a href="https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/">https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/</a> . 2. Município de São Paulo [homepage na internet]. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico [acesso em 13 set 2023]. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> . 3. Faria HC, Campos FCC, Santos MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFGM; 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14740	Enfermagem de Saúde Pública	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4525728 - RAFAELLA DA COSTA LOTTI TARGA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Elisomar Silva Santana		
<b>TITULO</b>	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) aplicado ao Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) no âmbito de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de São Paulo.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Segundo a Federação Internacional de Diabetes (2021), o diabetes é considerado um importante problema de saúde pública que atinge níveis alarmantes, mais de meio bilhão de pessoas vivendo com a enfermidade em todo o mundo. A prevenção das complicações passa por intervenções terapêuticas direcionadas, entre elas, o controle rigoroso da glicemia. As principais abordagens são dosagem de hemoglobina glicada (A1c) e o automonitoramento glicêmico (AMG). Seguindo as orientações do PAMG, todas as pessoas que utilizam insulina devem ser cadastradas e acompanhadas continuamente pelas equipes de saúde. Contudo, foi possível identificar dificuldades no acompanhamento e gestão, tanto do absenteísmo quanto da dosagem periódica da (A1c), uma vez que cada uma das cinco equipes controlava manualmente e o enfermeiro responsável pelo PAMG não possuía uma visão ampla dos usuários da UBS. Diante da situação observada após aplicação do PES, realizou-se a intervenção necessária.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Criar ferramenta de controle para facilitar a gestão e o acompanhamento pelo enfermeiro aos pacientes cadastrados do PAMG.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) para identificar e priorizar os problemas relativos à gestão do PAMG por parte do enfermeiro e propor intervenção ao problema priorizado.			
<b>RESULTADOS</b>	Utilizando as planilhas de controle de usuários de cada equipe já existentes, foi implementado a automatização de vários campos, de modo que, inserindo a data de retirada do material na planilha ela sinaliza o status da situação, mostrando "Em dia" para aqueles que retiraram o material em até 60 dias, "Realizar busca ativa" para os ausentes há mais de 60 dias e "Inativar" para aqueles que não compareceram nos últimos 180 dias. Quanto ao controle dosagem periódica de (A1c), colocando-se a data do último exame, a planilha calcula a data do próximo exame a ser realizado, conforme protocolo do AMG, e mostra o status da renovação. Se não tiver a data do último exame na planilha, aparece no status "Sem informação", "Em dia" aparece se o último exame foi realizado nos últimos 60 dias, se faltam 30 dias para o vencimento, aparece automaticamente o status "Próximo ao vencimento" e "Exames vencidos" aparece se o último foi realizado há mais de 90 dias.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Com a automatização dos status de comparecimento e de controle de exames, além de facilitar o acompanhamento dos usuários por parte da equipe, devido às sinalizações automáticas da planilha, foi possível criar o painel de controle contendo as informações de total e porcentagem de usuários por cada equipe, gráfico de rosca com os status do exame, tipos de diabetes e status de comparecimento dos usuários por equipes, o que permitiu facilitar a gestão do programa AMG e o acompanhamento dos usuários por parte do enfermeiro responsável.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. International Diabetes Federation [homepage na internet]. IDF Diabetes Atlas 2021. 10th 2021 [acesso em 18 set 2023]. Disponível em: <a href="https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/">https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/</a> . 2. Município de São Paulo [homepage na internet]. AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico [acesso em 13 set 2023]. Disponível em: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070">https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=6070</a> . 3. Faria HC, Campos FCC, Santos MA. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG; 2017.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14741	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roberto Rodrigues da Rosa Filho	Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	IMPACTO DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO NOS FETOS DE UMA PACIENTE GESTANTE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O protocolo anestésico da cadela gestante é desafiador, pois deve proporcionar boas condições cirúrgicas, mantendo a saúde dos fetos e da fêmea. Os fármacos possuem capacidade de atravessar a barreira placentária, não sendo possível anestésias seletivamente a fêmea. Malformações fetais podem ser ocasionadas por agentes teratogênicos ou hereditariedade. Agentes teratogênicos possuem maior risco de levar a malformações fetais no primeiro e segundo terço da gestação (período de organogênese), tendo em vista essa afirmativa, é necessário analisar a necessidade de submeter a matriz à terapêutica, tendo em vista os riscos. Estudos alegam que a anestesia por si só não aumenta a probabilidade de teratogenia, entretanto, associado à demais fatores (distúrbio nutricional, fármacos administrados, doenças infecciosas) há maiores chances de acometimento fetal. É primordial evitar a ocorrência de hipotensão no transcirúrgico, tendo em vista que pode levar a diminuição da perfusão sanguínea uterina, podendo acometer de forma direta o feto.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho relata a anestesia de uma cadela gestante e o impacto da anestesia no desenvolvimento embrionário.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Uma fêmea, canina, da raça yorkshire, 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi realizada a avaliação oftalmológica, onde foi possível constatar a presença de úlcera de córnea com exposição da camada de descemet. Devido a profundidade da úlcera, foi optado pela realização do procedimento cirúrgico de flap pediculado. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-anestésica com tramadol 3 mg/kg IM, decorrido 15 minutos foi canulado acesso venoso na veia cefálica e indução com propofol 5 mg/kg IV, após intubação orotraqueal com sonda número 4, a paciente foi mantida em infusão contínua de dexmedetomidina 2 mcg/kg/h e propofol a taxa variando de acordo com o plano anestésico, não ultrapassando a taxa de 0,6 mg/kg/min e instilado colírio anestésico tópico. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 25 mg/kg IV.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Na ultrassonografia de acompanhamento gestacional realizada previamente ao procedimento cirúrgico a paciente apresentava aproximadamente 36 dias de gestação e um dos fetos com perda da definição da calota craniana. Após a intervenção cirúrgica, foram realizadas novas ultrassonografias abdominais, que sugeriram dilatação ventricular de um dos fetos. Na cesariana foram visualizados 6 filhotes, e dentre eles, um possuía anencefalia e outro de hidrocefalia. Os demais não apresentaram malformações até o presente momento.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>A anencefalia e malformações fetais pode ser ocasionada por diversos fatores, dentre eles: doenças virais, administrações de determinados fármacos durante o período de gestação, radiações, contato com toxinas, hipervitaminose A ou D, deficiência de ácido fólico. Mesmo havendo o risco de malformação fetal, a intervenção cirúrgica da paciente foi de extrema importância para evitar a perda e perfuração do bulbo ocular. Mais estudos são necessários para investigar a causa da anencefalia em cães.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>DAHMER, et al. Anencefalia em cão – relato de caso. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, janeiro de 2012. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010. VASCONCELOS, Camila. Anestesia na cadela gestante. Universidade de Brasília, 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14741	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3534634 - GIOVANNA FUNISCELLO DE SOUSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roberto Rodrigues da Rosa Filho	Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	IMPACTO DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO NOS FETOS DE UMA PACIENTE GESTANTE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O protocolo anestésico da cadela gestante é desafiador, pois deve proporcionar boas condições cirúrgicas, mantendo a saúde dos fetos e da fêmea. Os fármacos possuem capacidade de atravessar a barreira placentária, não sendo possível anestésias seletivamente a fêmea. Malformações fetais podem ser ocasionadas por agentes teratogênicos ou hereditariedade. Agentes teratogênicos possuem maior risco de levar a malformações fetais no primeiro e segundo terço da gestação (período de organogênese), tendo em vista essa afirmativa, é necessário analisar a necessidade de submeter a matriz à terapêutica, tendo em vista os riscos. Estudos alegam que a anestesia por si só não aumenta a probabilidade de teratogenia, entretanto, associado à demais fatores (distúrbio nutricional, fármacos administrados, doenças infecciosas) há maiores chances de acometimento fetal. É primordial evitar a ocorrência de hipotensão no transcirúrgico, tendo em vista que pode levar a diminuição da perfusão sanguínea uterina, podendo acometer de forma direta o feto.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho relata a anestesia de uma cadela gestante e o impacto da anestesia no desenvolvimento embrionário.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Uma fêmea, canina, da raça yorkshire, 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi realizada a avaliação oftalmológica, onde foi possível constatar a presença de úlcera de córnea com exposição da camada de descemet. Devido a profundidade da úlcera, foi optado pela realização do procedimento cirúrgico de flap pediculado. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-anestésica com tramadol 3 mg/kg IM, decorrido 15 minutos foi canulado acesso venoso na veia cefálica e indução com propofol 5 mg/kg IV, após intubação orotraqueal com sonda número 4, a paciente foi mantida em infusão contínua de dexmedetomidina 2 mcg/kg/h e propofol a taxa variando de acordo com o plano anestésico, não ultrapassando a taxa de 0,6 mg/kg/min e instilado colírio anestésico tópico. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 25 mg/kg IV.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Na ultrassonografia de acompanhamento gestacional realizada previamente ao procedimento cirúrgico a paciente apresentava aproximadamente 36 dias de gestação e um dos fetos com perda da definição da calota craniana. Após a intervenção cirúrgica, foram realizadas novas ultrassonografias abdominais, que sugeriram dilatação ventricular de um dos fetos. Na cesariana foram visualizados 6 filhotes, e dentre eles, um possuía anencefalia e outro de hidrocefalia. Os demais não apresentaram malformações até o presente momento.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>A anencefalia e malformações fetais pode ser ocasionada por diversos fatores, dentre eles: doenças virais, administrações de determinados fármacos durante o período de gestação, radiações, contato com toxinas, hipervitaminose A ou D, deficiência de ácido fólico. Mesmo havendo o risco de malformação fetal, a intervenção cirúrgica da paciente foi de extrema importância para evitar a perda e perfuração do bulbo ocular. Mais estudos são necessários para investigar a causa da anencefalia em cães.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>DAHMER, et al. Anencefalia em cão – relato de caso. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, janeiro de 2012. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010. VASCONCELOS, Camila. Anestesia na cadela gestante. Universidade de Brasília, 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14741	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4847041 - MARIA FERNANDA ALMEIDA CARDOSO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roberto Rodrigues da Rosa Filho	Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	IMPACTO DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO NOS FETOS DE UMA PACIENTE GESTANTE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O protocolo anestésico da cadela gestante é desafiador, pois deve proporcionar boas condições cirúrgicas, mantendo a saúde dos fetos e da fêmea. Os fármacos possuem capacidade de atravessar a barreira placentária, não sendo possível anestésias seletivamente a fêmea. Malformações fetais podem ser ocasionadas por agentes teratogênicos ou hereditariedade. Agentes teratogênicos possuem maior risco de levar a malformações fetais no primeiro e segundo terço da gestação (período de organogênese), tendo em vista essa afirmativa, é necessário analisar a necessidade de submeter a matriz à terapêutica, tendo em vista os riscos. Estudos alegam que a anestesia por si só não aumenta a probabilidade de teratogenia, entretanto, associado à demais fatores (distúrbio nutricional, fármacos administrados, doenças infecciosas) há maiores chances de acometimento fetal. É primordial evitar a ocorrência de hipotensão no transcirúrgico, tendo em vista que pode levar a diminuição da perfusão sanguínea uterina, podendo acometer de forma direta o feto.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho relata a anestesia de uma cadela gestante e o impacto da anestesia no desenvolvimento embrionário.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Uma fêmea, canina, da raça yorkshire, 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi realizada a avaliação oftalmológica, onde foi possível constatar a presença de úlcera de córnea com exposição da camada de descemet. Devido a profundidade da úlcera, foi optado pela realização do procedimento cirúrgico de flap pediculado. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-anestésica com tramadol 3 mg/kg IM, decorrido 15 minutos foi canulado acesso venoso na veia cefálica e indução com propofol 5 mg/kg IV, após intubação orotraqueal com sonda número 4, a paciente foi mantida em infusão contínua de dexmedetomidina 2 mcg/kg/h e propofol a taxa variando de acordo com o plano anestésico, não ultrapassando a taxa de 0,6 mg/kg/min e instilado colírio anestésico tópico. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 25 mg/kg IV.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Na ultrassonografia de acompanhamento gestacional realizada previamente ao procedimento cirúrgico a paciente apresentava aproximadamente 36 dias de gestação e um dos fetos com perda da definição da calota craniana. Após a intervenção cirúrgica, foram realizadas novas ultrassonografias abdominais, que sugeriram dilatação ventricular de um dos fetos. Na cesariana foram visualizados 6 filhotes, e dentre eles, um possuía anencefalia e outro de hidrocefalia. Os demais não apresentaram malformações até o presente momento.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>A anencefalia e malformações fetais pode ser ocasionada por diversos fatores, dentre eles: doenças virais, administrações de determinados fármacos durante o período de gestação, radiações, contato com toxinas, hipervitaminose A ou D, deficiência de ácido fólico. Mesmo havendo o risco de malformação fetal, a intervenção cirúrgica da paciente foi de extrema importância para evitar a perda e perfuração do bulbo ocular. Mais estudos são necessários para investigar a causa da anencefalia em cães.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>DAHMER, et al. Anencefalia em cão – relato de caso. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, janeiro de 2012. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010. VASCONCELOS, Camila. Anestesia na cadela gestante. Universidade de Brasília, 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14741	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848110 - DANIELA SANTOS OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roberto Rodrigues da Rosa Filho	Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima	
<b>TITULO</b>	IMPACTO DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO NOS FETOS DE UMA PACIENTE GESTANTE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O protocolo anestésico da cadela gestante é desafiador, pois deve proporcionar boas condições cirúrgicas, mantendo a saúde dos fetos e da fêmea. Os fármacos possuem capacidade de atravessar a barreira placentária, não sendo possível anestésias seletivamente a fêmea. Malformações fetais podem ser ocasionadas por agentes teratogênicos ou hereditariedade. Agentes teratogênicos possuem maior risco de levar a malformações fetais no primeiro e segundo terço da gestação (período de organogênese), tendo em vista essa afirmativa, é necessário analisar a necessidade de submeter a matriz à terapêutica, tendo em vista os riscos. Estudos alegam que a anestesia por si só não aumenta a probabilidade de teratogenia, entretanto, associado à demais fatores (distúrbio nutricional, fármacos administrados, doenças infecciosas) há maiores chances de acometimento fetal. É primordial evitar a ocorrência de hipotensão no transcirúrgico, tendo em vista que pode levar a diminuição da perfusão sanguínea uterina, podendo acometer de forma direta o feto.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho relata a anestesia de uma cadela gestante e o impacto da anestesia no desenvolvimento embrionário.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Uma fêmea, canina, da raça yorkshire, 2 anos, deu entrada no hospital veterinário com queixa de blefaroespasmos no olho direito e gestação. Foi realizada a avaliação oftalmológica, onde foi possível constatar a presença de úlcera de córnea com exposição da camada de descemet. Devido a profundidade da úlcera, foi optado pela realização do procedimento cirúrgico de flap pediculado. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-anestésica com tramadol 3 mg/kg IM, decorrido 15 minutos foi canulado acesso venoso na veia cefálica e indução com propofol 5 mg/kg IV, após intubação orotraqueal com son da número 4, a paciente foi mantida em infusão contínua de dexmedetomidina 2 mcg/kg/h e propofol a taxa variando de acordo com o plano anestésico, não ultrapassando a taxa de 0,6 mg/kg/min e instilado colírio anestésico tópico. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 25 mg/kg IV.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Na ultrassonografia de acompanhamento gestacional realizada previamente ao procedimento cirúrgico a paciente apresentava aproximadamente 36 dias de gestação e um dos fetos com perda da definição da calota craniana. Após a intervenção cirúrgica, foram realizadas novas ultrassonografias abdominais, que sugeriram dilatação ventricular de um dos fetos. Na cesariana foram visualizados 6 filhotes, e dentre eles, um possuía anencefalia e outro de hidrocefalia. Os demais não apresentaram malformações até o presente momento.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>A anencefalia e malformações fetais pode ser ocasionada por diversos fatores, dentre eles: doenças virais, administrações de determinados fármacos durante o período de gestação, radiações, contato com toxinas, hipervitaminose A ou D, deficiência de ácido fólico. Mesmo havendo o risco de malformação fetal, a intervenção cirúrgica da paciente foi de extrema importância para evitar a perda e perfuração do bulbo ocular. Mais estudos são necessários para investigar a causa da anencefalia em cães.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>DAHMER, et al. Anencefalia em cão – relato de caso. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, janeiro de 2012. HUISINGA, et al. Anencephaly in a German Sheperd dog. Veterinary Pathology, volume 47, september 2010. VASCONCELOS, Camila. Anestesia na cadela gestante. Universidade de Brasília, 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14742	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4416350 - MARIA RITA MOURA SALES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE TEMPO EM ENFERMAGEM PARA DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA			
<b>INTRODUCAO</b>	Durante a realização do levantamento de dados sobre o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, identificamos a necessidade de elaboração e aplicação de um treinamento de primeiros socorros para os agentes comunitários de saúde (ACS) da unidade, necessitando da gestão eficaz do tempo em cada etapa do processo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o processo de intervenção do estágio de gestão diante da necessidade de gerenciar o tempo desde o desenvolvimento do projeto até a aplicação do treinamento e contabilização dos resultados levantados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em uma UBS na zona sul do Município de São Paulo, durante a intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES).			
<b>RESULTADO S</b>	Durante a vivência do estágio observamos a necessidade de uma intervenção voltada para orientação dos ACS por passarem grande parte do tempo em visitas no território adscrito tendo mais chances de se depararem com paradas cardiopulmonares e engasgos. Ao nos depararmos com esta questão nos organizamos em 5 etapas: revisão da literatura disponível, elaboração do treinamento, teste de eficácia, aplicação do treinamento e tabulação dos dados. Em todas as etapas fora necessário o manejo do tempo uma vez que tínhamos apenas uma semana para contemplar todas as etapas, então optamos pela utilização da matriz de gestão de tempo para organizar e contemplar todas as partes além da utilização da ferramenta 5W2H para ter mais de uma forma de visualizar e discutir o planejamento. Neste percurso foi necessário a capacidade de adaptação para a utilização de ferramentas improvisadas e artesanais como o uso de manequins montados, barbantes, impressos, caixa de som dentre outros sendo todos esses objetos previamente organizados em lista de checagem, testados e aprovados pelos autores como suficientes para a aplicação cientificamente correta, adequada e atualizada das práticas de primeiros socorros voltadas aos leigos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Através do uso das ferramentas de gestão conseguimos alcançar nossos objetivos dentro do prazo estipulado com tempo suficiente para lidar com as alterações de percurso que surgiram, apontando para a importância da utilização das ferramentas de gestão como Matriz de gestão de tempo, 5W2H, Check-list dentre outras para a previsão e provisão dos materiais, planejamento e conquista das metas levantadas.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Mancia JR, Cabral LC, Koerich MS. Educação permanente no contexto da enfermagem e na saúde. Rev Bras Enferm [Internet]. 2004Sep;57(5):605-10. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018">https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018</a> 2. Mello MC de, Fugulin FMT, Gaidzinski RR. O tempo no processo de trabalho em saúde: uma abordagem sociológica. Acta paul enferm [Internet]. 2007Jan;20(1):87-90. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015">https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015</a> 3. Cruz RNS, Griep R, Coelho ICMM, Almeida RM de SSA de, Garbelini MC da L. Extensão universitária como estratégia para o ensino do suporte básico de vida para a comunidade. Braz. J. Hea. Rev. [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2023 Oct. 10];6(1):2212-3. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/mCBJ">https://ishort.ink/mCBJ</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14742	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4448944 - MACGREGOR ARAUJO SEVERIANO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE TEMPO EM ENFERMAGEM PARA DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA			
<b>INTRODUCAO</b>	Durante a realização do levantamento de dados sobre o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, identificamos a necessidade de elaboração e aplicação de um treinamento de primeiros socorros para os agentes comunitários de saúde (ACS) da unidade, necessitando da gestão eficaz do tempo em cada etapa do processo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o processo de intervenção do estágio de gestão diante da necessidade de gerenciar o tempo desde o desenvolvimento do projeto até a aplicação do treinamento e contabilização dos resultados levantados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em uma UBS na zona sul do Município de São Paulo, durante a intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES).			
<b>RESULTADO S</b>	Durante a vivência do estágio observamos a necessidade de uma intervenção voltada para orientação dos ACS por passarem grande parte do tempo em visitas no território adscrito tendo mais chances de se depararem com paradas cardiorrespiratórias e engasgos. Ao nos depararmos com esta questão nos organizamos em 5 etapas: revisão da literatura disponível, elaboração do treinamento, teste de eficácia, aplicação do treinamento e tabulação dos dados. Em todas as etapas fora necessário o manejo do tempo uma vez que tínhamos apenas uma semana para contemplar todas as etapas, então optamos pela utilização da matriz de gestão de tempo para organizar e contemplar todas as partes além da utilização da ferramenta 5W2H para ter mais de uma forma de visualizar e discutir o planejamento. Neste percurso foi necessário a capacidade de adaptação para a utilização de ferramentas improvisadas e artesanais como o uso de manequins montados, barbantes, impressos, caixa de som dentre outros sendo todos esses objetos previamente organizados em lista de checagem, testados e aprovados pelos autores como suficientes para a aplicação cientificamente correta, adequada e atualizada das práticas de primeiros socorros voltadas aos leigos.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Através do uso das ferramentas de gestão conseguimos alcançar nossos objetivos dentro do prazo estipulado com tempo suficiente para lidar com as alterações de percurso que surgiram, apontando para a importância da utilização das ferramentas de gestão como Matriz de gestão de tempo, 5W2H, Check-list dentre outras para a previsão e provisão dos materiais, planejamento e conquista das metas levantadas.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Mancia JR, Cabral LC, Koerich MS. Educação permanente no contexto da enfermagem e na saúde. Rev Bras Enferm [Internet]. 2004Sep;57(5):605–10. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018">https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018</a> 2. Mello MC de, Fuguiñi FMT, Gaidzinski RR. O tempo no processo de trabalho em saúde: uma abordagem sociológica. Acta paul enferm [Internet]. 2007Jan;20(1):87–90. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015">https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015</a> 3. Cruz RNS, Griep R, Coelho ICMM, Almeida RM de SSA de, Garbelini MC da L. Extensão universitária como estratégia para o ensino do suporte básico de vida para a comunidade. Braz. J. Hea. Rev. [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2023 Oct. 10];6(1):2212-3. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/mCBJ">https://ishort.ink/mCBJ</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14742	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517504 - VICTOR CARLOS ALVES PEREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE TEMPO EM ENFERMAGEM PARA DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA			
<b>INTRODUCAO</b>	Durante a realização do levantamento de dados sobre o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, identificamos a necessidade de elaboração e aplicação de um treinamento de primeiros socorros para os agentes comunitários de saúde (ACS) da unidade, necessitando da gestão eficaz do tempo em cada etapa do processo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o processo de intervenção do estágio de gestão diante da necessidade de gerenciar o tempo desde o desenvolvimento do projeto até a aplicação do treinamento e contabilização dos resultados levantados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em uma UBS na zona sul do Município de São Paulo, durante a intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES).			
<b>RESULTADO S</b>	Durante a vivência do estágio observamos a necessidade de uma intervenção voltada para orientação dos ACS por passarem grande parte do tempo em visitas no território adscrito tendo mais chances de se depararem com paradas cardiorrespiratórias e engasgos. Ao nos depararmos com esta questão nos organizamos em 5 etapas: revisão da literatura disponível, elaboração do treinamento, teste de eficácia, aplicação do treinamento e tabulação dos dados. Em todas as etapas fora necessário o manejo do tempo uma vez que tínhamos apenas uma semana para contemplar todas as etapas, então optamos pela utilização da matriz de gestão de tempo para organizar e contemplar todas as partes além da utilização da ferramenta 5W2H para ter mais de uma forma de visualizar e discutir o planejamento. Neste percurso foi necessário a capacidade de adaptação para a utilização de ferramentas improvisadas e artesanais como o uso de manequins montados, barbantes, impressos, caixa de som dentre outros sendo todos esses objetos previamente organizados em lista de checagem, testados e aprovados pelos autores como suficientes para a aplicação cientificamente correta, adequada e atualizada das práticas de primeiros socorros voltadas aos leigos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Através do uso das ferramentas de gestão conseguimos alcançar nossos objetivos dentro do prazo estipulado com tempo suficiente para lidar com as alterações de percurso que surgiram, apontando para a importância da utilização das ferramentas de gestão como Matriz de gestão de tempo, 5W2H, Check-list dentre outras para a previsão e provisão dos materiais, planejamento e conquista das metas levantadas.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Mancia JR, Cabral LC, Koerich MS. Educação permanente no contexto da enfermagem e na saúde. Rev Bras Enferm [Internet]. 2004Sep;57(5):605–10. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018">https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018</a> 2. Mello MC de, Fugulin FMT, Gaidzinski RR. O tempo no processo de trabalho em saúde: uma abordagem sociológica. Acta paul enferm [Internet]. 2007Jan;20(1):87–90. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015">https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015</a> 3. Cruz RNS, Griep R, Coelho ICMM, Almeida RM de SSA de, Garbelini MC da L. Extensão universitária como estratégia para o ensino do suporte básico de vida para a comunidade. Braz. J. Hea. Rev. [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2023 Oct. 10];6(1):2212-3. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/mCBJ">https://ishort.ink/mCBJ</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14742	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577396 - INGRID RIBEIRO GONÇALVES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	GESTÃO DE TEMPO EM ENFERMAGEM PARA DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA			
<b>INTRODUCAO</b>	Durante a realização do levantamento de dados sobre o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, identificamos a necessidade de elaboração e aplicação de um treinamento de primeiros socorros para os agentes comunitários de saúde (ACS) da unidade, necessitando da gestão eficaz do tempo em cada etapa do processo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o processo de intervenção do estágio de gestão diante da necessidade de gerenciar o tempo desde o desenvolvimento do projeto até a aplicação do treinamento e contabilização dos resultados levantados.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em uma UBS na zona sul do Município de São Paulo, durante a intervenção do Planejamento Estratégico Situacional (PES).			
<b>RESULTADO S</b>	Durante a vivência do estágio observamos a necessidade de uma intervenção voltada para orientação dos ACS por passarem grande parte do tempo em visitas no território adscrito tendo mais chances de se depararem com paradas cardiorrespiratórias e engasgos. Ao nos depararmos com esta questão nos organizamos em 5 etapas: revisão da literatura disponível, elaboração do treinamento, teste de eficácia, aplicação do treinamento e tabulação dos dados. Em todas as etapas fora necessário o manejo do tempo uma vez que tínhamos apenas uma semana para contemplar todas as etapas, então optamos pela utilização da matriz de gestão de tempo para organizar e contemplar todas as partes além da utilização da ferramenta 5W2H para ter mais de uma forma de visualizar e discutir o planejamento. Neste percurso foi necessário a capacidade de adaptação para a utilização de ferramentas improvisadas e artesanais como o uso de manequins montados, barbantes, impressos, caixa de som dentre outros sendo todos esses objetos previamente organizados em lista de checagem, testados e aprovados pelos autores como suficientes para a aplicação cientificamente correta, adequada e atualizada das práticas de primeiros socorros voltadas aos leigos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Através do uso das ferramentas de gestão conseguimos alcançar nossos objetivos dentro do prazo estipulado com tempo suficiente para lidar com as alterações de percurso que surgiram, apontando para a importância da utilização das ferramentas de gestão como Matriz de gestão de tempo, 5W2H, Check-list dentre outras para a previsão e provisão dos materiais, planejamento e conquista das metas levantadas.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. Mancia JR, Cabral LC, Koerich MS. Educação permanente no contexto da enfermagem e na saúde. Rev Bras Enferm [Internet]. 2004Sep;57(5):605–10. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018">https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500018</a> 2. Mello MC de, Fugulin FMT, Gaidzinski RR. O tempo no processo de trabalho em saúde: uma abordagem sociológica. Acta paul enferm [Internet]. 2007Jan;20(1):87–90. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015">https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000100015</a> 3. Cruz RNS, Griep R, Coelho ICMM, Almeida RM de SSA de, Garbelini MC da L. Extensão universitária como estratégia para o ensino do suporte básico de vida para a comunidade. Braz. J. Hea. Rev. [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2023 Oct. 10];6(1):2212-3. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/mCBJ">https://ishort.ink/mCBJ</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14743	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4319532 - FERNANDO MINERVINO DA SILVA JUNIOR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da atividade de ectofofosfatases na infectividade dos isolados de Leishmania naiffi			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, a manifestação clínica mais comum da leishmaniose é a cutânea, causada principalmente pelas espécies de Leishmania (L.) amazonensis, L. braziliensis, L. guyanensis e menos frequente na L. naiffi, formando lesões localizadas com borda delimitadas. Muito pouco se tem descrito sobre a L. naiffi. A forma promastigota metacíclica é a infectante ao hospedeiro. As promastigotas possuem na membrana fatores de virulência, como as ectofofosfatases, que, pela sua propriedade de desfosforilar diferentes substratos, facilita a internalização e metabolismo do parasita dentro da célula.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar atividade de ectofofosfatases em isolados de L. (V). naiffi e L braziliensis (controle) e sua ação na infectividade em células hospedeiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os parasitos foram mantidos, à 28°C, em meio 199 suplementado com 10% SFB, antibióticos, 2% de urina masculina e 10 µg/mL hemina. As células Raw264.7 foram mantidas em cultura com RPMI completo suplementado com 10% de SFB, à 37°C. Para verificar a atividade das ectofofosfatases e citotoxicidade dos parasitas foi utilizado o ensaio colorimétrico com substrato paraNitroFenol (pNPP) e resazurina, respectivamente. A metaciclo genese foi determinada pela contagem morfológica dos parasitos			
<b>RESULTADOS</b>	Independentemente das espécies (L. braziliensis ou os isolados de L. naiffi), a atividade das ectofofosfatases foi estatisticamente maior nos pH 4,5 e 6,5 na fase log de crescimento (dia 4 de cultura) comparado com a fase estacionária, sugerindo uma importante atividade das ectofofosfatases ácidas. Para verificar a influência da atividade fosfatídica no D4 na metaciclo genese, as culturas de parasitos foram tratadas com 1 - 100 µM de molibdato de amônio ou 0,001 - 0,1 µM BpV(phen). As drogas inibiram as ectofofosfatases de maneira dose-dependente, sendo o molibdato mais efetivo do que o BpV(phen). Os parasitos foram tratados com as concentrações de 10 µM de molibdato de amônio e 0,1µM de BpV(phen) e após 7 dias de cultura, macrófagos de linhagem Raw264.7 foram infectados. A inibição das ectofofosfatases pela droga molibdato não alterou a infecção e o número de amastigota de L. braziliensis. Em 48h de infecção, o isolado de L. naiffi JM tratado tende infectar menos células em relação ao controle sem tratamento. A L. braziliensis tratada com BpV(phen) tende a diminuir a porcentagem de infecção e o número de amastigota em relação ao parasito não tratado, tanto em 2h quanto em 48 h. Já, os parasitos L. naiffi JM tratados com BpV(phen) tiveram, em 48h, o número de células e amastigotas reduzidas em relação ao controle sem tratamento. Os tratamentos dos parasitos com as drogas parecem não ter efeito na metaciclo genese			
<b>CONCLUSOES</b>	A atividade ectofofosfatases ácidas foi maior na fase log de crescimento dos parasitos, porém não parecem estar envolvidas na metaciclo genese dos parasitos, pelo menos com as drogas utilizadas. No entanto, as ectofofosfatases ácidas modulam positivamente a infecção de macrófagos principalmente pela L. naiffi, por mecanismo que não envolvem a geração das formas metacíclicas			
<b>REFERENCIAS</b>	da Silva Vieira T et al., Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:31. Elmahallawy EK et al. Veterinary sciences. 2021;8(2)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14743	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441770 - REBECA SANTANA SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da atividade de ectofosfatases na infectividade dos isolados de Leishmania naiffi			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No Brasil, a manifestação clínica mais comum da leishmaniose é a cutânea, causada principalmente pelas espécies de Leishmania (L.) amazonensis, L. braziliensis, L. guyanensis e menos frequente na L. naiffi, formando lesões localizadas com borda delimitadas. Muito pouco se tem descrito sobre a L. naiffi. A forma promastigota metacíclica é a infectante ao hospedeiro. As promastigotas possuem na membrana fatores de virulência, como as ectofosfatases, que, pela sua propriedade de desfosforilar diferentes substratos, facilita a internalização e metabolismo do parasita dentro da célula.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar atividade de ectofosfatases em isolados de L. (V). naiffi e L braziliensis (controle) e sua ação na infectividade em células hospedeiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os parasitos foram mantidos, à 28°C, em meio 199 suplementado com 10% SFB, antibióticos, 2% de urina masculina e 10 µg/mL hemina. As células Raw264.7 foram mantidas em cultura com RPMI completo suplementado com 10% de SFB, à 37°C. Para verificar a atividade das ectofosfatases e citotoxicidade dos parasitos foi utilizado o ensaio colorimétrico com substrato paraNitroFenol (pNPP) e resazurina, respectivamente. A metaciclo genese foi determinada pela contagem morfológica dos parasitos			
<b>RESULTADOS</b>	Independentemente das espécies (L. braziliensis ou os isolados de L. naiffi), a atividade das ectofosfatases foi estatisticamente maior nos pH 4,5 e 6,5 na fase log de crescimento (dia 4 de cultura) comparado com a fase estacionária, sugerindo uma importante atividade das ectofosfatases ácidas. Para verificar a influência da atividade fosfatídica no D4 na metaciclo genese, as culturas de parasitos foram tratadas com 1 - 100 µM de molibdato de amônio ou 0,001 - 0,1 µM BpV(phen). As drogas inibiram as ectofosfatases de maneira dose-dependente, sendo o molibdato mais efetivo do que o BpV(phen). Os parasitos foram tratados com as concentrações de 10 µM de molibdato de amônio e 0,1µM de BpV(phen) e após 7 dias de cultura, macrófagos de linhagem Raw264.7 foram infectados. A inibição das ectofosfatases pela droga molibdato não alterou a infecção e o número de amastigota de L. braziliensis. Em 48h de infecção, o isolado de L. naiffi JM tratado tende infectar menos células em relação ao controle sem tratamento. A L. braziliensis tratada com BpV(phen) tende a diminuir a porcentagem de infecção e o número de amastigota em relação ao parasito não tratado, tanto em 2h quanto em 48 h. Já, os parasitos L. naiffi JM tratados com BpV(phen) tiveram, em 48h, o número de células e amastigotas reduzidas em relação ao controle sem tratamento. Os tratamentos dos parasitos com as drogas parecem não ter efeito na metaciclo genese			
<b>CONCLUSÕES</b>	A atividade ectofosfatases ácidas foi maior na fase log de crescimento dos parasitos, porém não parecem estar envolvidas na metaciclo genese dos parasitos, pelo menos com as drogas utilizadas. No entanto, as ectofosfatases ácidas modulam positivamente a infecção de macrófagos principalmente pela L. naiffi, por mecanismo que não envolvem a geração das formas metacíclicas			
<b>REFERENCIAS</b>	da Silva Vieira T et al., Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:31. Elmahallawy EK et al. Veterinary sciences. 2021;8(2)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14743	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4775805 - LUCAS GALDINO NUNES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da atividade de ectofofosfases na infectividade dos isolados de Leishmania naiffi			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, a manifestação clínica mais comum da leishmaniose é a cutânea, causada principalmente pelas espécies de Leishmania (L.) amazonensis, L. braziliensis, L. guyanensis e menos frequente na L. naiffi, formando lesões localizadas com borda delimitadas. Muito pouco se tem descrito sobre a L. naiffi. A forma promastigota metacíclica é a infectante ao hospedeiro. As promastigotas possuem na membrana fatores de virulência, como as ectofofosfases, que, pela sua propriedade de desfosforilar diferentes substratos, facilita a internalização e metabolismo do parasita dentro da célula.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar atividade de ectofofosfases em isolados de L. (V). naiffi e L braziliensis (controle) e sua ação na infectividade em células hospedeiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os parasitos foram mantidos, à 28°C, em meio 199 suplementado com 10% SFB, antibióticos, 2% de urina masculina e 10 µg/mL hemina. As células Raw264.7 foram mantidas em cultura com RPMI completo suplementado com 10% de SFB, à 37°C. Para verificar a atividade das ectofofosfases e citotoxicidade dos parasitos foi utilizado o ensaio colorimétrico com substrato paraNitroFenol (pNPP) e resazurina, respectivamente. A metaciclo genese foi determinada pela contagem morfológica dos parasitos			
<b>RESULTADOS</b>	Independentemente das espécies (L. braziliensis ou os isolados de L. naiffi), a atividade das ectofofosfases foi estatisticamente maior nos pH 4,5 e 6,5 na fase log de crescimento (dia 4 de cultura) comparado com a fase estacionária, sugerindo uma importante atividade das ectofofosfases ácidas. Para verificar a influência da atividade fosfatídica no D4 na metaciclo genese, as culturas de parasitos foram tratadas com 1 - 100 µM de molibdato de amônio ou 0,001 - 0,1 µM BpV(phen). As drogas inibiram as ectofofosfases de maneira dose-dependente, sendo o molibdato mais efetivo do que o BpV(phen). Os parasitos foram tratados com as concentrações de 10 µM de molibdato de amônio e 0,1µM de BpV(phen) e após 7 dias de cultura, macrófagos de linhagem Raw264.7 foram infectados. A inibição das ectofofosfases pela droga molibdato não alterou a infecção e o número de amastigota de L. braziliensis. Em 48h de infecção, o isolado de L. naiffi JM tratado tende infectar menos células em relação ao controle sem tratamento. A L. braziliensis tratada com BpV(phen) tende a diminuir a porcentagem de infecção e o número de amastigota em relação ao parasito não tratado, tanto em 2h quanto em 48 h. Já, os parasitos L. naiffi JM tratados com BpV(phen) tiveram, em 48h, o número de células e amastigotas reduzidas em relação ao controle sem tratamento. Os tratamentos dos parasitos com as drogas parecem não ter efeito na metaciclo genese			
<b>CONCLUSOES</b>	A atividade ectofofosfases ácidas foi maior na fase log de crescimento dos parasitos, porém não parecem estar envolvidas na metaciclo genese dos parasitos, pelo menos com as drogas utilizadas. No entanto, as ectofofosfases ácidas modulam positivamente a infecção de macrófagos principalmente pela L. naiffi, por mecanismo que não envolvem a geração das formas metacíclicas			
<b>REFERENCIAS</b>	da Silva Vieira T et al., Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:31. Elmahallawy EK et al. Veterinary sciences. 2021;8(2)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14744	Nutrição	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4636619 - ANDREA CRISTINA DE BRITO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Raquel Nunes Silva		
<b>TITULO</b>	Elaboração de Portfólio Crítico Reflexivo para atuação em Educação Alimentar e Nutricional			
<b>INTRODUCA O</b>	A nutrição adequada é um pilar fundamental para a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida, exercendo um impacto direto não só na nossa qualidade de vida diária, mas também na maneira como enfrentamos desafios de saúde específicos. Este portfólio foi concebido como uma ferramenta educativa essencial, oferecendo uma variedade de sugestões para materiais didáticos centrados nas necessidades nutricionais de diferentes grupos etários: crianças, adultos e idosos, além de abordar condições de saúde específicas, como a hipertensão e a Síndrome do Intestino Irritável. Cada seção deste portfólio não apenas destaca a importância da educação alimentar e nutricional, mas também propõe sugestões práticas e acessíveis, projetadas para encorajar decisões alimentares saudáveis e informadas. Através deste recurso, esperamos inspirar uma mudança positiva e duradoura nos hábitos alimentares de indivíduos e comunidades, promovendo uma jornada de saúde, prevenção e vitalidade em todas as fases da vida.			
<b>OBJETIVOS</b>	Construir materiais didáticos para Educação Alimentar e Nutricional a partir da organização de um Portfólio Crítico Reflexivo como instrumento de atuação do Nutricionista.			
<b>METODOLOGIA</b>	Na elaboração deste portfólio, adotamos uma metodologia simplificada, porém abrangente. Iniciamos com uma pesquisa rigorosa sobre as necessidades nutricionais distintas de cada faixa etária e condições de saúde específicas, consultando literatura científica e diretrizes de saúde pública. O resultado é um conjunto de recursos que promove a educação alimentar e nutricional de forma compreensível e engajante para diversos públicos.			
<b>RESULTADO S</b>	O resultado do nosso trabalho no portfólio foi bastante positivo. Ao simplificar informações complexas sobre nutrição, conseguimos criar materiais educativos que são fáceis de entender, independentemente da idade ou do conhecimento prévio do leitor sobre o assunto. Ter um material de fácil compreensão foi especialmente importante para quem lida com condições como hipertensão e Síndrome do Intestino Irritável, pois percebemos que, com as informações certas, elas se sentiam mais confiantes para gerenciar sua saúde. No entanto, também aprendemos que educação alimentar e nutricional é um processo contínuo. Precisamos manter os materiais atualizados e continuar encontrando maneiras novas e criativas de manter as pessoas engajadas e informadas sobre sua nutrição e saúde.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Podemos concluir que, o desenvolvimento deste portfólio destacou a importância crucial da educação alimentar e nutricional em todas as fases da vida. Através de materiais simples e informativos, conseguimos não apenas transmitir conhecimentos essenciais sobre alimentação saudável, mas também empoderar indivíduos para que façam escolhas mais conscientes, especialmente aqueles enfrentando desafios de saúde específicos. Este projeto reforça a ideia de que, com acesso à informação correta e compreensível, as pessoas se sentem mais capacitadas para tomar decisões que beneficiam sua saúde e bem-estar a longo prazo. No entanto, é um campo em constante evolução, requerendo nosso compromisso contínuo para atualizar e adaptar os recursos, garantindo que permaneçam relevantes e eficazes.			
<b>REFERENCIA S</b>	Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020. GALISA, Monica; NUNES, Alessandra Paula; GARCIA, Luciana; CHEMIN, Sandra. Aconselhamento Alimentar para Crianças. Educação Alimentar e Nutricional - Da Teoria a Prática. 1ª ed. São Paulo: ROCA, 2014. GUIA ALIMENTAR POPULAÇÃO BRASILEIRA. 2ª Edição, pdf, páginas 124-127.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14744	Nutrição	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4663896 - DANIELLE CARVALHO SILVA OLIVEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Raquel Nunes Silva		
<b>TITULO</b>	Elaboração de Portfólio Crítico Reflexivo para atuação em Educação Alimentar e Nutricional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A nutrição adequada é um pilar fundamental para a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida, exercendo um impacto direto não só na nossa qualidade de vida diária, mas também na maneira como enfrentamos desafios de saúde específicos. Este portfólio foi concebido como uma ferramenta educativa essencial, oferecendo uma variedade de sugestões para materiais didáticos centrados nas necessidades nutricionais de diferentes grupos etários: crianças, adultos e idosos, além de abordar condições de saúde específicas, como a hipertensão e a Síndrome do Intestino Irritável. Cada seção deste portfólio não apenas destaca a importância da educação alimentar e nutricional, mas também propõe sugestões práticas e acessíveis, projetadas para encorajar decisões alimentares saudáveis e informadas. Através deste recurso, esperamos inspirar uma mudança positiva e duradoura nos hábitos alimentares de indivíduos e comunidades, promovendo uma jornada de saúde, prevenção e vitalidade em todas as fases da vida.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Construir materiais didáticos para Educação Alimentar e Nutricional a partir da organização de um Portfólio Crítico Reflexivo como instrumento de atuação do Nutricionista.			
<b>METODOLOGIA</b>	Na elaboração deste portfólio, adotamos uma metodologia simplificada, porém abrangente. Iniciamos com uma pesquisa rigorosa sobre as necessidades nutricionais distintas de cada faixa etária e condições de saúde específicas, consultando literatura científica e diretrizes de saúde pública. O resultado é um conjunto de recursos que promove a educação alimentar e nutricional de forma compreensível e engajante para diversos públicos.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado do nosso trabalho no portfólio foi bastante positivo. Ao simplificar informações complexas sobre nutrição, conseguimos criar materiais educativos que são fáceis de entender, independentemente da idade ou do conhecimento prévio do leitor sobre o assunto. Ter um material de fácil compreensão foi especialmente importante para quem lida com condições como hipertensão e Síndrome do Intestino Irritável, pois percebemos que, com as informações certas, elas se sentiam mais confiantes para gerenciar sua saúde. No entanto, também aprendemos que educação alimentar e nutricional é um processo contínuo. Precisamos manter os materiais atualizados e continuar encontrando maneiras novas e criativas de manter as pessoas engajadas e informadas sobre sua nutrição e saúde.			
<b>CONCLUSOES</b>	Podemos concluir que, o desenvolvimento deste portfólio destacou a importância crucial da educação alimentar e nutricional em todas as fases da vida. Através de materiais simples e informativos, conseguimos não apenas transmitir conhecimentos essenciais sobre alimentação saudável, mas também empoderar indivíduos para que façam escolhas mais conscientes, especialmente aqueles enfrentando desafios de saúde específicos. Este projeto reforça a ideia de que, com acesso à informação correta e compreensível, as pessoas se sentem mais capacitadas para tomar decisões que beneficiam sua saúde e bem-estar a longo prazo. No entanto, é um campo em constante evolução, requerendo nosso compromisso contínuo para atualizar e adaptar os recursos, garantindo que permaneçam relevantes e eficazes.			
<b>REFERENCIAS</b>	Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020. GALISA, Monica; NUNES, Alessandra Paula; GARCIA, Luciana; CHEMIN, Sandra. Aconselhamento Alimentar para Crianças. Educação Alimentar e Nutricional - Da Teoria à Prática. 1ª ed. São Paulo: ROCA, 2014. GUIA ALIMENTAR POPULAÇÃO BRASILEIRA. 2ª Edição, pdf, páginas 124-127.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14744	Nutrição	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4669258 - ALINE HENRIQUE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Raquel Nunes Silva		
<b>TITULO</b>	Elaboração de Portfólio Crítico Reflexivo para atuação em Educação Alimentar e Nutricional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A nutrição adequada é um pilar fundamental para a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida, exercendo um impacto direto não só na nossa qualidade de vida diária, mas também na maneira como enfrentamos desafios de saúde específicos. Este portfólio foi concebido como uma ferramenta educativa essencial, oferecendo uma variedade de sugestões para materiais didáticos centrados nas necessidades nutricionais de diferentes grupos etários: crianças, adultos e idosos, além de abordar condições de saúde específicas, como a hipertensão e a Síndrome do Intestino Irritável. Cada seção deste portfólio não apenas destaca a importância da educação alimentar e nutricional, mas também propõe sugestões práticas e acessíveis, projetadas para encorajar decisões alimentares saudáveis e informadas. Através deste recurso, esperamos inspirar uma mudança positiva e duradoura nos hábitos alimentares de indivíduos e comunidades, promovendo uma jornada de saúde, prevenção e vitalidade em todas as fases da vida.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Construir materiais didáticos para Educação Alimentar e Nutricional a partir da organização de um Portfólio Crítico Reflexivo como instrumento de atuação do Nutricionista.			
<b>METODOLOGIA</b>	Na elaboração deste portfólio, adotamos uma metodologia simplificada, porém abrangente. Iniciamos com uma pesquisa rigorosa sobre as necessidades nutricionais distintas de cada faixa etária e condições de saúde específicas, consultando literatura científica e diretrizes de saúde pública. O resultado é um conjunto de recursos que promove a educação alimentar e nutricional de forma compreensível e engajante para diversos públicos.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado do nosso trabalho no portfólio foi bastante positivo. Ao simplificar informações complexas sobre nutrição, conseguimos criar materiais educativos que são fáceis de entender, independentemente da idade ou do conhecimento prévio do leitor sobre o assunto. Ter um material de fácil compreensão foi especialmente importante para quem lida com condições como hipertensão e Síndrome do Intestino Irritável, pois percebemos que, com as informações certas, elas se sentiam mais confiantes para gerenciar sua saúde. No entanto, também aprendemos que educação alimentar e nutricional é um processo contínuo. Precisamos manter os materiais atualizados e continuar encontrando maneiras novas e criativas de manter as pessoas engajadas e informadas sobre sua nutrição e saúde.			
<b>CONCLUSOES</b>	Podemos concluir que, o desenvolvimento deste portfólio destacou a importância crucial da educação alimentar e nutricional em todas as fases da vida. Através de materiais simples e informativos, conseguimos não apenas transmitir conhecimentos essenciais sobre alimentação saudável, mas também empoderar indivíduos para que façam escolhas mais conscientes, especialmente aqueles enfrentando desafios de saúde específicos. Este projeto reforça a ideia de que, com acesso à informação correta e compreensível, as pessoas se sentem mais capacitadas para tomar decisões que beneficiam sua saúde e bem-estar a longo prazo. No entanto, é um campo em constante evolução, requerendo nosso compromisso contínuo para atualizar e adaptar os recursos, garantindo que permaneçam relevantes e eficazes.			
<b>REFERENCIAS</b>	Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020. GALISA, Monica; NUNES, Alessandra Paula; GARCIA, Luciana; CHEMIN, Sandra. Aconselhamento Alimentar para Crianças. Educação Alimentar e Nutricional - Da Teoria a Prática. 1ª ed. São Paulo: ROCA, 2014. GUIA ALIMENTAR POPULAÇÃO BRASILEIRA. 2ª Edição, pdf, páginas 124-127.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14745	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4416350 - MARIA RITA MOURA SALES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE VIVÊNCIA DE ESTÁGIO AOS OLHOS DE GRADUANDOS DE ENFERGAGEM: DA ASSISTÊNCIA À GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA			
<b>INTRODUCAO</b>	Durante a realização dos estágios curriculares obrigatórios da graduação em enfermagem pudemos nos deparar com inúmeras vivencias da prática da profissão diferenciando os aspectos da assistência beira leito da gestão dos cuidados e da equipe de enfermagem, sem segmentar ambas as práticas, mas correlacionar a devida complementação destes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o percurso dos estágios curriculares obrigatórios, visando a comparação dos diferentes aspectos do estágio assistencial e de gestão em saúde na atenção primária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Assistência à saúde Coletiva do 7º semestre e Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em três UBS diferentes do Município de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante os estágios supervisionados da graduação nos deparamos com diversas experiências que desafiaram nossos conhecimentos técnico-científicos e nossas capacidades de adaptação profissional. No 7º semestre fora abordada as práticas da assistência em enfermagem onde realizamos diversas práticas, como punção venosa periférica, classificação de risco, consultas de enfermagem dentre outras. Desenvolvemos habilidades manuais e de avaliação clínica da prática, compreendendo os processos e o tempo investido para a realização de cada processo. Durante o estágio do 8º semestre nos deparamos com as práticas de enfermagem, entretanto desta vez com o olhar mais aprofundado nas práticas da gestão em saúde. Foi elaborado um plano estratégico situacional (PES) com base na avaliação dos dados coletados na unidade, onde através de ferramentas de gestão como Matriz GUT e Matriz de Ishikawa desenvolvemos um projeto de intervenção que foi aplicado na Unidade e gerou resultados positivos aos envolvidos. Com isso, nos deparamos com a complexidade existente na prática e na gestão em saúde e como ambas as partes são necessárias para a formação do profissional enfermeiro.			
<b>CONCLUSOES</b>	As diferenças existentes nas abordagens de estágio curricular obrigatório do 7º semestre e 8º semestre complementam a prática do profissional enfermeiro, reafirmando a necessidade do olhar assistencial e de gestor na unidade básica de saúde, da equipe e até mesmo dos relacionamentos e vínculos com os usuários do sistema público de saúde. Com isso, pudemos vivenciar, aprofundar e desenvolver nossas competências técnicas, éticas, e profissionais nos capacitando para a realização das atividades do enfermeiro.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BACKES, Dirce Stein et al. O papel profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde: da saúde comunitária à estratégia de saúde da família. Ciência (#38)amp; Saúde Coletiva, v. 17, n. 1, p. 223-230, 2012. 2. BELÉM, Jameson Moreira et al. Avaliação da aprendizagem no estágio supervisionado de enfermagem em saúde coletiva. Trabalho, Educação e Saúde, v. 16, p. 849-867, 2018. 3. KROZETA, Karla; MEIER, Marineli Joaquim; DANSKI, Mitzy Reichembach. A auto-avaliação: uma possibilidade de mudança na formação profissional. Cogitare Enfermagem, v. 13, n. 4, 2008.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14745	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4448944 - MACGREGOR ARAUJO SEVERIANO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE VIVÊNCIA DE ESTÁGIO AOS OLHOS DE GRADUANDOS DE ENFERGAGEM: DA ASSISTÊNCIA À GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA			
<b>INTRODUCA O</b>	Durante a realização dos estágios curriculares obrigatórios da graduação em enfermagem pudemos nos deparar com inúmeras vivencias da prática da profissão diferenciando os aspectos da assistência beira leito da gestão dos cuidados e da equipe de enfermagem, sem segmentar ambas as práticas, mas correlacionar a devida complementação destes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o percurso dos estágios curriculares obrigatórios, visando a comparação dos diferentes aspectos do estágio assistencial e de gestão em saúde na atenção primária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Assistência à saúde Coletiva do 7º semestre e Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em três UBS diferentes do Município de São Paulo.			
<b>RESULTADO S</b>	Durante os estágios supervisionados da graduação nos deparamos com diversas experiências que desafiaram nossos conhecimentos técnico-científicos e nossas capacidades de adaptação profissional. No 7º semestre fora abordada as práticas da assistência em enfermagem onde realizamos diversas práticas, como punção venosa periférica, classificação de risco, consultas de enfermagem dentre outras. Desenvolvemos habilidades manuais e de avaliação clínica da prática, compreendendo os processos e o tempo investido para a realização de cada processo. Durante o estágio do 8º semestre nos deparamos com as práticas de enfermagem, entretanto desta vez com o olhar mais aprofundado nas práticas da gestão em saúde. Foi elaborado um plano estratégico situacional (PES) com base na avaliação dos dados coletados na unidade, onde através de ferramentas de gestão como Matriz GUT e Matriz de Ishikawa desenvolvemos um projeto de intervenção que foi aplicado na Unidade e gerou resultados positivos aos envolvidos. Com isso, nos deparamos com a complexidade existente na prática e na gestão em saúde e como ambas as partes são necessárias para a formação do profissional enfermeiro.			
<b>CONCLUSOE S</b>	As diferenças existentes nas abordagens de estágio curricular obrigatório do 7º semestre e 8º semestre complementam a prática do profissional enfermeiro, reafirmando a necessidade do olhar assistencial e de gestor na unidade básica de saúde, da equipe e até mesmo dos relacionamentos e vínculos com os usuários do sistema público de saúde. Com isso, podemos vivenciar, aprofundar e desenvolver nossas competências técnicas, éticas, e profissionais nos capacitando para a realização das atividades do enfermeiro.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. BACKES, Dirce Stein et al. O papel profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde: da saúde comunitária à estratégia de saúde da família. Ciência (#38)amp; Saúde Coletiva, v. 17, n. 1, p. 223-230, 2012. 2. BELÉM, Jameson Moreira et al. Avaliação da aprendizagem no estágio supervisionado de enfermagem em saúde coletiva. Trabalho, Educação e Saúde, v. 16, p. 849-867, 2018. 3. KROZETA, Karla; MEIER, Marineli Joaquim; DANSKI, Mitzy Reichembach. A auto-avaliação: uma possibilidade de mudança na formação profissional. Cogitare Enfermagem, v. 13, n. 4, 2008.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14745	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517504 - VICTOR CARLOS ALVES PEREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE VIVÊNCIA DE ESTÁGIO AOS OLHOS DE GRADUANDOS DE ENFERGAGEM: DA ASSISTÊNCIA À GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA			
<b>INTRODUCAO</b>	Durante a realização dos estágios curriculares obrigatórios da graduação em enfermagem pudemos nos deparar com inúmeras vivencias da prática da profissão diferenciando os aspectos da assistência beira leito da gestão dos cuidados e da equipe de enfermagem, sem segmentar ambas as práticas, mas correlacionar a devida complementação destes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o percurso dos estágios curriculares obrigatórios, visando a comparação dos diferentes aspectos do estágio assistencial e de gestão em saúde na atenção primária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Assistência à saúde Coletiva do 7º semestre e Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em três UBS diferentes do Município de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante os estágios supervisionados da graduação nos deparamos com diversas experiências que desafiaram nossos conhecimentos técnico-científicos e nossas capacidades de adaptação profissional. No 7º semestre fora abordada as práticas da assistência em enfermagem onde realizamos diversas práticas, como punção venosa periférica, classificação de risco, consultas de enfermagem dentre outras. Desenvolvemos habilidades manuais e de avaliação clínica da prática, compreendendo os processos e o tempo investido para a realização de cada processo. Durante o estágio do 8º semestre nos deparamos com as práticas de enfermagem, entretanto desta vez com o olhar mais aprofundado nas práticas da gestão em saúde. Foi elaborado um plano estratégico situacional (PES) com base na avaliação dos dados coletados na unidade, onde através de ferramentas de gestão como Matriz GUT e Matriz de Ishikawa desenvolvemos um projeto de intervenção que foi aplicado na Unidade e gerou resultados positivos aos envolvidos. Com isso, nos deparamos com a complexidade existente na prática e na gestão em saúde e como ambas as partes são necessárias para a formação do profissional enfermeiro.			
<b>CONCLUSOES</b>	As diferenças existentes nas abordagens de estágio curricular obrigatório do 7º semestre e 8º semestre complementam a prática do profissional enfermeiro, reafirmando a necessidade do olhar assistencial e de gestor na unidade básica de saúde, da equipe e até mesmo dos relacionamentos e vínculos com os usuários do sistema público de saúde. Com isso, pudemos vivenciar, aprofundar e desenvolver nossas competências técnicas, éticas, e profissionais nos capacitando para a realização das atividades do enfermeiro.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BACKES, Dirce Stein et al. O papel profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde: da saúde comunitária à estratégia de saúde da família. Ciência (#38)amp; Saúde Coletiva, v. 17, n. 1, p. 223-230, 2012. 2. BELÉM, Jameson Moreira et al. Avaliação da aprendizagem no estágio supervisionado de enfermagem em saúde coletiva. Trabalho, Educação e Saúde, v. 16, p. 849-867, 2018. 3. KROZETA, Karla; MEIER, Marineli Joaquim; DANSKI, Mitzy Reichembach. A auto-avaliação: uma possibilidade de mudança na formação profissional. Cogitare Enfermagem, v. 13, n. 4, 2008.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14745	Enfermagem Obstétrica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577396 - INGRID RIBEIRO GONÇALVES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josevânia Barreiro Mendes Silva		
<b>TITULO</b>	RELATO DE VIVÊNCIA DE ESTÁGIO AOS OLHOS DE GRADUANDOS DE ENFERGAGEM: DA ASSISTÊNCIA À GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA			
<b>INTRODUCAO</b>	Durante a realização dos estágios curriculares obrigatórios da graduação em enfermagem pudemos nos deparar com inúmeras vivencias da prática da profissão diferenciando os aspectos da assistência beira leito da gestão dos cuidados e da equipe de enfermagem, sem segmentar ambas as práticas, mas correlacionar a devida complementação destes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem durante o percurso dos estágios curriculares obrigatórios, visando a comparação dos diferentes aspectos do estágio assistencial e de gestão em saúde na atenção primária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de Assistência à saúde Coletiva do 7º semestre e Gestão em Saúde Coletiva do 8º semestre da graduação de Enfermagem, em três UBS diferentes do Município de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante os estágios supervisionados da graduação nos deparamos com diversas experiências que desafiaram nossos conhecimentos técnico-científicos e nossas capacidades de adaptação profissional. No 7º semestre fora abordada as práticas da assistência em enfermagem onde realizamos diversas práticas, como punção venosa periférica, classificação de risco, consultas de enfermagem dentre outras. Desenvolvemos habilidades manuais e de avaliação clínica da prática, compreendendo os processos e o tempo investido para a realização de cada processo. Durante o estágio do 8º semestre nos deparamos com as práticas de enfermagem, entretanto desta vez com o olhar mais aprofundado nas práticas da gestão em saúde. Foi elaborado um plano estratégico situacional (PES) com base na avaliação dos dados coletados na unidade, onde através de ferramentas de gestão como Matriz GUT e Matriz de Ishikawa desenvolvemos um projeto de intervenção que foi aplicado na Unidade e gerou resultados positivos aos envolvidos. Com isso, nos deparamos com a complexidade existente na prática e na gestão em saúde e como ambas as partes são necessárias para a formação do profissional enfermeiro.			
<b>CONCLUSOES</b>	As diferenças existentes nas abordagens de estágio curricular obrigatório do 7º semestre e 8º semestre complementam a prática do profissional enfermeiro, reafirmando a necessidade do olhar assistencial e de gestor na unidade básica de saúde, da equipe e até mesmo dos relacionamentos e vínculos com os usuários do sistema público de saúde. Com isso, pudemos vivenciar, aprofundar e desenvolver nossas competências técnicas, éticas, e profissionais nos capacitando para a realização das atividades do enfermeiro.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. BACKES, Dirce Stein et al. O papel profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde: da saúde comunitária à estratégia de saúde da família. Ciência (#38)amp; Saúde Coletiva, v. 17, n. 1, p. 223-230, 2012. 2. BELÉM, Jameson Moreira et al. Avaliação da aprendizagem no estágio supervisionado de enfermagem em saúde coletiva. Trabalho, Educação e Saúde, v. 16, p. 849-867, 2018. 3. KROZETA, Karla; MEIER, Marineli Joaquim; DANSKI, Mitzy Reichembach. A auto-avaliação: uma possibilidade de mudança na formação profissional. Cogitare Enfermagem, v. 13, n. 4, 2008.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14746	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3501213 - MAYARA DE ALMEIDA CURY RIBEIRO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	CARACTERIZAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA NECROSE ASSÉPTICA DA CABEÇA DO FÊMUR EM UM CÃO YORKSHIRE TERRIER			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A necrose asséptica da cabeça do fêmur (NACF), do subtipo Doença de Legg-Calvé-Perthes, é uma afecção autossômica recessiva, desencadeada após um ou vários episódios de isquemia, causando osteonecrose na epífise proximal do fêmur. Comum em cães jovens (4 a 8 meses), de raças pequenas, esta osteopatia pode levar à fratura e colapso do osso trabecular necrótico, além do achamento da cabeça femoral que pode predispor a atropatia degenerativa.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever as características histopatológicas da NACF, em um cão Yorkshire Terrier, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, da raça Yorkkshire Terrier, macho, 8 meses, foi atendido com sinais clínicos de impotência funcional de membro pélvico esquerdo e suspeita de possível fratura e alteração de trabeculado ósseo em região de cabeça femoral, em exame radiográfico. As suspeitas diagnósticas eram fratura de cabeça do fêmur ou NACF. Foi realizado colocefalectomia e a amostra foi encaminhada para histopatologia (lâminas coradas hematoxilina-eosina).			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar do exame radiográfico e quadro clínico do animal concluírem o diagnóstico de NACF, a avaliação histopatológica que melhor pode determinar estadiamento da lesão, uma vez que é possível verificar as áreas de necrose, reabsorção óssea e o aparecimento do tecido fibroso (forma mais tardia). Na microscopia, a lesão apresentou perda parcial da arquitetura histomorfológica, devido à ocorrência de áreas focalmente extensas de necrose intensa, associada à fibrose moderada e neovascularização discreta. Notou-se condensação óssea e osteócitos com anisocitose e pleomorfismo moderados, com núcleos picnóticos nas regiões perilesionais, além de osteoblastos típicos na superfície óssea em contato com as áreas de necrose (remodelamento ósseo). Não foram vistas atipias celulares em medula óssea. Houve presença de histiócitos típicos no limite do tecido fibrótico. Essa descrição segue literaturas anteriores. Com base no histopatológico, o animal em questão foi classificado como NACF tardio, uma vez que há substituição parcial da arquitetura tecidual remodelada por fibrose.			
<b>CONCLUSOES</b>	Mesmo com o diagnóstico de NACF em exame radiográfico, o histopatológico foi essencial para confirmação diagnóstica e possibilitou o estadiamento da lesão no cão.			
<b>REFERENCIAS</b>	MAXIE, Grant. Jubb, Kennedy (#38) Palmer's pathology of domestic animals: volume 2. Elsevier health sciences, 2016. TROSTEL, C. Todd; POOL, Roy R.; MCLAUGHLIN, Ron M. Canine lameness caused by developmental orthopedic diseases: panosteitis, Legg-Calve-Perthes disease, and hypertrophic osteodystrophy. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, v. 25, n. 4, p. 282-293, 2003. ZACHARY, James F.; MCGAVIN, M. Donald; MCGAVIN, M. Donald. Bases da patologia em veterinária. Elsevier Health Sciences Brazil, 2012.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14746	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3540065 - SANDRO SCHERER	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	CARACTERIZAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA NECROSE ASSÉPTICA DA CABEÇA DO FÊMUR EM UM CÃO YORKSHIRE TERRIER			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A necrose asséptica da cabeça do fêmur (NACF), do subtipo Doença de Legg-Calvé-Perthes, é uma afecção autossômica recessiva, desencadeada após um ou vários episódios de isquemia, causando osteonecrose na epífise proximal do fêmur. Comum em cães jovens (4 a 8 meses), de raças pequenas, esta osteopatia pode levar à fratura e colapso do osso trabecular necrótico, além do achamento da cabeça femoral que pode predispor a atropatia degenerativa.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever as características histopatológicas da NACF, em um cão Yorkshire Terrier, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, da raça Yorkkshire Terrier, macho, 8 meses, foi atendido com sinais clínicos de impotência funcional de membro pélvico esquerdo e suspeita de possível fratura e alteração de trabeculado ósseo em região de cabeça femoral, em exame radiográfico. As suspeitas diagnósticas eram fratura de cabeça do fêmur ou NACF. Foi realizado colocefalectomia e a amostra foi encaminhada para histopatologia (lâminas coradas hematoxilina-eosina).			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar do exame radiográfico e quadro clínico do animal concluírem o diagnóstico de NACF, a avaliação histopatológica que melhor pode determinar estadiamento da lesão, uma vez que é possível verificar as áreas de necrose, reabsorção óssea e o aparecimento do tecido fibroso (forma mais tardia). Na microscopia, a lesão apresentou perda parcial da arquitetura histomorfológica, devido à ocorrência de áreas focalmente extensas de necrose intensa, associada à fibrose moderada e neovascularização discreta. Notou-se condensação óssea e osteócitos com anisocitose e pleomorfismo moderados, com núcleos picnóticos nas regiões perilesionais, além de osteoblastos típicos na superfície óssea em contato com as áreas de necrose (remodelamento ósseo). Não foram vistas atipias celulares em medula óssea. Houve presença de histiócitos típicos no limite do tecido fibrótico. Essa descrição segue literaturas anteriores. Com base no histopatológico, o animal em questão foi classificado como NACF tardio, uma vez que há substituição parcial da arquitetura tecidual remodelada por fibrose.			
<b>CONCLUSOES</b>	Mesmo com o diagnóstico de NACF em exame radiográfico, o histopatológico foi essencial para confirmação diagnóstica e possibilitou o estadiamento da lesão no cão.			
<b>REFERENCIAS</b>	MAXIE, Grant. Jubb, Kennedy (#38) Palmer's pathology of domestic animals: volume 2. Elsevier health sciences, 2016. TROSTEL, C. Todd; POOL, Roy R.; MCLAUGHLIN, Ron M. Canine lameness caused by developmental orthopedic diseases: panosteitis, Legg-Calve-Perthes disease, and hypertrophic osteodystrophy. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, v. 25, n. 4, p. 282-293, 2003. ZACHARY, James F.; MCGAVIN, M. Donald; MCGAVIN, M. Donald. Bases da patologia em veterinária. Elsevier Health Sciences Brazil, 2012.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14746	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	CARACTERIZAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA NECROSE ASSÉPTICA DA CABEÇA DO FÊMUR EM UM CÃO YORKSHIRE TERRIER			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A necrose asséptica da cabeça do fêmur (NACF), do subtipo Doença de Legg-Calvé-Perthes, é uma afecção autossômica recessiva, desencadeada após um ou vários episódios de isquemia, causando osteonecrose na epífise proximal do fêmur. Comum em cães jovens (4 a 8 meses), de raças pequenas, esta osteopatia pode levar à fratura e colapso do osso trabecular necrótico, além do achamento da cabeça femoral que pode predispor a atropatia degenerativa.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever as características histopatológicas da NACF, em um cão Yorkshire Terrier, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, da raça Yorkshire Terrier, macho, 8 meses, foi atendido com sinais clínicos de impotência funcional de membro pélvico esquerdo e suspeita de possível fratura e alteração de trabeculado ósseo em região de cabeça femoral, em exame radiográfico. As suspeitas diagnósticas eram fratura de cabeça do fêmur ou NACF. Foi realizado colocefaleotomia e a amostra foi encaminhada para histopatologia (lâminas coradas hematoxilina-eosina).			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar do exame radiográfico e quadro clínico do animal concluírem o diagnóstico de NACF, a avaliação histopatológica que melhor pode determinar estadiamento da lesão, uma vez que é possível verificar as áreas de necrose, reabsorção óssea e o aparecimento do tecido fibroso (forma mais tardia). Na microscopia, a lesão apresentou perda parcial da arquitetura histomorfológica, devido à ocorrência de áreas focalmente extensas de necrose intensa, associada à fibrose moderada e neovascularização discreta. Notou-se condensação óssea e osteócitos com anisocitose e pleomorfismo moderados, com núcleos picnóticos nas regiões perilesionais, além de osteoblastos típicos na superfície óssea em contato com as áreas de necrose (remodelamento ósseo). Não foram vistas atipias celulares em medula óssea. Houve presença de histiócitos típicos no limite do tecido fibrótico. Essa descrição segue literaturas anteriores. Com base no histopatológico, o animal em questão foi classificado como NACF tardio, uma vez que há substituição parcial da arquitetura tecidual remodelada por fibrose.			
<b>CONCLUSOES</b>	Mesmo com o diagnóstico de NACF em exame radiográfico, o histopatológico foi essencial para confirmação diagnóstica e possibilitou o estadiamento da lesão no cão.			
<b>REFERENCIAS</b>	MAXIE, Grant. Jubb, Kennedy (#38) Palmer's pathology of domestic animals: volume 2. Elsevier health sciences, 2016. TROSTEL, C. Todd; POOL, Roy R.; MCLAUGHLIN, Ron M. Canine lameness caused by developmental orthopedic diseases: panosteitis, Legg-Calve-Perthes disease, and hypertrophic osteodystrophy. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, v. 25, n. 4, p. 282-293, 2003. ZACHARY, James F.; MCGAVIN, M. Donald; MCGAVIN, M. Donald. Bases da patologia em veterinária. Elsevier Health Sciences Brazil, 2012.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14746	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5075807 - MARCO ANTONIO BRUZADIN GRATIERI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	CARACTERIZAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA NECROSE ASSÉPTICA DA CABEÇA DO FÊMUR EM UM CÃO YORKSHIRE TERRIER			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A necrose asséptica da cabeça do fêmur (NACF), do subtipo Doença de Legg-Calvé-Perthes, é uma afecção autossômica recessiva, desencadeada após um ou vários episódios de isquemia, causando osteonecrose na epífise proximal do fêmur. Comum em cães jovens (4 a 8 meses), de raças pequenas, esta osteopatia pode levar à fratura e colapso do osso trabecular necrótico, além do achamento da cabeça femoral que pode predispor a atropatia degenerativa.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever as características histopatológicas da NACF, em um cão Yorkshire Terrier, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, da raça Yorkshire Terrier, macho, 8 meses, foi atendido com sinais clínicos de impotência funcional de membro pélvico esquerdo e suspeita de possível fratura e alteração de trabeculado ósseo em região de cabeça femoral, em exame radiográfico. As suspeitas diagnósticas eram fratura de cabeça do fêmur ou NACF. Foi realizado colocelefalectomia e a amostra foi encaminhada para histopatologia (lâminas coradas hematoxilina-eosina).			
<b>RESULTADOS</b>	Apesar do exame radiográfico e quadro clínico do animal concluírem o diagnóstico de NACF, a avaliação histopatológica que melhor pode determinar estadiamento da lesão, uma vez que é possível verificar as áreas de necrose, reabsorção óssea e o aparecimento do tecido fibroso (forma mais tardia). Na microscopia, a lesão apresentou perda parcial da arquitetura histomorfológica, devido à ocorrência de áreas focalmente extensas de necrose intensa, associada à fibrose moderada e neovascularização discreta. Notou-se condensação óssea e osteócitos com anisocitose e pleomorfismo moderados, com núcleos picnóticos nas regiões perilesionais, além de osteoblastos típicos na superfície óssea em contato com as áreas de necrose (remodelamento ósseo). Não foram vistas atipias celulares em medula óssea. Houve presença de histiócitos típicos no limite do tecido fibrótico. Essa descrição segue literaturas anteriores. Com base no histopatológico, o animal em questão foi classificado como NACF tardio, uma vez que há substituição parcial da arquitetura tecidual remodelada por fibrose.			
<b>CONCLUSOES</b>	Mesmo com o diagnóstico de NACF em exame radiográfico, o histopatológico foi essencial para confirmação diagnóstica e possibilitou o estadiamento da lesão no cão.			
<b>REFERENCIAS</b>	MAXIE, Grant. Jubb, Kennedy (#38) Palmer's pathology of domestic animals: volume 2. Elsevier health sciences, 2016. TROSTEL, C. Todd; POOL, Roy R.; MCLAUGHLIN, Ron M. Canine lameness caused by developmental orthopedic diseases: panosteitis, Legg-Calve-Perthes disease, and hypertrophic osteodystrophy. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, v. 25, n. 4, p. 282-293, 2003. ZACHARY, James F.; MCGAVIN, M. Donald; MCGAVIN, M. Donald. Bases da patologia em veterinária. Elsevier Health Sciences Brazil, 2012.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14747	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4321235 - LAURA GALEGO TEIXEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginf		
<b>TITULO</b>	A incidência de Sífilis na Grande São Paulo pré e durante a pandemia por COVID-19.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A sífilis é uma doença sistêmica humana, de notificação compulsória, causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i> . Ela é transmitida pelo contato sexual, sanguíneo ou de forma vertical para o feto durante a gestação de uma mãe não tratada ou tratada inadequadamente. O diagnóstico depende da história do paciente e da detecção de antígenos ou anticorpos por meio de testes laboratoriais. Seu tratamento é realizado com Penicilina Benzatina, com dosagem variável de acordo com o estágio da doença. A prevenção da sífilis é feita através do uso de preservativos sexuais masculinos ou femininos, que impede o contato entre fluidos corporais. Por se tratar de uma doença com inúmeras repercussões, faz-se necessário um estudo com o intuito de relacionar a transmissão de sífilis com os períodos do ano.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é comparar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida notificados nos anos de 2018 e 2020 na Grande São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo quantitativo e analítico dos casos de sífilis adquirida em São Paulo, no qual os dados serão obtidos a partir dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).			
<b>RESULTADOS</b>	Quanto à quantidade de casos notificados de Sífilis observa-se uma queda no ano de 2020 (pandemia), quando comparado ao ano de 2018 (pré pandemia). No que tange ao sexo, há uma incidência maior de notificação entre os homens. Por fim, ao analisar a faixa etária, a incidência maior é na população de 20 a 39 anos, população sexualmente mais ativa. Mas quando analisado o comportamento de cada faixa etária nos dois períodos, nota-se uma diminuição mais significativa entre as faixas de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A partir dos dados obtidos, foi possível observar que o período pandêmico teve um impacto na quantidade de casos notificados, que poderão ser confirmados após análise estatística.			
<b>REFERENCIAS</b>	GASPAR, PC.; BIGOLIN, A.; NETO, JBA.; PEREIRA, ÉDSON.; BAZZO, ML. Brazilian Protocol for Sexually Transmitted Infections 2020: syphilis diagnostic tests. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília, v. 30(Esp.1):1-12, na página 6, out. 2021. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf/@download/file/boletim_sifilis_2021_internet.pdf">https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf</a> . Acesso em: 01 nov. 2022. OLIVEIRA, Iana Mundim de; OLIVEIRA, Rivert Paulo Braga; ALVES, Rosane Ribeiro Figueiredo. Diagnosis, treatment, and notification of syphilis during pregnancy in the state of Goiás, Brazil, between 2007 and 2017. Revista de Saúde Pública, v. 55, n. 68. Disponível em: <a href="https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/">https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14747	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4321723 - ISABELLE REIS SANTIAGO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginf		
<b>TITULO</b>	A incidência de Sífilis na Grande São Paulo pré e durante a pandemia por COVID-19.			
<b>INTRODUCA O</b>	A sífilis é uma doença sistêmica humana, de notificação compulsória, causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i> . Ela é transmitida pelo contato sexual, sanguíneo ou de forma vertical para o feto durante a gestação de uma mãe não tratada ou tratada inadequadamente. O diagnóstico depende da história do paciente e da detecção de antígenos ou anticorpos por meio de testes laboratoriais. Seu tratamento é realizado com Penicilina Benzatina, com dosagem variável de acordo com o estágio da doença. A prevenção da sífilis é feita através do uso de preservativos sexuais masculinos ou femininos, que impede o contato entre fluidos corporais. Por se tratar de uma doença com inúmeras repercussões, faz-se necessário um estudo com o intuito de relacionar a transmissão de sífilis com os períodos do ano.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é comparar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida notificados nos anos de 2018 e 2020 na Grande São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo quantitativo e analítico dos casos de sífilis adquirida em São Paulo, no qual os dados serão obtidos a partir dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).			
<b>RESULTADO S</b>	Quanto à quantidade de casos notificados de Sífilis observa-se uma queda no ano de 2020 (pandemia), quando comparado ao ano de 2018 (pré pandemia). No que tange ao sexo, há uma incidência maior de notificação entre os homens. Por fim, ao analisar a faixa etária, a incidência maior é na população de 20 a 39 anos, população sexualmente mais ativa. Mas quando analisado o comportamento de cada faixa etária nos dois períodos, nota-se uma diminuição mais significativa entre as faixas de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A partir dos dados obtidos, foi possível observar que o período pandêmico teve um impacto na quantidade de casos notificados, que poderão ser confirmados após análise estatística.			
<b>REFERENCIA S</b>	GASPAR, PC.; BIGOLIN, A.; NETO, JBA.; PEREIRA, ÉDSON.; BAZZO, ML. Brazilian Protocol for Sexually Transmitted Infections 2020: syphilis diagnostic tests. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília, v. 30(Esp.1):1-12, na página 6, out. 2021. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf/@download/file/boletim_sifilis_2021_internet.pdf">https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf</a> . Acesso em: 01 nov. 2022. OLIVEIRA, Iana Mundim de; OLIVEIRA, Rivert Paulo Braga; ALVES, Rosane Ribeiro Figueiredo. Diagnosis, treatment, and notification of syphilis during pregnancy in the state of Goiás, Brazil, between 2007 and 2017. Revista de Saúde Pública, v. 55, n. 68. Disponível em: <a href="https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/">https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14747	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4321910 - LIVIA GIAMPICCOLO PAPA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginf		
<b>TITULO</b>	A incidência de Sífilis na Grande São Paulo pré e durante a pandemia por COVID-19.			
<b>INTRODUCAO</b>	A sífilis é uma doença sistêmica humana, de notificação compulsória, causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i> . Ela é transmitida pelo contato sexual, sanguíneo ou de forma vertical para o feto durante a gestação de uma mãe não tratada ou tratada inadequadamente. O diagnóstico depende da história do paciente e da detecção de antígenos ou anticorpos por meio de testes laboratoriais. Seu tratamento é realizado com Penicilina Benzatina, com dosagem variável de acordo com o estágio da doença. A prevenção da sífilis é feita através do uso de preservativos sexuais masculinos ou femininos, que impede o contato entre fluidos corporais. Por se tratar de uma doença com inúmeras repercussões, faz-se necessário um estudo com o intuito de relacionar a transmissão de sífilis com os períodos do ano.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é comparar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida notificados nos anos de 2018 e 2020 na Grande São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo quantitativo e analítico dos casos de sífilis adquirida em São Paulo, no qual os dados serão obtidos a partir dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).			
<b>RESULTADOS</b>	Quanto à quantidade de casos notificados de Sífilis observa-se uma queda no ano de 2020 (pandemia), quando comparado ao ano de 2018 (pré pandemia). No que tange ao sexo, há uma incidência maior de notificação entre os homens. Por fim, ao analisar a faixa etária, a incidência maior é na população de 20 a 39 anos, população sexualmente mais ativa. Mas quando analisado o comportamento de cada faixa etária nos dois períodos, nota-se uma diminuição mais significativa entre as faixas de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A partir dos dados obtidos, foi possível observar que o período pandêmico teve um impacto na quantidade de casos notificados, que poderão ser confirmados após análise estatística.			
<b>REFERENCIAS</b>	GASPAR, PC.; BIGOLIN, A.; NETO, JBA.; PEREIRA, ÉDSON.; BAZZO, ML. Brazilian Protocol for Sexually Transmitted Infections 2020: syphilis diagnostic tests. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília, v. 30(Esp.1):1-12, na página 6, out. 2021. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf/@download/file/boletim_sifilis_2021_internet.pdf">https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf</a> . Acesso em: 01 nov. 2022. OLIVEIRA, Iana Mundim de; OLIVEIRA, Rivert Paulo Braga; ALVES, Rosane Ribeiro Figueiredo. Diagnosis, treatment, and notification of syphilis during pregnancy in the state of Goiás, Brazil, between 2007 and 2017. Revista de Saúde Pública, v. 55, n. 68. Disponível em: <a href="https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/">https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14747	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517407 - ALINE GARCIA DE PAIVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginf		
<b>TITULO</b>	A incidência de Sífilis na Grande São Paulo pré e durante a pandemia por COVID-19.			
<b>INTRODUCA O</b>	A sífilis é uma doença sistêmica humana, de notificação compulsória, causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i> . Ela é transmitida pelo contato sexual, sanguíneo ou de forma vertical para o feto durante a gestação de uma mãe não tratada ou tratada inadequadamente. O diagnóstico depende da história do paciente e da detecção de antígenos ou anticorpos por meio de testes laboratoriais. Seu tratamento é realizado com Penicilina Benzatina, com dosagem variável de acordo com o estágio da doença. A prevenção da sífilis é feita através do uso de preservativos sexuais masculinos ou femininos, que impede o contato entre fluidos corporais. Por se tratar de uma doença com inúmeras repercussões, faz-se necessário um estudo com o intuito de relacionar a transmissão de sífilis com os períodos do ano.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é comparar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida notificados nos anos de 2018 e 2020 na Grande São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo quantitativo e analítico dos casos de sífilis adquirida em São Paulo, no qual os dados serão obtidos a partir dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).			
<b>RESULTADO S</b>	Quanto à quantidade de casos notificados de Sífilis observa-se uma queda no ano de 2020 (pandemia), quando comparado ao ano de 2018 (pré pandemia). No que tange ao sexo, há uma incidência maior de notificação entre os homens. Por fim, ao analisar a faixa etária, a incidência maior é na população de 20 a 39 anos, população sexualmente mais ativa. Mas quando analisado o comportamento de cada faixa etária nos dois períodos, nota-se uma diminuição mais significativa entre as faixas de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A partir dos dados obtidos, foi possível observar que o período pandêmico teve um impacto na quantidade de casos notificados, que poderão ser confirmados após análise estatística.			
<b>REFERENCIA S</b>	GASPAR, PC.; BIGOLIN, A.; NETO, JBA.; PEREIRA, ÉDSON.; BAZZO, ML. Brazilian Protocol for Sexually Transmitted Infections 2020: syphilis diagnostic tests. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília, v. 30(Esp.1):1-12, na página 6, out. 2021. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf/@download/file/boletim_sifilis_2021_internet.pdf">https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf</a> . Acesso em: 01 nov. 2022. OLIVEIRA, Iana Mundim de; OLIVEIRA, Rivert Paulo Braga; ALVES, Rosane Ribeiro Figueiredo. Diagnosis, treatment, and notification of syphilis during pregnancy in the state of Goiás, Brazil, between 2007 and 2017. Revista de Saúde Pública, v. 55, n. 68. Disponível em: <a href="https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/">https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14747	Medicina	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4526601 - MARIA FERNANDA SALA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	A incidência de Sífilis na Grande São Paulo pré e durante a pandemia por COVID-19.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A sífilis é uma doença sistêmica humana, de notificação compulsória, causada pela bactéria <i>Treponema pallidum</i> . Ela é transmitida pelo contato sexual, sanguíneo ou de forma vertical para o feto durante a gestação de uma mãe não tratada ou tratada inadequadamente. O diagnóstico depende da história do paciente e da detecção de antígenos ou anticorpos por meio de testes laboratoriais. Seu tratamento é realizado com Penicilina Benzatina, com dosagem variável de acordo com o estágio da doença. A prevenção da sífilis é feita através do uso de preservativos sexuais masculinos ou femininos, que impede o contato entre fluidos corporais. Por se tratar de uma doença com inúmeras repercussões, faz-se necessário um estudo com o intuito de relacionar a transmissão de sífilis com os períodos do ano.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é comparar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida notificados nos anos de 2018 e 2020 na Grande São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo quantitativo e analítico dos casos de sífilis adquirida em São Paulo, no qual os dados serão obtidos a partir dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).			
<b>RESULTADOS</b>	Quanto à quantidade de casos notificados de Sífilis observa-se uma queda no ano de 2020 (pandemia), quando comparado ao ano de 2018 (pré pandemia). No que tange ao sexo, há uma incidência maior de notificação entre os homens. Por fim, ao analisar a faixa etária, a incidência maior é na população de 20 a 39 anos, população sexualmente mais ativa. Mas quando analisado o comportamento de cada faixa etária nos dois períodos, nota-se uma diminuição mais significativa entre as faixas de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A partir dos dados obtidos, foi possível observar que o período pandêmico teve um impacto na quantidade de casos notificados, que poderão ser confirmados após análise estatística.			
<b>REFERENCIAS</b>	GASPAR, PC.; BIGOLIN, A.; NETO, JBA.; PEREIRA, ÉDSON.; BAZZO, ML. Brazilian Protocol for Sexually Transmitted Infections 2020: syphilis diagnostic tests. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília, v. 30(Esp.1):1-12, na página 6, out. 2021. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf/@download/file/boletim_sifilis_2021_internet.pdf">https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2021/sifilis/boletim_sifilis_2021_internet.pdf</a> . Acesso em: 01 nov. 2022. OLIVEIRA, Iana Mundim de; OLIVEIRA, Rivert Paulo Braga; ALVES, Rosane Ribeiro Figueiredo. Diagnosis, treatment, and notification of syphilis during pregnancy in the state of Goiás, Brazil, between 2007 and 2017. Revista de Saúde Pública, v. 55, n. 68. Disponível em: <a href="https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/">https://scielosp.org/article/rsp/2021.v55/68/</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14750	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	DERMATITE ULCERATIVA ASSOCIADA À INFECÇÃO POR <i>Serratia</i> sp. EM <i>RATTUS NORVEGICUS</i>			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A síndrome dermatite ulcerativa (SDU) em roedores de laboratório (camundongos e ratos) costuma apresentar curso crônico e origem multifatorial. A SDU pode ter origem idiopática ou estar associada a fatores como o grooming excessivo, prurido intenso, lesões auto infligidas na pele e/ou dermatopatias citotóxicas. Fatores ambientais, sexuais (em fêmeas), nutricionais, alopecia (em animais jovens), linhagens de animais (camundongo C57BL/6) e infecção por <i>Staphylococcus aureus</i> também são associados à SDU nesses animais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de dermatite ulcerativa em um rato Wistar ( <i>Rattus norvegicus</i> ), de criação doméstica, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um rato Wistar, macho, com 1 ano, apresentou prurido intenso, lambadura constante, e lesões alopecias por todo o corpo, com evolução para pododermite grave, mesmo após tratamento para acariase. Posteriormente, o animal foi tratado com amoxicilina (20mg/Kg), sem sucesso. Ao realizar exame citológico cutâneo, foi observado infiltrado inflamatório rico em linfócitos. A investigação laboratorial foi complementada com coleta de amostras para cultura fúngica e bacteriana, além de biópsia de pele.			
<b>RESULTADOS</b>	O fragmento de pele coletado para biópsia foi processado por métodos de rotina para obtenção de seções histológicas coradas por hematoxilina-eosina (HE), Gram, Grocott e Ácido Periódico de Stiff (PAS). Microscopicamente, foi observada foliculite mural, com infiltrado rico em histiócitos e, em menor número, linfócitos e plasmócitos, multifocal, moderado, com extensão até trechos da epiderme adjacente. Em áreas multifocais da junção dermo-epidérmica, foi observado infiltrado inflamatório similar (dermatite de interface), associado à balonização e apoptose de células do estrato basal da epiderme. Área focalmente extensa de ulceração da epiderme, com crosta fibrinoleucocitária e trechos com acantose e hiperqueratose moderadas também foram observados. Na ulceração, foram identificados restos celulares, infiltrado neutrofílico e linfoplasmocítico, moderado, multifocal, além de colônias bacterianas cocoides (gram negativos), discretas, multifocais. Não foram observadas estruturas compatíveis com leveduras e/ou hifas nas colorações de Grocott e PAS. Os resultados de cultura bacteriana apontaram isolamento de <i>Serratia</i> sp., bactéria gram negativa, e ausência de crescimento fúngico ou leveduriforme, corroborando os achados histopatológicos. O diagnóstico morfológico de dermatite ulcerativa e piogranulomatosa, crônica-ativa, multifocal a coalescente, moderada, associado a ulceração e colônias de bactérias ( <i>Serratia</i> sp.), foi estabelecido com base nos achados histopatológicos e microbiológicos. A SDU é comumente descrita em camundongos de experimentação e, na literatura, a ocorrência da síndrome em animais jovens está associada a quadro de alopecia e prurido intenso, como no caso aqui reportado. A SDU costuma ser associada a <i>S. aureus</i> , entretanto a infecção por <i>Serratia</i> sp. no presente caso pode sugerir a participação de outros agentes bacterianos, possivelmente por infecção bacteriana secundária ao prurido/escoriações de pele. Apesar de não ser determinada a etiologia, o perfil dermatopatológico sugere mecanismo imunomediado (dermatite citotóxica) primário que ainda necessita de investigações adicionais.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A combinação da avaliação histopatológica e cultura bacteriana permitiu o diagnóstico de SDU associada à infecção por <i>Serratia</i> sp.. O padrão morfológico da lesão pode auxiliar no diagnóstico diferencial de dermatopatias em roedores e auxiliar na escolha da conduta terapêutica.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	AFFOLTER, Verena K. Cytotoxic dermatitis: Review of the interface dermatitis pattern in veterinary skin diseases. <i>Veterinary Pathology</i> , p. 03009858231195080, 2023. FROHLICH, Jennifer. Rats and mice. <i>Ferrets, rabbits, and rodents</i> , p. 345, 2020. MECKLENBURG, Lars et al. Proliferative and non-proliferative lesions of the rat and mouse integument. <i>Journal of toxicologic pathology</i> , v. 26, n. 3_Suppl, p. 27S-57S, 2013. QUESENBERRY, Katherine E.; CARPENTER, James W. <i>Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine and surgery: includes sugar gliders and hedgehogs</i> , 2012. WELLE M.M., Linder, K.E. <i>The Integument</i> . In: Zachary JF, ed. <i>Pathologic Basis of Veterinary Disease</i> . 7th ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2022:1095–1262.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14750	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075742 - STEFHANI CRISTINA CHAN JACIK	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	DERMATITE ULCERATIVA ASSOCIADA À INFECÇÃO POR <i>Serratia</i> sp. EM <i>RATTUS NORVEGICUS</i>			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A síndrome dermatite ulcerativa (SDU) em roedores de laboratório (camundongos e ratos) costuma apresentar curso crônico e origem multifatorial. A SDU pode ter origem idiopática ou estar associada a fatores como o grooming excessivo, prurido intenso, lesões auto infligidas na pele e/ou dermatopatias citotóxicas. Fatores ambientais, sexuais (em fêmeas), nutricionais, alopecia (em animais jovens), linhagens de animais (camundongo C57BL/6) e infecção por <i>Staphylococcus aureus</i> também são associados à SDU nesses animais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de dermatite ulcerativa em um rato Wistar ( <i>Rattus norvegicus</i> ), de criação doméstica, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um rato Wistar, macho, com 1 ano, apresentou prurido intenso, lambadura constante, e lesões alopecias por todo o corpo, com evolução para pododermite grave, mesmo após tratamento para acariase. Posteriormente, o animal foi tratado com amoxicilina (20mg/Kg), sem sucesso. Ao realizar exame citológico cutâneo, foi observado infiltrado inflamatório rico em linfócitos. A investigação laboratorial foi complementada com coleta de amostras para cultura fúngica e bacteriana, além de biópsia de pele.			
<b>RESULTADOS</b>	O fragmento de pele coletado para biópsia foi processado por métodos de rotina para obtenção de seções histológicas coradas por hematoxilina-eosina (HE), Gram, Grocott e Ácido Periódico de Stiff (PAS). Microscopicamente, foi observada foliculite mural, com infiltrado rico em histiócitos e, em menor número, linfócitos e plasmócitos, multifocal, moderado, com extensão até trechos da epiderme adjacente. Em áreas multifocais da junção dermo-epidérmica, foi observado infiltrado inflamatório similar (dermatite de interface), associado à balonização e apoptose de células do estrato basal da epiderme. Área focalmente extensa de ulceração da epiderme, com crosta fibrinoleucocitária e trechos com acantose e hiperqueratose moderadas também foram observados. Na ulceração, foram identificados restos celulares, infiltrado neutrofilico e linfoplasmocítico, moderado, multifocal, além de colônias bacterianas cocoides (gram negativos), discretas, multifocais. Não foram observadas estruturas compatíveis com leveduras e/ou hifas nas colorações de Grocott e PAS. Os resultados de cultura bacteriana apontaram isolamento de <i>Serratia</i> sp., bactéria gram negativa, e ausência de crescimento fúngico ou leveduriforme, corroborando os achados histopatológicos. O diagnóstico morfológico de dermatite ulcerativa e piogranulomatosa, crônica-ativa, multifocal a coalescente, moderada, associado a ulceração e colônias de bactérias ( <i>Serratia</i> sp.), foi estabelecido com base nos achados histopatológicos e microbiológicos. A SDU é comumente descrita em camundongos de experimentação e, na literatura, a ocorrência da síndrome em animais jovens está associada a quadro de alopecia e prurido intenso, como no caso aqui reportado. A SDU costuma ser associada a <i>S. aureus</i> , entretanto a infecção por <i>Serratia</i> sp. no presente caso pode sugerir a participação de outros agentes bacterianos, possivelmente por infecção bacteriana secundária ao prurido/escoriações de pele. Apesar de não ser determinada a etiologia, o perfil dermatopatológico sugere mecanismo imunomediado (dermatite citotóxica) primário que ainda necessita de investigações adicionais.			
<b>CONCLUSOES</b>	A combinação da avaliação histopatológica e cultura bacteriana permitiu o diagnóstico de SDU associada à infecção por <i>Serratia</i> sp.. O padrão morfológico da lesão pode auxiliar no diagnóstico diferencial de dermatopatias em roedores e auxiliar na escolha da conduta terapêutica.			
<b>REFERENCIAS</b>	AFFOLTER, Verena K. Cytotoxic dermatitis: Review of the interface dermatitis pattern in veterinary skin diseases. <i>Veterinary Pathology</i> , p. 03009858231195080, 2023. FROHLICH, Jennifer. Rats and mice. <i>Ferrets, rabbits, and rodents</i> , p. 345, 2020. MECKLENBURG, Lars et al. Proliferative and non-proliferative lesions of the rat and mouse integument. <i>Journal of toxicologic pathology</i> , v. 26, n. 3_Suppl, p. 27S-57S, 2013. QUESENBERRY, Katherine E.; CARPENTER, James W. <i>Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine and surgery: includes sugar gliders and hedgehogs</i> , 2012. WELLE M.M, Linder, K.E. <i>The Integument</i> . In: Zachary JF, ed. <i>Pathologic Basis of Veterinary Disease</i> . 7th ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2022:1095–1262.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14752	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3534634 - GIOVANNA FUNISCELLO DE SOUSA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	ADENOCARCINOMA CLITORIANO EM CADELA: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCAO</b>	Neoplasias malignas vulvares/vaginais representam apenas 3% dos tumores relatados em cadelas. O adenocarcinoma clitoriano (ACC) é uma neoplasia epitelial glandular, maligna, descrita desde 2010. O tumor é possivelmente originado a partir de glândulas apócrinas situadas na base do clitóris e fossa clitoriana. No presente, menos 12 casos de ACC foram relatados ao redor do mundo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever um caso de adenocarcinoma clitoriano em cadela atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma cadela, sem raça definida, fêmea, castrada, 12 anos, apresentou secreção sanguinolenta fétida, ulceração, lambedura e sensibilidade dolorosa em região vaginal/vulvar, além de incontinência urinária, sem alterações urinárias. Após avaliação clínica, as principais suspeitas diagnósticas foram de tumor venéreo transmissível (TVT) e vaginite. Foram realizados ultrassom abdominal, hemograma e contagem de reticulócitos e provas de bioquímica sérica (fosfatase alcalina, alanina aminotransferase, ureia, creatinina) e prova de função hepática (proteína total e albumina) e citologia vaginal. Após 1 mês, o animal demonstrava-se irresponsivo ao tratamento com antiinflamatório, antibiótico e tramal 3mg/Kg, sendo optado pela eutanásia. O cadáver foi encaminhado para exame de necropsia.			
<b>RESULTADOS</b>	No hemograma, observou-se anemia regenerativa, leucocitose e neutrofilia. Nas provas bioquímicas e de função hepática, a única alteração foi de hipoalbuminemia. O exame citológico apontou processo inflamatório supurativo. Os achados foram associados ao quadro de hemorragia e infecção local da região vaginal/vulvar. O exame ultrassonográfico indicou ausência de alterações nas glândulas do saco anal. Durante a necrópsia, foi observada uma massa na região interna da vulva, medindo 3,8 cm x 3,8 cm, avermelhada a acastanhado, lisa e ligeiramente friável que, ao corte, era macia a fibroelástica. Ao exame microscópico, observou-se neoplasia maligna epitelial glandular, não encapsulada, irregular, infiltrativa na submucosa, de moderada celularidade e arranjo misto, com padrões sólido (possuindo células ovoides), tubular (possuindo células cuboideis a poligonais) e em rosetas (possuindo células fusiformes), em meio a um estroma fibrocolagenoso moderado. As células neoplásicas eram de tamanho moderado, com citoplasma eosinofílico, pouco delimitado, núcleo central, médio, com cromatina densa e 0 a 1 nucléolos conspícuos, pequenos, centrais e basofílicos. Baixo índice mitótico (4 figuras de mitose em 2.37mm²), com anisocitose, anisocariose e pleomorfismo moderados. Adjacentes ao foco neoplásico, foram observadas áreas focalmente extensas de necrose, ulceração, fibrose e hemorragia intensas, associadas a infiltrado inflamatório misto, multifocais, marcantes, com colônias bacterianas cocoides. O ACC apresenta características microscópicas e perfil imuno-histoquímico de expressão neuroendócrina similares ao adenocarcinoma de saco anal, possivelmente devido à histogênese comum entre as neoplasias. O diagnóstico de adenocarcinoma de saco anal, com metástase em região vulvar, foi afastado por não haver comprometimento da glândula de saco anal no exame ultrassonográfico. O diagnóstico morfológico de adenocarcinoma clitoriano foi determinado com base na localização anatômica e características macro e microscópicas da lesão.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apesar do número limitado de casos descritos, o adenocarcinoma clitoriano deve ser incluído no diagnóstico diferencial de tumores vaginais/vulvares em cadelas, como o carcinoma de células escamosas, carcinoma do vestíbulo vaginal ou tumor venéreo transmissível, além do adenocarcinoma de saco anal.			
<b>REFERENCIAS</b>	AGNEW DW, MACLACHLAN NJ. Tumors of the Genital System. In: Tumors in Domestic Animals, Fifth Ed. D. J. Meuten (ed). Wiley-Blackwell, USA, 2017, pp.689–722. MCALONEY CA, TAIKOWSKI KL, CRONIN JP, JENNINGS RN, PREMANANDAN C, WELLMAN ML, HOKAMP JA. Pathology in Practice. Journal of the American Veterinary Medical Association 2021; 259(S2): 1-3. MOSS C, SUGAI N, PERSONS R, CIEPLUCH B, LAHMERS K, CECERE J. Case report: Clitoral adenocarcinoma in a mixed-breed female dog. Frontiers in Veterinary Science 2023; 10: 1264538. NEIHAUS S, WINTER JE, GORING RL, KENNEDY FA, KIUPEL M. Primary clitoral adenocarcinoma with secondary hypercalcemia of malignancy in a dog. Journal of the American Animal Hospital Association 2010; 46(3): 193-196. SUZUKI K, MORITA R, HOJO Y, NOMURA K, SHIBUTANI M, MITSUMORI K. Immunohistochemical characterization of neuroendocrine differentiation of canine anal sac glandular tumours. Journal of comparative pathology 2013; 149(2-3): 199-207. VERIN R, CIAN F, STEWART J, BINANTI D, MACNEILL AL, PIVIANI M, MONTI P, BARONI G, LE CALVEZ S, SCASE TJ, FINOTELLO R. Canine clitoral carcinoma: a clinical, cytologic, histopathologic, immunohistochemical, and ultrastructural study. Veterinary pathology 2018; 55(4): 501-509.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14752	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848110 - DANIELA SANTOS OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	ADENOCARCINOMA CLITORIANO EM CADELA: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCAO</b>	Neoplasias malignas vulvares/vaginais representam apenas 3% dos tumores relatados em cadelas. O adenocarcinoma clitoriano (ACC) é uma neoplasia epitelial glandular, maligna, descrita desde 2010. O tumor é possivelmente originado a partir de glândulas apócrinas situadas na base do clitóris e fossa clitoriana. No presente, menos 12 casos de ACC foram relatados ao redor do mundo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever um caso de adenocarcinoma clitoriano em cadela atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma cadela, sem raça definida, fêmea, castrada, 12 anos, apresentou secreção sanguinolenta fétida, ulceração, lambedura e sensibilidade dolorosa em região vaginal/vulvar, além de incontinência urinária, sem alterações urinárias. Após avaliação clínica, as principais suspeitas diagnósticas foram de tumor venéreo transmissível (TVT) e vaginite. Foram realizados ultrassom abdominal, hemograma e contagem de reticulócitos e provas de bioquímica sérica (fosfatase alcalina, alanina aminotransferase, ureia, creatinina) e prova de função hepática (proteína total e albumina) e citologia vaginal. Após 1 mês, o animal demonstrava-se irresponsivo ao tratamento com antiinflamatório, antibiótico e tramal 3mg/Kg, sendo optado pela eutanásia. O cadáver foi encaminhado para exame de necropsia.			
<b>RESULTADOS</b>	No hemograma, observou-se anemia regenerativa, leucocitose e neutrofilia. Nas provas bioquímicas e de função hepática, a única alteração foi de hipoalbuminemia. O exame citológico apontou processo inflamatório supurativo. Os achados foram associados ao quadro de hemorragia e infecção local da região vaginal/vulvar. O exame ultrassonográfico indicou ausência de alterações nas glândulas do saco anal. Durante a necrópsia, foi observada uma massa na região interna da vulva, medindo 3,8 cm x 3,8 cm, avermelhado a acastanhado, lisa e ligeiramente friável que, ao corte, era macia a fibroelástica. Ao exame microscópico, observou-se neoplasia maligna epitelial glandular, não encapsulada, irregular, infiltrativa na submucosa, de moderada celularidade e arranjo misto, com padrões sólido (possuindo células ovoides), tubular (possuindo células cuboideis a poligonais) e em rosetas (possuindo células fusiformes), em meio a um estroma fibrocolagenoso moderado. As células neoplásicas eram de tamanho moderado, com citoplasma eosinofílico, pouco delimitado, núcleo central, médio, com cromatina densa e 0 a 1 nucléolos conspícuos, pequenos, centrais e basofílicos. Baixo índice mitótico (4 figuras de mitose em 2.37mm²), com anisocitose, anisocariose e pleomorfismo moderados. Adjacentes ao foco neoplásico, foram observadas áreas focalmente extensas de necrose, ulceração, fibrose e hemorragia intensas, associadas a infiltrado inflamatório misto, multifocais, marcantes, com colônias bacterianas cocoides. O ACC apresenta características microscópicas e perfil imuno-histoquímico de expressão neuroendócrina similares ao adenocarcinoma de saco anal, possivelmente devido à histogênese comum entre as neoplasias. O diagnóstico de adenocarcinoma de saco anal, com metástase em região vulvar, foi afastado por não haver comprometimento da glândula de saco anal no exame ultrassonográfico. O diagnóstico morfológico de adenocarcinoma clitoriano foi determinado com base na localização anatômica e características macro e microscópicas da lesão.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apesar do número limitado de casos descritos, o adenocarcinoma clitoriano deve ser incluído no diagnóstico diferencial de tumores vaginais/vulvares em cadelas, como o carcinoma de células escamosas, carcinoma do vestibulo vaginal ou tumor venéreo transmissível, além do adenocarcinoma de saco anal.			
<b>REFERENCIAS</b>	AGNEW DW, MACLACHLAN NJ. Tumors of the Genital System. In: Tumors in Domestic Animals, Fifth Ed. D. J. Meuten (ed). Wiley-Blackwell, USA, 2017, pp.689–722. MCALONEY CA, TAIKOWSKI KL, CRONIN JP, JENNINGS RN, PREMANANDAN C, WELLMAN ML, HOKAMP JA. Pathology in Practice. Journal of the American Veterinary Medical Association 2021; 259(S2): 1-3. MOSS C, SUGAI N, PERSONS R, CIEPLUCH B, LAHMERS K, CECERE J. Case report: Clitoral adenocarcinoma in a mixed-breed female dog. Frontiers in Veterinary Science 2023; 10: 1264538. NEIHAUS S, WINTER JE, GORING RL, KENNEDY FA, KIUPEL M. Primary clitoral adenocarcinoma with secondary hypercalcemia of malignancy in a dog. Journal of the American Animal Hospital Association 2010; 46(3): 193-196. SUZUKI K, MORITA R, HOJO Y, NOMURA K, SHIBUTANI M, MITSUMORI K. Immunohistochemical characterization of neuroendocrine differentiation of canine anal sac glandular tumours. Journal of comparative pathology 2013; 149(2-3): 199-207. VERIN R, CIAN F, STEWART J, BINANTI D, MACNEILL AL, PIVIANI M, MONTI P, BARONI G, LE CALVEZ S, SCASE TJ, FINOTELLO R. Canine clitoral carcinoma: a clinical, cytologic, histopathologic, immunohistochemical, and ultrastructural study. Veterinary pathology 2018; 55(4): 501-509.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14752	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	ADENOCARCINOMA CLITORIANO EM CADELA: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCA O</b>	Neoplasias malignas vulvares/vaginais representam apenas 3% dos tumores relatados em cadelas. O adenocarcinoma clitoriano (ACC) é uma neoplasia epitelial glandular, maligna, descrita desde 2010. O tumor é possivelmente originado a partir de glândulas apócrinas situadas na base do clitóris e fossa clitoriana. No presente, menos 12 casos de ACC foram relatados ao redor do mundo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever um caso de adenocarcinoma clitoriano em cadela atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Uma cadela, sem raça definida, fêmea, castrada, 12 anos, apresentou secreção sanguinolenta fétida, ulceração, lambedura e sensibilidade dolorosa em região vaginal/vulvar, além de incontinência urinária, sem alterações urinárias. Após avaliação clínica, as principais suspeitas diagnósticas foram de tumor venéreo transmissível (TVT) e vaginite. Foram realizados ultrassom abdominal, hemograma e contagem de reticulócitos e provas de bioquímica sérica (fosfatase alcalina, alanina aminotransferase, ureia, creatinina) e prova de função hepática (proteína total e albumina) e citologia vaginal. Após 1 mês, o animal demonstrava-se irresponsivo ao tratamento com antiinflamatório, antibiótico e tramal 3mg/Kg, sendo optado pela eutanásia. O cadáver foi encaminhado para exame de necropsia.			
<b>RESULTADO S</b>	No hemograma, observou-se anemia regenerativa, leucocitose e neutrofilia. Nas provas bioquímicas e de função hepática, a única alteração foi de hipoalbuminemia. O exame citológico apontou processo inflamatório supurativo. Os achados foram associados ao quadro de hemorragia e infecção local da região vaginal/vulvar. O exame ultrassonográfico indicou ausência de alterações nas glândulas do saco anal. Durante a necrópsia, foi observada uma massa na região interna da vulva, medindo 3,8 cm x 3,8 cm, avermelhado a acastanhado, lisa e ligeiramente friável que, ao corte, era macia a fibroelástica. Ao exame microscópico, observou-se neoplasia maligna epitelial glandular, não encapsulada, irregular, infiltrativa na submucosa, de moderada celularidade e arranjo misto, com padrões sólido (possuindo células ovoides), tubular (possuindo células cuboideis a poligonais) e em rosetas (possuindo células fusiformes), em meio a um estroma fibrocolagenoso moderado. As células neoplásicas eram de tamanho moderado, com citoplasma eosinofílico, pouco delimitado, núcleo central, médio, com cromatina densa e 0 a 1 nucléolos conspícuos, pequenos, centrais e basofílicos. Baixo índice mitótico (4 figuras de mitose em 2.37mm²), com anisocitose, anisocariose e pleomorfismo moderados. Adjacentes ao foco neoplásico, foram observadas áreas focalmente extensas de necrose, ulceração, fibrose e hemorragia intensas, associadas a infiltrado inflamatório misto, multifocais, marcantes, com colônias bacterianas cocoides. O ACC apresenta características microscópicas e perfil imuno-histoquímico de expressão neuroendócrina similares ao adenocarcinoma de saco anal, possivelmente devido à histogênese comum entre as neoplasias. O diagnóstico de adenocarcinoma de saco anal, com metástase em região vulvar, foi afastado por não haver comprometimento da glândula de saco anal no exame ultrassonográfico. O diagnóstico morfológico de adenocarcinoma clitoriano foi determinado com base na localização anatômica e características macro e microscópicas da lesão.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apesar do número limitado de casos descritos, o adenocarcinoma clitoriano deve ser incluído no diagnóstico diferencial de tumores vaginais/vulvares em cadelas, como o carcinoma de células escamosas, carcinoma do vestibulo vaginal ou tumor venéreo transmissível, além do adenocarcinoma de saco anal.			
<b>REFERENCIA S</b>	AGNEW DW, MACLACHLAN NJ. Tumors of the Genital System. In: Tumors in Domestic Animals, Fifth Ed. D. J. Meuten (ed). Wiley-Blackwell, USA, 2017, pp.689–722. MCALONEY CA, TAIKOWSKI KL, CRONIN JP, JENNINGS RN, PREMANANDAN C, WELLMAN ML, HOKAMP JA. Pathology in Practice. Journal of the American Veterinary Medical Association 2021; 259(S2): 1-3. MOSS C, SUGAI N, PERSONS R, CIEPLUCH B, LAHMERS K, CECERE J. Case report: Clitoral adenocarcinoma in a mixed-breed female dog. Frontiers in Veterinary Science 2023; 10: 1264538. NEIHAUS S, WINTER JE, GORING RL, KENNEDY FA, KIUPEL M. Primary clitoral adenocarcinoma with secondary hypercalcemia of malignancy in a dog. Journal of the American Animal Hospital Association 2010; 46(3): 193-196. SUZUKI K, MORITA R, HOJO Y, NOMURA K, SHIBUTANI M, MITSUMORI K. Immunohistochemical characterization of neuroendocrine differentiation of canine anal sac glandular tumours. Journal of comparative pathology 2013; 149(2-3): 199-207. VERIN R, CIAN F, STEWART J, BINANTI D, MACNEILL AL, PIVIANI M, MONTI P, BARONI G, LE CALVEZ S, SCASE TJ, FINOTELLO R. Canine clitoral carcinoma: a clinical, cytologic, histopathologic, immunohistochemical, and ultrastructural study. Veterinary pathology 2018; 55(4): 501-509.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14753	Enfermagem	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3780554 - ELISANGELA BEZERRA LOURENCO AZEVEDO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	Setembro Amarelo: um resgate histórico de como tudo começou			
<b>INTRODUCAO</b>	A história do Setembro Amarelo e de Mike Emme se entrelaça em uma jornada que busca aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio e promover a saúde mental. Ambos têm desempenhado papéis significativos na quebra do estigma que cerca as questões de saúde mental e no incentivo para que as pessoas busquem ajuda quando necessário.			
<b>OBJETIVOS</b>	Levantar aspectos históricos acerca do Setembro Amarelo e sua relação com a prevenção ao suicídio.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura onde foram revisados artigos em inglês e português coletados na base de dados Scielo e PubMed. Foram utilizados os descritores: "história" AND "suicídio".			
<b>RESULTADOS</b>	Mike Emme, embora seja um nome menos conhecido, desempenhou um papel crucial na história do Setembro Amarelo. A sua ligação com a campanha é emocional e inspiradora. Mike era um jovem canadense que, em 1994, tirou a própria vida aos 17 anos. Seus pais, Dale e Darlene Emme, criaram uma fita amarela em memória de seu filho, que gostava da canção "Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree". Essa fita amarela foi utilizada como símbolo para lembrar Mike e para conscientizar sobre a prevenção do suicídio. Essa fita amarela mais tarde inspirou a escolha da cor amarela como símbolo do Setembro Amarelo, criando um elo emocional entre o movimento e a história pessoal de Mike Emme. Os pais de Mike se tornaram defensores da prevenção do suicídio e participaram ativamente da conscientização e da promoção da saúde mental em suas comunidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	A história do Setembro Amarelo e de Mike Emme demonstra o poder da ação pessoal e do movimento coletivo na promoção da saúde mental e na prevenção do suicídio. Através da lembrança de Mike e da fita amarela, ela se tornou um símbolo global da esperança, do apoio e da conscientização. As histórias de ambos inspiram-nos a abordar as questões de saúde mental com compaixão e empatia, a quebrar o estigma e a criar uma rede de apoio para aqueles que enfrentam desafios emocionais. A conscientização sobre a prevenção do suicídio deve ser uma preocupação contínua. O Setembro Amarelo e a história de Mike Emme nos lembram de que, por meio do diálogo aberto, da compreensão e da disseminação de recursos, podemos criar comunidades mais solidárias e compassivas, oferecendo apoio àqueles que mais precisam.			
<b>REFERENCIAS</b>	World Health Organization. Public health action for the prevention of suicide: a framework. 2012; 1–26. Disponível em: <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75166/9789241503570_eng.pdf?sessionid=09BE83D92A0C1680AEBF2DF7A8E945F8?sequence=14">http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75166/9789241503570_eng.pdf?sessionid=09BE83D92A0C1680AEBF2DF7A8E945F8?sequence=14</a> . Bennett K, Rhodes AE, Duda S, Cheung AH, Manassis K, Links P, et al. A Youth Suicide Prevention Plan for Canada: A Systematic Review of Reviews. CanJPsychiatry. 2015; 60(6):245-257. Disponível em: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4501582/pdf/cjp-2015-vol60-june245-257-rev.pdf">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4501582/pdf/cjp-2015-vol60-june245-257-rev.pdf</a> Santos WB, Dinis NF. Violência e risco de suicídio na construção das masculinidades adolescentes. Cadernos pagu. 2018; 52(e185218). Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-83332018000100508(#38)lang=pt">http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-83332018000100508(#38)lang=pt</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14754	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4369050 - LUCAS BRITO PEREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nancy Preising Aptekmann		
<b>TITULO</b>	EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA NO EXERCICIO RESISTIDO: uma Revisão da Literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	A creatina é uma substância produzida pelos rins, fígado e pâncreas, através de dois aminoácidos (glicina e arginina). A creatina é encontrada na forma livre (C) e fosforilada (CP), onde 95% de toda creatina corporal é armazenada nos músculos esqueléticos. A creatina pode ser ingerida por meio dos alimentos, especialmente carnes e peixes. A suplementação de creatina monohidratada (CrM) a curto prazo aumenta a massa livre de gordura e a produção de força muscular possivelmente por meio do inchaço celular.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar os efeitos da suplementação de creatina na hipertrofia muscular em praticantes de musculação.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo foi realizado a partir da revisão narrativa da literatura, esta revisão teve por base os fundamentos literários e recomendações disponibilizados em artigos das plataformas Google Acadêmico, ScienceDirect, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine (Pubmed). Foram considerados somente artigos em português e inglês publicados desde 2006.			
<b>RESULTADOS</b>	A suplementação de creatina em combinação com o treinamento de força amplifica o número de células satélites e a concentração de mionúcleos em humanos, favorecendo a hipertrofia muscular. No estudo de Olsen et al.(2006), por exemplo, 32 indivíduos foram submetidos a um programa de treinamento de força por 16 semanas. No grupo que recebeu a suplementação de creatina (6 g; 4 vezes ao dia nos 7 primeiros dias e 1 vez ao dia nas 15 semanas restantes) em associação ao treinamento de força, o aumento no número de células satélites foi maior. A ureia, assim como a creatina pode ser utilizada como indicador de função renal, e quando comparados os níveis de ureia pré e pós suplementação de creatina em 12 homens saudáveis, não se identificou nenhuma alteração.			
<b>CONCLUSOES</b>	A suplementação de creatina tem um grande papel quando nos referimos à hipertrofia muscular relacionada com treinos de musculação e tem se tornado um dos suplementos mais comumente utilizados nos dias de hoje por praticantes de exercício físico e isso se deve muito pelo fato de diversos estudos virem comprovando sua eficácia no decorrer dos anos, e que seu uso pode ser feito de maneira saudável sem efeitos colaterais à saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	OLSEN S, ET AL. CREATINE SUPPLEMENTATION AUGMENTS THE INCREASE IN SATELLITE cell and myonuclei number in human skeletal muscle induced by strength training. J Physiol. 2006; 573: 525-534. BATISTA, J.A. et al. Suplementação de creatina e treinamento de força: alterações antropométricas e na resultante força máxima. Revista Eletrônica Saude e Ciência. Disponível em: <a href="https://www.rescceafi.com.br/vol2/n1/Artigo-II-22-31.pdf">https://www.rescceafi.com.br/vol2/n1/Artigo-II-22-31.pdf</a> . Acesso em: 20/05/2023. OLIVEIRA, M. V. et al. Suplementação com creatina e treinamento de força: uma análise comparativa do tempo de ação de dois protocolos de utilização e seus efeitos na força, massa muscular e composição corporal. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte.v. 15, n.2, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14754	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4390377 - RODRIGO DO CARMO LIBERALINO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nancy Preising Aptekmann		
<b>TITULO</b>	EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA NO EXERCICIO RESISTIDO: uma Revisão da Literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	A creatina é uma substância produzida pelos rins, fígado e pâncreas, através de dois aminoácidos (glicina e arginina). A creatina é encontrada na forma livre (C) e fosforilada (CP), onde 95% de toda creatina corporal é armazenada nos músculos esqueléticos. A creatina pode ser ingerida por meio dos alimentos, especialmente carnes e peixes. A suplementação de creatina monohidratada (CrM) a curto prazo aumenta a massa livre de gordura e a produção de força muscular possivelmente por meio do inchaço celular.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar os efeitos da suplementação de creatina na hipertrofia muscular em praticantes de musculação.			
<b>METODOLOGIA</b>	Este estudo foi realizado a partir da revisão narrativa da literatura, esta revisão teve por base os fundamentos literários e recomendações disponibilizados em artigos das plataformas Google Acadêmico, ScienceDirect, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine (Pubmed). Foram considerados somente artigos em português e inglês publicados desde 2006.			
<b>RESULTADOS</b>	A suplementação de creatina em combinação com o treinamento de força amplifica o número de células satélites e a concentração de mionúcleos em humanos, favorecendo a hipertrofia muscular. No estudo de Olsen et al.(2006), por exemplo, 32 indivíduos foram submetidos a um programa de treinamento de força por 16 semanas. No grupo que recebeu a suplementação de creatina (6 g; 4 vezes ao dia nos 7 primeiros dias e 1 vez ao dia nas 15 semanas restantes) em associação ao treinamento de força, o aumento no número de células satélites foi maior. A ureia, assim como a creatina pode ser utilizada como indicador de função renal, e quando comparados os níveis de ureia pré e pós suplementação de creatina em 12 homens saudáveis, não se identificou nenhuma alteração.			
<b>CONCLUSOES</b>	A suplementação de creatina tem um grande papel quando nos referimos à hipertrofia muscular relacionada com treinos de musculação e tem se tornado um dos suplementos mais comumente utilizados nos dias de hoje por praticantes de exercício físico e isso se deve muito pelo fato de diversos estudos virem comprovando sua eficácia no decorrer dos anos, e que seu uso pode ser feito de maneira saudável sem efeitos colaterais à saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	OLSEN S, ET AL. CREATINE SUPPLEMENTATION AUGMENTS THE INCREASE IN SATELLITE cell and myonuclei number in human skeletal muscle induced by strength training. J Physiol. 2006; 573: 525-534. BATISTA, J.A. et al. Suplementação de creatina e treinamento de força: alterações antropométricas e na resultante força máxima. Revista Eletrônica Saude e Ciência. Disponível em: <a href="https://www.rescceafi.com.br/vol2/n1/Artigo-II-22-31.pdf">https://www.rescceafi.com.br/vol2/n1/Artigo-II-22-31.pdf</a> . Acesso em: 20/05/2023. OLIVEIRA, M. V. et al. Suplementação com creatina e treinamento de força: uma análise comparativa do tempo de ação de dois protocolos de utilização e seus efeitos na força, massa muscular e composição corporal. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte.v. 15, n.2, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14756	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2972301 - ISABELLA VIEIRA FIGUEIREDO TOMAZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roberto Rodrigues da Rosa Filho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	
<b>TITULO</b>	MASTECTOMIA COMO TRATAMENTO DE ESCOLHA PARA MASTITE GANGRENOSA EM CAPRINO			
<b>INTRODUCA O</b>	A mastite gangrenosa é a mais severa dentre o grupo das mastites, essa enfermidade acarreta a perda tecidual, e o tratamento recomendado é a retirada cirúrgica do tecido necrosado e fechamento da região por primeira intenção. Como principais agentes bacterianos achados em casos de mastite nos pequenos ruminantes têm- se Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Pseudomonas spp. e Mannheimia haemolytica.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de mastite gangrenosa atendida no HOVET-UNISA, onde realizou-se o isolamento de Staphylococcus aureus e Acinetobacter sp. e instituiu-se como tratamento a mastectomia total.			
<b>METODOLOGIA</b>	Animal foi atendido no HOVET-UNISA com histórico de parto há quatro dias, iniciou quadro de hiporexia, sensibilidade dolorosa e alterações de coloração e consistência em tetos e úbere no dia seguinte ao parto. No momento da admissão o animal apresentou FC e FR elevadas, hipomotilidade ruminal, mucosas hipocoradas e TPC aumentado. Na inspeção notou-se teto esquerdo com consistência firme, coloração cianótica em ápice, temperatura reduzida, sensibilidade dolorosa a palpação e presença de secreção serosanguinolenta; e teto direito com consistência firme, coloração avermelhada em base e úbere, sensibilidade dolorosa a palpação e presença de secreção purulenta. Realizada coleta do material de ambos os tetos para cultura e antibiograma, instituído tratamento conservativo por dois dias e após esse período, por apresentar piora no quadro de necrose tecidual optou-se pela intervenção cirúrgica, sendo realizada mastectomia total.			
<b>RESULTADO S</b>	Animal foi mantido com tratamento conservativo por dois dias prévios a cirurgia, sendo nele instituído enrofloxacina (5mg/kg), gentamicina intramamária (1 bisnaga por teto), flunixin (2,2mg/kg), dipirona (25mg/kg) e compressa para possível estabilização do quadro. Após esse período foi realizada intervenção cirúrgica onde animal apresentava piora do quadro de necrose tecidual, como escolha foi realizada mastectomia total e debridamento de todo o tecido necrosado encontrado no abdômen do animal ao momento da inspeção trans operatória. Como tratamento pós-operatório manteve-se a administração de enrofloxacina (5mg/kg), flunixin (2,2mg/kg), dipirona (25mg/kg), sendo associado gentamicina (4mg/kg), ceftiofur (2,2mg/kg) e limpeza da ferida cirúrgica uma vez ao dia, mantidos por mais quatro dias após procedimento. Animal retornou dez dias, após alta, para retirada de pontos, onde foi constatado que não houve deiscência de pontos e recidiva de tecido de necrose na região da ferida cirúrgica.			
<b>CONCLUSOES</b>	A mastectomia total é o tratamento de escolha para casos de mastite gangrenosa, pelos animais não apresentarem melhora do quadro com tratamento conservativo e evitando assim óbito dos animais devido toxemia e infecções bacterianas secundárias.			
<b>REFERENCIA S</b>	RIZZO, Huber et al. Tratamentos clínico-cirúrgicos de mastite gangrenosa unilateral em caprinos por diferentes tipos de cicatrização. Scientia Plena, v. 11, n. 4, 2015. ORDÓÑEZ, Valente Velázquez et al. Mastite estafilocócica em rebanhos caprinos. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, v. 5, n. 2, p. 1482-1495, 2022. PEIXOTO, Rodolfo de M. et al. Etiologia e perfil de sensibilidade antimicrobiana dos isolados bacterianos da mastite em pequenos ruminantes e concordância de técnicas empregadas no diagnóstico. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 30, p. 735-740, 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14756	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3800504 - THAMIRES ALVES MURTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Roberto Rodrigues da Rosa Filho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	
<b>TITULO</b>	MASTECTOMIA COMO TRATAMENTO DE ESCOLHA PARA MASTITE GANGRENOSA EM CAPRINO			
<b>INTRODUCAO</b>	A mastite gangrenosa é a mais severa dentre o grupo das mastites, essa enfermidade acarreta a perda tecidual, e o tratamento recomendado é a retirada cirúrgica do tecido necrosado e fechamento da região por primeira intenção. Como principais agentes bacterianos achados em casos de mastite nos pequenos ruminantes têm-se Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Pseudomonas spp. e Mannheimia haemolytica.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de mastite gangrenosa atendida no HOVET-UNISA, onde realizou-se o isolamento de Staphylococcus aureus e Acinetobacter sp. e instituiu-se como tratamento a mastectomia total.			
<b>METODOLOGIA</b>	Animal foi atendido no HOVET-UNISA com histórico de parto há quatro dias, iniciou quadro de hiporexia, sensibilidade dolorosa e alterações de coloração e consistência em tetos e úbere no dia seguinte ao parto. No momento da admissão o animal apresentou FC e FR elevadas, hipomotilidade ruminal, mucosas hipocoradas e TPC aumentado. Na inspeção notou-se teto esquerdo com consistência firme, coloração cianótica em ápice, temperatura reduzida, sensibilidade dolorosa a palpação e presença de secreção serosanguinolenta; e teto direito com consistência firme, coloração avermelhada em base e úbere, sensibilidade dolorosa a palpação e presença de secreção purulenta. Realizada coleta do material de ambos os tetos para cultura e antibiograma, instituído tratamento conservativo por dois dias e após esse período, por apresentar piora no quadro de necrose tecidual optou-se pela intervenção cirúrgica, sendo realizada mastectomia total.			
<b>RESULTADOS</b>	Animal foi mantido com tratamento conservativo por dois dias prévios a cirurgia, sendo nele instituído enrofloxacina (5mg/kg), gentamicina intramamária (1 bisnaga por teto), flunixin (2,2mg/kg), dipirona (25mg/kg) e compressa para possível estabilização do quadro. Após esse período foi realizada intervenção cirúrgica onde animal apresentava piora do quadro de necrose tecidual, como escolha foi realizada mastectomia total e debridamento de todo o tecido necrosado encontrado no abdômen do animal ao momento da inspeção trans operatória. Como tratamento pós-operatório manteve-se a administração de enrofloxacina (5mg/kg), flunixin (2,2mg/kg), dipirona (25mg/kg), sendo associado gentamicina (4mg/kg), ceftiofur (2,2mg/kg) e limpeza da ferida cirúrgica uma vez ao dia, mantidos por mais quatro dias após procedimento. Animal retornou dez dias, após alta, para retirada de pontos, onde foi constatado que não houve deiscência de pontos e recidiva de tecido de necrose na região da ferida cirúrgica.			
<b>CONCLUSOES</b>	A mastectomia total é o tratamento de escolha para casos de mastite gangrenosa, pelos animais não apresentarem melhora do quadro com tratamento conservativo e evitando assim óbito dos animais devido toxemia e infecções bacterianas secundárias.			
<b>REFERENCIAS</b>	RIZZO, Huber et al. Tratamentos clínico-cirúrgicos de mastite gangrenosa unilateral em caprinos por diferentes tipos de cicatrização. Scientia Plena, v. 11, n. 4, 2015. ORDÓÑEZ, Valente Velázquez et al. Mastite estafilocócica em rebanhos caprinos. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, v. 5, n. 2, p. 1482-1495, 2022. PEIXOTO, Rodolfo de M. et al. Etiologia e perfil de sensibilidade antimicrobiana dos isolados bacterianos da mastite em pequenos ruminantes e concordância de técnicas empregadas no diagnóstico. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 30, p. 735-740, 2010.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14757	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3540065 - SANDRO SCHERER	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	CALCINOSE CIRCUNSCRITA LABIAL EM UM CÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Calcinose circunscrita (CC) é uma lesão não-neoplásica benigna caracterizada por um acúmulo subcutâneo, focal a multifocal, de material mineralizado, amorfo, em meio a resposta inflamatória granulomatosa, circundada por tecido conjuntivo. A lesão é incomum na cavidade oral de cães e gatos, sendo mais frequente em regiões cutâneas/subcutâneas de grande atrito, em animais jovens, de raças de grande porte. Embora a etiopatogenia da afecção não seja totalmente compreendida, estudos apontam origem idiopática ou por calcificação distrófica. Recentemente foi descrito um caso de CC na cavidade oral de um gato após picada de vespa (Hymenoptera vespidae).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever um caso de CC labial associada à picada de insetos em um cão atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Um cão, Shih-Tzu, macho, 2 anos, apresentou aumento de volume em região interna do lábio inferior, na junção com a mucosa gengival, rostral aos dentes incisivos, com histórico de crescimento progressivo há 1 mês. A tutora referiu que, antes da formação da massa, o animal havia sido picado duas vezes no local da lesão, uma vez por abelha (Hymenoptera anthophila) e outra por vespa (Hymenoptera vespidae). Foi realizada biópsia excisional e o fragmento foi encaminhado para exame histopatológico, em secções histológicas coradas por hematoxilina-eosina. Após excisão cirúrgica, o dente incisivo do animal apresentou-se frágil e amolecido, entretanto não interferiu no apetite ou alimentação.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Na avaliação macroscópica, a massa mediu 2,2 cm x 1,7 cm x 0,8 cm, firme, irregular, nodular, enegrecido, com focos esbranquiçados, contendo, na superfície de corte, material arenoso multifocal. Na microscopia, foram observadas áreas multifocais de deposição de material basofílico em submucosa (calcificação), bem delimitadas, circundadas por moderado infiltrado granulomatoso, composto por numerosos macrófagos epitelioides e ocasionais células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho e cápsula conjuntiva. Entre as áreas de calcificação e inflamação granulomatosa, foi observada fibroplasia multifocal, moderada. O diagnóstico de CC labial foi estabelecido com base no padrão histopatológico. Estudos apontam que lesões traumáticas focais podem resultar em calcificação distrófica e formação de CC, em áreas de pressão ou em locais de trauma anterior, possivelmente associado a degeneração e necrose tecidual prévias. Relatos anteriores indicam que a CC em cavidade oral em cães é mais frequentemente observada na língua. A deposição local de Cálcio na área de CC pode ter relação com descalcificação dentária e fragilidade do dente incisivo do cão na área adjacente à lesão, entretanto avaliações adicionais, incluindo dosagem sérica de Cálcio e de distúrbios que comprometam o metabolismo sistêmico de Cálcio e Fósforo ainda precisam ser realizados para confirmação da origem da CC. O tratamento varia de acordo com a causa, entretanto, a literatura aponta que a excisão cirúrgica completa da lesão parece ser curativa, sem recidivas.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	As características anatomopatológicas da CC labial neste caso podem contribuir para o diagnóstico diferencial de lesões proliferativas ou neoplásicas em cavidade oral de cães e o histórico de picada de insetos pode apontar para uma potencial etiologia da CC em cavidade oral de pequenos animais.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>COLLADOS, J. et al. Lingual calcinosis circumscripita in a dog. Journal of veterinary dentistry, v. 19, n. 1, p. 19-21, 2002. GROSS, Thelma Lee et al. Skin diseases of the dog and cat: clinical and histopathologic diagnosis. John Wiley (#38) Sons, 2008. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. MURPHY, Brian G.; BELL, Cynthia M.; SOUKUP, Jason W. Veterinary oral and maxillofacial pathology. John Wiley (#38) Sons, 2020. SANTOS, Bartolomeu BN et al. Oral Calcinosis Circumscripita Associated with Wasp (Hymenoptera vespidae) Sting in a Cat. Journal of Comparative Pathology, v. 196, p. 16-20, 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14757	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	CALCINOSE CIRCUNSCRITA LABIAL EM UM CÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Calcinose circunscrita (CC) é uma lesão não-neoplásica benigna caracterizada por um acúmulo subcutâneo, focal a multifocal, de material mineralizado, amorfo, em meio a resposta inflamatória granulomatosa, circundada por tecido conjuntivo. A lesão é incomum na cavidade oral de cães e gatos, sendo mais frequente em regiões cutâneas/subcutâneas de grande atrito, em animais jovens, de raças de grande porte. Embora a etiopatogenia da afecção não seja totalmente compreendida, estudos apontam origem idiopática ou por calcificação distrófica. Recentemente foi descrito um caso de CC na cavidade oral de um gato após picada de vespa (Hymenoptera vespidae).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever um caso de CC labial associada à picada de insetos em um cão atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Um cão, Shih-Tzu, macho, 2 anos, apresentou aumento de volume em região interna do lábio inferior, na junção com a mucosa gengival, rostral aos dentes incisivos, com histórico de crescimento progressivo há 1 mês. A tutora referiu que, antes da formação da massa, o animal havia sido picado duas vezes no local da lesão, uma vez por abelha (Hymenoptera anthophila) e outra por vespa (Hymenoptera vespidae). Foi realizada biópsia excisional e o fragmento foi encaminhado para exame histopatológico, em secções histológicas coradas por hematoxilina-eosina. Após excisão cirúrgica, o dente incisivo do animal apresentou-se frágil e amolecido, entretanto não interferiu no apetite ou alimentação.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Na avaliação macroscópica, a massa mediu 2,2 cm x 1,7 cm x 0,8 cm, firme, irregular, nodular, enegrecido, com focos esbranquiçados, contendo, na superfície de corte, material arenoso multifocal. Na microscopia, foram observadas áreas multifocais de deposição de material basofílico em submucosa (calcificação), bem delimitadas, circundadas por moderado infiltrado granulomatoso, composto por numerosos macrófagos epitelioides e ocasionais células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho e cápsula conjuntiva. Entre as áreas de calcificação e inflamação granulomatosa, foi observada fibroplasia multifocal, moderada. O diagnóstico de CC labial foi estabelecido com base no padrão histopatológico. Estudos apontam que lesões traumáticas focais podem resultar em calcificação distrófica e formação de CC, em áreas de pressão ou em locais de trauma anterior, possivelmente associado a degeneração e necrose tecidual prévias. Relatos anteriores indicam que a CC em cavidade oral em cães é mais frequentemente observada na língua. A deposição local de Cálcio na área de CC pode ter relação com descalcificação dentária e fragilidade do dente incisivo do cão na área adjacente à lesão, entretanto avaliações adicionais, incluindo dosagem sérica de Cálcio e de distúrbios que comprometam o metabolismo sistêmico de Cálcio e Fósforo ainda precisam ser realizados para confirmação da origem da CC. O tratamento varia de acordo com a causa, entretanto, a literatura aponta que a excisão cirúrgica completa da lesão parece ser curativa, sem recidivas.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	As características anatomopatológicas da CC labial neste caso podem contribuir para o diagnóstico diferencial de lesões proliferativas ou neoplásicas em cavidade oral de cães e o histórico de picada de insetos pode apontar para uma potencial etiologia da CC em cavidade oral de pequenos animais.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>COLLADOS, J. et al. Lingual calcinosis circumscripita in a dog. Journal of veterinary dentistry, v. 19, n. 1, p. 19-21, 2002. GROSS, Thelma Lee et al. Skin diseases of the dog and cat: clinical and histopathologic diagnosis. John Wiley (#38) Sons, 2008. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. MURPHY, Brian G.; BELL, Cynthia M.; SOUKUP, Jason W. Veterinary oral and maxillofacial pathology. John Wiley (#38) Sons, 2020. SANTOS, Bartolomeu BN et al. Oral Calcinosis Circumscripita Associated with Wasp (Hymenoptera vespidae) Sting in a Cat. Journal of Comparative Pathology, v. 196, p. 16-20, 2022.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14768	Criação de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4285689 - LUANA APARECIDA GOMES SETUBAL	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Roberto Bueno Ribeiro		
<b>TITULO</b>	Revisão sistemática sobre efeitos da massagem no úbere de búfalas para retirada do bezerro ao pé			
<b>INTRODUCA O</b>	A bubalinocultura de leite, destaca-se como segunda produtora de leite pelo mundo (FAO, 2022) gerando uma grande demanda na fabricação de derivados lácteos. Porém, durante as ordenhas, é necessária a presença do bezerro para a ejeção do leite da búfala, o que acaba gerando estresse aos animais e grande demanda de trabalho. Como alternativa, a aplicação do hormônio ocitocina é uma estratégia muito utilizada pelos produtores estimulando a liberação do leite sem a necessidade da presença do bezerro, contudo, o uso constante do hormônio pode gerar problemas a longo prazo aos animais, como, possíveis alterações metabólicas no organismo do animal e contaminações pelo uso das agulhas nas búfalas (LINHARES, 2012). Logo, técnicas alternativas são necessárias para melhorar a eficiência da retirada de leite mantendo o bem-estar dos animais e mitigando o uso da ocitocina (COSTA et al., 2020).			
<b>OBJETIVOS</b>	Buscar por meio de uma revisão sistemática artigos científicos sobre a utilização de técnicas de massagem em úbere e seus efeitos na produção de leite de búfalas sem a presença do bezerro.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi iniciado com busca nas plataformas de bases de dado PubMed, Google Scholar, SciElo, ScienceDirect, não delimitando-se período de busca, sendo utilizados como termos bubalinocultura, ordenha, búfala, "bezerro ao pé", ocitocina, "leite de búfala" e suas associações, realizada por meio dos operadores booleanos AND, OR e NOT. A busca ocorreu nos idiomas inglês, português e italiano.			
<b>RESULTADO S</b>	Das buscas na Pub med foram obtidos 218 artigos, não sendo aproveitado nenhum após a seleção. Nas buscas do Google Scholar foram obtidos 35.854 artigos, sendo aproveitados 4 (quatro) após a seleção. Nas buscas pelo SciElo foram encontrados 36 artigos, sendo aproveitados 2 (dois) após a seleção. Na ScienceDirect foram encontrados 9.095 artigos, sendo aproveitado 1 artigo após a seleção. Assim, ao final deste processo inicial, oito artigos foram selecionados dentro do objetivo do estudo, tendo como objetivo principal: produção de búfalas leiteiras, uso de ocitocina exógena, manejo de ordenha, a presença do bezerro durante as ordenhas, bem-estar de búfalas leiteiras, características do leite. Esses artigos estão sendo avaliados no momento, mas, dado o pequeno número de artigos encontrados, novas buscas serão realizadas, com outros termos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Até o momento, as buscas realizadas nesta revisão, geram poucos artigos sobre o tema. Ainda que estes resultados sejam esperados, nova pesquisa será realizada, utilizando informações dos artigos já pré-selecionados.			
<b>REFERENCIA S</b>	COSTA, Angela et al. The Effect of Pre-milking Stimulation on Teat Morphological Parameters and Milk Traits in the Italian Water Buffalo. <i>Frontiers</i> , 2020. Disponível em: <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.572422/full">https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.572422/full</a> . Acesso em: 18 ago. 2023. FAO - Food and Agriculture Organization. <i>Agricultural outlook 2022 - 2031</i> . OECD: FAO, 2022. LINHARES, Luyde, Ocitocina exógena e leite residual. <i>Google Scholar</i> , 2012. Disponível em: <a href="http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/788">http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/788</a> . Acesso em: 19 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14768	Criação de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4989775 - MARIANA YUMI MENDES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Roberto Bueno Ribeiro		
<b>TITULO</b>	Revisão sistemática sobre efeitos da massagem no úbere de búfalas para retirada do bezerro ao pé			
<b>INTRODUCA O</b>	A bubalinocultura de leite, destaca-se como segunda produtora de leite pelo mundo (FAO, 2022) gerando uma grande demanda na fabricação de derivados lácteos. Porém, durante as ordenhas, é necessária a presença do bezerro para a ejeção do leite da búfala, o que acaba gerando estresse aos animais e grande demanda de trabalho. Como alternativa, a aplicação do hormônio ocitocina é uma estratégia muito utilizada pelos produtores estimulando a liberação do leite sem a necessidade da presença do bezerro, contudo, o uso constante do hormônio pode gerar problemas a longo prazo aos animais, como, possíveis alterações metabólicas no organismo do animal e contaminações pelo uso das agulhas nas búfalas (LINHARES, 2012). Logo, técnicas alternativas são necessárias para melhorar a eficiência da retirada de leite mantendo o bem-estar dos animais e mitigando o uso da ocitocina (COSTA et al., 2020).			
<b>OBJETIVOS</b>	Buscar por meio de uma revisão sistemática artigos científicos sobre a utilização de técnicas de massagem em úbere e seus efeitos na produção de leite de búfalas sem a presença do bezerro.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi iniciado com busca nas plataformas de bases de dado PubMed, Google Scholar, SciELO, ScienceDirect, não delimitando-se período de busca, sendo utilizados como termos bubalinocultura, ordenha, búfala, "bezerro ao pé", ocitocina, "leite de búfala" e suas associações, realizada por meio dos operadores booleanos AND, OR e NOT. A busca ocorreu nos idiomas inglês, português e italiano.			
<b>RESULTADO S</b>	Das buscas na Pub med foram obtidos 218 artigos, não sendo aproveitado nenhum após a seleção. Nas buscas do Google Scholar foram obtidos 35.854 artigos, sendo aproveitados 4 (quatro) após a seleção. Nas buscas pelo SciELO foram encontrados 36 artigos, sendo aproveitados 2 (dois) após a seleção. Na ScienceDirect foram encontrados 9.095 artigos, sendo aproveitado 1 artigo após a seleção. Assim, ao final deste processo inicial, oito artigos foram selecionados dentro do objetivo do estudo, tendo como objetivo principal: produção de búfalas leiteiras, uso de ocitocina exógena, manejo de ordenha, a presença do bezerro durante as ordenhas, bem-estar de búfalas leiteiras, características do leite. Esses artigos estão sendo avaliados no momento, mas, dado o pequeno número de artigos encontrados, novas buscas serão realizadas, com outros termos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Até o momento, as buscas realizadas nesta revisão, geram poucos artigos sobre o tema. Ainda que estes resultados sejam esperados, nova pesquisa será realizada, utilizando informações dos artigos já pré-selecionados.			
<b>REFERENCIA S</b>	COSTA, Angela et al. The Effect of Pre-milking Stimulation on Teat Morphological Parameters and Milk Traits in the Italian Water Buffalo. <i>Frontiers</i> , 2020. Disponível em: <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.572422/full">https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.572422/full</a> . Acesso em: 18 ago. 2023. FAO - Food and Agriculture Organization. <i>Agricultural outlook 2022 – 2031</i> . OECD: FAO, 2022. LINHARES, Luyde. Ocitocina exógena e leite residual. <i>Google Scholar</i> , 2012. Disponível em: <a href="http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/788">http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/788</a> . Acesso em: 19 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14769	Enfermagem	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3780554 - ELISANGELA BEZERRA LOURENCO AZEVEDO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Claudia Polubriaginof		<b>Orientador Externo</b>
				1 - Poster
<b>TITULO</b>	A DISCIPLINA HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: A CONTRIBUIÇÃO DE EDITH DE MAGALHÃES FRAENKEL PARA A EEUSP (1920-1950)			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O estudo histórico-social analisa o papel crucial de Edith de Magalhães Fraenkel, a primeira diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, na enfermagem brasileira. Examina suas contribuições para a enfermagem em São Paulo e no Brasil, além dos fatores sociais, políticos e ideológicos relacionados à criação da EEUSP. Utilizando relatórios de Edith como fontes e uma matriz de análise documental, a pesquisa destaca seu envolvimento no Departamento Nacional de Saúde Pública, na fundação da EEUSP e no movimento associativo da enfermagem em São Paulo. Edith liderou esforços para fortalecer a Associação Brasileira de Enfermagem, promoveu o ensino de enfermagem e organizou o I Congresso Nacional de Enfermagem. Seu trabalho foi fundamental para elevar a EEUSP ao status de destaque na formação de profissionais de enfermagem e impulsionou avanços progressistas na área. Edith de Magalhães Fraenkel desempenhou um papel fundamental no avanço e na consolidação da enfermagem no Brasil, atuando como diretora, defensora do ensino e líder associativa.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Analisar o programa da disciplina história da enfermagem proposto por Edith de Magalhães Fraenkel para o curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo para, deste modo, colaborar com a construção da história da enfermagem em São Paulo, fundamentalmente, em relação ao lugar ocupado pela EEUSP no processo de profissionalização da arte e ciência do cuidado no Brasil pós 1950.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>O estudo se concentra em uma pasta-arquivo contendo documentos datilografados por Edith de Magalhães Fraenkel sobre a disciplina de História da Enfermagem. Estes documentos revelam o planejamento da disciplina e demonstram a visão de Edith sobre a importância da história da enfermagem na formação profissional. A pesquisa utiliza o método de pesquisa Survey para obter informações quantitativas ao longo do tempo, analisando a evolução de variáveis relacionadas à trajetória de Edith e à abordagem da disciplina.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Foram inventariados aspectos históricos, teóricos e didático-pedagógicos do plano de ensino da disciplina de história da enfermagem, caracterizando o programa em relação aos elementos curriculares que o nortearam e sua representação da profissão no contexto histórico. Além disso, a pesquisa resgatou historicamente o papel da disciplina de história da enfermagem na formação profissional de enfermeiros no Brasil e traçou a trajetória de Edith de Magalhães Fraenkel, alcançando seus objetivos de investigação.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O estudo busca preservar a memória da enfermagem e da Escola de Enfermagem da USP, usando análise qualitativa para interpretar documentos e abordar a questão em foco.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Mota, A. Prefácio, In: Souza Campos, P. F. de.; Oguisso, T. Enfermagem no Brasil: formação e identidade profissional pós-1930. São Paulo: Yendis, 2013. p. xii. Carvalho, A C. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo- resumo histórico 1942-1980. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.14, n.supl., p.1- 271, 1980. Mancia JR, Padilha MICS. Trajetória de Edith Magalhães Fraenkel. Rev Bras Enferm. 2006;59(n.esp):432-7.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14770	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3168981 - LUANA LOPES PATENTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		JOSYANE CRISTINA OSHIKA
<b>TITULO</b>	Anemia persistente sugestiva de eritropoiese ineficiente em um cão			
<b>INTRODUCA O</b>	Anemia é a alteração hematológica mais comum em cães e, por conta de sua origem multifatorial, é necessário investigar sua causa de base. Para tal, são utilizadas classificações que auxiliam a compreender a fisiopatologia por trás do processo, com base nos índices hematimétricos, no grau de regeneração e na fisiopatologia. Quando a causa de base não é esclarecida por meios semiológicos básicos, é necessário recorrer a exames mais especializados, como o mielograma, consistindo na análise citológica da medula óssea, avaliando o seu complexo microambiente de acordo com a celularidade e a proporção entre as células hematopoiéticas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o caso de uma anemia persistente de causa indeterminada em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, Yorkshire, de 11 anos, apresentando apatia, êmese e emagrecimento progressivo, apesar da normorexia. Possuía histórico de cardiopatia já tratada e, no mês anterior, ficou internado por conta de uma anemia, sendo necessária transfusão de concentrado de hemácias. O histórico de anemia perdurou por 20 dias. Em exame físico, apresentava mucosas de coloração perlfáceas. Foram solicitados exames para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADO S</b>	Os exames de sangue mostravam uma anemia macrocítica normocrômica com hematócrito de 8% (referência: 37 a 55%) e contagem de reticulócitos 232800 células/ $\mu$ L, caracterizando regeneração máxima. O paciente possuía títulos de anticorpos anti-Ehrlichia canis de 1:80, com PCRs negativas recentes para diversos hemoparasitos. Com base nos resultados, foi realizada transfusão de concentrado de hemácias e prescritas doxiciclina (10mg/kg, SID, por 30 dias) e prednisolona (1mg/kg, BID). No mês subsequente, o paciente retornou sete vezes para o hospital permanecendo dependente de transfusões e, mesmo com reticulocitose, não apresentou resposta aos tratamentos iniciados. Foi indicado o mielograma, porém a tutora optou pela eutanásia antes da realização do exame. O paciente apresentou um quadro de anemia progressiva grave de origem incerta. A ausência de resposta ao tratamento antiriquetsial e imunossupressor pode indicar que não se tratava de hemoparasitose ou hemólise imunomediada. A dependência de transfusões apesar da presença de reticulocitose e ausência de sangramentos pode indicar uma hematopoiese inefetiva, não permitindo descartar diagnósticos diferenciais como síndrome mielodisplásica, síndrome fagocítica secundária à hemoparasitose intramedular ou uma desordem proliferativa com hemofagocitose, quadros que poderiam ter sido avaliados com a realização do mielograma.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Anemias são quadros complexos e multifatoriais, sendo necessário um diagnóstico minucioso de sua origem para que sejam corretamente tratadas. O mielograma é um exame que pode ser utilizado com tal finalidade, sendo relativamente simples de ser realizado, com poucas contraindicações, porém frequentemente com baixa adesão dos tutores devido aos custos e ao risco anestésico. No caso relatado, é evidente que a não realização do procedimento prejudicou a conduta clínica, restando apenas a terapia de suporte como alternativa.			
<b>REFERENCIA S</b>	ANDRADE, ASS. Prevalence of the causes of anemia in dogs. 52p. Dissertação (Mestrado). Universidade Técnica de Lisboa. 2014. HARVEY, J. W. Veterinary hematology : a diagnostic guide and color atlas. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2012. THRALL, Mary A. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14770	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		JOSYANE CRISTINA OSHIKA
<b>TITULO</b>	Anemia persistente sugestiva de eritropoiese ineficiente em um cão			
<b>INTRODUCA O</b>	Anemia é a alteração hematológica mais comum em cães e, por conta de sua origem multifatorial, é necessário investigar sua causa de base. Para tal, são utilizadas classificações que auxiliam a compreender a fisiopatologia por trás do processo, com base nos índices hematimétricos, no grau de regeneração e na fisiopatologia. Quando a causa de base não é esclarecida por meios semiológicos básicos, é necessário recorrer a exames mais especializados, como o mielograma, consistindo na análise citológica da medula óssea, avaliando o seu complexo microambiente de acordo com a celularidade e a proporção entre as células hematopoiéticas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o caso de uma anemia persistente de causa indeterminada em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, Yorkshire, de 11 anos, apresentando apatia, êmese e emagrecimento progressivo, apesar da normorexia. Possuía histórico de cardiopatia já tratada e, no mês anterior, ficou internado por conta de uma anemia, sendo necessária transfusão de concentrado de hemácias. O histórico de anemia perdurou por 20 dias. Em exame físico, apresentava mucosas de coloração perlfáceas. Foram solicitados exames para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADO S</b>	Os exames de sangue mostravam uma anemia macrocítica normocrômica com hematócrito de 8% (referência: 37 a 55%) e contagem de reticulócitos 232800 células/ $\mu$ L, caracterizando regeneração máxima. O paciente possuía títulos de anticorpos anti-Ehrlichia canis de 1:80, com PCRs negativas recentes para diversos hemoparasitos. Com base nos resultados, foi realizada transfusão de concentrado de hemácias e prescritas doxiciclina (10mg/kg, SID, por 30 dias) e prednisolona (1mg/kg, BID). No mês subsequente, o paciente retornou sete vezes para o hospital permanecendo dependente de transfusões e, mesmo com reticulocitose, não apresentou resposta aos tratamentos iniciados. Foi indicado o mielograma, porém a tutora optou pela eutanásia antes da realização do exame. O paciente apresentou um quadro de anemia progressiva grave de origem incerta. A ausência de resposta ao tratamento antiriquetsial e imunossupressor pode indicar que não se tratava de hemoparasitose ou hemólise imunomediada. A dependência de transfusões apesar da presença de reticulocitose e ausência de sangramentos pode indicar uma hematopoiese inefetiva, não permitindo descartar diagnósticos diferenciais como síndrome mielodisplásica, síndrome fagocítica secundária à hemoparasitose intramedular ou uma desordem proliferativa com hemofagocitose, quadros que poderiam ter sido avaliados com a realização do mielograma.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Anemias são quadros complexos e multifatoriais, sendo necessário um diagnóstico minucioso de sua origem para que sejam corretamente tratadas. O mielograma é um exame que pode ser utilizado com tal finalidade, sendo relativamente simples de ser realizado, com poucas contraindicações, porém frequentemente com baixa adesão dos tutores devido aos custos e ao risco anestésico. No caso relatado, é evidente que a não realização do procedimento prejudicou a conduta clínica, restando apenas a terapia de suporte como alternativa.			
<b>REFERENCIA S</b>	ANDRADE, ASS. Prevalence of the causes of anemia in dogs. 52p. Dissertação (Mestrado). Universidade Técnica de Lisboa. 2014. HARVEY, J. W. Veterinary hematology : a diagnostic guide and color atlas. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2012. THRALL, Mary A. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14770	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3816885 - NATÁLIA PEREIRA LOPES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		JOSYANE CRISTINA OSHIKA
<b>TITULO</b>	Anemia persistente sugestiva de eritropoiese ineficiente em um cão			
<b>INTRODUCA O</b>	Anemia é a alteração hematológica mais comum em cães e, por conta de sua origem multifatorial, é necessário investigar sua causa de base. Para tal, são utilizadas classificações que auxiliam a compreender a fisiopatologia por trás do processo, com base nos índices hematimétricos, no grau de regeneração e na fisiopatologia. Quando a causa de base não é esclarecida por meios semiológicos básicos, é necessário recorrer a exames mais especializados, como o mielograma, consistindo na análise citológica da medula óssea, avaliando o seu complexo microambiente de acordo com a celularidade e a proporção entre as células hematopoiéticas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o caso de uma anemia persistente de causa indeterminada em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, Yorkshire, de 11 anos, apresentando apatia, êmese e emagrecimento progressivo, apesar da normorexia. Possuía histórico de cardiopatia já tratada e, no mês anterior, ficou internado por conta de uma anemia, sendo necessária transfusão de concentrado de hemácias. O histórico de anemia perdurou por 20 dias. Em exame físico, apresentava mucosas de coloração perlfáceas. Foram solicitados exames para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADO S</b>	Os exames de sangue mostravam uma anemia macrocítica normocrômica com hematócrito de 8% (referência: 37 a 55%) e contagem de reticulócitos 232800 células/ $\mu$ L, caracterizando regeneração máxima. O paciente possuía títulos de anticorpos anti-Ehrlichia canis de 1:80, com PCR's negativas recentes para diversos hemoparasitos. Com base nos resultados, foi realizada transfusão de concentrado de hemácias e prescritas doxiciclina (10mg/kg, SID, por 30 dias) e prednisolona (1mg/kg, BID). No mês subsequente, o paciente retornou sete vezes para o hospital permanecendo dependente de transfusões e, mesmo com reticulocitose, não apresentou resposta aos tratamentos iniciados. Foi indicado o mielograma, porém a tutora optou pela eutanásia antes da realização do exame. O paciente apresentou um quadro de anemia progressiva grave de origem incerta. A ausência de resposta ao tratamento antiriquetsial e imunossupressor pode indicar que não se tratava de hemoparasitose ou hemólise imunomediada. A dependência de transfusões apesar da presença de reticulocitose e ausência de sangramentos pode indicar uma hematopiose inefetiva, não permitindo descartar diagnósticos diferenciais como síndrome mielodisplásica, síndrome fagocítica secundária à hemoparasitose intramedular ou uma desordem proliferativa com hemofagocitose, quadros que poderiam ter sido avaliados com a realização do mielograma.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Anemias são quadros complexos e multifatoriais, sendo necessário um diagnóstico minucioso de sua origem para que sejam corretamente tratadas. O mielograma é um exame que pode ser utilizado com tal finalidade, sendo relativamente simples de ser realizado, com poucas contraindicações, porém frequentemente com baixa adesão dos tutores devido aos custos e ao risco anestésico. No caso relatado, é evidente que a não realização do procedimento prejudicou a conduta clínica, restando apenas a terapia de suporte como alternativa.			
<b>REFERENCIA S</b>	ANDRADE, ASS. Prevalence of the causes of anemia in dogs. 52p. Dissertação (Mestrado). Universidade Técnica de Lisboa. 2014. HARVEY, J. W. Veterinary hematology : a diagnostic guide and color atlas. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2012. THRALL, Mary A. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14770	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4227841 - GABRIEL DE LUCA OCCULATE SERRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		JOSYANE CRISTINA OSHIKA
<b>TITULO</b>	Anemia persistente sugestiva de eritropoiese ineficiente em um cão			
<b>INTRODUCAO</b>	Anemia é a alteração hematológica mais comum em cães e, por conta de sua origem multifatorial, é necessário investigar sua causa de base. Para tal, são utilizadas classificações que auxiliam a compreender a fisiopatologia por trás do processo, com base nos índices hematimétricos, no grau de regeneração e na fisiopatologia. Quando a causa de base não é esclarecida por meios semiológicos básicos, é necessário recorrer a exames mais especializados, como o mielograma, consistindo na análise citológica da medula óssea, avaliando o seu complexo microambiente de acordo com a celularidade e a proporção entre as células hematopoiéticas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o caso de uma anemia persistente de causa indeterminada em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, Yorkshire, de 11 anos, apresentando apatia, êmese e emagrecimento progressivo, apesar da normorexia. Possuía histórico de cardiopatia já tratada e, no mês anterior, ficou internado por conta de uma anemia, sendo necessária transfusão de concentrado de hemácias. O histórico de anemia perdurou por 20 dias. Em exame físico, apresentava mucosas de coloração perlfáceas. Foram solicitados exames para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADOS</b>	Os exames de sangue mostravam uma anemia macrocítica normocrômica com hematócrito de 8% (referência: 37 a 55%) e contagem de reticulócitos 232800 células/ $\mu$ L, caracterizando regeneração máxima. O paciente possuía títulos de anticorpos anti-Ehrlichia canis de 1:80, com PCR's negativas recentes para diversos hemoparasitos. Com base nos resultados, foi realizada transfusão de concentrado de hemácias e prescritas doxiciclina (10mg/kg, SID, por 30 dias) e prednisolona (1mg/kg, BID). No mês subsequente, o paciente retornou sete vezes para o hospital permanecendo dependente de transfusões e, mesmo com reticulocitose, não apresentou resposta aos tratamentos iniciados. Foi indicado o mielograma, porém a tutora optou pela eutanásia antes da realização do exame. O paciente apresentou um quadro de anemia progressiva grave de origem incerta. A ausência de resposta ao tratamento antiriquetsial e imunossupressor pode indicar que não se tratava de hemoparasitose ou hemólise imunomediada. A dependência de transfusões apesar da presença de reticulocitose e ausência de sangramentos pode indicar uma hematopiose inefetiva, não permitindo descartar diagnósticos diferenciais como síndrome mielodisplásica, síndrome fagocítica secundária à hemoparasitose intramedular ou uma desordem proliferativa com hemofagocitose, quadros que poderiam ter sido avaliados com a realização do mielograma.			
<b>CONCLUSOES</b>	Anemias são quadros complexos e multifatoriais, sendo necessário um diagnóstico minucioso de sua origem para que sejam corretamente tratadas. O mielograma é um exame que pode ser utilizado com tal finalidade, sendo relativamente simples de ser realizado, com poucas contraindicações, porém frequentemente com baixa adesão dos tutores devido aos custos e ao risco anestésico. No caso relatado, é evidente que a não realização do procedimento prejudicou a conduta clínica, restando apenas a terapia de suporte como alternativa.			
<b>REFERENCIAS</b>	ANDRADE, ASS. Prevalence of the causes of anemia in dogs. 52p. Dissertação (Mestrado). Universidade Técnica de Lisboa. 2014. HARVEY, J. W. Veterinary hematology : a diagnostic guide and color atlas. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2012. THRALL, Mary A. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14771	Farmácia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4414969 - ESTER ALVES RUSSO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		NOBUKO YOSHIDA
<b>TITULO</b>	Efeito das proteínas lisossomais na infecção de células não fagocíticas pela <i>Leishmania amazonensis</i>			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A Leishmaniose é uma doença endêmica em vários países, incluindo o Brasil. O protozoário do gênero <i>Leishmania</i> possui duas formas evolutivas: promastigota e amastigota. As promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Pouco tem se descrito sobre as células não fagocíticas, mas as células não fagocíticas são possíveis fontes de reservatórios do parasito e podem ter um papel importante na reincidência da doença. Após a internalização do parasita, ocorre a formação de vacúolos parasitóforos (VPs). Nessas vesículas, as formas promastigotas passam por uma rápida transformação para amastigotas. Os VPs contêm moléculas da via endocítica, incluindo as proteínas associadas às membranas dos lisossomos (LAMP-1 e LAMP-2); e da via exocítica. Os estudos na literatura mostram as LAMPs como importantes marcadores para a fusão do lisossomo com o fagolisossomo e para a maturação dos vacúolos parasitóforos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito das proteínas lisossomais Lamp 1 e Lamp 2 na infecção de células não fagocíticas pelo protozoário da espécie <i>L. amazonensis</i> .			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram utilizadas células HeLa depletadas ou não (wild type – WT) de LAMP-1 ou LAMP-2 bem como de fibroblastos murinos (MEF) knock out para LAMP-1 e/ou LAMP-2. A expressão das proteínas após lise das células foi determinada por Western Blot. As células foram infectadas com multiplicidade de infecção de 10 com <i>L. amazonensis</i> por 4hs e 48hs. Para determinação da infecção, as células infectadas (lamínulas) foram submetidas a coloração por Giemsa ou metabolização de resazurina. O nível de infecção foi avaliado contando-se o número de parasitas intracelular em um total de pelo menos 100 células.			
<b>RESULTADOS</b>	A depleção ou baixa expressão de LAMP1 e/ou LAMP-2 foi confirmada por WB. Nas células MEF, a total depleção de LAMP2 facilitou significativamente a entrada do parasita em 4h em relação as células WT, bem como a proliferação das amastigotas em 48 hs. A ausência de LAMP1 não exerceu este efeito (dupla depleção). Os resultados preliminares com células HeLa com baixa expressão de LAMP1 ou LAMP2 mostrou que não houve impacto na infecção em 4h ou na proliferação das amastigotas em 48 h.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados sugerem que, pelo menos em fibroblasto, a expressão normal de LAMP-2 previne a infecção e proliferação do parasito. Mais estudos são necessários para determinar o papel da LAMP2 na entrada do parasito na células e proliferação das amastigotas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021 Rodrigues JPF, Souza Onofre T, Barbosa BC, Ferreira ER, Bonfim-Melo A, Yoshida N. Host cell protein LAMP-2 is the receptor for <i>Trypanosoma cruzi</i> surface molecule gp82 that mediates invasion. <i>Cellular microbiology</i>. 2019;21(5):e13003. da Silva Vieira T, Arango Duque G, Ory K, Gontijo CM, Soares RP, Descoteaux A. <i>Leishmania braziliensis</i>: Strain-Specific Modulation of Phagosome Maturation. <i>Frontiers in cellular and infection microbiology</i>. 2019;9:319.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14771	Farmácia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4765257 - ARIANNE EMILY FERNANDES ARAUJO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		NOBUKO YOSHIDA
<b>TITULO</b>	Efeito das proteínas lisossomais na infecção de células não fagocíticas pela Leishmania amazonensis			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A Leishmaniose é uma doença endêmica em vários países, incluindo o Brasil. O protozoário do gênero Leishmania possui duas formas evolutivas: promastigota e amastigota. As promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Pouco tem se descrito sobre as células não fagocíticas, mas as células não fagocíticas são possíveis fontes de reservatórios do parasito e podem ter um papel importante na reincidência da doença. Após a internalização do parasita, ocorre a formação de vacúolos parasitóforos (VPs). Nessas vesículas, as formas promastigotas passam por uma rápida transformação para amastigotas. Os VPs contêm moléculas da via endocítica, incluindo as proteínas associadas às membranas dos lisossomos (LAMP-1 e LAMP-2); e da via exocítica. Os estudos na literatura mostram as LAMPs como importantes marcadores para a fusão do lisossomo com o fagolisossomo e para a maturação dos vacúolos parasitóforos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito das proteínas lisossomais Lamp 1 e Lamp 2 na infecção de células não fagocíticas pelo protozoário da espécie L. amazonensis.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram utilizadas células HeLa depletadas ou não (wild type – WT) de LAMP-1 ou LAMP-2 bem como de fibroblastos murinos (MEF) knock out para LAMP-1 e/ou LAMP-2. A expressão das proteínas após lise das células foi determinada por Western Blot. As células foram infectadas com multiplicidade de infecção de 10 com L. amazonensis por 4hs e 48hs. Para determinação da infecção, as células infectadas (lamínlulas) foram submetidas a coloração por Giemsa ou metabolização de resazurina. O nível de infecção foi avaliado contando-se o número de parasitas intracelular em um total de pelo menos 100 células.			
<b>RESULTADOS</b>	A depleção ou baixa expressão de LAMP1 e/ou LAMP-2 foi confirmada por WB. Nas células MEF, a total depleção de LAMP2 facilitou significativamente a entrada do parasita em 4h em relação as células WT, bem como a proliferação das amastigotas em 48 hs. A ausência de LAMP1 não exarcebou este efeito (dupla depleção). Os resultados preliminares com células HeLa com baixa expressão de LAMP1 ou LAMP2 mostrou que não houve impacto na infecção em 4h ou na proliferação das amastigotas em 48 h.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados sugerem que, pelo menos em fibroblasto, a expressão normal de LAMP-2 previne a infecção e proliferação do parasito. Mais estudos são necessários para determinar o papel da LAMP2 na entrada do parasito na células e proliferação das amastigotas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021 Rodrigues JPF, Souza Onofre T, Barbosa BC, Ferreira ER, Bonfim-Melo A, Yoshida N. Host cell protein LAMP-2 is the receptor for Trypanosoma cruzi surface molecule gp82 that mediates invasion. Cellular microbiology. 2019;21(5):e13003. da Silva Vieira T, Arango Duque G, Ory K, Gontijo CM, Soares RP, Descoteaux A. Leishmania braziliensis: Strain-Specific Modulation of Phagosome Maturation. Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:319.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14771	Farmácia	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4902840 - ESTHER GOMES DE MELLO ALVES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		NOBUKO YOSHIDA
<b>TITULO</b>	Efeito das proteínas lisossomais na infecção de células não fagocíticas pela <i>Leishmania amazonensis</i>			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A Leishmaniose é uma doença endêmica em vários países, incluindo o Brasil. O protozoário do gênero <i>Leishmania</i> possui duas formas evolutivas: promastigota e amastigota. As promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Pouco tem se descrito sobre as células não fagocíticas, mas as células não fagocíticas são possíveis fontes de reservatórios do parasito e podem ter um papel importante na reincidência da doença. Após a internalização do parasita, ocorre a formação de vacúolos parasitóforos (VPs). Nessas vesículas, as formas promastigotas passam por uma rápida transformação para amastigotas. Os VPs contêm moléculas da via endocítica, incluindo as proteínas associadas às membranas dos lisossomos (LAMP-1 e LAMP-2); e da via exocítica. Os estudos na literatura mostram as LAMPs como importantes marcadores para a fusão do lisossomo com o fagolisossomo e para a maturação dos vacúolos parasitóforos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito das proteínas lisossomais Lamp 1 e Lamp 2 na infecção de células não fagocíticas pelo protozoário da espécie <i>L. amazonensis</i> .			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram utilizadas células HeLa depletadas ou não (wild type – WT) de LAMP-1 ou LAMP-2 bem como de fibroblastos murinos (MEF) knock out para LAMP-1 e/ou LAMP-2. A expressão das proteínas após lise das células foi determinada por Western Blot. As células foram infectadas com multiplicidade de infecção de 10 com <i>L. amazonensis</i> por 4hs e 48hs. Para determinação da infecção, as células infectadas (laminulas) foram submetidas a coloração por Giemsa ou metabolização de resazurina. O nível de infecção foi avaliado contando-se o número de parasitas intracelular em um total de pelo menos 100 células.			
<b>RESULTADOS</b>	A depleção ou baixa expressão de LAMP1 e/ou LAMP-2 foi confirmada por WB. Nas células MEF, a total depleção de LAMP2 facilitou significativamente a entrada do parasita em 4h em relação as células WT, bem como a proliferação das amastigotas em 48 hs. A ausência de LAMP1 não exerceu este efeito (dupla depleção). Os resultados preliminares com células HeLa com baixa expressão de LAMP1 ou LAMP2 mostrou que não houve impacto na infecção em 4h ou na proliferação das amastigotas em 48 h.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados sugerem que, pelo menos em fibroblasto, a expressão normal de LAMP-2 previne a infecção e proliferação do parasito. Mais estudos são necessários para determinar o papel da LAMP2 na entrada do parasito na células e proliferação das amastigotas.			
<b>REFERENCIAS</b>	Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021 Rodrigues JPF, Souza Onofre T, Barbosa BC, Ferreira ER, Bonfim-Melo A, Yoshida N. Host cell protein LAMP-2 is the receptor for <i>Trypanosoma cruzi</i> surface molecule gp82 that mediates invasion. Cellular microbiology. 2019;21(5):e13003. da Silva Vieira T, Arango Duque G, Ory K, Gontijo CM, Soares RP, Descoteaux A. <i>Leishmania braziliensis</i> : Strain-Specific Modulation of Phagosome Maturation. Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:319.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14773	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4383265 - MARCO ANTONIO SUAREZ PEREYRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno de Oliveira Pinheiro		
<b>TITULO</b>	O JIU JITSU NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR			
<b>INTRODUCAO</b>	Sabendo que o tema lutas ainda encontra muitas barreiras a serem transpassadas em ambiente escolar por conta de preconceitos e estereótipos divulgados pela mídia, o Jiu Jitsu surge como modalidade a ser inserida no planejamento das aulas de Educação Física Escolar com estratégia para ressignificação das percepções sobre o ensino de lutas na Escola e para contextualização desta modalidade na cultura corporal regional.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo teve como objetivo apresentar analisar sobre a utilização do Jiu Jitsu como estratégia para ressignificação do ensino das lutas nas aulas de Educação Física Escolar.			
<b>METODOLOGIA</b>	A construção desse estudo baseou-se a partir de relato de experiência associado a revisão bibliográfica de literatura. Buscas foram realizadas em bases de dados gratuitas onde artigos, projetos de Leis aprovados e em tramitação, reportagens e dissertações foram selecionadas tendo como critério de inclusão a presença de palavras-chave como: lutas, Jiu Jitsu, Educação Física, Escola, Crianças e Adolescentes. O relato de experiência considerou as vivências dos autores com a modalidade na atividade docente em escolas públicas.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi possível constatar que existem diversas restrições para a aplicação do conteúdo de lutas nas aulas de Educação Física, entre elas: o preconceito com as modalidades de lutas, a falta de formação específicas dos professores para aplicação das modalidades em sala de aula e o preconceito da comunidade escolar que associa as lutas com violência e agressividade. Nos aspectos teórico-prático é possível utilizar o Jiu Jitsu como ferramenta pedagógica nas aulas de Educação Física, proporcionando aos alunos o aprendizado não somente de uma luta enquanto modalidade, mas também buscando-se a formação integral do indivíduo considerando os aspectos biopsicossociais que podem ser abordados e desenvolvidos como: disciplina, respeito, desenvolvimento cognitivo e psicomotor, inclusão social e relacionamento socioafetivo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Portanto, considerando que o ensino de lutas atende aos conteúdos esperados dentro do período de escolarização de acordo com os documentos curriculares, é de extrema importância que se amplie as discussões sobre a formação pedagógica dos professores de Educação Física e a experimentação da modalidade Jiu Jitsu em ambiente escolar por estudantes. Esta modalidade tem grande potencial de desenvolvimento de competências e habilidades associadas a formação de um cidadão e um indivíduo ativo fisicamente.			
<b>REFERENCIAS</b>	RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; DARIDO, Suraya Cristina. O ensino das lutas na escola: possibilidades para a educação física. Porto Alegre - RS: Penso Editora Ltda, 2015. FAVATO, Mathheus Martins. O Jiu Jitsu como conteúdo da Educação Física Escolar no Ensino Médio. 34p. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Licenciatura em Educação Física, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia - GO, 2021. MACIEL, Breno Henrique Moraes. O Jiu-Jitsu brasileiro na educação física escolar: a arte suave como ferramenta pedagógica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. Brasil.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14780	Manejo de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4399561 - IRIS MOREIRA BARBOSA	2 - Aprovada	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Roberto Bueno Ribeiro		
<b>TITULO</b>	FORNECIMENTO DE LEGUMINOSAS NA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS DE CORTE: REVISÃO SISTEMÁTICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Com o aumento da demanda mundial sobre os produtos oriundos da pecuária e os impactos ambientais gerados pela sua criação, os produtores têm buscado alternativas para uma pecuária mais sustentável com custo baixo, alto índice produtivo e sustentável (ABRÃO, et al., 2016; SOARES et al., 2019). De acordo Pereira (2016), o uso de leguminosas na pastagem melhora a qualidade da produção de carne e leite, além da sua capacidade de fixar o nitrogênio e repassar para o sistema de pastagem sendo mais sustentável.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão sistemática sobre o fornecimento de leguminosas para bovinos de corte e os seus efeitos na sustentabilidade do sistema produtivo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a elaboração desse trabalho está sendo realizada uma revisão sistemática qualitativa, nos bancos de dados PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e em bibliotecas físicas, sendo selecionados artigos em inglês e português. A pergunta chave da pesquisa é "qual o impacto do fornecimento de leguminosas na sustentabilidade do sistema de criação de bovinos de corte?". Foram utilizados os termos de busca: leguminosas, "bovinos de corte", "integração lavoura-pecuária-floresta" e sustentabilidade. A associação entre eles foi feita utilizando os marcadores booleanos "AND", "OR" e "NOT".			
<b>RESULTADOS</b>	Na primeira etapa da revisão sistemática uma pesquisa abrangente nos bancos de dados a partir da seleção das palavras-chave geraram 10.959 artigos. Desses artigos apenas 40 enquadravam-se na pergunta da pesquisa, sendo que após a leitura, foram selecionados 30 artigos. Desses trabalhos, 10 foram publicados em revistas nacionais e 20 em periódicos internacionais, a maioria foram realizados experimentalmente, tendo apenas uma revisão e uma meta-análise. O ano de publicação variou de 1992 à 2022, sendo que a maioria em 2021.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O tema abordado apresenta um vasta literatura disponível, todavia a maior parte dos estudos é recente, indicando sua importância para a pecuária atual, que busca modelos mais sustentáveis de produção.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Abrão, F. O.; Fernandes, B. de C.; Pessoa, M. S. Produção sustentável : Princípios e possibilidades. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 61 – 73, 2016. DOI:10.21206/rbas.v6i4.380. Pereira, J. M. Utilização de Leguminosas Forrageiras na Alimentação de Bovinos. Universidade de Santa Cruz. p. 1 – 7, 2016. Soares, C. Oliveira et al. Seguranc(#38)#807;a alimentar, sustentabilidade e produc(#38)#807;a:(#38)#771;o de protei(#38)#769;na de origem animal. Vilela, EF; Callegaro, GM; Fernandes, GW Coord. Biomass e agricultura: oportunidades e desafios. Rio de Janeiro: Vertente edições, p. 149-162, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14781	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4482433 - JEOVAR SAVANO FURTADO DE LACERDA RODRIGUES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno de Oliveira Pinheiro		1 - Poster
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO LAZER E DA RECREAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O lazer é um direito garantido pela constituição de 1988 a todos os brasileiros, sendo uma obrigação dos municípios, estados e governo federal. Fomentar atividades ligadas à arte, à cultura, ao esporte e a outras linguagens que podem fazer parte de ações com base no lazer dentro da sociedade atual. A perspectiva teórica que embasa este artigo considerou as premissas de que tanto o lazer quanto as atividades recreativas são influenciadas e construídas a partir de um contexto histórico, social e cultural.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo teve como objetivo principal analisar a importância das práticas de recreação e lazer, assim como sua origem, sua caracterização e os impactos gerados nas vidas de agentes de segurança pública, que convive diariamente com altas cargas de estresse.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi desenvolvido uma análise qualitativa do relato de experiência considerando a literatura acerca da intervenção e do papel do Profissional de Educação Física no campo da recreação e do lazer nas instituições policiais, com a finalidade de melhorar a saúde mental desses profissionais.			
<b>RESULTADOS</b>	A prática de lazer por parte dos agentes de segurança pública desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio emocional e na promoção do bem-estar desses profissionais dedicados. Apesar das demandas intensas e muitas vezes estressantes de seus trabalhos, encontrar tempo para atividades recreativas é crucial para renovar as energias e reduzir o impacto do estresse relacionado ao serviço. O lazer não apenas proporciona momentos de relaxamento, mas também fortalece os laços comunitários, promovendo uma sensação de pertencimento e camaradagem entre os colegas. Além disso, as atividades de lazer ajudam a melhorar a saúde mental e física, proporcionando uma fuga temporária das responsabilidades profissionais. Ao participar de atividades recreativas, os agentes de segurança pública podem recarregar suas energias, desenvolver habilidades sociais e encontrar um senso de equilíbrio em suas vidas agitadas. Dessa forma, investir no lazer não é apenas uma escolha pessoal, mas também uma estratégia essencial para garantir que esses profissionais estejam bem-preparados para cumprir suas responsabilidades com eficácia e empatia.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Portanto, toda e qualquer atividade que o agente de segurança desenvolve em seu tempo de ócio voltado para o lazer, visa prioritariamente o convívio social, descontração e diversão. Tais atividades proporcionam ao indivíduo uma sensação de bem-estar e elevação do humor, permitindo através destas práticas, a prevenção de algumas doenças psicossociais como a depressão e ansiedade.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	PIMENTEL, Giuliano. Lazer: fundamentos, estratégias e atuação profissional. Jundiaí: Fontoura, 2003. AQUINO, Cassio Adriano Braz de; MARTINS, José Clerton de Oliveira. Ócio, lazer e tempo livre na sociedade do consumo e do trabalho. Revista Mal-estar e Subjetividade, 2, 7, 479-500, 2007. Disponível em: <a href="https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/27034/1/2007_art_cabaquino.pdf">https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/27034/1/2007_art_cabaquino.pdf</a> FRAGA, Alex Branco. WACHS, Felipe (orgs.). Educação física e saúde coletiva: políticas de formação e perspectivas de intervenção. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14783	Epidemiologia Animal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4290780 - GABRIELE YUMI RAMALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico molecular da leptospirose em cães com suspeita clínica atendidos no Hovet-UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial, potencialmente letal e capaz de causar surtos epidêmicos em populações humanas e de animais domésticos (Sykes et al. 2010). Cães infectados podem atuar como importante fonte de infecção para populações humanas, uma vez que são capazes de eliminar o patógeno no ambiente via urina e fluidos corporais (Schuller et al. 2015). Desta forma, a identificação de animais infectados, que é possibilitada principalmente pelo uso da técnica de PCR, é essencial para auxiliar na implementação de medidas preventivas com forte impacto em Saúde Pública.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o diagnóstico da leptospirose canina em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA pela técnica de PCR.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos pacientes entre que apresentaram níveis elevados de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 64,2 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados à duas ou mais manifestações clínicas sugestivas de leptospirose (distúrbios hemorrágicos, febre, vômitos, icterícia, prostração, hiporexia/anorexia). Cães que apresentaram poliúria, polidipsia e perda de peso um mês antes da apresentação no ambulatório não foram incluídos no estudo para descartar possíveis quadros de doença renal crônica. Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica da doença e destinadas a detecção molecular de leptospirose por meio da PCR por meio de técnica descrita por Merien et al. (1992).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram atendidos dez animais com suspeita clínica da entre março de 2022 e julho de 2023. Três desses animais tiveram diagnóstico de infecção confirmado pela PCR, sendo que dois animais apresentaram positividade em amostras de sangue, e um animal em amostra de urina.			
<b>CONCLUSOES</b>	O uso da técnica de PCR foi capaz de diagnosticar a doença em 30% dos animais com suspeita de leptospirose atendidos no período. A técnica se mostrou viável para o diagnóstico precoce da doença, embora seja importante o uso de técnicas sorológicas associadas para a identificação de animais na fase convalescente da doença.			
<b>REFERENCIAS</b>	Sykes, J.E. et al., 2010. 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine, 25(1), pp.1–13. Schuller, S. et al., 2015. European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 56(3), pp.159–179. Mérien, F., Amouriaux, P., Perolat, P., Baranton, G. (#38) Giron, I. S. Polymerase chain reaction for detection of Leptospira spp. in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology 30, 2219–2224 (1992).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14783	Epidemiologia Animal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4308361 - HELOISA MARCELINO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico molecular da leptospirose em cães com suspeita clínica atendidos no Hovet-UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial, potencialmente letal e capaz de causar surtos epidêmicos em populações humanas e de animais domésticos (Sykes et al. 2010). Cães infectados podem atuar como importante fonte de infecção para populações humanas, uma vez que são capazes de eliminar o patógeno no ambiente via urina e fluidos corporais (Schuller et al. 2015). Desta forma, a identificação de animais infectados, que é possibilitada principalmente pelo uso da técnica de PCR, é essencial para auxiliar na implementação de medidas preventivas com forte impacto em Saúde Pública.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o diagnóstico da leptospirose canina em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA pela técnica de PCR.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos pacientes entre que apresentaram níveis elevados de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 64,2 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados à duas ou mais manifestações clínicas sugestivas de leptospirose (distúrbios hemorrágicos, febre, vômitos, icterícia, prostração, hiporexia/anorexia). Cães que apresentaram poliúria, polidipsia e perda de peso um mês antes da apresentação no ambulatório não foram incluídos no estudo para descartar possíveis quadros de doença renal crônica. Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica da doença e destinadas a detecção molecular de leptospirosas patogênicas por meio da PCR por meio de técnica descrita por Merien et al. (1992).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram atendidos dez animais com suspeita clínica da entre março de 2022 e julho de 2023. Três desses animais tiveram diagnóstico de infecção confirmado pela PCR, sendo que dois animais apresentaram positividade em amostras de sangue, e um animal em amostra de urina.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O uso da técnica de PCR foi capaz de diagnosticar a doença em 30% dos animais com suspeita de leptospirose atendidos no período. A técnica se mostrou viável para o diagnóstico precoce da doença, embora seja importante o uso de técnicas sorológicas associadas para a identificação de animais na fase convalescente da doença.			
<b>REFERENCIA S</b>	Sykes, J.E. et al., 2010. 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine, 25(1), pp.1–13. Schuller, S. et al., 2015. European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 56(3), pp.159–179. Mérien, F., Amouriaux, P., Perolat, P., Baranton, G. (#38) Giron, I. S. Polymerase chain reaction for detection of Leptospira spp. in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology 30, 2219–2224 (1992).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14783	Epidemiologia Animal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4394607 - ANA BEATRIZ MENDES DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico molecular da leptospirose em cães com suspeita clínica atendidos no Hovet-UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial, potencialmente letal e capaz de causar surtos epidêmicos em populações humanas e de animais domésticos (Sykes et al. 2010). Cães infectados podem atuar como importante fonte de infecção para populações humanas, uma vez que são capazes de eliminar o patógeno no ambiente via urina e fluidos corporais (Schuller et al. 2015). Desta forma, a identificação de animais infectados, que é possibilitada principalmente pelo uso da técnica de PCR, é essencial para auxiliar na implementação de medidas preventivas com forte impacto em Saúde Pública.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o diagnóstico da leptospirose canina em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA pela técnica de PCR.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos pacientes entre que apresentaram níveis elevados de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 64,2 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados à duas ou mais manifestações clínicas sugestivas de leptospirose (distúrbios hemorrágicos, febre, vômitos, icterícia, prostração, hiporexia/anorexia). Cães que apresentaram poliúria, polidipsia e perda de peso um mês antes da apresentação no ambulatório não foram incluídos no estudo para descartar possíveis quadros de doença renal crônica. Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica da doença e destinadas a detecção molecular de leptospirosas patogênicas por meio da PCR por meio de técnica descrita por Merien et al. (1992).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram atendidos dez animais com suspeita clínica da entre março de 2022 e julho de 2023. Três desses animais tiveram diagnóstico de infecção confirmado pela PCR, sendo que dois animais apresentaram positividade em amostras de sangue, e um animal em amostra de urina.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O uso da técnica de PCR foi capaz de diagnosticar a doença em 30% dos animais com suspeita de leptospirose atendidos no período. A técnica se mostrou viável para o diagnóstico precoce da doença, embora seja importante o uso de técnicas sorológicas associadas para a identificação de animais na fase convalescente da doença.			
<b>REFERENCIA S</b>	Sykes, J.E. et al., 2010. 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine, 25(1), pp.1–13. Schuller, S. et al., 2015. European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 56(3), pp.159–179. Mérien, F., Amouriaux, P., Perolat, P., Baranton, G. (#38) Giron, I. S. Polymerase chain reaction for detection of Leptospira spp. in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology 30, 2219–2224 (1992).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14784	Educação	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442598 - ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ieda Maria da Silva Pinto Barbosa		
<b>TITULO</b>	O uso da literatura como fonte para a formação de leitores e fomentação da escrita no âmbito escolar			
<b>INTRODUCAO</b>	O presente artigo trata da prática da literatura no âmbito escolar, um lugar privilegiado, que serão construídas as bases para a formação de leitores e a escrita. O estudo literário, de uma forma mais ampla do que qualquer outro, estimula o exercício da mente, a compreensão do real abrangendo várias significações, a consciência do eu em relação ao outro, o conhecimento do mundo de uma forma muito ampla e principalmente promove o estudo e conhecimento da língua. Com foco na literatura em sua função humanizadora, pois exerce sobre o indivíduo o papel de formação social e cognitiva, indispensável para o desenvolvimento de um ser autônomo, crítico e reflexivo.			
<b>OBJETIVOS</b>	Apontar possibilidades para que o uso da literatura possa influenciar a formação de leitores e a fomentação da escrita no ambiente escolar.			
<b>METODOLOGIA</b>	As informações disponibilizadas, foram obtidas por meio da pesquisa bibliográfica e pesquisa documental: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSOES</b>	Para que o uso da literatura possa ser uma fonte para a formação de leitores e fomentação da escrita através do ambiente escolar, o professor precisa conhecer a literatura que irá trabalhar usar técnicas de leitura oral, leituras compartilhadas e provocar os alunos no momento da leitura com perguntas que irão despertar o pensamento. Além de ofertar cantinhos de leitura, visitas a bibliotecas e livrarias. Propostas pedagógicas que podem aguçar seu gosto pela literatura e ampliar seu repertório conhecendo novas palavras.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1997. AGUIAR, V. T. de (coord) et al. Era uma vez... na escola: Formando educadores para formar leitores. Belo Horizonte: Formato editorial, 2001. ARIÈS, P. História social da infância e da família. 2. ed., Tradução: D. Flaksman. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. BAMBERGER, R. Como incentivar o hábito de leitura. São Paulo: Ática/Unesco, 1988. BRASIL, Câmara dos Deputados. Lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010. Disponível em: <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112244.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112244.htm</a>. Acesso em 13 out. 2023. BRASIL, Ministério da Educação Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <a href="http://basenacionalcomum.mec.gov.br/">http://basenacionalcomum.mec.gov.br/</a>. Acesso em 29 set. 2023. BUARQUE, C. Chapeuzinho Amarelo. Rio de Janeiro, Berleandis (#38) Vertecchia, 1979. CÂNDIDO, Antonio. A literatura e a formação do homem. Ciência e Cultura, São Paulo: EDUSP, v. 24, n. 9, set. 1972. CÂNDIDO, Antonio. Vários Escritos. 5. Ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2014. COELHO, N. N. Literatura infantil. São Paulo: Ed. Moderna, 2000. LAJOLO, M. O texto não é pretexto. In: ZILBERMAN, R. (org), Leitura em crise na escola: as alternativas do professor. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998. NUNES, L. B. A Bolsa Amarela. (II. Marie Louise Nery) Rio de Janeiro, Agir, 1976. SILVEIRA, M. I. M. Modelos Teóricos e Estratégias de Leitura: suas implicações no ensino. Maceió: EDUFAL, 2005. ZILBERMAN, R. A leitura e o ensino da literatura. Curitiba: InterSaber, 2012. ZILBERMAN, R. A literatura infantil na escola. 11. ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Global, 2003.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14785	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4025784 - GABRIELA TAVARES DE LIMA CAVALCANTI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Marco Antonio Iazzetti		Marcelo Andreetta Corral
		<b>Orientador Externo</b>		
<b>TITULO</b>	A Medicina Tradicional Chinesa e o tratamento da Infertilidade Feminina			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A infertilidade feminina acomete cerca de 48,5 milhões de casais no mundo. Sendo uma doença definida pela incapacidade de gerar uma gravidez após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares desprotegidas. Em relação aos tratamentos convencionais da infertilidade, métodos farmacológicos são utilizados para distúrbios ovarianos e procedimentos cirúrgicos utilizados em problemas relacionados às tubas uterinas, em alguns casos de endometriose e técnicas de reprodução assistida. Entretanto, estes tratamentos apresentam efeitos indesejáveis aos pacientes. Para tornar o tratamento da infertilidade feminina mais eficaz, há a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) com a acupuntura, fitoterapia e moxabustão, como tratamento complementar, que possuem reduzidos efeitos colaterais quando comparado aos tratamentos convencionais e em conjunto deles, os tornam mais eficazes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os efeitos da MTC no tratamento da infertilidade feminina			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizar uma revisão sistemática de literatura seguindo as recomendações metodológicas do PRISMA. A pesquisa utilizou as bases de dados BVS e Pubmed, selecionando artigos de revisão, revisão sistemática, meta-análises e ensaios clínicos. Sendo a pesquisa delimitada entre o período de 2013 a 2023 e nas línguas portuguesa e inglesa. Foram escolhidos os descritores "Medicina Tradicional Chinesa", "Acupuntura" e "Infertilidade Feminina".			
<b>RESULTADOS</b>	Buscando evidências acerca dos efeitos da MTC sobre o tratamento da Infertilidade feminina, agrupam-se 99 artigos, dos quais 24 atendiam os critérios estabelecidos para a revisão. Foi observado que 20 artigos (83,33%) apresentaram evidências favoráveis à eficácia da MTC e 4 (16,67%) apresentaram a falta de evidências que pudessem comprovar a eficácia. Desses 20 artigos, 11 (55%) sustentam a efetividade dela como um tratamento complementar, enquanto 9 (45%) apontam a eficácia da MTC sozinha no tratamento. Entretanto, 3 desses (15%) apontam ineficácia da MTC no tratamento de causas relacionadas à Infertilidade Feminina. Do total de artigos selecionados, 6 (25%) apontam a acupuntura, sendo pouco eficaz ou ineficaz para o tratamento comparado a outras técnicas como a fitoterapia; e quando utilizadas como tratamento singular			
<b>CONCLUSÕES</b>	A maioria dos autores reconhece o efeito da MTC e seus métodos na Infertilidade Feminina, principalmente, quando empregado em conjunto ao tratamento convencional. Entretanto, há a necessidade da realização de ensaios clínicos envolvendo amostras maiores, melhor sistematização e padronização da coleta de dados e maior tempo de seguimento; além de mais trabalhos abordando métodos empregados pela MTC para elucidar sua eficácia no tratamento da Infertilidade Feminina			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Lee JW, Hyun MK, Kim HJ, Kim DI. Acupuncture and herbal medicine for female infertility: an overview of systematic reviews. Integr Med Res [Internet]. Nov 2020 [citado 5 jul 2023];100694. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100694">https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100694</a></p> <p>Xia JF, Inagaki Y, Zhang JF, Wang L, Song PP. Chinese medicine as complementary therapy for female infertility. Chin J Integr Med [Internet]. 2 ago 2016 [citado 6 jul 2023];23(4):245-52. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1007/s11655-016-2510-5">https://doi.org/10.1007/s11655-016-2510-5</a></p> <p>Jo J, Lee YJ, Lee H. Acupuncture for polycystic ovarian syndrome. Medicine [Internet]. Jun 2017 [citado 6 jul 2023];96(23):e7066. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1097/md.0000000000007066">https://doi.org/10.1097/md.0000000000007066</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14785	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4095511 - MARIANA CHIEFFI SAMPAIO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marco Antonio Iazzetti	Marcelo Andreetta Corral	
<b>TITULO</b>	A Medicina Tradicional Chinesa e o tratamento da Infertilidade Feminina			
<b>INTRODUCAO</b>	A infertilidade feminina acomete cerca de 48,5 milhões de casais no mundo. Sendo uma doença definida pela incapacidade de gerar uma gravidez após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares desprotegidas. Em relação aos tratamentos convencionais da infertilidade, métodos farmacológicos são utilizados para distúrbios ovarianos e procedimentos cirúrgicos utilizados em problemas relacionados às tubas uterinas, em alguns casos de endometriose e técnicas de reprodução assistida. Entretanto, estes tratamentos apresentam efeitos indesejáveis aos pacientes. Para tornar o tratamento da infertilidade feminina mais eficaz, há a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) com a acupuntura, fitoterapia e moxabustão, como tratamento complementar, que possuem reduzidos efeitos colaterais quando comparado aos tratamentos convencionais e em conjunto deles, os tornam mais eficazes.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os efeitos da MTC no tratamento da infertilidade feminina			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizar uma revisão sistemática de literatura seguindo as recomendações metodológicas do PRISMA. A pesquisa utilizou as bases de dados BVS e Pubmed, selecionando artigos de revisão, revisão sistemática, meta-análises e ensaios clínicos. Sendo a pesquisa delimitada entre o período de 2013 a 2023 e nas línguas portuguesa e inglesa. Foram escolhidos os descritores "Medicina Tradicional Chinesa", "Acupuntura" e "Infertilidade Feminina".			
<b>RESULTADOS</b>	Buscando evidências acerca dos efeitos da MTC sobre o tratamento da Infertilidade feminina, agrupam-se 99 artigos, dos quais 24 atendiam os critérios estabelecidos para a revisão. Foi observado que 20 artigos (83,33%) apresentaram evidências favoráveis à eficácia da MTC e 4 (16,67%) apresentaram a falta de evidências que pudessem comprovar a eficácia. Desses 20 artigos, 11 (55%) sustentam a efetividade dela como um tratamento complementar, enquanto 9 (45%) apontam a eficácia da MTC sozinha no tratamento. Entretanto, 3 desses (15%) apontam ineficácia da MTC no tratamento de causas relacionadas à Infertilidade Feminina. Do total de artigos selecionados, 6 (25%) apontam a acupuntura, sendo pouco eficaz ou ineficaz para o tratamento comparado a outras técnicas como a fitoterapia; e quando utilizadas como tratamento singular			
<b>CONCLUSOES</b>	A maioria dos autores reconhece o efeito da MTC e seus métodos na Infertilidade Feminina, principalmente, quando empregado em conjunto ao tratamento convencional. Entretanto, há a necessidade da realização de ensaios clínicos envolvendo amostras maiores, melhor sistematização e padronização da coleta de dados e maior tempo de seguimento; além de mais trabalhos abordando métodos empregados pela MTC para elucidar sua eficácia no tratamento da Infertilidade Feminina			
<b>REFERENCIAS</b>	Lee JW, Hyun MK, Kim HJ, Kim DI. Acupuncture and herbal medicine for female infertility: an overview of systematic reviews. Integr Med Res [Internet]. Nov 2020 [citado 5 jul 2023];100694. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100694">https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100694</a> . Xia JF, Inagaki Y, Zhang JF, Wang L, Song PP. Chinese medicine as complementary therapy for female infertility. Chin J Integr Med [Internet]. 2 ago 2016 [citado 6 jul 2023];23(4):245-52. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1007/s11655-016-2510-5">https://doi.org/10.1007/s11655-016-2510-5</a> . Jo J, Lee YJ, Lee H. Acupuncture for polycystic ovarian syndrome. Medicine [Internet]. Jun 2017 [citado 6 jul 2023];96(23):e7066. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1097/md.0000000000007066">https://doi.org/10.1097/md.0000000000007066</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14785	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4313054 - ALAN RYUITI TOKUTAKE HIROKAWA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Marco Antonio Iazzetti		Marcelo Andreetta Corral
		<b>Orientador Externo</b>		
<b>TITULO</b>	A Medicina Tradicional Chinesa e o tratamento da Infertilidade Feminina			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A infertilidade feminina acomete cerca de 48,5 milhões de casais no mundo. Sendo uma doença definida pela incapacidade de gerar uma gravidez após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares desprotegidas. Em relação aos tratamentos convencionais da infertilidade, métodos farmacológicos são utilizados para distúrbios ovarianos e procedimentos cirúrgicos utilizados em problemas relacionados às tubas uterinas, em alguns casos de endometriose e técnicas de reprodução assistida. Entretanto, estes tratamentos apresentam efeitos indesejáveis aos pacientes. Para tornar o tratamento da infertilidade feminina mais eficaz, há a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) com a acupuntura, fitoterapia e moxabustão, como tratamento complementar, que possuem reduzidos efeitos colaterais quando comparado aos tratamentos convencionais e em conjunto deles, os tornam mais eficazes.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar os efeitos da MTC no tratamento da infertilidade feminina			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizar uma revisão sistemática de literatura seguindo as recomendações metodológicas do PRISMA. A pesquisa utilizou as bases de dados BVS e Pubmed, selecionando artigos de revisão, revisão sistemática, meta-análises e ensaios clínicos. Sendo a pesquisa delimitada entre o período de 2013 a 2023 e nas línguas portuguesa e inglesa. Foram escolhidos os descritores "Medicina Tradicional Chinesa", "Acupuntura" e "Infertilidade Feminina".			
<b>RESULTADOS</b>	Buscando evidências acerca dos efeitos da MTC sobre o tratamento da Infertilidade feminina, agrupam-se 99 artigos, dos quais 24 atendiam os critérios estabelecidos para a revisão. Foi observado que 20 artigos (83,33%) apresentaram evidências favoráveis à eficácia da MTC e 4 (16,67%) apresentaram a falta de evidências que pudessem comprovar a eficácia. Desses 20 artigos, 11 (55%) sustentam a efetividade dela como um tratamento complementar, enquanto 9 (45%) apontam a eficácia da MTC sozinha no tratamento. Entretanto, 3 desses (15%) apontam ineficácia da MTC no tratamento de causas relacionadas à Infertilidade Feminina. Do total de artigos selecionados, 6 (25%) apontam a acupuntura, sendo pouco eficaz ou ineficaz para o tratamento comparado a outras técnicas como a fitoterapia; e quando utilizadas como tratamento singular			
<b>CONCLUSOES</b>	A maioria dos autores reconhece o efeito da MTC e seus métodos na Infertilidade Feminina, principalmente, quando empregado em conjunto ao tratamento convencional. Entretanto, há a necessidade da realização de ensaios clínicos envolvendo amostras maiores, melhor sistematização e padronização da coleta de dados e maior tempo de seguimento; além de mais trabalhos abordando métodos empregados pela MTC para elucidar sua eficácia no tratamento da Infertilidade Feminina			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Lee JW, Hyun MK, Kim HJ, Kim DI. Acupuncture and herbal medicine for female infertility: an overview of systematic reviews. Integr Med Res [Internet]. Nov 2020 [citado 5 jul 2023];100694. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100694">https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100694</a></p> <p>Xia JF, Inagaki Y, Zhang JF, Wang L, Song PP. Chinese medicine as complementary therapy for female infertility. Chin J Integr Med [Internet]. 2 ago 2016 [citado 6 jul 2023];23(4):245-52. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1007/s11655-016-2510-5">https://doi.org/10.1007/s11655-016-2510-5</a></p> <p>Jo J, Lee YJ, Lee H. Acupuncture for polycystic ovarian syndrome. Medicine [Internet]. Jun 2017 [citado 6 jul 2023];96(23):e7066. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1097/md.0000000000007066">https://doi.org/10.1097/md.0000000000007066</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14786	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	Manejo anestésico do paciente cardiopata submetido a mandibulectomia bilateral: relato de caso			
<b>INTRODUCA O</b>	A doença degenerativa mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a principal causa de insuficiência cardíaca congestiva esquerda em cães, e na maioria dos casos a doença está associada com a degeneração de valva tricúspide, isso devido a repercussão hemodinâmica e consequentemente remodelamento cardíaco. De acordo com o consenso publicado pela ACVIM (2019), o estadiamento da DMVM descreve quatro estágios básicos, elucidando que em estágio B2, pacientes ainda assintomáticos apresentam regurgitação e alterações atriais e ventriculares decorrentes do remodelamento da valva mitral, já sendo indicado início do tratamento medicamentoso para retardar o início da insuficiência cardíaca.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é relatar o procedimento anestésico para mandibulectomia bilateral e linfadenectomia submandibular esquerda realizada no Hospital Veterinário UNISA em um paciente classificado como B2, apresentando hipertensão pulmonar e repercussão hemodinâmica importante.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um paciente canino, macho, da raça Lhasa apso, dez anos, 6,3 kg foi submetido ao procedimento de mandibulectomia bilateral para a retirada de neoplasia. Nos exames pré-anestésicos, o ecocardiograma demonstrou achados compatíveis com a cardiopatia em questão, também tendo remodelamento da valva tricúspide. No exame pré-anestésico, foi classificado como ASA III. De medicação pré-anestésica, foi utilizada morfina 0,3mg/kg e cetamina 0,6mg/kg via IM. Para indução etomidato 2mg/kg, associado com fentanil 2mcg/kg e midazolam 0,2mg/kg. Para maior controle alérgico no trans e pós cirúrgico, realizado bloqueio mandibular bilateral com bupivacaína. No trans-anestésico, com 15min foi preciso realizar um bolus de fentanil 2mg/kg pois a frequência cardíaca se apresentava elevada, juntamente com a pressão arterial média. Após 1h paciente apresentou queda rápida de frequência cardíaca e pressão arterial, sendo preconizado o início da infusão de dobutamina 2mcg/kg/min durante 25min, o procedimento perdurou por mais 45 min, e após o animal apresentou boa recuperação.			
<b>RESULTADO S</b>	É de conhecimento que o volume sistólico é afetado por três fatores, sendo eles a pré carga, pós carga e contratilidade. No caso do paciente relatado, o problema era advindo de contratilidade e inotropismo, por isso tem indicação de utilizar a dobutamina. O manejo analgésico durante todo o procedimento é essencial, afim de se evitar alterações cardiovasculares deflagradas pelo estímulo doloroso e reduzir o requerimento dos anestésicos. A dor é uma sensação complexa multidimensional, onde se torna inviável o seu tratamento com apenas um fármaco com ação analgésica.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que a técnica anestésica empregada foi satisfatória para o procedimento em que o paciente foi submetido, proporcionando estabilidade hemodinâmica e adequada analgesia.			
<b>REFERENCIA S</b>	KEENE B, ATKINS C, BONAGURA J et al, 2019. ACVIM. Journal of Veterinary Internal Medicine, (2019), 1127-1140, 33 (3). MATTHEWS K, KRONEN PW, LASCELLES D, et al. Guidelines for recognition, assessment and treatment of pain: WSAVA Global Pain Council. J Small Anim Pract 2014;55:E10-68. REED R, DOHERTY T. Minimum alveolar concentration: key concepts and a review of its pharmacological reduction in dogs. Part 1. Res Vet Sci 2018; 117:266-70			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14786	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4855094 - AMANDA CRISTINA FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	Manejo anestésico do paciente cardiopata submetido a mandibulectomia bilateral: relato de caso			
<b>INTRODUCA O</b>	A doença degenerativa mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a principal causa de insuficiência cardíaca congestiva esquerda em cães, e na maioria dos casos a doença está associada com a degeneração de valva tricúspide, isso devido a repercussão hemodinâmica e consequentemente remodelamento cardíaco. De acordo com o consenso publicado pela ACVIM (2019), o estadiamento da DMVM descreve quatro estágios básicos, elucidando que em estágio B2, pacientes ainda assintomáticos apresentam regurgitação e alterações atriais e ventriculares decorrentes do remodelamento da valva mitral, já sendo indicado início do tratamento medicamentoso para retardar o início da insuficiência cardíaca.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é relatar o procedimento anestésico para mandibulectomia bilateral e linfadenectomia submandibular esquerda realizada no Hospital Veterinário UNISA em um paciente classificado como B2, apresentando hipertensão pulmonar e repercussão hemodinâmica importante.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um paciente canino, macho, da raça Lhasa apso, dez anos, 6,3 kg foi submetido ao procedimento de mandibulectomia bilateral para a retirada de neoplasia. Nos exames pré-anestésicos, o ecocardiograma demonstrou achados compatíveis com a cardiopatia em questão, também tendo remodelamento da valva tricúspide. No exame pré-anestésico, foi classificado como ASA III. De medicação pré-anestésica, foi utilizada morfina 0,3mg/kg e cetamina 0,6mg/kg via IM. Para indução etomidato 2mg/kg, associado com fentanil 2mcg/kg e midazolam 0,2mg/kg. Para maior controle alérgico no trans e pós cirúrgico, realizado bloqueio mandibular bilateral com bupivacaína. No trans-anestésico, com 15min foi preciso realizar um bolus de fentanil 2mg/kg pois a frequência cardíaca se apresentava elevada, juntamente com a pressão arterial média. Após 1h paciente apresentou queda rápida de frequência cardíaca e pressão arterial, sendo preconizado o início da infusão de dobutamina 2mcg/kg/min durante 25min, o procedimento perdurou por mais 45 min, e após o animal apresentou boa recuperação.			
<b>RESULTADO S</b>	É de conhecimento que o volume sistólico é afetado por três fatores, sendo eles a pré carga, pós carga e contratilidade. No caso do paciente relatado, o problema era advindo de contratilidade e inotropismo, por isso tem indicação de utilizar a dobutamina. O manejo analgésico durante todo o procedimento é essencial, afim de se evitar alterações cardiovasculares deflagradas pelo estímulo doloroso e reduzir o requerimento dos anestésicos. A dor é uma sensação complexa multidimensional, onde se torna inviável o seu tratamento com apenas um fármaco com ação analgésica.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que a técnica anestésica empregada foi satisfatória para o procedimento em que o paciente foi submetido, proporcionando estabilidade hemodinâmica e adequada analgesia.			
<b>REFERENCIA S</b>	KEENE B, ATKINS C, BONAGURA J et al, 2019. ACVIM. Journal of Veterinary Internal Medicine, (2019), 1127-1140, 33 (3). MATTHEWS K, KRONEN PW, LASCELLES D, et al. Guidelines for recognition, assessment and treatment of pain: WSAVA Global Pain Council. J Small Anim Pract 2014;55:E10-68. REED R, DOHERTY T. Minimum alveolar concentration: key concepts and a review of its pharmacological reduction in dogs. Part 1. Res Vet Sci 2018; 117:266-70			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14787	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4319532 - FERNANDO MINERVINO DA SILVA JUNIOR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO-DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da atividade de ectofosfatases na infectividade dos isolados de <i>Leishmania naiffi</i>			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No Brasil, a manifestação clínica mais comum da leishmaniose é a cutânea, causada principalmente pelas espécies de <i>Leishmania</i> ( <i>L.</i> ) <i>amazonensis</i> , <i>L. braziliensis</i> , <i>L. guyanensis</i> e menos frequente na <i>L. naiffi</i> . Muito pouco se tem descrito sobre a <i>L. naiffi</i> . A forma promastigota metacíclica é a infectante ao hospedeiro, no qual a forma infectante se diferencia em amastigota e infecta as células adjacentes. As promastigotas possuem na membrana fatores de virulência, como as ectofosfatases, que, pela sua propriedade de desfosforilar diferentes substratos, facilita a internalização e metabolismo do parasita dentro da célula.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar atividade de ectofosfatases em isolados de <i>L. (V.) naiffi</i> e <i>L. (V.) braziliensis</i> (controle) e sua ação na infectividade em células hospedeiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os parasitos foram mantidos, à 28°C, em meio 199 suplementado com 10% SFB, antibióticos, 2% de urina masculina e 10 µg/mL hemina. As células Raw264.7 foram mantidas em cultura com RPMI completo, em estufa a 37°C. Para verificar a atividade das ectofosfatases e citotoxicidade dos parasitas foi utilizado o ensaio colorimétrico com substrato paraNitroFenol (pNPP) e resazurina, respectivamente. A metaciclo genese foi determinada pela contagem morfológica dos parasitos.			
<b>RESULTADOS</b>	Independentemente das espécies de leishmania, a atividade das ectofosfatases foi estatisticamente maior nos pH 4,5 e 6,5 na fase log de crescimento (dia 4 de cultura), sugerindo um importante atividade das ectofosfatases ácidas. As culturas de parasitos foram tratadas com 1 - 100 µM de molibdato de amônio ou 0,001 - 0,1 µM BpV(phen). As drogas inibiram as ectofosfatases de maneira dose-dependente, sendo o molibdato mais efetivo do que o BpV(phen). Os parasitos foram tratados com 10 µM de molibdato de amônio e 0,1µM de BpV(phen) e após 7 dias de cultura, foram utilizados para a infecção de macrófagos de linhagem Raw264.7. A droga molibdato não alterou a infecção e o número de amastigota de <i>L. braziliensis</i> . Em 48h de infecção, o isolado de <i>L. naiffi</i> JM tratado, porém, tende a infectar menos as células em relação ao controle sem tratamento. Com relação ao BpV(phen), o tratamento dos parasitos da espécie <i>L. braziliensis</i> tende a diminuir a porcentagem de infecção e o número de amastigota em relação ao parasito não tratado, tanto em 2h quanto em 48 h. Já, os parasitos <i>L. naiffi</i> JM tratados com BpV(phen) tiveram, em 48h, o número de células e amastigotas reduzidas em relação ao controle sem tratamento. Os tratamentos dos parasitos com as drogas parecem não ter efeito na metaciclo genese.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A atividade ectofosfatases ácidas foi maior na fase log de crescimento dos parasitos, porém não parecem estar envolvidas na metaciclo genese, pelo menos com as drogas utilizadas. No entanto, as ectofosfatases ácidas modulam positivamente a infecção de macrófagos principalmente pela <i>L. naiffi</i> , por mecanismo que não envolvem a geração das formas metacíclicas			
<b>REFERENCIAS</b>	Cantanhede LM, Cupolillo E. Parasit Vectors. 2023;16(1):194 da Silva Vieira T, et al. Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:31 Elmahallawy EK, Alkhalidi AAM. Veterinary science. 2021;8(2)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14787	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441770 - REBECA SANTANA SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO-DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da atividade de ectofosfatases na infectividade dos isolados de Leishmania naiffi			
<b>INTRODUÇÃO</b>	No Brasil, a manifestação clínica mais comum da leishmaniose é a cutânea, causada principalmente pelas espécies de Leishmania (L.) amazonensis, L. braziliensis, L. guyanensis e menos frequente na L. naiffi. Muito pouco se tem descrito sobre a L. naiffi. A forma promastigota metacíclica é a infectante ao hospedeiro, no qual a forma infectante se diferencia em amastigota e infecta as células adjacentes. As promastigotas possuem na membrana fatores de virulência, como as ectofosfatases, que, pela sua propriedade de desfosforilar diferentes substratos, facilita a internalização e metabolismo do parasita dentro da célula.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar atividade de ectofosfatases em isolados de L. (V). naiffi e L. (V). braziliensis (controle) e sua ação na infectividade em células hospedeiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os parasitos foram mantidos, à 28°C, em meio 199 suplementado com 10% SFB, antibióticos, 2% de urina masculina e 10 µg/mL hemina. As células Raw264.7 foram mantidas em cultura com RPMI completo, em estufa a 37°C. Para verificar a atividade das ectofosfatases e citotoxicidade dos parasitas foi utilizado o ensaio colorimétrico com substrato paraNitroFenol (pNPP) e resazurina, respectivamente. A metaciclo genese foi determinada pela contagem morfológica dos parasitos.			
<b>RESULTADOS</b>	Independentemente das espécies de leishmania, a atividade das ectofosfatases foi estatisticamente maior nos pH 4,5 e 6,5 na fase log de crescimento (dia 4 de cultura), sugerindo um importante atividade das ectofosfatases ácidas. As culturas de parasitos foram tratadas com 1 - 100 µM de molibdato de amônio ou 0,001 - 0,1 µM BpV(phen). As drogas inibiram as ectofosfatases de maneira dose-dependente, sendo o molibdato mais efetivo do que o BpV(phen). Os parasitos foram tratados com 10 µM de molibdato de amônio e 0,1µM de BpV(phen) e após 7 dias de cultura, foram utilizados para a infecção de macrófagos de linhagem Raw264.7. A droga molibdato não alterou a infecção e o número de amastigota de L. braziliensis. Em 48h de infecção, o isolado de L. naiffi JM tratado, porém, tende a infectar menos as células em relação ao controle sem tratamento. Com relação ao BpV(phen), o tratamento dos parasitos da espécie L. braziliensis tende a diminuir a porcentagem de infecção e o número de amastigota em relação ao parasito não tratado, tanto em 2h quanto em 48 h. Já, os parasitos L. naiffi JM tratados com BpV(phen) tiveram, em 48h, o número de células e amastigotas reduzidas em relação ao controle sem tratamento. Os tratamentos dos parasitos com as drogas parecem não ter efeito na metaciclo genese.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A atividade ectofosfatases ácidas foi maior na fase log de crescimento dos parasitos, porém não parecem estar envolvidas na metaciclo genese, pelo menos com as drogas utilizadas. No entanto, as ectofosfatases ácidas modulam positivamente a infecção de macrófagos principalmente pela L. naiffi, por mecanismo que não envolvem a geração das formas metacíclicas			
<b>REFERENCIAS</b>	Cantanhede LM, Cupolillo E. Parasit Vectors. 2023;16(1):194 da Silva Vieira T, et al. Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:31 Elmahallawy EK, Alkhalidi AAM. Veterinary science. 2021;8(2)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14787	Biomedicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4775805 - LUCAS GALDINO NUNES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO-DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da atividade de ectofofosfatases na infectividade dos isolados de Leishmania naiffi			
<b>INTRODUCAO</b>	No Brasil, a manifestação clínica mais comum da leishmaniose é a cutânea, causada principalmente pelas espécies de Leishmania (L.) amazonensis, L. braziliensis, L. guyanensis e menos frequente na L. naiffi. Muito pouco se tem descrito sobre a L. naiffi. A forma promastigota metacíclica é a infectante ao hospedeiro, no qual a forma infectante se diferencia em amastigota e infecta as células adjacentes. As promastigotas possuem na membrana fatores de virulência, como as ectofofosfatases, que, pela sua propriedade de desfosforilar diferentes substratos, facilita a internalização e metabolismo do parasita dentro da célula.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar atividade de ectofofosfatases em isolados de L. (V). naiffi e L. (V). braziliensis (controle) e sua ação na infectividade em células hospedeiras.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os parasitos foram mantidos, à 28°C, em meio 199 suplementado com 10% SFB, antibióticos, 2% de urina masculina e 10 µg/mL hemina. As células Raw264.7 foram mantidas em cultura com RPMI completo, em estufa a 37°C. Para verificar a atividade das ectofofosfatases e citotoxicidade dos parasitas foi utilizado o ensaio colorimétrico com substrato paraNitroFenol (pNPP) e resazurina, respectivamente. A metaciclo genese foi determinada pela contagem morfológica dos parasitos.			
<b>RESULTADOS</b>	Independentemente das espécies de leishmania, a atividade das ectofofosfatases foi estatisticamente maior nos pH 4,5 e 6,5 na fase log de crescimento (dia 4 de cultura), sugerindo um importante atividade das ectofofosfatases ácidas. As culturas de parasitos foram tratadas com 1 - 100 µM de molibdato de amônio ou 0,001 - 0,1 µM BpV(phen). As drogas inibiram as ectofofosfatases de maneira dose-dependente, sendo o molibdato mais efetivo do que o BpV(phen). Os parasitos foram tratados com 10 µM de molibdato de amônio e 0,1µM de BpV(phen) e após 7 dias de cultura, foram utilizados para a infecção de macrófagos de linhagem Raw264.7. A droga molibdato não alterou a infecção e o número de amastigota de L. braziliensis. Em 48h de infecção, o isolado de L. naiffi JM tratado, porém, tende a infectar menos as células em relação ao controle sem tratamento. Com relação ao BpV(phen), o tratamento dos parasitos da espécie L. braziliensis tende a diminuir a porcentagem de infecção e o número de amastigota em relação ao parasito não tratado, tanto em 2h quanto em 48 h. Já, os parasitos L. naiffi JM tratados com BpV(phen) tiveram, em 48h, o número de células e amastigotas reduzidas em relação ao controle sem tratamento. Os tratamentos dos parasitos com as drogas parecem não ter efeito na metaciclo genese.			
<b>CONCLUSOES</b>	A atividade ectofofosfatases ácidas foi maior na fase log de crescimento dos parasitos, porém não parecem estar envolvidas na metaciclo genese, pelo menos com as drogas utilizadas. No entanto, as ectofofosfatases ácidas modulam positivamente a infecção de macrófagos principalmente pela L. naiffi, por mecanismo que não envolvem a geração das formas metacíclicas			
<b>REFERENCIAS</b>	Cantanhede LM, Cupolillo E. Parasit Vectors. 2023;16(1):194 da Silva Vieira T, et al. Frontiers in cellular and infection microbiology. 2019;9:31 Elmahallawy EK, Alkhalidi AAM. Veterinary science. 2021;8(2)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14788	Ciências	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4846770 - MARIA EUGÊNIA DE SOUSA BRASIL SOZIO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Revisão narrativa sobre os determinantes sociais, políticos e econômicos da negligência no combate à leptospirose no Brasil			
<b>INTRODUCA O</b>	A leptospirose é considerada uma Doença Tropical Negligenciada (DTN) que incide, especialmente, em áreas tropicais, populações em situação de vulnerabilidade econômica, excluídas socialmente e amplamente estigmatizadas (Lindoso e Lindoso, 2009; Martins-Melo et al., 2015). Para além dos desafios estruturais – sociais, políticos e econômicos, vale ressaltar que a leptospirose é notadamente marcada por falhas diagnósticas, subregistro e subnotificação dos casos (Rodrigues, 2018). Assim, embora tenha impacto significativo em saúde humana, a leptospirose segue como uma doença tipicamente negligenciada no Brasil. As diversas faces dessa negligência, entretanto, permanecem pouco caracterizadas, dificultando o aprofundamento do debate sobre o verdadeiro impacto da doença e sua importância para a saúde pública no país.			
<b>OBJETIVOS</b>	Produzir uma revisão narrativa da literatura que caracterize as diferentes dimensões da negligência no combate à leptospirose no Brasil, identificando seus possíveis determinantes sociais, políticos e econômicos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizar-se-á uma busca avançada em repositórios como PubMed, Scielo e Science Direct. Complementarmente, devem ser buscados dados e registros em sistemas de dados oficiais, como o DATASUS e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), além de documentos especializados acerca da temática, como os boletins epidemiológicos e demais produções da literatura cinzenta.			
<b>RESULTADO S</b>	A partir da leitura preliminar de 58 textos pré-selecionados, foram propostos descritores para orientar a busca avançada de novos artigos nos repositórios mencionados. Até o presente momento, propõe-se a seguinte categorização de descritores: (A) Diagnóstico – e as subcategorias (A1) Erro diagnóstico e (A2) Subdiagnóstico; (B) Prevenção e tratamento – e a subcategoria (B1) Imunização deficiente; (C) Negligências – e as subcategorias (C1) Negligência institucional, (C2) Negligência à pesquisa, (C3) Negligência mercadológica e (C4) Negligência médica; (D) Vigilância – e a subcategoria (D1) Vigilância deficiente; (E) Lacunas – e as subcategorias (E1) Lacuna no conhecimento científico, (E2) Lacuna nos dados e estimativas e (E3) Lacuna no conhecimento médico; e (F) Outros tópicos, com a subcategoria (F1) Diversidade de espécies patogênicas. Como próximos passos, após a consolidação dos descritores, dar-se-á início à busca de novos artigos e sua subsequente leitura para a produção de uma revisão narrativa.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A análise preliminar permitiu identificar que a leptospirose está inserida em um contexto de negligência sob diferentes óticas: negligência institucional, negligência mercadológica, negligência médica e negligência à pesquisa. Por fim, são marcantes as lacunas no conhecimento médico e científico a respeito da leptospirose, além da imprecisão dos dados e estimativas disponíveis publicamente.			
<b>REFERENCIA S</b>	LINDOSO, J. A. L.; LINDOSO, A. A. B. P. Neglected tropical diseases in Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 51, n. 5, p. 247–253, 2009. MARTINS-MELO, F. R. et al. Mortality from neglected tropical diseases in Brazil, 2000–2011. Bulletin of the World Health Organization, v. 94, n. 2, p. 103–110, 2015. RODRIGUES, C. M. O. O círculo vicioso da negligência da leptospirose no Brasil The vicious circle of the leptospirosis negligence in Brazil. p. 1–11, 16 abr. 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14789	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3946754 - HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno de Oliveira Pinheiro		
<b>TITULO</b>	BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Apesar dos jovens serem a parcela mais ativa da população, os indicadores de sedentarismo crescente têm alertado os profissionais de saúde. A prática de exercícios físicos por crianças e adolescentes no Brasil alcançou um patamar significativamente preocupante, evidenciando uma mudança nos hábitos de vida da juventude. Além disso, a popularização de tecnologias wearables e aplicativos de fitness transformou a maneira como as crianças e adolescentes encaram o exercício.			
<b>OBJETIVOS</b>	Essa pesquisa teve como objetivo analisar a importância da prática da atividade física para saúde de crianças e adolescentes, além de evidenciar os benefícios da vida ativa para esta parcela da população.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizou-se uma revisão bibliográfica de literatura, com diferentes tipos de documentos (artigos, teses, dissertações, textos on-line). Foram utilizados trabalhos obtidos a partir da busca com os descritores "atividade física", "crianças e adolescentes", "benefícios" e "esportes" nos endereços eletrônicos Google Acadêmico e Scielo. Selecionaram-se os estudos que apresentavam a descrição do método no título e no corpo do texto de forma abrangente, de modo a contribuir com sua caracterização. Optou-se pela descrição panorâmica dos benefícios associados a prática de atividades físicas, exercícios físicos e atividades esportivas ao público infantojuvenil.			
<b>RESULTADOS</b>	A atividade física regular ajuda no desenvolvimento dos sistemas muscular e esquelético, melhorando a força, a resistência e a coordenação motora. Além disso, contribui para um crescimento saudável e aprimora a saúde dos ossos, ajudando a prevenir problemas como a osteoporose no futuro. A prática de atividades físicas auxilia também no controle do peso corporal, reduzindo o risco de obesidade infantil e reduzem o risco de doenças cardíacas a longo prazo. A atividade física é conhecida por liberar endorfinas, os hormônios do bem-estar, que ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Além disso, a prática de esportes em equipe pode melhorar a autoestima e as habilidades sociais, promovendo uma sensação de pertencimento. Estudos mostram que crianças e adolescentes fisicamente ativos tendem a ter melhor desempenho escolar, a concentração, a memória e a capacidade de resolução de problemas, contribuindo para o sucesso acadêmico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Portanto, a prática regular de atividades físicas não apenas beneficia a saúde física das crianças e adolescentes, mas também melhora sua saúde mental, desempenho acadêmico e habilidades sociais, estabelecendo as bases para uma vida saudável e equilibrada. É fundamental incentivar e apoiar a participação ativa das crianças em atividades físicas para promover seu bem-estar geral.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	ARRAZ, Fernando Miranda. A Importância da Atividade Física na Infância. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 08, Vol. 01, pp. 92-103, Agosto de 2018. FIEP – Federação Internacional de Educação Física: Manifesto Mundial da Educação Física. Informativo CREF/RS. Ano 01, Julho – Agosto. P. 7, 2004. CARAZZATO J.G. Atividade Física na Criança e no Adolescente. Em Ghorayeb N (#38) Barros T. O Exercício. Ed. Atheneu. 1999. p 351-361. DE ROSE Jr.D. Esporte e atividade física na infância e adolescência: uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed,2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14791	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	NEFROTOXICIDADE EM CÃO APÓS INGESTÃO DE PETISCO COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR MONOETILENOGLICOL			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O etilenoglicol é um solvente orgânico com propriedade anticongelante que, ao ser ingerido, é absorvido no trato gastrointestinal e metabolizado em produtos tóxicos. Esse composto representa uma das principais causas de intoxicação em pequenos animais, com taxa de letalidade variando de 59% a 70%, entre cães e gatos. O agente químico é um líquido incolor, inodoro e de sabor adocicado, que pode aumentar a palatabilidade e contribuir com a ingestão acidental. No Brasil, no final de 2022, uma empresa produtora de propilenoglicol forneceu, de modo acidental, monoetilenoglicol para empresa produtora de petiscos para cães (Bassar Pet Food). A ingestão de petiscos provenientes de lotes contaminados com monoetilenoglicol resultou em, pelo menos, 40 casos letais de intoxicação em cães no país.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de intoxicação, associado à ingestão de petisco comercial com suspeita de contaminação por monoetilenoglicol, em um cão atendido em setembro de 2022 no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, sem raça definida, macho, 5 anos, apresentou anorexia, hipotermia, oligodipsia, apatia e desidratação, com histórico de consumo de petiscos da marca Petz Snack Cuidado Oral, produzido pela Bassar Pet Food. Após estabilização do animal, amostra de sangue foi coletada para realização de hemograma, provas bioquímicas de função renal e hepática, além de realização de ultrassonografia abdominal e pélvica. Após duas semanas de tratamento de suporte, o animal encontrava-se irresponsivo, sendo optado pela eutanásia. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>No hemograma, o animal apresentou anemia hemolítica não regenerativa, com presença de excêntricos. Nas provas bioquímicas, apresentou aumento de ureia (300 mg/dL) e creatinina (8,75 mg/dL) séricas, com ausência de alteração de bioquímica hepática. Na avaliação ultrassonográfica, foi observado aumento da ecogenicidade de região cortical renal, compatível com nefropatia e pielectasia. Na histopatologia renal, foram observados numerosos cristais arredondados, por vezes alongados, compatíveis com oxalato de cálcio monohidratados (a maioria contendo coloração acastanhada a esverdeada condizente com melanina) no lúmen dos túbulos renais, associados à degeneração e necrose do epitélio tubular e infiltrado linfoplasmocítico intersticial, multifocal, discreto. Cristais de morfologia similar foram também observados no parênquima cerebral, associado a edema moderado. Os sinais clínicos da intoxicação aguda por monoetilenoglicol incluem êmese, náusea, anorexia, diarreia e ulcerações gástricas, depressão, incoordenação, ataxia, convulsões e coma. Os animais intoxicados também apresentam sinais clínicos de insuficiência renal aguda, como oligúria e anúria, acompanhados por aumento acentuado de enzimas renais, com rápida evolução para óbito. No presente caso, o animal apresentou histórico e quadro clínico compatível com nefrotoxicidade aguda causada por monoetilenoglicol. Adicionalmente, apresentou perda da relação córtico-medular renal, na ultrassonografia, combinado à presença de corpúsculos de Heinz e excêntricos no hemograma, característicos de anemia hemolítica por agentes oxidantes. O exame histopatológico renal confirmou a suspeita de nefrotoxicidade, uma vez que identificou cristais característicos da intoxicação por monoetilenoglicol nos túbulos renais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Os achados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, combinados à avaliação histopatológica, foram utilizados para o estabelecimento do diagnóstico definitivo de nefrotoxicidade aguda, associada à ingestão do petisco comercial.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARDOSO, Joana Isabel Garcia et al. Estudo sobre intoxicações em animais de companhia no concelho de Loures. 2016. Dissertação de Mestrado. SANTOS, Aline et al. Cristalúria e anemia hemolítica por intoxicação simultânea por etilenoglicol e propilenoglicol em cão: relato de caso. Enciclopedia Biosfera, v. 10, n. 19, 2014. TALCOTT, Patricia A.; PETERSON, Michael E. Small animal toxicology. Elsevier Health Sciences, 2012. THOMPSON, M. E. et al. Characterization of melamine-containing and calcium oxalate crystals in three dogs with suspected pet food-induced nephrotoxicosis. Veterinary Pathology, v. 45, n. 3, p. 417-426, 2008.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14791	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3760545 - AUGUSTO NUNES GAJARDO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	NEFROTOXICIDADE EM CÃO APÓS INGESTÃO DE PETISCO COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR MONOETILENOGLICOL			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O etilenoglicol é um solvente orgânico com propriedade anticongelante que, ao ser ingerido, é absorvido no trato gastrointestinal e metabolizado em produtos tóxicos. Esse composto representa uma das principais causas de intoxicação em pequenos animais, com taxa de letalidade variando de 59% a 70%, entre cães e gatos. O agente químico é um líquido incolor, inodoro e de sabor adocicado, que pode aumentar a palatabilidade e contribuir com a ingestão acidental. No Brasil, no final de 2022, uma empresa produtora de propilenoglicol forneceu, de modo acidental, monoetilenoglicol para empresa produtora de petiscos para cães (Bassar Pet Food). A ingestão de petiscos provenientes de lotes contaminados com monoetilenoglicol resultou em, pelo menos, 40 casos letais de intoxicação em cães no país.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de intoxicação, associado à ingestão de petisco comercial com suspeita de contaminação por monoetilenoglicol, em um cão atendido em setembro de 2022 no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, sem raça definida, macho, 5 anos, apresentou anorexia, hipotermia, oligodipsia, apatia e desidratação, com histórico de consumo de petiscos da marca Petz Snack Cuidado Oral, produzido pela Bassar Pet Food. Após estabilização do animal, amostra de sangue foi coletada para realização de hemograma, provas bioquímicas de função renal e hepática, além de realização de ultrassonografia abdominal e pélvica. Após duas semanas de tratamento de suporte, o animal encontrava-se irresponsivo, sendo optado pela eutanásia. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>No hemograma, o animal apresentou anemia hemolítica não regenerativa, com presença de excêntricos. Nas provas bioquímicas, apresentou aumento de ureia (300 mg/dL) e creatinina (8,75 mg/dL) séricas, com ausência de alteração de bioquímica hepática. Na avaliação ultrassonográfica, foi observado aumento da ecogenicidade de região cortical renal, compatível com nefropatia e pielectasia. Na histopatologia renal, foram observados numerosos cristais arredondados, por vezes alongados, compatíveis com oxalato de cálcio monohidratados (a maioria contendo coloração acastanhada a esverdeada condizente com melanina) no lúmen dos túbulos renais, associados à degeneração e necrose do epitélio tubular e infiltrado linfoplasmocítico intersticial, multifocal, discreto. Cristais de morfologia similar foram também observados no parênquima cerebral, associado a edema moderado. Os sinais clínicos da intoxicação aguda por monoetilenoglicol incluem êmese, náusea, anorexia, diarreia e ulcerações gástricas, depressão, incoordenação, ataxia, convulsões e coma. Os animais intoxicados também apresentam sinais clínicos de insuficiência renal aguda, como oligúria e anúria, acompanhados por aumento acentuado de enzimas renais, com rápida evolução para óbito. No presente caso, o animal apresentou histórico e quadro clínico compatível com nefrotoxicidade aguda causada por monoetilenoglicol. Adicionalmente, apresentou perda da relação córtico-medular renal, na ultrassonografia, combinado à presença de corpúsculos de Heinz e excêntricos no hemograma, característicos de anemia hemolítica por agentes oxidantes. O exame histopatológico renal confirmou a suspeita de nefrotoxicidade, uma vez que identificou cristais característicos da intoxicação por monoetilenoglicol nos túbulos renais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Os achados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, combinados à avaliação histopatológica, foram utilizados para o estabelecimento do diagnóstico definitivo de nefrotoxicidade aguda, associada à ingestão do petisco comercial.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARDOSO, Joana Isabel Garcia et al. Estudo sobre intoxicações em animais de companhia no concelho de Loures. 2016. Dissertação de Mestrado. SANTOS, Aline et al. Cristalúria e anemia hemolítica por intoxicação simultânea por etilenoglicol e propilenoglicol em cão: relato de caso. Enciclopedia Biosfera, v. 10, n. 19, 2014. TALCOTT, Patricia A.; PETERSON, Michael E. Small animal toxicology. Elsevier Health Sciences, 2012. THOMPSON, M. E. et al. Characterization of melamine-containing and calcium oxalate crystals in three dogs with suspected pet food-induced nephrotoxicosis. Veterinary Pathology, v. 45, n. 3, p. 417-426, 2008.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14791	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3816885 - NATÁLIA PEREIRA LOPES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	NEFROTOXICIDADE EM CÃO APÓS INGESTÃO DE PETISCO COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR MONOETILENOGLICOL			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O etilenoglicol é um solvente orgânico com propriedade anticongelante que, ao ser ingerido, é absorvido no trato gastrointestinal e metabolizado em produtos tóxicos. Esse composto representa uma das principais causas de intoxicação em pequenos animais, com taxa de letalidade variando de 59% a 70%, entre cães e gatos. O agente químico é um líquido incolor, inodoro e de sabor adocicado, que pode aumentar a palatabilidade e contribuir com a ingestão acidental. No Brasil, no final de 2022, uma empresa produtora de propilenoglicol forneceu, de modo acidental, monoetilenoglicol para empresa produtora de petiscos para cães (Bassar Pet Food). A ingestão de petiscos provenientes de lotes contaminados com monoetilenoglicol resultou em, pelo menos, 40 casos letais de intoxicação em cães no país.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de intoxicação, associado à ingestão de petisco comercial com suspeita de contaminação por monoetilenoglicol, em um cão atendido em setembro de 2022 no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, sem raça definida, macho, 5 anos, apresentou anorexia, hipotermia, oligodipsia, apatia e desidratação, com histórico de consumo de petiscos da marca Petz Snack Cuidado Oral, produzido pela Bassar Pet Food. Após estabilização do animal, amostra de sangue foi coletada para realização de hemograma, provas bioquímicas de função renal e hepática, além de realização de ultrassonografia abdominal e pélvica. Após duas semanas de tratamento de suporte, o animal encontrava-se irresponsivo, sendo optado pela eutanásia. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>No hemograma, o animal apresentou anemia hemolítica não regenerativa, com presença de excêntricos. Nas provas bioquímicas, apresentou aumento de ureia (300 mg/dL) e creatinina (8,75 mg/dL) séricas, com ausência de alteração de bioquímica hepática. Na avaliação ultrassonográfica, foi observado aumento da ecogenicidade de região cortical renal, compatível com nefropatia e pielectasia. Na histopatologia renal, foram observados numerosos cristais arredondados, por vezes alongados, compatíveis com oxalato de cálcio monohidratados (a maioria contendo coloração acastanhada a esverdeada condizente com melanina) no lúmen dos túbulos renais, associados à degeneração e necrose do epitélio tubular e infiltrado linfoplasmocítico intersticial, multifocal, discreto. Cristais de morfologia similar foram também observados no parênquima cerebral, associado a edema moderado. Os sinais clínicos da intoxicação aguda por monoetilenoglicol incluem êmese, náusea, anorexia, diarreia e ulcerações gástricas, depressão, incoordenação, ataxia, convulsões e coma. Os animais intoxicados também apresentam sinais clínicos de insuficiência renal aguda, como oligúria e anúria, acompanhados por aumento acentuado de enzimas renais, com rápida evolução para óbito. No presente caso, o animal apresentou histórico e quadro clínico compatível com nefrotoxicidade aguda causada por monoetilenoglicol. Adicionalmente, apresentou perda da relação córtico-medular renal, na ultrassonografia, combinado à presença de corpúsculos de Heinz e excêntricos no hemograma, característicos de anemia hemolítica por agentes oxidantes. O exame histopatológico renal confirmou a suspeita de nefrotoxicidade, uma vez que identificou cristais característicos da intoxicação por monoetilenoglicol nos túbulos renais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Os achados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, combinados à avaliação histopatológica, foram utilizados para o estabelecimento do diagnóstico definitivo de nefrotoxicidade aguda, associada à ingestão do petisco comercial.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARDOSO, Joana Isabel Garcia et al. Estudo sobre intoxicações em animais de companhia no concelho de Loures. 2016. Dissertação de Mestrado. SANTOS, Aline et al. Cristalúria e anemia hemolítica por intoxicação simultânea por etilenoglicol e propilenoglicol em cão: relato de caso. Enciclopedia Biosfera, v. 10, n. 19, 2014. TALCOTT, Patricia A.; PETERSON, Michael E. Small animal toxicology. Elsevier Health Sciences, 2012. THOMPSON, M. E. et al. Characterization of melamine-containing and calcium oxalate crystals in three dogs with suspected pet food-induced nephrotoxicosis. Veterinary Pathology, v. 45, n. 3, p. 417-426, 2008.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14791	Anatomia Patologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alex Junior Souza de Souza		
<b>TITULO</b>	NEFROTOXICIDADE EM CÃO APÓS INGESTÃO DE PETISCO COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO POR MONOETILENOGLICOL			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O etilenoglicol é um solvente orgânico com propriedade anticongelante que, ao ser ingerido, é absorvido no trato gastrointestinal e metabolizado em produtos tóxicos. Esse composto representa uma das principais causas de intoxicação em pequenos animais, com taxa de letalidade variando de 59% a 70%, entre cães e gatos. O agente químico é um líquido incolor, inodoro e de sabor adocicado, que pode aumentar a palatabilidade e contribuir com a ingestão acidental. No Brasil, no final de 2022, uma empresa produtora de propilenoglicol forneceu, de modo acidental, monoetilenoglicol para empresa produtora de petiscos para cães (Bassar Pet Food). A ingestão de petiscos provenientes de lotes contaminados com monoetilenoglicol resultou em, pelo menos, 40 casos letais de intoxicação em cães no país.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de intoxicação, associado à ingestão de petisco comercial com suspeita de contaminação por monoetilenoglicol, em um cão atendido em setembro de 2022 no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um cão, sem raça definida, macho, 5 anos, apresentou anorexia, hipotermia, oligodipsia, apatia e desidratação, com histórico de consumo de petiscos da marca Petz Snack Cuidado Oral, produzido pela Bassar Pet Food. Após estabilização do animal, amostra de sangue foi coletada para realização de hemograma, provas bioquímicas de função renal e hepática, além de realização de ultrassonografia abdominal e pélvica. Após duas semanas de tratamento de suporte, o animal encontrava-se irresponsivo, sendo optado pela eutanásia. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico.			
<b>RESULTADO S</b>	<p>No hemograma, o animal apresentou anemia hemolítica não regenerativa, com presença de excêntricos. Nas provas bioquímicas, apresentou aumento de ureia (300 mg/dL) e creatinina (8,75 mg/dL) séricas, com ausência de alteração de bioquímica hepática. Na avaliação ultrassonográfica, foi observado aumento da ecogenicidade de região cortical renal, compatível com nefropatia e pielectasia. Na histopatologia renal, foram observados numerosos cristais arredondados, por vezes alongados, compatíveis com oxalato de cálcio monohidratados (a maioria contendo coloração acastanhada a esverdeada condizente com melanina) no lúmen dos túbulos renais, associados à degeneração e necrose do epitélio tubular e infiltrado linfoplasmocítico intersticial, multifocal, discreto. Cristais de morfologia similar foram também observados no parênquima cerebral, associado a edema moderado. Os sinais clínicos da intoxicação aguda por monoetilenoglicol incluem êmese, náusea, anorexia, diarreia e ulcerações gástricas, depressão, incoordenação, ataxia, convulsões e coma. Os animais intoxicados também apresentam sinais clínicos de insuficiência renal aguda, como oligúria e anúria, acompanhados por aumento acentuado de enzimas renais, com rápida evolução para óbito. No presente caso, o animal apresentou histórico e quadro clínico compatível com nefrotoxicidade aguda causada por monoetilenoglicol. Adicionalmente, apresentou perda da relação córtico-medular renal, na ultrassonografia, combinado à presença de corpúsculos de Heinz e excêntricos no hemograma, característicos de anemia hemolítica por agentes oxidantes. O exame histopatológico renal confirmou a suspeita de nefrotoxicidade, uma vez que identificou cristais característicos da intoxicação por monoetilenoglicol nos túbulos renais.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Os achados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, combinados à avaliação histopatológica, foram utilizados para o estabelecimento do diagnóstico definitivo de nefrotoxicidade aguda, associada à ingestão do petisco comercial.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARDOSO, Joana Isabel Garcia et al. Estudo sobre intoxicações em animais de companhia no concelho de Loures. 2016. Dissertação de Mestrado. SANTOS, Aline et al. Cristalúria e anemia hemolítica por intoxicação simultânea por etilenoglicol e propilenoglicol em cão: relato de caso. Enciclopedia Biosfera, v. 10, n. 19, 2014. TALCOTT, Patricia A.; PETERSON, Michael E. Small animal toxicology. Elsevier Health Sciences, 2012. THOMPSON, M. E. et al. Characterization of melamine-containing and calcium oxalate crystals in three dogs with suspected pet food-induced nephrotoxicosis. Veterinary Pathology, v. 45, n. 3, p. 417-426, 2008.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14792	Direito Processual Penal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5113580 - NINA PADULA SILVA BELUTTI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato Watanabe de Moraes		
<b>TITULO</b>	Descrição das técnicas de investigação utilizadas no "Caso Isabella Nardoni"			
<b>INTRODUCA O</b>	A investigação criminal é a atividade procedimental pré-processual, que se desenvolve ao longo de um inquérito policial, conduzida pelas autoridades públicas para coletar evidências e informações relacionadas a um possível crime, visando identificar os suspeitos, as circunstâncias do delito e as provas que podem ser usadas na acusação ou defesa. São realizadas diligências para esclarecer os fatos e coletar informações sobre um crime, a fim de contribuir para a resolução do caso. Isso inclui interrogatórios, perícias, busca e apreensão, exames médicos e solicitação de documentos a entidades públicas e privadas. O "caso Isabella Nardoni" foi um notório assassinato em 2008 em São Paulo, envolvendo seu pai e madrasta. A investigação desempenhou um papel crucial na resolução do crime, e esta pesquisa busca identificar e descrever as técnicas investigativas usadas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O trabalho tem como propósito principal fornecer uma compreensão detalhada das estratégias utilizadas durante a investigação, destacando as técnicas forenses empregadas na coleta e análise das evidências. Serão exploradas diferentes etapas do processo investigativo, desde a coleta inicial de informações até a reconstrução da cena do crime, passando pela análise de vestígios, entrevistas e interrogatórios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Esta pesquisa é de natureza descritiva e utiliza uma abordagem qualitativa para identificar e descrever as características de um determinado fenômeno. Ela emprega um estudo de caso, coletando dados de um evento real com o propósito de descrever as técnicas de investigação usadas para resolver o caso.			
<b>RESULTADO S</b>	O procedimento de análise de dados ocorrerá utilizando-se da análise de conteúdo de Bardin (2011), cuja se estrutura em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração do material, categorização ou codificação; 3) tratamento dos resultados, inferências e interpretação. Na pré-análise, primeira etapa da organização da análise de conteúdo, será sistematizada as ideias preliminares em quatro etapas: 1) leitura flutuante, 2) escolha dos documentos, 3) reformulações de objetivos e hipóteses e 4) formulação de indicadores, as quais darão fim a preparação do material como um todo. Em seguida será realizada a exploração do material, em que a repetição de termos é a estratégia adotada na codificação para criar as unidades de registro e, posteriormente, categorias de análise iniciais. Os resultados serão tratados com a finalidade de constituir e captar os conteúdos contido em todo o material coletados por meios dos instrumentos, utilizando-se da análise reflexiva e crítica.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A investigação criminal é essencial para a justiça e a segurança pública, visando identificar culpados e proteger inocentes. O estudo de casos reais proporciona uma experiência prática para aprender técnicas e procedimentos de investigação forense, abordando questões éticas e legais, como privacidade e manipulação de provas. O caso em questão teve um impacto significativo na sociedade brasileira e envolveu diversas técnicas forenses, como análise de DNA e reconstituição de cenas de crime. Analisar essas técnicas oferece uma visão ampla das ferramentas disponíveis na investigação forense e como podem ser aplicadas em diferentes situações.			
<b>REFERENCIAS</b>	BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004. PEREIRA, E. da S. Teoria da investigação criminal. São Paulo: Grupo Almedina, 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14793	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>

Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima

**TITULO** BLOQUEIO DO PLANO DO ERETOR DA ESPINHA PARA CONTROLE DE DOR TRANSCRIRGÍCA EM CÃO SUBMETIDO A HEMILAMINECTOMIA – RELATO DE CASO

**INTRODUCAO** Os bloqueios anestésicos tem como principal objetivo eliminar a sensação de dor de forma reversível em uma área determinada do corpo, havendo a diminuição do requerimento de outros fármacos, diminuindo o efeito depressor, trazendo maior estabilidade cardiovascular e analgesia. O bloqueio do plano eretor da espinha, consiste na infiltração de uma solução anestésica no plano interfacial localizado entre o complexo muscular eretor da espinha e dos processos transversos das vertebrae torácicas, atingindo os ramos dorsais e ventrais dos nervos espinhais em nível torácico e lombar, sendo desta forma uma técnica indicada para o procedimento de hemilaminectomia.

**OBJETIVOS** Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um paciente canino submetido a hemilaminectomia com a utilização da técnica de bloqueio do plano do eretor da espinha.

**METODOLOGIA** Foi encaminhado para hemilaminectomia um cão da raça Shih Tzu, 5 anos. Utilizado como medicação pré anestésica metadona 0,2mg/Kg e cetamina 0,8mg/Kg IM. Realizada a indução com propofol 3mg/Kg e midazolam 0,25mg/Kg IV, seguido da intubação orotraqueal e manutenção com isoflurano. Após adequação do plano anestésico, paciente foi colocado em decúbito esternal e realizado o bloqueio do plano eretor da espinha, com bupivacaína 2mg/Kg em um volume de 0,4mL/Kg por ponto, o bloqueio foi realizado em T11 e T12 de forma unilateral, guiado por ultrassom. Após o bloqueio o animal manteve todos os parâmetros dentro da normalidade, não sendo necessário o uso de opióides no transanestésico, realizado como pós-operatório dipirona 25mg/Kg e meloxicam 0,1mg/Kg, havendo uma recuperação anestésica rápida e sem a necessidade de resgate analgésico.

**RESULTADOS** Durante o procedimento a percepção dolorosa pode ser demonstrada através do incremento dos valores de frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA). Um paciente sem dor tem como predomínio o sistema nervoso parassimpático fazendo com que a FC e PA se mantenham em valores basais mais baixos, quando ocorre a percepção de dor o sistema nervoso simpático passa a ser dominante elevando os mesmos. No presente relato os valores de FC a partir do momento em que se iniciou a cirurgia variaram entre 70 e 100bpm, sendo que na maior parte do tempo a FC se manteve entre 70 e 80bpm. Com relação a pressão arterial média, está se manteve em 70mmHg em praticamente todo o transoperatório, com apenas 3 momentos nos quais a pressão ficou em 62mmHg, respondendo rapidamente a redução do anestésico inalatório.

**CONCLUSOES** É possível concluir que o bloqueio locoregional foi efetivo, uma vez que não houve indícios de estímulo nociceptivo durante todo o procedimento.

**REFERENCIAS** Zannin D, Isaka LJ, Pereira RH, Mencalha R. Opioid-free total intravenous anesthesia with bilateral ultrasound-guided erector spinae plane block for perioperative pain control in a dog undergoing dorsal hemilaminectomy. Vet Anaesth Analg. 2020 Guldem, et, al. Índice de analgesia/nocicepção para monitorização da analgesia perioperatória na cirurgia da coluna. vertebral. Revista Brasileira de Anestesiologia. Abril, 2017. Otero, P. (#38) Portela, D. Anestesia regional em animais de companhia. Argentina: Editora Inter-Médica. 2017. p. 241-247.

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14793	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4185668 - DAFNER ALVES DE ARAUJO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	BLOQUEIO DO PLANO DO ERETOR DA ESPINHA PARA CONTROLE DE DOR TRANSCRURGICA EM CÃO SUBMETIDO A HEMILAMINECTOMIA – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCAO</b>	Os bloqueios anestésicos tem como principal objetivo eliminar a sensação de dor de forma reversível em uma área determinada do corpo, havendo a diminuição do requerimento de outros fármacos, diminuindo o efeito depressor, trazendo maior estabilidade cardiovascular e analgesia. O bloqueio do plano eretor da espinha, consiste na infiltração de uma solução anestésica no plano interfacial localizado entre o complexo muscular eretor da espinha e dos processos transversos das vertebrae torácicas, atingindo os ramos dorsais e ventrais dos nervos espinhais em nível torácico e lombar, sendo desta forma uma técnica indicada para o procedimento de hemilaminectomia.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um paciente canino submetido a hemilaminectomia com a utilização da técnica de bloqueio do plano do eretor da espinha.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi encaminhado para hemilaminectomia um cão da raça Shih Tzu, 5 anos. Utilizado como medicação pré anestésica metadona 0,2mg/Kg e cetamina 0,8mg/Kg IM. Realizada a indução com propofol 3mg/Kg e midazolam 0,25mg/Kg IV, seguido da intubação orotraqueal e manutenção com isoflurano. Após adequação do plano anestésico, paciente foi colocado em decúbito esternal e realizado o bloqueio do plano eretor da espinha, com bupivacaína 2mg/Kg em um volume de 0,4mL/Kg por ponto, o bloqueio foi realizado em T11 e T12 de forma unilateral, guiado por ultrassom. Após o bloqueio o animal manteve todos os parâmetros dentro da normalidade, não sendo necessário o uso de opióides no transanestésico, realizado como pós-operatório dipirona 25mg/Kg e meloxicam 0,1mg/Kg, havendo uma recuperação anestésica rápida e sem a necessidade de resgate analgésico.			
<b>RESULTADOS</b>	Durante o procedimento a percepção dolorosa pode ser demonstrada através do incremento dos valores de frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA). Um paciente sem dor tem como predomínio o sistema nervoso parassimpático fazendo com que a FC e PA se mantenham em valores basais mais baixos, quando ocorre a percepção de dor o sistema nervoso simpático passa a ser dominante elevando os mesmos. No presente relato os valores de FC a partir do momento em que se iniciou a cirurgia variaram entre 70 e 100bpm, sendo que na maior parte do tempo a FC se manteve entre 70 e 80bpm. Com relação a pressão arterial média, está se manteve em 70mmHg em praticamente todo o transoperatório, com apenas 3 momentos nos quais a pressão ficou em 62mmHg, respondendo rapidamente a redução do anestésico inalatório.			
<b>CONCLUSOES</b>	É possível concluir que o bloqueio locorregional foi efetivo, uma vez que não houve indícios de estímulo nociceptivo durante todo o procedimento.			
<b>REFERENCIAS</b>	Zannin D, Isaka LJ, Pereira RH, Mencalha R. Opioid-free total intravenous anesthesia with bilateral ultrasound-guided erector spinae plane block for perioperative pain control in a dog undergoing dorsal hemilaminectomy. Vet Anaesth Analg. 2020 Guldem, et, al. Índice de analgesia/nocicepção para monitorização da analgesia perioperatória na cirurgia da coluna. vertebral. Revista Brasileira de Anestesiologia. Abril, 2017. Otero, P. (#38) Portela, D. Anestesia regional em animais de companhia. Argentina: Editora Inter-Médica. 2017. p. 241-247.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14794	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5252083 - FERNANDA COSTA DOURADO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	COMA HIPOGLICÊMICO NÃO DIABÉTICO: relato de caso			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O coma hipoglicêmico em pacientes não diabéticos pode ser gerado por vários fatores, dentre eles o insulínoma. Insulínoma é um tumor raro de células beta pancreáticas, que aumenta a produção de insulina, desencadeando em uma hiperativação das vias hipoglicemiantes. Ademais, ele é propulsor dos distúrbios funcionais pré-coma, uma vez que o insulínoma perpassa o funcionamento das ilhotas de Langerhans, devendo refletir também nos níveis de peptídeo C e cortisol. Neste estudo, será apresentado um relatório de caso de um paciente, diagnosticado com essa neoplasia a partir de um artigo científico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar as consequências causadas pela hipoglicemia em pacientes com insulínoma a partir da literatura científica.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica de artigos científicos e bibliografias que elucidavam acerca dos temas: insulínoma, hipoglicemia não diabética e coma hipoglicêmico. Desta forma, com a consolidação do referencial teórico foi possível a análise de um caso clínico, no qual o paciente em questão foi diagnosticado com insulínoma.			
<b>RESULTADOS</b>	Paciente de 70 anos, após o primeiro exame, apresentou glicemia de 40 mg/dl no glicosímetro e 30mg/dl na amostra sanguínea; nível plasmático de peptídeo C 11,25 ng/ml; nível plasmático de insulina 6,2 mU/ml. Portanto, é evidente que a análise glicêmica revela um índice muito abaixo do parâmetro normal, que é de 70 a 99 mg/dl, revelando assim um quadro hipoglicêmico, devido a correspondência a tríade de Whipple. Assim, foi necessário a realização de ultrassonografia do abdômen para identificar um possível insulínoma no pâncreas, o qual foi detectado ao realizar o exame. Desta forma, com o diagnóstico de insulínoma, o tratamento é essencialmente cirúrgico, porém foi recusado pelo paciente. Depois de duas semanas, o paciente foi hospitalizado novamente e descobriu-se que estava tendo um GCS de 3. Pulso de 130 batimentos por minuto, pressão arterial foi de 150/80 mmHg e taxa respiratória de 26/minuto. Além disso, sua glicemia era de 25mg/dL, apresentando sintomas neuroglicoplênicos. Devido a hipoglicemia, há ativação dos receptores glutamatérgicos, que levam a um edema celular e à disfunção neuronal. Por fim, eletroencefalograma isoeétrico esperado para um coma, caracterizando inatividade elétrica cerebral e ressonância magnética mostrou lesões em gânglio basal bilateral, realizou-se um diagnóstico de coma hipoglicêmico com pneumonia por aspiração. O paciente morreu no terceiro dia de admissão, devido a sepse e choque séptico decorrente da inflamação.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se que, o quadro de insulínoma pode se tornar grave devido ao efeito da baixa disposição de glicose na corrente sanguínea, que resulta em uma hipoglicemia grave, e consequentemente impacta o efetivo funcionamento dos sistemas, em primordial o nervoso. Em conclusão, é nítido que a negação da remoção cirúrgica do tumor e o descumprimento das orientações médicas foram fatores determinantes para o óbito, salientando a importância da conduta médica e o conhecimento sobre as doenças metabólicas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. ARRIGONI, Carolina; JUNIOR, Mauro; FONSECA, Claudio. Insulínoma: Revisão da Literatura. Revista EMESCAM de Estudos em Saúde, 2019. Disponível em: (#60)https://emescam.br/wp-content/uploads/2021/05/rees_004.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2023. 2. KUMAR, Prabhat; CHAUHAN, Ajay; DIXIT, Jui, Jyotsana; GUPTA, Harish. Insulínoma Causando Coma Hipoglicêmico Prolongado. Delhi, Índia: PubMed Central, 2016. Disponível em: (#60)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028456/#62. Acesso em: 27 set. 2023. 3. NELSON, David; COX, Michael. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª edição. São Paulo: Artmed, 2014. 4. RODRIGUES, Joana. Hipoglicemia – Da Bioquímica à Clínica. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. Disponível em: (#60)https://core.ac.uk/download/pdf/48580901.pdf(#62). Acesso em: 27 de set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14794	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5252105 - LETICIA BEZERRA SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	COMA HIPOGLICÊMICO NÃO DIABÉTICO: relato de caso			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O coma hipoglicêmico em pacientes não diabéticos pode ser gerado por vários fatores, dentre eles o insulinooma. Insulinooma é um tumor raro de células beta pancreáticas, que aumenta a produção de insulina, desencadeando em uma hiperativação das vias hipoglicemiantes. Ademais, ele é propulsor dos distúrbios funcionais pré-coma, uma vez que o insulinooma perpassa o funcionamento das ilhotas de Langerhans, devendo refletir também nos níveis de peptídeo C e cortisol. Neste estudo, será apresentado um relatório de caso de um paciente, diagnosticado com essa neoplasia a partir de um artigo científico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar as consequências causadas pela hipoglicemia em pacientes com insulinooma a partir da literatura científica.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica de artigos científicos e bibliografias que elucidavam acerca dos temas: insulinooma, hipoglicemia não diabética e coma hipoglicêmico. Desta forma, com a consolidação do referencial teórico foi possível a análise de um caso clínico, no qual o paciente em questão foi diagnosticado com insulinooma.			
<b>RESULTADOS</b>	Paciente de 70 anos, após o primeiro exame, apresentou glicemia de 40 mg/dl no glicosímetro e 30mg/dl na amostra sanguínea; nível plasmático de peptídeo C 11,25 ng/ml; nível plasmático de insulina 6,2 mU/ml. Portanto, é evidente que a análise glicêmica revela um índice muito abaixo do parâmetro normal, que é de 70 a 99 mg/dl, revelando assim um quadro hipoglicêmico, devido a correspondência a tríade de Whipple. Assim, foi necessário a realização de ultrassonografia do abdômen para identificar um possível insulinooma no pâncreas, o qual foi detectado ao realizar o exame. Desta forma, com o diagnóstico de insulinooma, o tratamento é essencialmente cirúrgico, porém foi recusado pelo paciente. Depois de duas semanas, o paciente foi hospitalizado novamente e descobriu-se que estava tendo um GCS de 3. Pulso de 130 batimentos por minuto, pressão arterial foi de 150/80 mmHg e taxa respiratória de 26/minuto. Além disso, sua glicemia era de 25mg/dL, apresentando sintomas neuroglicoplênicos. Devido a hipoglicemia, há ativação dos receptores glutamatérgicos, que levam a um edema celular e à disfunção neuronal. Por fim, eletroencefalograma isoeétrico esperado para um coma, caracterizando inatividade elétrica cerebral e ressonância magnética mostrou lesões em gânglio basal bilateral, realizou-se um diagnóstico de coma hipoglicêmico com pneumonia por aspiração. O paciente morreu no terceiro dia de admissão, devido a sepse e choque séptico decorrente da inflamação.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se que, o quadro de insulinooma pode se tornar grave devido ao efeito da baixa disposição de glicose na corrente sanguínea, que resulta em uma hipoglicemia grave, e consequentemente impacta o efetivo funcionamento dos sistemas, em primordial o nervoso. Em conclusão, é nítido que a negação da remoção cirúrgica do tumor e o descumprimento das orientações médicas foram fatores determinantes para o óbito, salientando a importância da conduta médica e o conhecimento sobre as doenças metabólicas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. ARRIGONI, Carolina; JUNIOR, Mauro; FONSECA, Claudio. Insulinooma: Revisão da Literatura. Revista EMESCAM de Estudos em Saúde, 2019. Disponível em: (#60)https://emescam.br/wp-content/uploads/2021/05/rees_004.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2023. 2. KUMAR, Prabhat; CHAUHAN, Ajay; DIXIT, Jui, Jyotsana; GUPTA, Harish. Insulinooma Causando Coma Hipoglicêmico Prolongado. Delhi, India: PubMed Central, 2016. Disponível em: (#60)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028456/#62. Acesso em: 27 set. 2023. 3. NELSON, David; COX, Michael. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª edição. São Paulo: Artmed, 2014. 4. RODRIGUES, Joana. Hipoglicemia – Da Bioquímica à Clínica. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. Disponível em: (#60)https://core.ac.uk/download/pdf/48580901.pdf(#62). Acesso em: 27 de set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14794	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5252113 - LARA RAYSSA PASSOS RODRIGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	COMA HIPOGLICÊMICO NÃO DIABÉTICO: relato de caso			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O coma hipoglicêmico em pacientes não diabéticos pode ser gerado por vários fatores, dentre eles o insulinooma. Insulinooma é um tumor raro de células beta pancreáticas, que aumenta a produção de insulina, desencadeando em uma hiperativação das vias hipoglicemiantes. Ademais, ele é propulsor dos distúrbios funcionais pré-coma, uma vez que o insulinooma perpassa o funcionamento das ilhotas de Langerhans, devendo refletir também nos níveis de peptídeo C e cortisol. Neste estudo, será apresentado um relatório de caso de um paciente, diagnosticado com essa neoplasia a partir de um artigo científico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar as consequências causadas pela hipoglicemia em pacientes com insulinooma a partir da literatura científica.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica de artigos científicos e bibliografias que elucidavam acerca dos temas: insulinooma, hipoglicemia não diabética e coma hipoglicêmico. Desta forma, com a consolidação do referencial teórico foi possível a análise de um caso clínico, no qual o paciente em questão foi diagnosticado com insulinooma.			
<b>RESULTADOS</b>	Paciente de 70 anos, após o primeiro exame, apresentou glicemia de 40 mg/dl no glicosímetro e 30mg/dl na amostra sanguínea; nível plasmático de peptídeo C 11,25 ng/ml; nível plasmático de insulina 6,2 mU/ml. Portanto, é evidente que a análise glicêmica revela um índice muito abaixo do parâmetro normal, que é de 70 a 99 mg/dl, revelando assim um quadro hipoglicêmico, devido a correspondência a tríade de Whipple. Assim, foi necessário a realização de ultrassonografia do abdômen para identificar um possível insulinooma no pâncreas, o qual foi detectado ao realizar o exame. Desta forma, com o diagnóstico de insulinooma, o tratamento é essencialmente cirúrgico, porém foi recusado pelo paciente. Depois de duas semanas, o paciente foi hospitalizado novamente e descobriu-se que estava tendo um GCS de 3. Pulso de 130 batimentos por minuto, pressão arterial foi de 150/80 mmHg e taxa respiratória de 26/minuto. Além disso, sua glicemia era de 25mg/dL, apresentando sintomas neuroglicoplênicos. Devido a hipoglicemia, há ativação dos receptores glutamatérgicos, que levam a um edema celular e à disfunção neuronal. Por fim, eletroencefalograma isoeétrico esperado para um coma, caracterizando inatividade elétrica cerebral e ressonância magnética mostrou lesões em gânglio basal bilateral, realizou-se um diagnóstico de coma hipoglicêmico com pneumonia por aspiração. O paciente morreu no terceiro dia de admissão, devido a sepse e choque séptico decorrente da inflamação.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se que, o quadro de insulinooma pode se tornar grave devido ao efeito da baixa disposição de glicose na corrente sanguínea, que resulta em uma hipoglicemia grave, e consequentemente impacta o efetivo funcionamento dos sistemas, em primordial o nervoso. Em conclusão, é nítido que a negação da remoção cirúrgica do tumor e o descumprimento das orientações médicas foram fatores determinantes para o óbito, salientando a importância da conduta médica e o conhecimento sobre as doenças metabólicas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. ARRIGONI, Carolina; JUNIOR, Mauro; FONSECA, Claudio. Insulinooma: Revisão da Literatura. Revista EMESCAM de Estudos em Saúde, 2019. Disponível em: (#60)https://emescam.br/wp-content/uploads/2021/05/rees_004.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2023. 2. KUMAR, Prabhat; CHAUHAN, Ajay; DIXIT, Jui, Jyotsana; GUPTA, Harish. Insulinooma Causando Coma Hipoglicêmico Prolongado. Delhi, India: PubMed Central, 2016. Disponível em: (#60)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028456/#62. Acesso em: 27 set. 2023. 3. NELSON, David; COX, Michael. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª edição. São Paulo: Artmed, 2014. 4. RODRIGUES, Joana. Hipoglicemia – Da Bioquímica à Clínica. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. Disponível em: (#60)https://core.ac.uk/download/pdf/48580901.pdf(#62). Acesso em: 27 de set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14794	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5266220 - VICTÓRIA ARAUJO MOURÃO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	COMA HIPOGLICÊMICO NÃO DIABÉTICO: relato de caso			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O coma hipoglicêmico em pacientes não diabéticos pode ser gerado por vários fatores, dentre eles o insulínoma. Insulínoma é um tumor raro de células beta pancreáticas, que aumenta a produção de insulina, desencadeando em uma hiperativação das vias hipoglicemiantes. Ademais, ele é propulsor dos distúrbios funcionais pré-coma, uma vez que o insulínoma perpassa o funcionamento das ilhotas de Langerhans, devendo refletir também nos níveis de peptídeo C e cortisol. Neste estudo, será apresentado um relatório de caso de um paciente, diagnosticado com essa neoplasia a partir de um artigo científico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar as consequências causadas pela hipoglicemia em pacientes com insulínoma a partir da literatura científica.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica de artigos científicos e bibliografias que elucidavam acerca dos temas: insulínoma, hipoglicemia não diabética e coma hipoglicêmico. Desta forma, com a consolidação do referencial teórico foi possível a análise de um caso clínico, no qual o paciente em questão foi diagnosticado com insulínoma.			
<b>RESULTADOS</b>	Paciente de 70 anos, após o primeiro exame, apresentou glicemia de 40 mg/dl no glicosímetro e 30mg/dl na amostra sanguínea; nível plasmático de peptídeo C 11,25 ng/ml; nível plasmático de insulina 6,2 mU/ml. Portanto, é evidente que a análise glicêmica revela um índice muito abaixo do parâmetro normal, que é de 70 a 99 mg/dl, revelando assim um quadro hipoglicêmico, devido a correspondência a tríade de Whipple. Assim, foi necessário a realização de ultrassonografia do abdômen para identificar um possível insulínoma no pâncreas, o qual foi detectado ao realizar o exame. Desta forma, com o diagnóstico de insulínoma, o tratamento é essencialmente cirúrgico, porém foi recusado pelo paciente. Depois de duas semanas, o paciente foi hospitalizado novamente e descobriu-se que estava tendo um GCS de 3. Pulso de 130 batimentos por minuto, pressão arterial foi de 150/80 mmHg e taxa respiratória de 26/minuto. Além disso, sua glicemia era de 25mg/dL, apresentando sintomas neuroglicoplênicos. Devido a hipoglicemia, há ativação dos receptores glutamatérgicos, que levam a um edema celular e à disfunção neuronal. Por fim, eletroencefalograma isoeétrico esperado para um coma, caracterizando inatividade elétrica cerebral e ressonância magnética mostrou lesões em gânglio basal bilateral, realizou-se um diagnóstico de coma hipoglicêmico com pneumonia por aspiração. O paciente morreu no terceiro dia de admissão, devido a sepse e choque séptico decorrente da inflamação.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se que, o quadro de insulínoma pode se tornar grave devido ao efeito da baixa disposição de glicose na corrente sanguínea, que resulta em uma hipoglicemia grave, e consequentemente impacta o efetivo funcionamento dos sistemas, em primordial o nervoso. Em conclusão, é nítido que a negação da remoção cirúrgica do tumor e o descumprimento das orientações médicas foram fatores determinantes para o óbito, salientando a importância da conduta médica e o conhecimento sobre as doenças metabólicas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. ARRIGONI, Carolina; JUNIOR, Mauro; FONSECA, Claudio. Insulínoma: Revisão da Literatura. Revista EMESCAM de Estudos em Saúde, 2019. Disponível em: (#60)https://emescam.br/wp-content/uploads/2021/05/rees_004.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2023. 2. KUMAR, Prabhat; CHAUHAN, Ajay; DIXIT, Jui, Jyotsana; GUPTA, Harish. Insulínoma Causando Coma Hipoglicêmico Prolongado. Delhi, Índia: PubMed Central, 2016. Disponível em: (#60)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028456/#62. Acesso em: 27 set. 2023. 3. NELSON, David; COX, Michael. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª edição. São Paulo: Artmed, 2014. 4. RODRIGUES, Joana. Hipoglicemia – Da Bioquímica à Clínica. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. Disponível em: (#60)https://core.ac.uk/download/pdf/48580901.pdf(#62). Acesso em: 27 de set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14794	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5266246 - DARA GABRIELA MACÉDO SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Maysa Mariana Cruz		
<b>TITULO</b>	COMA HIPOGLICÊMICO NÃO DIABÉTICO: relato de caso			
<b>INTRODUCA O</b>	O coma hipoglicêmico em pacientes não diabéticos pode ser gerado por vários fatores, dentre eles o insulínoma. Insulínoma é um tumor raro de células beta pancreáticas, que aumenta a produção de insulina, desencadeando em uma hiperativação das vias hipoglicemiantes. Ademais, ele é propulsor dos distúrbios funcionais pré-coma, uma vez que o insulínoma perpassa o funcionamento das ilhotas de Langerhans, devendo refletir também nos níveis de peptídeo C e cortisol. Neste estudo, será apresentado um relatório de caso de um paciente, diagnosticado com essa neoplasia a partir de um artigo científico.			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar as consequências causadas pela hipoglicemia em pacientes com insulínoma a partir da literatura científica.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica de artigos científicos e bibliografias que elucidavam acerca dos temas: insulínoma, hipoglicemia não diabética e coma hipoglicêmico. Desta forma, com a consolidação do referencial teórico foi possível a análise de um caso clínico, no qual o paciente em questão foi diagnosticado com insulínoma.			
<b>RESULTADO S</b>	Paciente de 70 anos, após o primeiro exame, apresentou glicemia de 40 mg/dl no glicosímetro e 30mg/dl na amostra sanguínea; nível plasmático de peptídeo C 11,25 ng/ml; nível plasmático de insulina 6,2 mU/ml. Portanto, é evidente que a análise glicêmica revela um índice muito abaixo do parâmetro normal, que é de 70 a 99 mg/dl, revelando assim um quadro hipoglicêmico, devido a correspondência a tríade de Whipple. Assim, foi necessário a realização de ultrassonografia do abdômen para identificar um possível insulínoma no pâncreas, o qual foi detectado ao realizar o exame. Desta forma, com o diagnóstico de insulínoma, o tratamento é essencialmente cirúrgico, porém foi recusado pelo paciente. Depois de duas semanas, o paciente foi hospitalizado novamente e descobriu-se que estava tendo um GCS de 3. Pulso de 130 batimentos por minuto, pressão arterial foi de 150/80 mmHg e taxa respiratória de 26/minuto. Além disso, sua glicemia era de 25mg/dL, apresentando sintomas neuroglicoplênicos. Devido a hipoglicemia, há ativação dos receptores glutamatérgicos, que levam a um edema celular e à disfunção neuronal. Por fim, eletroencefalograma isoeétrico esperado para um coma, caracterizando inatividade elétrica cerebral e ressonância magnética mostrou lesões em gânglio basal bilateral, realizou-se um diagnóstico de coma hipoglicêmico com pneumonia por aspiração. O paciente morreu no terceiro dia de admissão, devido a sepse e choque séptico decorrente da inflamação.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Conclui-se que, o quadro de insulínoma pode se tornar grave devido ao efeito da baixa disposição de glicose na corrente sanguínea, que resulta em uma hipoglicemia grave, e consequentemente impacta o efetivo funcionamento dos sistemas, em primordial o nervoso. Em conclusão, é nítido que a negação da remoção cirúrgica do tumor e o descumprimento das orientações médicas foram fatores determinantes para o óbito, salientando a importância da conduta médica e o conhecimento sobre as doenças metabólicas.			
<b>REFERENCIA S</b>	1. ARRIGONI, Carolina; JUNIOR, Mauro; FONSECA, Claudio. Insulínoma: Revisão da Literatura. Revista EMESCAM de Estudos em Saúde, 2019. Disponível em: (#60)https://emescam.br/wp-content/uploads/2021/05/rees_004.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2023. 2. KUMAR, Prabhat; CHAUHAN, Ajay; DIXIT, Juhi, Jyotsana; GUPTA, Harish. Insulínoma Causando Coma Hipoglicêmico Prolongado. Delhi, India: PubMed Central, 2016. Disponível em: (#60)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028456/#62. Acesso em: 27 set. 2023. 3. NELSON, David; COX, Michael. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª edição. São Paulo: Artmed, 2014. 4. RODRIGUES, Joana. Hipoglicemia – Da Bioquímica à Clínica. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2014. Disponível em: (#60)https://core.ac.uk/download/pdf/48580901.pdf(#62). Acesso em: 27 de set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14797	Clinica Cirúrgica Animal	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5075742 - STEFHANI CRISTINA CHAN JACIK		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Leandro Sanchez Gomes	
<b>TITULO</b>	Laceração palpebral e phthisis bulbis em coelho-doméstico ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A busca por pets não convencionais e as oportunidades de especialização nessa área surgem constantemente na veterinária. Afecções oculares podem servir de alerta no diagnóstico de afecções sistêmicas. A catarata é uma afecção oftálmica que ocorre espontaneamente apenas em coelhos brancos da Nova Zelândia. Acreditava-se que a doença ocorria secundariamente a um quadro de uveíte, principalmente quando provocada pelo <i>Encephalitozoon cuniculi</i>. O tratamento preferido para catarata é facoemulsificação, associado a anti-parasiticidas para combate do <i>E. cuniculi</i>. A uveíte é uma inflamação da úvea, e sua evolução final pode desencadear Phthisis bulbis, onde o olho apresenta atrofia, encolhimento, desorganização ocular e do conteúdo intraocular. Em pequenos animais lacerações palpebrais são normalmente decorrentes de trauma, e o tratamento envolve uso de antimicrobianos tópicos e sistêmicos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever um caso clínico em coelho com alterações oftalmológicas.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Um coelho, fêmea, sete anos, apresentava secreção ocular purulenta em olho direito há um dia e histórico de uveíte em olho esquerdo há três anos. A paciente apresentava histórico de otite em ouvido e era mantida com dois contactantes felinos. No exame oftalmológico, o olho direito apresentava laceração na terceira pálpebra, secreção purulenta e opacidade de córnea. O olho esquerdo apresentava diminuição de volume e tensão, protrusão de terceira pálpebra e opacidade lenticular, ambos os olhos foram negativos para o teste com fluoresceína. Institui-se tratamento tópico com tobramicina no olho direito QID, e hialuronato de sódio TID, e enrofloxacin 10mg/kg BID via oral. Após uma semana o olho direito apresentava melhora em relação a secreção, e realizou-se desbridamento da borda da terceira pálpebra, com anestesia tópica com colírio de proximetaína. Após duas semanas paciente apresentou melhora do aspecto do olho direito, com resolução total do quadro.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A laceração palpebral pode ter ocorrido secundariamente a um trauma, autoinduzido, devido ao histórico de otite, ou secundário à arranhadura dos contactantes. O uso de antibióticos sistêmico e tópico, e desbridamento da lesão, foram eficientes para resolução do quadro. E a catarata, com consequente uveíte no olho esquerdo, pode ser consequência de uma infecção por <i>Encephalitozoon cuniculi</i>. No caso clínico, paciente não aparentava dor em olho esquerdo e é difícil determinar se a visão era presente, já que coelhos não respondem adequadamente ao reflexo de ameaça. O tratamento anterior para a uveíte pode não ter sido eficaz resultando na Phthisis bulbis.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Em coelhos deve-se considerar a infecção por <i>E. cuniculi</i>, como principal diagnóstico diferencial causador de catarata. Casos de laceração palpebral de origem traumática podem receber associação de antibioticoterapia sistêmica e tópica para controle infeccioso, e a escolha da técnica de desbridamento é fundamental para a resolução correta.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Afonso ISD. Emergências oculares em pequenos animais estudo retrospectivo de 72 casos. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2017. Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. 2. Maini S, Hartley C. Guide to ophthalmology in rabbits. Practice. 2019; 41 (7): 310-320. 3. Tripathy K, Chawla R, Temkar S, Sagar P, Kashyap S, Pushker N, Sharma YR. Phthisis bulbi - a clinicopathological perspective. Semin Ophthalmol. 2018; 33 (6): 788-803.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14799	Farmácia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3394646 - JANAINA SANTANA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO-DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da beta-hematina como nanocarreadora das drogas miltefosina e paromomicina na leishmaniose visceral experimental			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada e pode ser letal se não diagnosticada e tratada corretamente. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães. Em 2016, foi liberado um medicamento à base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães tratados ainda continuam infectivos. Neste contexto, foi idealizado o projeto com a utilização da beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) com inclusão ou incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Resultados obtidos in vitro mostraram que a beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) pré-sintetizada revestida com 1 – 16 µg/ml de miltefosina, bem como a sHZ incorporada com paromomicina reduziram a carga parasitária de macrófagos infectados com a L. infantum. Sugerindo que o anidrido de hematina pode ser utilizado como um nanocarreador de drogas in vitro. Sabe-se que a sHZ, quando injetado intraperitonealmente em camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar em modelo experimental de leishmaniose visceral os compostos de sHZ efetivos nos experimentos in vitro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os animais receberam intraperitonealmente 500 µl de salina tamponada (PBS), com 800 µg de HZ (80 µl do estoque 10 mg/ml), ou HZ revestida com miltefosina (proporcional a 80 µl de 16µg/ml), ou HZ incorporada com paramomicina (150 mg de hemina com 100 mg de paramomicina), miltefosina (40 mg/kg) ou paramomicina (112 mg/kg). O tratamento foi realizado a cada 2 dois dias totalizando 5 doses. Após 7 dias os animais foram eutanasiados, os órgãos e sangue coletados, para a determinação da carga parasitária (diluição limitante) e a função hepática (por kits comerciais), respectivamente.			
<b>RESULTADOS</b>	A carga parasitária foi significativamente reduzida com o tratamento com sHZ e a adição de drogas não melhorou o efeito de redução da carga parasitária. Foi possível detectar sHZ com ou sem adição de drogas principalmente no fígado e em menor quantidade no baço. Em relação a função hepática, os compostos de sHZ não alteraram as enzimas transaminase glutâmico-pirúvica, transaminase glutâmico-oxalacética e creatinina. No entanto, a creatinina estava alterada em 33% dos camundongos que receberam miltefosina intraperitoneal, estes animais apresentaram perda de peso e aparentemente o fígado tinha um tamanho menor			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, a sHZ introduzida intraperitonealmente, por si, já diminuiu a carga parasitária in vivo e a adição das drogas no composto diminuiu a eficácia da sHZ.			
<b>REFERENCIAS</b>	Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021; OPAS-OMS. Leishmaniose: Informe Epidemiológico das Américas. 2020. Lee MS, Igari Y, Tsukui T, Ishii KJ, Coban C. Current status of synthetic hemozoin adjuvant: A preliminary safety evaluation. Vaccine. 2016;34(18):2055-61			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14799	Farmácia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441770 - REBECA SANTANA SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO-DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da beta-hematina como nanocarreadora das drogas miltefosina e paromomicina na leishmaniose visceral experimental			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada e pode ser letal se não diagnosticada e tratada corretamente. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães. Em 2016, foi liberado um medicamento à base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães tratados ainda continuam infectivos. Neste contexto, foi idealizado o projeto com a utilização da beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) com inclusão ou incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Resultados obtidos in vitro mostraram que a beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) pré-sintetizada revestida com 1 – 16 µg/ml de miltefosina, bem como a sHZ incorporada com paromomicina reduziram a carga parasitária de macrófagos infectados com a L. infantum. Sugerindo que o anidrido de hematina pode ser utilizado como um nanocarreador de drogas in vitro. Sabe-se que a sHZ, quando injetado intraperitonealmente em camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar em modelo experimental de leishmaniose visceral os compostos de sHZ efetivos nos experimentos in vitro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os animais receberam intraperitonealmente 500 µl de salina tamponada (PBS), com 800 µg de HZ (80 µl do estoque 10 mg/ml), ou HZ revestida com miltefosina (proporcional a 80 µl de 16µg/ml), ou HZ incorporada com paramomicina (150 mg de hemina com 100 mg de paramomicina), miltefosina (40 mg/kg) ou paramomicina (112 mg/kg). O tratamento foi realizado a cada 2 dois dias totalizando 5 doses. Após 7 dias os animais foram eutanasiados, os órgãos e sangue coletados, para a determinação da carga parasitária (diluição limitante) e a função hepática (por kits comerciais), respectivamente.			
<b>RESULTADOS</b>	A carga parasitária foi significativamente reduzida com o tratamento com sHZ e a adição de drogas não melhorou o efeito de redução da carga parasitária. Foi possível detectar sHZ com ou sem adição de drogas principalmente no fígado e em menor quantidade no baço. Em relação a função hepática, os compostos de sHZ não alteraram as enzimas transaminase glutâmico-pirúvica, transaminase glutâmico-oxalacética e creatinina. No entanto, a creatinina estava alterada em 33% dos camundongos que receberam miltefosina intraperitoneal, estes animais apresentaram perda de peso e aparentemente o fígado tinha um tamanho menor			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, a sHZ introduzida intraperitonealmente, por si, já diminuiu a carga parasitária in vivo e a adição das drogas no composto diminuiu a eficácia da sHZ.			
<b>REFERENCIAS</b>	Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021; OPAS-OMS. Leishmaniose: Informe Epidemiológico das Américas. 2020. Lee MS, Igari Y, Tsukui T, Ishii KJ, Coban C. Current status of synthetic hemozoin adjuvant: A preliminary safety evaluation. Vaccine. 2016;34(18):2055-61			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14799	Farmácia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4847393 - RENAN SANTOS BARBOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		FÁTIMA RIBEIRO-DIAS
<b>TITULO</b>	Avaliação da beta-hematina como nanocarreadora das drogas miltefosina e paromomicina na leishmaniose visceral experimental			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada e pode ser letal se não diagnosticada e tratada corretamente. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães. Em 2016, foi liberado um medicamento à base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães tratados ainda continuam infectivos. Neste contexto, foi idealizado o projeto com a utilização da beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) com inclusão ou incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Resultados obtidos in vitro mostraram que a beta-hematina ou hemozoina sintética (sHZ) pré-sintetizada revestida com 1 – 16 µg/ml de miltefosina, bem como a sHZ incorporada com paromomicina reduziram a carga parasitária de macrófagos infectados com a L. infantum. Sugerindo que o anidrido de hematina pode ser utilizado como um nanocarreador de drogas in vitro. Sabe-se que a sHZ, quando injetado intraperitonealmente em camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar em modelo experimental de leishmaniose visceral os compostos de sHZ efetivos nos experimentos in vitro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os animais receberam intraperitonealmente 500 µl de salina tamponada (PBS), com 800 µg de HZ (80 µl do estoque 10 mg/ml), ou HZ revestida com miltefosina (proporcional a 80 µl de 16µg/ml), ou HZ incorporada com paramomicina (150 mg de hemina com 100 mg de paramomicina), miltefosina (40 mg/kg) ou paramomicina (112 mg/kg). O tratamento foi realizado a cada 2 dois dias totalizando 5 doses. Após 7 dias os animais foram eutanasiados, os órgãos e sangue coletados, para a determinação da carga parasitária (diluição limitante) e a função hepática (por kits comerciais), respectivamente.			
<b>RESULTADOS</b>	A carga parasitária foi significativamente reduzida com o tratamento com sHZ e a adição de drogas não melhorou o efeito de redução da carga parasitária. Foi possível detectar sHZ com ou sem adição de drogas principalmente no fígado e em menor quantidade no baço. Em relação a função hepática, os compostos de sHZ não alteraram as enzimas transaminase glutâmico-pirúvica, transaminase glutâmico-oxalacética e creatinina. No entanto, a creatinina estava alterada em 33% dos camundongos que receberam miltefosina intraperitoneal, estes animais apresentaram perda de peso e aparentemente o fígado tinha um tamanho menor			
<b>CONCLUSOES</b>	Assim, a sHZ introduzida intraperitonealmente, por si, já diminuiu a carga parasitária in vivo e a adição das drogas no composto diminuiu a eficácia da sHZ.			
<b>REFERENCIAS</b>	Brasil. Epidemiological Report – Neglected tropical diseases 2021; OPAS-OMS. Leishmaniose: Informe Epidemiológico das Américas. 2020. Lee MS, Igari Y, Tsukui T, Ishii KJ, Coban C. Current status of synthetic hemozoin adjuvant: A preliminary safety evaluation. Vaccine. 2016;34(18):2055-61			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14800	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4312040 - BEATRIZ YOSHIOKA MISIKAMII		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Celia Aparecida Marques Pimenta		1 - Poster
<b>TITULO</b>	OS EFEITOS DA MICROBIOTA NA DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A depressão é um problema de saúde pública que traz graves prejuízos para a sociedade e para o indivíduo. O que se sabe hoje é que se trata de um transtorno de origem multifatorial – porém ainda há uma lacuna no conhecimento, precisamente no que tange os mecanismos que promovem e permitem a depressão vicejar, e que expliquem de modo satisfatório o que ocorre dentro do organismo. Uma hipótese que tem ganhado bastante força é a do papel do intestino no contexto de saúde mental.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente trabalho tenciona analisar as evidências mais recentes quanto ao envolvimento da microbiota no desenvolvimento e manutenção do transtorno depressivo			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão literária realizada com artigos do Pubmed, utilizando de descritores específicos de modo a filtrar os artigos, obtendo resultados entre 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A relação entre intestino e cérebro é capaz de modular funções cerebrais, por exemplo o comportamento emocional. Isso ocorre porque uma disfunção na microbiota causa o aumento da permeabilidade intestinal, tornando a liberação de substâncias como citocinas e LPS mais fácil, o que desempenha papel fundamental na constituição da inflamação da depressão, ou seja, uma microbiota não saudável libera toxinas que chegam ao cérebro. O estresse também pode contribuir para a alteração da microbiota e a comunicação entre o intestino e o cérebro ocorre pelo nervo vago. Foi constatado que são necessários mais estudos para comprovar a melhora dos distúrbios psiquiátricos com os probióticos, porém se espera grandes avanços. Há algumas famílias de bactérias que apresentaram uma melhora maior para a depressão como a Prevotellaceae, genus Corprococcus e Faecalibacterium. Um dos fatores que limita a eficácia dos probióticos na depressão é o número de cepas. Múltiplas cepas são mais efetivas e uma microbiota já danificada também prejudica a ação. Alguns estudos mostram que o ideal seria renovar a microbiota com um transplante fecal. Além disso, outros possíveis fatores de maior efetividade do efeito dos probióticos é a dosagem e o tempo de duração. Outros artigos concluíram que os probióticos são benéficos nos sintomas da depressão, pois diminuem citocinas. Os estudos também avaliaram a influência da qualidade da alimentação na microbiota e os resultados foram positivo para a relação direta entre esses dois tópicos. Assim, intervenções alimentares se mostraram um potencial estratégico para melhorar os sintomas depressivos. A alimentação também se mostrou benéfica em conjunto com os probióticos			
<b>CONCLUSOES</b>	Há forte correlação entre a microbiota e o transtorno depressivo, de toda forma, faz-se necessário que mais estudos sejam realizados.			
<b>REFERENCIAS</b>	FORTH, Evan et al. Effect of fecal microbiota transplant on symptoms of psychiatric disorders: a systematic review. BMC Psychiatry. Volume 20, Artigo 299. 2020. NASERIBAFROUEI, A. et al. Correlation between the human fecal microbiota and depression. Neurogastroenterology and motility: the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, v. 26, n. 8, p. 1155–1162, 2014. LIANG, S. et al. Recognizing depression from the Microbiota-gut-brain axis. International journal of molecular sciences, v. 19, n. 6, p. 1592, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14800	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4312058 - LAURA TAMIE SILVA ETO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Celia Aparecida Marques Pimenta		
				<b>Apresentação</b>
				1 - Poster
<b>TITULO</b>	OS EFEITOS DA MICROBIOTA NA DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A depressão é um problema de saúde pública que traz graves prejuízos para a sociedade e para o indivíduo. O que se sabe hoje é que se trata de um transtorno de origem multifatorial – porém ainda há uma lacuna no conhecimento, precisamente no que tange os mecanismos que promovem e permitem a depressão vicejar, e que expliquem de modo satisfatório o que ocorre dentro do organismo. Uma hipótese que tem ganhado bastante força é a do papel do intestino no contexto de saúde mental.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente trabalho tenciona analisar as evidências mais recentes quanto ao envolvimento da microbiota no desenvolvimento e manutenção do transtorno depressivo			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão literária realizada com artigos do Pubmed, utilizando de descritores específicos de modo a filtrar os artigos, obtendo resultados entre 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A relação entre intestino e cérebro é capaz de modular funções cerebrais, por exemplo o comportamento emocional. Isso ocorre porque uma disfunção na microbiota causa o aumento da permeabilidade intestinal, tornando a liberação de substâncias como citocinas e LPS mais fácil, o que desempenha papel fundamental na constituição da inflamação da depressão, ou seja, uma microbiota não saudável libera toxinas que chegam ao cérebro. O estresse também pode contribuir para a alteração da microbiota e a comunicação entre o intestino e o cérebro ocorre pelo nervo vago. Foi constatado que são necessários mais estudos para comprovar a melhora dos distúrbios psiquiátricos com os probióticos, porém se espera grandes avanços. Há algumas famílias de bactérias que apresentaram uma melhora maior para a depressão como a Prevotellaceae, genus Corprococcus e Faecalibacterium. Um dos fatores que limita a eficácia dos probióticos na depressão é o número de cepas. Múltiplas cepas são mais efetivas e uma microbiota já danificada também prejudica a ação. Alguns estudos mostram que o ideal seria renovar a microbiota com um transplante fecal. Além disso, outros possíveis fatores de maior efetividade do efeito dos probióticos é a dosagem e o tempo de duração. Outros artigos concluíram que os probióticos são benéficos nos sintomas da depressão, pois diminuem citocinas. Os estudos também avaliaram a influência da qualidade da alimentação na microbiota e os resultados foram positivo para a relação direta entre esses dois tópicos. Assim, intervenções alimentares se mostraram um potencial estratégico para melhorar os sintomas depressivos. A alimentação também se mostrou benéfica em conjunto com os probióticos			
<b>CONCLUSOES</b>	Há forte correlação entre a microbiota e o transtorno depressivo, de toda forma, faz-se necessário que mais estudos sejam realizados.			
<b>REFERENCIAS</b>	FORTH, Evan et al. Effect of fecal microbiota transplant on symptoms of psychiatric disorders: a systematic review. BMC Psychiatry. Volume 20, Artigo 299. 2020. NASERIBAFROUEI, A. et al. Correlation between the human fecal microbiota and depression. Neurogastroenterology and motility: the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, v. 26, n. 8, p. 1155–1162, 2014. LIANG, S. et al. Recognizing depression from the Microbiota-gut-brain axis. International journal of molecular sciences, v. 19, n. 6, p. 1592, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14800	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4314549 - DANTE MIGUEL CAMPANELLI ROSA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Celia Aparecida Marques Pimenta		
<b>TITULO</b>	OS EFEITOS DA MICROBIOTA NA DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A depressão é um problema de saúde pública que traz graves prejuízos para a sociedade e para o indivíduo. O que se sabe hoje é que se trata de um transtorno de origem multifatorial – porém ainda há uma lacuna no conhecimento, precisamente no que tange os mecanismos que promovem e permitem a depressão vicejar, e que expliquem de modo satisfatório o que ocorre dentro do organismo. Uma hipótese que tem ganhado bastante força é a do papel do intestino no contexto de saúde mental.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente trabalho tenciona analisar as evidências mais recentes quanto ao envolvimento da microbiota no desenvolvimento e manutenção do transtorno depressivo			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão literária realizada com artigos do Pubmed, utilizando de descritores específicos de modo a filtrar os artigos, obtendo resultados entre 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A relação entre intestino e cérebro é capaz de modular funções cerebrais, por exemplo o comportamento emocional. Isso ocorre porque uma disfunção na microbiota causa o aumento da permeabilidade intestinal, tornando a liberação de substâncias como citocinas e LPS mais fácil, o que desempenha papel fundamental na constituição da inflamação da depressão, ou seja, uma microbiota não saudável libera toxinas que chegam ao cérebro. O estresse também pode contribuir para a alteração da microbiota e a comunicação entre o intestino e o cérebro ocorre pelo nervo vago. Foi constatado que são necessários mais estudos para comprovar a melhora dos distúrbios psiquiátricos com os probióticos, porém se espera grandes avanços. Há algumas famílias de bactérias que apresentaram uma melhora maior para a depressão como a Prevotellaceae, genus Corprococcus e Faecalibacterium. Um dos fatores que limita a eficácia dos probióticos na depressão é o número de cepas. Múltiplas cepas são mais efetivas e uma microbiota já danificada também prejudica a ação. Alguns estudos mostram que o ideal seria renovar a microbiota com um transplante fecal. Além disso, outros possíveis fatores de maior efetividade do efeito dos probióticos é a dosagem e o tempo de duração. tempo de duração. Outros artigos concluíram que os probióticos são benéficos nos sintomas da depressão, pois diminuem citocinas. Os estudos também avaliaram a influência da qualidade da alimentação na microbiota e os resultados foram positivo para a relação direta entre esses dois tópicos. Assim, intervenções alimentares se mostraram um potencial estratégico para melhorar os sintomas depressivos. A alimentação também se mostrou benéfica em conjunto com os probióticos			
<b>CONCLUSOES</b>	Há forte correlação entre a microbiota e o transtorno depressivo, de toda forma, faz-se necessário que mais estudos sejam realizados.			
<b>REFERENCIAS</b>	FORTH, Evan et al. Effect of fecal microbiota transplant on symptoms of psychiatric disorders: a systematic review. BMC Psychiatry. Volume 20, Artigo 299. 2020. NASERIBAFROUEI, A. et al. Correlation between the human fecal microbiota and depression. Neurogastroenterology and motility: the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, v. 26, n. 8, p. 1155–1162, 2014. LIANG, S. et al. Recognizing depression from the Microbiota-gut-brain axis. International journal of molecular sciences, v. 19, n. 6, p. 1592, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14800	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4317181 - MARIANA BARBOSA CHAIM ASSEFF		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Celia Aparecida Marques Pimenta		
<b>TITULO</b>	OS EFEITOS DA MICROBIOTA NA DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A depressão é um problema de saúde pública que traz graves prejuízos para a sociedade e para o indivíduo. O que se sabe hoje é que se trata de um transtorno de origem multifatorial – porém ainda há uma lacuna no conhecimento, precisamente no que tange os mecanismos que promovem e permitem a depressão vicejar, e que expliquem de modo satisfatório o que ocorre dentro do organismo. Uma hipótese que tem ganhado bastante força é a do papel do intestino no contexto de saúde mental.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente trabalho tenciona analisar as evidências mais recentes quanto ao envolvimento da microbiota no desenvolvimento e manutenção do transtorno depressivo			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão literária realizada com artigos do Pubmed, utilizando de descritores específicos de modo a filtrar os artigos, obtendo resultados entre 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A relação entre intestino e cérebro é capaz de modular funções cerebrais, por exemplo o comportamento emocional. Isso ocorre porque uma disfunção na microbiota causa o aumento da permeabilidade intestinal, tornando a liberação de substâncias como citocinas e LPS mais fácil, o que desempenha papel fundamental na constituição da inflamação da depressão, ou seja, uma microbiota não saudável libera toxinas que chegam ao cérebro. O estresse também pode contribuir para a alteração da microbiota e a comunicação entre o intestino e o cérebro ocorre pelo nervo vago. Foi constatado que são necessários mais estudos para comprovar a melhora dos distúrbios psiquiátricos com os probióticos, porém se espera grandes avanços. Há algumas famílias de bactérias que apresentaram uma melhora maior para a depressão como a Prevotellaceae, genus Corprococcus e Faecalibacterium. Um dos fatores que limita a eficácia dos probióticos na depressão é o número de cepas. Múltiplas cepas são mais efetivas e uma microbiota já danificada também prejudica a ação. Alguns estudos mostram que o ideal seria renovar a microbiota com um transplante fecal. Além disso, outros possíveis fatores de maior efetividade do efeito dos probióticos é a dosagem e o tempo de duração. Outros artigos concluíram que os probióticos são benéficos nos sintomas da depressão, pois diminuem citocinas. Os estudos também avaliaram a influência da qualidade da alimentação na microbiota e os resultados foram positivo para a relação direta entre esses dois tópicos. Assim, intervenções alimentares se mostraram um potencial estratégico para melhorar os sintomas depressivos. A alimentação também se mostrou benéfica em conjunto com os probióticos			
<b>CONCLUSOES</b>	Há forte correlação entre a microbiota e o transtorno depressivo, de toda forma, faz-se necessário que mais estudos sejam realizados.			
<b>REFERENCIAS</b>	FORTH, Evan et al. Effect of fecal microbiota transplant on symptoms of psychiatric disorders: a systematic review. BMC Psychiatry. Volume 20, Artigo 299. 2020. NASERIBAFROUEI, A. et al. Correlation between the human fecal microbiota and depression. Neurogastroenterology and motility: the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, v. 26, n. 8, p. 1155–1162, 2014. LIANG, S. et al. Recognizing depression from the Microbiota-gut-brain axis. International journal of molecular sciences, v. 19, n. 6, p. 1592, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14800	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4318161 - ADIB AREF ABDUL LATIF		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Celia Aparecida Marques Pimenta		
<b>TITULO</b>	OS EFEITOS DA MICROBIOTA NA DEPRESSÃO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A depressão é um problema de saúde pública que traz graves prejuízos para a sociedade e para o indivíduo. O que se sabe hoje é que se trata de um transtorno de origem multifatorial – porém ainda há uma lacuna no conhecimento, precisamente no que tange os mecanismos que promovem e permitem a depressão vicejar, e que expliquem de modo satisfatório o que ocorre dentro do organismo. Uma hipótese que tem ganhado bastante força é a do papel do intestino no contexto de saúde mental.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente trabalho tenciona analisar as evidências mais recentes quanto ao envolvimento da microbiota no desenvolvimento e manutenção do transtorno depressivo			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão literária realizada com artigos do Pubmed, utilizando de descritores específicos de modo a filtrar os artigos, obtendo resultados entre 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	A relação entre intestino e cérebro é capaz de modular funções cerebrais, por exemplo o comportamento emocional. Isso ocorre porque uma disfunção na microbiota causa o aumento da permeabilidade intestinal, tornando a liberação de substâncias como citocinas e LPS mais fácil, o que desempenha papel fundamental na constituição da inflamação da depressão, ou seja, uma microbiota não saudável libera toxinas que chegam ao cérebro. O estresse também pode contribuir para a alteração da microbiota e a comunicação entre o intestino e o cérebro ocorre pelo nervo vago. Foi constatado que são necessários mais estudos para comprovar a melhora dos distúrbios psiquiátricos com os probióticos, porém se espera grandes avanços. Há algumas famílias de bactérias que apresentaram uma melhora maior para a depressão como a Prevotellaceae, genus Corprococcus e Faecalibacterium. Um dos fatores que limita a eficácia dos probióticos na depressão é o número de cepas. Múltiplas cepas são mais efetivas e uma microbiota já danificada também prejudica a ação. Alguns estudos mostram que o ideal seria renovar a microbiota com um transplante fecal. Além disso, outros possíveis fatores de maior efetividade do efeito dos probióticos é a dosagem e o tempo de duração. Outros artigos concluíram que os probióticos são benéficos nos sintomas da depressão, pois diminuem citocinas. Os estudos também avaliaram a influência da qualidade da alimentação na microbiota e os resultados foram positivo para a relação direta entre esses dois tópicos. Assim, intervenções alimentares se mostraram um potencial estratégico para melhorar os sintomas depressivos. A alimentação também se mostrou benéfica em conjunto com os probióticos			
<b>CONCLUSOES</b>	Há forte correlação entre a microbiota e o transtorno depressivo, de toda forma, faz-se necessário que mais estudos sejam realizados.			
<b>REFERENCIAS</b>	FORTH, Evan et al. Effect of fecal microbiota transplant on symptoms of psychiatric disorders: a systematic review. BMC Psychiatry. Volume 20, Artigo 299. 2020. NASERIBAFROUEI, A. et al. Correlation between the human fecal microbiota and depression. Neurogastroenterology and motility: the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, v. 26, n. 8, p. 1155–1162, 2014. LIANG, S. et al. Recognizing depression from the Microbiota-gut-brain axis. International journal of molecular sciences, v. 19, n. 6, p. 1592, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14801	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3962113 - ROGER MITCHELL FELICIANO ALVES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno de Oliveira Pinheiro		
<b>TITULO</b>	O EXERCÍCIO FÍSICO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO IDOSO			
<b>INTRODUCAO</b>	Apesar da crescente evidência científica que apoia os benefícios da atividade física na saúde mental dos idosos, permanecem lacunas na compreensão dos mecanismos subjacentes a estes efeitos e na implementação de políticas públicas eficazes e adaptativas para esta população.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo teve como objetivo investigar a relação entre atividade física regular e saúde mental em idosos e analisar como a atividade física afeta positivamente o bem-estar emocional, cognitivo e social dos idosos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzida uma revisão bibliográfica abrangente, abordando uma variedade de fontes, incluindo artigos, teses, dissertações e conteúdos online, para investigar o tema em questão. A pesquisa foi realizada usando os descritores "saúde mental", "idosos", "exercício físico" e "benefícios" nos bancos de dados do Google Acadêmico e Scielo. Foram selecionados estudos que detalhavam o método de forma abrangente em seus títulos e textos, contribuindo assim para sua caracterização. A revisão concentrou-se na análise global dos benefícios relacionados à prática de atividades físicas, exercícios e esportes para idosos.			
<b>RESULTADO S</b>	À medida que envelhecemos, enfrentamos desafios emocionais e cognitivos que podem afetar nosso bem-estar mental. No entanto, a atividade física regular tem sido amplamente reconhecida como uma poderosa ferramenta para mitigar esses desafios. Os exercícios não apenas melhoram a saúde física, fortalecendo ossos e músculos, mas também têm um impacto profundo no nosso estado emocional. A liberação de endorfinas durante o exercício não apenas alivia o estresse e a ansiedade, mas também melhora o humor e a autoestima. Além disso, o exercício físico regular pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, o que é crucial para uma boa saúde mental. Além disso, as atividades físicas, quando realizadas em grupos, proporcionam oportunidades valiosas para socialização, reduzindo assim a solidão e fortalecendo os laços sociais.			
<b>CONCLUSOES</b>	Portanto, incentivar e apoiar a prática regular de exercícios físicos entre os idosos é essencial para promover não apenas a sua saúde física, mas também o seu bem-estar mental e emocional. O desenvolvimento do tema busca compreender melhor esta relação, será possível estabelecer estratégias mais direcionadas e mais bem informadas para melhorar a qualidade de vida dos idosos e contribuir para sociedades mais saudáveis e mais inclusivas.			
<b>REFERENCIA S</b>	ANTUNES, Hanna K.M.; SANTOS, Ruth F.; CASSILHAS, Ricardo; SANTOS, Ronaldo V.T.; BUENO, Orlando F.A.; MELLO, Marco Túlio de. Exercício físico e função cognitiva: uma revisão. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, [S.L.], v. 12, n. 2, p. 108-114, abr. 2006. FapUNIFESP (SciELO). CALDERON, Thayla Sayuri Suzuki. ATUAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR NA ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM IDOSOS. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO, 2015, Presidente Prudente. Pesquisa e Extensão. [S.L.]: ., 2015. p. 25-31. COLCOMBE, Stanley J. et al. A aptidão aeróbica reduz a perda de tecido cerebral em humanos idosos. As Revistas de Gerontologia Série A: Ciências Biológicas e Ciências Médicas, v. 2, pág. M176-M180, 2003. DIRETRIZES DA OMS PARA ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: NUM PISCAR DE OLHOS. Organização Mundial de Saúde: Num Piscar de Olhos, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14803	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU MOBITZ TIPO II APÓS USO DE DEXMEDETOMIDINA E TAQUICARDIA VENTRICULAR POSTERIOR ADMINISTRAÇÃO DE ATROPINA E ATIPAMEZOLE DURANTE TRANS-ANESTESICO EM CÃO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A dexmedetomidina é um fármaco agonista alfa-2 adrenérgico que age impedindo a liberação de noradrenalina, diminuindo a atividade simpática no sistema nervoso central, podendo induzir a bradicardia e bloqueio atrioventricular, sendo seu antagonista o atipamezole. A atropina é um anticolinérgico, que, pode ser utilizado para aumentar a frequência cardíaca, mas pode não aumentar proporcionalmente o débito cardíaco, podendo resultar em hipertensão, aumento do consumo de oxigênio do miocárdio e arritmias, como a taquicardia ventricular.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o caso de um cão fêmea, da raça Pit Bull, com 2 anos de idade, submetida à técnica de osteotomia e nivelamento do platô tibial, que sofreu taquicardia ventricular após administração de atropina e atipamezole.			
<b>METODOLOGIA</b>	Paciente foi admitido pela equipe de anestesiologia, a qual realizou sua avaliação física e de seus exames pré-operatórios, que não apresentaram alterações. A medicação pré-anestésica foi dexmedetomidina 2 mcg/kg e tramal 3 mg/kg. A indução realizada com propofol 5 mg/kg e cetamina 1 mg/kg e manutenção com isoflurano. Foi realizada epidural em região lombossacra e após posicionar o animal em decúbito dorsal, animal apresentou bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II, com cerca de 5 ondas P sem complexo QRS, com pressão arterial sistólica em 100 mmHg. Optou-se por realizar atropina 0,03 mg/kg e a reversão do alfa-2 adrenérgico com atipamezole. Esta manobra levou a uma taquicardia ventricular, a qual foi tratada com lidocaína 1,5 mg/kg em bólus via intravenosa. Paciente se manteve estável durante o restante do procedimento.			
<b>RESULTADOS</b>	Tendo conhecimento dos efeitos da dexmedetomidina, o paciente apresentou bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II, com cerca de 5 ondas P isoladas. Optou-se pelo tratamento da bradiarritmia com anticolinérgico, que se mostra efetivo para aumentar inicialmente a frequência cardíaca e pode resultar em hipertensão, aumento do consumo de oxigênio do miocárdio e arritmias. A reversão dos agonistas (#38)#945;2-adrenérgicos pode levar a excitação do paciente, perda de analgesia e efeitos adversos cardiovasculares, incluindo taquicardia e hipotensão. Esta manobra, levou a uma taquicardia ventricular que pode progredir para fibrilação ventricular e parada cardiorrespiratória. Em cães, o medicamento de escolha para o tratamento é a lidocaína intravenosa, que suprime arritmias de múltiplos mecanismos eletrofisiológicos e apresenta mínimos efeitos hemodinâmicos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A administração do anticolinérgico, juntamente com o atipamezole resultou em uma taquicardia que, possivelmente com a redução do débito cardíaco e hipóxia do miocárdio, evoluiu para taquicardia ventricular.			
<b>REFERENCIAS</b>	GRIMM, Kurt A.; LAMONT, Leigh A.; TRANQUILLI, William J.; et al. Lumb (#38) Jones   Anestesiologia e Analgesia em Veterinária, 5ª edição. 2017. SPINOSA, Helenice de S.; GÖRNIK, Silvana L.; BERNARDI, Maria M. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. 2022. KUUSELA, E.; RAEKALLIO, M.; HIETANEN, H., et al. 24- hour Holter-Monitoring in the Perianaesthetic Period in dogs premedicated with Dexmedetomidine. The veterinary journal. v. 164, p. 235-239, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14803	Anestesiologia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4222377 - GABRIELA ROCHA MUNIZ PACHECO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima		
<b>TITULO</b>	BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU MOBITZ TIPO II APÓS USO DE DEXMEDETOMIDINA E TAQUICARDIA VENTRICULAR POSTERIOR ADMINISTRAÇÃO DE ATROPINA E ATIPAMEZOLE DURANTE TRANS-ANESTESICO EM CÃO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A dexmedetomidina é um fármaco agonista alfa-2 adrenérgico que age impedindo a liberação de noradrenalina, diminuindo a atividade simpática no sistema nervoso central, podendo induzir a bradicardia e bloqueio atrioventricular, sendo seu antagonista o atipamezole. A atropina é um anticolinérgico, que, pode ser utilizado para aumentar a frequência cardíaca, mas pode não aumentar proporcionalmente o débito cardíaco, podendo resultar em hipertensão, aumento do consumo de oxigênio do miocárdio e arritmias, como a taquicardia ventricular.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o caso de um cão fêmea, da raça Pit Bull, com 2 anos de idade, submetida à técnica de osteotomia e nivelamento do platô tibial, que sofreu taquicardia ventricular após administração de atropina e atipamezole.			
<b>METODOLOGIA</b>	Paciente foi admitido pela equipe de anestesiologia, a qual realizou sua avaliação física e de seus exames pré-operatórios, que não apresentaram alterações. A medicação pré-anestésica foi dexmedetomidina 2 mcg/kg e tramal 3 mg/kg. A indução realizada com propofol 5 mg/kg e cetamina 1 mg/kg e manutenção com isoflurano. Foi realizada epidural em região lombossacra e após posicionar o animal em decúbito dorsal, animal apresentou bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II, com cerca de 5 ondas P sem complexo QRS, com pressão arterial sistólica em 100 mmHg. Optou-se por realizar atropina 0,03 mg/kg e a reversão do alfa-2 adrenérgico com atipamezole. Esta manobra levou a uma taquicardia ventricular, a qual foi tratada com lidocaína 1,5 mg/kg em bólus via intravenosa. Paciente se manteve estável durante o restante do procedimento.			
<b>RESULTADOS</b>	Tendo conhecimento dos efeitos da dexmedetomidina, o paciente apresentou bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II, com cerca de 5 ondas P isoladas. Optou-se pelo tratamento da bradiarritmia com anticolinérgico, que se mostra efetivo para aumentar inicialmente a frequência cardíaca e pode resultar em hipertensão, aumento do consumo de oxigênio do miocárdio e arritmias. A reversão dos agonistas (#38)#945;2-adrenérgicos pode levar a excitação do paciente, perda de analgesia e efeitos adversos cardiovasculares, incluindo taquicardia e hipotensão. Esta manobra, levou a uma taquicardia ventricular que pode progredir para fibrilação ventricular e parada cardiorrespiratória. Em cães, o medicamento de escolha para o tratamento é a lidocaína intravenosa, que suprime arritmias de múltiplos mecanismos eletrofisiológicos e apresenta mínimos efeitos hemodinâmicos.			
<b>CONCLUSOES</b>	A administração do anticolinérgico, juntamente com o atipamezole resultou em uma taquicardia que, possivelmente com a redução do débito cardíaco e hipóxia do miocárdio, evoluiu para taquicardia ventricular.			
<b>REFERENCIAS</b>	GRIMM, Kurt A.; LAMONT, Leigh A.; TRANQUILLI, William J.; et al. Lumb (#38) Jones   Anestesiologia e Analgesia em Veterinária, 5ª edição. 2017. SPINOSA, Helenice de S.; GÖRNIÁK, Silvana L.; BERNARDI, Maria M. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. 2022. KUUSELA, E.; RAEKALLIO, M.; HIETANEN, H., et al. 24- hour Holter-Monitoring in the Perioperative Period in dogs premedicated with Dexmedetomidine. The veterinary journal. v. 164, p. 235-239, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14805	Epidemiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4063562 - EVELYN MOURA DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		STEPHANIE BERGMANN ESTEVES
<b>TITULO</b>	Análise da distribuição espacial de sorovares de <i>Leptospira</i> identificados em casos confirmados de leptospirose no município de São Paulo entre 2004 e 2022.			
<b>INTRODUCAO</b>	A leptospirose é uma enfermidade causada por bactérias do gênero <i>Leptospira</i> , que acomete diversas espécies de mamíferos, incluindo seres humanos. Uma vez que certos sorovares de <i>Leptospira</i> estão frequentemente associados a hospedeiros específicos e (Putz and Nally, 2020), a busca pela identificação do sorovar ou sorogrupo infectante em casos confirmados de leptospirose humana pode permitir a determinação das principais fontes de infecção relacionadas à transmissão dessa enfermidade, lançando luz sobre os padrões de transmissão local do patógeno.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a distribuição espacial de sorovares de <i>Leptospira</i> identificados em casos confirmados de leptospirose no município entre 2004 e 2022			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir dos dados disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), foram coletadas as informações de latitude e longitude dos pacientes. Os casos confirmados de leptospirose foram definidos com base na presença de sinais e sintomas clínicos compatíveis, juntamente com um ou mais dos seguintes resultados de exames laboratoriais: (1) títulos iguais ou superiores a 800 na soroaglutinação microscópica (MAT) quando utilizado somente um amostra de soro, sendo que o sorogrupo infectante foi identificado com base na titulação mais alta obtida; (2) soroconversão na MAT utilizando duas amostras (mudança na titulação de 0 para a primeira amostra para 100 ou mais na segunda amostra). Neste caso, o sorogrupo infectante foi determinado com base na titulação mais elevada. Para a análise da distribuição espacial dos sorovares, estes dados foram exportados para o software QGIS, com objetivo de produzir mapas de calor para os pontos com maior densidade de infecção por leptospirose confirmada pela MAT.			
<b>RESULTADOS</b>	No período de 2004 a 2022, foram analisados o total de 18.447 pacientes suspeitos para leptospirose. Destes pacientes, 2.129 testaram positivo na técnica de MAT e Elisa-IgM. Destes, apenas 1.399 pacientes tiveram resultados que apontavam o provável sorogrupo infectante. Os sorogrupos mais frequentemente encontrados foram: Icterohaemorrhagiae (41,03%), Cynopteri (10,86%), Australis (8,43%), Autumnalis (3,72%) e Canicola (3,57%). Em relação ao sorogrupo Icterohaemorrhagiae, que tem roedores sinantrópicos como hospedeiros naturais, corresponde a uma porcentagem de 41,03%, enquanto os outros sorogrupos somam 58,97% das ocorrências. A distribuição de pacientes reagentes a esse sorogrupo se concentra principalmente em Butantã, Campo Limpo, Brasilândia, Cidade Ademar, e Jaçanã. Já os demais sorogrupos, quando analisados conjuntamente, são encontrados em Jaçanã, Casa-Verde, Guaianases, Butantã, Cidade Ademar, Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Tiradentes, M' Boi Mirim, Santo Amaro, Ipiranga e Vila Mariana.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados indicam que os sorogrupos que possuem como hospedeiros naturais os animais silvestres estão predominantemente distribuídos em áreas com maior cobertura vegetal. Por outro lado, os sorogrupos associados a animais domésticos e sinantrópicos apresentam maior concentração em zonas mais urbanizadas, o que pode subsidiar medidas preventivas ligadas à Saúde Única.			
<b>REFERENCIAS</b>	Putz, E.J., Nally, J.E., 2020. Investigating the Immunological and Biological Equilibrium of Reservoir Hosts and Pathogenic <i>Leptospira</i> : Balancing the Solution to an Acute Problem? <i>Front Microbiol</i> 11. <a href="https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.02005">https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.02005</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14806	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3776093 - MARIA EDUARDA PEREIRA DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	RECLUSÃO E ESTIGMA: A OPINIÃO SOCIAL SOBRE OS DETENTOS BRASILEIROS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os atos infracionais geram sentimento de revolta e indignação popular. Ao ser atingida pela criminalidade, a sociedade reivindica seu direito comunitário de punir o transgressor através da participação ativa de todos os seus agentes: seja diretamente através do Estado, ou indiretamente através do próprio fazer social. A sociedade, por meio do imaginário popular, perpetua o estereótipo de infrator através da estigmatização e marginalização dos indivíduos em situação de encarceramento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os comentários virtuais feitos sobre o sistema prisional brasileiro em publicações jornalísticas da rede social Twitter.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os dados foram coletados através da ferramenta de busca-avançada do Twitter. Foram filtradas publicações feitas pelo perfil G1, no período de 2020 a 2022, com as palavras-chaves "detentos" e "sistema prisional". Publicações que abordavam casos de grande repercussão midiática, como prisões de pessoas públicas e rebeliões entre facções, não foram consideradas para este estudo. Após a seleção das postagens, segundo os critérios estabelecidos, os comentários com discurso estigmatizante foram contabilizados e transcritos integralmente em uma planilha e analisados de acordo com o referencial teórico utilizado na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Nos anos de 2020 a 2022, a palavra-chave "detentos" reuniu 12 publicações com 115 comentários classificados como estigmatizantes. Já a palavra-chave 'sistema prisional' contabilizou 4 publicações com 30 comentários classificados como estigmatizantes. As temáticas encontradas foram de violência extrema, sugerindo medidas de pena de morte e tortura; comentários sarcásticos; visões simplistas, categorizadas por atribuir o fenômeno da criminalidade apenas ao sujeito infrator; e comentários de indiferença, classificados através de palavras curtas e ou com descrições apáticas diante da situação noticiada. Compreendidas através do fenômeno do punitivismo, conceito caracterizado por medidas e ideologias estabelecidas que propõem o endurecimento de penas e o encarceramento em massa como forma de combater a criminalidade, tais discursos demonstram a visão social limitada ante o multifacetado fenômeno da criminalidade e o desejo comunitário em punir ao invés de reintegrar (Domingues, 2022; Foucault, 1975; Reuter, 2016).			
<b>CONCLUSOES</b>	As crenças sociais relativas à pessoa encarcerada, demonstraram-se enraizadas em discursos estigmatizantes e punitivistas, além de visões simplistas sobre fenômenos sociais complexos.			
<b>REFERENCIAS</b>	DOMINGUES, Cleber Rogério Rodrigues. CULTURA PUNITIVISTA NA JURISDIÇÃO UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O ENCARCERAMENTO E SEUS REFLEXOS SOCIAIS. Pesquisas e Inovações em Ciências Humanas e Sociais: Produções Científicas Multidisciplinares no Século XXI, Volume 2, [S.L.], p. 313-317, 2 set. 2022. Instituto Scientia. <a href="http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19">http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19</a> . FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 1975. 302 p. 9-88 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira; PEREIRA, Marcos Emanuel (org.). Estereótipos, preconceitos e discriminação: perspectivas teóricas e metodológicas. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2004. Disponível em: <a href="https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%20e%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20R1.pdf">https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%20e%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20R1.pdf</a> . Acesso em: 17 set. 2023. REUTER, Cristina. O Trabalho do Psicólogo em prisões. 2016. Disponível em: <a href="https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf">https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf</a> . Acesso em: 27 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14806	Psicologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4397754 - JULIA SILVA DE LIMA FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Toledo Risso		
<b>TITULO</b>	RECLUSÃO E ESTIGMA: A OPINIÃO SOCIAL SOBRE OS DETENTOS BRASILEIROS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Os atos infracionais geram sentimento de revolta e indignação popular. Ao ser atingida pela criminalidade, a sociedade reivindica seu direito comunitário de punir o transgressor através da participação ativa de todos os seus agentes: seja diretamente através do Estado, ou indiretamente através do próprio fazer social. A sociedade, por meio do imaginário popular, perpetua o estereótipo de infrator através da estigmatização e marginalização dos indivíduos em situação de encarceramento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os comentários virtuais feitos sobre o sistema prisional brasileiro em publicações jornalísticas da rede social Twitter.			
<b>METODOLOGIA</b>	Os dados foram coletados através da ferramenta de busca-avançada do Twitter. Foram filtradas publicações feitas pelo perfil G1, no período de 2020 a 2022, com as palavras-chaves "detentos" e "sistema prisional". Publicações que abordavam casos de grande repercussão midiática, como prisões de pessoas públicas e rebeliões entre facções, não foram consideradas para este estudo. Após a seleção das postagens, segundo os critérios estabelecidos, os comentários com discurso estigmatizante foram contabilizados e transcritos integralmente em uma planilha e analisados de acordo com o referencial teórico utilizado na pesquisa.			
<b>RESULTADOS</b>	Nos anos de 2020 a 2022, a palavra-chave "detentos" reuniu 12 publicações com 115 comentários classificados como estigmatizantes. Já a palavra-chave 'sistema prisional' contabilizou 4 publicações com 30 comentários classificados como estigmatizantes. As temáticas encontradas foram de violência extrema, sugerindo medidas de pena de morte e tortura; comentários sarcásticos; visões simplistas, categorizadas por atribuir o fenômeno da criminalidade apenas ao sujeito infrator; e comentários de indiferença, classificados através de palavras curtas e ou com descrições apáticas diante da situação noticiada. Compreendidas através do fenômeno do punitivismo, conceito caracterizado por medidas e ideologias estabelecidas que propõem o endurecimento de penas e o encarceramento em massa como forma de combater a criminalidade, tais discursos demonstram a visão social limitada ante o multifacetado fenômeno da criminalidade e o desejo comunitário em punir ao invés de reintegrar (Domingues, 2022; Foucault, 1975; Reuter, 2016).			
<b>CONCLUSÕES</b>	As crenças sociais relativas à pessoa encarcerada, demonstraram-se enraizadas em discursos estigmatizantes e punitivistas, além de visões simplistas sobre fenômenos sociais complexos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	DOMINGUES, Cleber Rogério Rodrigues. CULTURA PUNITIVISTA NA JURISDIÇÃO UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O ENCARCERAMENTO E SEUS REFLEXOS SOCIAIS. Pesquisas e Inovações em Ciências Humanas e Sociais: Produções Científicas Multidisciplinares no Século XXI, Volume 2, [S.L.], p. 313-317, 2 set. 2022. Instituto Scientia. <a href="http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19">http://dx.doi.org/10.55232/10830012.19</a> . FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 1975. 302 p. 9-88 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira; PEREIRA, Marcos Emanuel (org.). Estereótipos, preconceitos e discriminação: perspectivas teóricas e metodológicas. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2004. Disponível em: <a href="https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%20e%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20RI.pdf">https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32112/1/Estere%C3%B3tipos%20e%20preconceitos%20e%20discrimina%C3%A7%C3%A3o%20RI.pdf</a> . Acesso em: 17 set. 2023. REUTER, Cristina. O Trabalho do Psicólogo em prisões. 2016. Disponível em: <a href="https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf">https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/12/O-trabalho-do-psicologo-grafica-web1.pdf</a> . Acesso em: 27 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14809	Epidemiologia Animal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4290780 - GABRIELE YUMI RAMALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico molecular da leptospirose em cães com suspeita clínica atendidos no Hovet-UNISA			
<b>INTRODUCAO</b>	A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial, potencialmente letal e capaz de causar surtos epidêmicos em populações humanas e de animais domésticos (Sykes et al. 2010). Cães infectados podem atuar como importante fonte de infecção para populações humanas, uma vez que são capazes de eliminar o patógeno no ambiente via urina e fluidos corporais (Schuller et al. 2015). Desta forma, a identificação de animais infectados, que é possibilitada principalmente pelo uso da técnica de PCR, é essencial para auxiliar na implementação de medidas preventivas com forte impacto em Saúde Pública.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o diagnóstico da leptospirose canina em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA pela técnica de PCR.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos pacientes entre que apresentaram níveis elevados de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 64,2 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados à duas ou mais manifestações clínicas sugestivas de leptospirose (distúrbios hemorrágicos, febre, vômitos, icterícia, prostração, hiporexia/anorexia). Cães que apresentaram poliúria, polidipsia e perda de peso um mês antes da apresentação no ambulatório não foram incluídos no estudo para descartar possíveis quadros de doença renal crônica. Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica da doença e destinadas a detecção molecular de leptospirose por meio da PCR por meio de técnica descrita por Merien et al. (1992).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram atendidos dez animais com suspeita clínica da entre março de 2022 e julho de 2023. Três desses animais tiveram diagnóstico de infecção confirmado pela PCR, sendo que dois animais apresentaram positividade em amostras de sangue, e um animal em amostra de urina.			
<b>CONCLUSOES</b>	O uso da técnica de PCR foi capaz de diagnosticar a doença em 30% dos animais com suspeita de leptospirose atendidos no período. A técnica se mostrou viável para o diagnóstico precoce da doença, embora seja importante o uso de técnicas sorológicas associadas para a identificação de animais na fase convalescente da doença.			
<b>REFERENCIAS</b>	Sykes, J.E. et al., 2010. 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine, 25(1), pp.1–13. Schuller, S. et al., 2015. European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 56(3), pp.159–179. Mérien, F., Amouriaux, P., Perolat, P., Baranton, G. (#38) Giron, I. S. Polymerase chain reaction for detection of Leptospira spp. in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology 30, 2219–2224 (1992).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14809	Epidemiologia Animal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4308361 - HELOISA MARCELINO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico molecular da leptospirose em cães com suspeita clínica atendidos no Hovet-UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial, potencialmente letal e capaz de causar surtos epidêmicos em populações humanas e de animais domésticos (Sykes et al. 2010). Cães infectados podem atuar como importante fonte de infecção para populações humanas, uma vez que são capazes de eliminar o patógeno no ambiente via urina e fluidos corporais (Schuller et al. 2015). Desta forma, a identificação de animais infectados, que é possibilitada principalmente pelo uso da técnica de PCR, é essencial para auxiliar na implementação de medidas preventivas com forte impacto em Saúde Pública.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o diagnóstico da leptospirose canina em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA pela técnica de PCR.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos pacientes entre que apresentaram níveis elevados de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 64,2 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados à duas ou mais manifestações clínicas sugestivas de leptospirose (distúrbios hemorrágicos, febre, vômitos, icterícia, prostração, hiporexia/anorexia). Cães que apresentaram poliúria, polidipsia e perda de peso um mês antes da apresentação no ambulatório não foram incluídos no estudo para descartar possíveis quadros de doença renal crônica. Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica da doença e destinadas a detecção molecular de leptospirosas patogênicas por meio da PCR por meio de técnica descrita por Merien et al. (1992).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram atendidos dez animais com suspeita clínica da entre março de 2022 e julho de 2023. Três desses animais tiveram diagnóstico de infecção confirmado pela PCR, sendo que dois animais apresentaram positividade em amostras de sangue, e um animal em amostra de urina.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O uso da técnica de PCR foi capaz de diagnosticar a doença em 30% dos animais com suspeita de leptospirose atendidos no período. A técnica se mostrou viável para o diagnóstico precoce da doença, embora seja importante o uso de técnicas sorológicas associadas para a identificação de animais na fase convalescente da doença.			
<b>REFERENCIA S</b>	Sykes, J.E. et al., 2010. 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine, 25(1), pp.1–13. Schuller, S. et al., 2015. European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 56(3), pp.159–179. Mérien, F., Amouriaux, P., Perolat, P., Baranton, G. (#38) Giron, I. S. Polymerase chain reaction for detection of Leptospira spp. in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology 30, 2219–2224 (1992).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14809	Epidemiologia Animal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4394607 - ANA BEATRIZ MENDES DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico molecular da leptospirose em cães com suspeita clínica atendidos no Hovet-UNISA			
<b>INTRODUCA O</b>	A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial, potencialmente letal e capaz de causar surtos epidêmicos em populações humanas e de animais domésticos (Sykes et al. 2010). Cães infectados podem atuar como importante fonte de infecção para populações humanas, uma vez que são capazes de eliminar o patógeno no ambiente via urina e fluidos corporais (Schuller et al. 2015). Desta forma, a identificação de animais infectados, que é possibilitada principalmente pelo uso da técnica de PCR, é essencial para auxiliar na implementação de medidas preventivas com forte impacto em Saúde Pública.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o diagnóstico da leptospirose canina em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA pela técnica de PCR.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos pacientes entre que apresentaram níveis elevados de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 64,2 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados à duas ou mais manifestações clínicas sugestivas de leptospirose (distúrbios hemorrágicos, febre, vômitos, icterícia, prostração, hiporexia/anorexia). Cães que apresentaram poliúria, polidipsia e perda de peso um mês antes da apresentação no ambulatório não foram incluídos no estudo para descartar possíveis quadros de doença renal crônica. Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica da doença e destinadas a detecção molecular de leptospirosas patogênicas por meio da PCR por meio de técnica descrita por Merien et al. (1992).			
<b>RESULTADOS</b>	Foram atendidos dez animais com suspeita clínica da entre março de 2022 e julho de 2023. Três desses animais tiveram diagnóstico de infecção confirmado pela PCR, sendo que dois animais apresentaram positividade em amostras de sangue, e um animal em amostra de urina.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O uso da técnica de PCR foi capaz de diagnosticar a doença em 30% dos animais com suspeita de leptospirose atendidos no período. A técnica se mostrou viável para o diagnóstico precoce da doença, embora seja importante o uso de técnicas sorológicas associadas para a identificação de animais na fase convalescente da doença.			
<b>REFERENCIA S</b>	Sykes, J.E. et al., 2010. 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine, 25(1), pp.1–13. Schuller, S. et al., 2015. European consensus statement on leptospirosis in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 56(3), pp.159–179. Mérien, F., Amouriaux, P., Perolat, P., Baranton, G. (#38) Giron, I. S. Polymerase chain reaction for detection of Leptospira spp. in clinical samples. Journal of Clinical Microbiology 30, 2219–2224 (1992).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14810	Direito Processual Penal	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5138469 - SABRINA DE SOUZA CASTRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato Watanabe de Moraes		
<b>TITULO</b>	Análise de estratégias investigativas de homicídios			
<b>INTRODUCAO</b>	A análise das estratégias de investigação de homicídio é crucial para aprimorar a eficácia das investigações criminais. O projeto visa melhorar os métodos das agências de aplicação da lei na resolução de homicídios, considerando a necessidade de técnicas especializadas, coleta de evidências, análise de cenas de crime e colaboração entre especialistas. Uma avaliação crítica é necessária para identificar pontos fortes e áreas a serem aprimoradas.			
<b>OBJETIVOS</b>	A análise das estratégias de investigação de homicídios visa melhorar as práticas profissionais, identificando as melhores abordagens, métodos eficazes e uso adequado de recursos e tecnologias disponíveis. Além disso, busca identificar tendências e padrões nos casos, aprimorar as técnicas investigativas, identificando pontos fortes e fracos e contribuindo para a justiça e para o avanço científico.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa envolverá uma revisão abrangente da literatura legal relacionada a investigações de homicídios, bem como uma análise de relatórios de inquéritos policiais. Além disso, planeja-se conduzir entrevistas com investigadores, promotores, peritos e outros profissionais envolvidos nesse campo, visando obter informações qualitativas e identificar oportunidades de melhoria nas estratégias usadas. Isso proporcionará insights valiosos e uma compreensão mais profunda das práticas e abordagens no contexto das investigações de homicídios.			
<b>RESULTADOS</b>	Muito tem sido feito no campo das estratégias investigativas de homicídios para melhorar a eficácia das investigações e aumentar a resolução desses casos. Em muitos países, foram criadas unidades especializadas dedicadas exclusivamente à investigação de homicídios. Essas unidades contam com investigadores experientes e treinados especificamente para lidar com casos de assassinato, garantindo uma abordagem mais especializada e eficaz. Com o avanço da tecnologia, surgiram várias técnicas e equipamentos forenses mais avançados para auxiliar nas investigações de homicídios. Isso inclui o uso de análise de DNA, análise de impressões digitais, análise de balística, reconstrução de cenas de crime em 3D e análise de vídeo e imagem. A colaboração entre diferentes agências, como polícia, laboratórios forenses, promotoria e especialistas em criminalística, tem se mostrado fundamental para o sucesso das investigações de homicídios. O compartilhamento de informações e a cooperação entre essas entidades permitem uma abordagem mais abrangente e eficiente na coleta e análise de evidências.			
<b>CONCLUSOES</b>	O projeto de pesquisa sobre estratégias de investigação de homicídios visa aprimorar as práticas ao identificar lacunas e pontos fortes nas estratégias usadas. A pesquisa analisa abordagens variadas em casos reais e emprega diversos métodos, incluindo revisão bibliográfica, análise de dados, entrevistas com profissionais e tecnologias forenses avançadas. Este projeto não oferece respostas definitivas, mas busca contribuir para o campo da investigação criminal, fornecendo conhecimento que pode guiar futuras investigações e práticas. As conclusões obtidas, espera-se, servirão como base para discussões sobre o aprimoramento das estratégias investigativas e o avanço da área.			
<b>REFERENCIAS</b>	MENDRONI, Marcelo B. Curso de investigação criminal, 3ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. PEREIRA, E. da S. Teoria da investigação criminal. São Paulo: Grupo Almedina, 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14811	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4256956 - VANESSA FURTADO DO VALE BENTO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	A INFLUÊNCIA DA PALHAÇOTERAPIA NO ATENDIMENTO INFANTIL AMBULATORIAL			
<b>INTRODUCAO</b>	A palhaçoterapia ou terapia do riso é uma ferramenta que pode ser utilizada no ambiente de saúde para diminuir a tensão e tornar o ambiente mais alegre, no Brasil, essa prática foi inserida por Wellington Nogueira, em 1991, quando fundou o grupo "Doutores da Alegria".			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a influência da palhaçoterapia no atendimento infantil no ambiente ambulatorial, demonstrar se a intervenção lúdica é capaz de diminuir o medo e estresse das crianças durante as consultas. Explicar como pode ser considerado a palhaçoterapia como terapia não farmacológica no alívio da ansiedade no decorrer do atendimento. Avaliar se a intervenção terapêutica é aceita pelo público alvo (infantil).			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa transversal de avaliação da percepção dos pais e/ou responsáveis legais sobre sua criança, intervenção lúdica dos palhaços no ambulatório de pediatria, seguida de formulário para avaliação do impacto da intervenção.			
<b>RESULTADO S</b>	O formulário foi aplicado aos pais de crianças de variadas idades (2 a 11 anos), sendo 77,3% do gênero masculino e 22,7% do gênero feminino. Ao questionar os genitores sobre "Fica estressado quando vai na consulta pediátrica" 72% disseram que "Não" ficam estressados. No entanto, quando perguntado "O Senhor(a) sentiu diferença no comportamento da criança que você está acompanhando na presença dos palhaços (Ela ficou mais tranquila?)" 77,3% reportaram que "Sim". Ademais, quando perguntado aos pais "O (A) senhor (a) acha que sua criança gostaria que houvesse sempre a interação com os palhaços?", "O senhor(a) gostaria que tivesse interações com palhaços em outros serviços de saúde" e "O Senhor (a) acredita que a palhaçoterapia ajuda as crianças a perderem o medo de ir ao médico ou ficarem menos estressadas" as respostas foram 100% positivas para essas perguntas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A interação das crianças com os palhaços foi extremamente satisfatória, todos os participantes interagiram bem, participando de brincadeiras ou apenas conversando e interagindo de maneira lúdica. Os pais que responderam a pesquisas demonstraram bastantes satisfeitos e tranquilos em relação ao projeto, todos acreditam na eficiência da palhaçoterapia como uma ótima opção para aliviar o estresse e o temor das crianças em volta das consultas médicas e em outros serviços de saúde. Além de transformar o ambiente de espera em um local menos tedioso facilitando assim um alívio para os pais e médicos que receberiam o paciente inquieto e impaciente, estando a criança calma e alegre.			
<b>REFERENCIAS</b>	Isaacs D. Clowns and clown doctors. J Paediatr Child Health. 2021 Dec;57(12):1844-1846. Alcântara PL, Wogel AZ, Rossi MI, Neves IR, Sabates AL, Puggina AC. Effect of interaction with clowns on vital signs and non-verbal communication of hospitalized children. Rev Paul Pediatr. 2016 Dec;34(4):432-438. Catapan SC, Oliveira WF, Rotta TM. Palhaçoterapia em ambiente hospitalar: uma revisão de literatura [Clown therapy in the hospital setting: A review of the literature]. Cien Saude Colet. 2019 Sep 9;24(9):3417-3429.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14811	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4321146 - BEATRIZ LEITE DE PAULA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	A INFLUÊNCIA DA PALHAÇOTERAPIA NO ATENDIMENTO INFANTIL AMBULATORIAL			
<b>INTRODUCAO</b>	A palhaçoterapia ou terapia do riso é uma ferramenta que pode ser utilizada no ambiente de saúde para diminuir a tensão e tornar o ambiente mais alegre, no Brasil, essa prática foi inserida por Wellington Nogueira, em 1991, quando fundou o grupo "Doutores da Alegria".			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a influência da palhaçoterapia no atendimento infantil no ambiente ambulatorial, demonstrar se a intervenção lúdica é capaz de diminuir o medo e estresse das crianças durante as consultas. Explicar como pode ser considerado a palhaçoterapia como terapia não farmacológica no alívio da ansiedade no decorrer do atendimento. Avaliar se a intervenção terapêutica é aceita pelo público alvo (infantil).			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa transversal de avaliação da percepção dos pais e/ou responsáveis legais sobre sua criança, intervenção lúdica dos palhaços no ambulatório de pediatria, seguida de formulário para avaliação do impacto da intervenção.			
<b>RESULTADO S</b>	O formulário foi aplicado aos pais de crianças de variadas idades (2 a 11 anos), sendo 77,3% do gênero masculino e 22,7% do gênero feminino. Ao questionar os genitores sobre "Fica estressado quando vai na consulta pediátrica" 72% disseram que "Não" ficam estressados. No entanto, quando perguntado "O Senhor(a) sentiu diferença no comportamento da criança que você está acompanhando na presença dos palhaços (Ela ficou mais tranquila?)" 77,3% reportaram que "Sim". Ademais, quando perguntado aos pais "O (A) senhor (a) acha que sua criança gostaria que houvesse sempre a interação com os palhaços?", "O senhor(a) gostaria que tivesse interações com palhaços em outros serviços de saúde" e "O Senhor (a) acredita que a palhaçoterapia ajuda as crianças a perderem o medo de ir ao médico ou ficarem menos estressadas" as respostas foram 100% positivas para essas perguntas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A interação das crianças com os palhaços foi extremamente satisfatória, todos os participantes interagiram bem, participando de brincadeiras ou apenas conversando e interagindo de maneira lúdica. Os pais que responderam a pesquisas demonstraram bastantes satisfeitos e tranquilos em relação ao projeto, todos acreditam na eficiência da palhaçoterapia como uma ótima opção para aliviar o estresse e o temor das crianças em volta das consultas médicas e em outros serviços de saúde. Além de transformar o ambiente de espera em um local menos tedioso facilitando assim um alívio para os pais e médicos que receberiam o paciente inquieto e impaciente, estando a criança calma e alegre.			
<b>REFERENCIAS</b>	Isaacs D. Clowns and clown doctors. J Paediatr Child Health. 2021 Dec;57(12):1844-1846. Alcântara PL, Wogel AZ, Rossi MI, Neves IR, Sabates AL, Puggina AC. Effect of interaction with clowns on vital signs and non-verbal communication of hospitalized children. Rev Paul Pediatr. 2016 Dec;34(4):432-438. Catapan SC, Oliveira WF, Rotta TM. Palhaçoterapia em ambiente hospitalar: uma revisão de literatura [Clown therapy in the hospital setting: A review of the literature]. Cien Saude Colet. 2019 Sep 9;24(9):3417-3429.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14811	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4453476 - CAMILA GOMES PEREIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	A INFLUÊNCIA DA PALHAÇOTERAPIA NO ATENDIMENTO INFANTIL AMBULATORIAL			
<b>INTRODUCAO</b>	A palhaçoterapia ou terapia do riso é uma ferramenta que pode ser utilizada no ambiente de saúde para diminuir a tensão e tornar o ambiente mais alegre, no Brasil, essa prática foi inserida por Wellington Nogueira, em 1991, quando fundou o grupo "Doutores da Alegria".			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a influência da palhaçoterapia no atendimento infantil no ambiente ambulatorial, demonstrar se a intervenção lúdica é capaz de diminuir o medo e estresse das crianças durante as consultas. Explicar como pode ser considerado a palhaçoterapia como terapia não farmacológica no alívio da ansiedade no decorrer do atendimento. Avaliar se a intervenção terapêutica é aceita pelo público alvo (infantil).			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa transversal de avaliação da percepção dos pais e/ou responsáveis legais sobre sua criança, intervenção lúdica dos palhaços no ambulatório de pediatria, seguida de formulário para avaliação do impacto da intervenção.			
<b>RESULTADO S</b>	O formulário foi aplicado aos pais de crianças de variadas idades (2 a 11 anos), sendo 77,3% do gênero masculino e 22,7% do gênero feminino. Ao questionar os genitores sobre "Fica estressado quando vai na consulta pediátrica" 72% disseram que "Não" ficam estressados. No entanto, quando perguntado "O Senhor(a) sentiu diferença no comportamento da criança que você está acompanhando na presença dos palhaços (Ela ficou mais tranquila?)" 77,3% reportaram que "Sim". Ademais, quando perguntado aos pais "O (A) senhor (a) acha que sua criança gostaria que houvesse sempre a interação com os palhaços?", "O senhor(a) gostaria que tivesse interações com palhaços em outros serviços de saúde" e "O Senhor (a) acredita que a palhaçoterapia ajuda as crianças a perderem o medo de ir ao médico ou ficarem menos estressadas" as respostas foram 100% positivas para essas perguntas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A interação das crianças com os palhaços foi extremamente satisfatória, todos os participantes interagiram bem, participando de brincadeiras ou apenas conversando e interagindo de maneira lúdica. Os pais que responderam a pesquisas demonstraram bastantes satisfeitos e tranquilos em relação ao projeto, todos acreditam na eficiência da palhaçoterapia como uma ótima opção para aliviar o estresse e o temor das crianças em volta das consultas médicas e em outros serviços de saúde. Além de transformar o ambiente de espera em um local menos tedioso facilitando assim um alívio para os pais e médicos que receberiam o paciente inquieto e impaciente, estando a criança calma e alegre.			
<b>REFERENCIAS</b>	Isaacs D. Clowns and clown doctors. J Paediatr Child Health. 2021 Dec;57(12):1844-1846. Alcântara PL, Wogel AZ, Rossi MI, Neves IR, Sabates AL, Puggina AC. Effect of interaction with clowns on vital signs and non-verbal communication of hospitalized children. Rev Paul Pediatr. 2016 Dec;34(4):432-438. Catapan SC, Oliveira WF, Rotta TM. Palhaçoterapia em ambiente hospitalar: uma revisão de literatura [Clown therapy in the hospital setting: A review of the literature]. Cien Saude Colet. 2019 Sep 9;24(9):3417-3429.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14811	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4526929 - REBECA BRESSAN PAIXAO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	A INFLUÊNCIA DA PALHAÇOTERAPIA NO ATENDIMENTO INFANTIL AMBULATORIAL			
<b>INTRODUCAO</b>	A palhaçoterapia ou terapia do riso é uma ferramenta que pode ser utilizada no ambiente de saúde para diminuir a tensão e tornar o ambiente mais alegre, no Brasil, essa prática foi inserida por Wellington Nogueira, em 1991, quando fundou o grupo "Doutores da Alegria".			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a influência da palhaçoterapia no atendimento infantil no ambiente ambulatorial, demonstrar se a intervenção lúdica é capaz de diminuir o medo e estresse das crianças durante as consultas. Explicar como pode ser considerado a palhaçoterapia como terapia não farmacológica no alívio da ansiedade no decorrer do atendimento. Avaliar se a intervenção terapêutica é aceita pelo público alvo (infantil).			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa transversal de avaliação da percepção dos pais e/ou responsáveis legais sobre sua criança, intervenção lúdica dos palhaços no ambulatório de pediatria, seguida de formulário para avaliação do impacto da intervenção.			
<b>RESULTADO S</b>	O formulário foi aplicado aos pais de crianças de variadas idades (2 a 11 anos), sendo 77,3% do gênero masculino e 22,7% do gênero feminino. Ao questionar os genitores sobre "Fica estressado quando vai na consulta pediátrica" 72% disseram que "Não" ficam estressados. No entanto, quando perguntado "O Senhor(a) sentiu diferença no comportamento da criança que você está acompanhando na presença dos palhaços (Ela ficou mais tranquila?)" 77,3% reportaram que "Sim". Ademais, quando perguntado aos pais "O (A) senhor (a) acha que sua criança gostaria que houvesse sempre a interação com os palhaços?", "O senhor(a) gostaria que tivesse interações com palhaços em outros serviços de saúde" e "O Senhor (a) acredita que a palhaçoterapia ajuda as crianças a perderem o medo de ir ao médico ou ficarem menos estressadas" as respostas foram 100% positivas para essas perguntas.			
<b>CONCLUSOES</b>	A interação das crianças com os palhaços foi extremamente satisfatória, todos os participantes interagiram bem, participando de brincadeiras ou apenas conversando e interagindo de maneira lúdica. Os pais que responderam a pesquisas demonstraram bastantes satisfeitos e tranquilos em relação ao projeto, todos acreditam na eficiência da palhaçoterapia como uma ótima opção para aliviar o estresse e o temor das crianças em volta das consultas médicas e em outros serviços de saúde. Além de transformar o ambiente de espera em um local menos tedioso facilitando assim um alívio para os pais e médicos que receberiam o paciente inquieto e impaciente, estando a criança calma e alegre.			
<b>REFERENCIAS</b>	Isaacs D. Clowns and clown doctors. J Paediatr Child Health. 2021 Dec;57(12):1844-1846. Alcântara PL, Wogel AZ, Rossi MI, Neves IR, Sabates AL, Puggina AC. Effect of interaction with clowns on vital signs and non-verbal communication of hospitalized children. Rev Paul Pediatr. 2016 Dec;34(4):432-438. Catapan SC, Oliveira WF, Rotta TM. Palhaçoterapia em ambiente hospitalar: uma revisão de literatura [Clown therapy in the hospital setting: A review of the literature]. Cien Saude Colet. 2019 Sep 9;24(9):3417-3429.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14812	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3168981 - LUANA LOPES PATENTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Achado laboratorial de microfíliaras de <i>Dirofilaria immitis</i> em paciente canino.			
<b>INTRODUCA O</b>	A dirofilariose é uma zoonose causada pelo nematódeo <i>Dirofilaria immitis</i> , acometendo principalmente os canídeos. É transmitida por picada de mosquitos, sendo endêmica em áreas tropicais e úmidas, onde há hospedeiros reservatórios silvestres e condições favoráveis para a reprodução dos mosquitos. Os vermes adultos se alojam no lado direito do coração e nos vasos adjacentes, liberando microfíliaras para a circulação. A gravidade dos sinais clínicos é variável, tendo relação com a carga parasitária, a duração da infecção e a resistência individual. Em pacientes pouco sintomáticos, a detecção de microfíliaras no sangue pode ser a única indicação da doença.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o diagnóstico laboratorial de microfíliarêmia sugerindo dirofilariose em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino macho, SRD, de 14 anos, com queixa inicial de prostração e hiporexia perdurando uma semana. Tutor relatou que o paciente costumava acompanhá-lo em seu serviço com barcos na represa. Negou fazer controle de ectoparasitas e vermifugações. O exame físico constatou taquipneia e frequência cardíaca normal sem alterações à auscultação pulmonar e cardíaca. Foram solicitados exames para maiores esclarecimentos do quadro.			
<b>RESULTADO S</b>	Em hemograma, o paciente apresentou anemia discreta normocítica e normocrômica com hematócrito 37% (referência: 38-50%) e neutrofilia 13833/uL (3500-12800/uL). No esfregaço sanguíneo, foram detectadas numerosas microfíliaras. Para confirmação, foram realizadas as técnicas da gota espessa e avaliação microscópica do tubo de microhematócrito, constatando-se grande quantidade de parasitos. Foi realizado teste de Knott modificado para avaliação morfológica das microfíliaras, constatando-se estrutura e extremidade caudal retas, sugestivas de <i>Dirofilaria immitis</i> . Foram recomendadas a realização de PCR e ecocardiograma para confirmação de diagnóstico. No entanto, por motivos financeiros, o tutor solicitou a eutanásia do animal devido ao sofrimento progressivo e impossibilidade de realizar os tratamentos necessários. A dirofilariose é associada a regiões litorâneas de clima úmido e quente. Em regiões metropolitanas, pacientes acometidos frequentemente apresentam histórico de viagens para regiões de risco. As alterações laboratoriais podem ser correlacionadas com o quadro. A anemia pode ocorrer devido à hemólise decorrente da movimentação dos vermes, como também à supressão medular secundária à infecção crônica. Já, a neutrofilia está presente em até 80% dos cães com insuficiência cardíaca congestiva direita. Os exames para a detecção de microfíliaras foram essenciais, visto que o paciente apresentava sintomatologia inespecífica e o diagnóstico de dirofilariose não havia sido previamente considerado.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A dirofilariose é uma zoonose de importância pública e deve ser lembrada como um diagnóstico diferencial em pacientes cujo histórico indique visitas a áreas de risco. Os exames específicos para a pesquisa de microfíliaras permite a detecção da doença em pacientes pouco sintomáticos, direcionando o diagnóstico e, se confirmado, permitindo o tratamento adequado, visando diminuir a quantidade de hospedeiros reservatórios de microfíliaras na população.			
<b>REFERENCIA S</b>	GREENE, CE. Doenças Infecciosas em Cães e Gatos. Grupo GEN, 2015. TAYLOR, MA; COOP, R.L.; WALL, R L. Parasitologia Veterinária, 4ª edição. Grupo GEN, 2017 REIFUR, L. Prevalência de filarioses em cães do litoral paranaense, Paraná, Brasil: Destaque para a <i>Dirofilaria immitis</i> . Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias), UFPR, 128p., 2000.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14812	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Achado laboratorial de microfírias de <i>Dirofilaria immitis</i> em paciente canino.			
<b>INTRODUCAO</b>	A dirofilariose é uma zoonose causada pelo nematódeo <i>Dirofilaria immitis</i> , acometendo principalmente os canídeos. É transmitida por picada de mosquitos, sendo endêmica em áreas tropicais e úmidas, onde há hospedeiros reservatórios silvestres e condições favoráveis para a reprodução dos mosquitos. Os vermes adultos se alojam no lado direito do coração e nos vasos adjacentes, liberando microfírias para a circulação. A gravidade dos sinais clínicos é variável, tendo relação com a carga parasitária, a duração da infecção e a resistência individual. Em pacientes pouco sintomáticos, a detecção de microfírias no sangue pode ser a única indicação da doença.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o diagnóstico laboratorial de microfíria sugerindo dirofilariose em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino macho, SRD, de 14 anos, com queixa inicial de prostração e hiporexia perdurando uma semana. Tutor relatou que o paciente costumava acompanhá-lo em seu serviço com barcos na represa. Negou fazer controle de ectoparasitas e vermifugações. O exame físico constatou taquipneia e frequência cardíaca normal sem alterações à auscultação pulmonar e cardíaca. Foram solicitados exames para maiores esclarecimentos do quadro.			
<b>RESULTADOS</b>	Em hemograma, o paciente apresentou anemia discreta normocítica e normocrômica com hematócrito 37% (referência: 38-50%) e neutrofilia 13833/uL (3500-12800/uL). No esfregaço sanguíneo, foram detectadas numerosas microfírias. Para confirmação, foram realizadas as técnicas da gota espessa e avaliação microscópica do tubo de microhematócrito, constatando-se grande quantidade de parasitos. Foi realizado teste de Knott modificado para avaliação morfológica das microfírias, constatando-se estrutura e extremidade caudal retas, sugestivas de <i>Dirofilaria immitis</i> . Foram recomendadas a realização de PCR e ecocardiograma para confirmação de diagnóstico. No entanto, por motivos financeiros, o tutor solicitou a eutanásia do animal devido ao sofrimento progressivo e impossibilidade de realizar os tratamentos necessários. A dirofilariose é associada a regiões litorâneas de clima úmido e quente. Em regiões metropolitanas, pacientes acometidos frequentemente apresentam histórico de viagens para regiões de risco. As alterações laboratoriais podem ser correlacionadas com o quadro. A anemia pode ocorrer devido à hemólise decorrente da movimentação dos vermes, como também à supressão medular secundária à infecção crônica. Já, a neutrofilia está presente em até 80% dos cães com insuficiência cardíaca congestiva direita. Os exames para a detecção de microfírias foram essenciais, visto que o paciente apresentava sintomatologia inespecífica e o diagnóstico de dirofilariose não havia sido previamente considerado.			
<b>CONCLUSOES</b>	A dirofilariose é uma zoonose de importância pública e deve ser lembrada como um diagnóstico diferencial em pacientes cujo histórico indique visitas a áreas de risco. Os exames específicos para a pesquisa de microfírias permite a detecção da doença em pacientes pouco sintomáticos, direcionando o diagnóstico e, se confirmado, permitindo o tratamento adequado, visando diminuir a quantidade de hospedeiros reservatórios de microfírias na população.			
<b>REFERENCIAS</b>	GREENE, CE. Doenças Infecciosas em Cães e Gatos. Grupo GEN, 2015. TAYLOR, MA; COOP, R.L.; WALL, R L. Parasitologia Veterinária, 4ª edição. Grupo GEN, 2017 REIFUR, L. Prevalência de filarioses em cães do litoral paranaense, Paraná, Brasil: Destaque para a <i>Dirofilaria immitis</i> . Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias), UFPR, 128p., 2000.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14812	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4441621 - LOHRANA CARVALHO SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Achado laboratorial de microfilárias de <i>Dirofilaria immitis</i> em paciente canino.			
<b>INTRODUCAO</b>	A dirofilariose é uma zoonose causada pelo nematódeo <i>Dirofilaria immitis</i> , acometendo principalmente os canídeos. É transmitida por picada de mosquitos, sendo endêmica em áreas tropicais e úmidas, onde há hospedeiros reservatórios silvestres e condições favoráveis para a reprodução dos mosquitos. Os vermes adultos se alojam no lado direito do coração e nos vasos adjacentes, liberando microfilárias para a circulação. A gravidade dos sinais clínicos é variável, tendo relação com a carga parasitária, a duração da infecção e a resistência individual. Em pacientes pouco sintomáticos, a detecção de microfilárias no sangue pode ser a única indicação da doença.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o diagnóstico laboratorial de microfilaremia sugerindo dirofilariose em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino macho, SRD, de 14 anos, com queixa inicial de prostração e hiporexia perdurando uma semana. Tutor relatou que o paciente costumava acompanhá-lo em seu serviço com barcos na represa. Negou fazer controle de ectoparasitas e vermifugações. O exame físico constatou taquipneia e frequência cardíaca normal sem alterações à auscultação pulmonar e cardíaca. Foram solicitados exames para maiores esclarecimentos do quadro.			
<b>RESULTADOS</b>	Em hemograma, o paciente apresentou anemia discreta normocítica e normocrômica com hematócrito 37% (referência: 38-50%) e neutrofilia 13833/uL (3500-12800/uL). No esfregaço sanguíneo, foram detectadas numerosas microfilárias. Para confirmação, foram realizadas as técnicas da gota espessa e avaliação microscópica do tubo de microhematócrito, constatando-se grande quantidade de parasitos. Foi realizado teste de Knott modificado para avaliação morfológica das microfilárias, constatando-se estrutura e extremidade caudal retas, sugestivas de <i>Dirofilaria immitis</i> . Foram recomendadas a realização de PCR e ecocardiograma para confirmação de diagnóstico. No entanto, por motivos financeiros, o tutor solicitou a eutanásia do animal devido ao sofrimento progressivo e impossibilidade de realizar os tratamentos necessários. A dirofilariose é associada a regiões litorâneas de clima úmido e quente. Em regiões metropolitanas, pacientes acometidos frequentemente apresentam histórico de viagens para regiões de risco. As alterações laboratoriais podem ser correlacionadas com o quadro. A anemia pode ocorrer devido à hemólise decorrente da movimentação dos vermes, como também à supressão medular secundária à infecção crônica. Já, a neutrofilia está presente em até 80% dos cães com insuficiência cardíaca congestiva direita. Os exames para a detecção de microfilárias foram essenciais, visto que o paciente apresentava sintomatologia inespecífica e o diagnóstico de dirofilariose não havia sido previamente considerado.			
<b>CONCLUSOES</b>	A dirofilariose é uma zoonose de importância pública e deve ser lembrada como um diagnóstico diferencial em pacientes cujo histórico indique visitas a áreas de risco. Os exames específicos para a pesquisa de microfilarias permite a detecção da doença em pacientes pouco sintomáticos, direcionando o diagnóstico e, se confirmado, permitindo o tratamento adequado, visando diminuir a quantidade de hospedeiros reservatórios de microfilárias na população.			
<b>REFERENCIAS</b>	GREENE, CE. Doenças Infecciosas em Cães e Gatos. Grupo GEN, 2015. TAYLOR, MA; COOP, R.L.; WALL, R L. Parasitologia Veterinária, 4ª edição. Grupo GEN, 2017 REIFUR, L. Prevalência de filarioses em cães do litoral paranaense, Paraná, Brasil: Destaque para a <i>Dirofilaria immitis</i> . Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias), UFPR, 128p., 2000.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14813	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4631153 - NUBIA MARTINS SILVA DE ALMEIDA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		KAIQUE ARRIEL
<b>TITULO</b>	Relato de caso de esporotricose em paciente pós contato com felino			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A esporotricose é uma doença zoonótica, causada por fungos dimórficos do gênero <i>Sporothrix</i> que apresenta evolução subaguda a crônica e é considerada a micose subcutânea mais frequente na América Latina. Existem várias formas clínicas, sendo as mais frequentes a cutânea fixa e a cutâneo-linfática. A espécie <i>Sporothrix schenckii</i> é encontrada na vegetação viva ou decomposição, nos excrementos de animais e no solo. A espécie <i>Sporothrix brasiliensis</i> só foi identificada em 2007 e incluída no clado patogênico do gênero <i>Sporothrix</i>. Antes da descrição das novas espécies crípticas patogênicas, a esporotricose era atribuída a um único agente etiológico, <i>Sporothrix schenckii</i>, conhecido como um patógeno fúngico de baixa virulência. Recentemente, surtos da doença no Brasil estão sendo associados ao <i>Sporothrix brasiliensis</i> com transmissão zoonótica, principalmente pelos felinos</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar um relato de caso de transmissão zoonótica de esporotricose em paciente atendida no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro (UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a cultura foi realizado, inicialmente, o macrocultivo em Ágar Sabouraud com Cloranfenicol e ciclohexamida. A placa foi mantida por 21 dias a 25°C e observou-se crescimento de uma colônia filamentososa branca com centro escuro. Da colônia crescida no macrocultivo foi coletada a amostra para a realização do microcultivo em ágar batata			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Trata-se de paciente do sexo feminino, 66 anos, apresentando no dorso da mão direita e dorso da mão do antebraço esquerdo, nódulos eritematosos ulcerados e com drenagem de secreção purulenta, além de nódulos eritematosos em aspecto de rosário no trajeto linfático regional ascendente em ambos os membros superiores. A paciente referia que as lesões no membro superior direito tiveram início há cerca de 6 semanas após ter sofrido arranhadura por gato adotado recentemente da rua, e, as do membro superior esquerdo tiveram início há cerca de 4 semanas após arranhadura de gato próprio, até então saudável mas que foi colocado em convívio com o gato adotado recentemente. Referia ainda que as lesões iniciaram em forma de pústula no local da arranhadura e posteriormente se disseminaram pelos membros superiores em trajeto linear, se tornando nódulos e supurando. Diante da suspeita clínico-epidemiológica do diagnóstico de esporotricose cutâneo-linfática foi realizada uma biópsia de uma lesão ulcerada, com envio do material para estudo anatomopatológico e para cultura de fungos realizada no laboratório de pesquisa da UNISA. A análise das lâminas do microcultivo revelou estruturas com hifas septadas, ramificadas e na extremidade dos conidióforos, conídios ovalados ou arredondados em arranjos de margarida, características dos fungos do gênero <i>Sporothrix</i>, confirmando o diagnóstico. Posteriormente o laudo do estudo anatomopatológico também revelou alterações histológicas compatíveis com o diagnóstico de esporotricose.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Este foi um caso de esporotricose cutâneo linfática atendido no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro, contribuindo para chamar atenção a esta epidemia de transmissão zoonótica que vem atingindo a cidade de São Paulo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Alvarez, C.M et al., Microorganisms. 2022 Nov; 10(11): 2152 Gremião I.D.F. et al., Braz J Microbiol. 2021 Mar; 52(1): 107–124 <a href="https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144">https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14813	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4665023 - ALEFER PEREIRA DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		KAIQUE ARRIEL
<b>TITULO</b>	Relato de caso de esporotricose em paciente pós contato com felino			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A esporotricose é uma doença zoonótica, causada por fungos dimórficos do gênero <i>Sporothrix</i> que apresenta evolução subaguda a crônica e é considerada a micose subcutânea mais frequente na América Latina. Existem várias formas clínicas, sendo as mais frequentes a cutânea fixa e a cutâneo-linfática. A espécie <i>Sporothrix schenckii</i> é encontrada na vegetação viva ou decomposição, nos excrementos de animais e no solo. A espécie <i>Sporothrix brasiliensis</i> só foi identificada em 2007 e incluída no clado patogênico do gênero <i>Sporothrix</i>. Antes da descrição das novas espécies crípticas patogênicas, a esporotricose era atribuída a um único agente etiológico, <i>Sporothrix schenckii</i>, conhecido como um patógeno fúngico de baixa virulência. Recentemente, surtos da doença no Brasil estão sendo associados ao <i>Sporothrix brasiliensis</i> com transmissão zoonótica, principalmente pelos felinos</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar um relato de caso de transmissão zoonótica de esporotricose em paciente atendida no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro (UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a cultura foi realizado, inicialmente, o macrocultivo em Ágar Sabouraud com Cloranfenicol e ciclohexamida. A placa foi mantida por 21 dias a 25°C e observou-se crescimento de uma colônia filamentososa branca com centro escuro. Da colônia crescida no macrocultivo foi coletada a amostra para a realização do microcultivo em ágar batata			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Trata-se de paciente do sexo feminino, 66 anos, apresentando no dorso da mão direita e dorso da mão do antebraço esquerdo, nódulos eritematosos ulcerados e com drenagem de secreção purulenta, além de nódulos eritematosos em aspecto de rosário no trajeto linfático regional ascendente em ambos os membros superiores. A paciente referia que as lesões no membro superior direito tiveram início há cerca de 6 semanas após ter sofrido arranhadura por gato adotado recentemente da rua, e, as do membro superior esquerdo tiveram início há cerca de 4 semanas após arranhadura de gato próprio, até então saudável mas que foi colocado em convívio com o gato adotado recentemente. Referia ainda que as lesões iniciaram em forma de pústula no local da arranhadura e posteriormente se disseminaram pelos membros superiores em trajeto linear, se tornando nódulos e supurando. Diante da suspeita clínico-epidemiológica do diagnóstico de esporotricose cutâneo-linfática foi realizada uma biópsia de uma lesão ulcerada, com envio do material para estudo anatomopatológico e para cultura de fungos realizada no laboratório de pesquisa da UNISA. A análise das lâminas do microcultivo revelou estruturas com hifas septadas, ramificadas e na extremidade dos conidióforos, conídios ovalados ou arredondados em arranjos de margarida, características dos fungos do gênero <i>Sporothrix</i>, confirmando o diagnóstico. Posteriormente o laudo do estudo anatomopatológico também revelou alterações histológicas compatíveis com o diagnóstico de esporotricose.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este foi um caso de esporotricose cutâneo linfática atendido no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro, contribuindo para chamar atenção a esta epidemia de transmissão zoonótica que vem atingindo a cidade de São Paulo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Alvarez, C.M et al., Microorganisms. 2022 Nov; 10(11): 2152 Gremião I.D.F. et al., Braz J Microbiol. 2021 Mar; 52(1): 107–124 <a href="https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144">https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14813	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4730569 - THAIS KOHATSU YANASE	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		KAIQUE ARRIEL
<b>TITULO</b>	Relato de caso de esporotricose em paciente pós contato com felino			
<b>INTRODUCA O</b>	A esporotricose é uma doença zoonótica, causada por fungos dimórficos do gênero <i>Sporothrix</i> que apresenta evolução subaguda a crônica e é considerada a micose subcutânea mais frequente na América Latina. Existem várias formas clínicas, sendo as mais frequentes a cutânea fixa e a cutâneo-linfática. A espécie <i>Sporothrix schenckii</i> é encontrada na vegetação viva ou decomposição, nos excrementos de animais e no solo. A espécie <i>Sporothrix brasiliensis</i> só foi identificada em 2007 e incluída no clado patogênico do gênero <i>Sporothrix</i> . Antes da descrição das novas espécies crípticas patogênicas, a esporotricose era atribuída a um único agente etiológico, <i>Sporothrix schenckii</i> , conhecido como um patógeno fúngico de baixa virulência. Recentemente, surtos da doença no Brasil estão sendo associados ao <i>Sporothrix brasiliensis</i> com transmissão zoonótica, principalmente pelos felinos			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar um relato de caso de transmissão zoonótica de esporotricose em paciente atendida no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro (UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a cultura foi realizado, inicialmente, o macrocultivo em Ágar Sabouraud com Cloranfenicol e ciclohexamida. A placa foi mantida por 21 dias a 25°C e observou-se crescimento de uma colônia filamentososa branca com centro escuro. Da colônia crescida no macrocultivo foi coletada a amostra para a realização do microcultivo em ágar batata			
<b>RESULTADO S</b>	Trata-se de paciente do sexo feminino, 66 anos, apresentando no dorso da mão direita e dorso da mão do antebraço esquerdo, nódulos eritematosos ulcerados e com drenagem de secreção purulenta, além de nódulos eritematosos em aspecto de rosário no trajeto linfático regional ascendente em ambos os membros superiores. A paciente referia que as lesões no membro superior direito tiveram início há cerca de 6 semanas após ter sofrido arranhadura por gato adotado recentemente da rua, e, as do membro superior esquerdo tiveram início há cerca de 4 semanas após arranhadura de gato próprio, até então saudável mas que foi colocado em convívio com o gato adotado recentemente. Referia ainda que as lesões iniciaram em forma de pústula no local da arranhadura e posteriormente se disseminaram pelos membros superiores em trajeto linear, se tornando nódulos e supurando. Diante da suspeita clínico-epidemiológica do diagnóstico de esporotricose cutâneo-linfática foi realizada uma biópsia de uma lesão ulcerada, com envio do material para estudo anatomopatológico e para cultura de fungos realizada no laboratório de pesquisa da UNISA. A análise das lâminas do microcultivo revelou estruturas com hifas septadas, ramificadas e na extremidade dos conidióforos, conídios ovalados ou arredondados em arranjos de margarida, características dos fungos do gênero <i>Sporothrix</i> , confirmando o diagnóstico. Posteriormente o laudo do estudo anatomopatológico também revelou alterações histológicas compatíveis com o diagnóstico de esporotricose.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este foi um caso de esporotricose cutâneo linfática atendido no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro, contribuindo para chamar atenção a esta epidemia de transmissão zoonótica que vem atingindo a cidade de São Paulo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Alvarez, C.M et al., Microorganisms. 2022 Nov; 10(11): 2152 Gremião I.D.F. et al., Braz J Microbiol. 2021 Mar; 52(1): 107–124 <a href="https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144">https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14813	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4936973 - HELOISE MARANGONI COUTINHO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marina Tiemi Shio		KAIQUE ARRIEL
<b>TITULO</b>	Relato de caso de esporotricose em paciente pós contato com felino			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A esporotricose é uma doença zoonótica, causada por fungos dimórficos do gênero <i>Sporothrix</i> que apresenta evolução subaguda a crônica e é considerada a micose subcutânea mais frequente na América Latina. Existem várias formas clínicas, sendo as mais frequentes a cutânea fixa e a cutâneo-linfática. A espécie <i>Sporothrix schenckii</i> é encontrada na vegetação viva ou decomposição, nos excrementos de animais e no solo. A espécie <i>Sporothrix brasiliensis</i> só foi identificada em 2007 e incluída no clado patogênico do gênero <i>Sporothrix</i>. Antes da descrição das novas espécies crípticas patogênicas, a esporotricose era atribuída a um único agente etiológico, <i>Sporothrix schenckii</i>, conhecido como um patógeno fúngico de baixa virulência. Recentemente, surtos da doença no Brasil estão sendo associados ao <i>Sporothrix brasiliensis</i> com transmissão zoonótica, principalmente pelos felinos</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar um relato de caso de transmissão zoonótica de esporotricose em paciente atendida no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro (UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Para a cultura foi realizado, inicialmente, o macrocultivo em Ágar Sabouraud com Cloranfenicol e ciclohexamida. A placa foi mantida por 21 dias a 25°C e observou-se crescimento de uma colônia filamentosa branca com centro escuro. Da colônia crescida no macrocultivo foi coletada a amostra para a realização do microcultivo em ágar batata			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Trata-se de paciente do sexo feminino, 66 anos, apresentando no dorso da mão direita e dorso da mão do antebraço esquerdo, nódulos eritematosos ulcerados e com drenagem de secreção purulenta, além de nódulos eritematosos em aspecto de rosário no trajeto linfático regional ascendente em ambos os membros superiores. A paciente referia que as lesões no membro superior direito tiveram início há cerca de 6 semanas após ter sofrido arranhadura por gato adotado recentemente da rua, e, as do membro superior esquerdo tiveram início há cerca de 4 semanas após arranhadura de gato próprio, até então saudável mas que foi colocado em convívio com o gato adotado recentemente. Referia ainda que as lesões iniciaram em forma de pústula no local da arranhadura e posteriormente se disseminaram pelos membros superiores em trajeto linear, se tornando nódulos e supurando. Diante da suspeita clínico-epidemiológica do diagnóstico de esporotricose cutâneo-linfática foi realizada uma biópsia de uma lesão ulcerada, com envio do material para estudo anatomopatológico e para cultura de fungos realizada no laboratório de pesquisa da UNISA. A análise das lâminas do microcultivo revelou estruturas com hifas septadas, ramificadas e na extremidade dos conidióforos, conídios ovalados ou arredondados em arranjos de margarida, características dos fungos do gênero <i>Sporothrix</i>, confirmando o diagnóstico. Posteriormente o laudo do estudo anatomopatológico também revelou alterações histológicas compatíveis com o diagnóstico de esporotricose.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	Este foi um caso de esporotricose cutâneo linfática atendido no ambulatório de dermatologia da Universidade Santo Amaro, contribuindo para chamar atenção a esta epidemia de transmissão zoonótica que vem atingindo a cidade de São Paulo.			
<b>REFERENCIAS</b>	Alvarez, C.M et al., Microorganisms. 2022 Nov; 10(11): 2152 Gremião I.D.F. et al., Braz J Microbiol. 2021 Mar; 52(1): 107–124 <a href="https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144">https://www.anaisdermatologia.org.br/pt-esporotricose-humana-recomendacoes-da-sociedade-articulo-S2666275222002144</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14814	Medicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4313500 - GABRIELA SUCENA PASTORE	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral	RICARDO SIUFI MAGALHÃES, ANTONIO CARLOS GOMES DE BARROS JÚNIOR	
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico da doença pulmonar obstrutiva crônica em pacientes de um ambulatório de especialidades de São Paulo			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença pulmonar caracterizada pela condição pulmonar heterogênea caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, como dispneia, tosse e escarro, por causa de anormalidades nas vias aéreas. Se trata de uma doença prevenível e tratável, sendo a principal causa o tabagismo, mas não podemos excluir as causas não tabagistas, além disso, existem diferenças entre tabagistas com a mesma carga tabágica, sugerindo que fatores intrínsecos modificam o risco de desenvolver DPOC, bem como a apresentação clínica, que depende da interação entre os fatores individuais e ambientais como a queima de biomassa e o uso de fogão à lenha.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil sócio-epidemiológico, a adesão dos pacientes ao tratamento além de histórico de exacerbações hospitalares e não hospitalares, em um hospital escola de especialidades de São Paulo/SP.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo/documental, no qual foram analisados 165 prontuários do Hospital Escola de Especialidades de São Paulo/SP, e destes, 33 foram utilizados para a coleta de dados. Após a coleta de dados, foi realizada uma comparação com gráficos de todo o material analisado.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi possível identificar que os pacientes mais cometidos e com maior taxa tabágica foram do sexo feminino, dado isso pode-se levantar um questionamento se realmente a prevalência está entre o sexo feminino ou os pacientes do sexo masculino não buscam o serviço. Notou-se também a prevalência da tríade de sintomas da DPOC, sendo a dispneia a mais relatada nos prontuários. A respeito do tabagismo, majoritariamente os pacientes possuíam histórico e carga tabágica média de 30 anos/maço, mas também encontramos pacientes com outros antecedentes, como por exemplo, contato com fogão a lenha. O que torna a contabilização da carga tabágica mais difícil, principalmente de formas indiretas de tabagismo como o tabagismo passivo. Aproximadamente 60% dos pacientes apresentavam antecedentes ocupacionais para a evolução de uma DPOC. Há representativa adesão à terapia farmacológica nos pacientes que realizam seguimento no ambulatório. A espirometria só foi realizada em 42,4% dos pacientes. A média de carga tabágica foi de 30 anos / Maço e também em 8 prontuários não constava a carga, sendo um dado relevante se tratando de DPOC. A exacerbação hospitalar foi constatada em 57% dos pacientes. A partir desse cenário, foi proposto a implantação de ficha de DPOC para o ambulatório, além da indicação de compra de um equipamento de espirometria.			
<b>CONCLUSOES</b>	É importante ressaltar que é indicado a aquisição de um aparelho de espirometria para o serviço do hospital escola, dado ao expressivo número de pacientes que precisam realizar o exame e a facilidade em obtenção dos resultados, uma questão além das doenças obstrutivas, mas um ganho ao serviço ambulatorial.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARDOSO, A. P. Exacerbação da DPOC. Pulmão RJ, v. 22, n. 2, p. 60-64, 2013. CERQUEIRA-RAMOS, A. T. S.; CREPALDI, A. L. Qualidade de vida em doenças pulmonares crônicas: aspectos conceituais e metodológicos. J Pneumol v. 26, n.4, 2000. COSTA, C. H.; RUFINO, R.; Quando devemos usar CI na DPOC?. Pulmão RJ, 26(1):15-18, 2017. CRUZ, M. M.; PEREIRA, M.; Epidemiologia da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no Brasil: uma revisão sistemática e metanálise. Ciência (#38) Saúde Coletiva, v. 25, n. 11, p. 4547 - 4557, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14814	Medicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317441 - GABRIELA BIZARRI FLUMIGNAN	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcelo Andreetta Corral	RICARDO SIUFI MAGALHÃES, ANTONIO CARLOS GOMES DE BARROS JÚNIOR	
<b>TITULO</b>	Perfil epidemiológico da doença pulmonar obstrutiva crônica em pacientes de um ambulatório de especialidades de São Paulo			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença pulmonar caracterizada pela condição pulmonar heterogênea caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, como dispneia, tosse e escarro, por causa de anormalidades nas vias aéreas. Se trata de uma doença prevenível e tratável, sendo a principal causa o tabagismo, mas não podemos excluir as causas não tabagistas, além disso, existem diferenças entre tabagistas com a mesma carga tabágica, sugerindo que fatores intrínsecos modificam o risco de desenvolver DPOC, bem como a apresentação clínica, que depende da interação entre os fatores individuais e ambientais como a queima de biomassa e o uso de fogão à lenha.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil sócio-epidemiológico, a adesão dos pacientes ao tratamento além de histórico de exacerbações hospitalares e não hospitalares, em um hospital escola de especialidades de São Paulo/SP.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo/documental, no qual foram analisados 165 prontuários do Hospital Escola de Especialidades de São Paulo/SP, e destes, 33 foram utilizados para a coleta de dados. Após a coleta de dados, foi realizada uma comparação com gráficos de todo o material analisado.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi possível identificar que os pacientes mais cometidos e com maior taxa tabágica foram do sexo feminino, dado isso pode-se levantar um questionamento se realmente a prevalência está entre o sexo feminino ou os pacientes do sexo masculino não buscam o serviço. Notou-se também a prevalência da tríade de sintomas da DPOC, sendo a dispneia a mais relatada nos prontuários. A respeito do tabagismo, majoritariamente os pacientes possuíam histórico e carga tabágica média de 30 anos/maço, mas também encontramos pacientes com outros antecedentes, como por exemplo, contato com fogão a lenha. O que torna a contabilização da carga tabágica mais difícil, principalmente de formas indiretas de tabagismo como o tabagismo passivo. Aproximadamente 60% dos pacientes apresentavam antecedentes ocupacionais para a evolução de uma DPOC. Há representativa adesão à terapia farmacológica nos pacientes que realizam seguimento no ambulatório. A espirometria só foi realizada em 42,4% dos pacientes. A média de carga tabágica foi de 30 anos / Maço e também em 8 prontuários não constava a carga, sendo um dado relevante se tratando de DPOC. A exacerbação hospitalar foi constatada em 57% dos pacientes. A partir desse cenário, foi proposto a implantação de ficha de DPOC para o ambulatório, além da indicação de compra de um equipamento de espirometria.			
<b>CONCLUSOES</b>	É importante ressaltar que é indicado a aquisição de um aparelho de espirometria para o serviço do hospital escola, dado ao expressivo número de pacientes que precisam realizar o exame e a facilidade em obtenção dos resultados, uma questão além das doenças obstrutivas, mas um ganho ao serviço ambulatorial.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARDOSO, A. P. Exacerbação da DPOC. Pulmão RJ, v. 22, n. 2, p. 60-64, 2013. CERQUEIRA-RAMOS, A. T. S.; CREPALDI, A. L. Qualidade de vida em doenças pulmonares crônicas: aspectos conceituais e metodológicos. J Pneumol v. 26, n.4, 2000. COSTA, C. H.; RUFINO, R.; Quando devemos usar CI na DPOC?. Pulmão RJ, 26(1):15-18, 2017. CRUZ, M. M.; PEREIRA, M.; Epidemiologia da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no Brasil: uma revisão sistemática e metanálise. Ciência (#38) Saúde Coletiva, v. 25, n. 11, p. 4547 - 4557, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14816	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3534634 - GIOVANNA FUNISCELLO DE SOUSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	ALMIR FELICIO ELOY JÚNIOR
<b>TITULO</b>	COMUNICAÇÃO ORONASAL EM PACIENTE CANINO ASSOCIADO À CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM PALATO DURO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As fistulas oronasais são comunicações anormais entre a cavidade oral e nasal, ocasionadas por: doença periodontal avançada, extrações dentárias inadequadas, entre outras causas. Em cães, causam diversas alterações clínicas como: espirros, secreções nasais, rinites, sinusites, infecções no trato respiratório inferior. São de difícil resolução quando estão associadas à periodontites crônicas, gerando inflamação e redução do tecido saudável adjacente. A deiscência de pontos é a principal complicação pós-operatória, causada pela tensão da sutura e contaminação, gerando recidiva. É preconizado no tratamento propiciar cicatrização e restauração da função, com diferentes técnicas descritas em literatura. É sabido que não há um método de tratamento que sirva a todos os tipos de fistulas, assim, a escolha baseia-se na localização e extensão do defeito, e viabilidade do tecido adjacente.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso clínico de paciente canino, atendido no Hovet UNISA, com comunicação oronasal devido Carcinoma de Células Escamosas, e possível técnica cirúrgica a ser empregada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Um paciente canino, macho, da raça Dachshund, com quatorze anos, foi atendido com queixa de apatia, hiporexia, tosses e espirros, o animal já havia passado por duas cirurgias odontológicas em colega nos últimos dois anos. O animal apresentava algia oral, halitose, severa doença periodontal, lesões ulcerativas crônicas em palato duro caudal fazendo comunicação oronasal com inflamação, e linfonodos submandibulares reativos. Foi realizada cirurgia para o fechamento da comunicação oronasal com flap rotacional da porção rostral, bem como extração dos elementos dentários comprometidos; realizada também biópsia incisional do palato duro e esofagostomia. O paciente retornou após sete dias, com secreção nasal serosa bilateral, e foi liberado alimentação pastosa por via oral, porém o animal voltou a se alimentar espontaneamente após 13 dias, retornando no Hovet no dia seguinte com importante desidratação. Após sedação, constatou-se deiscência dos pontos em palato duro, com menor comunicação oronasal quando comparada ao atendimento inicial. Optou-se em aguardar de 60 a 90 dias para reavaliação de nova tentativa de correção da fistula, com o intuito de reepitelização e revascularização do tecido. Nesse período a alimentação será prioritariamente via tubo esofágico. Em conjunto a isso constatou-se no exame histopatológico do palato duro o diagnóstico de carcinoma de células escamosas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As fistulas oronasais são de grande frequência na clínica de pequenos animais, e a seleção do tipo de técnica corretiva pode variar, não isentando a possibilidade de deiscência dos pontos e recidiva do quadro. Associado a isso, observamos maiores taxas de complicação quando esta afecção se apresenta em conjunto com neoplasias, como o carcinoma de células escamosas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Giosso MA. Odontologia Veterinária para o clínico de pequenos animais. 2ª ed. São Paulo: Minha Editora, 2007. Nogueira RM. Fistula oronasal em cão: reparo com flape simples associado a fator proteico angiogênico purificado do látex de seringueira, veiculado com matriz de esponja de colágeno: estudo experimental. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009. Dissertação (mestrado). Slatter DH. Manual de cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Ed. Manole, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14816	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3540065 - SANDRO SCHERER	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	ALMIR FELICIO ELOY JÚNIOR
<b>TITULO</b>	COMUNICAÇÃO ORONASAL EM PACIENTE CANINO ASSOCIADO À CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM PALATO DURO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As fistulas oronasais são comunicações anormais entre a cavidade oral e nasal, ocasionadas por: doença periodontal avançada, extrações dentárias inadequadas, entre outras causas. Em cães, causam diversas alterações clínicas como: espirros, secreções nasais, rinites, sinusites, infecções no trato respiratório inferior. São de difícil resolução quando estão associadas à periodontites crônicas, gerando inflamação e redução do tecido saudável adjacente. A deiscência de pontos é a principal complicação pós-operatória, causada pela tensão da sutura e contaminação, gerando recidiva. É preconizado no tratamento propiciar cicatrização e restauração da função, com diferentes técnicas descritas em literatura. É sabido que não há um método de tratamento que sirva a todos os tipos de fistulas, assim, a escolha baseia-se na localização e extensão do defeito, e viabilidade do tecido adjacente.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso clínico de paciente canino, atendido no Hovet UNISA, com comunicação oronasal devido Carcinoma de Células Escamosas, e possível técnica cirúrgica a ser empregada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Um paciente canino, macho, da raça Dachshund, com quatorze anos, foi atendido com queixa de apatia, hiporexia, tosses e espirros, o animal já havia passado por duas cirurgias odontológicas em coleira nos últimos dois anos. O animal apresentava algia oral, halitose, severa doença periodontal, lesões ulcerativas crônicas em palato duro caudal fazendo comunicação oronasal com inflamação, e linfonodos submandibulares reativos. Foi realizada cirurgia para o fechamento da comunicação oronasal com flap rotacional da porção rostral, bem como extração dos elementos dentários comprometidos; realizada também biópsia incisional do palato duro e esofagostomia. O paciente retornou após sete dias, com secreção nasal serosa bilateral, e foi liberado alimentação pastosa por via oral, porém o animal voltou a se alimentar espontaneamente após 13 dias, retornando no Hovet no dia seguinte com importante desidratação. Após sedação, constatou-se deiscência dos pontos em palato duro, com menor comunicação oronasal quando comparada ao atendimento inicial. Optou-se em aguardar de 60 a 90 dias para reavaliação de nova tentativa de correção da fistula, com o intuito de reepitelização e revascularização do tecido. Nesse período a alimentação será prioritariamente via tubo esofágico. Em conjunto a isso constatou-se no exame histopatológico do palato duro o diagnóstico de carcinoma de células escamosas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As fistulas oronasais são de grande frequência na clínica de pequenos animais, e a seleção do tipo de técnica corretiva pode variar, não isentando a possibilidade de deiscência dos pontos e recidiva do quadro. Associado a isso, observamos maiores taxas de complicação quando esta afecção se apresenta em conjunto com neoplasias, como o carcinoma de células escamosas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Giosso MA. Odontologia Veterinária para o clínico de pequenos animais. 2ª ed. São Paulo: Minha Editora, 2007. Nogueira RM. Fistula oronasal em cão: reparo com flape simples associado a fator proteico angiogênico purificado do látex de seringueira, veiculado com matriz de esponja de colágeno: estudo experimental. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009. Dissertação (mestrado). Slatter DH. Manual de cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Ed. Manole, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14816	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3656748 - GIULIA MARIA SPADARO TEIXEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	ALMIR FELICIO ELOY JÚNIOR
<b>TITULO</b>	COMUNICAÇÃO ORONASAL EM PACIENTE CANINO ASSOCIADO À CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM PALATO DURO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As fistulas oronasais são comunicações anormais entre a cavidade oral e nasal, ocasionadas por: doença periodontal avançada, extrações dentárias inadequadas, entre outras causas. Em cães, causam diversas alterações clínicas como: espirros, secreções nasais, rinites, sinusites, infecções no trato respiratório inferior. São de difícil resolução quando estão associadas à periodontites crônicas, gerando inflamação e redução do tecido saudável adjacente. A deiscência de pontos é a principal complicação pós-operatória, causada pela tensão da sutura e contaminação, gerando recidiva. É preconizado no tratamento propiciar cicatrização e restauração da função, com diferentes técnicas descritas em literatura. É sabido que não há um método de tratamento que sirva a todos os tipos de fistulas, assim, a escolha baseia-se na localização e extensão do defeito, e viabilidade do tecido adjacente.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso clínico de paciente canino, atendido no Hovet UNISA, com comunicação oronasal devido Carcinoma de Células Escamosas, e possível técnica cirúrgica a ser empregada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Um paciente canino, macho, da raça Dachshund, com quatorze anos, foi atendido com queixa de apatia, hiporexia, tosses e espirros, o animal já havia passado por duas cirurgias odontológicas em colega nos últimos dois anos. O animal apresentava algia oral, halitose, severa doença periodontal, lesões ulcerativas crônicas em palato duro caudal fazendo comunicação oronasal com inflamação, e linfonodos submandibulares reativos. Foi realizada cirurgia para o fechamento da comunicação oronasal com flap rotacional da porção rostral, bem como extração dos elementos dentários comprometidos; realizada também biópsia incisional do palato duro e esofagostomia. O paciente retornou após sete dias, com secreção nasal serosa bilateral, e foi liberado alimentação pastosa por via oral, porém o animal voltou a se alimentar espontaneamente após 13 dias, retornando no Hovet no dia seguinte com importante desidratação. Após sedação, constatou-se deiscência dos pontos em palato duro, com menor comunicação oronasal quando comparada ao atendimento inicial. Optou-se em aguardar de 60 a 90 dias para reavaliação de nova tentativa de correção da fistula, com o intuito de reepitelização e revascularização do tecido. Nesse período a alimentação será prioritariamente via tubo esofágico. Em conjunto a isso constatou-se no exame histopatológico do palato duro o diagnóstico de carcinoma de células escamosas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As fistulas oronasais são de grande frequência na clínica de pequenos animais, e a seleção do tipo de técnica corretiva pode variar, não isentando a possibilidade de deiscência dos pontos e recidiva do quadro. Associado a isso, observamos maiores taxas de complicação quando esta afecção se apresenta em conjunto com neoplasias, como o carcinoma de células escamosas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Giosso MA. Odontologia Veterinária para o clínico de pequenos animais. 2ª ed. São Paulo: Minha Editora, 2007. Nogueira RM. Fistula oronasal em cão: reparo com flape simples associado a fator proteico angiogênico purificado do látex de seringueira, veiculado com matriz de esponja de colágeno: estudo experimental. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009. Dissertação (mestrado). Slatter DH. Manual de cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Ed. Manole, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14816	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3667898 - LEONARDO DO NASCIMENTO LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	ALMIR FELICIO ELOY JUNIOR
<b>TITULO</b>	COMUNICAÇÃO ORONASAL EM PACIENTE CANINO ASSOCIADO À CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM PALATO DURO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>As fistulas oronasais são comunicações anormais entre a cavidade oral e nasal, ocasionadas por: doença periodontal avançada, extrações dentárias inadequadas, entre outras causas. Em cães, causam diversas alterações clínicas como: espirros, secreções nasais, rinites, sinusites, infecções no trato respiratório inferior. São de difícil resolução quando estão associadas à periodontites crônicas, gerando inflamação e redução do tecido saudável adjacente. A deiscência de pontos é a principal complicação pós-operatória, causada pela tensão da sutura e contaminação, gerando recidiva. É preconizado no tratamento propiciar cicatrização e restauração da função, com diferentes técnicas descritas em literatura. É sabido que não há um método de tratamento que sirva a todos os tipos de fistulas, assim, a escolha baseia-se na localização e extensão do defeito, e viabilidade do tecido adjacente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso clínico de paciente canino, atendido no Hovet UNISA, com comunicação oronasal devido Carcinoma de Células Escamosas, e possível técnica cirúrgica a ser empregada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Um paciente canino, macho, da raça Dachshund, com quatorze anos, foi atendido com queixa de apatia, hiporexia, tosses e espirros, o animal já havia passado por duas cirurgias odontológicas em colega nos últimos dois anos. O animal apresentava algia oral, halitose, severa doença periodontal, lesões ulcerativas crônicas em palato duro caudal fazendo comunicação oronasal com inflamação, e linfonodos submandibulares reativos. Foi realizada cirurgia para o fechamento da comunicação oronasal com flap rotacional da porção rostral, bem como extração dos elementos dentários comprometidos; realizada também biópsia incisional do palato duro e esofagostomia. O paciente retornou após sete dias, com secreção nasal serosa bilateral, e foi liberado alimentação pastosa por via oral, porém o animal voltou a se alimentar espontaneamente após 13 dias, retornando no Hovet no dia seguinte com importante desidratação. Após sedação, constatou-se deiscência dos pontos em palato duro, com menor comunicação oronasal quando comparada ao atendimento inicial. Optou-se em aguardar de 60 a 90 dias para reavaliação de nova tentativa de correção da fistula, com o intuito de reepitelização e revascularização do tecido. Nesse período a alimentação será prioritariamente via tubo esofágico. Em conjunto a isso constatou-se no exame histopatológico do palato duro o diagnóstico de carcinoma de células escamosas.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	As fistulas oronasais são de grande frequência na clínica de pequenos animais, e a seleção do tipo de técnica corretiva pode variar, não isentando a possibilidade de deiscência dos pontos e recidiva do quadro. Associado a isso, observamos maiores taxas de complicação quando esta afecção se apresenta em conjunto com neoplasias, como o carcinoma de células escamosas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>Giosso MA. Odontologia Veterinária para o clínico de pequenos animais. 2ª ed. São Paulo: Minha Editora, 2007. Nogueira RM. Fistula oronasal em cão: reparo com flape simples associado a fator proteico angiogênico purificado do látex de seringueira, veiculado com matriz de esponja de colágeno: estudo experimental. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009. Dissertação (mestrado). Slatter DH. Manual de cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Ed. Manole, 2007.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14816	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848110 - DANIELA SANTOS OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	ALMIR FELICIO ELOY JÚNIOR
<b>TITULO</b>	COMUNICAÇÃO ORONASAL EM PACIENTE CANINO ASSOCIADO À CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM PALATO DURO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As fistulas oronasais são comunicações anormais entre a cavidade oral e nasal, ocasionadas por: doença periodontal avançada, extrações dentárias inadequadas, entre outras causas. Em cães, causam diversas alterações clínicas como: espirros, secreções nasais, rinites, sinusites, infecções no trato respiratório inferior. São de difícil resolução quando estão associadas à periodontites crônicas, gerando inflamação e redução do tecido saudável adjacente. A deiscência de pontos é a principal complicação pós-operatória, causada pela tensão da sutura e contaminação, gerando recidiva. É preconizado no tratamento propiciar cicatrização e restauração da função, com diferentes técnicas descritas em literatura. É sabido que não há um método de tratamento que sirva a todos os tipos de fistulas, assim, a escolha baseia-se na localização e extensão do defeito, e viabilidade do tecido adjacente.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso clínico de paciente canino, atendido no Hovet UNISA, com comunicação oronasal devido Carcinoma de Células Escamosas, e possível técnica cirúrgica a ser empregada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Um paciente canino, macho, da raça Dachshund, com quatorze anos, foi atendido com queixa de apatia, hiporexia, tosses e espirros, o animal já havia passado por duas cirurgias odontológicas em colega nos últimos dois anos. O animal apresentava algia oral, halitose, severa doença periodontal, lesões ulcerativas crônicas em palato duro caudal fazendo comunicação oronasal com inflamação, e linfonodos submandibulares reativos. Foi realizada cirurgia para o fechamento da comunicação oronasal com flap rotacional da porção rostral, bem como extração dos elementos dentários comprometidos; realizada também biópsia incisional do palato duro e esofagostomia. O paciente retornou após sete dias, com secreção nasal serosa bilateral, e foi liberado alimentação pastosa por via oral, porém o animal voltou a se alimentar espontaneamente após 13 dias, retornando no Hovet no dia seguinte com importante desidratação. Após sedação, constatou-se deiscência dos pontos em palato duro, com menor comunicação oronasal quando comparada ao atendimento inicial. Optou-se em aguardar de 60 a 90 dias para reavaliação de nova tentativa de correção da fistula, com o intuito de reepitelização e revascularização do tecido. Nesse período a alimentação será prioritariamente via tubo esofágico. Em conjunto a isso constatou-se no exame histopatológico do palato duro o diagnóstico de carcinoma de células escamosas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As fistulas oronasais são de grande frequência na clínica de pequenos animais, e a seleção do tipo de técnica corretiva pode variar, não isentando a possibilidade de deiscência dos pontos e recidiva do quadro. Associado a isso, observamos maiores taxas de complicação quando esta afecção se apresenta em conjunto com neoplasias, como o carcinoma de células escamosas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Giosso MA. Odontologia Veterinária para o clínico de pequenos animais. 2ª ed. São Paulo: Minha Editora, 2007. Nogueira RM. Fistula oronasal em cão: reparo com flape simples associado a fator proteico angiogênico purificado do látex de seringueira, veiculado com matriz de esponja de colágeno: estudo experimental. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009. Dissertação (mestrado). Slatter DH. Manual de cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Ed. Manole, 2007.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14816	Clinica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	ALMIR FELICIO ELOY JÚNIOR
<b>TITULO</b>	COMUNICAÇÃO ORONASAL EM PACIENTE CANINO ASSOCIADO À CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM PALATO DURO – RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As fistulas oronasais são comunicações anormais entre a cavidade oral e nasal, ocasionadas por: doença periodontal avançada, extrações dentárias inadequadas, entre outras causas. Em cães, causam diversas alterações clínicas como: espirros, secreções nasais, rinites, sinusites, infecções no trato respiratório inferior. São de difícil resolução quando estão associadas à periodontites crônicas, gerando inflamação e redução do tecido saudável adjacente. A deiscência de pontos é a principal complicação pós-operatória, causada pela tensão da sutura e contaminação, gerando recidiva. É preconizado no tratamento propiciar cicatrização e restauração da função, com diferentes técnicas descritas em literatura. É sabido que não há um método de tratamento que sirva a todos os tipos de fistulas, assim, a escolha baseia-se na localização e extensão do defeito, e viabilidade do tecido adjacente.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso clínico de paciente canino, atendido no Hovet UNISA, com comunicação oronasal devido Carcinoma de Células Escamosas, e possível técnica cirúrgica a ser empregada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	Um paciente canino, macho, da raça Dachshund, com quatorze anos, foi atendido com queixa de apatia, hiporexia, tosses e espirros, o animal já havia passado por duas cirurgias odontológicas em coleira nos últimos dois anos. O animal apresentava algia oral, halitose, severa doença periodontal, lesões ulcerativas crônicas em palato duro caudal fazendo comunicação oronasal com inflamação, e linfonodos submandibulares reativos. Foi realizada cirurgia para o fechamento da comunicação oronasal com flap rotacional da porção rostral, bem como extração dos elementos dentários comprometidos; realizada também biópsia incisional do palato duro e esofagostomia. O paciente retornou após sete dias, com secreção nasal serosa bilateral, e foi liberado alimentação pastosa por via oral, porém o animal voltou a se alimentar espontaneamente após 13 dias, retornando no Hovet no dia seguinte com importante desidratação. Após sedação, constatou-se deiscência dos pontos em palato duro, com menor comunicação oronasal quando comparada ao atendimento inicial. Optou-se em aguardar de 60 a 90 dias para reavaliação de nova tentativa de correção da fistula, com o intuito de reepitelização e revascularização do tecido. Nesse período a alimentação será prioritariamente via tubo esofágico. Em conjunto a isso constatou-se no exame histopatológico do palato duro o diagnóstico de carcinoma de células escamosas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As fistulas oronasais são de grande frequência na clínica de pequenos animais, e a seleção do tipo de técnica corretiva pode variar, não isentando a possibilidade de deiscência dos pontos e recidiva do quadro. Associado a isso, observamos maiores taxas de complicação quando esta afecção se apresenta em conjunto com neoplasias, como o carcinoma de células escamosas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Giosso MA. Odontologia Veterinária para o clínico de pequenos animais. 2ª ed. São Paulo: Minha Editora, 2007. Nogueira RM. Fistula oronasal em cão: reparo com flape simples associado a fator proteico angiogênico purificado do látex de seringueira, veiculado com matriz de esponja de colágeno: estudo experimental. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009. Dissertação (mestrado). Slatter DH. Manual de cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Ed. Manole, 2007.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14817	Doenças Infecciosas de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3237346 - BIANCA CAMARGO DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Isolamento de bacteriófagos ambientais de Escherichia coli com potencial aplicação em fagoterapia			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O surgimento de patógenos resistentes a múltiplos antimicrobianos tem estimulado a busca por novas ferramentas terapêuticas que permitam substituir ou complementar os antimicrobianos no combate às doenças bacterianas. O uso de bacteriófagos, entidades virais especializadas em parasitar bactérias, tem sido cada vez mais explorado no combate a infecções causadas por bactérias multirresistentes, surgindo como alternativa viável de substituição ou complementação do uso de antibióticos. Dentro de uma perspectiva de Saúde Única, a falta de saneamento básico tem tido impacto direto e indireto na ocorrência de diversas doenças infecciosas. O esgoto tem sido considerado uma das fontes mais importantes de acúmulo e liberação de bactérias e genes de resistência para o meio ambiente (Karkman et al., 2018). A contaminação do esgoto é ocasionada majoritariamente por diferentes cepas de E. coli, que é considerada uma das principais bactérias associadas à mortalidade em quadros bacterianos que acometem humanos em escala global, levando a aproximadamente 500 mil mortes somente no ano de 2019 (Ikuta et al. 2019).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Isolar e tipificar bacteriófagos ambientais de E. coli para uso potencial em fagoterapia			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foram feitas tentativas de isolamento de fagos em amostra ambiental de esgoto colhida nas imediações da UNISA. A amostra foi filtrada para retirada de bactérias e demais impurezas. O filtrado foi dividido em 4 alíquotas, e a cada uma delas foi adicionado uma cepa E. coli previamente tipificada, juntamente com a adição de meio de cultura TSB para amplificação do vírus de interesse. Dessa forma, foi realizada tentativa de isolamento de fagos contra 4 tipos diferentes de E. coli. Após dois dias de incubação à 37°C, as soluções foram filtradas para remoção de bactérias, e os filtrados foram utilizados para realização do teste do pingô ("drop test"). O teste foi feito a partir do depósito de uma gota da solução fágica em diferentes diluições sobre um tapete bacteriano plaqueado em meio de cultura TSB top ágar. As leituras do teste foram feitas 24h após o pingô.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	O drop test demonstrou extensa lise do tapete bacteriano em três das quatro placas, indicando presença de fagos contra as cepas de E. coli utilizadas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados mostram sucesso no isolamento de fagos líticos de E. coli, que deverão ser devidamente purificados e caracterizados nas próximas etapas para avaliação de seu potencial para uso em terapias fágicas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Karkman, A., Do, T.T., Walsh, F., Virta, M.P.J., 2018. Antibiotic-Resistance Genes in Waste Water. Trends Microbiol 26, 220–228. <a href="https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.005">https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.005</a></p> <p>Ikuta Ks, Swetschinski Lr, Robles Aguilar G, Sharara F, Mestrovic T, Gray Ap, et al. Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2022;400(10369):2221–48.</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14817	Doenças Infecciosas de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4394607 - ANA BEATRIZ MENDES DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Isolamento de bacteriófagos ambientais de Escherichia coli com potencial aplicação em fagoterapia			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O surgimento de patógenos resistentes a múltiplos antimicrobianos tem estimulado a busca por novas ferramentas terapêuticas que permitam substituir ou complementar os antimicrobianos no combate às doenças bacterianas. O uso de bacteriófagos, entidades virais especializadas em parasitar bactérias, tem sido cada vez mais explorado no combate a infecções causadas por bactérias multirresistentes, surgindo como alternativa viável de substituição ou complementação do uso de antibióticos. Dentro de uma perspectiva de Saúde Única, a falta de saneamento básico tem tido impacto direto e indireto na ocorrência de diversas doenças infecciosas. O esgoto tem sido considerado uma das fontes mais importantes de acúmulo e liberação de bactérias e genes de resistência para o meio ambiente (Karkman et al., 2018). A contaminação do esgoto é ocasionada majoritariamente por diferentes cepas de E. coli, que é considerada uma das principais bactérias associadas à mortalidade em quadros bacterianos que acometem humanos em escala global, levando a aproximadamente 500 mil mortes somente no ano de 2019 (Ikuta et al. 2019).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Isolar e tipificar bacteriófagos ambientais de E. coli para uso potencial em fagoterapia			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foram feitas tentativas de isolamento de fagos em amostra ambiental de esgoto colhida nas imediações da UNISA. A amostra foi filtrada para retirada de bactérias e demais impurezas. O filtrado foi dividido em 4 alíquotas, e a cada uma delas foi adicionado uma cepa E. coli previamente tipificada, juntamente com a adição de meio de cultura TSB para amplificação do vírus de interesse. Dessa forma, foi realizada tentativa de isolamento de fagos contra 4 tipos diferentes de E. coli. Após dois dias de incubação à 37°C, as soluções foram filtradas para remoção de bactérias, e os filtrados foram utilizados para realização do teste do pingô ("drop test"). O teste foi feito a partir do depósito de uma gota da solução fágica em diferentes diluições sobre um tapete bacteriano plaqueado em meio de cultura TSB top ágar. As leituras do teste foram feitas 24h após o pingô.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	O drop test demonstrou extensa lise do tapete bacteriano em três das quatro placas, indicando presença de fagos contra as cepas de E. coli utilizadas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados mostram sucesso no isolamento de fagos líticos de E. coli, que deverão ser devidamente purificados e caracterizados nas próximas etapas para avaliação de seu potencial para uso em terapias fágicas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Karkman, A., Do, T.T., Walsh, F., Virta, M.P.J., 2018. Antibiotic-Resistance Genes in Waste Water. Trends Microbiol 26, 220–228.  <a href="https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.005">https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.005</a> Ikuta Ks, Swetschinski Lr, Robles Aguilar G, Sharara F, Mestrovic T, Gray Ap, et al. Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2022;400(10369):2221–48.</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14817	Doenças Infecciosas de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5097070 - RAFAEL DE MELO COSTA RIBEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Bruno Alonso Miotto		
<b>TITULO</b>	Isolamento de bacteriófagos ambientais de Escherichia coli com potencial aplicação em fagoterapia			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O surgimento de patógenos resistentes a múltiplos antimicrobianos tem estimulado a busca por novas ferramentas terapêuticas que permitam substituir ou complementar os antimicrobianos no combate às doenças bacterianas. O uso de bacteriófagos, entidades virais especializadas em parasitar bactérias, tem sido cada vez mais explorado no combate a infecções causadas por bactérias multirresistentes, surgindo como alternativa viável de substituição ou complementação do uso de antibióticos. Dentro de uma perspectiva de Saúde Única, a falta de saneamento básico tem tido impacto direto e indireto na ocorrência de diversas doenças infecciosas. O esgoto tem sido considerado uma das fontes mais importantes de acúmulo e liberação de bactérias e genes de resistência para o meio ambiente (Karkman et al., 2018). A contaminação do esgoto é ocasionada majoritariamente por diferentes cepas de E. coli, que é considerada uma das principais bactérias associadas à mortalidade em quadros bacterianos que acometem humanos em escala global, levando a aproximadamente 500 mil mortes somente no ano de 2019 (Ikuta et al. 2019).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Isolar e tipificar bacteriófagos ambientais de E. coli para uso potencial em fagoterapia			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foram feitas tentativas de isolamento de fagos em amostra ambiental de esgoto colhida nas imediações da UNISA. A amostra foi filtrada para retirada de bactérias e demais impurezas. O filtrado foi dividido em 4 alíquotas, e a cada uma delas foi adicionado uma cepa E. coli previamente tipificada, juntamente com a adição de meio de cultura TSB para amplificação do vírus de interesse. Dessa forma, foi realizada tentativa de isolamento de fagos contra 4 tipos diferentes de E. coli. Após dois dias de incubação à 37°C, as soluções foram filtradas para remoção de bactérias, e os filtrados foram utilizados para realização do teste do pingô ("drop test"). O teste foi feito a partir do depósito de uma gota da solução fágica em diferentes diluições sobre um tapete bacteriano plaqueado em meio de cultura TSB top ágar. As leituras do teste foram feitas 24h após o pingô.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	O drop test demonstrou extensa lise do tapete bacteriano em três das quatro placas, indicando presença de fagos contra as cepas de E. coli utilizadas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados mostram sucesso no isolamento de fagos líticos de E. coli, que deverão ser devidamente purificados e caracterizados nas próximas etapas para avaliação de seu potencial para uso em terapias fágicas.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Karkman, A., Do, T.T., Walsh, F., Virta, M.P.J., 2018. Antibiotic-Resistance Genes in Waste Water. Trends Microbiol 26, 220–228.  <a href="https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.005">https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.005</a> Ikuta Ks, Swetschinski Lr, Robles Aguilar G, Sharara F, Mestrovic T, Gray Ap, et al. Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2022;400(10369):2221–48.</p>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14819	Taxonomia dos Grupos Recentes	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3659062 - BEATRIZ RODRIGUES DA CRUZ	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		CAROLINE ROCHA DE FRANÇA
<b>TITULO</b>	Análise comparativa entre espécies simpátricas de peixes chinelo do gênero <i>Rineloricaria</i> (Siluriformes; Loricariidae) com a identificação de possível nova espécie.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O gênero <i>Rineloricaria</i> , de Bleeker, 1862, é o mais diversificado da subfamília Loricariinae, com 71 espécies formalmente descritas e várias outras reconhecidas, mas ainda não descritas. A identificação de espécies geralmente se baseia em características morfológicas, como a cobertura de placas dérmicas, proporções das nadadeiras e a presença de filamentos nas nadadeiras caudais. Um grupo fenotípico composto por três espécies ( <i>R. parva</i> , <i>R. wolfei</i> e <i>R. castroi</i> ) se destaca pela presença de filamentos nos raios superiores e inferiores das nadadeiras caudais, o que as diferencia das demais. No rio Purus, essas três espécies coexistem, tornando necessário um estudo comparativo para identificar espécies não descritas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar uma análise comparativa entre as espécies de <i>Rineloricaria</i> com filamentos duplos nas nadadeiras e determinar se existem espécies não descritas entre elas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 10 lotes de espécimes depositados na coleção da UNESP de Botucatu. As análises morfométricas e métricas seguiram a literatura, incluindo medidas adicionais. As medições foram realizadas com paquímetros digitais sob estereomicroscópio.			
<b>RESULTADOS</b>	As análises morfológicas identificaram dois morfotipos (M1 e M2): M1 corresponde a <i>R. wolfei</i> , enquanto M2 parece representar uma espécie não descrita, semelhante a <i>R. castroi</i> . Os dois morfotipos podem ser diferenciados por várias características. M1 possui 5-6 séries abdominais, área nua elíptica não estendida, 9 dentes por ramo do dentário e um sulco pós-orbital com metade do tamanho do olho. A nadadeira peitoral de M1 não atinge a nadadeira pélvica. Já M2 possui 3-5 séries abdominais, área nua estendida até o primeiro poro do canal látero sensorial, 10 dentes por ramo do dentário e um sulco pós-orbital com menos da metade do tamanho do olho. A nadadeira peitoral de M2 ultrapassa a nadadeira pélvica. É importante observar que M2 se assemelha a <i>R. castroi</i> , mas difere significativamente no padrão de coloração, sugerindo a possibilidade de uma nova espécie.			
<b>CONCLUSOES</b>	A análise morfológica indica a presença de duas espécies de <i>Rineloricaria</i> com filamentos duplos nas nadadeiras no rio Purus. No entanto, apenas uma delas coincide com uma espécie previamente descrita, <i>R. wolfei</i> , sugerindo a descoberta de uma nova espécie de peixe na região.			
<b>REFERENCIAS</b>	Silva, G. J. D. C. (2013). Estudos evolutivos entre espécies do gênero <i>Rineloricaria</i> (Siluriformes: Loricariidae: Loricariinae) com base em caracteres moleculares, 87 pp. <a href="http://hdl.handle.net/11449/115878">http://hdl.handle.net/11449/115878</a> Urbano(#38)#8208; Bonilla, A., Londoño(#38)#8208; Burbano, A., (#38) Carvalho, T. P. (2023). A new species of rheophilic armored catfish of <i>Rineloricaria</i> (Siluriformes: Loricariidae) from the Vaupés River, Amazonas basin, Colombia. <i>Journal of Fish Biology</i> . <a href="https://doi.org/10.1111/jfb.15500">https://doi.org/10.1111/jfb.15500</a> Vera-Alcaraz, H. S., Pavanelli, C. S., (#38) Zawadzki, C. H. (2012). Taxonomic revision of the <i>Rineloricaria</i> species (Siluriformes: Loricariidae) from the Paraguay River basin. <i>Neotropical Ichthyology</i> , 10, 285-311 pp. <a href="https://doi.org/10.1590/S1679-62252012000200006">https://doi.org/10.1590/S1679-62252012000200006</a>			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14820	Serviço Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4316291 - MARIANA DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	O TRÁFICO DE MULHERES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL ALIMENTADO PELA POBREZA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>As mulheres por muito tempo carregaram o papel de subordinadas, foram oprimidas e controladas pelo simples fato de serem mulheres, fadadas ao anonimato por seus pais, maridos e a própria sociedade. Embora tenhamos conquistado avanços através de muita luta, ainda não alcançamos uma sociedade igualitária, mulheres ainda são agredidas, esturpradas e assassinadas, também são vendidas como mercadoria todos os dias em um comercio que tem crescido a cada dia mais e pouco tem se falado sobre isso. Segundo o CNJ "Conselho Nacional De Justiça", o tráfico humano é considerado pela ONU um dos crimes mais rentáveis do mundo. A exploração sexual de mulheres é um problema global complexo que muitas vezes está intrinsecamente ligado à submissão feminina e à vulnerabilidade socioeconômica. Esta introdução breve destaca a interseção desses fatores, revelando a necessidade de entender as raízes profundas do tráfico sexual feminino.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>- Analisar as estratégias de recrutamento de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o tráfico sexual, identificando os fatores que as tornam alvos preferenciais nesse contexto. - Discutir como o trabalho precarizado no contexto de vida de mulheres pobres influencia na busca por melhores condições de sobrevivência. - Compreender como a pobreza torna as mulheres mais suscetíveis ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>O delineamento de pesquisa trará uma abordagem qualitativa de cunho exploratório, visando compreender a influência que a pobreza tem sobre o tráfico sexual.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os resultados parciais da pesquisa destacam de forma contundente que o tráfico sexual encontra terreno fértil na interseção da vulnerabilidade, desigualdade e misoginia. Fica evidente que se não houvesse tanta vulnerabilidade socioeconômica, desigualdade de gênero e estereótipos misóginos arraigados, o tráfico sexual não encontraria espaço para crescer de maneira tão alarmante. Essa constatação ressalta a necessidade premente de abordar essas questões fundamentais para combater eficazmente o tráfico sexual de mulheres.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Como conclusão preliminar, a pesquisa destaca a trágica realidade do tráfico sexual de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É fundamental a interseção da pobreza e do tráfico sexual para implementar políticas públicas e ações que protejam as mulheres e promovam a igualdade de gênero e justiça social.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <a href="https://www.cnj.jus.br/justica-contabilizou-aumento-de-processos-de-trafico-humano-em-2015/">https://www.cnj.jus.br/justica-contabilizou-aumento-de-processos-de-trafico-humano-em-2015/</a>. Acesso em 17/08/2023 às 16:00h. SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. Ministério Público do Estado da Bahia, 2004. MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez. O papel da mulher na sociedade. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 75, p. 123-134, 1980.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14821	Administração	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4107730 - CLAUDINEIA RESENDE SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa		
<b>TITULO</b>	MARKETING DIGITAL EM GRANDES EVENTOS: A EXPERIÊNCIA DO THE TOWN			
<b>INTRODUCAO</b>	Marketing de Eventos é uma disciplina que se destaca por sua capacidade de criar experiências memoráveis e impactantes para o público, promovendo produtos, serviços ou causas de forma eficaz. Desempenha um papel crucial no mix de marketing, permitindo que as organizações estabeleçam conexões emocionais com seu público, fortaleçam a conscientização da marca e alcancem objetivos estratégicos com a realização de eventos cuidadosamente planejados e executados. (BONFIM, 2015) O crescimento do acesso à internet tem impactado as estratégias de marketing de marcas e eventos; por ser muito acessível, a internet serve aos interesses estratégicos das empresas de diferentes portes. Com as ferramentas de Marketing Digital, as empresas começaram a promover seus produtos e serviços utilizando um ambiente web que está em constante crescimento. Essa abordagem se destaca por atrair cada vez mais clientes e oferecer suporte de análises na criação de uma estratégia eficaz de divulgação. (FERNANDEZ, 2013)			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar as estratégias e resultados da aplicação de marketing digital no planejamento de um grande evento.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental; com estudo de caso do The Town. Dados obtidos em pesquisas à internet, de 10/08 a 15/10/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	The Town 2023: realizado de 15 a 19 de setembro, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Reunindo música, cultura e arte, vendeu todos os 500 mil ingressos colocados à venda, impacto aproximado de R\$1,7 bilhões na economia de São Paulo. Composto de marketing: comunicação multicanal, mídia digital e tradicional, estratégias de relações públicas. Inclui Marketing de Conteúdo e de Experiências. Articulação com patrocinadores: produção de conteúdo nos sites, espaços de ativação de marca no evento, especialmente, espaços instagramáveis. Produção e compartilhamento de conteúdo ao longo de todo evento. Buzz Marketing: utilizado com eficiência, antecipando anúncio de novidades e surpresas para engajar o público-alvo, gerando intensa interação. O site do evento, 1 ano antes, apresentava um tour virtual com os espaços que seriam construídos. Produção de conteúdo pelos usuários, com compartilhamento em diversas mídias digitais. Influenciadores: diversos perfis cuidadosamente selecionais, nacionais e internacionais, desempenharam papel importante na promoção do evento. Resultados digitais: 1,3 milhão de postagens Twitter, Instagram, Facebook e Youtube relacionados ao evento. 7% relacionados diretamente às marcas patrocinadoras. Três patrocinadores somaram mais de 170 mil interações individuais.			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo de caso permitiu analisar a utilização combinada de estratégias de marketing tradicionais e digitais, compondo um mix de marketing eficiente e consistente com os objetivos estratégicos dos organizadores. Volume de conteúdo produzido e compartilhado pelos usuários, nas mídias digitais, tornou uma marca nova conhecida nacional e internacionalmente, pouco tempo após implantação as ações. Resultados obtidos em público e renda também evidenciam o sucesso das estratégias adotadas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BONFIM, Marcus Vinicius (org.). Marketing de eventos. São Paulo: Pearson education do Brasil, 2015. FERNANDEZ, Amyris. Planejamento de mídias digitais. São Paulo: Blucher, 2013. LI, Charlene. Fenômenos Sociais nos Negócios: vênça em um mundo transformado pelas redes sociais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14821	Administração	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4283384 - EDILENE ALVESBARBOSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa		
<b>TITULO</b>	MARKETING DIGITAL EM GRANDES EVENTOS: A EXPERIÊNCIA DO THE TOWN			
<b>INTRODUCAO</b>	Marketing de Eventos é uma disciplina que se destaca por sua capacidade de criar experiências memoráveis e impactantes para o público, promovendo produtos, serviços ou causas de forma eficaz. Desempenha um papel crucial no mix de marketing, permitindo que as organizações estabeleçam conexões emocionais com seu público, fortaleçam a conscientização da marca e alcancem objetivos estratégicos com a realização de eventos cuidadosamente planejados e executados. (BONFIM, 2015) O crescimento do acesso à internet tem impactado as estratégias de marketing de marcas e eventos; por ser muito acessível, a internet serve aos interesses estratégicos das empresas de diferentes portes. Com as ferramentas de Marketing Digital, as empresas começaram a promover seus produtos e serviços utilizando um ambiente web que está em constante crescimento. Essa abordagem se destaca por atrair cada vez mais clientes e oferecer suporte de análises na criação de uma estratégia eficaz de divulgação. (FERNANDEZ, 2013)			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar as estratégias e resultados da aplicação de marketing digital no planejamento de um grande evento.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental; com estudo de caso do The Town. Dados obtidos em pesquisas à internet, de 10/08 a 15/10/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	The Town 2023: realizado de 15 a 19 de setembro, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Reunindo música, cultura e arte, vendeu todos os 500 mil ingressos colocados à venda, impacto aproximado de R\$1,7 bilhões na economia de São Paulo. Composto de marketing: comunicação multicanal, mídia digital e tradicional, estratégias de relações públicas. Inclui Marketing de Conteúdo e de Experiências. Articulação com patrocinadores: produção de conteúdo nos sites, espaços de ativação de marca no evento, especialmente, espaços instagramáveis. Produção e compartilhamento de conteúdo ao longo de todo evento. Buzz Marketing: utilizado com eficiência, antecipando anúncio de novidades e surpresas para engajar o público-alvo, gerando intensa interação. O site do evento, 1 ano antes, apresentava um tour virtual com os espaços que seriam construídos. Produção de conteúdo pelos usuários, com compartilhamento em diversas mídias digitais. Influenciadores: diversos perfis cuidadosamente selecionais, nacionais e internacionais, desempenharam papel importante na promoção do evento. Resultados digitais: 1,3 milhão de postagens Twitter, Instagram, Facebook e Youtube relacionados ao evento. 7% relacionados diretamente às marcas patrocinadoras. Três patrocinadores somaram mais de 170 mil interações individuais.			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo de caso permitiu analisar a utilização combinada de estratégias de marketing tradicionais e digitais, compondo um mix de marketing eficiente e consistente com os objetivos estratégicos dos organizadores. Volume de conteúdo produzido e compartilhado pelos usuários, nas mídias digitais, tornou uma marca nova conhecida nacional e internacionalmente, pouco tempo após implantação as ações. Resultados obtidos em público e renda também evidenciam o sucesso das estratégias adotadas.			
<b>REFERENCIAS</b>	BONFIM, Marcus Vinicius (org.). Marketing de eventos. São Paulo: Pearson education do Brasil, 2015. FERNANDEZ, Amyris. Planejamento de mídias digitais. São Paulo: Blucher, 2013. LI, Charlene. Fenômenos Sociais nos Negócios: vênça em um mundo transformado pelas redes sociais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14822	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4288122 - LEANDRO BERNARDES COSTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Aplicação e Segurança do Machine Learning no E-commerce			
<b>INTRODUCAO</b>	A era digital mudou o panorama do comércio global e o e-commerce, gerando crescimento econômico e conveniência do consumidor, cujas aplicações do Machine Learning (ML) têm papel importante na melhoria da eficiência operacional e na personalização da experiência do cliente no setor do comércio eletrônico, no entanto o empreendedor precisa saber que a ML veio para auxiliar, mas possui falhas e lacunas que precisam ser corrigidas (COZMAN; PLONSKI; NERI, 2021).			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar as aplicações de aprendizado das máquinas no e-commerce e analisar os problemas de segurança associados a esta implementação, dada a facilidade e praticidade de seu uso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa de base teórica e dados secundários referente a aplicação do Machine Learning no mercado (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).			
<b>RESULTADOS</b>	Na mitologia grega, o grande caçador Orion era cego e dependia do mortal Cepheus, como muitos dependem do Machine Learning de assistentes virtuais até algoritmos de recomendação em plataformas. A vulnerabilidade de Orion necessitando de orientação para mover-se é comparada a dependência excessiva da Machine Learning tornando humanos vulneráveis a erros técnicos e ataques cibernéticos, pois apesar da sua capacidade de análise de dados, automação e aprendizado de máquina essa dependência levanta questões éticas sobre controle, privacidade e responsabilidade pela tecnologia (REESE, 2023). Como vantagens para o e-commerce o ML desenvolve estratégias, conhecimentos e possibilidades para o negócio com a capacidade de entender o cliente e ofertar algo mais relevante, impactando as vendas (MENSALIDADES, 2018). Recentemente, muitas empresas vendem soluções de detecção, prevenção de fraudes e bloqueio de fraudadores utilizando Machine Learning, cujo algoritmo entende as variáveis identificadas no e-commerce (VOGLIOTTI, 2023).			
<b>CONCLUSOES</b>	A implantação do Machine Learning no e-commerce permite personalizar, otimizar processos, prever a experiência dos clientes e desempenhos empresariais, mas gerenciar dados confidenciais e transações financeiras requerem proteção e segurança tanto para os clientes quanto para as empresas com investimento em medidas de segurança robustas, formação de funcionários, resposta rápida a incidentes e meios de checar veracidade das informações dos clientes para evitarem golpes de pessoas fantasmas ou inexistentes. O futuro do e-commerce parece entusiasmante, mas desafiador, pois para que as empresas aproveitem as oportunidades oferecidas devem se comprometer com sua segurança e proteção dos dados dos clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	COZMAN, F. G.; PLONSKI, G. A.; NERI, H. (Orgs.). Inteligência artificial: avanços e tendências. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Instituto de Estudos Avançados, 2021. Disponível em: (#60)https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/650/#62. Acesso em: 11 set. 2023. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MENSALIDADES. Conheça as diferentes opções de uso do machine learning para e-commerce. Mensalidades, 2018 Disponível em: (#60)http://blog.mensalidades.com.br/como-a-solutions-onepromove-enxerga-o-uso-de-machine-learning-em-e-commerces/#62. Acesso em: 13 set. 2023. REESE, S. O Caçador Orion. #AvareUrgente, 28 mar. 2023. Disponível em: (#60)https://avareurgente.com/o-cacador-orion/#62. Acesso em: 27 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 VOGLIOTTI, T. Como o Machine Learning está transformando a prevenção de fraudes em e-commerce. Autentify, 05 set. 2023. Disponível em: (#60)https://www.autentify.com.br/antifraude/como-o-machine-learning-esta-transformando-a-prevencao-de-fraudes-em-e-commerce/#:~:text=O%20Machine%20Learning%20em%20mostrado/#62. Acesso em: 28 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14822	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4388933 - VITÓRIA RODRIGUES DELIZA GARCIA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Aplicação e Segurança do Machine Learning no E-commerce			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A era digital mudou o panorama do comércio global e o e-commerce, gerando crescimento econômico e conveniência do consumidor, cujas aplicações do Machine Learning (ML) têm papel importante na melhoria da eficiência operacional e na personalização da experiência do cliente no setor do comércio eletrônico, no entanto o empreendedor precisa saber que a ML veio para auxiliar, mas possui falhas e lacunas que precisam ser corrigidas (COZMAN; PLONSKI; NERI, 2021).			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar as aplicações de aprendizado das máquinas no e-commerce e analisar os problemas de segurança associados a esta implementação, dada a facilidade e praticidade de seu uso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa de base teórica e dados secundários referente a aplicação do Machine Learning no mercado (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).			
<b>RESULTADOS</b>	Na mitologia grega, o grande caçador Orion era cego e dependia do mortal Cepheus, como muitos dependem do Machine Learning de assistentes virtuais até algoritmos de recomendação em plataformas. A vulnerabilidade de Orion necessitando de orientação para mover-se é comparada a dependência excessiva da Machine Learning tornando humanos vulneráveis a erros técnicos e ataques cibernéticos, pois apesar da sua capacidade de análise de dados, automação e aprendizado de máquina essa dependência levanta questões éticas sobre controle, privacidade e responsabilidade pela tecnologia (REESE, 2023). Como vantagens para o e-commerce o ML desenvolve estratégias, conhecimentos e possibilidades para o negócio com a capacidade de entender o cliente e ofertar algo mais relevante, impactando as vendas (MENSALIDADES, 2018). Recentemente, muitas empresas vendem soluções de detecção, prevenção de fraudes e bloqueio de fraudadores utilizando Machine Learning, cujo algoritmo entende as variáveis identificadas no e-commerce (VOGLIOTTI, 2023).			
<b>CONCLUSÕES</b>	A implantação do Machine Learning no e-commerce permite personalizar, otimizar processos, prever a experiência dos clientes e desempenhos empresariais, mas gerenciar dados confidenciais e transações financeiras requerem proteção e segurança tanto para os clientes quanto para as empresas com investimento em medidas de segurança robustas, formação de funcionários, resposta rápida a incidentes e meios de checar veracidade das informações dos clientes para evitarem golpes de pessoas fantasmas ou inexistentes. O futuro do e-commerce parece entusiasmante, mas desafiador, pois para que as empresas aproveitem as oportunidades oferecidas devem se comprometer com sua segurança e proteção dos dados dos clientes.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	COZMAN, F. G.; PLONSKI, G. A.; NERI, H. (Orgs.). Inteligência artificial: avanços e tendências. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Instituto de Estudos Avançados, 2021. Disponível em: (#60)https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/650/#62. Acesso em: 11 set. 2023. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MENSALIDADES. Conheça as diferentes opções de uso do machine learning para e-commerce. Mensalidades, 2018 Disponível em: (#60)http://blog.mensalidades.com.br/como-a-solutions-onepromove-enxerga-o-uso-de-machine-learning-em-e-commerces/#62. Acesso em: 13 set. 2023. REESE, S. O Caçador Orion. #AvareUrgente, 28 mar. 2023. Disponível em: (#60)https://avareurgente.com/o-cacador-orion/#62. Acesso em: 27 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 VOGLIOTTI, T. Como o Machine Learning está transformando a prevenção de fraudes em e-commerce. Autentify, 05 set. 2023. Disponível em: (#60)https://www.autentify.com.br/antifraude/como-o-machine-learning-esta-transformando-a-prevencao-de-fraudes-em-e-commerce/#:~:text=O%20Machine%20Learning%20tem%20mostrado#62. Acesso em: 28 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14822	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4541596 - THOMAS PERES SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Aplicação e Segurança do Machine Learning no E-commerce			
<b>INTRODUCAO</b>	A era digital mudou o panorama do comércio global e o e-commerce, gerando crescimento econômico e conveniência do consumidor, cujas aplicações do Machine Learning (ML) têm papel importante na melhoria da eficiência operacional e na personalização da experiência do cliente no setor do comércio eletrônico, no entanto o empreendedor precisa saber que a ML veio para auxiliar, mas possui falhas e lacunas que precisam ser corrigidas (COZMAN; PLONSKI; NERI, 2021).			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar as aplicações de aprendizado das máquinas no e-commerce e analisar os problemas de segurança associados a esta implementação, dada a facilidade e praticidade de seu uso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa de base teórica e dados secundários referente a aplicação do Machine Learning no mercado (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).			
<b>RESULTADOS</b>	Na mitologia grega, o grande caçador Orion era cego e dependia do mortal Cepheus, como muitos dependem do Machine Learning de assistentes virtuais até algoritmos de recomendação em plataformas. A vulnerabilidade de Orion necessitando de orientação para mover-se é comparada a dependência excessiva da Machine Learning tornando humanos vulneráveis a erros técnicos e ataques cibernéticos, pois apesar da sua capacidade de análise de dados, automação e aprendizado de máquina essa dependência levanta questões éticas sobre controle, privacidade e responsabilidade pela tecnologia (REESE, 2023). Como vantagens para o e-commerce o ML desenvolve estratégias, conhecimentos e possibilidades para o negócio com a capacidade de entender o cliente e ofertar algo mais relevante, impactando as vendas (MENSALIDADES, 2018). Recentemente, muitas empresas vendem soluções de detecção, prevenção de fraudes e bloqueio de fraudadores utilizando Machine Learning, cujo algoritmo entende as variáveis identificadas no e-commerce (VOGLIOTTI, 2023).			
<b>CONCLUSOES</b>	A implantação do Machine Learning no e-commerce permite personalizar, otimizar processos, prever a experiência dos clientes e desempenhos empresariais, mas gerenciar dados confidenciais e transações financeiras requerem proteção e segurança tanto para os clientes quanto para as empresas com investimento em medidas de segurança robustas, formação de funcionários, resposta rápida a incidentes e meios de checar veracidade das informações dos clientes para evitarem golpes de pessoas fantasmas ou inexistentes. O futuro do e-commerce parece entusiasmante, mas desafiador, pois para que as empresas aproveitem as oportunidades oferecidas devem se comprometer com sua segurança e proteção dos dados dos clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	COZMAN, F. G.; PLONSKI, G. A.; NERI, H. (Orgs.). Inteligência artificial: avanços e tendências. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Instituto de Estudos Avançados, 2021. Disponível em: (#60)https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/650/#62. Acesso em: 11 set. 2023. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MENSALIDADES. Conheça as diferentes opções de uso do machine learning para e-commerce. Mensalidades, 2018 Disponível em: (#60)http://blog.mensalidades.com.br/como-a-solutions-onepromove-enxerga-o-uso-de-machine-learning-em-e-commerces/#62. Acesso em: 13 set. 2023. REESE, S. O Caçador Orion. #AvareUrgente, 28 mar. 2023. Disponível em: (#60)https://avareurgente.com/o-cacador-orion/#62. Acesso em: 27 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 VOGLIOTTI, T. Como o Machine Learning está transformando a prevenção de fraudes em e-commerce. Autentify, 05 set. 2023. Disponível em: (#60)https://www.autentify.com.br/antifraude/como-o-machine-learning-esta-transformando-a-prevencao-de-fraudes-em-e-commerce/#:~:text=O%20Machine%20Learning%20tem%20mostrado/#62. Acesso em: 28 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14822	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4547624 - ELENILDE DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Aplicação e Segurança do Machine Learning no E-commerce			
<b>INTRODUCAO</b>	A era digital mudou o panorama do comércio global e o e-commerce, gerando crescimento econômico e conveniência do consumidor, cujas aplicações do Machine Learning (ML) têm papel importante na melhoria da eficiência operacional e na personalização da experiência do cliente no setor do comércio eletrônico, no entanto o empreendedor precisa saber que a ML veio para auxiliar, mas possui falhas e lacunas que precisam ser corrigidas (COZMAN; PLONSKI; NERI, 2021).			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar as aplicações de aprendizado das máquinas no e-commerce e analisar os problemas de segurança associados a esta implementação, dada a facilidade e praticidade de seu uso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa de base teórica e dados secundários referente a aplicação do Machine Learning no mercado (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).			
<b>RESULTADOS</b>	Na mitologia grega, o grande caçador Orion era cego e dependia do mortal Cepheus, como muitos dependem do Machine Learning de assistentes virtuais até algoritmos de recomendação em plataformas. A vulnerabilidade de Orion necessitando de orientação para mover-se é comparada a dependência excessiva da Machine Learning tornando humanos vulneráveis a erros técnicos e ataques cibernéticos, pois apesar da sua capacidade de análise de dados, automação e aprendizado de máquina essa dependência levanta questões éticas sobre controle, privacidade e responsabilidade pela tecnologia (REESE, 2023). Como vantagens para o e-commerce o ML desenvolve estratégias, conhecimentos e possibilidades para o negócio com a capacidade de entender o cliente e ofertar algo mais relevante, impactando as vendas (MENSALIDADES, 2018). Recentemente, muitas empresas vendem soluções de detecção, prevenção de fraudes e bloqueio de fraudadores utilizando Machine Learning, cujo algoritmo entende as variáveis identificadas no e-commerce (VOGLIOTTI, 2023).			
<b>CONCLUSOES</b>	A implantação do Machine Learning no e-commerce permite personalizar, otimizar processos, prever a experiência dos clientes e desempenhos empresariais, mas gerenciar dados confidenciais e transações financeiras requerem proteção e segurança tanto para os clientes quanto para as empresas com investimento em medidas de segurança robustas, formação de funcionários, resposta rápida a incidentes e meios de checar veracidade das informações dos clientes para evitarem golpes de pessoas fantasmas ou inexistentes. O futuro do e-commerce parece entusiasmante, mas desafiador, pois para que as empresas aproveitem as oportunidades oferecidas devem se comprometer com sua segurança e proteção dos dados dos clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	COZMAN, F. G.; PLONSKI, G. A.; NERI, H. (Orgs.). Inteligência artificial: avanços e tendências. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Instituto de Estudos Avançados, 2021. Disponível em: (#60)https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/650/#62. Acesso em: 11 set. 2023. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MENSALIDADES. Conheça as diferentes opções de uso do machine learning para e-commerce. Mensalidades, 2018 Disponível em: (#60)http://blog.mensalidades.com.br/como-a-solutions-onepromove-enxerga-o-uso-de-machine-learning-em-e-commerces/#62. Acesso em: 13 set. 2023. REESE, S. O Caçador Orion. #AvareUrgente, 28 mar. 2023. Disponível em: (#60)https://avareurgente.com/o-cacador-orion/#62. Acesso em: 27 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 VOGLIOTTI, T. Como o Machine Learning está transformando a prevenção de fraudes em e-commerce. Autentify, 05 set. 2023. Disponível em: (#60)https://www.autentify.com.br/antifraude/como-o-machine-learning-esta-transformando-a-prevencao-de-fraudes-em-e-commerce/#:~:text=O%20Machine%20Learning%20tem%20mostrado#62. Acesso em: 28 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14822	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577701 - LUCAS RAMOS DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Aplicação e Segurança do Machine Learning no E-commerce			
<b>INTRODUCAO</b>	A era digital mudou o panorama do comércio global e o e-commerce, gerando crescimento econômico e conveniência do consumidor, cujas aplicações do Machine Learning (ML) têm papel importante na melhoria da eficiência operacional e na personalização da experiência do cliente no setor do comércio eletrônico, no entanto o empreendedor precisa saber que a ML veio para auxiliar, mas possui falhas e lacunas que precisam ser corrigidas (COZMAN; PLONSKI; NERI, 2021).			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar as aplicações de aprendizado das máquinas no e-commerce e analisar os problemas de segurança associados a esta implementação, dada a facilidade e praticidade de seu uso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa de base teórica e dados secundários referente a aplicação do Machine Learning no mercado (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).			
<b>RESULTADOS</b>	Na mitologia grega, o grande caçador Orion era cego e dependia do mortal Cepheus, como muitos dependem do Machine Learning de assistentes virtuais até algoritmos de recomendação em plataformas. A vulnerabilidade de Orion necessitando de orientação para mover-se é comparada a dependência excessiva da Machine Learning tornando humanos vulneráveis a erros técnicos e ataques cibernéticos, pois apesar da sua capacidade de análise de dados, automação e aprendizado de máquina essa dependência levanta questões éticas sobre controle, privacidade e responsabilidade pela tecnologia (REESE, 2023). Como vantagens para o e-commerce o ML desenvolve estratégias, conhecimentos e possibilidades para o negócio com a capacidade de entender o cliente e ofertar algo mais relevante, impactando as vendas (MENSALIDADES, 2018). Recentemente, muitas empresas vendem soluções de detecção, prevenção de fraudes e bloqueio de fraudadores utilizando Machine Learning, cujo algoritmo entende as variáveis identificadas no e-commerce (VOGLIOTTI, 2023).			
<b>CONCLUSOES</b>	A implantação do Machine Learning no e-commerce permite personalizar, otimizar processos, prever a experiência dos clientes e desempenhos empresariais, mas gerenciar dados confidenciais e transações financeiras requerem proteção e segurança tanto para os clientes quanto para as empresas com investimento em medidas de segurança robustas, formação de funcionários, resposta rápida a incidentes e meios de checar veracidade das informações dos clientes para evitarem golpes de pessoas fantasmas ou inexistentes. O futuro do e-commerce parece entusiasmante, mas desafiador, pois para que as empresas aproveitem as oportunidades oferecidas devem se comprometer com sua segurança e proteção dos dados dos clientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	COZMAN, F. G.; PLONSKI, G. A.; NERI, H. (Orgs.). Inteligência artificial: avanços e tendências. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Instituto de Estudos Avançados, 2021. Disponível em: (#60)https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/650/#62. Acesso em: 11 set. 2023. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MENSALIDADES. Conheça as diferentes opções de uso do machine learning para e-commerce. Mensalidades, 2018 Disponível em: (#60)http://blog.mensalidades.com.br/como-a-solutions-onepromove-enxerga-o-uso-de-machine-learning-em-e-commerces/#62. Acesso em: 13 set. 2023. REESE, S. O Caçador Orion. #AvareUrgente, 28 mar. 2023. Disponível em: (#60)https://avareurgente.com/o-cacador-orion/#62. Acesso em: 27 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 VOGLIOTTI, T. Como o Machine Learning está transformando a prevenção de fraudes em e-commerce. Autentify, 05 set. 2023. Disponível em: (#60)https://www.autentify.com.br/antifraude/como-o-machine-learning-esta-transformando-a-prevencao-de-fraudes-em-e-commerce/#:~:text=O%20Machine%20Learning%20tem%20mostrado/#62. Acesso em: 28 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14823	Direito Penal	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4136861 - ALESSANDRA GISELE CANDIDO DA COSTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato Watanabe de Moraes		
<b>TITULO</b>	Diálogos entre a criminologia e a ficção: aportes dos quadrinhos na construção do pensamento crítico			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A criminologia cultural é um campo de estudo que se concentra nas relações complexas entre cultura, sociedade e criminalidade. Este ramo da criminologia busca compreender como as representações culturais e sociais influenciam na percepção do crime e no comportamento criminoso na sociedade contemporânea. As histórias em quadrinhos desempenham um papel importante como expressões culturais que refletem valores de uma época. A interseção entre criminologia e ficção permite explorar como narrativas fictícias abordam temas complexos de crime, sociedade e justiça, oferecendo uma perspectiva acessível para discutir questões morais, éticas e filosóficas relacionadas à criminologia. Por essa razão, o presente artigo tem como objetivo analisar a interseção existente entre a criminologia cultural e a ficção, utilizando a graphic novel "X-Men: Deus Ama, o Homem Mata", publicada em 1982, escrita por Chris Claremont e ilustrada por Brent Anderson, como principal fonte de demonstração de como a ficção pode dialogar com a criminologia de maneira clara e, assim, servir como ferramenta para construção do pensamento crítico criminológico. Desta forma, no decorrer do presente artigo, será analisado como a supramencionada história em quadrinhos, ao ir além das convenções típicas de histórias de super-heróis, propõe uma reflexão sobre questões sociais e morais profundas. Além disso, será demonstrado como essa obra contribui para a construção do pensamento crítico quando, por meio da narrativa e dos personagens, confronta preconceitos existentes em sociedade.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo é demonstrar como os quadrinhos podem fomentar pensamento crítico na sociedade, devido à sua acessibilidade e capacidade de transmitir narrativas complexas de forma compreensível. Além disso, destaca o potencial dos quadrinhos como fonte bibliográfica para estudos de criminologia e sociologia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia de pesquisa é qualitativa e envolve a análise de artigos, livros e revistas relacionados à criminologia cultural. Além disso, será explorada a história em quadrinhos "X-Men: Deus ama, o homem mata" para estabelecer conexões entre seu contexto histórico, críticas apresentadas e relevância atual na análise crítica.			
<b>RESULTADO S</b>	Espera-se a identificação de variados elementos criminológicos na narrativa fictícia selecionada, incluindo representações de personagens cometendo crimes, suas motivações, e a exploração de questões sociais associadas aos crimes. Analisa-se também o potencial da criminologia cultural para incorporar a análise das histórias em quadrinhos como ferramentas analíticas e como essa abordagem interdisciplinar pode ser benéfica para a compreensão de fenômenos sociais e difusão de conhecimento. Por fim, demonstrar-seá como a acessibilidade às histórias em quadrinhos pode contribuir para a formação da análise crítica sobre a sociedade.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclui-se, então, que as histórias em quadrinhos não apenas espelham, mas também moldam a percepção da sociedade, fornecendo uma base sólida para uma análise crítica e uma compreensão mais profunda das dinâmicas culturais e sociais em torno do crime e de pensamentos preconceituosos.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CARVALHO, Salo de. Criminologia cultural, complexidade e as fronteiras de pesquisa nas ciências criminais. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 17, n. 81, nov./dez. 2009. CLAREMONT, Christopher; ANDERSON, Eric Brent. X-Men: Deus ama, o homem mata – Edição estendida. Barueri – São Paulo: Panini Comics, 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14825	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2725592 - ANDRESSA ARAÚJO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Edilson Isídio da Silva Junior	Victor Nowosh	JOSYANE CRISTINA OSHIKA
<b>TITULO</b>	PECTUS EXCAVATUM EM FELINO ATENDIDO NO HOSPITAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Pectus excavatum (PE) é uma malformação congênita incomum em cães e rara em gatos, caracterizada pelo desvio dorsal do esterno em relação às cartilagens costais, estendendo-se caudalmente a partir da quinta ou sexta costela. A origem deste processo está relacionada à pressão intrauterina anormal ao feto, falha na osteogênese ou condrogênese, raquitismo e falha na disposição de tendões ou musculatura diafragmática. A sintomatologia pode ser branda a grave, representada majoritariamente pelo desenvolvimento de arritmias, valvopatias, dispnéia, pneumonias recorrentes e êmese. Devido à baixa especificidade dos sintomas, o diagnóstico é feito através da radiografia e exame físico.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de PE em um felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi atendida uma paciente felina, siamês, de aproximadamente 4 meses de idade, após histórico de pneumonia e diagnóstico acidental de PE realizado em colega. A principal queixa relatada foi discreta dispnéia e relutância da tutora em permitir atividade normal do animal devido ao desconhecimento do manejo de gatos com PE.</p> <p>Ao exame físico os parâmetros encontravam-se todos dentro da normalidade para a espécie, e a paciente apresentava bom padrão respiratório. Para visualização completa do PE a radiografia torácica com projeções latero-lateral e ventrodorsal foram realizadas, permitindo a visualização do deslocamento dorsal da 6ª, 7ª e 8ª esternébras, hipoplasia bilateral do 1º arco costal. Devido a possível alteração cardíaca a ecocardiografia foi solicitada, permitindo o diagnóstico de insuficiência valvar mitral discreta, sem repercussão hemodinâmica.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O PE é uma malformação rara, ainda mais na espécie felina. Além disso, a apresentação clínica relatada é inespecífica, o que acarretou no atraso do diagnóstico do paciente. Os achados radiográficos condizem com a literatura com relação ao deslocamento dorsal da 6ª a 8ª esternébras, e hipoplasia bilateral do 1º arco costa. Todavia, o deslocamento da silhueta cardíaca não foi visualizado, explicando a ausência de manifestações cardiovasculares na paciente. O histórico de pneumonia pode estar relacionado ao PE, pois o complexo respiratório felino comum nesta idade é caracterizado principalmente por manifestações em trato respiratório superior. Sendo assim, a correção cirúrgica do PE pode ser indicada em recidivas do quadro. Devido ao PE de grau leve e ausência de repercussão hemodinâmica, a paciente obteve alta após retorno, sendo indicado apenas acompanhamento cardiológico da mesma, uma vez que com o avanço da idade a alteração diagnosticada cardíaca pode evoluir.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>O relato demonstrou um diagnóstico raro na espécie felina, o que levou ao atraso no diagnóstico do paciente. Apesar da baixa frequência, recomenda-se que o diagnóstico de PE seja considerado como um diferencial em felinos com doenças cardiopulmonares sem outras causas evidentes, mesmo que a sintomatologia não evidencie prejuízo hemodinâmico ou deslocamento esternal facilmente palpável.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>FOSSUM, TW. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. HORN, AP et al. Pectus excavatum--Correção cirúrgica utilizando tala externa de poliuretano fabricada com tecnologia de impressão 3D. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, (29)2, 2022. THRALL, DE. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 6 ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14825	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4237293 - LARISSA ALVES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Edilson Isídio da Silva Junior	Victor Nowosh	JOSYANE CRISTINA OSHIKA
<b>TITULO</b>	PECTUS EXCAVATUM EM FELINO ATENDIDO NO HOSPITAL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Pectus excavatum (PE) é uma malformação congênita incomum em cães e rara em gatos, caracterizada pelo desvio dorsal do esterno em relação às cartilagens costais, estendendo-se caudalmente a partir da quinta ou sexta costela. A origem deste processo está relacionada à pressão intrauterina anormal ao feto, falha na osteogênese ou condrogênese, raquitismo e falha na disposição de tendões ou musculatura diafragmática. A sintomatologia pode ser branda a grave, representada majoritariamente pelo desenvolvimento de arritmias, valvopatias, dispnéia, pneumonias recorrentes e êmese. Devido à baixa especificidade dos sintomas, o diagnóstico é feito através da radiografia e exame físico.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de PE em um felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi atendida uma paciente felina, siamês, de aproximadamente 4 meses de idade, após histórico de pneumonia e diagnóstico acidental de PE realizado em colega. A principal queixa relatada foi discreta dispnéia e relutância da tutora em permitir atividade normal do animal devido ao desconhecimento do manejo de gatos com PE.</p> <p>Ao exame físico os parâmetros encontravam-se todos dentro da normalidade para a espécie, e a paciente apresentava bom padrão respiratório. Para visualização completa do PE a radiografia torácica com projeções latero-lateral e ventrodorsal foram realizadas, permitindo a visualização do deslocamento dorsal da 6ª, 7ª e 8ª esternébras, hipoplasia bilateral do 1º arco costal. Devido a possível alteração cardíaca a ecocardiografia foi solicitada, permitindo o diagnóstico de insuficiência valvar mitral discreta, sem repercussão hemodinâmica.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O PE é uma malformação rara, ainda mais na espécie felina. Além disso, a apresentação clínica relatada é inespecífica, o que acarretou no atraso do diagnóstico do paciente. Os achados radiográficos condizem com a literatura com relação ao deslocamento dorsal da 6ª a 8ª esternébras, e hipoplasia bilateral do 1º arco costa. Todavia, o deslocamento da silhueta cardíaca não foi visualizado, explicando a ausência de manifestações cardiovasculares na paciente. O histórico de pneumonia pode estar relacionado ao PE, pois o complexo respiratório felino comum nesta idade é caracterizado principalmente por manifestações em trato respiratório superior. Sendo assim, a correção cirúrgica do PE pode ser indicada em recidivas do quadro. Devido ao PE de grau leve e ausência de repercussão hemodinâmica, a paciente obteve alta após retorno, sendo indicado apenas acompanhamento cardiológico da mesma, uma vez que com o avanço da idade a alteração diagnosticada cardíaca pode evoluir.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O relato demonstrou um diagnóstico raro na espécie felina, o que levou ao atraso no diagnóstico do paciente. Apesar da baixa frequência, recomenda-se que o diagnóstico de PE seja considerado como um diferencial em felinos com doenças cardiopulmonares sem outras causas evidentes, mesmo que a sintomatologia não evidencie prejuízo hemodinâmico ou deslocamento esternal facilmente palpável.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FOSSUM, TW. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. HORN, AP et al. Pectus excavatum--Correção cirúrgica utilizando tala externa de poliuretano fabricada com tecnologia de impressão 3D. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, (29)2, 2022. THRALL, DE. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 6 ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14825	Patologia Clínica Animal	B - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848179 - LETICIA ROSKOSZ GONZALEZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Edilson Isídio da Silva Junior	Victor Nowosh	JOSYANE CRISTINA OSHIKA
<b>TITULO</b>	PECTUS EXCAVATUM EM FELINO ATENDIDO NO HOSPITAL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Pectus excavatum (PE) é uma malformação congênita incomum em cães e rara em gatos, caracterizada pelo desvio dorsal do esterno em relação às cartilagens costais, estendendo-se caudalmente a partir da quinta ou sexta costela. A origem deste processo está relacionada à pressão intrauterina anormal ao feto, falha na osteogênese ou condrogênese, raquitismo e falha na disposição de tendões ou musculatura diafragmática. A sintomatologia pode ser branda a grave, representada majoritariamente pelo desenvolvimento de arritmias, valvopatias, dispnéia, pneumonias recorrentes e êmese. Devido à baixa especificidade dos sintomas, o diagnóstico é feito através da radiografia e exame físico.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de PE em um felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi atendida uma paciente felina, siamês, de aproximadamente 4 meses de idade, após histórico de pneumonia e diagnóstico acidental de PE realizado em colega. A principal queixa relatada foi discreta dispnéia e relutância da tutora em permitir atividade normal do animal devido ao desconhecimento do manejo de gatos com PE.</p> <p>Ao exame físico os parâmetros encontravam-se todos dentro da normalidade para a espécie, e a paciente apresentava bom padrão respiratório. Para visualização completa do PE a radiografia torácica com projeções latero-lateral e ventrodorsal foram realizadas, permitindo a visualização do deslocamento dorsal da 6ª, 7ª e 8ª esternébras, hipoplasia bilateral do 1º arco costal. Devido a possível alteração cardíaca a ecocardiografia foi solicitada, permitindo o diagnóstico de insuficiência valvar mitral discreta, sem repercussão hemodinâmica.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O PE é uma malformação rara, ainda mais na espécie felina. Além disso, a apresentação clínica relatada é inespecífica, o que acarretou no atraso do diagnóstico do paciente. Os achados radiográficos condizem com a literatura com relação ao deslocamento dorsal da 6ª a 8ª esternébras, e hipoplasia bilateral do 1º arco costal. Todavia, o deslocamento da silhueta cardíaca não foi visualizado, explicando a ausência de manifestações cardiovasculares na paciente. O histórico de pneumonia pode estar relacionado ao PE, pois o complexo respiratório felino comum nesta idade é caracterizado principalmente por manifestações em trato respiratório superior. Sendo assim, a correção cirúrgica do PE pode ser indicada em recidivas do quadro. Devido ao PE de grau leve e ausência de repercussão hemodinâmica, a paciente obteve alta após retorno, sendo indicado apenas acompanhamento cardiológico da mesma, uma vez que com o avanço da idade a alteração diagnosticada cardíaca pode evoluir.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O relato demonstrou um diagnóstico raro na espécie felina, o que levou ao atraso no diagnóstico do paciente. Apesar da baixa frequência, recomenda-se que o diagnóstico de PE seja considerado como um diferencial em felinos com doenças cardiopulmonares sem outras causas evidentes, mesmo que a sintomatologia não evidencie prejuízo hemodinâmico ou deslocamento esternal facilmente palpável.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FOSSUM, TW. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. HORN, AP et al. Pectus excavatum--Correção cirúrgica utilizando tala externa de poliuretano fabricada com tecnologia de impressão 3D. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, (29)2, 2022. THRALL, DE. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 6 ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade	
2023	14825	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares	
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>	
		4848187 - JESSICA CORTEZ VICTORATT	I	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>	
		Edilson Isídio da Silva Junior	Victor Nowosh	JOSYANE CRISTINA OSHIKA	
<b>TITULO</b>	PECTUS EXCAVATUM EM FELINO ATENDIDO NO HOSPITAL				
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Pectus excavatum (PE) é uma malformação congênita incomum em cães e rara em gatos, caracterizada pelo desvio dorsal do esterno em relação às cartilagens costais, estendendo-se caudalmente a partir da quinta ou sexta costela. A origem deste processo está relacionada à pressão intrauterina anormal ao feto, falha na osteogênese ou condrogênese, raquitismo e falha na disposição de tendões ou musculatura diafragmática. A sintomatologia pode ser branda a grave, representada majoritariamente pelo desenvolvimento de arritmias, valvopatias, dispnéia, pneumonias recorrentes e êmese. Devido à baixa especificidade dos sintomas, o diagnóstico é feito através da radiografia e exame físico.</p>				
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de PE em um felino atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.				
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Foi atendida uma paciente felina, siamês, de aproximadamente 4 meses de idade, após histórico de pneumonia e diagnóstico acidental de PE realizado em colega. A principal queixa relatada foi discreta dispnéia e relutância da tutora em permitir atividade normal do animal devido ao desconhecimento do manejo de gatos com PE.</p> <p>Ao exame físico os parâmetros encontravam-se todos dentro da normalidade para a espécie, e a paciente apresentava bom padrão respiratório. Para visualização completa do PE a radiografia torácica com projeções latero-lateral e ventrodorsal foram realizadas, permitindo a visualização do deslocamento dorsal da 6ª, 7ª e 8ª esternébras, hipoplasia bilateral do 1º arco costal. Devido a possível alteração cardíaca a ecocardiografia foi solicitada, permitindo o diagnóstico de insuficiência valvar mitral discreta, sem repercussão hemodinâmica.</p>				
<b>RESULTADOS</b>	<p>O PE é uma malformação rara, ainda mais na espécie felina. Além disso, a apresentação clínica relatada é inespecífica, o que acarretou no atraso do diagnóstico do paciente. Os achados radiográficos condizem com a literatura com relação ao deslocamento dorsal da 6ª a 8ª esternébras, e hipoplasia bilateral do 1º arco costal. Todavia, o deslocamento da silhueta cardíaca não foi visualizado, explicando a ausência de manifestações cardiovasculares na paciente. O histórico de pneumonia pode estar relacionado ao PE, pois o complexo respiratório felino comum nesta idade é caracterizado principalmente por manifestações em trato respiratório superior. Sendo assim, a correção cirúrgica do PE pode ser indicada em recidivas do quadro. Devido ao PE de grau leve e ausência de repercussão hemodinâmica, a paciente obteve alta após retorno, sendo indicado apenas acompanhamento cardiológico da mesma, uma vez que com o avanço da idade a alteração diagnosticada cardíaca pode evoluir.</p>				
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O relato demonstrou um diagnóstico raro na espécie felina, o que levou ao atraso no diagnóstico do paciente. Apesar da baixa frequência, recomenda-se que o diagnóstico de PE seja considerado como um diferencial em felinos com doenças cardiopulmonares sem outras causas evidentes, mesmo que a sintomatologia não evidencie prejuízo hemodinâmico ou deslocamento esternal facilmente palpável.</p>				
<b>REFERENCIAS</b>	<p>FOSSUM, TW. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. HORN, AP et al. Pectus excavatum--Correção cirúrgica utilizando tala externa de poliuretano fabricada com tecnologia de impressão 3D. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, (29)2, 2022. THRALL, DE. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 6 ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.</p>				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14826	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4207734 - ELENA MONTES CALVO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	O Uso da Cirurgia Robótica no Câncer de Próstata - Comparação com o método cirúrgico tradicional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A próstata, glândula fundamental para a reprodução masculina, é frequentemente afetada pelo câncer, uma das principais causas de mortalidade entre os homens no Brasil. O diagnóstico desse câncer, geralmente obtido por meio de biópsias guiadas por ultrassom transretal, é crucial para definir o estágio da doença e, assim, determinar o tratamento mais adequado. Em alguns casos, o câncer de próstata progride de maneira lenta e não representa uma ameaça iminente à vida do paciente, permitindo a opção de acompanhamento clínico no lugar de tratamento imediato. No entanto, a prostatectomia radical (RP) é a intervenção cirúrgica padrão-ouro para pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco, intermediário ou baixo risco com alta probabilidade de progressão. Existem várias abordagens cirúrgicas, incluindo a prostatectomia radical laparoscópica (LRP), a prostatectomia radical assistida por robô (RARP) e a prostatectomia radical minimamente invasiva (MIRP).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é analisar e comparar essas abordagens cirúrgicas, destacando os benefícios da cirurgia robótica em relação à tradicional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 22 artigos publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês, obtidos em bases de dados como o National Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Embora as diferenças entre esses métodos não sejam substanciais em termos de resultados funcionais e oncológicos, há variações nos desfechos pós-operatórios. RARP, por exemplo, demonstrou taxas menores de complicações perioperatórias, perda de sangue, transfusões, complicações cardíacas, respiratórias e vasculares em comparação com RP. MIRP, por outro lado, apresentou menos complicações respiratórias, mas maior incidência de complicações geniturinárias após a cirurgia. A cirurgia robótica se destaca pela precisão, especialmente na complexa anatomia pélvica, minimizando o risco de impotência sexual e incontinência urinária, uma vez que preserva os vasos responsáveis pela ereção. Em contraste, a cirurgia tradicional é mais invasiva, associada a sangramento significativo, tempo de recuperação prolongado e maior risco de complicações.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O avanço tecnológico na medicina, como a cirurgia robótica, oferece benefícios significativos, incluindo menor risco de complicações, redução do tempo de internação e melhoria na qualidade de vida pós-cirúrgica. A cirurgia robótica é considerada o padrão-ouro no tratamento do câncer de próstata, principalmente para pacientes que não se enquadram na categoria de "inócuos", apresentando vantagens superiores em relação à abordagem tradicional.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Mukherjee K, Kamal KM. Variation in prostate surgery costs and outcomes in the USA: robot-assisted versus open radical prostatectomy. J Comp Eff Res [Internet]. Feb 2019 [citado 14 out 2023];8(3):143-55. 2. Takeshima Y, Yamada Y, Teshima T, Fujimura T, Kakutani S, Hakozaaki Y, Kimura N, Akiyama Y, Sato Y, Kawai T, Yamada D, Kume H. Clinical significance and risk factors of International Society of Urological Pathology (ISUP) grade upgrading in prostate cancer patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy. BMC Cancer [Internet]. 4 maio 2021 [citado 14 out 2023];21(1).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14826	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4313267 - MANUELLA KERSTING FREDIANI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	O Uso da Cirurgia Robótica no Câncer de Próstata - Comparação com o método cirúrgico tradicional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A próstata, glândula fundamental para a reprodução masculina, é frequentemente afetada pelo câncer, uma das principais causas de mortalidade entre os homens no Brasil. O diagnóstico desse câncer, geralmente obtido por meio de biópsias guiadas por ultrassom transretal, é crucial para definir o estágio da doença e, assim, determinar o tratamento mais adequado. Em alguns casos, o câncer de próstata progride de maneira lenta e não representa uma ameaça iminente à vida do paciente, permitindo a opção de acompanhamento clínico no lugar de tratamento imediato. No entanto, a prostatectomia radical (RP) é a intervenção cirúrgica padrão-ouro para pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco 6, intermediário ou baixo risco com alta probabilidade de progressão. Existem várias abordagens cirúrgicas, incluindo a prostatectomia radical laparoscópica (LRP), a prostatectomia radical assistida por robô (RARP) e a prostatectomia radical minimamente invasiva (MIRP).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é analisar e comparar essas abordagens cirúrgicas, destacando os benefícios da cirurgia robótica em relação à tradicional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 22 artigos publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês, obtidos em bases de dados como o National Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Embora as diferenças entre esses métodos não sejam substanciais em termos de resultados funcionais e oncológicos, há variações nos desfechos pós-operatórios. RARP, por exemplo, demonstrou taxas menores de complicações perioperatórias, perda de sangue, transfusões, complicações cardíacas, respiratórias e vasculares em comparação com RP. MIRP, por outro lado, apresentou menos complicações respiratórias, mas maior incidência de complicações geniturinárias após a cirurgia. A cirurgia robótica se destaca pela precisão 1, especialmente na complexa anatomia pélvica, minimizando o risco de impotência sexual e incontinência urinária, uma vez que preserva os vasos responsáveis pela ereção. Em contraste, a cirurgia tradicional é mais invasiva, associada a sangramento significativo, tempo de recuperação prolongado e maior risco de complicações.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O avanço tecnológico na medicina, como a cirurgia robótica, oferece benefícios significativos, incluindo menor risco de complicações, redução do tempo de internação e melhoria na qualidade de vida pós-cirúrgica. A cirurgia robótica é considerada o padrão-ouro no tratamento do câncer de próstata, principalmente para pacientes que não se enquadram na categoria de "inócuos", apresentando vantagens superiores em relação à abordagem tradicional.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Mukherjee K, Kamal KM. Variation in prostate surgery costs and outcomes in the USA: robot-assisted versus open radical prostatectomy. J Comp Eff Res [Internet]. Feb 2019 [citado 14 out 2023];8(3):143-55. 2. Takeshima Y, Yamada Y, Teshima T, Fujimura T, Kakutani S, Hakozaaki Y, Kimura N, Akiyama Y, Sato Y, Kawai T, Yamada D, Kume H. Clinical significance and risk factors of International Society of Urological Pathology (ISUP) grade upgrading in prostate cancer patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy. BMC Cancer [Internet]. 4 maio 2021 [citado 14 out 2023];21(1).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14826	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4313879 - EDUARDO JOSE DOMINGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	O Uso da Cirurgia Robótica no Câncer de Próstata - Comparação com o método cirúrgico tradicional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A próstata, glândula fundamental para a reprodução masculina, é frequentemente afetada pelo câncer, uma das principais causas de mortalidade entre os homens no Brasil. O diagnóstico desse câncer, geralmente obtido por meio de biópsias guiadas por ultrassom transretal, é crucial para definir o estágio da doença e, assim, determinar o tratamento mais adequado. Em alguns casos, o câncer de próstata progride de maneira lenta e não representa uma ameaça iminente à vida do paciente, permitindo a opção de acompanhamento clínico no lugar de tratamento imediato. No entanto, a prostatectomia radical (RP) é a intervenção cirúrgica padrão-ouro para pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco 6, intermediário ou baixo risco com alta probabilidade de progressão. Existem várias abordagens cirúrgicas, incluindo a prostatectomia radical laparoscópica (LRP), a prostatectomia radical assistida por robô (RARP) e a prostatectomia radical minimamente invasiva (MIRP).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é analisar e comparar essas abordagens cirúrgicas, destacando os benefícios da cirurgia robótica em relação à tradicional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 22 artigos publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês, obtidos em bases de dados como o National Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Embora as diferenças entre esses métodos não sejam substanciais em termos de resultados funcionais e oncológicos, há variações nos desfechos pós-operatórios. RARP, por exemplo, demonstrou taxas menores de complicações perioperatórias, perda de sangue, transfusões, complicações cardíacas, respiratórias e vasculares em comparação com RP. MIRP, por outro lado, apresentou menos complicações respiratórias, mas maior incidência de complicações geniturinárias após a cirurgia. A cirurgia robótica se destaca pela precisão 1, especialmente na complexa anatomia pélvica, minimizando o risco de impotência sexual e incontinência urinária, uma vez que preserva os vasos responsáveis pela ereção. Em contraste, a cirurgia tradicional é mais invasiva, associada a sangramento significativo, tempo de recuperação prolongado e maior risco de complicações.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O avanço tecnológico na medicina, como a cirurgia robótica, oferece benefícios significativos, incluindo menor risco de complicações, redução do tempo de internação e melhoria na qualidade de vida pós-cirúrgica. A cirurgia robótica é considerada o padrão-ouro no tratamento do câncer de próstata, principalmente para pacientes que não se enquadram na categoria de "inócuos", apresentando vantagens superiores em relação à abordagem tradicional.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Mukherjee K, Kamal KM. Variation in prostate surgery costs and outcomes in the USA: robot-assisted versus open radical prostatectomy. J Comp Eff Res [Internet]. Feb 2019 [citado 14 out 2023];8(3):143-55. 2. Takeshima Y, Yamada Y, Teshima T, Fujimura T, Kakutani S, Hakozaaki Y, Kimura N, Akiyama Y, Sato Y, Kawai T, Yamada D, Kume H. Clinical significance and risk factors of International Society of Urological Pathology (ISUP) grade upgrading in prostate cancer patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy. BMC Cancer [Internet]. 4 maio 2021 [citado 14 out 2023];21(1).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14826	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317009 - YASMIN GARCIA SCRIPILITI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	O Uso da Cirurgia Robótica no Câncer de Próstata - Comparação com o método cirúrgico tradicional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A próstata, glândula fundamental para a reprodução masculina, é frequentemente afetada pelo câncer, uma das principais causas de mortalidade entre os homens no Brasil. O diagnóstico desse câncer, geralmente obtido por meio de biópsias guiadas por ultrassom transretal, é crucial para definir o estágio da doença e, assim, determinar o tratamento mais adequado. Em alguns casos, o câncer de próstata progride de maneira lenta e não representa uma ameaça iminente à vida do paciente, permitindo a opção de acompanhamento clínico no lugar de tratamento imediato. No entanto, a prostatectomia radical (RP) é a intervenção cirúrgica padrão-ouro para pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco 6, intermediário ou baixo risco com alta probabilidade de progressão. Existem várias abordagens cirúrgicas, incluindo a prostatectomia radical laparoscópica (LRP), a prostatectomia radical assistida por robô (RARP) e a prostatectomia radical minimamente invasiva (MIRP).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é analisar e comparar essas abordagens cirúrgicas, destacando os benefícios da cirurgia robótica em relação à tradicional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 22 artigos publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês, obtidos em bases de dados como o National Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Embora as diferenças entre esses métodos não sejam substanciais em termos de resultados funcionais e oncológicos, há variações nos desfechos pós-operatórios. RARP, por exemplo, demonstrou taxas menores de complicações perioperatórias, perda de sangue, transfusões, complicações cardíacas, respiratórias e vasculares em comparação com RP. MIRP, por outro lado, apresentou menos complicações respiratórias, mas maior incidência de complicações geniturinárias após a cirurgia. A cirurgia robótica se destaca pela precisão 1, especialmente na complexa anatomia pélvica, minimizando o risco de impotência sexual e incontinência urinária, uma vez que preserva os vasos responsáveis pela ereção. Em contraste, a cirurgia tradicional é mais invasiva, associada a sangramento significativo, tempo de recuperação prolongado e maior risco de complicações.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O avanço tecnológico na medicina, como a cirurgia robótica, oferece benefícios significativos, incluindo menor risco de complicações, redução do tempo de internação e melhoria na qualidade de vida pós-cirúrgica. A cirurgia robótica é considerada o padrão-ouro no tratamento do câncer de próstata, principalmente para pacientes que não se enquadram na categoria de "inócuos", apresentando vantagens superiores em relação à abordagem tradicional.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Mukherjee K, Kamal KM. Variation in prostate surgery costs and outcomes in the USA: robot-assisted versus open radical prostatectomy. J Comp Eff Res [Internet]. Feb 2019 [citado 14 out 2023];8(3):143-55. 2. Takeshima Y, Yamada Y, Teshima T, Fujimura T, Kakutani S, Hakozaaki Y, Kimura N, Akiyama Y, Sato Y, Kawai T, Yamada D, Kume H. Clinical significance and risk factors of International Society of Urological Pathology (ISUP) grade upgrading in prostate cancer patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy. BMC Cancer [Internet]. 4 maio 2021 [citado 14 out 2023];21(1).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14826	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4317106 - HENRIQUE ITO GUEBARRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	O Uso da Cirurgia Robótica no Câncer de Próstata - Comparação com o método cirúrgico tradicional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A próstata, glândula fundamental para a reprodução masculina, é frequentemente afetada pelo câncer, uma das principais causas de mortalidade entre os homens no Brasil. O diagnóstico desse câncer, geralmente obtido por meio de biópsias guiadas por ultrassom transretal, é crucial para definir o estágio da doença e, assim, determinar o tratamento mais adequado. Em alguns casos, o câncer de próstata progride de maneira lenta e não representa uma ameaça iminente à vida do paciente, permitindo a opção de acompanhamento clínico no lugar de tratamento imediato. No entanto, a prostatectomia radical (RP) é a intervenção cirúrgica padrão-ouro para pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco 6, intermediário ou baixo risco com alta probabilidade de progressão. Existem várias abordagens cirúrgicas, incluindo a prostatectomia radical laparoscópica (LRP), a prostatectomia radical assistida por robô (RARP) e a prostatectomia radical minimamente invasiva (MIRP).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é analisar e comparar essas abordagens cirúrgicas, destacando os benefícios da cirurgia robótica em relação à tradicional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 22 artigos publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês, obtidos em bases de dados como o National Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Embora as diferenças entre esses métodos não sejam substanciais em termos de resultados funcionais e oncológicos, há variações nos desfechos pós-operatórios. RARP, por exemplo, demonstrou taxas menores de complicações perioperatórias, perda de sangue, transfusões, complicações cardíacas, respiratórias e vasculares em comparação com RP. MIRP, por outro lado, apresentou menos complicações respiratórias, mas maior incidência de complicações geniturinárias após a cirurgia. A cirurgia robótica se destaca pela precisão 1, especialmente na complexa anatomia pélvica, minimizando o risco de impotência sexual e incontinência urinária, uma vez que preserva os vasos responsáveis pela ereção. Em contraste, a cirurgia tradicional é mais invasiva, associada a sangramento significativo, tempo de recuperação prolongado e maior risco de complicações.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O avanço tecnológico na medicina, como a cirurgia robótica, oferece benefícios significativos, incluindo menor risco de complicações, redução do tempo de internação e melhoria na qualidade de vida pós-cirúrgica. A cirurgia robótica é considerada o padrão-ouro no tratamento do câncer de próstata, principalmente para pacientes que não se enquadram na categoria de "inócuos", apresentando vantagens superiores em relação à abordagem tradicional.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Mukherjee K, Kamal KM. Variation in prostate surgery costs and outcomes in the USA: robot-assisted versus open radical prostatectomy. J Comp Eff Res [Internet]. Feb 2019 [citado 14 out 2023];8(3):143-55. 2. Takeshima Y, Yamada Y, Teshima T, Fujimura T, Kakutani S, Hakozaaki Y, Kimura N, Akiyama Y, Sato Y, Kawai T, Yamada D, Kume H. Clinical significance and risk factors of International Society of Urological Pathology (ISUP) grade upgrading in prostate cancer patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy. BMC Cancer [Internet]. 4 maio 2021 [citado 14 out 2023];21(1).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14826	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4317556 - FERNANDA CAMARGO SERATO GRANDJEAN VON BRUSKY		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Píber		
<b>TITULO</b>	O Uso da Cirurgia Robótica no Câncer de Próstata - Comparação com o método cirúrgico tradicional			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A próstata, glândula fundamental para a reprodução masculina, é frequentemente afetada pelo câncer, uma das principais causas de mortalidade entre os homens no Brasil. O diagnóstico desse câncer, geralmente obtido por meio de biópsias guiadas por ultrassom transretal, é crucial para definir o estágio da doença e, assim, determinar o tratamento mais adequado. Em alguns casos, o câncer de próstata progride de maneira lenta e não representa uma ameaça iminente à vida do paciente, permitindo a opção de acompanhamento clínico no lugar de tratamento imediato. No entanto, a prostatectomia radical (RP) é a intervenção cirúrgica padrão-ouro para pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco, intermediário ou baixo risco com alta probabilidade de progressão. Existem várias abordagens cirúrgicas, incluindo a prostatectomia radical laparoscópica (LRP), a prostatectomia radical assistida por robô (RARP) e a prostatectomia radical minimamente invasiva (MIRP).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é analisar e comparar essas abordagens cirúrgicas, destacando os benefícios da cirurgia robótica em relação à tradicional.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisados 22 artigos publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês, obtidos em bases de dados como o National Library of Medicine (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Embora as diferenças entre esses métodos não sejam substanciais em termos de resultados funcionais e oncológicos, há variações nos desfechos pós-operatórios. RARP, por exemplo, demonstrou taxas menores de complicações perioperatórias, perda de sangue, transfusões, complicações cardíacas, respiratórias e vasculares em comparação com RP. MIRP, por outro lado, apresentou menos complicações respiratórias, mas maior incidência de complicações geniturinárias após a cirurgia. A cirurgia robótica se destaca pela precisão 1, especialmente na complexa anatomia pélvica, minimizando o risco de impotência sexual e incontinência urinária, uma vez que preserva os vasos responsáveis pela ereção. Em contraste, a cirurgia tradicional é mais invasiva, associada a sangramento significativo, tempo de recuperação prolongado e maior risco de complicações.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	O avanço tecnológico na medicina, como a cirurgia robótica, oferece benefícios significativos, incluindo menor risco de complicações, redução do tempo de internação e melhoria na qualidade de vida pós-cirúrgica. A cirurgia robótica é considerada o padrão-ouro no tratamento do câncer de próstata, principalmente para pacientes que não se enquadram na categoria de "inócuos", apresentando vantagens superiores em relação à abordagem tradicional.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Mukherjee K, Kamal KM. Variation in prostate surgery costs and outcomes in the USA: robot-assisted versus open radical prostatectomy. J Comp Eff Res [Internet]. Feb 2019 [citado 14 out 2023];8(3):143-55. 2. Takeshima Y, Yamada Y, Teshima T, Fujimura T, Kakutani S, Hakozaiki Y, Kimura N, Akiyama Y, Sato Y, Kawai T, Yamada D, Kume H. Clinical significance and risk factors of International Society of Urological Pathology (ISUP) grade upgrading in prostate cancer patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy. BMC Cancer [Internet]. 4 maio 2021 [citado 14 out 2023];21(1).</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14828	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3985202 - KLEBER VALDO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Contribuições do marketing digital nas estratégias de marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	O marketing digital é um canal de fácil comunicação com público-alvo, reduzindo custos para empresas anunciantes nas mídias sociais (SILVA, LANINI, 2023). Para aprimorar esse canal, em 2021, a Google lançou a ferramenta PMax (Performance Max), modalidade de campanha do Google Ads, combinando inteligência artificial e aprendizado de máquina, gerando melhores resultados e atraindo clientes em todos os canais do Google (MUITO MAIS DIGITAL, 2022).			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar, entender, fazer comparações e analisar se ações de marketing com esta ferramenta nas redes sociais tendem a influenciar clientes a consumirem e reconhecerem marcas por traz dos anúncios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com revisão teórica, documentos e dados secundários (MATTAR, 2011; VERGARA, 2044) obtidos por estudo de caso para compreender evento real (YIN, 2015).			
<b>RESULTADOS</b>	As empresas Carrefour e Banco Pan utilizam ferramentas Google nas redes sociais: Banco Pan utiliza Google Ads e PMax; Carrefour, apenas Google Ads. A análise de resultados do Carrefour em maio, junho e julho de 2023 apontou: 39.945.189 cliques, CPC (custo por clique) de R\$ 0,59, 348.411 transações, 14.470.172 usuários, taxa conversão e-commerce de 1,16% e receita de R\$ 422.551.058,32. O Pmax melhoraria suas estratégias combinando imagens e textos em anúncios de forma otimizada. O melhor funcionamento da PMax depende de otimizações: o Banco Pan forneceu planilha de empréstimo com garantia de veículo: junho/julho (sem otimização) e agosto (com otimização) de 2023. Antes da otimização o resultado não saiu como esperado, a otimização permitiu focar geração de leads (potenciais consumidores com dados em site - SERASA EXPERIAN, 2023) A otimização reduziu CPL de R\$ 13,91/julho/R\$ 5,22 agosto e CAC (Custo por aquisição) de 33% para 8%. Antes da otimização do PMax não havia leads qualificados para conversão (público mar aberto). A otimização permitiu entender o público aumentando produção final (R\$ 935.261,53 agosto/R\$ 46.786,48 junho) com menor investimento (R\$ 79.174,00 agosto/R\$ 339.034,00 julho).			
<b>CONCLUSOES</b>	A estratégia de marketing permite comunicar marcas e atrair clientes, requerendo atualização de tecnologias disponíveis, pois comparando as empresas encontramos três realidades: o Carrefour que usa apenas Google Ads e potencializaria resultados com Pmax; um banco que usa Google Ads e implanta eficazmente o Pmax por mar aberto; a eficiência de seu uso após sua otimização.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MUITO MAIS DIGITAL. Campanhas Pmax (Performance Max) – o que são e como utilizá-las? Muito mais digital – MMD+. 28 mar. 2022. Disponível em: (#60)https://muitomaisdigital.com.br/blog/campanhas-pmax-como-utilizar/(#62). Acesso em: 23 set. 2023. SERASA EXPERIAN. O que é lead: Saiba mais sobre sua definição e importância para gerar mais vendas. Sersa Experian. 01 fev. 2023. Disponível em: (#60)https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/marketing/o-que-e-lead/#:~:text=O%20termo%20E2%80%9Clead%2%80%9D%20define%20potenciais,representando%20uma%20oportunidade%20de%20venda(#62). Acesso em: 11 out. 2023. SILVA, Ricardo Gomes; LANINI, Telma Regina Esteves. Marketing e comunicação no universo digital. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. E-book. Disponível em: (#60)https://plataforma.bvirtual.com.br(#62). Acesso em: 19 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14828	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4119002 - CAMILA APARECIDA SILVESTRE SIQUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Contribuições do marketing digital nas estratégias de marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	O marketing digital é um canal de fácil comunicação com público-alvo, reduzindo custos para empresas anunciantes nas mídias sociais (SILVA, LANINI, 2023). Para aprimorar esse canal, em 2021, a Google lançou a ferramenta PMax (Performance Max), modalidade de campanha do Google Ads, combinando inteligência artificial e aprendizado de máquina, gerando melhores resultados e atraindo clientes em todos os canais do Google (MUITO MAIS DIGITAL, 2022).			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar, entender, fazer comparações e analisar se ações de marketing com esta ferramenta nas redes sociais tendem a influenciar clientes a consumirem e reconhecerem marcas por traz dos anúncios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com revisão teórica, documentos e dados secundários (MATTAR, 2011; VERGARA, 2044) obtidos por estudo de caso para compreender evento real (YIN, 2015).			
<b>RESULTADOS</b>	As empresas Carrefour e Banco Pan utilizam ferramentas Google nas redes sociais: Banco Pan utiliza Google Ads e PMax; Carrefour, apenas Google Ads. A análise de resultados do Carrefour em maio, junho e julho de 2023 apontou: 39.945.189 cliques, CPC (custo por clique) de R\$ 0,59, 348.411 transações, 14.470.172 usuários, taxa conversão e-commerce de 1,16% e receita de R\$ 422.551.058,32. O Pmax melhoraria suas estratégias combinando imagens e textos em anúncios de forma otimizada. O melhor funcionamento da PMax depende de otimizações: o Banco Pan forneceu planilha de empréstimo com garantia de veículo: junho/julho (sem otimização) e agosto (com otimização) de 2023. Antes da otimização o resultado não saiu como esperado, a otimização permitiu focar geração de leads (potenciais consumidores com dados em site - SERASA EXPERIAN, 2023) A otimização reduziu CPL de R\$ 13,91/julho/R\$ 5,22 agosto e CAC (Custo por aquisição) de 33% para 8%. Antes da otimização do PMax não havia leads qualificados para conversão (público mar aberto). A otimização permitiu entender o público aumentando produção final (R\$ 935.261,53 agosto/R\$ 46.786,48 junho) com menor investimento (R\$ 79.174,00 agosto/R\$ 339.034,00 julho).			
<b>CONCLUSOES</b>	A estratégia de marketing permite comunicar marcas e atrair clientes, requerendo atualização de tecnologias disponíveis, pois comparando as empresas encontramos três realidades: o Carrefour que usa apenas Google Ads e potencializaria resultados com Pmax; um banco que usa Google Ads e implanta eficazmente o Pmax por mar aberto; a eficiência de seu uso após sua otimização.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MUITO MAIS DIGITAL. Campanhas Pmax (Performance Max) – o que são e como utilizá-las? Muito mais digital – MMD+. 28 mar. 2022. Disponível em: (#60)https://muitomaisdigital.com.br/blog/campanhas-pmax-como-utilizar/(#62). Acesso em: 23 set. 2023. SERASA EXPERIAN. O que é lead: Saiba mais sobre sua definição e importância para gerar mais vendas. Sersa Experian. 01 fev. 2023. Disponível em: (#60)https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/marketing/o-que-e-lead/#:~:text=O%20termo%20E2%80%9Clead%2%80%9D%20define%20potenciais,representando%20uma%20oportunidade%20de%20venda(#62). Acesso em: 11 out. 2023. SILVA, Ricardo Gomes; LANINI, Telma Regina Esteves. Marketing e comunicação no universo digital. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. E-book. Disponível em: (#60)https://plataforma.bvirtual.com.br(#62). Acesso em: 19 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14828	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4518047 - ANA BEATRIZ LIMA DIAS DE SA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Contribuições do marketing digital nas estratégias de marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	O marketing digital é um canal de fácil comunicação com público-alvo, reduzindo custos para empresas anunciantes nas mídias sociais (SILVA, LANINI, 2023). Para aprimorar esse canal, em 2021, a Google lançou a ferramenta PMax (Performance Max), modalidade de campanha do Google Ads, combinando inteligência artificial e aprendizado de máquina, gerando melhores resultados e atraindo clientes em todos os canais do Google (MUITO MAIS DIGITAL, 2022).			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar, entender, fazer comparações e analisar se ações de marketing com esta ferramenta nas redes sociais tendem a influenciar clientes a consumirem e reconhecerem marcas por traz dos anúncios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com revisão teórica, documentos e dados secundários (MATTAR, 2011; VERGARA, 2044) obtidos por estudo de caso para compreender evento real (YIN, 2015).			
<b>RESULTADOS</b>	As empresas Carrefour e Banco Pan utilizam ferramentas Google nas redes sociais: Banco Pan utiliza Google Ads e PMax; Carrefour, apenas Google Ads. A análise de resultados do Carrefour em maio, junho e julho de 2023 apontou: 39.945.189 cliques, CPC (custo por clique) de R\$ 0,59, 348.411 transações, 14.470.172 usuários, taxa conversão e-commerce de 1,16% e receita de R\$ 422.551.058,32. O Pmax melhoraria suas estratégias combinando imagens e textos em anúncios de forma otimizada. O melhor funcionamento da PMax depende de otimizações: o Banco Pan forneceu planilha de empréstimo com garantia de veículo: junho/julho (sem otimização) e agosto (com otimização) de 2023. Antes da otimização o resultado não saiu como esperado, a otimização permitiu focar geração de leads (potenciais consumidores com dados em site - SERASA EXPERIAN, 2023) A otimização reduziu CPL de R\$ 13,91/julho/R\$ 5,22 agosto e CAC (Custo por aquisição) de 33% para 8%. Antes da otimização do PMax não havia leads qualificados para conversão (público mar aberto). A otimização permitiu entender o público aumentando produção final (R\$ 935.261,53 agosto/R\$ 46.786,48 junho) com menor investimento (R\$ 79.174,00 agosto/R\$ 339.034,00 julho).			
<b>CONCLUSOES</b>	A estratégia de marketing permite comunicar marcas e atrair clientes, requerendo atualização de tecnologias disponíveis, pois comparando as empresas encontramos três realidades: o Carrefour que usa apenas Google Ads e potencializaria resultados com Pmax; um banco que usa Google Ads e implanta eficazmente o Pmax por mar aberto; a eficiência de seu uso após sua otimização.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MUITO MAIS DIGITAL. Campanhas Pmax (Performance Max) – o que são e como utilizá-las? Muito mais digital – MMD+. 28 mar. 2022. Disponível em: (#60)https://muitomaisdigital.com.br/blog/campanhas-pmax-como-utilizar/(#62). Acesso em: 23 set. 2023. SERASA EXPERIAN. O que é lead: Saiba mais sobre sua definição e importância para gerar mais vendas. Serasa Experian. 01 fev. 2023. Disponível em: (#60)https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/marketing/o-que-e-lead/#:~:text=O%20termo%20E2%80%9Clead%2%80%9D%20define%20potenciais,representando%20uma%20oportunidade%20de%20venda(#62). Acesso em: 11 out. 2023. SILVA, Ricardo Gomes; LANINI, Telma Regina Esteves. Marketing e comunicação no universo digital. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. E-book. Disponível em: (#60)https://plataforma.bvirtual.com.br(#62). Acesso em: 19 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14828	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577809 - LUANA LENYER BESSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	Contribuições do marketing digital nas estratégias de marketing			
<b>INTRODUCAO</b>	O marketing digital é um canal de fácil comunicação com público-alvo, reduzindo custos para empresas anunciantes nas mídias sociais (SILVA, LANINI, 2023). Para aprimorar esse canal, em 2021, a Google lançou a ferramenta PMax (Performance Max), modalidade de campanha do Google Ads, combinando inteligência artificial e aprendizado de máquina, gerando melhores resultados e atraindo clientes em todos os canais do Google (MUITO MAIS DIGITAL, 2022).			
<b>OBJETIVOS</b>	Demonstrar, entender, fazer comparações e analisar se ações de marketing com esta ferramenta nas redes sociais tendem a influenciar clientes a consumirem e reconhecerem marcas por traz dos anúncios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com revisão teórica, documentos e dados secundários (MATTAR, 2011; VERGARA, 2044) obtidos por estudo de caso para compreender evento real (YIN, 2015).			
<b>RESULTADOS</b>	As empresas Carrefour e Banco Pan utilizam ferramentas Google nas redes sociais: Banco Pan utiliza Google Ads e PMax; Carrefour, apenas Google Ads. A análise de resultados do Carrefour em maio, junho e julho de 2023 apontou: 39.945.189 cliques, CPC (custo por clique) de R\$ 0,59, 348.411 transações, 14.470.172 usuários, taxa conversão e-commerce de 1,16% e receita de R\$ 422.551.058,32. O Pmax melhoraria suas estratégias combinando imagens e textos em anúncios de forma otimizada. O melhor funcionamento da PMax depende de otimizações: o Banco Pan forneceu planilha de empréstimo com garantia de veículo: junho/julho (sem otimização) e agosto (com otimização) de 2023. Antes da otimização o resultado não saiu como esperado, a otimização permitiu focar geração de leads (potenciais consumidores com dados em site - SERASA EXPERIAN, 2023) A otimização reduziu CPL de R\$ 13,91/julho/R\$ 5,22 agosto e CAC (Custo por aquisição) de 33% para 8%. Antes da otimização do PMax não havia leads qualificados para conversão (público mar aberto). A otimização permitiu entender o público aumentando produção final (R\$ 935.261,53 agosto/R\$ 46.786,48 junho) com menor investimento (R\$ 79.174,00 agosto/R\$ 339.034,00 julho).			
<b>CONCLUSOES</b>	A estratégia de marketing permite comunicar marcas e atrair clientes, requerendo atualização de tecnologias disponíveis, pois comparando as empresas encontramos três realidades: o Carrefour que usa apenas Google Ads e potencializaria resultados com Pmax; um banco que usa Google Ads e implanta eficazmente o Pmax por mar aberto; a eficiência de seu uso após sua otimização.			
<b>REFERENCIAS</b>	MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MUITO MAIS DIGITAL. Campanhas Pmax (Performance Max) – o que são e como utilizá-las? Muito mais digital – MMD+. 28 mar. 2022. Disponível em: (#60)https://muitomaisdigital.com.br/blog/campanhas-pmax-como-utilizar/(#62). Acesso em: 23 set. 2023. SERASA EXPERIAN. O que é lead: Saiba mais sobre sua definição e importância para gerar mais vendas. Serasa Experian. 01 fev. 2023. Disponível em: (#60)https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/marketing/o-que-e-lead/#:~:text=O%20termo%20E2%80%9Clead%2%80%9D%20define%20potenciais,representando%20uma%20oportunidade%20de%20venda(#62). Acesso em: 11 out. 2023. SILVA, Ricardo Gomes; LANINI, Telma Regina Esteves. Marketing e comunicação no universo digital. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. E-book. Disponível em: (#60)https://plataforma.bvirtual.com.br(#62). Acesso em: 19 set. 2023. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14829	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4137205 - SILVIA LEN	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: " Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, consequentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14829	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4312988 - GABRIELLA CUNHA NOVAES SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: " Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, consequentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14829	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4313461 - ISABELLA PERIN MARTINS DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: " Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, consequentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14829	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317211 - LARISSA MOUADEB	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: " Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, consequentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322:owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14829	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317955 - DANIELLA BIDLOVSKY	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: " Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322:owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14829	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4889126 - LUANA LAURITO BATISTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: " Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322:owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14831	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5066484 - HENRIQUE GIACOMELLI SAVAS MISSAILIDIS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NO SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Nas últimas três décadas, o Brasil passou por uma transformação significativa na gestão do saneamento básico, evoluindo de uma abordagem fragmentada para uma legislação integrada e descentralizada com a promulgação da Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. No Brasil, a falta de acesso à água potável e saneamento adequado impacta diretamente a saúde da população, sobretudo das crianças, exigindo investimentos urgentes, panorama este que não é diferente do experimentado pelo município de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizamos intervenções educativas com intuito de melhorar a saúde pública a partir da construção de consciência coletiva a respeito da necessidade de saneamento básico como sinônimo de qualidade de vida da população de um território de saúde no município de Guarulhos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Desempenhamos uma campanha através de distribuição de panfletos, os quais demonstram a eficácia e a importância do saneamento básico para a população. O público alvo para distribuição do material educativo foram as trinta (30) famílias atendidas na UBS da Comunidade São Rafael, no município de Guarulhos. A abordagem foi realizada durante um (1) dia de funcionamento das atividades assistenciais da unidade, de modo que estes usuários da rede foram orientados sobre a relevância e o impacto do saneamento básico em suas vidas e na de seus familiares e colegas.			
<b>RESULTADOS</b>	Promovemos a informação sobre o saneamento básico, reconhecido como um direito humano pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual inclui em sua legislação o direito de todos os cidadãos ao acesso a serviços de água potável, saneamento básico e higiene adequados para garantir uma vida digna e saudável. Portanto, através da divulgação destes panfletos a população local foi conscientizada sobre práticas de higiene, melhorias nas condições de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se com base nesse estudo que a conscientização populacional pautada na entrega de panfletos na UBS de São Rafael, mostrou-se eficiente em seu papel de educação e criação de novos hábitos na população da comunidade local, informando a população sobre os benefícios do saneamento básico, o seu direito à esse, e maneiras de prevenção de doenças de maior prevalência em locais nos quais esse direito básico não é concedido, e, portanto, doenças relacionadas a essa escassez. Mudanças mais profundas relacionadas a qualidade de vida dessa comunidade relacionam-se diretamente com a implementação de políticas públicas governamentais, as quais são de responsabilidade municipal e fogem da alçada de ação desse projeto.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<a href="https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf</a> <a href="https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687">https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687</a> <a href="https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas-vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico">https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas-vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14831	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Apresentação</b>		
		5232805 - FELIPE MESQUITA MOREIRA MOTA RODRIGUES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		<b>Orientador Externo</b>		
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
<b>TITULO</b>	INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NO SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Nas últimas três décadas, o Brasil passou por uma transformação significativa na gestão do saneamento básico, evoluindo de uma abordagem fragmentada para uma legislação integrada e descentralizada com a promulgação da Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. No Brasil, a falta de acesso à água potável e saneamento adequado impacta diretamente a saúde da população, sobretudo das crianças, exigindo investimentos urgentes, panorama este que não é diferente do experimentado pelo município de Guarulhos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Realizamos intervenções educativas com intuito de melhorar a saúde pública a partir da construção de consciência coletiva a respeito da necessidade de saneamento básico como sinônimo de qualidade de vida da população de um território de saúde no município de Guarulhos.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Desempenhamos uma campanha através de distribuição de panfletos, os quais demonstram a eficácia e a importância do saneamento básico para a população. O público alvo para distribuição do material educativo foram as trinta (30) famílias atendidas na UBS da Comunidade São Rafael, no município de Guarulhos. A abordagem foi realizada durante um (1) dia de funcionamento das atividades assistenciais da unidade, de modo que estes usuários da rede foram orientados sobre a relevância e o impacto do saneamento básico em suas vidas e na de seus familiares e colegas.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Promovemos a informação sobre o saneamento básico, reconhecido como um direito humano pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual inclui em sua legislação o direito de todos os cidadãos ao acesso a serviços de água potável, saneamento básico e higiene adequados para garantir uma vida digna e saudável. Portanto, através da divulgação destes panfletos a população local foi conscientizada sobre práticas de higiene, melhorias nas condições de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Conclui-se com base nesse estudo que a conscientização populacional pautada na entrega de panfletos na UBS de São Rafael, mostrou-se eficiente em seu papel de educação e criação de novos hábitos na população da comunidade local, informando a população sobre os benefícios do saneamento básico, o seu direito à esse, e maneiras de prevenção de doenças de maior prevalência em locais nos quais esse direito básico não é concedido, e, portanto, doenças relacionadas a essa escassez. Mudanças mais profundas relacionadas a qualidade de vida dessa comunidade relacionam-se diretamente com a implementação de políticas públicas governamentais, as quais são de responsabilidade municipal e fogem da alçada de ação desse projeto.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p><a href="https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf</a>  <a href="https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687">https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687</a> <a href="https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas-vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico">https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas-vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14831	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233721 - FERNANDA DE LUCAS ARAGÃO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	1 - Poster
<b>TITULO</b>	INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NO SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Nas últimas três décadas, o Brasil passou por uma transformação significativa na gestão do saneamento básico, evoluindo de uma abordagem fragmentada para uma legislação integrada e descentralizada com a promulgação da Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. No Brasil, a falta de acesso à água potável e saneamento adequado impacta diretamente a saúde da população, sobretudo das crianças, exigindo investimentos urgentes, panorama este que não é diferente do experimentado pelo município de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizamos intervenções educativas com intuito de melhorar a saúde pública a partir da construção de consciência coletiva a respeito da necessidade de saneamento básico como sinônimo de qualidade de vida da população de um território de saúde no município de Guarulhos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Desempenhamos uma campanha através de distribuição de panfletos, os quais demonstram a eficácia e a importância do saneamento básico para a população. O público alvo para distribuição do material educativo foram as trinta (30) famílias atendidas na UBS da Comunidade São Rafael, no município de Guarulhos. A abordagem foi realizada durante um (1) dia de funcionamento das atividades assistenciais da unidade, de modo que estes usuários da rede foram orientados sobre a relevância e o impacto do saneamento básico em suas vidas e na de seus familiares e colegas.			
<b>RESULTADOS</b>	Promovemos a informação sobre o saneamento básico, reconhecido como um direito humano pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual inclui em sua legislação o direito de todos os cidadãos ao acesso a serviços de água potável, saneamento básico e higiene adequados para garantir uma vida digna e saudável. Portanto, através da divulgação destes panfletos a população local foi conscientizada sobre práticas de higiene, melhorias nas condições de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Conclui-se com base nesse estudo que a conscientização populacional pautada na entrega de panfletos na UBS de São Rafael, mostrou-se eficiente em seu papel de educação e criação de novos hábitos na população da comunidade local, informando a população sobre os benefícios do saneamento básico, o seu direito à esse, e maneiras de prevenção de doenças de maior prevalência em locais nos quais esse direito básico não é concedido, e, portanto, doenças relacionadas a essa escassez. Mudanças mais profundas relacionadas a qualidade de vida dessa comunidade relacionam-se diretamente com a implementação de políticas públicas governamentais, as quais são de responsabilidade municipal e fogem da alçada de ação desse projeto.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<a href="https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf</a> <a href="https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687">https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687</a> <a href="https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas-vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico">https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas-vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14831	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5233755 - GIOVANNA VITHORIA DE BRITO LYRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NO SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Nas últimas três décadas, o Brasil passou por uma transformação significativa na gestão do saneamento básico, evoluindo de uma abordagem fragmentada para uma legislação integrada e descentralizada com a promulgação da Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. No Brasil, a falta de acesso à água potável e saneamento adequado impacta diretamente a saúde da população, sobretudo das crianças, exigindo investimentos urgentes, panorama este que não é diferente do experimentado pelo município de Guarulhos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Realizamos intervenções educativas com intuito de melhorar a saúde pública a partir da construção de consciência coletiva a respeito da necessidade de saneamento básico como sinônimo de qualidade de vida da população de um território de saúde no município de Guarulhos.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Desempenhamos uma campanha através de distribuição de panfletos, os quais demonstram a eficácia e a importância do saneamento básico para a população. O público alvo para distribuição do material educativo foram as trinta (30) famílias atendidas na UBS da Comunidade São Rafael, no município de Guarulhos. A abordagem foi realizada durante um (1) dia de funcionamento das atividades assistenciais da unidade, de modo que estes usuários da rede foram orientados sobre a relevância e o impacto do saneamento básico em suas vidas e na de seus familiares e colegas.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Promovemos a informação sobre o saneamento básico, reconhecido como um direito humano pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual inclui em sua legislação o direito de todos os cidadãos ao acesso a serviços de água potável, saneamento básico e higiene adequados para garantir uma vida digna e saudável. Portanto, através da divulgação destes panfletos a população local foi conscientizada sobre práticas de higiene, melhorias nas condições de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Conclui-se com base nesse estudo que a conscientização populacional pautada na entrega de panfletos na UBS de São Rafael, mostrou-se eficiente em seu papel de educação e criação de novos hábitos na população da comunidade local, informando a população sobre os benefícios do saneamento básico, o seu direito à esse, e maneiras de prevenção de doenças de maior prevalência em locais nos quais esse direito básico não é concedido, e, portanto, doenças relacionadas a essa escassez. Mudanças mais profundas relacionadas a qualidade de vida dessa comunidade relacionam-se diretamente com a implementação de políticas públicas governamentais, as quais são de responsabilidade municipal e fogem da alçada de ação desse projeto.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p><a href="https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVcm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf</a>  <a href="https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687">https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687</a> <a href="https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas- vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico">https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas- vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14831	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5233771 - GIOVANNA SANCHEZ DE CARVALHO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NO SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Nas últimas três décadas, o Brasil passou por uma transformação significativa na gestão do saneamento básico, evoluindo de uma abordagem fragmentada para uma legislação integrada e descentralizada com a promulgação da Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. No Brasil, a falta de acesso à água potável e saneamento adequado impacta diretamente a saúde da população, sobretudo das crianças, exigindo investimentos urgentes, panorama este que não é diferente do experimentado pelo município de Guarulhos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Realizamos intervenções educativas com intuito de melhorar a saúde pública a partir da construção de consciência coletiva a respeito da necessidade de saneamento básico como sinônimo de qualidade de vida da população de um território de saúde no município de Guarulhos.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Desempenhamos uma campanha através de distribuição de panfletos, os quais demonstram a eficácia e a importância do saneamento básico para a população. O público alvo para distribuição do material educativo foram as trinta (30) famílias atendidas na UBS da Comunidade São Rafael, no município de Guarulhos. A abordagem foi realizada durante um (1) dia de funcionamento das atividades assistenciais da unidade, de modo que estes usuários da rede foram orientados sobre a relevância e o impacto do saneamento básico em suas vidas e na de seus familiares e colegas.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Promovemos a informação sobre o saneamento básico, reconhecido como um direito humano pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual inclui em sua legislação o direito de todos os cidadãos ao acesso a serviços de água potável, saneamento básico e higiene adequados para garantir uma vida digna e saudável. Portanto, através da divulgação destes panfletos a população local foi conscientizada sobre práticas de higiene, melhorias nas condições de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Conclui-se com base nesse estudo que a conscientização populacional pautada na entrega de panfletos na UBS de São Rafael, mostrou-se eficiente em seu papel de educação e criação de novos hábitos na população da comunidade local, informando a população sobre os benefícios do saneamento básico, o seu direito à esse, e maneiras de prevenção de doenças de maior prevalência em locais nos quais esse direito básico não é concedido, e, portanto, doenças relacionadas a essa escassez. Mudanças mais profundas relacionadas a qualidade de vida dessa comunidade relacionam-se diretamente com a implementação de políticas públicas governamentais, as quais são de responsabilidade municipal e fogem da alçada de ação desse projeto.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p><a href="https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVCm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/rap/a/KCkSKLRdQVCm5CwJLY5s9DS/?lang=pt(#38)format=pdf</a>  <a href="https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687">https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/151/proposals/1687</a> <a href="https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas- vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico">https://brasil.un.org/pt-br/101526-mais-de-42-bilh%C3%B5es-de-pessoas- vivem-sem-acesso-saneamento-b%C3%A1sico</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14833	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4312759 - RACHEL ANN ASENCIO BRACELIS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Câncer de testículo e seu diagnóstico: uma revisão integrativa			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O câncer testicular é a neoplasia mais comum entre homens de 18 a 39 anos, corresponde mundialmente a 1% dos tumores masculinos e 5% das malignidades urológicas. A doença se divide em dois grandes grupos: os tumores não seminomatosos e os seminomatosos. Os não seminomatosos correspondem a cerca de 60% de todos os tumores de testículo e tendem a surgir antes dos 30 anos de idade, já os seminomatosos respondem por 40% dos casos e costumam aparecer em idade um pouco mais avançada. A principal manifestação dos pacientes é a presença de uma massa indolor no escroto, detectada pelo próprio paciente ou pelo parceiro sexual.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Explorar e comparar os métodos diagnósticos disponíveis para o câncer de testículo, abordando sua importância para a doença.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, baseada em dados de artigos originais, livros, documentos, ensaios clínicos e metanálises. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo, e Science Hub. Os descritores booleanos e palavras chaves escolhidas foram: "Tumores testiculares"; "Doença urogenital masculina"; "Marcadores tumorais". Foram considerados elegíveis: estudos cujo título abordavam câncer testicular, relatos de caso a respeito e obras que descreviam os métodos diagnósticos da doença. A delimitação temporal de publicação foi de 2018 a 2023.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>O diagnóstico consiste no exame físico, na ultrassonografia de bolsa testicular com Doppler e na dosagem sanguínea dos marcadores tumorais. No exame físico, na maioria dos casos, encontra-se o nódulo palpável, no qual é importante comparar ambos os testículos. O Ultrassom evidencia lesões nodulares hipoeóicas, geralmente com hiperfluxo ao Doppler. Há dois marcadores tumorais mais importantes: a alfafetoproteína (AFP) e a subunidade beta da gonadotrofina coriônica humana (β- HCG). Nos carcinomas embrionários, os níveis de AFP e β-HCG podem estar aumentados; nos tumores do saco vitelínico, os níveis de AFP; e nos coriocarcinomas, a β-HCG. Os pacientes com seminoma podem apresentar pequenas elevações dos níveis de β-HCG, mas nunca de AFP.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O câncer testicular envolve uma abordagem multidisciplinar que combina exame físico, ultrassonografia, dosagem de marcadores tumorais. Cada método desempenha um papel único no diagnóstico e estadiamento da doença, permitindo a seleção do tratamento mais apropriado. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada são fundamentais para melhorar as chances de cura e qualidade de vida dos pacientes com câncer testicular. Portanto, a conscientização sobre a importância do autoexame e a busca por atendimento médico em caso de suspeita são essenciais.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Aafp.org. 2023 [cited 2023 Oct 15]. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article_primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article_primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html</a> 2. BairdDC,MeyersGJ,HuJS.TesticularCancer:DiagnosisandTreatment.American Family Physician [Internet]. 2018 Feb 15 [cited 2023 Oct15];97(4):261–8. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14833	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4318315 - GABRIEL FOCESI WOLSKI		2 - Aprovado
				0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Câncer de testículo e seu diagnóstico: uma revisão integrativa			
<b>INTRODUCAO</b>	O câncer testicular é a neoplasia mais comum entre homens de 18 a 39 anos, corresponde mundialmente a 1% dos tumores masculinos e 5% das malignidades urológicas. A doença se divide em dois grandes grupos: os tumores não seminomatosos e os seminomatosos. Os não seminomatosos correspondem a cerca de 60% de todos os tumores de testículo e tendem a surgir antes dos 30 anos de idade, já os seminomatosos respondem por 40% dos casos e costumam aparecer em idade um pouco mais avançada. A principal manifestação dos pacientes é a presença de uma massa indolor no escroto, detectada pelo próprio paciente ou pelo parceiro sexual.			
<b>OBJETIVOS</b>	Explorar e comparar os métodos diagnósticos disponíveis para o câncer de testículo, abordando sua importância para a doença.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, baseada em dados de artigos originais, livros, documentos, ensaios clínicos e metanálises. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo, e Science Hub. Os descritores booleanos e palavras chaves escolhidas foram: "Tumores testiculares"; "Doença urogenital masculina"; "Marcadores tumorais". Foram considerados elegíveis: estudos cujo título abordavam câncer testicular, relatos de caso a respeito e obras que descreviam os métodos diagnósticos da doença. A delimitação temporal de publicação foi de 2018 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O diagnóstico consiste no exame físico, na ultrassonografia de bolsa testicular com Doppler e na dosagem sanguínea dos marcadores tumorais. No exame físico, na maioria dos casos, encontra-se o nódulo palpável, no qual é importante comparar ambos os testículos. O Ultrassom evidencia lesões nodulares hipoecóicas, geralmente com hiperfluxo ao Doppler. Há dois marcadores tumorais mais importantes: a alfafetoproteína (AFP) e a subunidade beta da gonadotrofina coriônica humana (β-HCG). Nos carcinomas embrionários, os níveis de AFP e β-HCG podem estar aumentados; nos tumores do saco vitelínico, os níveis de AFP; e nos coriocarcinomas, a β-HCG. Os pacientes com seminoma podem apresentar pequenas elevações dos níveis de β-HCG, mas nunca de AFP.			
<b>CONCLUSOES</b>	O câncer testicular envolve uma abordagem multidisciplinar que combina exame físico, ultrassonografia, dosagem de marcadores tumorais. Cada método desempenha um papel único no diagnóstico e estadiamento da doença, permitindo a seleção do tratamento mais apropriado. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada são fundamentais para melhorar as chances de cura e qualidade de vida dos pacientes com câncer testicular. Portanto, a conscientização sobre a importância do autoexame e a busca por atendimento médico em caso de suspeita são essenciais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Aafp.org, 2023 [cited 2023 Oct 15]. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article_primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article_primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html</a> 2. BairdDC,MeyersGJ,HuJS.TesticularCancer:DiagnosisandTreatment.American Family Physician [Internet]. 2018 Feb 15 [cited 2023 Oct15];97(4):261–8. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14833	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4318331 - LEONARDO HAIDAR CONTAR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Câncer de testículo e seu diagnóstico: uma revisão integrativa			
<b>INTRODUCAO</b>	O câncer testicular é a neoplasia mais comum entre homens de 18 a 39 anos, corresponde mundialmente a 1% dos tumores masculinos e 5% das malignidades urológicas. A doença se divide em dois grandes grupos: os tumores não seminomatosos e os seminomatosos. Os não seminomatosos correspondem a cerca de 60% de todos os tumores de testículo e tendem a surgir antes dos 30 anos de idade, já os seminomatosos respondem por 40% dos casos e costumam aparecer em idade um pouco mais avançada. A principal manifestação dos pacientes é a presença de uma massa indolor no escroto, detectada pelo próprio paciente ou pelo parceiro sexual.			
<b>OBJETIVOS</b>	Explorar e comparar os métodos diagnósticos disponíveis para o câncer de testículo, abordando sua importância para a doença.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, baseada em dados de artigos originais, livros, documentos, ensaios clínicos e metanálises. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo, e Science Hub. Os descritores booleanos e palavras chaves escolhidas foram: "Tumores testiculares"; "Doença urogenital masculina"; "Marcadores tumorais". Foram considerados elegíveis: estudos cujo título abordavam câncer testicular, relatos de caso a respeito e obras que descreviam os métodos diagnósticos da doença. A delimitação temporal de publicação foi de 2018 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O diagnóstico consiste no exame físico, na ultrassonografia de bolsa testicular com Doppler e na dosagem sanguínea dos marcadores tumorais. No exame físico, na maioria dos casos, encontra-se o nódulo palpável, no qual é importante comparar ambos os testículos. O Ultrassom evidencia lesões nodulares hipoecóicas, geralmente com hiperfluxo ao Doppler. Há dois marcadores tumorais mais importantes: a alfafetoproteína (AFP) e a subunidade beta da gonadotrofina coriônica humana (β-HCG). Nos carcinomas embrionários, os níveis de AFP e β-HCG podem estar aumentados; nos tumores do saco vitelínico, os níveis de AFP; e nos coriocarcinomas, a β-HCG. Os pacientes com seminoma podem apresentar pequenas elevações dos níveis de β-HCG, mas nunca de AFP.			
<b>CONCLUSOES</b>	O câncer testicular envolve uma abordagem multidisciplinar que combina exame físico, ultrassonografia, dosagem de marcadores tumorais. Cada método desempenha um papel único no diagnóstico e estadiamento da doença, permitindo a seleção do tratamento mais apropriado. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada são fundamentais para melhorar as chances de cura e qualidade de vida dos pacientes com câncer testicular. Portanto, a conscientização sobre a importância do autoexame e a busca por atendimento médico em caso de suspeita são essenciais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Aafp.org, 2023 [cited 2023 Oct 15]. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article-primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article-primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html</a> 2. BairdDC,MeyersGJ,HuJS.TesticularCancer:DiagnosisandTreatment.American Family Physician [Internet]. 2018 Feb 15 [cited 2023 Oct15];97(4):261–8. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14833	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4318404 - GUSTAVO CAVALCANTI DE ALENCAR FILHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Câncer de testículo e seu diagnóstico: uma revisão integrativa			
<b>INTRODUCAO</b>	O câncer testicular é a neoplasia mais comum entre homens de 18 a 39 anos, corresponde mundialmente a 1% dos tumores masculinos e 5% das malignidades urológicas. A doença se divide em dois grandes grupos: os tumores não seminomatosos e os seminomatosos. Os não seminomatosos correspondem a cerca de 60% de todos os tumores de testículo e tendem a surgir antes dos 30 anos de idade, já os seminomatosos respondem por 40% dos casos e costumam aparecer em idade um pouco mais avançada. A principal manifestação dos pacientes é a presença de uma massa indolor no escroto, detectada pelo próprio paciente ou pelo parceiro sexual.			
<b>OBJETIVOS</b>	Explorar e comparar os métodos diagnósticos disponíveis para o câncer de testículo, abordando sua importância para a doença.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, baseada em dados de artigos originais, livros, documentos, ensaios clínicos e metanálises. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo, e Science Hub. Os descritores booleanos e palavras chaves escolhidas foram: "Tumores testiculares"; "Doença urogenital masculina"; "Marcadores tumorais". Foram considerados elegíveis: estudos cujo título abordavam câncer testicular, relatos de caso a respeito e obras que descreviam os métodos diagnósticos da doença. A delimitação temporal de publicação foi de 2018 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O diagnóstico consiste no exame físico, na ultrassonografia de bolsa testicular com Doppler e na dosagem sanguínea dos marcadores tumorais. No exame físico, na maioria dos casos, encontra-se o nódulo palpável, no qual é importante comparar ambos os testículos. O Ultrassom evidencia lesões nodulares hipoecóicas, geralmente com hiperfluxo ao Doppler. Há dois marcadores tumorais mais importantes: a alfafetoproteína (AFP) e a subunidade beta da gonadotrofina coriônica humana (β-HCG). Nos carcinomas embrionários, os níveis de AFP e β-HCG podem estar aumentados; nos tumores do saco vitelínico, os níveis de AFP; e nos coriocarcinomas, a β-HCG. Os pacientes com seminoma podem apresentar pequenas elevações dos níveis de β-HCG, mas nunca de AFP.			
<b>CONCLUSOES</b>	O câncer testicular envolve uma abordagem multidisciplinar que combina exame físico, ultrassonografia, dosagem de marcadores tumorais. Cada método desempenha um papel único no diagnóstico e estadiamento da doença, permitindo a seleção do tratamento mais apropriado. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada são fundamentais para melhorar as chances de cura e qualidade de vida dos pacientes com câncer testicular. Portanto, a conscientização sobre a importância do autoexame e a busca por atendimento médico em caso de suspeita são essenciais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Aafp.org, 2023 [cited 2023 Oct 15]. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article-primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article-primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html</a> 2. BairdDC,MeyersGJ,HuJS.TesticularCancer:DiagnosisandTreatment.American Family Physician [Internet]. 2018 Feb 15 [cited 2023 Oct15];97(4):261–8. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14833	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4321324 - LANA OMAR GHAZZAOUI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Câncer de testículo e seu diagnóstico: uma revisão integrativa			
<b>INTRODUCAO</b>	O câncer testicular é a neoplasia mais comum entre homens de 18 a 39 anos, corresponde mundialmente a 1% dos tumores masculinos e 5% das malignidades urológicas. A doença se divide em dois grandes grupos: os tumores não seminomatosos e os seminomatosos. Os não seminomatosos correspondem a cerca de 60% de todos os tumores de testículo e tendem a surgir antes dos 30 anos de idade, já os seminomatosos respondem por 40% dos casos e costumam aparecer em idade um pouco mais avançada. A principal manifestação dos pacientes é a presença de uma massa indolor no escroto, detectada pelo próprio paciente ou pelo parceiro sexual.			
<b>OBJETIVOS</b>	Explorar e comparar os métodos diagnósticos disponíveis para o câncer de testículo, abordando sua importância para a doença.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, baseada em dados de artigos originais, livros, documentos, ensaios clínicos e metanálises. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo, e Science Hub. Os descritores booleanos e palavras chaves escolhidas foram: "Tumores testiculares"; "Doença urogenital masculina"; "Marcadores tumorais". Foram considerados elegíveis: estudos cujo título abordavam câncer testicular, relatos de caso a respeito e obras que descreviam os métodos diagnósticos da doença. A delimitação temporal de publicação foi de 2018 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O diagnóstico consiste no exame físico, na ultrassonografia de bolsa testicular com Doppler e na dosagem sanguínea dos marcadores tumorais. No exame físico, na maioria dos casos, encontra-se o nódulo palpável, no qual é importante comparar ambos os testículos. O Ultrassom evidencia lesões nodulares hipoecóicas, geralmente com hiperfluxo ao Doppler. Há dois marcadores tumorais mais importantes: a alfafetoproteína (AFP) e a subunidade beta da gonadotrofina coriônica humana (β-HCG). Nos carcinomas embrionários, os níveis de AFP e β-HCG podem estar aumentados; nos tumores do saco vitelínico, os níveis de AFP; e nos coriocarcinomas, a β-HCG. Os pacientes com seminoma podem apresentar pequenas elevações dos níveis de β-HCG, mas nunca de AFP.			
<b>CONCLUSOES</b>	O câncer testicular envolve uma abordagem multidisciplinar que combina exame físico, ultrassonografia, dosagem de marcadores tumorais. Cada método desempenha um papel único no diagnóstico e estadiamento da doença, permitindo a seleção do tratamento mais apropriado. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada são fundamentais para melhorar as chances de cura e qualidade de vida dos pacientes com câncer testicular. Portanto, a conscientização sobre a importância do autoexame e a busca por atendimento médico em caso de suspeita são essenciais.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Aafp.org, 2023 [cited 2023 Oct 15]. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article-primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261/jcr:content/root/aafp-article-primary-content-container/aafp_article_main_par/aafp_tables_content1.enlarge.html</a> 2. BairdDC,MeyersGJ,HuJS.TesticularCancer:DiagnosisandTreatment.American Family Physician [Internet]. 2018 Feb 15 [cited 2023 Oct15];97(4):261–8. Available from: <a href="https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html">https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0215/p261.html</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14835	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4538676 - KATHIANE ASSIS MENEZES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	O impacto da qualidade de vida no trabalho nas empresas (QVT)			
<b>INTRODUCAO</b>	Ações organizacionais pela qualidade de vida no trabalho (QVT) são abordadas em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas como necessidade e recurso estratégico, respectivamente (BERGAMINI, 2015) e em sites como o Glassdoor, Forbes Brasil, etc.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto que a implementação de ações de QVT pode gerar para a empresa e seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com teoria, estudo de caso da Empresa X com análise da Pesquisa Pulses-janeiro/2023 (YIN, 2015) e pesquisa quantitativa baseada nos achados da Pesquisa Pulses com não colaboradores-outubro/2023, por questionário eletrônico obtendo 127 respostas. Amostra não probabilística por conveniência e análise estatística (COELHO, 2018).			
<b>RESULTADO S</b>	A Empresa X foi escolhida por ser uma boa empresa para trabalhar (4,3 estrelas) no site Glassdoor e pelos conteúdos de QVT em seu blog, cujas ações implantadas originaram a Pesquisa Pulses. Pela análise documental as médias atribuídas a fatores associados ao nível de satisfação e ações de QVT foram 9,0 para comunicação com o líder, feedback, qualidade no relacionamento, reconhecimento, respeito à diversidade e times saudáveis, 8,5 desenvolvimento, saúde emocional e saúde física; 8,0 para justiça de procedimentos. Baseado nestes resultados desenvolveu-se questionário com não colaboradores, com 15 questões: Q1 idade, Q2-3 importância da QVT, Q4-Q12, a partir da média dos fatores obtida pela Empresa X que classificassem a empresa como ótima, boa, neutra, ruim ou péssima, Q13 se a empresa proporciona QVT aos seus colaboradores, Q14 se trabalharia nesta empresa e Q15 classificação dos fatores por grau de importância. Resultados: idade 18-30 anos (72%); 85% consideram a QVT um tema muito importante; a empresa foi considerada como ótima para os fatores Comunicação com o líder (71%), Feedback (72%), Qualidade no relacionamento (69%), Reconhecimento (76%), Respeito a diversidade (68%), Times saudáveis (71%). Como boa para Desenvolvimento (69%), Justiça de procedimentos (69%), Saúde emocional (53%) e Saúde física (64%). 96% acreditam que a empresa promove QVT aos colaboradores e considerando a QVT como critério, 94% trabalhariam nesta empresa. 48 respondentes apontaram a Saúde emocional como fator mais importante seguido da qualidade dos relacionamentos - 15 respondentes. Apesar da Saúde emocional obter o maior grau de importância apresentou menor percentual de classificação (53%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo de caso revelou que a Empresa X proporciona ambiente de trabalho equilibrado, com boa avaliação dos colaboradores no relacionamento QVT e satisfação e tem interesse na comunicação com o público externo promovido em seu blog. O questionário que aplicamos revelou que a Empresa X em relação às ações de QVT é classificada como ótima ou boa para se trabalhar. Acreditamos que a QVT além de promover o bem-estar interno fortalece a imagem da companhia interna e externamente.			
<b>REFERENCIA S</b>	BERGAMINI, C.W. Psicologia aplicada à Administração de Empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. COELHO, B. Pesquisa quantitativa: entenda como utilizar essa abordagem de pesquisa. Mettzer, 04 fev. 2018. Disponível em: (#60)https://blog.mettzer.com/pesquisa-quantitativa/#62. Acesso em: 06 out. 2023. YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14835	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4549279 - VITORIA CRISTINA RIBEIRO COSTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	O impacto da qualidade de vida no trabalho nas empresas (QVT)			
<b>INTRODUCAO</b>	Ações organizacionais pela qualidade de vida no trabalho (QVT) são abordadas em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas como necessidade e recurso estratégico, respectivamente (BERGAMINI, 2015) e em sites como o Glassdoor, Forbes Brasil, etc.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto que a implementação de ações de QVT pode gerar para a empresa e seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com teoria, estudo de caso da Empresa X com análise da Pesquisa Pulses-janeiro/2023 (YIN, 2015) e pesquisa quantitativa baseada nos achados da Pesquisa Pulses com não colaboradores-outubro/2023, por questionário eletrônico obtendo 127 respostas. Amostra não probabilística por conveniência e análise estatística (COELHO, 2018).			
<b>RESULTADO S</b>	A Empresa X foi escolhida por ser uma boa empresa para trabalhar (4,3 estrelas) no site Glassdoor e pelos conteúdos de QVT em seu blog, cujas ações implantadas originaram a Pesquisa Pulses. Pela análise documental as médias atribuídas a fatores associados ao nível de satisfação e ações de QVT foram 9,0 para comunicação com o líder, feedback, qualidade no relacionamento, reconhecimento, respeito à diversidade e times saudáveis, 8,5 desenvolvimento, saúde emocional e saúde física; 8,0 para justiça de procedimentos. Baseado nestes resultados desenvolveu-se questionário com não colaboradores, com 15 questões: Q1 idade, Q2-3 importância da QVT, Q4-Q12, a partir da média dos fatores obtida pela Empresa X que classificassem a empresa como ótima, boa, neutra, ruim ou péssima, Q13 se a empresa proporciona QVT aos seus colaboradores, Q14 se trabalharia nesta empresa e Q15 classificação dos fatores por grau de importância. Resultados: idade 18-30 anos (72%); 85% consideram a QVT um tema muito importante; a empresa foi considerada como ótima para os fatores Comunicação com o líder (71%), Feedback (72%), Qualidade no relacionamento (69%), Reconhecimento (76%), Respeito a diversidade (68%), Times saudáveis (71%). Como boa para Desenvolvimento (69%), Justiça de procedimentos (69%), Saúde emocional (53%) e Saúde física (64%). 96% acreditam que a empresa promove QVT aos colaboradores e considerando a QVT como critério, 94% trabalhariam nesta empresa. 48 respondentes apontaram a Saúde emocional como fator mais importante seguido da qualidade dos relacionamentos - 15 respondentes. Apesar da Saúde emocional obter o maior grau de importância apresentou menor percentual de classificação (53%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo de caso revelou que a Empresa X proporciona ambiente de trabalho equilibrado, com boa avaliação dos colaboradores no relacionamento QVT e satisfação e tem interesse na comunicação com o público externo promovido em seu blog. O questionário que aplicamos revelou que a Empresa X em relação às ações de QVT é classificada como ótima ou boa para se trabalhar. Acreditamos que a QVT além de promover o bem-estar interno fortalece a imagem da companhia interna e externamente.			
<b>REFERENCIA S</b>	BERGAMINI, C.W. Psicologia aplicada à Administração de Empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. COELHO, B. Pesquisa quantitativa: entenda como utilizar essa abordagem de pesquisa. Mettzer, 04 fev. 2018. Disponível em: (#60)https://blog.mettzer.com/pesquisa-quantitativa/#62. Acesso em: 06 out. 2023. YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14835	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4549678 - REBEKA BATISTA MARQUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	O impacto da qualidade de vida no trabalho nas empresas (QVT)			
<b>INTRODUCAO</b>	Ações organizacionais pela qualidade de vida no trabalho (QVT) são abordadas em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas como necessidade e recurso estratégico, respectivamente (BERGAMINI, 2015) e em sites como o Glassdoor, Forbes Brasil, etc.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto que a implementação de ações de QVT pode gerar para a empresa e seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com teoria, estudo de caso da Empresa X com análise da Pesquisa Pulses-janeiro/2023 (YIN, 2015) e pesquisa quantitativa baseada nos achados da Pesquisa Pulses com não colaboradores-outubro/2023, por questionário eletrônico obtendo 127 respostas. Amostra não probabilística por conveniência e análise estatística (COELHO, 2018).			
<b>RESULTADO S</b>	A Empresa X foi escolhida por ser uma boa empresa para trabalhar (4,3 estrelas) no site Glassdoor e pelos conteúdos de QVT em seu blog, cujas ações implantadas originaram a Pesquisa Pulses. Pela análise documental as médias atribuídas a fatores associados ao nível de satisfação e ações de QVT foram 9,0 para comunicação com o líder, feedback, qualidade no relacionamento, reconhecimento, respeito à diversidade e times saudáveis, 8,5 desenvolvimento, saúde emocional e saúde física; 8,0 para justiça de procedimentos. Baseado nestes resultados desenvolveu-se questionário com não colaboradores, com 15 questões: Q1 idade, Q2-3 importância da QVT, Q4-Q12, a partir da média dos fatores obtida pela Empresa X que classificassem a empresa como ótima, boa, neutra, ruim ou péssima, Q13 se a empresa proporciona QVT aos seus colaboradores, Q14 se trabalharia nesta empresa e Q15 classificação dos fatores por grau de importância. Resultados: idade 18-30 anos (72%); 85% consideram a QVT um tema muito importante; a empresa foi considerada como ótima para os fatores Comunicação com o líder (71%), Feedback (72%), Qualidade no relacionamento (69%), Reconhecimento (76%), Respeito a diversidade (68%), Times saudáveis (71%). Como boa para Desenvolvimento (69%), Justiça de procedimentos (69%), Saúde emocional (53%) e Saúde física (64%). 96% acreditam que a empresa promove QVT aos colaboradores e considerando a QVT como critério, 94% trabalhariam nesta empresa. 48 respondentes apontaram a Saúde emocional como fator mais importante seguido da qualidade dos relacionamentos - 15 respondentes. Apesar da Saúde emocional obter o maior grau de importância apresentou menor percentual de classificação (53%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo de caso revelou que a Empresa X proporciona ambiente de trabalho equilibrado, com boa avaliação dos colaboradores no relacionamento QVT e satisfação e tem interesse na comunicação com o público externo promovido em seu blog. O questionário que aplicamos revelou que a Empresa X em relação às ações de QVT é classificada como ótima ou boa para se trabalhar. Acreditamos que a QVT além de promover o bem-estar interno fortalece a imagem da companhia interna e externamente.			
<b>REFERENCIA S</b>	BERGAMINI, C.W. Psicologia aplicada à Administração de Empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. COELHO, B. Pesquisa quantitativa: entenda como utilizar essa abordagem de pesquisa. Mettzer, 04 fev. 2018. Disponível em: (#60)https://blog.mettzer.com/pesquisa-quantitativa/#62. Acesso em: 06 out. 2023. YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14835	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4661761 - MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Josimeire Pessoa de Queiroz		
<b>TITULO</b>	O impacto da qualidade de vida no trabalho nas empresas (QVT)			
<b>INTRODUCAO</b>	Ações organizacionais pela qualidade de vida no trabalho (QVT) são abordadas em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas como necessidade e recurso estratégico, respectivamente (BERGAMINI, 2015) e em sites como o Glassdoor, Forbes Brasil, etc.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o impacto que a implementação de ações de QVT pode gerar para a empresa e seus colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa com teoria, estudo de caso da Empresa X com análise da Pesquisa Pulses-janeiro/2023 (YIN, 2015) e pesquisa quantitativa baseada nos achados da Pesquisa Pulses com não colaboradores-outubro/2023, por questionário eletrônico obtendo 127 respostas. Amostra não probabilística por conveniência e análise estatística (COELHO, 2018).			
<b>RESULTADO S</b>	A Empresa X foi escolhida por ser uma boa empresa para trabalhar (4,3 estrelas) no site Glassdoor e pelos conteúdos de QVT em seu blog, cujas ações implantadas originaram a Pesquisa Pulses. Pela análise documental as médias atribuídas a fatores associados ao nível de satisfação e ações de QVT foram 9,0 para comunicação com o líder, feedback, qualidade no relacionamento, reconhecimento, respeito à diversidade e times saudáveis, 8,5 desenvolvimento, saúde emocional e saúde física; 8,0 para justiça de procedimentos. Baseado nestes resultados desenvolveu-se questionário com não colaboradores, com 15 questões: Q1 idade, Q2-3 importância da QVT, Q4-Q12, a partir da média dos fatores obtida pela Empresa X que classificassem a empresa como ótima, boa, neutra, ruim ou péssima, Q13 se a empresa proporciona QVT aos seus colaboradores, Q14 se trabalharia nesta empresa e Q15 classificação dos fatores por grau de importância. Resultados: idade 18-30 anos (72%); 85% consideram a QVT um tema muito importante; a empresa foi considerada como ótima para os fatores Comunicação com o líder (71%), Feedback (72%), Qualidade no relacionamento (69%), Reconhecimento (76%), Respeito a diversidade (68%), Times saudáveis (71%). Como boa para Desenvolvimento (69%), Justiça de procedimentos (69%), Saúde emocional (53%) e Saúde física (64%). 96% acreditam que a empresa promove QVT aos colaboradores e considerando a QVT como critério, 94% trabalhariam nesta empresa. 48 respondentes apontaram a Saúde emocional como fator mais importante seguido da qualidade dos relacionamentos - 15 respondentes. Apesar da Saúde emocional obter o maior grau de importância apresentou menor percentual de classificação (53%).			
<b>CONCLUSOES</b>	O estudo de caso revelou que a Empresa X proporciona ambiente de trabalho equilibrado, com boa avaliação dos colaboradores no relacionamento QVT e satisfação e tem interesse na comunicação com o público externo promovido em seu blog. O questionário que aplicamos revelou que a Empresa X em relação às ações de QVT é classificada como ótima ou boa para se trabalhar. Acreditamos que a QVT além de promover o bem-estar interno fortalece a imagem da companhia interna e externamente.			
<b>REFERENCIA S</b>	BERGAMINI, C.W. Psicologia aplicada à Administração de Empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. COELHO, B. Pesquisa quantitativa: entenda como utilizar essa abordagem de pesquisa. Mettzer, 04 fev. 2018. Disponível em: (#60)https://blog.mettzer.com/pesquisa-quantitativa/#62. Acesso em: 06 out. 2023. YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14836	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5225027 - VANESSA VIEIRA DINIZ	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A água é um recurso natural essencial para a vida é um dos recursos mais escassos e ameaçados do planeta. A ingestão da água potável é muito importante para a manutenção da saúde única. Facilitar o acesso das crianças ao tema é indispensável para auxiliar na construção de uma consciência coletiva sobre a importância da conservação da água.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do projeto é desenvolver temas relacionados à importância da água na primeira infância, para que os mesmos sejam agentes sociais e futuros tomadores de decisão em prol da conservação deste recurso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Atuamos com duas turmas de alunos de 5 anos de idade, matriculados no colégio de educação privada Pentágono de Educação Infantil, do bairro de Perdizes, em São Paulo. Realizamos três visitas de intervenção. Através da apresentação do conteúdo e metodologia ativa e lúdica, como roda de conversa, desenhos e música, avaliamos o perfil dos alunos e estabelecemos vínculo de confiança e afinidade com as crianças. Os assuntos abordados foram o ciclo da água e sua importância na saúde humana, ambiental e dos demais seres vivos, poluição dos rios, importância dos mares e manguezais, profissões relacionadas ao uso da água e a relação da água com a vida dos ribeirinhos.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados da abordagem foram obtidos através da análise de desenhos feitos pelos alunos após a discussão e exposição sobre os temas. Percebemos que o projeto impactou significativamente a compreensão e o engajamento das crianças em relação aos temas abordados. Antes da intervenção, muitos não tinham consciência sobre a existência dos mangues, mas adquiriram um entendimento profundo e uma conexão emocional com este e outros tópicos, evidenciando a eficácia da abordagem prática e lúdica adotada. As professoras envolvidas no projeto expressaram grande satisfação com os resultados.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Em suma, os resultados deste projeto destacam a eficácia de uma abordagem prática e lúdica na sensibilização das crianças para questões ambientais e sociais importantes. O projeto não apenas aumentou o conhecimento das crianças, mas também promoveu o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a formação de atitudes conscientes em relação à água, aos manguezais e aos povos ribeirinhos. Esses resultados fornecem insights valiosos para a educação na primeira infância e destacam a importância de abordar questões ambientais e sociais em um ambiente educacional.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. INTRODUÇÃO(#38)#807;A(#38)#771;O A(#38)#768; ENGENHARIA AMBIENTAL - Sa(#38)#771;o Paulo: Prentice Hall, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14836	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5225078 - ALESSANDRA VIVIANE DE LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A água é um recurso natural essencial para a vida é um dos recursos mais escassos e ameaçados do planeta. A ingestão da água potável é muito importante para a manutenção da saúde única. Facilitar o acesso das crianças ao tema é indispensável para auxiliar na construção de uma consciência coletiva sobre a importância da conservação da água.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do projeto é desenvolver temas relacionados à importância da água na primeira infância, para que os mesmos sejam agentes sociais e futuros tomadores de decisão em prol da conservação deste recurso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Atuamos com duas turmas de alunos de 5 anos de idade, matriculados no colégio de educação privada Pentágono de Educação Infantil, do bairro de Perdizes, em São Paulo. Realizamos três visitas de intervenção. Através da apresentação do conteúdo e metodologia ativa e lúdica, como roda de conversa, desenhos e música, avaliamos o perfil dos alunos e estabelecemos vínculo de confiança e afinidade com as crianças. Os assuntos abordados foram o ciclo da água e sua importância na saúde humana, ambiental e dos demais seres vivos, poluição dos rios, importância dos mares e manguezais, profissões relacionadas ao uso da água e a relação da água com a vida dos ribeirinhos.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados da abordagem foram obtidos através da análise de desenhos feitos pelos alunos após a discussão e exposição sobre os temas. Percebemos que o projeto impactou significativamente a compreensão e o engajamento das crianças em relação aos temas abordados. Antes da intervenção, muitos não tinham consciência sobre a existência dos mangues, mas adquiriram um entendimento profundo e uma conexão emocional com este e outros tópicos, evidenciando a eficácia da abordagem prática e lúdica adotada. As professoras envolvidas no projeto expressaram grande satisfação com os resultados.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Em suma, os resultados deste projeto destacam a eficácia de uma abordagem prática e lúdica na sensibilização das crianças para questões ambientais e sociais importantes. O projeto não apenas aumentou o conhecimento das crianças, mas também promoveu o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a formação de atitudes conscientes em relação à água, aos manguezais e aos povos ribeirinhos. Esses resultados fornecem insights valiosos para a educação na primeira infância e destacam a importância de abordar questões ambientais e sociais em um ambiente educacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S.. INTRODUÇÃO(#38)#807:A(#38)#771;O A(#38)#768; ENGENHARIA AMBIENTAL - Sa(#38)#771;o Paulo: Prentice Hall, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14836	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		5232791 - LUCAS SILVA SANTOS		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
TITULO	A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
INTRODUÇÃO	A água é um recurso natural essencial para a vida é um dos recursos mais escassos e ameaçados do planeta. A ingestão da água potável é muito importante para a manutenção da saúde única. Facilitar o acesso das crianças ao tema é indispensável para auxiliar na construção de uma consciência coletiva sobre a importância da conservação da água.			
OBJETIVOS	O objetivo do projeto é desenvolver temas relacionados à importância da água na primeira infância, para que os mesmos sejam agentes sociais e futuros tomadores de decisão em prol da conservação deste recurso.			
METODOLOGIA	Atuamos com duas turmas de alunos de 5 anos de idade, matriculados no colégio de educação privada Pentágono de Educação Infantil, do bairro de Perdizes, em São Paulo. Realizamos três visitas de intervenção. Através da apresentação do conteúdo e metodologia ativa e lúdica, como roda de conversa, desenhos e música, avaliamos o perfil dos alunos e estabelecemos vínculo de confiança e afinidade com as crianças. Os assuntos abordados foram o ciclo da água e sua importância na saúde humana, ambiental e dos demais seres vivos, poluição dos rios, importância dos mares e manguezais, profissões relacionadas ao uso da água e a relação da água com a vida dos ribeirinhos.			
RESULTADOS	Os resultados da abordagem foram obtidos através da análise de desenhos feitos pelos alunos após a discussão e exposição sobre os temas. Percebemos que o projeto impactou significativamente a compreensão e o engajamento das crianças em relação aos temas abordados. Antes da intervenção, muitos não tinham consciência sobre a existência dos mangues, mas adquiriram um entendimento profundo e uma conexão emocional com este e outros tópicos, evidenciando a eficácia da abordagem prática e lúdica adotada. As professoras envolvidas no projeto expressaram grande satisfação com os resultados.			
CONCLUSÕES	Em suma, os resultados deste projeto destacam a eficácia de uma abordagem prática e lúdica na sensibilização das crianças para questões ambientais e sociais importantes. O projeto não apenas aumentou o conhecimento das crianças, mas também promoveu o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a formação de atitudes conscientes em relação à água, aos manguezais e aos povos ribeirinhos. Esses resultados fornecem insights valiosos para a educação na primeira infância e destacam a importância de abordar questões ambientais e sociais em um ambiente educacional.			
REFERENCIAS	BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S.. INTRODUÇÃO(#38)#807:A(#38)#771;O A(#38)#768; ENGENHARIA AMBIENTAL - Sa(#38)#771;o Paulo: Prentice Hall, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14836	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5243033 - THIAGO TADEU CORREA RAMOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é um recurso natural essencial para a vida é um dos recursos mais escassos e ameaçados do planeta. A ingestão da água potável é muito importante para a manutenção da saúde única. Facilitar o acesso das crianças ao tema é indispensável para auxiliar na construção de uma consciência coletiva sobre a importância da conservação da água.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do projeto é desenvolver temas relacionados à importância da água na primeira infância, para que os mesmos sejam agentes sociais e futuros tomadores de decisão em prol da conservação deste recurso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Atuamos com duas turmas de alunos de 5 anos de idade, matriculados no colégio de educação privada Pentágono de Educação Infantil, do bairro de Perdizes, em São Paulo. Realizamos três visitas de intervenção. Através da apresentação do conteúdo e metodologia ativa e lúdica, como roda de conversa, desenhos e música, avaliamos o perfil dos alunos e estabelecemos vínculo de confiança e afinidade com as crianças. Os assuntos abordados foram o ciclo da água e sua importância na saúde humana, ambiental e dos demais seres vivos, poluição dos rios, importância dos mares e manguezais, profissões relacionadas ao uso da água e a relação da água com a vida dos ribeirinhos.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados da abordagem foram obtidos através da análise de desenhos feitos pelos alunos após a discussão e exposição sobre os temas. Percebemos que o projeto impactou significativamente a compreensão e o engajamento das crianças em relação aos temas abordados. Antes da intervenção, muitos não tinham consciência sobre a existência dos mangues, mas adquiriram um entendimento profundo e uma conexão emocional com este e outros tópicos, evidenciando a eficácia da abordagem prática e lúdica adotada. As professoras envolvidas no projeto expressaram grande satisfação com os resultados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em suma, os resultados deste projeto destacam a eficácia de uma abordagem prática e lúdica na sensibilização das crianças para questões ambientais e sociais importantes. O projeto não apenas aumentou o conhecimento das crianças, mas também promoveu o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a formação de atitudes conscientes em relação à água, aos manguezais e aos povos ribeirinhos. Esses resultados fornecem insights valiosos para a educação na primeira infância e destacam a importância de abordar questões ambientais e sociais em um ambiente educacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. INTRODUÇÃO(#38)#807;A(#38)#771;O A(#38)#768; ENGENHARIA AMBIENTAL - Sa(#38)#771;o Paulo: Prentice Hall, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14836	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Apresentação</b>		
		5243301 - PEDRO AUGUSTO MARCONDES DO AMARAL MAYER BICUDO		2 - Aprovado
		1 - Poster		
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A água é um recurso natural essencial para a vida é um dos recursos mais escassos e ameaçados do planeta. A ingestão da água potável é muito importante para a manutenção da saúde única. Facilitar o acesso das crianças ao tema é indispensável para auxiliar na construção de uma consciência coletiva sobre a importância da conservação da água.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do projeto é desenvolver temas relacionados à importância da água na primeira infância, para que os mesmos sejam agentes sociais e futuros tomadores de decisão em prol da conservação deste recurso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Atuamos com duas turmas de alunos de 5 anos de idade, matriculados no colégio de educação privada Pentágono de Educação Infantil, do bairro de Perdizes, em São Paulo. Realizamos três visitas de intervenção. Através da apresentação do conteúdo e metodologia ativa e lúdica, como roda de conversa, desenhos e música, avaliamos o perfil dos alunos e estabelecemos vínculo de confiança e afinidade com as crianças. Os assuntos abordados foram o ciclo da água e sua importância na saúde humana, ambiental e dos demais seres vivos, poluição dos rios, importância dos mares e manguezais, profissões relacionadas ao uso da água e a relação da água com a vida dos ribeirinhos.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados da abordagem foram obtidos através da análise de desenhos feitos pelos alunos após a discussão e exposição sobre os temas. Percebemos que o projeto impactou significativamente a compreensão e o engajamento das crianças em relação aos temas abordados. Antes da intervenção, muitos não tinham consciência sobre a existência dos mangues, mas adquiriram um entendimento profundo e uma conexão emocional com este e outros tópicos, evidenciando a eficácia da abordagem prática e lúdica adotada. As professoras envolvidas no projeto expressaram grande satisfação com os resultados.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Em suma, os resultados deste projeto destacam a eficácia de uma abordagem prática e lúdica na sensibilização das crianças para questões ambientais e sociais importantes. O projeto não apenas aumentou o conhecimento das crianças, mas também promoveu o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a formação de atitudes conscientes em relação à água, aos manguezais e aos povos ribeirinhos. Esses resultados fornecem insights valiosos para a educação na primeira infância e destacam a importância de abordar questões ambientais e sociais em um ambiente educacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S.. INTRODUÇÃO(#38)#807;A(#38)#771;O A(#38)#768; ENGENHARIA AMBIENTAL - Sa(#38)#771;o Paulo: Prentice Hall, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14836	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5243891 - FERNANDA SIMONCELO PARA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
<b>INTRODUCAO</b>	A água é um recurso natural essencial para a vida é um dos recursos mais escassos e ameaçados do planeta. A ingestão da água potável é muito importante para a manutenção da saúde única. Facilitar o acesso das crianças ao tema é indispensável para auxiliar na construção de uma consciência coletiva sobre a importância da conservação da água.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo do projeto é desenvolver temas relacionados à importância da água na primeira infância, para que os mesmos sejam agentes sociais e futuros tomadores de decisão em prol da conservação deste recurso.			
<b>METODOLOGIA</b>	Atuamos com duas turmas de alunos de 5 anos de idade, matriculados no colégio de educação privada Pentágono de Educação Infantil, do bairro de Perdizes, em São Paulo. Realizamos três visitas de intervenção. Através da apresentação do conteúdo e metodologia ativa e lúdica, como roda de conversa, desenhos e música, avaliamos o perfil dos alunos e estabelecemos vínculo de confiança e afinidade com as crianças. Os assuntos abordados foram o ciclo da água e sua importância na saúde humana, ambiental e dos demais seres vivos, poluição dos rios, importância dos mares e manguezais, profissões relacionadas ao uso da água e a relação da água com a vida dos ribeirinhos.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados da abordagem foram obtidos através da análise de desenhos feitos pelos alunos após a discussão e exposição sobre os temas. Percebemos que o projeto impactou significativamente a compreensão e o engajamento das crianças em relação aos temas abordados. Antes da intervenção, muitos não tinham consciência sobre a existência dos mangues, mas adquiriram um entendimento profundo e uma conexão emocional com este e outros tópicos, evidenciando a eficácia da abordagem prática e lúdica adotada. As professoras envolvidas no projeto expressaram grande satisfação com os resultados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Em suma, os resultados deste projeto destacam a eficácia de uma abordagem prática e lúdica na sensibilização das crianças para questões ambientais e sociais importantes. O projeto não apenas aumentou o conhecimento das crianças, mas também promoveu o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a formação de atitudes conscientes em relação à água, aos manguezais e aos povos ribeirinhos. Esses resultados fornecem insights valiosos para a educação na primeira infância e destacam a importância de abordar questões ambientais e sociais em um ambiente educacional.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S.. INTRODUÇÃO(#38)#807:A(#38)#771;O A(#38)#768; ENGENHARIA AMBIENTAL - Sa(#38)#771;o Paulo: Prentice Hall, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14837	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		<b>Orientador Externo</b>		
		5233046 - LEANDRO RAFAEL LIMA DE SENA		2 - Aprovado
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
<b>TITULO</b>	O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, OS PULMÕES SENTEM			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O ar puro é essencial para a sobrevivência humana, mas grande parte da população não inspira um ar de qualidade por causa da poluição. No entanto, a poluição doméstica, também chamada poluição interna, pode ser um problema para a saúde de diversas famílias. As alergias causadas pela poluição do ar doméstico acometem a população em geral, principalmente crianças, devido ao contato com ácaros de poeira domiciliar que são encontrados em residências. Por isso, é necessária a conscientização sobre o problema através do apoio dos profissionais da saúde e acadêmicos de medicina que se interessam pelo tema de grande importância para todos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Difundir o conhecimento sobre o tema através de palestras, publicações nas redes sociais, panfletos e cartazes, profissionais da saúde, acadêmicos de medicina e da população de modo geral, com ênfase nas crianças, as mais afetadas diretamente.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A intervenção se deu através da promoção de uma atividade educativa pautada na realização de uma palestra destinada a cem (100) profissionais de higiene, realizada no âmbito do "Higixpo", promovido pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. De modo complementar, foram promovidas atividades lúdicas de cunho educativo voltadas para a qualidade do ar, aplicadas em uma escola no bairro do Belém – SP, cuja ação foi nomeada "saúde é o que interessa o resto não tem pressa", apresentando de forma lúdica a importância da higiene do ar domiciliar.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A realização dessas atividades permitiu a construção de um portfólio de impressões dos envolvidos, de modo a ficar demonstrado que estas abordagens se demonstraram capazes de gerar uma adesão em torno da discussão da temática da higiene do ar domiciliar como ferramenta de educação em saúde para a prevenção de agravos respiratórios.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Em face do exposto, é possível inferir que a utilização de abordagens de educação em saúde, ajustadas a linguagem e ao contexto do público alvo das ações é capaz de promover uma reflexão a respeito das temática da higiene do ar domiciliar, podendo ser um caminho metodológico para a realização de ações similares que explorem outros temas que interseccionam meio ambiente e promoção da saúde.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>THE INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGY IN CHILDHOOD (ISSAC). Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISSAC). Eur Respir J., n. 12, p. 315-35, 1998. 2. BOUSQUET, J; van CAUWENBERGE, P.; KALTHAEV, N. and The WORKSHOP EXPERT PANNEL. ARIA Workshop</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14837	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		<b>Orientador Externo</b>		
		5233143 - ANA CLARA FERNANDES CARLOS		2 - Aprovado
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
<b>TITULO</b>	O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, OS PULMÕES SENTEM			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O ar puro é essencial para a sobrevivência humana, mas grande parte da população não inspira um ar de qualidade por causa da poluição. No entanto, a poluição doméstica, também chamada poluição interna, pode ser um problema para a saúde de diversas famílias. As alergias causadas pela poluição do ar doméstico acometem a população em geral, principalmente crianças, devido ao contato com ácaros de poeira domiciliar que são encontrados em residências. Por isso, é necessária a conscientização sobre o problema através do apoio dos profissionais da saúde e acadêmicos de medicina que se interessam pelo tema de grande importância para todos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Difundir o conhecimento sobre o tema através de palestras, publicações nas redes sociais, panfletos e cartazes, profissionais da saúde, acadêmicos de medicina e da população de modo geral, com ênfase nas crianças, as mais afetadas diretamente.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A intervenção se deu através da promoção de uma atividade educativa pautada na realização de uma palestra destinada a cem (100) profissionais de higiene, realizada no âmbito do "Higixpo", promovido pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. De modo complementar, foram promovidas atividades lúdicas de cunho educativo voltadas para a qualidade do ar, aplicadas em uma escola no bairro do Belém – SP, cuja ação foi nomeada "saúde é o que interessa o resto não tem pressa", apresentando de forma lúdica a importância da higiene do ar domiciliar.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A realização dessas atividades permitiu a construção de um portfólio de impressões dos envolvidos, de modo a ficar demonstrado que estas abordagens se demonstraram capazes de gerar uma adesão em torno da discussão da temática da higiene do ar domiciliar como ferramenta de educação em saúde para a prevenção de agravos respiratórios.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Em face do exposto, é possível inferir que a utilização de abordagens de educação em saúde, ajustadas a linguagem e ao contexto do público alvo das ações é capaz de promover uma reflexão a respeito das temática da higiene do ar domiciliar, podendo ser um caminho metodológico para a realização de ações similares que explorem outros temas que interseccionam meio ambiente e promoção da saúde.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>THE INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGY IN CHILDHOOD (ISSAC). Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISSAC). Eur Respir J., n. 12, p. 315-35, 1998. 2. BOUSQUET, J; van CAUWENBERGE, P.; KALTHAEV, N. and The WORKSHOP EXPERT PANNEL. ARIA Workshop</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14837	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233186 - GABRIEL DE GOES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, OS PULMÕES SENTEM			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O ar puro é essencial para a sobrevivência humana, mas grande parte da população não inspira um ar de qualidade por causa da poluição. No entanto, a poluição doméstica, também chamada poluição interna, pode ser um problema para a saúde de diversas famílias. As alergias causadas pela poluição do ar doméstico acometem a população em geral, principalmente crianças, devido ao contato com ácaros de poeira domiciliar que são encontrados em residências. Por isso, é necessária a conscientização sobre o problema através do apoio dos profissionais da saúde e acadêmicos de medicina que se interessam pelo tema de grande importância para todos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Difundir o conhecimento sobre o tema através de palestras, publicações nas redes sociais, panfletos e cartazes, profissionais da saúde, acadêmicos de medicina e da população de modo geral, com ênfase nas crianças, as mais afetadas diretamente.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A intervenção se deu através da promoção de uma atividade educativa pautada na realização de uma palestra destinada a cem (100) profissionais de higiene, realizada no âmbito do "Higiexpo", promovido pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. De modo complementar, foram promovidas atividades lúdicas de cunho educativo voltadas para a qualidade do ar, aplicadas em uma escola no bairro do Belém – SP, cuja ação foi nomeada "saúde é o que interessa o resto não tem pressa", apresentando de forma lúdica a importância da higiene do ar domiciliar.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A realização dessas atividades permitiu a construção de um portfólio de impressões dos envolvidos, de modo a ficar demonstrado que estas abordagens se demonstraram capazes de gerar uma adesão em torno da discussão da temática da higiene do ar domiciliar como ferramenta de educação em saúde para a prevenção de agravos respiratórios.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Em face do exposto, é possível inferir que a utilização de abordagens de educação em saúde, ajustadas a linguagem e ao contexto do público alvo das ações é capaz de promover uma reflexão a respeito das temática da higiene do ar domiciliar, podendo ser um caminho metodológico para a realização de ações similares que explorem outros temas que interseccionam meio ambiente e promoção da saúde.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>THE INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGY IN CHILDHOOD (ISSAC). Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISSAC). Eur Respir J., n. 12, p. 315-35, 1998. 2. BOUSQUET, J; van CAUWENBERGE, P.; KALTHAEV, N. and The WORKSHOP EXPERT PANNEL. ARIA Workshop</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14837	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233232 - MARCELA DENOBILO		2 - Aprovado
				1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, OS PULMÕES SENTEM			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O ar puro é essencial para a sobrevivência humana, mas grande parte da população não inspira um ar de qualidade por causa da poluição. No entanto, a poluição doméstica, também chamada poluição interna, pode ser um problema para a saúde de diversas famílias. As alergias causadas pela poluição do ar doméstico acometem a população em geral, principalmente crianças, devido ao contato com ácaros de poeira domiciliar que são encontrados em residências. Por isso, é necessária a conscientização sobre o problema através do apoio dos profissionais da saúde e acadêmicos de medicina que se interessam pelo tema de grande importância para todos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Difundir o conhecimento sobre o tema através de palestras, publicações nas redes sociais, panfletos e cartazes, profissionais da saúde, acadêmicos de medicina e da população de modo geral, com ênfase nas crianças, as mais afetadas diretamente.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A intervenção se deu através da promoção de uma atividade educativa pautada na realização de uma palestra destinada a cem (100) profissionais de higiene, realizada no âmbito do "Higiexpo", promovido pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. De modo complementar, foram promovidas atividades lúdicas de cunho educativo voltadas para a qualidade do ar, aplicadas em uma escola no bairro do Belém – SP, cuja ação foi nomeada "saúde é o que interessa o resto não tem pressa", apresentando de forma lúdica a importância da higiene do ar domiciliar.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A realização dessas atividades permitiu a construção de um portfólio de impressões dos envolvidos, de modo a ficar demonstrado que estas abordagens se demonstraram capazes de gerar uma adesão em torno da discussão da temática da higiene do ar domiciliar como ferramenta de educação em saúde para a prevenção de agravos respiratórios.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Em face do exposto, é possível inferir que a utilização de abordagens de educação em saúde, ajustadas a linguagem e ao contexto do público alvo das ações é capaz de promover uma reflexão a respeito das temática da higiene do ar domiciliar, podendo ser um caminho metodológico para a realização de ações similares que explorem outros temas que interseccionam meio ambiente e promoção da saúde.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>THE INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGY IN CHILDHOOD (ISSAC). Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISSAC). Eur Respir J., n. 12, p. 315-35, 1998. 2. BOUSQUET, J; van CAUWENBERGE, P.; KALTHAEV, N. and The WORKSHOP EXPERT PANNEL. ARIA Workshop</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14837	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5243637 - MARINA ID SOARES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, OS PULMÕES SENTEM			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O ar puro é essencial para a sobrevivência humana, mas grande parte da população não inspira um ar de qualidade por causa da poluição. No entanto, a poluição doméstica, também chamada poluição interna, pode ser um problema para a saúde de diversas famílias. As alergias causadas pela poluição do ar doméstico acometem a população em geral, principalmente crianças, devido ao contato com ácaros de poeira domiciliar que são encontrados em residências. Por isso, é necessária a conscientização sobre o problema através do apoio dos profissionais da saúde e acadêmicos de medicina que se interessam pelo tema de grande importância para todos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Difundir o conhecimento sobre o tema através de palestras, publicações nas redes sociais, panfletos e cartazes, profissionais da saúde, acadêmicos de medicina e da população de modo geral, com ênfase nas crianças, as mais afetadas diretamente.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A intervenção se deu através da promoção de uma atividade educativa pautada na realização de uma palestra destinada a cem (100) profissionais de higiene, realizada no âmbito do "Higiexpo", promovido pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. De modo complementar, foram promovidas atividades lúdicas de cunho educativo voltadas para a qualidade do ar, aplicadas em uma escola no bairro do Belém – SP, cuja ação foi nomeada "saúde é o que interessa o resto não tem pressa", apresentando de forma lúdica a importância da higiene do ar domiciliar.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A realização dessas atividades permitiu a construção de um portfólio de impressões dos envolvidos, de modo a ficar demonstrado que estas abordagens se demonstraram capazes de gerar uma adesão em torno da discussão da temática da higiene do ar domiciliar como ferramenta de educação em saúde para a prevenção de agravos respiratórios.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Em face do exposto, é possível inferir que a utilização de abordagens de educação em saúde, ajustadas a linguagem e ao contexto do público alvo das ações é capaz de promover uma reflexão a respeito das temática da higiene do ar domiciliar, podendo ser um caminho metodológico para a realização de ações similares que explorem outros temas que interseccionam meio ambiente e promoção da saúde.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>THE INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGY IN CHILDHOOD (ISSAC). Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISSAC). Eur Respir J., n. 12, p. 315-35, 1998. 2. BOUSQUET, J; van CAUWENBERGE, P.; KALTHAEV, N. and The WORKSHOP EXPERT PANNEL. ARIA Workshop</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14837	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5243904 - SARAH AQUINO ABDUL HADI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, OS PULMÕES SENTEM			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O ar puro é essencial para a sobrevivência humana, mas grande parte da população não inspira um ar de qualidade por causa da poluição. No entanto, a poluição doméstica, também chamada poluição interna, pode ser um problema para a saúde de diversas famílias. As alergias causadas pela poluição do ar doméstico acometem a população em geral, principalmente crianças, devido ao contato com ácaros de poeira domiciliar que são encontrados em residências. Por isso, é necessária a conscientização sobre o problema através do apoio dos profissionais da saúde e acadêmicos de medicina que se interessam pelo tema de grande importância para todos.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Difundir o conhecimento sobre o tema através de palestras, publicações nas redes sociais, panfletos e cartazes, profissionais da saúde, acadêmicos de medicina e da população de modo geral, com ênfase nas crianças, as mais afetadas diretamente.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A intervenção se deu através da promoção de uma atividade educativa pautada na realização de uma palestra destinada a cem (100) profissionais de higiene, realizada no âmbito do "Higiexpo", promovido pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. De modo complementar, foram promovidas atividades lúdicas de cunho educativo voltadas para a qualidade do ar, aplicadas em uma escola no bairro do Belém – SP, cuja ação foi nomeada "saúde é o que interessa o resto não tem pressa", apresentando de forma lúdica a importância da higiene do ar domiciliar.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A realização dessas atividades permitiu a construção de um portfólio de impressões dos envolvidos, de modo a ficar demonstrado que estas abordagens se demonstraram capazes de gerar uma adesão em torno da discussão da temática da higiene do ar domiciliar como ferramenta de educação em saúde para a prevenção de agravos respiratórios.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Em face do exposto, é possível inferir que a utilização de abordagens de educação em saúde, ajustadas a linguagem e ao contexto do público alvo das ações é capaz de promover uma reflexão a respeito das temática da higiene do ar domiciliar, podendo ser um caminho metodológico para a realização de ações similares que explorem outros temas que interseccionam meio ambiente e promoção da saúde.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>THE INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGY IN CHILDHOOD (ISSAC). Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISSAC). Eur Respir J., n. 12, p. 315-35, 1998. 2. BOUSQUET, J; van CAUWENBERGE, P.; KALTHAEV, N. and The WORKSHOP EXPERT PANNEL. ARIA Workshop</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14839	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4312708 - JULIA SEEDER IACONA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Infertilidade Masculina por Esteroides Anabolizantes			
<b>INTRODUCAO</b>	Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) são compostos sintéticos derivados da testosterona (TE), hormônio utilizado de forma artificial devido a suas ações anabólicas e androgênicas. Os EAA são utilizados, cada vez mais, de forma ilegal e abusiva, por agirem promovendo melhoria da performance esportiva e estética. Porém, foram observados prejuízos na sexualidade e/ou na fertilidade masculina após treinamento excessivo e/ou abuso da droga. Além dos outros efeitos adversos que podem estar presentes, como: efeitos psiquiátricos, distúrbios do sono, perturbações do humor e risco de complicações cardiovasculares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os impactos causados na vida sexual masculina decorrente do uso de esteroides anabolizantes e seus efeitos deletérios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em dados de artigos das plataformas PubMed e Scielo, com os descritores Infertilidade, Anabolizante, Sexo Masculino e Efeitos Colaterais, com delimitação temporal de 2010 a 2023, língua portuguesa e inglesa e disponibilidade do texto completo gratuito na plataforma. Após leitura dos resumos, foram excluídos os artigos sem foco em infertilidade masculina.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da análise dos artigos, foi esclarecido que o uso de EAA apresentou efeitos como: aumento da libido, crescimento de pêlos, efeito anti- catabólico, entre outros. Porém, também resultaram em efeitos colaterais indesejados de acordo com o tipo de anabolizante utilizado, dosagem, idade e tempo de uso, como: acne, estrias, interrupção no crescimento de adolescentes, aumento no risco de lesões músculo-tendíneas, ginecomastia, impotência sexual, oligospermia, atrofia testicular, azoospermia, priapismo, alterações de exames laboratoriais e efeitos psicológicos, como agressividade e irritabilidade. Além disso, acerca da infertilidade masculina, o principal mecanismo se dá pelo hipogonadismo hipogonadotrófico induzido por esteroides (ASIH), que tende a se regularizar espontaneamente ao longo do 1o ano de pausa de uso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que o uso dos EAAs e outros derivados para fins de ganho de massa magra são positivos, mas os efeitos deletérios que esses causam na saúde são exponencialmente maiores. O uso e abuso deles ocorre sem acompanhamento profissional, em grande maioria; o que provoca danos, muitas vezes, difíceis de reverter. Os EAA induzem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG) através de um mecanismo de feedback negativo, que culmina na supressão da liberação das gonadotrofinas (hipogonadismo hipogonadotrófico) e no comprometimento do processo de espermatogênese.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ALHASHIMI, M. The deleterious effect of anabolic androgenic steroid abuse on sexual and reproductive health and comparison of recovery between treated and untreated patients: Single (#38)#8208; center prospective randomized study. <i>Andrologia</i> , v. 54, n. 11, 5 set. 2022. 2. SANSONE, A. et al. Sport, doping and male fertility. <i>Reproductive Biology and Endocrinology</i> , v. 16, n. 1, 12 nov. 2018. 3. O uso dos esteroides anabolizantes androgênicos: uma revisão da literatura   Revista JRG de Estudos Acadêmicos. <i>revistajrg.com</i> , 11 out. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14839	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4313526 - MARIA LUISA ROCHA OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Infertilidade Masculina por Esteroides Anabolizantes			
<b>INTRODUCAO</b>	Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) são compostos sintéticos derivados da testosterona (TE), hormônio utilizado de forma artificial devido a suas ações anabólicas e androgênicas. Os EAA são utilizados, cada vez mais, de forma ilegal e abusiva, por agirem promovendo melhoria da performance esportiva e estética. Porém, foram observados prejuízos na sexualidade e/ou na fertilidade masculina após treinamento excessivo e/ou abuso da droga. Além dos outros efeitos adversos que podem estar presentes, como: efeitos psiquiátricos, distúrbios do sono, perturbações do humor e risco de complicações cardiovasculares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os impactos causados na vida sexual masculina decorrente do uso de esteroides anabolizantes e seus efeitos deletérios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em dados de artigos das plataformas PubMed e Scielo, com os descritores Infertilidade, Anabolizante, Sexo Masculino e Efeitos Colaterais, com delimitação temporal de 2010 a 2023, língua portuguesa e inglesa e disponibilidade do texto completo gratuito na plataforma. Após leitura dos resumos, foram excluídos os artigos sem foco em infertilidade masculina.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da análise dos artigos, foi esclarecido que o uso de EAA apresentou efeitos como: aumento da libido, crescimento de pêlos, efeito anti- catabólico, entre outros. Porém, também resultaram em efeitos colaterais indesejados de acordo com o tipo de anabolizante utilizado, dosagem, idade e tempo de uso, como: acne, estrias, interrupção no crescimento de adolescentes, aumento no risco de lesões músculo-tendíneas, ginecomastia, impotência sexual, oligospermia, atrofia testicular, azoospermia, priapismo, alterações de exames laboratoriais e efeitos psicológicos, como agressividade e irritabilidade. Além disso, acerca da infertilidade masculina, o principal mecanismo se dá pelo hipogonadismo hipogonadotrófico induzido por esteroides (ASIH), que tende a se regularizar espontaneamente ao longo do 1o ano de pausa de uso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que o uso dos EAAs e outros derivados para fins de ganho de massa magra são positivos, mas os efeitos deletérios que esses causam na saúde são exponencialmente maiores. O uso e abuso deles ocorre sem acompanhamento profissional, em grande maioria; o que provoca danos, muitas vezes, difíceis de reverter. Os EAA induzem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG) através de um mecanismo de feedback negativo, que culmina na supressão da liberação das gonadotrofinas (hipogonadismo hipogonadotrófico) e no comprometimento do processo de espermatogênese.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ALHASHIMI, M. The deleterious effect of anabolic androgenic steroid abuse on sexual and reproductive health and comparison of recovery between treated and untreated patients: Single (#38)#8208; center prospective randomized study. <i>Andrologia</i> , v. 54, n. 11, 5 set. 2022. 2. SANSONE, A. et al. Sport, doping and male fertility. <i>Reproductive Biology and Endocrinology</i> , v. 16, n. 1, 12 nov. 2018. 3. O uso dos esteroides anabolizantes androgênicos: uma revisão da literatura   Revista JRG de Estudos Acadêmicos. <i>revistajrg.com</i> , 11 out. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14839	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317149 - LUIZA ALBUQUERQUE DE ASSIS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Infertilidade Masculina por Esteroides Anabolizantes			
<b>INTRODUCAO</b>	Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) são compostos sintéticos derivados da testosterona (TE), hormônio utilizado de forma artificial devido a suas ações anabólicas e androgênicas. Os EAA são utilizados, cada vez mais, de forma ilegal e abusiva, por agirem promovendo melhoria da performance esportiva e estética. Porém, foram observados prejuízos na sexualidade e/ou na fertilidade masculina após treinamento excessivo e/ou abuso da droga. Além dos outros efeitos adversos que podem estar presentes, como: efeitos psiquiátricos, distúrbios do sono, perturbações do humor e risco de complicações cardiovasculares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os impactos causados na vida sexual masculina decorrente do uso de esteroides anabolizantes e seus efeitos deletérios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em dados de artigos das plataformas PubMed e Scielo, com os descritores Infertilidade, Anabolizante, Sexo Masculino e Efeitos Colaterais, com delimitação temporal de 2010 a 2023, língua portuguesa e inglesa e disponibilidade do texto completo gratuito na plataforma. Após leitura dos resumos, foram excluídos os artigos sem foco em infertilidade masculina.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da análise dos artigos, foi esclarecido que o uso de EAA apresentou efeitos como: aumento da libido, crescimento de pêlos, efeito anti- catabólico, entre outros. Porém, também resultaram em efeitos colaterais indesejados de acordo com o tipo de anabolizante utilizado, dosagem, idade e tempo de uso, como: acne, estrias, interrupção no crescimento de adolescentes, aumento no risco de lesões músculo-tendíneas, ginecomastia, impotência sexual, oligospermia, atrofia testicular, azoospermia, priapismo, alterações de exames laboratoriais e efeitos psicológicos, como agressividade e irritabilidade. Além disso, acerca da infertilidade masculina, o principal mecanismo se dá pelo hipogonadismo hipogonadotrófico induzido por esteroides (ASIH), que tende a se regularizar espontaneamente ao longo do 1o ano de pausa de uso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que o uso dos EAAs e outros derivados para fins de ganho de massa magra são positivos, mas os efeitos deletérios que esses causam na saúde são exponencialmente maiores. O uso e abuso deles ocorre sem acompanhamento profissional, em grande maioria; o que provoca danos, muitas vezes, difíceis de reverter. Os EAA induzem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG) através de um mecanismo de feedback negativo, que culmina na supressão da liberação das gonadotrofinas (hipogonadismo hipogonadotrófico) e no comprometimento do processo de espermatogênese.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ALHASHIMI, M. The deleterious effect of anabolic androgenic steroid abuse on sexual and reproductive health and comparison of recovery between treated and untreated patients: Single (#38)#8208; center prospective randomized study. Andrologia, v. 54, n. 11, 5 set. 2022. 2. SANSONE, A. et al. Sport, doping and male fertility. Reproductive Biology and Endocrinology, v. 16, n. 1, 12 nov. 2018. 3. O uso dos esteroides anabolizantes androgênicos: uma revisão da literatura   Revista JRG de Estudos Acadêmicos. revistajrg.com, 11 out. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14839	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4318064 - AMANDA CRISTINA LOPES BRATHWAITE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Infertilidade Masculina por Esteroides Anabolizantes			
<b>INTRODUCAO</b>	Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) são compostos sintéticos derivados da testosterona (TE), hormônio utilizado de forma artificial devido a suas ações anabólicas e androgênicas. Os EAA são utilizados, cada vez mais, de forma ilegal e abusiva, por agirem promovendo melhoria da performance esportiva e estética. Porém, foram observados prejuízos na sexualidade e/ou na fertilidade masculina após treinamento excessivo e/ou abuso da droga. Além dos outros efeitos adversos que podem estar presentes, como: efeitos psiquiátricos, distúrbios do sono, perturbações do humor e risco de complicações cardiovasculares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os impactos causados na vida sexual masculina decorrente do uso de esteroides anabolizantes e seus efeitos deletérios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em dados de artigos das plataformas PubMed e Scielo, com os descritores Infertilidade, Anabolizante, Sexo Masculino e Efeitos Colaterais, com delimitação temporal de 2010 a 2023, língua portuguesa e inglesa e disponibilidade do texto completo gratuito na plataforma. Após leitura dos resumos, foram excluídos os artigos sem foco em infertilidade masculina.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da análise dos artigos, foi esclarecido que o uso de EAA apresentou efeitos como: aumento da libido, crescimento de pêlos, efeito anti- catabólico, entre outros. Porém, também resultaram em efeitos colaterais indesejados de acordo com o tipo de anabolizante utilizado, dosagem, idade e tempo de uso, como: acne, estrias, interrupção no crescimento de adolescentes, aumento no risco de lesões músculo-tendíneas, ginecomastia, impotência sexual, oligospermia, atrofia testicular, azoospermia, priapismo, alterações de exames laboratoriais e efeitos psicológicos, como agressividade e irritabilidade. Além disso, acerca da infertilidade masculina, o principal mecanismo se dá pelo hipogonadismo hipogonadotrófico induzido por esteroides (ASIH), que tende a se regularizar espontaneamente ao longo do 1o ano de pausa de uso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que o uso dos EAAs e outros derivados para fins de ganho de massa magra são positivos, mas os efeitos deletérios que esses causam na saúde são exponencialmente maiores. O uso e abuso deles ocorre sem acompanhamento profissional, em grande maioria; o que provoca danos, muitas vezes, difíceis de reverter. Os EAA induzem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG) através de um mecanismo de feedback negativo, que culmina na supressão da liberação das gonadotrofinas (hipogonadismo hipogonadotrófico) e no comprometimento do processo de espermatogênese.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ALHASHIMI, M. The deleterious effect of anabolic androgenic steroid abuse on sexual and reproductive health and comparison of recovery between treated and untreated patients: Single (#38)#8208; center prospective randomized study. <i>Andrologia</i> , v. 54, n. 11, 5 set. 2022. 2. SANSONE, A. et al. Sport, doping and male fertility. <i>Reproductive Biology and Endocrinology</i> , v. 16, n. 1, 12 nov. 2018. 3. O uso dos esteroides anabolizantes androgênicos: uma revisão da literatura   Revista JRG de Estudos Acadêmicos. <i>revistajrg.com</i> , 11 out. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14839	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4321260 - CAMILA MENDES TORRES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Infertilidade Masculina por Esteroides Anabolizantes			
<b>INTRODUCAO</b>	Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) são compostos sintéticos derivados da testosterona (TE), hormônio utilizado de forma artificial devido a suas ações anabólicas e androgênicas. Os EAA são utilizados, cada vez mais, de forma ilegal e abusiva, por agirem promovendo melhoria da performance esportiva e estética. Porém, foram observados prejuízos na sexualidade e/ou na fertilidade masculina após treinamento excessivo e/ou abuso da droga. Além dos outros efeitos adversos que podem estar presentes, como: efeitos psiquiátricos, distúrbios do sono, perturbações do humor e risco de complicações cardiovasculares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os impactos causados na vida sexual masculina decorrente do uso de esteroides anabolizantes e seus efeitos deletérios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em dados de artigos das plataformas PubMed e Scielo, com os descritores Infertilidade, Anabolizante, Sexo Masculino e Efeitos Colaterais, com delimitação temporal de 2010 a 2023, língua portuguesa e inglesa e disponibilidade do texto completo gratuito na plataforma. Após leitura dos resumos, foram excluídos os artigos sem foco em infertilidade masculina.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da análise dos artigos, foi esclarecido que o uso de EAA apresentou efeitos como: aumento da libido, crescimento de pêlos, efeito anti- catabólico, entre outros. Porém, também resultaram em efeitos colaterais indesejados de acordo com o tipo de anabolizante utilizado, dosagem, idade e tempo de uso, como: acne, estrias, interrupção no crescimento de adolescentes, aumento no risco de lesões músculo-tendíneas, ginecomastia, impotência sexual, oligospermia, atrofia testicular, azoospermia, priapismo, alterações de exames laboratoriais e efeitos psicológicos, como agressividade e irritabilidade. Além disso, acerca da infertilidade masculina, o principal mecanismo se dá pelo hipogonadismo hipogonadotrófico induzido por esteroides (ASIH), que tende a se regularizar espontaneamente ao longo do 1o ano de pausa de uso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que o uso dos EAAs e outros derivados para fins de ganho de massa magra são positivos, mas os efeitos deletérios que esses causam na saúde são exponencialmente maiores. O uso e abuso deles ocorre sem acompanhamento profissional, em grande maioria; o que provoca danos, muitas vezes, difíceis de reverter. Os EAA induzem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG) através de um mecanismo de feedback negativo, que culmina na supressão da liberação das gonadotrofinas (hipogonadismo hipogonadotrófico) e no comprometimento do processo de espermatogênese.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ALHASHIMI, M. The deleterious effect of anabolic androgenic steroid abuse on sexual and reproductive health and comparison of recovery between treated and untreated patients: Single (#38)#8208; center prospective randomized study. <i>Andrologia</i> , v. 54, n. 11, 5 set. 2022. 2. SANSONE, A. et al. Sport, doping and male fertility. <i>Reproductive Biology and Endocrinology</i> , v. 16, n. 1, 12 nov. 2018. 3. O uso dos esteroides anabolizantes androgênicos: uma revisão da literatura   Revista JRG de Estudos Acadêmicos. <i>revistajrg.com</i> , 11 out. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14839	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4889142 - NATALIE ISABELLA ZUCOLOTO QUIROZ		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Infertilidade Masculina por Esteroides Anabolizantes			
<b>INTRODUCAO</b>	Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) são compostos sintéticos derivados da testosterona (TE), hormônio utilizado de forma artificial devido a suas ações anabólicas e androgênicas. Os EAA são utilizados, cada vez mais, de forma ilegal e abusiva, por agirem promovendo melhoria da performance esportiva e estética. Porém, foram observados prejuízos na sexualidade e/ou na fertilidade masculina após treinamento excessivo e/ou abuso da droga. Além dos outros efeitos adversos que podem estar presentes, como: efeitos psiquiátricos, distúrbios do sono, perturbações do humor e risco de complicações cardiovasculares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os impactos causados na vida sexual masculina decorrente do uso de esteroides anabolizantes e seus efeitos deletérios.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em dados de artigos das plataformas PubMed e Scielo, com os descritores Infertilidade, Anabolizante, Sexo Masculino e Efeitos Colaterais, com delimitação temporal de 2010 a 2023, língua portuguesa e inglesa e disponibilidade do texto completo gratuito na plataforma. Após leitura dos resumos, foram excluídos os artigos sem foco em infertilidade masculina.			
<b>RESULTADOS</b>	A partir da análise dos artigos, foi esclarecido que o uso de EAA apresentou efeitos como: aumento da libido, crescimento de pêlos, efeito anti- catabólico, entre outros. Porém, também resultaram em efeitos colaterais indesejados de acordo com o tipo de anabolizante utilizado, dosagem, idade e tempo de uso, como: acne, estrias, interrupção no crescimento de adolescentes, aumento no risco de lesões músculo-tendíneas, ginecomastia, impotência sexual, oligospermia, atrofia testicular, azoospermia, priapismo, alterações de exames laboratoriais e efeitos psicológicos, como agressividade e irritabilidade. Além disso, acerca da infertilidade masculina, o principal mecanismo se dá pelo hipogonadismo hipogonadotrófico induzido por esteroides (ASIH), que tende a se regularizar espontaneamente ao longo do 1o ano de pausa de uso.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que o uso dos EAAs e outros derivados para fins de ganho de massa magra são positivos, mas os efeitos deletérios que esses causam na saúde são exponencialmente maiores. O uso e abuso deles ocorre sem acompanhamento profissional, em grande maioria; o que provoca danos, muitas vezes, difíceis de reverter. Os EAA induzem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG) através de um mecanismo de feedback negativo, que culmina na supressão da liberação das gonadotrofinas (hipogonadismo hipogonadotrófico) e no comprometimento do processo de espermatogênese.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. ALHASHIMI, M. The deleterious effects of anabolic androgenic steroid abuse on sexual and reproductive health and comparison of recovery between treated and untreated patients: Single (#38)#8208; center prospective randomized study. <i>Andrologia</i> , v. 54, n. 11, 5 set. 2022. 2. SANSONE, A. et al. Sport, doping and male fertility. <i>Reproductive Biology and Endocrinology</i> , v. 16, n. 1, 12 nov. 2018. 3. O uso dos esteroides anabolizantes androgênicos: uma revisão da literatura   Revista JRG de Estudos Acadêmicos. <i>revistajrg.com</i> , 11 out. 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14840	Ciências da Saúde	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5226210 - MICHELLY THAUANY DA SILVA BARROS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		
<b>TITULO</b>	Conhecimento de adolescentes sobre métodos contraceptivos e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis – Uma revisão integrativa da literatura.			
<b>INTRODUCAO</b>	A adolescência é um momento de mudanças significativas para o ser humano pois os fatores hormonais trazem novas formas de interação social, com a chegada da adolescência uma das maiores preocupações é em torno da gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis (IST's) <sup>1,2</sup> . A gravidez na adolescência está sendo considerada um problema global de saúde pública, visto que 11% dos nascimentos em todo o mundo são de gestações em mulheres adolescentes, as IST's acometem principalmente as adolescentes e é um desafio para a sociedade moderna, o aumento dos novos casos de IST's possuem relação direta com a baixa adesão do uso de preservativos <sup>3</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar o nível de conhecimento dos adolescentes acerca das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e métodos contraceptivos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, empregando-se a análise de estudos sobre o nível de conhecimento de adolescentes sobre métodos contraceptivos e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs, SciELO, por meio dos descritores (DeCS): "sexualidade" AND "adolescência" AND "infecções sexualmente transmissíveis" AND "métodos contraceptivos" AND "gestação". As limitações apresentadas na busca foram a escassez de estudos.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram utilizados estudos publicados entre 2018 e 2023, foram encontrados 105 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos originais disponíveis na íntegra em inglês e português. Cada artigo foi avaliado por dois revisores. Após a extração de dados houve a exclusão inicial de 51 artigos, pois estavam duplicados ou não se enquadravam no objetivo. Em segunda análise foi realizada a leitura na íntegra de 54 artigos e selecionados 13. Os estudos indicam que a deficiência de conhecimento sobre a temática está relacionada à educação sexual transmitida aos adolescentes em diversos cenários. Na família, o obstáculo é a hesitação em discutir sobre a sexualidade com os pais, que também se sentem despreparados. Os trabalhos analisados evidenciam a falta de comunicação clara com estes jovens corrobora para a deficiência de conhecimento sobre as IST's e os métodos contraceptivos			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante do exposto, é possível compreender que o conhecimento apresentado sobre o assunto é ineficaz entre os adolescentes, sendo imprescindível a ampliação das atividades propostas pelas escolas com abordagem expositiva, posto que os próprios alunos as consideram necessário para o melhor conhecimento sobre o assunto.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Marcondes, F.L.; Mota, C.P.; Lima da Silva, J.L, et al. Educação sexual entre adolescentes: um estudo de caso. Revistta Nursing. 2021; 24(274): 5357-5361. Online. Disponível: (#60)https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/770/1511(#62). Acesso em 02 out. 2023. 2. Vieira KJ, Barbosa NG, Monteiro JCS, et al. Conhecimento de adolescentes sobre metodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Revista Baiana de Enfermagem. 2021; (35): e39015. Online. Disponível em (#60)http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S2178-86502021000100314(#62). Acesso em 02 out. 2023. 3. Silva FP, Morais LP, Mota WS, Quirino GS. Dúvidas sobre infecções sexualmente transmissíveis de adolescentes: revisão integrativa da literatura. Revista de Enfermagem UFPE. 2021; 15(2):e247967. Online. Disponível em: (#60)https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/247967/39961(#62). Acesso em 02 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14842	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4623533 - NÁDIA NEVES TACHOTTI PIRES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	PRODUÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA DIRECIONAMENTO DE CONDUTAS FRENTE ÀS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR			
<b>INTRODUCA O</b>	Doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA's) são causadas pela ingestão de alimentos e água contaminados por micro-organismos patogênicos e suas toxinas, bem como agentes químicos e físicos. Os sintomas são perturbações gastrointestinais que culminam em diarreia e dores abdominais. Apesar dos esforços do Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de Guarulhos em enfatizar as políticas de prevenção às DTHA'S, ainda há uma baixa cobertura de coleta e tratamento de esgotos sanitários na região. Assim, a atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS) se torna imprescindível, uma vez que intermediam o contato da população com o sistema de saúde. Por isso, torna-se essencial a produção de material informativo para auxiliar os ACS na disseminação de informação a nível preventivo dessas doenças.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo do trabalho é produzir material técnico, visando a educação em saúde para prevenção das DTHA's na região de Guarulhos, direcionada para o agente comunitário de saúde, de forma que a informação técnica possa ser disseminada de maneira acessível à comunidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as principais DTHA's e formas de prevenção. Após, foi elaborado um questionário para compreender o nível de informações e a forma de transmissão das informações por parte do ACS (n = 10). A partir do levantamento bibliográfico e das lacunas técnicas diagnosticadas, foram construídos e serão distribuídos materiais técnicos em forma de banners para serem expostos nas UBS São Rafael e Palmira, que somadas atendem em média 1700 famílias. Após aplicados, será realizado um novo questionário para verificação de adesão e viabilidade de replicação da informação destes profissionais para a população.			
<b>RESULTADO S</b>	O questionário qualificou o nível de conhecimento técnico, e foi respondido pelos ACS de forma receptiva e interessada em saber mais sobre o assunto. A aplicação de questionário é uma ferramenta importante para obter um panorama da compreensão do conhecimento, bem como entender as necessidades de interferência (MALHOTRA, 2006). O material contém as principais formas de contaminação por DTHA's, que são também as mais comuns no dia a dia da comunidade atendida pela UBS. Entre elas a má higienização de alimentos e água contaminada, que são citadas também com as mais comuns na literatura (SIRTOLI; COMARELLA, 2018). A prevenção é o método mais eficiente de controle, e o material aplicado traz opções como o uso de hipoclorito, distribuído gratuitamente pela UBS.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Concluímos que a alta prevalência de DTHA traz a necessidade de intervenções não apenas na população, mas principalmente nos replicadores que estão em contato direto com os usuários do sistema. Por isso, as intervenções educativas para os ACS se mostraram importantes para a promoção e prevenção da saúde frente às DTHA.			
<b>REFERENCIA S</b>	BRASIL. Ministério da Saúde. Capacitação em Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas: manual do monitor. Brasília, 2010. MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. SIRTOLI, D. B.; COMARELLA, L. O papel da vigilância sanitária na prevenção das doenças transmitidas por alimentos (DTA). Revista Saúde e Desenvolvimento, v.12, n. 10, p. 197-209, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14842	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4825276 - MARCELO KOJI SOYAMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	PRODUÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA DIRECIONAMENTO DE CONDUTAS FRENTE ÀS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR			
<b>INTRODUCAO</b>	Doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA's) são causadas pela ingestão de alimentos e água contaminados por micro-organismos patogênicos e suas toxinas, bem como agentes químicos e físicos. Os sintomas são perturbações gastrointestinais que culminam em diarreia e dores abdominais. Apesar dos esforços do Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de Guarulhos em enfatizar as políticas de prevenção às DTHA'S, ainda há uma baixa cobertura de coleta e tratamento de esgotos sanitários na região. Assim, a atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS) se torna imprescindível, uma vez que intermediam o contato da população com o sistema de saúde. Por isso, torna-se essencial a produção de material informativo para auxiliar os ACS na disseminação de informação a nível preventivo dessas doenças.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo do trabalho é produzir material técnico, visando a educação em saúde para prevenção das DTHA's na região de Guarulhos, direcionada para o agente comunitário de saúde, de forma que a informação técnica possa ser disseminada de maneira acessível à comunidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as principais DTHA's e formas de prevenção. Após, foi elaborado um questionário para compreender o nível de informações e a forma de transmissão das informações por parte do ACS (n = 10). A partir do levantamento bibliográfico e das lacunas técnicas diagnosticadas, foram construídos e serão distribuídos materiais técnicos em forma de banners para serem expostos nas UBS São Rafael e Palmira, que somadas atendem em média 1700 famílias. Após aplicados, será realizado um novo questionário para verificação de adesão e viabilidade de replicação da informação destes profissionais para a população.			
<b>RESULTADOS</b>	O questionário qualificou o nível de conhecimento técnico, e foi respondido pelos ACS de forma receptiva e interessada em saber mais sobre o assunto. A aplicação de questionário é uma ferramenta importante para obter um panorama da compreensão do conhecimento, bem como entender as necessidades de interferência (MALHOTRA, 2006). O material contém as principais formas de contaminação por DTHA's, que são também as mais comuns no dia a dia da comunidade atendida pela UBS. Entre elas a má higienização de alimentos e água contaminada, que são citadas também com as mais comuns na literatura (SIRTOLI; COMARELLA, 2018). A prevenção é o método mais eficiente de controle, e o material aplicado traz opções como o uso de hipoclorito, distribuído gratuitamente pela UBS.			
<b>CONCLUSOES</b>	Concluímos que a alta prevalência de DTHA traz a necessidade de intervenções não apenas na população, mas principalmente nos replicadores que estão em contato direto com os usuários do sistema. Por isso, as intervenções educativas para os ACS se mostraram importantes para a promoção e prevenção da saúde frente às DTHA.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRASIL. Ministério da Saúde. Capacitação em Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas: manual do monitor. Brasília, 2010. MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. SIRTOLI, D. B.; COMARELLA, L. O papel da vigilância sanitária na prevenção das doenças transmitidas por alimentos (DTA). Revista Saúde e Desenvolvimento, v.12, n. 10, p. 197-209, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14842	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233798 - MARCELLA GIANCOLI KATO CANO DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
		<b>Orientador Externo</b>		
<b>TITULO</b>	PRODUÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA DIRECIONAMENTO DE CONDUTAS FRENTE ÀS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA's) são causadas pela ingestão de alimentos e água contaminados por micro-organismos patogênicos e suas toxinas, bem como agentes químicos e físicos. Os sintomas são perturbações gastrointestinais que culminam em diarreia e dores abdominais. Apesar dos esforços do Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de Guarulhos em enfatizar as políticas de prevenção às DTHA'S, ainda há uma baixa cobertura de coleta e tratamento de esgotos sanitários na região. Assim, a atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS) se torna imprescindível, uma vez que intermediam o contato da população com o sistema de saúde. Por isso, torna-se essencial a produção de material informativo para auxiliar os ACS na disseminação de informação a nível preventivo dessas doenças.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo do trabalho é produzir material técnico, visando a educação em saúde para prevenção das DTHA's na região de Guarulhos, direcionada para o agente comunitário de saúde, de forma que a informação técnica possa ser disseminada de maneira acessível à comunidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as principais DTHA's e formas de prevenção. Após, foi elaborado um questionário para compreender o nível de informações e a forma de transmissão das informações por parte do ACS (n = 10). A partir do levantamento bibliográfico e das lacunas técnicas diagnosticadas, foram construídos e serão distribuídos materiais técnicos em forma de banners para serem expostos nas UBS São Rafael e Palmira, que somadas atendem em média 1700 famílias. Após aplicados, será realizado um novo questionário para verificação de adesão e viabilidade de replicação da informação destes profissionais para a população.			
<b>RESULTADOS</b>	O questionário qualificou o nível de conhecimento técnico, e foi respondido pelos ACS de forma receptiva e interessada em saber mais sobre o assunto. A aplicação de questionário é uma ferramenta importante para obter um panorama da compreensão do conhecimento, bem como entender as necessidades de interferência (MALHOTRA, 2006). O material contém as principais formas de contaminação por DTHA's, que são também as mais comuns no dia a dia da comunidade atendida pela UBS. Entre elas a má higienização de alimentos e água contaminada, que são citadas também com as mais comuns na literatura (SIRTOLI; COMARELLA, 2018). A prevenção é o método mais eficiente de controle, e o material aplicado traz opções como o uso de hipoclorito, distribuído gratuitamente pela UBS.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Concluímos que a alta prevalência de DTHA traz a necessidade de intervenções não apenas na população, mas principalmente nos replicadores que estão em contato direto com os usuários do sistema. Por isso, as intervenções educativas para os ACS se mostraram importantes para a promoção e prevenção da saúde frente às DTHA.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BRASIL. Ministério da Saúde. Capacitação em Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas: manual do monitor. Brasília, 2010. MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. SIRTOLI, D. B.; COMARELLA, L. O papel da vigilância sanitária na prevenção das doenças transmitidas por alimentos (DTA). Revista Saúde e Desenvolvimento, v.12, n. 10, p. 197-209, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14842	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		<b>Orientador Externo</b>		
		5244242 - TANIA RIBEIRO DA SILVA CUNHA		2 - Aprovado
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
<b>TITULO</b>	PRODUÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA DIRECIONAMENTO DE CONDUTAS FRENTE ÀS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA's) são causadas pela ingestão de alimentos e água contaminados por micro-organismos patogênicos e suas toxinas, bem como agentes químicos e físicos. Os sintomas são perturbações gastrointestinais que culminam em diarreia e dores abdominais. Apesar dos esforços do Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de Guarulhos em enfatizar as políticas de prevenção às DTHA'S, ainda há uma baixa cobertura de coleta e tratamento de esgotos sanitários na região. Assim, a atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS) se torna imprescindível, uma vez que intermediam o contato da população com o sistema de saúde. Por isso, torna-se essencial a produção de material informativo para auxiliar os ACS na disseminação de informação a nível preventivo dessas doenças.			
<b>OBJETIVOS</b>	Objetivo do trabalho é produzir material técnico, visando a educação em saúde para prevenção das DTHA's na região de Guarulhos, direcionada para o agente comunitário de saúde, de forma que a informação técnica possa ser disseminada de maneira acessível à comunidade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as principais DTHA's e formas de prevenção. Após, foi elaborado um questionário para compreender o nível de informações e a forma de transmissão das informações por parte do ACS (n = 10). A partir do levantamento bibliográfico e das lacunas técnicas diagnosticadas, foram construídos e serão distribuídos materiais técnicos em forma de banners para serem expostos nas UBS São Rafael e Palmira, que somadas atendem em média 1700 famílias. Após aplicados, será realizado um novo questionário para verificação de adesão e viabilidade de replicação da informação destes profissionais para a população.			
<b>RESULTADOS</b>	O questionário qualificou o nível de conhecimento técnico, e foi respondido pelos ACS de forma receptiva e interessada em saber mais sobre o assunto. A aplicação de questionário é uma ferramenta importante para obter um panorama da compreensão do conhecimento, bem como entender as necessidades de interferência (MALHOTRA, 2006). O material contém as principais formas de contaminação por DTHA's, que são também as mais comuns no dia a dia da comunidade atendida pela UBS. Entre elas a má higienização de alimentos e água contaminada, que são citadas também com as mais comuns na literatura (SIRTOLI; COMARELLA, 2018). A prevenção é o método mais eficiente de controle, e o material aplicado traz opções como o uso de hipoclorito, distribuído gratuitamente pela UBS.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Concluímos que a alta prevalência de DTHA traz a necessidade de intervenções não apenas na população, mas principalmente nos replicadores que estão em contato direto com os usuários do sistema. Por isso, as intervenções educativas para os ACS se mostraram importantes para a promoção e prevenção da saúde frente às DTHA.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BRASIL. Ministério da Saúde. Capacitação em Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas: manual do monitor. Brasília, 2010. MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. SIRTOLI, D. B.; COMARELLA, L. O papel da vigilância sanitária na prevenção das doenças transmitidas por alimentos (DTA). Revista Saúde e Desenvolvimento, v.12, n. 10, p. 197-209, 2018.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14843	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3168981 - LUANA LOPES PATENTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana de Paula Nhanharelli	Victor Nowosh	
<b>TITULO</b>	Ureterolitíase bilateral associada à doença renal crônica em um felino			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A ureterolitíase ocorre principalmente em gatos, devido à migração de urólitos formados na pelve renal ao longo dos ureteres. Essa obstrução pode causar danos renais mecânicos ou hidronefrose, levando à manifestações clínicas de dor e azotemia. Cerca de 95% desses urólitos são formados por oxalato de cálcio, sendo a doença renal crônica (DRC), um fator predisponente à sua formação. A DRC é comum em animais idosos, com sinais clínicos aparecendo quando aproximadamente 75% dos néfrons são perdidos, o que muitas vezes leva a um diagnóstico tardio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso de ureterolitíase associada à doença renal crônica em um paciente felino atendido no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um felino de 11 anos, com queixas de emagrecimento progressivo, hiporexia e sialorreia. Ao exame físico, o paciente demonstrou-se reativo à manipulação com vocalização excessiva à palpação da região abdominal hipogástrica, sugerindo dor aguda. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADOS</b>	O hemograma do paciente revelou leucocitose (23400/µL; referência: 5500-19500/µL) com neutrofilia (19890/µL; ref.: 2500-12500/µL), sugerindo quadro inflamatório. Em bioquímica sérica, detectou-se aumento da creatinina sérica (2,92mg/mL; ref.: 0,5-1,8mg/mL) e, em urinalise, foi detectada baixa densidade urinária (1.010; ref: 1.030-1.050) e presença de sangue oculto (++; ref.: ausente). Os exames de imagem indicaram a presença de urólitos em ambos os ureteres, perda da relação cortical-medular e aumento de ecogenicidade em mesentério e duodeno. O paciente foi diagnosticado com ureterolitíase e DRC, sendo tratado clinicamente para ambos os casos e apresentando boa evolução. A DRC é uma doença de alta prevalência em felinos machos, adultos e idosos, podendo levar a sintomas como poliúria, êmese, náusea, apatia e prostração, cuja gravidade está relacionada ao estágio da doença. A urolitíase, nome dado à formação de cálculos urinários, está associada à DRC e pode causar obstrução do fluxo urinário, hidronefrose, lesão renal e pielonefrite. A natureza dos cálculos pode variar, mas há predomínio de oxalato de cálcio em felinos com DRC. O tratamento clínico da ureterolitíase é realizado com bloqueadores alfa-adrenérgicos (prazosina ou tansulosina) que promovem relaxamento ureteral e favorecem a migração dos cálculos. Para pacientes com DRC, preconizam-se as mudanças na dieta, com redução de proteínas e fósforo, e tratamento das manifestações clínicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ainda que incurável e de prognóstico reservado à mau, o diagnóstico precoce de ambas DRC e urolitíase e a instituição de tratamento e acompanhamento veterinário confere aos pacientes maior sobrevida ao retardar o avanço do quadro e oferecer conforto ao lidar com o surgimento dos sinais clínicos associados ao quadro.			
<b>REFERENCIAS</b>	FISCHER, JR. Acute Ureteral Obstruction in Cats: Diagnosis, Management Options, and Outcomes. <i>Advances in Small Animal Medicine and Surgery</i> , 19(7) 1-3, 2006. PIMENTA, MM. et al. Estudo da ocorrência de litíase renal e ureteral em gatos com doença renal crônica. <i>Pesquisa Veterinária Brasileira</i> , 34(6) 555-561, 2014. GLAZER, K. et al. <i>Ureterolithiasis</i> , StatPearls Publishing, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14843	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana de Paula Nhanharelli	Victor Nowosh	
<b>TITULO</b>	Ureterolitíase bilateral associada à doença renal crônica em um felino			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A ureterolitíase ocorre principalmente em gatos, devido à migração de urólitos formados na pelve renal ao longo dos ureteres. Essa obstrução pode causar danos renais mecânicos ou hidronefrose, levando à manifestações clínicas de dor e azotemia. Cerca de 95% desses urólitos são formados por oxalato de cálcio, sendo a doença renal crônica (DRC), um fator predisponente à sua formação. A DRC é comum em animais idosos, com sinais clínicos aparecendo quando aproximadamente 75% dos néfrons são perdidos, o que muitas vezes leva a um diagnóstico tardio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso de ureterolitíase associada à doença renal crônica em um paciente felino atendido no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um felino de 11 anos, com queixas de emagrecimento progressivo, hiporexia e sialorreia. Ao exame físico, o paciente demonstrou-se reativo à manipulação com vocalização excessiva à palpação da região abdominal hipogástrica, sugerindo dor aguda. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADOS</b>	O hemograma do paciente revelou leucocitose (23400/µL; referência: 5500-19500/µL) com neutrofilia (19890/µL; ref.: 2500-12500/µL), sugerindo quadro inflamatório. Em bioquímica sérica, detectou-se aumento da creatinina sérica (2,92mg/mL; ref.: 0,5-1,8mg/mL) e, em urinalise, foi detectada baixa densidade urinária (1.010; ref: 1.030-1.050) e presença de sangue oculto (++; ref.: ausente). Os exames de imagem indicaram a presença de urólitos em ambos os ureteres, perda da relação cortical-medular e aumento de ecogenicidade em mesentério e duodeno. O paciente foi diagnosticado com ureterolitíase e DRC, sendo tratado clinicamente para ambos os casos e apresentando boa evolução. A DRC é uma doença de alta prevalência em felinos machos, adultos e idosos, podendo levar a sintomas como poliúria, poliúria, êmese, náusea, apatia e prostração, cuja gravidade está relacionada ao estágio da doença. A urolitíase, nome dado à formação de cálculos urinários, está associada à DRC e pode causar obstrução do fluxo urinário, hidronefrose, lesão renal e pielonefrite. A natureza dos cálculos pode variar, mas há predomínio de oxalato de cálcio em felinos com DRC. O tratamento clínico da ureterolitíase é realizado com bloqueadores alfa-adrenérgicos (prazosina ou tansulosina) que promovem relaxamento ureteral e favorecem a migração dos cálculos. Para pacientes com DRC, preconizam-se as mudanças na dieta, com redução de proteínas e fósforo, e tratamento das manifestações clínicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ainda que incurável e de prognóstico reservado à mau, o diagnóstico precoce de ambas DRC e urolitíase e a instituição de tratamento e acompanhamento veterinário confere aos pacientes maior sobrevida ao retardar o avanço do quadro e oferecer conforto ao lidar com o surgimento dos sinais clínicos associados ao quadro.			
<b>REFERENCIAS</b>	FISCHER, JR. Acute Ureteral Obstruction in Cats: Diagnosis, Management Options, and Outcomes. <i>Advances in Small Animal Medicine and Surgery</i> , 19(7) 1-3, 2006. PIMENTA, MM. et al. Estudo da ocorrência de litíase renal e ureteral em gatos com doença renal crônica. <i>Pesquisa Veterinária Brasileira</i> , 34(6) 555-561, 2014. GLAZER, K. et al. <i>Ureterolithiasis</i> , StatPearls Publishing, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14843	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135628 - EDUARDO MARTINS BORGES SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana de Paula Nhanharelli	Victor Nowosh	
<b>TITULO</b>	Ureterolitíase bilateral associada à doença renal crônica em um felino			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A ureterolitíase ocorre principalmente em gatos, devido à migração de urólitos formados na pelve renal ao longo dos ureteres. Essa obstrução pode causar danos renais mecânicos ou hidronefrose, levando à manifestações clínicas de dor e azotemia. Cerca de 95% desses urólitos são formados por oxalato de cálcio, sendo a doença renal crônica (DRC), um fator predisponente à sua formação. A DRC é comum em animais idosos, com sinais clínicos aparecendo quando aproximadamente 75% dos néfrons são perdidos, o que muitas vezes leva a um diagnóstico tardio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar caso de ureterolitíase associada à doença renal crônica em um paciente felino atendido no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Santo Amaro.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um felino de 11 anos, com queixas de emagrecimento progressivo, hiporexia e sialorreia. Ao exame físico, o paciente demonstrou-se reativo à manipulação com vocalização excessiva à palpação da região abdominal hipogástrica, sugerindo dor aguda. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADOS</b>	O hemograma do paciente revelou leucocitose (23400/µL; referência: 5500-19500/µL) com neutrofilia (19890/µL; ref.: 2500-12500/µL), sugerindo quadro inflamatório. Em bioquímica sérica, detectou-se aumento da creatinina sérica (2,92mg/mL; ref.: 0,5-1,8mg/mL) e, em urinalise, foi detectada baixa densidade urinária (1.010; ref: 1.030-1.050) e presença de sangue oculto (++; ref.: ausente). Os exames de imagem indicaram a presença de urólitos em ambos os ureteres, perda da relação cortical-medular e aumento de ecogenicidade em mesentério e duodeno. O paciente foi diagnosticado com ureterolitíase e DRC, sendo tratado clinicamente para ambos os casos e apresentando boa evolução. A DRC é uma doença de alta prevalência em felinos machos, adultos e idosos, podendo levar a sintomas como poliúria, poliúria, êmese, náusea, apatia e prostração, cuja gravidade está relacionada ao estágio da doença. A urolitíase, nome dado à formação de cálculos urinários, está associada à DRC e pode causar obstrução do fluxo urinário, hidronefrose, lesão renal e pielonefrite. A natureza dos cálculos pode variar, mas há predomínio de oxalato de cálcio em felinos com DRC. O tratamento clínico da ureterolitíase é realizado com bloqueadores alfa-adrenérgicos (prazosina ou tansulosina) que promovem relaxamento ureteral e favorecem a migração dos cálculos. Para pacientes com DRC, preconizam-se as mudanças na dieta, com redução de proteínas e fósforo, e tratamento das manifestações clínicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Ainda que incurável e de prognóstico reservado à mau, o diagnóstico precoce de ambas DRC e urolitíase e a instituição de tratamento e acompanhamento veterinário confere aos pacientes maior sobrevida ao retardar o avanço do quadro e oferecer conforto ao lidar com o surgimento dos sinais clínicos associados ao quadro.			
<b>REFERENCIAS</b>	FISCHER, JR. Acute Ureteral Obstruction in Cats: Diagnosis, Management Options, and Outcomes. <i>Advances in Small Animal Medicine and Surgery</i> , 19(7) 1-3, 2006. PIMENTA, MM. et al. Estudo da ocorrência de litíase renal e ureteral em gatos com doença renal crônica. <i>Pesquisa Veterinária Brasileira</i> , 34(6) 555-561, 2014. GLAZER, K. et al. <i>Ureterolithiasis</i> , StatPearls Publishing, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14845	Clinica Veterinária	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2972301 - ISABELLA VIEIRA FIGUEIREDO TOMAZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	ACHADO NECROSCÓPICO DE URÓLITO RENAL BILATERAL EM EQUINO IDOSO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Urólitos são cálculos formados pelo acúmulo e unificação dos sedimentos urinários, compostos por um ou mais cristaloídes. Podem ser encontrados em qualquer porção do trato urinário dos equinos. Um centro de referência em urolitíases relatou a prevalência estimada em 0,11% nessa espécie, sendo destes 12% renais, em mais de 4.400 casos diagnosticados nas diferentes espécies animais. Essa enfermidade acomete em maior proporção equinos machos, castrados, com idade média de dez anos, sem predisposição racial e manejo nutricional inadequado. Um estudo mostra que de 256 urólitos avaliados 95% eram compostos por carbonato de cálcio, 1% de estruvita e 0,8% por oxalato de cálcio e os outros correspondiam menos de 0,5% cada. Equinos com urolitíase renal normalmente apresentam insuficiência renal crônica, com isso manifestam sinais clínicos como queda de desempenho, perda de peso e uremia. O diagnóstico se dá a partir da dosagem sérica de uréia e creatinina, urinálise, análise de sedimento urinário e ultrassonografia renal. A urolitíase em equinos apresenta um prognóstico reservado. Animais que possuem urólitos renais apresentam pior prognóstico quando comparados com cálculos vesicais e uretrais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é relatar o achado necroscópico de urólito renal em equino no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET-UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um equino, macho, castrado, 38 anos, com histórico de perda de peso progressiva, diminuição de tônus muscular, apetite seletivo e incoordenação há 6 meses. Animal apresentava escore de condição corporal caquético, dificuldade para levantar mantendo-se muito tempo em decúbito com inúmeras escaras, não apresentava alterações nos parâmetros clínicos e laboratoriais avaliados. Após vinte e três dias de internação animal veio a óbito, sendo realizada a necropsia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como causa mortis foi diagnosticado um quadro de peritonite e achado necroscópico a presença de urólitos em ambos os rins. No rim esquerdo um urólito com dimensões de aproximadamente 10cmx8cm, e em rim direito pequenos cálculos medindo aproximadamente 3cmx3cm, todos localizados em pelve renal, levando a dilatação da mesma, com área de infarto e aderência a cápsula renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As afecções renais em equinos, mesmo raras são importantes por serem diagnosticadas tardiamente e levarem a insuficiência renal, irreversível, podendo levar à óbito. Esse animal apresentava fatores predisponentes como idade avançada, orquiectomizado e macho, porém, exceto pelo emagrecimento progressivo, nenhum outro sinal clínico compatível com lesão renal.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>FERREIRA, M. A. et al. Urolitíase obstrutiva em equino. (#38)#8239;Acta Scientiae Veterinariae, v. 47, p. 1-5, 2019. Disponível em: <a href="https://repositorio.usp.br/directbitstream/344ddf4-10fa-4c1f-b2ad-22b2e4fdce78/FZEA_002995020.pdf">https://repositorio.usp.br/directbitstream/344ddf4-10fa-4c1f-b2ad-22b2e4fdce78/FZEA_002995020.pdf</a>. Acesso em: 06 out. 2023. MACBETH, B. J. Obstructive urolithiasis, unilateral hydronephrosis, and probable nephrolithiasis in a 12-year old Clydesdale gelding. The Canadian Veterinary Journal, v. 49, n. 3, p. 287, 2008. Disponível em: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249726/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249726/</a> Acesso em: 06 out 2023. DIAZ-ESPINEIRA, M. et al. Structure and composition of equine uroliths. Journal of Equine Veterinary Science, v. 15, n. 1, p. 27-34, 1995. Disponível em: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080607805776">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080607805776</a>. Acesso em: 06 out 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14845	Clinica Veterinária	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3800504 - THAMIRES ALVES MURTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	ACHADO NECROSCÓPICO DE URÓLITO RENAL BILATERAL EM EQUINO IDOSO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Urólitos são cálculos formados pelo acúmulo e unificação dos sedimentos urinários, compostos por um ou mais cristaloídes. Podem ser encontrados em qualquer porção do trato urinário dos equinos. Um centro de referência em urolitíases relatou a prevalência estimada em 0,11% nessa espécie, sendo destes 12% renais, em mais de 4.400 casos diagnosticados nas diferentes espécies animais. Essa enfermidade acomete em maior proporção equinos machos, castrados, com idade média de dez anos, sem predisposição racial e manejo nutricional inadequado. Um estudo mostra que de 256 urólitos avaliados 95% eram compostos por carbonato de cálcio, 1% de estruvita e 0,8% por oxalato de cálcio e os outros correspondiam menos de 0,5% cada. Equinos com urolitíase renal normalmente apresentam insuficiência renal crônica, com isso manifestam sinais clínicos como queda de desempenho, perda de peso e uremia. O diagnóstico se dá a partir da dosagem sérica de uréia e creatinina, urinálise, análise de sedimento urinário e ultrassonografia renal. A urolitíase em equinos apresenta um prognóstico reservado. Animais que possuem urólitos renais apresentam pior prognóstico quando comparados com cálculos vesicais e uretrais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é relatar o achado necroscópico de urólito renal em equino no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET-UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um equino, macho, castrado, 38 anos, com histórico de perda de peso progressiva, diminuição de tônus muscular, apetite seletivo e incoordenação há 6 meses. Animal apresentava escore de condição corporal caquético, dificuldade para levantar mantendo-se muito tempo em decúbito com inúmeras escaras, não apresentava alterações nos parâmetros clínicos e laboratoriais avaliados. Após vinte e três dias de internação animal veio a óbito, sendo realizada a necropsia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como causa mortis foi diagnosticado um quadro de peritonite e achado necroscópico a presença de urólitos em ambos os rins. No rim esquerdo um urólito com dimensões de aproximadamente 10cmx8cm, e em rim direito pequenos cálculos medindo aproximadamente 3cmx3cm, todos localizados em pelve renal, levando a dilatação da mesma, com área de infarto e aderência a cápsula renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As afecções renais em equinos, mesmo raras são importantes por serem diagnosticadas tardiamente e levarem a insuficiência renal, irreversível, podendo levar à óbito. Esse animal apresentava fatores predisponentes como idade avançada, orquiectomizado e macho, porém, exceto pelo emagrecimento progressivo, nenhum outro sinal clínico compatível com lesão renal.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>FERREIRA, M. A. et al. Urolitíase obstrutiva em equino. (#38)#8239;Acta Scientiae Veterinariae, v. 47, p. 1-5, 2019. Disponível em: <a href="https://repositorio.usp.br/directbitstream/344ddf4-10fa-4c1f-b2ad-22b2e4fdce78/FZEA_002995020.pdf">https://repositorio.usp.br/directbitstream/344ddf4-10fa-4c1f-b2ad-22b2e4fdce78/FZEA_002995020.pdf</a>. Acesso em: 06 out. 2023. MACBETH, B. J. Obstructive urolithiasis, unilateral hydronephrosis, and probable nephrolithiasis in a 12-year old Clydesdale gelding. The Canadian Veterinary Journal, v. 49, n. 3, p. 287, 2008. Disponível em: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249726/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249726/</a> Acesso em: 06 out 2023. DIAZ-ESPINEIRA, M. et al. Structure and composition of equine uroliths. Journal of Equine Veterinary Science, v. 15, n. 1, p. 27-34, 1995. Disponível em: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080607805776">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080607805776</a>. Acesso em: 06 out 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14845	Clínica Veterinária	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075726 - CAROLINA SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	ACHADO NECROSCÓPICO DE URÓLITO RENAL BILATERAL EM EQUINO IDOSO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Urólitos são cálculos formados pelo acúmulo e unificação dos sedimentos urinários, compostos por um ou mais cristaloídes. Podem ser encontrados em qualquer porção do trato urinário dos equinos. Um centro de referência em urolitases relatou a prevalência estimada em 0,11% nessa espécie, sendo destes 12% renais, em mais de 4.400 casos diagnosticados nas diferentes espécies animais. Essa enfermidade acomete em maior proporção equinos machos, castrados, com idade média de dez anos, sem predisposição racial e manejo nutricional inadequado. Um estudo mostra que de 256 urólitos avaliados 95% eram compostos por carbonato de cálcio, 1% de estruvita e 0,8% por oxalato de cálcio e os outros correspondiam menos de 0,5% cada. Equinos com urolitase renal normalmente apresentam insuficiência renal crônica, com isso manifestam sinais clínicos como queda de desempenho, perda de peso e uremia. O diagnóstico se dá a partir da dosagem sérica de uréia e creatinina, urinálise, análise de sedimento urinário e ultrassonografia renal. A urolitase em equinos apresenta um prognóstico reservado. Animais que possuem urólitos renais apresentam pior prognóstico quando comparados com cálculos vesicais e uretrais.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é relatar o achado necroscópico de urólito renal em equino no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET-UNISA).			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um equino, macho, castrado, 38 anos, com histórico de perda de peso progressiva, diminuição de tônus muscular, apetite seletivo e incoordenação há 6 meses. Animal apresentava escore de condição corporal caquético, dificuldade para levantar mantendo-se muito tempo em decúbito com inúmeras escaras, não apresentava alterações nos parâmetros clínicos e laboratoriais avaliados. Após vinte e três dias de internação animal veio a óbito, sendo realizada a necropsia.			
<b>RESULTADOS</b>	Como causa mortis foi diagnosticado um quadro de peritonite e achado necroscópico a presença de urólitos em ambos os rins. No rim esquerdo um urólito com dimensões de aproximadamente 10cmx8cm, e em rim direito pequenos cálculos medindo aproximadamente 3cmx3cm, todos localizados em pelve renal, levando a dilatação da mesma, com área de infarto e aderência a cápsula renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	As afecções renais em equinos, mesmo raras são importantes por serem diagnosticadas tardiamente e levarem a insuficiência renal, irreversível, podendo levar à óbito. Esse animal apresentava fatores predisponentes como idade avançada, orquiectomizado e macho, porém, exceto pelo emagrecimento progressivo, nenhum outro sinal clínico compatível com lesão renal.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>FERREIRA, M. A. et al. Urolitase obstrutiva em equino.(#38)#8239;Acta Scientiae Veterinariae, v. 47, p. 1-5, 2019. Disponível em: <a href="https://repositorio.usp.br/directbitstream/344ddf4-10fa-4c1f-b2ad-22b2e4fdce78/FZEA_002995020.pdf">https://repositorio.usp.br/directbitstream/344ddf4-10fa-4c1f-b2ad-22b2e4fdce78/FZEA_002995020.pdf</a>. Acesso em: 06 out. 2023. MACBETH, B. J. Obstructive urolithiasis, unilateral hydronephrosis, and probable nephrolithiasis in a 12-year old Clydesdale gelding. The Canadian Veterinary Journal, v. 49, n. 3, p. 287, 2008. Disponível em: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249726/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249726/</a> Acesso em: 06 out 2023. DIAZ-ESPIÑEIRA, M. et al. Structure and composition of equine uroliths. Journal of Equine Veterinary Science, v. 15, n. 1, p. 27-34, 1995. Disponível em: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080607805776">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080607805776</a>. Acesso em: 06 out 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14846	Enfermagem Obstétrica	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5167108 - JENIFFER MONTEIRO PORTES DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		GRAZIELLE VIOLA ARRONQUI
<b>TITULO</b>	A importância da mensuração do volume urinário através da ultrassonografia pelo enfermeiro no preparo da transferência embrionária.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A transferência embrionária (TE) é uma técnica de alta complexidade que consiste em inserir um embrião na cavidade uterina seguindo uma série de passos durante o procedimento. 1 Embora tenha sido idealizada como solução para infertilidade de casais heterossexuais, seu uso se difundiu entre pessoas cujas práticas sexuais não geram filhos por motivos não clínicos: mulheres sem companheiro, casais homossexuais masculinos e femininos.3 O resultado favorável da TE é multifatorial.2 A mensuração do volume urinário pode ser feita através de ultrassonografia (USG), sendo considerado um procedimento rápido e não invasivo.7 Exame este, que pode ser realizado por enfermeiro devidamente capacitado.8			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a importância do conhecimento do enfermeiro sobre a ultrassonografia do volume urinário para o procedimento de transferência embrionária.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão integrativa da literatura. Trata-se de uma revisão sistematizada realizada a partir da pergunta "Qual a importância do conhecimento do enfermeiro sobre ultrassonografia do volume urinário para o procedimento de transferência embrionária?" A estratégia utilizada foi a PICOT: P (participantes): Enfermeiros; I (intervenção): Utilização da ultrassonografia para a mensuração do volume urinário na transferência embrionária; C (controle): não utilização da mensuração do volume urinário pelo enfermeiro; O (resultado): ausência da definição da importância do procedimento descrito na literatura; T (tipo de estudo): estudos observacionais. A busca ocorreu nas bases de dados Pubmed, Scileo e LILACS, sem limitação de ano de publicação. Os descritores utilizados foram "embryo transfer" AND "urinary bladder" e "transferência embrionária" AND "volume urinário". As limitações apresentadas na busca foram a escassez de estudos que abordem o tema em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	A busca inicial resultou em 131 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão acima, foram selecionados 31 artigos para leitura de resumos. Foram excluídos os duplicados e que não apresentavam relação com o tema. Para esta revisão foram analisados 07 artigos. Estudos demonstram que ajustar a angulação uterina através da bexiga repleta pode facilitar a passagem do cateter de TE e consequentemente deixar o procedimento menos traumático para o endométrio.4,5,9 Entretanto, em estudo retrospectivo de coorte, descreve que a bexiga distendida durante a TE pode estar associada ao aumento do risco de gravidez ectópica, requerendo mais estudos sobre o tema.6			
<b>CONCLUSOES</b>	O profissional enfermeiro que atua em clínica de RA é responsável por todo o preparo da paciente para o procedimento de TE. A mensuração do volume urinário proporciona maior conforto para a paciente, evita a distensão da bexiga, proporciona posição uterina adequada, facilitando a TE para o profissional médico.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO HUMANA. Tratado de Reprodução Assistida, São Paulo, SP, 2011. 2. LORUSSO, F. et al. Outcome of in vitro fertilization after transabdominal ultrasound-assisted embryo transfer with a full or empty bladder. Fertility and Sterility, v. 84, n. 4, p. 1046-1048, 1 out. 2005. 3. LUNA, N. Regulação das técnicas de reprodução assistida nas resoluções do Conselho Federal de Medicina: da liberalização gradativa à virada pró-vida. Revista de Antropologia, v. 66, p. e198211, 9 out. 2023. 4. MANSOUR, R. T. Optimizing the embryo transfer technique. Human Reproduction, v. 17, n. 5, p. 1149-1153, 1 maio 2002. 5. ABOU-SETTA, A. M. Effect of passive uterine straightening during embryo transfer: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, v. 86, n. 5, p. 516-522, jan. 2007. 6. CHENG, L.-Y. et al. Ectopic pregnancy following in vitro fertilization with embryo transfer: A single-center experience during 15 years. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, v. 54, n. 5, p. 541-545, out. 2015. 7. LOPES, K. R.; NICOLUSSI, A. C. Vantagens da ultrassonografia de bexiga na mensuração do volume urinário em pacientes críticos: revisão integrativa [Advantages of bladder ultrasound in measuring urine volume in critically ill patients: an integrative review] [Ventajas de la ecografía vesical en la medición del volumen urinario en pacientes críticos: revisión integradora]. Revista Enfermagem UERJ, v. 29, n. 1, p. e61972, 20 dez. 2021. 8. RESOLUÇÃO COFEN No 679/2021. Disponível em: (#60)https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-679-2021/#62. Acesso em: 18 out. 2023. 9. PAULA, A.; MARTINS, M.; DE JANEIRO, R. Fundação Oswaldo Cruz Instituto Fernandes Figueira Pós- Graduação em Saúde da Criança e da Mulher O PAPEL DA TÉCNICA DE TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA NO RESULTADO DOS CICLOS DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. [s.l: s.n.]. Disponível em: (#60)https://bvssp.icict.fiocruz.br/pdf/MartinsAnaPaulaMachado.pdf(#62).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14847	Ciências Humanas	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1416456 - RODRIGO TAVARES DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Alzira Lobo de Arruda Campos		
<b>TITULO</b>	NATUREZA COMO RECURSO BRINCANTE NO UNIVERSO INFANTIL: CONCEPÇÕES E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Na educação infantil paulistana o brincar da criança apresenta-se como um dos eixos primordiais no que concerne ao desenvolvimento das crianças, tendo em vista uma educação inclusiva, integral e equânime. No presente trabalho, inserido na linha de pesquisa Sociedade, Comunicação e Linguagem, procura-se entender o significado da experiência do brincar na natureza - e com o que dela provém. Como problema de pesquisa indagamos como os documentos oficiais, como Currículo da Cidade (2019) e Indicadores de Qualidade na Educação Infantil Paulistana (2016) reproduzem as concepções sobre a natureza e sobre o brincar da criança diante de uma sociedade de consumo. A hipótese é de que as sensibilidades e desafios trazidos pelas percepções sobre a natureza apresentam-se nesta documentação, de modo a fundamentar a natureza como recurso potencial brincante e sustentável.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo geral desta pesquisa é investigar nos documentos supracitados a presença e relação entre o brincar das crianças, a natureza e a sustentabilidade na educação infantil paulistana; já os objetivos específicos consistem em: I - identificar, a partir da investigação analítica dos documentos mencionados, como se apresentam as concepções sobre o brincar; II - desenvolver um diálogo interdisciplinar com o Currículo da Cidade: Educação Infantil, elencando abordagens de natureza e sensibilidade e considerando o conceito de sustentabilidade; III - contextualizar práticas pedagógicas envolvendo a temática da natureza na proposta de educação integral do município de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia desta pesquisa é análise documental.			
<b>RESULTADOS</b>	Os documentos enfatizam a importância da educação integral, do brincar e da relação dialógica entre tempos, espaços, materialidades, interações e narrativas, em consonância com o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento sustentável. O arcabouço teórico da pesquisa contemplou autores como Horn e Barbosa (2022); Gilles Brougère (2010); Gandhi Piorski (2016); e Paulo Freire (2023).			
<b>CONCLUSÕES</b>	A pesquisa aborda a importância do brincar na concepção de experiência e integração com a natureza; os documentos analisados, na perspectiva da educação integral, reconhecem a importância deste tema, apontando, também, a relação da instituição, como um todo, no que concerne à Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS); considera-se, também, a importância da formação continuada dos profissionais da educação, no sentido de conscientização e potencialização das práticas.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Parcial BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e Cultura. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2010. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários para a prática educativa. 75ed. São Paulo: Paz e Terra, 2023. FRIEDMANN, Adriana. O Brincar na Educação Infantil: Observação, Adequação e Inclusão. 1.ed. São Paulo: Moderna, 2012. HORN, Maria da Graça Souza; BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Abrindo as portas da escola infantil: Viver e aprender nos espaços externos. Porto Alegre: Penso, 2022. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 12 ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2007, PIORSKI, Gandhi. Brinquedos do chão: a natureza, o imaginário e o brincar. São Paulo: Peirópolis, 2016. SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da cidade: Educação Infantil. São Paulo: SME/COPED, 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, São Paulo (SP). Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana. São Paulo: SME/DOT, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14848	Enfermagem Obstétrica	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5025176 - HELEN PATRICIA DE CAMARGO KANHOUCHE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		GRAZIELLE VIOLA ARRONQUI
<b>TITULO</b>	REPRODUÇÃO ASSISTIDA: PAPEL DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A reprodução humana assistida (RHA) é um conjunto de técnicas, procedimentos e intervenções biotecnológicas sobre o processo reprodutivo humano.<sup>1</sup> Desde o primeiro nascimento por técnica de reprodução assistida (RA) em 1978 na Inglaterra, a comunidade científica médica vem dividindo conhecimento em busca de evolução. No Brasil, este marco se deu em 1984, Nakamura e cols. tiveram o primeiro caso de sucesso, o nascimento de uma bebê vinda de RA.2 Estudos relatam que com o início da RHA nos anos setenta, teve também início a demanda por intervenções de enfermagem. Em alguns serviços de RA observa-se a atuação de enfermeiras obstetras, mas que não há preparo formal das mesmas para este fim.11 Nos últimos anos, o número de Centros de Reprodução Humana Assistida (CRHA) vem crescendo. Atualmente, no Brasil existem 193 CRHAs<sup>3</sup>, o que demonstra um campo crescente e promissor no mercado de trabalho para a enfermagem.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar o papel da enfermagem obstétrica na Reprodução Humana Assistida.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de uma revisão integrativa realizada a partir da pergunta "Qual o papel da enfermagem obstétrica na Reprodução Humana Assistida?". A estratégia utilizada foi a PICO: P (participantes): enfermagem obstétrica; I (intervenção): aprimoramento no conteúdo em reprodução humana assistida; C (controle): relevância sobre o tema; e O (resultado): ausência da definição da importância do conteúdo descrito na literatura. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs, Scielo, no período de 2013 a 2023, por meio dos descritores relacionados Reprodução Assistida e Enfermagem Obstétrica. As limitações apresentadas na busca foram a escassez de estudos que abordem o tema em questão. A partir dos descritores foram encontrados 32 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos originais disponíveis na íntegra em inglês, português e espanhol. Cada artigo foi avaliado por dois revisores. Após a extração de dados houve a exclusão inicial de 11 artigos, pois não se enquadravam no objetivo ou eram duplicados. Em segunda análise foi realizada a leitura na íntegra de 21 artigos e selecionados 10 que se aplicam ao tema e objetivo do estudo em questão.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Estudo integrativo da literatura descreve que a enfermagem é de suma importância na RHA. O enfermeiro é o profissional que passa mais tempo com o casal/indivíduo tentante neste processo.10 Estudos internacionais 4,5,6,7,8,9 corroboram a importância dos cuidados de enfermagem frente a pacientes em uso de técnicas de RA. Estudos indicam que o enfermeiro obstetra desempenha funções na assistência em RA enfrentam a ausência de cursos acadêmicos específicos para sua área de atuação.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Considerando que as melhores práticas se fundamentam na ciência, é imprescindível o acesso a informações de alta qualidade para impulsionar o crescimento profissional do enfermeiro obstetra, assegurando assim, o fornecimento de cuidados de excelência e assistência completa nesse ambiente tecnológico.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. QUEIROZ, A. B. A. et al. Nursing work in assisted human reproduction: between technology and humanization. Rev. bras. enferm, p. e20170919-e20170919, 2020. 2. QUEIROZ, A. B. A. et al. Social representation of reproductive biotechnologies among nurses working in sexual and reproductive health. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, 9 abr. 2021. 3. SisEmbrio. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acesoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/sisembrio/#62. 4. VELEZ, M. P. et al. Care plans for women pregnant using assisted reproductive technologies: a systematic review. Reprod Health, p. 9-9, 2019. 5. ISBIR, G. G.; OZAN, Y. D. Nursing and midwifery students' experiences with the course of infertility and assisted reproductive techniques: A focus group study from Turkey. Nurse Educ Pract, p. 235-241, 2018. 6. LI, X.-Q.; SUN, C.-F.; GUO, M. Benefits of nursing care service in the assisted reproduction clinic to self-cycle management and self-efficiency of infertility patients. National Journal of Andrology, p. 536-539, 2017. 7. JUNG, Y.-J.; KIM, H.-Y. Factors Influencing Infertility- related Quality of Life in Women Undergoing Assisted Reproductive Techniques: Focusing on Depression and Resilience. Korean Journal of Women Health Nursing, p. 117-125, 2017. 8. LI, W. et al. Factores determinantes del éxito en la carrera de enfermeras actuantes en tecnología de reproducción asistida. Rev. latinoam. enferm. (Online), p. e3926-e3926, 2023. 9. LU, W. et al. Progress of psychological status and targeted nursing intervention in assisted reproductive technology assisted pregnancy population in female athlete patients. Rev. int. med. cienc. act. fis. deporte, p. 412-424, 2023. 10. BARROS, S. M. O. DE. A enfermagem e a reprodução humana. Acta Paul Enferm., v. 13, n. special issue 1, p. 207-213, 1 dez. 2000. 11. VALADARES, R. R. F.; ALVES, L. A. M. T.; BEZERRA, M. L. R. A enfermagem no contexto da reprodução assistida: uma revisão integrativa da literatura. Research, Society and Development, v. 10, n. 15, p. e137101522801, 21 nov. 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14848	Enfermagem Obstétrica	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5115582 - LUCIANA DA CONCEIÇÃO MELO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		GRAZIELLE VIOLA ARRONQUI
<b>TITULO</b>	REPRODUÇÃO ASSISTIDA: PAPEL DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A reprodução humana assistida (RHA) é um conjunto de técnicas, procedimentos e intervenções biotecnológicas sobre o processo reprodutivo humano.<sup>1</sup> Desde o primeiro nascimento por técnica de reprodução assistida (RA) em 1978 na Inglaterra, a comunidade científica médica vem dividindo conhecimento em busca de evolução. No Brasil, este marco se deu em 1984, Nakamura e cols. tiveram o primeiro caso de sucesso, o nascimento de uma bebê vinda de RA.<sup>2</sup> Estudos relatam que com o início da RHA nos anos setenta, teve também início a demanda por intervenções de enfermagem. Em alguns serviços de RA observa-se a atuação de enfermeiras obstetras, mas que não há preparo formal das mesmas para este fim.<sup>11</sup> Nos últimos anos, o número de Centros de Reprodução Humana Assistida (CRHA) vem crescendo. Atualmente, no Brasil existem 193 CRHAs<sup>9</sup>, o que demonstra um campo crescente e promissor no mercado de trabalho para a enfermagem.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar o papel da enfermagem obstétrica na Reprodução Humana Assistida.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de uma revisão integrativa realizada a partir da pergunta "Qual o papel da enfermagem obstétrica na Reprodução Humana Assistida?". A estratégia utilizada foi a PICO: P (participantes): enfermagem obstétrica; I (intervenção): aprimoramento no conteúdo em reprodução humana assistida; C (controle): relevância sobre o tema; e O (resultado): ausência da definição da importância do conteúdo descrito na literatura. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs, Scielo, no período de 2013 a 2023, por meio dos descritores relacionados Reprodução Assistida e Enfermagem Obstétrica. As limitações apresentadas na busca foram a escassez de estudos que abordem o tema em questão. A partir dos descritores foram encontrados 32 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos originais disponíveis na íntegra em inglês, português e espanhol. Cada artigo foi avaliado por dois revisores. Após a extração de dados houve a exclusão inicial de 11 artigos, pois não se enquadravam no objetivo ou eram duplicados. Em segunda análise foi realizada a leitura na íntegra de 21 artigos e selecionados 10 que se aplicam ao tema e objetivo do estudo em questão.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Estudo integrativo da literatura descreve que a enfermagem é de suma importância na RHA. O enfermeiro é o profissional que passa mais tempo com o casal/indivíduo tentante neste processo.<sup>10</sup> Estudos internacionais 4,5,6,7,8,9 corroboram a importância dos cuidados de enfermagem frente a pacientes em uso de técnicas de RA. Estudos indicam que o enfermeiro obstetra desempenha funções na assistência em RA enfrentam a ausência de cursos acadêmicos específicos para sua área de atuação.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Considerando que as melhores práticas se fundamentam na ciência, é imprescindível o acesso a informações de alta qualidade para impulsionar o crescimento profissional do enfermeiro obstetra, assegurando assim, o fornecimento de cuidados de excelência e assistência completa nesse ambiente tecnológico.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. QUEIROZ, A. B. A. et al. Nursing work in assisted human reproduction: between technology and humanization. Rev. bras. enferm, p. e20170919-e20170919, 2020. 2. QUEIROZ, A. B. A. et al. Social representation of reproductive biotechnologies among nurses working in sexual and reproductive health. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, 9 abr. 2021. 3. SisEmbrio. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoinformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/sisembrio/#62. 4. VELEZ, M. P. et al. Care plans for women pregnant using assisted reproductive technologies: a systematic review. Reprod Health, p. 9-9, 2019. 5. ISBIR, G. G.; OZAN, Y. D. Nursing and midwifery students' experiences with the course of infertility and assisted reproductive techniques: A focus group study from Turkey. Nurse Educ Pract, p. 235-241, 2018. 6. LI, X.-Q.; SUN, C.-F.; GUO, M. Benefits of nursing care service in the assisted reproduction clinic to self-cycle management and self-efficiency of infertility patients. National Journal of Andrology, p. 536-539, 2017. 7. JUNG, Y.-J.; KIM, H.-Y. Factors Influencing Infertility-related Quality of Life in Women Undergoing Assisted Reproductive Techniques: Focusing on Depression and Resilience. Korean Journal of Women Health Nursing, p. 117-125, 2017. 8. LI, W. et al. Factores determinantes del éxito en la carrera de enfermeras actuantes en tecnología de reproducción asistida. Rev. latinoam. enferm. (Online), p. e3926-e3926, 2023. 9. LU, W. et al. Progress of psychological status and targeted nursing intervention in assisted reproductive technology assisted pregnancy population in female athlete patients. Rev. int. med. cienc. act. fis. deporte, p. 412-424, 2023. 10. BARROS, S. M. O. DE. A enfermagem e a reprodução humana. Acta Paul Enferm., v. 13, n. special issue 1, p. 207-213, 1 dez. 2000. 11. VALADARES, R. R. F.; ALVES, L. A. M. T.; BEZERRA, M. L. R. A enfermagem no contexto da reprodução assistida: uma revisão integrativa da literatura. Research, Society and Development, v. 10, n. 15, p. e137101522801, 21 nov. 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14848	Enfermagem Obstétrica	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5167108 - JENIFFER MONTEIRO PORTES DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		GRAZIELLE VIOLA ARRONQUI
<b>TITULO</b>	REPRODUÇÃO ASSISTIDA: PAPEL DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A reprodução humana assistida (RHA) é um conjunto de técnicas, procedimentos e intervenções biotecnológicas sobre o processo reprodutivo humano.<sup>1</sup> Desde o primeiro nascimento por técnica de reprodução assistida (RA) em 1978 na Inglaterra, a comunidade científica médica vem dividindo conhecimento em busca de evolução. No Brasil, este marco se deu em 1984, Nakamura e cols. tiveram o primeiro caso de sucesso, o nascimento de uma bebê vinda de RA.2 Estudos relatam que com o início da RHA nos anos setenta, teve também início a demanda por intervenções de enfermagem. Em alguns serviços de RA observa-se a atuação de enfermeiras obstetras, mas que não há preparo formal das mesmas para este fim.11 Nos últimos anos, o número de Centros de Reprodução Humana Assistida (CRHA) vem crescendo. Atualmente, no Brasil existem 193 CRHAs<sup>3</sup>, o que demonstra um campo crescente e promissor no mercado de trabalho para a enfermagem.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar o papel da enfermagem obstétrica na Reprodução Humana Assistida.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de uma revisão integrativa realizada a partir da pergunta "Qual o papel da enfermagem obstétrica na Reprodução Humana Assistida?". A estratégia utilizada foi a PICO: P (participantes): enfermagem obstétrica; I (intervenção): aprimoramento no conteúdo em reprodução humana assistida; C (controle): relevância sobre o tema; e O (resultado): ausência da definição da importância do conteúdo descrito na literatura. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs, Scielo, no período de 2013 a 2023, por meio dos descritores relacionados Reprodução Assistida e Enfermagem Obstétrica. As limitações apresentadas na busca foram a escassez de estudos que abordem o tema em questão. A partir dos descritores foram encontrados 32 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos originais disponíveis na íntegra em inglês, português e espanhol. Cada artigo foi avaliado por dois revisores. Após a extração de dados houve a exclusão inicial de 11 artigos, pois não se enquadravam no objetivo ou eram duplicados. Em segunda análise foi realizada a leitura na íntegra de 21 artigos e selecionados 10 que se aplicam ao tema e objetivo do estudo em questão.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Estudo integrativo da literatura descreve que a enfermagem é de suma importância na RHA. O enfermeiro é o profissional que passa mais tempo com o casal/indivíduo tentante neste processo.10 Estudos internacionais 4,5,6,7,8,9 corroboram a importância dos cuidados de enfermagem frente a pacientes em uso de técnicas de RA. Estudos indicam que o enfermeiro obstetra desempenha funções na assistência em RA enfrentam a ausência de cursos acadêmicos específicos para sua área de atuação.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Considerando que as melhores práticas se fundamentam na ciência, é imprescindível o acesso a informações de alta qualidade para impulsionar o crescimento profissional do enfermeiro obstetra, assegurando assim, o fornecimento de cuidados de excelência e assistência completa nesse ambiente tecnológico.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. QUEIROZ, A. B. A. et al. Nursing work in assisted human reproduction: between technology and humanization. Rev. bras. enferm, p. e20170919-e20170919, 2020. 2. QUEIROZ, A. B. A. et al. Social representation of reproductive biotechnologies among nurses working in sexual and reproductive health. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, 9 abr. 2021. 3. SisEmbrio. Disponível em: (#60)<a href="https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoinformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/sisembrio/#62">https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoinformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/sisembrio/#62</a>. 4. VELEZ, M. P. et al. Care plans for women pregnant using assisted reproductive technologies: a systematic review. Reprod Health, p. 9-9, 2019. 5. ISBIR, G. G.; OZAN, Y. D. Nursing and midwifery students' experiences with the course of infertility and assisted reproductive techniques: A focus group study from Turkey. Nurse Educ Pract, p. 235-241, 2018. 6. LI, X.-Q.; SUN, C.-F.; GUO, M. Benefits of nursing care service in the assisted reproduction clinic to self-cycle management and self-efficiency of infertility patients. National Journal of Andrology, p. 536-539, 2017. 7. JUNG, Y.-J.; KIM, H.-Y. Factors Influencing Infertility- related Quality of Life in Women Undergoing Assisted Reproductive Techniques: Focusing on Depression and Resilience. Korean Journal of Women Health Nursing, p. 117-125, 2017. 8. LI, W. et al. Factores determinantes del éxito en la carrera de enfermeras actuantes en tecnología de reproducción asistida. Rev. latinoam. enferm. (Online), p. e3926-e3926, 2023. 9. LU, W. et al. Progress of psychological status and targeted nursing intervention in assisted reproductive technology assisted pregnancy population in female athlete patients. Rev. int. med. cienc. act. fis. deporte, p. 412-424, 2023. 10. BARROS, S. M. O. DE. A enfermagem e a reprodução humana. Acta Paul Enferm., v. 13, n. special issue 1, p. 207-213, 1 dez. 2000. 11. VALADARES, R. R. F.; ALVES, L. A. M. T.; BEZERRA, M. L. R. A enfermagem no contexto da reprodução assistida: uma revisão integrativa da literatura. Research, Society and Development, v. 10, n. 15, p. e137101522801, 21 nov. 2021.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14849	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4211103 - AMANDA MACIEL LEAL DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Evidências Recentes Sobre o Tratamento e Profilaxia em Infecções do Trato Urinário de Repetição			
<b>INTRODUCA O</b>	As infecções do trato urinário (ITU) são afecções de importante relevância não apenas na cidade de São Paulo, como também em todo o Brasil e no mundo. Por ser tão prevalente, é necessário atentar-se a atualizações que possam melhorar a conduta do médico em relação à essa doença, principalmente em pacientes com infecções recorrentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo objetiva o levantamento da literatura recente acerca de infecções do trato urinário recorrentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados artigos da base de dados PUBMED, com as especificidades "Free full text", dos anos 2020 a 2023, "Systematic Review" e na barra de pesquisa "(Urinary Tract Infections) AND (Recurrence)" resultand 21 artigos. Foram excluídos 8 artigos que não estavam de acordo com o objetivo do estudo.			
<b>RESULTADO S</b>	A profilaxia com antibióticos e remoção de cálculos renais são condutas já bem estabelecidas na literatura e os estudos contemplados nessa revisão continuam corroborando a favor de seus benefícios. Com menores estudos e piores estudos, menos confiantes, novas abordagens são buscadas. São os casos da D-manose e o Cranberry. Ambos tiveram resultados conflitantes na literatura, provavelmente pela baixa qualidade dos desenhos dos estudos realizados, como foi advogado pelos autores das revisões. No entanto, não foi encontrado malefício em relação ao seu uso. Assim, mesmo que sua efetividade ainda esteja em questionamento, sua segurança parece estar cada vez mais bem estabelecida. Novos métodos, como o de inoculação competitiva em que se promove competição entre as bactérias patogênicas versus inócuas parece ser eficaz, no entanto, ainda com uso muito restrito. Nesse aspecto de manipulação da flora bacteriana, o uso de probióticos não foi capaz de reduzir ITU.			
<b>CONCLUSOES</b>	Novas moléculas e abordagens podem auxiliar na redução da recorrência de ITU, assim como protocolos assertivos de profilaxia com o uso de antibiótico. Portanto, melhores diretrizes e estudos sobre o tema poderiam resultar em impactos na prática clínica.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABDULLATIF,VictorA;SUR,RogerL;ESHAGHIAN,Eli;etal.EfficacyofProbioticsas Prophylaxis for Urinary Tract Infections in Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus, 2021. ANNA MAE SCOTT; CLARK, Justin; CHRIS DEL MAR; et al. Increased fluid intake to prevent urinary tract infections: systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, v. 70, n. 692, p. e200–e207, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14849	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4312902 - AMANDA LETICIA SILVA LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Evidências Recentes Sobre o Tratamento e Profilaxia em Infecções do Trato Urinário de Repetição			
<b>INTRODUCA O</b>	As infecções do trato urinário (ITU) são afecções de importante relevância não apenas na cidade de São Paulo, como também em todo o Brasil e no mundo. Por ser tão prevalente, é necessário atentar-se a atualizações que possam melhorar a conduta do médico em relação à essa doença, principalmente em pacientes com infecções recorrentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo objetiva o levantamento da literatura recente acerca de infecções do trato urinário recorrentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados artigos da base de dados PUBMED, com as especificidades "Free full text", dos anos 2020 a 2023, "Systematic Review" e na barra de pesquisa "(Urinary Tract Infections) AND (Recurrence)" resultand 21 artigos. Foram excluídos 8 artigos que não estavam de acordo com o objetivo do estudo.			
<b>RESULTADO S</b>	A profilaxia com antibióticos e remoção de cálculos renais são condutas já bem estabelecidas na literatura e os estudos contemplados nessa revisão continuam corroborando a favor de seus benefícios. Com menores estudos e piores estudos, menos confiáveis, novas abordagens são buscadas. São os casos da D-manose e o Cranberry. Ambos tiveram resultados conflitantes na literatura, provavelmente pela baixa qualidade dos desenhos dos estudos realizados, como foi advogado pelos autores das revisões. No entanto, não foi encontrado malefício em relação ao seu uso. Assim, mesmo que sua efetividade ainda esteja em questionamento, sua segurança parece estar cada vez mais bem estabelecida. Novos métodos, como o de inoculação competitiva em que se promove competição entre as bactérias patogênicas versus inócuas parece ser eficaz, no entanto, ainda com uso muito restrito. Nesse aspecto de manipulação da flora bacteriana, o uso de probióticos não foi capaz de reduzir ITU.			
<b>CONCLUSOES</b>	Novas moléculas e abordagens podem auxiliar na redução da recorrência de ITU, assim como protocolos assertivos de profilaxia com o uso de antibiótico. Portanto, melhores diretrizes e estudos sobre o tema poderiam resultar em impactos na prática clínica.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABDULLATIF,VictorA;SUR,RogerL;ESHAGHIAN,Eli;etal.EfficacyofProbioticsas Prophylaxis for Urinary Tract Infections in Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus, 2021. ANNA MAE SCOTT; CLARK, Justin; CHRIS DEL MAR; et al. Increased fluid intake to prevent urinary tract infections: systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, v. 70, n. 692, p. e200–e207, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14849	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4314263 - LUCCAS SANTOS BENETON	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Evidências Recentes Sobre o Tratamento e Profilaxia em Infecções do Trato Urinário de Repetição			
<b>INTRODUCAO</b>	As infecções do trato urinário (ITU) são afecções de importante relevância não apenas na cidade de São Paulo, como também em todo o Brasil e no mundo. Por ser tão prevalente, é necessário atentar-se a atualizações que possam melhorar a conduta do médico em relação à essa doença, principalmente em pacientes com infecções recorrentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo objetiva o levantamento da literatura recente acerca de infecções do trato urinário recorrentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados artigos da base de dados PUBMED, com as especificidades "Free full text", dos anos 2020 a 2023, "Systematic Review" e na barra de pesquisa "(Urinary Tract Infections) AND (Recurrence)" resultand 21 artigos. Foram excluídos 8 artigos que não estavam de acordo com o objetivo do estudo.			
<b>RESULTADOS</b>	A profilaxia com antibióticos e remoção de cálculos renais são condutas já bem estabelecidas na literatura e os estudos contemplados nessa revisão continuam corroborando a favor de seus benefícios. Com menores estudos e piores estudos, menos confiáveis, novas abordagens são buscadas. São os casos da D-manose e o Cranberry. Ambos tiveram resultados conflitantes na literatura, provavelmente pela baixa qualidade dos desenhos dos estudos realizados, como foi advogado pelos autores das revisões. No entanto, não foi encontrado malefício em relação ao seu uso. Assim, mesmo que sua efetividade ainda esteja em questionamento, sua segurança parece estar cada vez mais bem estabelecida. Novos métodos, como o de inoculação competitiva em que se promove competição entre as bactérias patogênicas versus inócuas parece ser eficaz, no entanto, ainda com uso muito restrito. Nesse aspecto de manipulação da flora bacteriana, o uso de probióticos não foi capaz de reduzir ITU.			
<b>CONCLUSOES</b>	Novas moléculas e abordagens podem auxiliar na redução da recorrência de ITU, assim como protocolos assertivos de profilaxia com o uso de antibiótico. Portanto, melhores diretrizes e estudos sobre o tema poderiam resultar em impactos na prática clínica.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABDULLATIF,VictorA;SUR,RogerL;ESHAGHIAN,Eli;etal.EfficacyofProbioticsas Prophylaxis for Urinary Tract Infections in Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus, 2021. ANNA MAE SCOTT; CLARK, Justin; CHRIS DEL MAR; et al. Increased fluid intake to prevent urinary tract infections: systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, v. 70, n. 692, p. e200–e207, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14849	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4316983 - IAGO DELGALLO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Evidências Recentes Sobre o Tratamento e Profilaxia em Infecções do Trato Urinário de Repetição			
<b>INTRODUCA O</b>	As infecções do trato urinário (ITU) são afecções de importante relevância não apenas na cidade de São Paulo, como também em todo o Brasil e no mundo. Por ser tão prevalente, é necessário atentar-se a atualizações que possam melhorar a conduta do médico em relação à essa doença, principalmente em pacientes com infecções recorrentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo objetiva o levantamento da literatura recente acerca de infecções do trato urinário recorrentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados artigos da base de dados PUBMED, com as especificidades "Free full text", dos anos 2020 a 2023, "Systematic Review" e na barra de pesquisa "(Urinary Tract Infections) AND (Recurrence)" resultand 21 artigos. Foram excluídos 8 artigos que não estavam de acordo com o objetivo do estudo.			
<b>RESULTADO S</b>	A profilaxia com antibióticos e remoção de cálculos renais são condutas já bem estabelecidas na literatura e os estudos contemplados nessa revisão continuam corroborando a favor de seus benefícios. Com menores estudos e piores estudos, menos confiáveis, novas abordagens são buscadas. São os casos da D-manose e o Cranberry. Ambos tiveram resultados conflitantes na literatura, provavelmente pela baixa qualidade dos desenhos dos estudos realizados, como foi advogado pelos autores das revisões. No entanto, não foi encontrado malefício em relação ao seu uso. Assim, mesmo que sua efetividade ainda esteja em questionamento, sua segurança parece estar cada vez mais bem estabelecida. Novos métodos, como o de inoculação competitiva em que se promove competição entre as bactérias patogênicas versus inócuas parece ser eficaz, no entanto, ainda com uso muito restrito. Nesse aspecto de manipulação da flora bacteriana, o uso de probióticos não foi capaz de reduzir ITU.			
<b>CONCLUSOES</b>	Novas moléculas e abordagens podem auxiliar na redução da recorrência de ITU, assim como protocolos assertivos de profilaxia com o uso de antibiótico. Portanto, melhores diretrizes e estudos sobre o tema poderiam resultar em impactos na prática clínica.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABDULLATIF,VictorA;SUR,RogerL;ESHAGHIAN,Eli;etal.EfficacyofProbioticsas Prophylaxis for Urinary Tract Infections in Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus, 2021. ANNA MAE SCOTT; CLARK, Justin; CHRIS DEL MAR; et al. Increased fluid intake to prevent urinary tract infections: systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, v. 70, n. 692, p. e200–e207, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14849	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317351 - PEDRO MARCOS PIVETTA DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Evidências Recentes Sobre o Tratamento e Profilaxia em Infecções do Trato Urinário de Repetição			
<b>INTRODUCA O</b>	As infecções do trato urinário (ITU) são afecções de importante relevância não apenas na cidade de São Paulo, como também em todo o Brasil e no mundo. Por ser tão prevalente, é necessário atentar-se a atualizações que possam melhorar a conduta do médico em relação à essa doença, principalmente em pacientes com infecções recorrentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo objetiva o levantamento da literatura recente acerca de infecções do trato urinário recorrentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados artigos da base de dados PUBMED, com as especificidades "Free full text", dos anos 2020 a 2023, "Systematic Review" e na barra de pesquisa "(Urinary Tract Infections) AND (Recurrence)" resultand 21 artigos. Foram excluídos 8 artigos que não estavam de acordo com o objetivo do estudo.			
<b>RESULTADO S</b>	A profilaxia com antibióticos e remoção de cálculos renais são condutas já bem estabelecidas na literatura e os estudos contemplados nessa revisão continuam corroborando a favor de seus benefícios. Com menores estudos e piores estudos, menos confiantes, novas abordagens são buscadas. São os casos da D-manose e o Cranberry. Ambos tiveram resultados conflitantes na literatura, provavelmente pela baixa qualidade dos desenhos dos estudos realizados, como foi advogado pelos autores das revisões. No entanto, não foi encontrado malefício em relação ao seu uso. Assim, mesmo que sua efetividade ainda esteja em questionamento, sua segurança parece estar cada vez mais bem estabelecida. Novos métodos, como o de inoculação competitiva em que se promove competição entre as bactérias patogênicas versus inócuas parece ser eficaz, no entanto, ainda com uso muito restrito. Nesse aspecto de manipulação da flora bacteriana, o uso de probióticos não foi capaz de reduzir ITU.			
<b>CONCLUSOES</b>	Novas moléculas e abordagens podem auxiliar na redução da recorrência de ITU, assim como protocolos assertivos de profilaxia com o uso de antibiótico. Portanto, melhores diretrizes e estudos sobre o tema poderiam resultar em impactos na prática clínica.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABDULLATIF,VictorA;SUR,RogerL;ESHAGHIAN,Eli;etal.EfficacyofProbioticsas Prophylaxis for Urinary Tract Infections in Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus, 2021. ANNA MAE SCOTT; CLARK, Justin; CHRIS DEL MAR; et al. Increased fluid intake to prevent urinary tract infections: systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, v. 70, n. 692, p. e200–e207, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14849	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317823 - FERNANDA AMORIM GARCIA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	Evidências Recentes Sobre o Tratamento e Profilaxia em Infecções do Trato Urinário de Repetição			
<b>INTRODUCAO</b>	As infecções do trato urinário (ITU) são afecções de importante relevância não apenas na cidade de São Paulo, como também em todo o Brasil e no mundo. Por ser tão prevalente, é necessário atentar-se a atualizações que possam melhorar a conduta do médico em relação à essa doença, principalmente em pacientes com infecções recorrentes.			
<b>OBJETIVOS</b>	O presente estudo objetiva o levantamento da literatura recente acerca de infecções do trato urinário recorrentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram selecionados artigos da base de dados PUBMED, com as especificidades "Free full text", dos anos 2020 a 2023, "Systematic Review" e na barra de pesquisa "(Urinary Tract Infections) AND (Recurrence)" resultand 21 artigos. Foram excluídos 8 artigos que não estavam de acordo com o objetivo do estudo.			
<b>RESULTADOS</b>	A profilaxia com antibióticos e remoção de cálculos renais são condutas já bem estabelecidas na literatura e os estudos contemplados nessa revisão continuam corroborando a favor de seus benefícios. Com menores estudos e piores estudos, menos confiáveis, novas abordagens são buscadas. São os casos da D-manose e o Cranberry. Ambos tiveram resultados conflitantes na literatura, provavelmente pela baixa qualidade dos desenhos dos estudos realizados, como foi advogado pelos autores das revisões. No entanto, não foi encontrado malefício em relação ao seu uso. Assim, mesmo que sua efetividade ainda esteja em questionamento, sua segurança parece estar cada vez mais bem estabelecida. Novos métodos, como o de inoculação competitiva em que se promove competição entre as bactérias patogênicas versus inócuas parece ser eficaz, no entanto, ainda com uso muito restrito. Nesse aspecto de manipulação da flora bacteriana, o uso de probióticos não foi capaz de reduzir ITU.			
<b>CONCLUSOES</b>	Novas moléculas e abordagens podem auxiliar na redução da recorrência de ITU, assim como protocolos assertivos de profilaxia com o uso de antibiótico. Portanto, melhores diretrizes e estudos sobre o tema poderiam resultar em impactos na prática clínica.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABDULLATIF,VictorA;SUR,RogerL;ESHAGHIAN,Eli;etal.EfficacyofProbioticsas Prophylaxis for Urinary Tract Infections in Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cureus, 2021. ANNA MAE SCOTT; CLARK, Justin; CHRIS DEL MAR; et al. Increased fluid intake to prevent urinary tract infections: systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, v. 70, n. 692, p. e200–e207, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14850	Arquitetura e Urbanismo	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4625617 - GISELLE APARECIDA PIRAGIS ZOGAIB	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Elaine Alcantara Freitas Peixoto		
<b>TITULO</b>	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO E A FUNCIONALIDADE NO REUSO DE PATRIMÔNIOS ARQUITETÔNICOS: UM ESTUDO PRELIMINAR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Este estudo apresenta o resultado do Projeto de Iniciação Científica realizado com o apoio da UNISA, em 2022, sobre a revisão bibliográfica que buscou compreender: até que ponto a restauração de monumentos históricos arquitetônicos suportam transformações culturais e tecnológicas mantendo a identidade original e a linguagem arquitetônica? Partiu-se da hipótese de que talvez os teóricos da restauração não dessem relevante atenção às possíveis distorções na identidade original e na linguagem arquitetônica causadas pelas técnicas por eles indicadas em restaurações de monumentos arquitetônicos destinados ao reuso com nova funcionalidade.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar o modo como os teóricos da restauração se ocuparam destas questões e como se certificaram de que não ocorressem distorções em consequência das técnicas por eles indicadas, fosse como monumento isolado ou como parte de um conjunto.			
<b>METODOLOGIA</b>	O método comparativo e descritivo guiou esta avaliação sobre semelhanças e diferenças entre os teóricos da restauração: Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, John Ruskin, Camillo Boito, Alois Riegl e Cesare Brandi (1906-1988), partindo de Alois Riegl a orientação teórica para esta revisão bibliográfica.			
<b>RESULTADOS</b>	Esta pesquisa mostrou que os teóricos não ignoram o reuso do monumento arquitetônico no processo de restauração. Para eles, a expectativa de preservar a identidade e linguagem originais está submissa à ação degradadora do tempo, na qual a atividade humana está integralmente incluída quando tenta cultivar um monumento antigofazendo aparentar ser novo. Eles destacam que polaridade entre velho e novo é a responsável por permitir a experiência de conhecer o valor de memória e propõem evitar que os danos se tornem irreversíveis. Para isto, compreendem a validade de manter o monumento arquitetônico ocupado, desde que não se perca de vista a função para qual foi concebido e não deixe de registrar todos os momentos de sua história ou intervenções sofridas, como um legado aos descendentes. Com isto entendem que talvez seja possível que o monumento arquitetônico prolongue sua imperativa existência no tempo e no espaço mantendo um diálogo relevante com a sociedade.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este estudo concluiu: refuta a previsão inicial e identifica que o restauro deve ser um recurso apenas quando não houver mais possibilidade de conservação, sendo que o (re)uso pode ser uma alternativa contra o abandono e esquecimento.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Boito C. Os Restauradores. Trad. Beatriz MugayarKühl. Rev. Renata Maria Parreira Cordeiro. 5ª ed. Cotia: Ateliê Editorial; 2022. (Coleção Artes (#38) Ofícios). 2. Brandi C. Teoria da Restauração. Trad. Beatriz MugayarKühl. Rev. Renata Maria Parreira Cordeiro. 4ª ed. Cotia: Ateliê Editorial; 2019. (Coleção Artes (#38) Ofícios). 3. Choay F. A alegoria do patrimônio. Trad. Lucio Vieira Machado. São Paulo: UNESP; 2001. 4. Riegl A. O culto moderno dos monumentos. Trd. João Tiago Proença. Lisboa: Edições 70; 2016. (Arte (#38) Comunicação). 5. Viollet-le-Duc E. Restauração. Trad. Beatriz MugayarKühl. Rev. Renata Maria Parreira Cordeiro. 4ª ed. Cotia: Ateliê Editorial; 2006. (Coleção Artes (#38) Ofícios).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14851	Medicina	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4623355 - GIOVANNA BERTOLINI CHUERY	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Lucas Melo Neves		
<b>TITULO</b>	Impacto da atividade física na percepção de solidão de homens e mulheres: uma análise dos dados do projeto "hospital à céu aberto 2022"			
<b>INTRODUCAO</b>	A atividade física (AF) é de suma importância para a saúde humana, tendo potencial para evitar doenças como câncer, hipertensão e diabetes mellitus tipo 2. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde desenvolveu diretrizes para estabelecer as recomendações de AF para a população, onde reconheceu-se a necessidade de ao menos 150 minutos semanais de AF para a população adulta. Ainda é um grande desafio para quase 40% da população mundial, atender tais recomendações. Um dos elementos que colaboram para que uma considerável parte da população não atenda a recomendação mínima de AF parece ser a solidão.			
<b>OBJETIVOS</b>	Diante disso, buscou-se verificar a relação entre prática de AF e solidão na população, e compreender as diferenças entre os resultados de homens e mulheres.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para tal fim, realizamos uma avaliação do tempo de AF e solidão de uma população da zona Sul de São Paulo, com aplicação de escalas individualmente. Assim utilizamos as ferramentas International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) para avaliação da atividade física e a Escala de Solidão UCLA- BR para avaliar a solidão. Os questionários foram aplicados por uma equipe mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes. Além disso, perguntas para fins de identificação também foram realizadas (sexo e idade).			
<b>RESULTADOS</b>	Ao fim da pesquisa, verificou-se 54 participantes (N=54). A partir dos resultados da escala IPAQ, 29 foram classificados como ATIVOS, enquanto 24 NÃO ATIVOS. Ao realizarmos o teste UCLABR verificamos que o score médio de solidão do grupo NÃO ATIVO foi de 42,5 pontos, enquanto os ATIVOS obtiveram cerca de 35 pontos. Além disso, resultados com base no sexo dos participantes foram analisados; dos 17 homens, 13 eram ATIVOS com um score de solidão de 24 pontos, e 4 NÃO ATIVOS com um score de 41 pontos. Já as mulheres, das 36 respostas válidas, 16 eram ATIVAS com um score de solidão de 37 pontos, e 20 NÃO ATIVAS com um score de 41 pontos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base nos dados obtidos concluiu-se que a AF reduz os scores de solidão tanto em homens quanto em mulheres, no entanto verificou-se que os homens possuem um resultado mais positivo diante da prática de AF com relação a diminuição dos scores de solidão.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World health organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. British Journal of Sports Medicine. 2020 Nov. 2- Solmi M, Veronese N, Galvano D, Favaro A, Ostinelli EG, Noventa V, et al. Factors Associated With Loneliness: An Umbrella Review Of Observational Studies. Journal of Affective Disorders. 2020 Jun. 3- Schrempft S, Jackowska M, Harmer M, Steptoe A. Associations between social isolation, loneliness, and objective physical activity in older men and women. BMC Public Health. 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14852	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3534634 - GIOVANNA FUNISCELLO DE SOUSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI
<b>TITULO</b>	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PULMONAR EM PACIENTE CANINO: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Neoplasias pulmonares primárias são infrequentes em cães, correspondendo à 1% das neoplasias, ao contrário das metástases pulmonares. Dentre os tipos histológicos mais comuns de neoplasias pulmonares primárias estão os adenocarcinomas e os carcinomas de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna de células epidérmicas, as quais se diferenciam para queratinócitos, de crescimento lento e não necessariamente metastático. Os sinais clínicos são inespecíficos, o diagnóstico pode ser realizado através de radiografias, ultrassonografias e tomografia computadorizada, além de citologia aspirativa por agulha fina ou biópsia. O tratamento de escolha é cirúrgico através de excisão da massa, e a quimioterapia adjuvante pode ser utilizada, embora não possua evidências de que apresente boa resposta neste tipo de neoplasia.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente atendido no Hovet UNISA, diagnosticado com carcinoma de células escamosas pulmonar primário.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão, atendido no Hovet UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Foi atendido no Hovet Unisa um paciente canino, macho, da raça Shih-tzu, de 12 anos, com diagnóstico realizado em colega de neoplasia pulmonar. O paciente havia iniciado sinais de cianose de língua e tosse não produtiva, há poucos meses antes do primeiro atendimento. No exame físico, o animal apresentava campos pulmonares discretamente abafados à auscultação, e demais parâmetros dentro da normalidade. Em radiografia torácica, visualizou-se estrutura arredondada medindo cerca de 4,0cm x 3,0cm em região ventral e cranial de tórax, confirmada pela tomografia computadorizada, localizada em topografia do segmento cranial do lobo pulmonar cranial esquerdo. Foi realizada citologia aspirativa guiada por ultrassom, sugestiva para carcinoma de células escamosas. O paciente foi submetido a lobectomia pulmonar do lobo cranial esquerdo com posterior toracostomia, e encaminhado para unidade de terapia intensiva. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Após dois meses da data da cirurgia o paciente retornou com queixa de engasgos, espirros, epistaxe, hiporexia e prostração. Ao exame radiográfico, constatou-se área arredondada de aproximadamente 1,0cm x 0,8cm, em região dorsal de tórax. Seguido de retorno após 20 dias aproximadamente com persistência dos engasgos, e cansaço fácil. Em nova radiografia, a neoplasia apresentou aumento de volume (2,2cm x 1,8cm). Novo exame de tomografia computadorizada foi solicitado, ainda sem retorno.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	A lobectomia pulmonar é o método de eleição para excisão de neoplasias pulmonares primárias, tendo prognóstico reservado a depender da avaliação histológica, e maior sobrevida quando diagnosticada precocemente.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>GUIMARAES JL. Lobectomia pulmonar para exérese de neoplasia pulmonar primária em cão - relato de caso. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. Monografia de especialização em cirurgia de animais de companhia. De Cezaro T, et al. Lobectomia pulmonar em canino: relato de caso. Anais de medicina veterinária. 2022; 2(1): 56-59. Mcphetridge JB, et al. Distribution of histopathologic types of primary pulmonary neoplasia in dogs and outcome of affected dogs: 340 cases (2010–2019). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2022; 260(2): 234-243.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14852	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3540065 - SANDRO SCHERER	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI
<b>TITULO</b>	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PULMONAR EM PACIENTE CANINO: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Neoplasias pulmonares primárias são infrequentes em cães, correspondendo à e1% das neoplasias, ao contrário das metástases pulmonares. Dentre os tipos histológicos mais comuns de neoplasias pulmonares primárias estão os adenocarcinomas e os carcinomas de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna de células epidérmicas, as quais se diferenciam para queratinócitos, de crescimento lento e não necessariamente metastático. Os sinais clínicos são inespecíficos, o diagnóstico pode ser realizado através de radiografias, ultrassonografias e tomografia computadorizada, além de citologia aspirativa por agulha fina ou biópsia. O tratamento de escolha é cirúrgico através de excisão da massa, e a quimioterapia adjuvante pode ser utilizada, embora não possua evidências de que apresente boa resposta neste tipo de neoplasia.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente atendido no Hovet UNISA, diagnosticado com carcinoma de células escamosas pulmonar primário.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão, atendido no Hovet UNISA.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Foi atendido no Hovet Unisa um paciente canino, macho, da raça Shih-tzu, de 12 anos, com diagnóstico realizado em colega de neoplasia pulmonar. O paciente havia iniciado sinais de cianose de língua e tosse não produtiva, há poucos meses antes do primeiro atendimento. No exame físico, o animal apresentava campos pulmonares discretamente abafados à auscultação, e demais parâmetros dentro da normalidade. Em radiografia torácica, visualizou-se estrutura arredondada medindo cerca de 4,0cm x 3,0cm em região ventral e cranial de tórax, confirmada pela tomografia computadorizada, localizada em topografia do segmento cranial do lobo pulmonar cranial esquerdo. Foi realizada citologia aspirativa guiada por ultrassom, sugestiva para carcinoma de células escamosas. O paciente foi submetido a lobectomia pulmonar do lobo cranial esquerdo com posterior toracostomia, e encaminhado para unidade de terapia intensiva. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Após dois meses da data da cirurgia o paciente retornou com queixa de engasgos, espirros, epistaxe, hiporexia e prostração. Ao exame radiográfico, constatou área arredondada de aproximadamente 1,0cm x 0,8cm, em região dorsal de tórax. Seguido de retorno após 20 dias aproximadamente com persistência dos engasgos, e cansaço fácil. Em nova radiografia, a neoplasia apresentou aumento de volume (2,2cm x 1,8cm). Novo exame de tomografia computadorizada foi solicitado, ainda sem retorno.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A lobectomia pulmonar é o método de eleição para excisão de neoplasias pulmonares primárias, tendo prognóstico reservado a depender da avaliação histológica, e maior sobrevida quando diagnosticada precocemente.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>GUIMARAES JL. Lobectomia pulmonar para exérese de neoplasia pulmonar primaria em cão - relato de caso. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. Monografia em especialização em cirurgia de animais de companhia. De Cezaro T, et al. Lobectomia pulmonar em canino: relato de caso. Anais de medicina veterinária. 2022; 2(1): 56-59. Mcphetridge JB, et al. Distribution of histopathologic types of primary pulmonary neoplasia in dogs and outcome of affected dogs: 340 cases (2010–2019). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2022; 260(2): 234-243.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14852	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3656748 - GIULIA MARIA SPADARO TEIXEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI
<b>TITULO</b>	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PULMONAR EM PACIENTE CANINO: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Neoplasias pulmonares primárias são infrequentes em cães, correspondendo à 1% das neoplasias, ao contrário das metástases pulmonares. Dentre os tipos histológicos mais comuns de neoplasias pulmonares primárias estão os adenocarcinomas e os carcinomas de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna de células epidérmicas, as quais se diferenciam para queratinócitos, de crescimento lento e não necessariamente metastático. Os sinais clínicos são inespecíficos, o diagnóstico pode ser realizado através de radiografias, ultrassonografias e tomografia computadorizada, além de citologia aspirativa por agulha fina ou biópsia. O tratamento de escolha é cirúrgico através de excisão da massa, e a quimioterapia adjuvante pode ser utilizada, embora não possua evidências de que apresente boa resposta neste tipo de neoplasia.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente atendido no Hovet UNISA, diagnosticado com carcinoma de células escamosas pulmonar primário.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão, atendido no Hovet UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi atendido no Hovet Unisa um paciente canino, macho, da raça Shih-tzu, de 12 anos, com diagnóstico realizado em colega de neoplasia pulmonar. O paciente havia iniciado sinais de cianose de língua e tosse não produtiva, há poucos meses antes do primeiro atendimento. No exame físico, o animal apresentava campos pulmonares discretamente abafados à auscultação, e demais parâmetros dentro da normalidade. Em radiografia torácica, visualizou-se estrutura arredondada medindo cerca de 4,0cm x 3,0cm em região ventral e cranial de tórax, confirmada pela tomografia computadorizada, localizada em topografia do segmento cranial do lobo pulmonar cranial esquerdo. Foi realizada citologia aspirativa guiada por ultrassom, sugestiva para carcinoma de células escamosas. O paciente foi submetido a lobectomia pulmonar do lobo cranial esquerdo com posterior toracostomia, e encaminhado para unidade de terapia intensiva. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Após dois meses da data da cirurgia o paciente retornou com queixa de engasgos, espirros, epistaxe, hiporexia e prostração. Ao exame radiográfico, constatou-se área arredondada de aproximadamente 1,0cm x 0,8cm, em região dorsal de tórax. Seguido de retorno após 20 dias aproximadamente com persistência dos engasgos, e cansaço fácil. Em nova radiografia, a neoplasia apresentou aumento de volume (2,2cm x 1,8cm). Novo exame de tomografia computadorizada foi solicitado, ainda sem retorno.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A lobectomia pulmonar é o método de eleição para excisão de neoplasias pulmonares primárias, tendo prognóstico reservado a depender da avaliação histológica, e maior sobrevida quando diagnosticada precocemente.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	GUIMARAES JL. Lobectomia pulmonar para exérese de neoplasia pulmonar primária em cão - relato de caso. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. Monografia de especialização em cirurgia de animais de companhia. De Cezaro T, et al. Lobectomia pulmonar em canino: relato de caso. Anais de medicina veterinária. 2022; 2(1): 56-59. Mcphetridge JB, et al. Distribution of histopathologic types of primary pulmonary neoplasia in dogs and outcome of affected dogs: 340 cases (2010–2019). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2022; 260(2): 234-243.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14852	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3667898 - LEONARDO DO NASCIMENTO LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI
<b>TITULO</b>	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PULMONAR EM PACIENTE CANINO: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Neoplasias pulmonares primárias são infrequentes em cães, correspondendo à e1% das neoplasias, ao contrário das metástases pulmonares. Dentre os tipos histológicos mais comuns de neoplasias pulmonares primárias estão os adenocarcinomas e os carcinomas de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna de células epidérmicas, as quais se diferenciam para queratinócitos, de crescimento lento e não necessariamente metastático. Os sinais clínicos são inespecíficos, o diagnóstico pode ser realizado através de radiografias, ultrassonografias e tomografia computadorizada, além de citologia aspirativa por agulha fina ou biópsia. O tratamento de escolha é cirúrgico através de excisão da massa, e a quimioterapia adjuvante pode ser utilizada, embora não possua evidências de que apresente boa resposta neste tipo de neoplasia.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente atendido no Hovet UNISA, diagnosticado com carcinoma de células escamosas pulmonar primário.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão, atendido no Hovet UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi atendido no Hovet Unisa um paciente canino, macho, da raça Shih-tzu, de 12 anos, com diagnóstico realizado em colega de neoplasia pulmonar. O paciente havia iniciado sinais de cianose de língua e tosse não produtiva, há poucos meses antes do primeiro atendimento. No exame físico, o animal apresentava campos pulmonares discretamente abafados à auscultação, e demais parâmetros dentro da normalidade. Em radiografia torácica, visualizou-se estrutura arredondada medindo cerca de 4,0cm x 3,0cm em região ventral e cranial de tórax, confirmada pela tomografia computadorizada, localizada em topografia do segmento cranial do lobo pulmonar cranial esquerdo. Foi realizada citologia aspirativa guiada por ultrassom, sugestiva para carcinoma de células escamosas. O paciente foi submetido a lobectomia pulmonar do lobo cranial esquerdo com posterior toracostomia, e encaminhado para unidade de terapia intensiva. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Após dois meses da data da cirurgia o paciente retornou com queixa de engasgos, espirros, epistaxe, hiporexia e prostração. Ao exame radiográfico, constatou área arredondada de aproximadamente 1,0cm x 0,8cm, em região dorsal de tórax. Seguido de retorno após 20 dias aproximadamente com persistência dos engasgos, e cansaço fácil. Em nova radiografia, a neoplasia apresentou aumento de volume (2,2cm x 1,8cm). Novo exame de tomografia computadorizada foi solicitado, ainda sem retorno.			
<b>CONCLUSOES</b>	A lobectomia pulmonar é o método de eleição para excisão de neoplasias pulmonares primárias, tendo prognóstico reservado a depender da avaliação histológica, e maior sobrevida quando diagnosticada precocemente.			
<b>REFERENCIAS</b>	GUIMARAES JL. Lobectomia pulmonar para exérese de neoplasia pulmonar primaria em cão - relato de caso. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. Monografia em especialização em cirurgia de animais de companhia. De Cezaro T, et al. Lobectomia pulmonar em canino: relato de caso. Anais de medicina veterinária. 2022; 2(1): 56-59. Mcphetridge JB, et al. Distribution of histopathologic types of primary pulmonary neoplasia in dogs and outcome of affected dogs: 340 cases (2010–2019). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2022; 260(2): 234-243.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14852	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848110 - DANIELA SANTOS OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI
<b>TITULO</b>	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PULMONAR EM PACIENTE CANINO: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Neoplasias pulmonares primárias são infrequentes em cães, correspondendo à e1% das neoplasias, ao contrário das metástases pulmonares. Dentre os tipos histológicos mais comuns de neoplasias pulmonares primárias estão os adenocarcinomas e os carcinomas de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna de células epidérmicas, as quais se diferenciam para queratinócitos, de crescimento lento e não necessariamente metastático. Os sinais clínicos são inespecíficos, o diagnóstico pode ser realizado através de radiografias, ultrassonografias e tomografia computadorizada, além de citologia aspirativa por agulha fina ou biópsia. O tratamento de escolha é cirúrgico através de excisão da massa, e a quimioterapia adjuvante pode ser utilizada, embora não possua evidências de que apresente boa resposta neste tipo de neoplasia.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente atendido no Hovet UNISA, diagnosticado com carcinoma de células escamosas pulmonar primário.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão, atendido no Hovet UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi atendido no Hovet Unisa um paciente canino, macho, da raça Shih-tzu, de 12 anos, com diagnóstico realizado em colega de neoplasia pulmonar. O paciente havia iniciado sinais de cianose de língua e tosse não produtiva, há poucos meses antes do primeiro atendimento. No exame físico, o animal apresentava campos pulmonares discretamente abafados à auscultação, e demais parâmetros dentro da normalidade. Em radiografia torácica, visualizou-se estrutura arredondada medindo cerca de 4,0cm x 3,0cm em região ventral e cranial de tórax, confirmada pela tomografia computadorizada, localizada em topografia do segmento cranial do lobo pulmonar cranial esquerdo. Foi realizada citologia aspirativa guiada por ultrassom, sugestiva para carcinoma de células escamosas. O paciente foi submetido a lobectomia pulmonar do lobo cranial esquerdo com posterior toracostomia, e encaminhado para unidade de terapia intensiva. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Após dois meses da data da cirurgia o paciente retornou com queixa de engasgos, espirros, epistaxe, hiporexia e prostração. Ao exame radiográfico, constatou área arredondada de aproximadamente 1,0cm x 0,8cm, em região dorsal de tórax. Seguido de retorno após 20 dias aproximadamente com persistência dos engasgos, e cansaço fácil. Em nova radiografia, a neoplasia apresentou aumento de volume (2,2cm x 1,8cm). Novo exame de tomografia computadorizada foi solicitado, ainda sem retorno.			
<b>CONCLUSOES</b>	A lobectomia pulmonar é o método de eleição para excisão de neoplasias pulmonares primárias, tendo prognóstico reservado a depender da avaliação histológica, e maior sobrevida quando diagnosticada precocemente.			
<b>REFERENCIAS</b>	GUIMARAES JL. Lobectomia pulmonar para exérese de neoplasia pulmonar primaria em cão - relato de caso. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. Monografia em especialização em cirurgia de animais de companhia. De Cezaro T, et al. Lobectomia pulmonar em canino: relato de caso. Anais de medicina veterinária. 2022; 2(1): 56-59. Mcphetridge JB, et al. Distribution of histopathologic types of primary pulmonary neoplasia in dogs and outcome of affected dogs: 340 cases (2010–2019). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2022; 260(2): 234-243.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14852	Clínica Cirúrgica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5075777 - JOÃO VICTOR PRATES CAMPOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho	Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	GUSTAVO DA SILVA SCHIAVI
<b>TITULO</b>	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PULMONAR EM PACIENTE CANINO: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Neoplasias pulmonares primárias são infrequentes em cães, correspondendo à 1% das neoplasias, ao contrário das metástases pulmonares. Dentre os tipos histológicos mais comuns de neoplasias pulmonares primárias estão os adenocarcinomas e os carcinomas de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna de células epidérmicas, as quais se diferenciam para queratinócitos, de crescimento lento e não necessariamente metastático. Os sinais clínicos são inespecíficos, o diagnóstico pode ser realizado através de radiografias, ultrassonografias e tomografia computadorizada, além de citologia aspirativa por agulha fina ou biópsia. O tratamento de escolha é cirúrgico através de excisão da massa, e a quimioterapia adjuvante pode ser utilizada, embora não possua evidências de que apresente boa resposta neste tipo de neoplasia.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente atendido no Hovet UNISA, diagnosticado com carcinoma de células escamosas pulmonar primário.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o relato do caso foi realizada revisão do prontuário médico e exames do paciente em questão, atendido no Hovet UNISA.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi atendido no Hovet Unisa um paciente canino, macho, da raça Shih-tzu, de 12 anos, com diagnóstico realizado em colega de neoplasia pulmonar. O paciente havia iniciado sinais de cianose de língua e tosse não produtiva, há poucos meses antes do primeiro atendimento. No exame físico, o animal apresentava campos pulmonares discretamente abafados à auscultação, e demais parâmetros dentro da normalidade. Em radiografia torácica, visualizou-se estrutura arredondada medindo cerca de 4,0cm x 3,0cm em região ventral e cranial de tórax, confirmada pela tomografia computadorizada, localizada em topografia do segmento cranial do lobo pulmonar cranial esquerdo. Foi realizada citologia aspirativa guiada por ultrassom, sugestiva para carcinoma de células escamosas. O paciente foi submetido a lobectomia pulmonar do lobo cranial esquerdo com posterior toracostomia, e encaminhado para unidade de terapia intensiva. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Após dois meses da data da cirurgia o paciente retornou com queixa de engasgos, espirros, epistaxe, hiporexia e prostração. Ao exame radiográfico, constatou área arredondada de aproximadamente 1,0cm x 0,8cm, em região dorsal de tórax. Seguido de retorno após 20 dias aproximadamente com persistência dos engasgos, e cansaço fácil. Em nova radiografia, a neoplasia apresentou aumento de volume (2,2cm x 1,8cm). Novo exame de tomografia computadorizada foi solicitado, ainda sem retorno.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A lobectomia pulmonar é o método de eleição para excisão de neoplasias pulmonares primárias, tendo prognóstico reservado a depender da avaliação histológica, e maior sobrevida quando diagnosticada precocemente.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	GUIMARAES JL. Lobectomia pulmonar para exérese de neoplasia pulmonar primária em cão - relato de caso. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. Monografia em especialização em cirurgia de animais de companhia. De Cezaro T, et al. Lobectomia pulmonar em canino: relato de caso. Anais de medicina veterinária. 2022; 2(1): 56-59. Mcphetridge JB, et al. Distribution of histopathologic types of primary pulmonary neoplasia in dogs and outcome of affected dogs: 340 cases (2010–2019). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2022; 260(2): 234-243.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14854	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4206959 - LUIZA GUIDO DIAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS NO TRATAMENTO DA NEFROLITÍASE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A nefrolitíase é a terceira doença mais comum do trato urinário e sua fisiopatologia está relacionada à dieta e ao metabolismo de cálcio, ácido úrico, oxalato e cistina, portanto, os pacientes portadores desses cálculos devem seguir orientações dietéticas, incluindo aumento da ingestão de líquidos, restrição da ingestão de sal e de proteína animal, especialmente carne vermelha. Nos casos de agudização do quadro, o tratamento pode ser feito de maneira clínica e/ou cirúrgica, dependendo do tamanho do cálculo, do grau de obstrução, da intensidade da dor e da resposta à analgesia. Vale ressaltar que a descoberta da influência dietética na formação de cálculos renais é recente, assim como a quantidade ideal do consumo de cada alimento. Dessa forma, o estudo é importante para consolidar a literatura com base em evidências científicas e reforçar as recomendações existentes, além de contribuir para descobertas futuras.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência das alterações dietéticas na formação da nefrolitíase.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir da plataforma PubMed, foram pesquisados os descritores (nephrolithiasis) AND (diet) no campo de pesquisa, aplicando os filtros de: textos completos grátis, revisões, dos últimos 10 anos, e em adultos, resultando em 8 artigos que serão analisados e revisados.			
<b>RESULTADOS</b>	Seis dos artigos concordam que o consumo de proteína animal, sódio, cálcio e potássio favorecem a formação de cálculo. Além disso, 3 destes 6 artigos ainda ressaltam a importância da Oxalobacter formigenes, bactéria presente na microbiota intestinal, que é capaz de degradar o oxalato e, assim, reduzir a reestruturação do cálculo. Os outros 2 artigos, no entanto, relatam que não há uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a nefrolitíase; sendo que 1 deles ainda alega que nos idosos a restrição de cálcio não é recomendada por conta de sua importância para a saúde óssea e renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Segundo a maior parte dos autores, a dieta tem um papel crucial na prevenção e manejo de cálculos renais, juntamente com medidas terapêuticas, visando reduzir a morbidade associada a essa condição e os custos para o sistema de saúde. Foi evidenciado que a microbiota intestinal desempenha um papel na formação de cálculos, com a disbiose intestinal sendo associada à nefrolitíase. No entanto, ainda há uma discordância por alguns autores de que não existe uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a formação dos cálculos urinários. Dessa forma, fica evidenciada a importância de mais pesquisas sobre as alterações dietéticas na nefrolitíase.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	KorkesF, SilvaliJL, HeilbergIP. Costsforinhospitaltreatmentofurinary lithiasis in the Brazilian public health system. Einstein (Sao Paulo). 2011 Dec;9(4):518-22. English, Portuguese. doi: 10.1590/S1679-45082011GS2143. PMID: 26761257. BurnsZ, KnightJ, FargueS, HolmesR, AssimosD, WoodK. Future treatments for hyperoxaluria. Current Opinion in Urology. 2020 Mar;30(2):171-6. LegayC, KrasniqiT, BourdetA, BonnyO, BochudM. Methodsforthedietary assessment of adult kidney stone formers: a scoping review. J Nephrol. 2022 Apr;35(3):821-830. doi: 10.1007/s40620-022-01259-3. Epub 2022 Feb 15. PMID: 35167058; PMCID: PMC8995246.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14854	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4312929 - PEDRO ENRIQUE ZABOTO DOUGLAS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS NO TRATAMENTO DA NEFROLITÍASE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A nefrolitíase é a terceira doença mais comum do trato urinário e sua fisiopatologia está relacionada à dieta e ao metabolismo de cálcio, ácido úrico, oxalato e cistina, portanto, os pacientes portadores desses cálculos devem seguir orientações dietéticas, incluindo aumento da ingestão de líquidos, restrição da ingestão de sal e de proteína animal, especialmente carne vermelha. Nos casos de agudização do quadro, o tratamento pode ser feito de maneira clínica e/ou cirúrgica, dependendo do tamanho do cálculo, do grau de obstrução, da intensidade da dor e da resposta à analgesia. Vale ressaltar que a descoberta da influência dietética na formação de cálculos renais é recente, assim como a quantidade ideal do consumo de cada alimento. Dessa forma, o estudo é importante para consolidar a literatura com base em evidências científicas e reforçar as recomendações existentes, além de contribuir para descobertas futuras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência das alterações dietéticas na formação da nefrolitíase.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir da plataforma PubMed, foram pesquisados os descritores (nephrolithiasis) AND (diet) no campo de pesquisa, aplicando os filtros de: textos completos grátis, revisões, dos últimos 10 anos, e em adultos, resultando em 8 artigos que serão analisados e revisados.			
<b>RESULTADOS</b>	Seis dos artigos concordam que o consumo de proteína animal, sódio, cálcio e potássio favorecem a formação de cálculo. Além disso, 3 destes 6 artigos ainda ressaltam a importância da Oxalobacter formigenes, bactéria presente na microbiota intestinal, que é capaz de degradar o oxalato e, assim, reduzir a reestruturação do cálculo. Os outros 2 artigos, no entanto, relatam que não há uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a nefrolitíase; sendo que 1 deles ainda alega que nos idosos a restrição de cálcio não é recomendada por conta de sua importância para a saúde óssea e renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Segundo a maior parte dos autores, a dieta tem um papel crucial na prevenção e manejo de cálculos renais, juntamente com medidas terapêuticas, visando reduzir a morbidade associada a essa condição e os custos para o sistema de saúde. Foi evidenciado que a microbiota intestinal desempenha um papel na formação de cálculos, com a disbiose intestinal sendo associada à nefrolitíase. No entanto, ainda há uma discordância por alguns autores de que não existe uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a formação dos cálculos urinários. Dessa forma, fica evidenciada a importância de mais pesquisas sobre as alterações dietéticas na nefrolitíase.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>KorkesF, SilvaliJL, HeilbergIP. Costsforinhospitaltreatmentofurinary lithiasis in the Brazilian public health system. Einstein (Sao Paulo). 2011 Dec;9(4):518-22. English, Portuguese. doi: 10.1590/S1679-45082011GS2143. PMID: 26761257. BurnsZ, KnightJ, FargueS, HolmesR, AssimosD, WoodK. Future treatments for hyperoxaluria. Current Opinion in Urology. 2020 Mar;30(2):171-6. LegayC, KrasniqiT, BourdetA, BonnyO, BochudM. Methodsforthe dietary assessment of adult kidney stone formers: a scoping review. J Nephrol. 2022 Apr;35(3):821-830. doi: 10.1007/s40620-022-01259-3. Epub 2022 Feb 15. PMID: 35167058; PMCID: PMC8995246.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14854	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4314123 - LUIZA MOREIRA RIOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS NO TRATAMENTO DA NEFROLITÍASE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A nefrolitíase é a terceira doença mais comum do trato urinário e sua fisiopatologia está relacionada à dieta e ao metabolismo de cálcio, ácido úrico, oxalato e cistina, portanto, os pacientes portadores desses cálculos devem seguir orientações dietéticas, incluindo aumento da ingestão de líquidos, restrição da ingestão de sal e de proteína animal, especialmente carne vermelha. Nos casos de agudização do quadro, o tratamento pode ser feito de maneira clínica e/ou cirúrgica, dependendo do tamanho do cálculo, do grau de obstrução, da intensidade da dor e da resposta à analgesia. Vale ressaltar que a descoberta da influência dietética na formação de cálculos renais é recente, assim como a quantidade ideal do consumo de cada alimento. Dessa forma, o estudo é importante para consolidar a literatura com base em evidências científicas e reforçar as recomendações existentes, além de contribuir para descobertas futuras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência das alterações dietéticas na formação da nefrolitíase.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir da plataforma PubMed, foram pesquisados os descritores (nephrolithiasis) AND (diet) no campo de pesquisa, aplicando os filtros de: textos completos grátis, revisões, dos últimos 10 anos, e em adultos, resultando em 8 artigos que serão analisados e revisados.			
<b>RESULTADOS</b>	Seis dos artigos concordam que o consumo de proteína animal, sódio, cálcio e potássio favorecem a formação de cálculo. Além disso, 3 destes 6 artigos ainda ressaltam a importância da Oxalobacter formigenes, bactéria presente na microbiota intestinal, que é capaz de degradar o oxalato e, assim, reduzir a reestruturação do cálculo. Os outros 2 artigos, no entanto, relatam que não há uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a nefrolitíase; sendo que 1 deles ainda alega que nos idosos a restrição de cálcio não é recomendada por conta de sua importância para a saúde óssea e renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Segundo a maior parte dos autores, a dieta tem um papel crucial na prevenção e manejo de cálculos renais, juntamente com medidas terapêuticas, visando reduzir a morbidade associada a essa condição e os custos para o sistema de saúde. Foi evidenciado que a microbiota intestinal desempenha um papel na formação de cálculos, com a disbiose intestinal sendo associada à nefrolitíase. No entanto, ainda há uma discordância por alguns autores de que não existe uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a formação dos cálculos urinários. Dessa forma, fica evidenciada a importância de mais pesquisas sobre as alterações dietéticas na nefrolitíase.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>KorkesF, SilvaliJL, HeilbergIP. Costsforinhospitaltreatmentofurinary lithiasis in the Brazilian public health system. Einstein (Sao Paulo). 2011 Dec;9(4):518-22. English, Portuguese. doi: 10.1590/S1679-45082011GS2143. PMID: 26761257. BurnsZ, KnightJ, FargueS, HolmesR, AssimosD, WoodK. Future treatments for hyperoxaluria. Current Opinion in Urology. 2020 Mar;30(2):171-6. LegayC, KrasniqiT, BourdetA, BonnyO, BochudM. Methodsforthedietary assessment of adult kidney stone formers: a scoping review. J Nephrol. 2022 Apr;35(3):821-830. doi: 10.1007/s40620-022-01259-3. Epub 2022 Feb 15. PMID: 35167058; PMCID: PMC8995246.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14854	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4314131 - THAMIRES ROS DOMINGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS NO TRATAMENTO DA NEFROLITÍASE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A nefrolitíase é a terceira doença mais comum do trato urinário e sua fisiopatologia está relacionada à dieta e ao metabolismo de cálcio, ácido úrico, oxalato e cistina, portanto, os pacientes portadores desses cálculos devem seguir orientações dietéticas, incluindo aumento da ingestão de líquidos, restrição da ingestão de sal e de proteína animal, especialmente carne vermelha. Nos casos de agudização do quadro, o tratamento pode ser feito de maneira clínica e/ou cirúrgica, dependendo do tamanho do cálculo, do grau de obstrução, da intensidade da dor e da resposta à analgesia. Vale ressaltar que a descoberta da influência dietética na formação de cálculos renais é recente, assim como a quantidade ideal do consumo de cada alimento. Dessa forma, o estudo é importante para consolidar a literatura com base em evidências científicas e reforçar as recomendações existentes, além de contribuir para descobertas futuras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência das alterações dietéticas na formação da nefrolitíase.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir da plataforma PubMed, foram pesquisados os descritores (nephrolithiasis) AND (diet) no campo de pesquisa, aplicando os filtros de: textos completos grátis, revisões, dos últimos 10 anos, e em adultos, resultando em 8 artigos que serão analisados e revisados.			
<b>RESULTADOS</b>	Seis dos artigos concordam que o consumo de proteína animal, sódio, cálcio e potássio favorecem a formação de cálculo. Além disso, 3 destes 6 artigos ainda ressaltam a importância da Oxalobacter formigenes, bactéria presente na microbiota intestinal, que é capaz de degradar o oxalato e, assim, reduzir a reestruturação do cálculo. Os outros 2 artigos, no entanto, relatam que não há uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a nefrolitíase; sendo que 1 deles ainda alega que nos idosos a restrição de cálcio não é recomendada por conta de sua importância para a saúde óssea e renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Segundo a maior parte dos autores, a dieta tem um papel crucial na prevenção e manejo de cálculos renais, juntamente com medidas terapêuticas, visando reduzir a morbidade associada a essa condição e os custos para o sistema de saúde. Foi evidenciado que a microbiota intestinal desempenha um papel na formação de cálculos, com a disbiose intestinal sendo associada à nefrolitíase. No entanto, ainda há uma discordância por alguns autores de que não existe uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a formação dos cálculos urinários. Dessa forma, fica evidenciada a importância de mais pesquisas sobre as alterações dietéticas na nefrolitíase.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>KorkesF, SilvaliJL, HeilbergIP. Costsforinhospitaltreatmentofurinary lithiasis in the Brazilian public health system. Einstein (Sao Paulo). 2011 Dec;9(4):518-22. English, Portuguese. doi: 10.1590/S1679-45082011GS2143. PMID: 26761257. BurnsZ, KnightJ, FargueS, HolmesR, AssimosD, WoodK. Future treatments for hyperoxaluria. Current Opinion in Urology. 2020 Mar;30(2):171-6. LegayC, KrasniqiT, BourdetA, BonnyO, BochudM. Methodsforthedietary assessment of adult kidney stone formers: a scoping review. J Nephrol. 2022 Apr;35(3):821-830. doi: 10.1007/s40620-022-01259-3. Epub 2022 Feb 15. PMID: 35167058; PMCID: PMC8995246.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14854	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4320948 - MARIANA PITTNER NARDI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS NO TRATAMENTO DA NEFROLITÍASE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A nefrolitíase é a terceira doença mais comum do trato urinário e sua fisiopatologia está relacionada à dieta e ao metabolismo de cálcio, ácido úrico, oxalato e cistina, portanto, os pacientes portadores desses cálculos devem seguir orientações dietéticas, incluindo aumento da ingestão de líquidos, restrição da ingestão de sal e de proteína animal, especialmente carne vermelha. Nos casos de agudização do quadro, o tratamento pode ser feito de maneira clínica e/ou cirúrgica, dependendo do tamanho do cálculo, do grau de obstrução, da intensidade da dor e da resposta à analgesia. Vale ressaltar que a descoberta da influência dietética na formação de cálculos renais é recente, assim como a quantidade ideal do consumo de cada alimento. Dessa forma, o estudo é importante para consolidar a literatura com base em evidências científicas e reforçar as recomendações existentes, além de contribuir para descobertas futuras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência das alterações dietéticas na formação da nefrolitíase.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir da plataforma PubMed, foram pesquisados os descritores (nephrolithiasis) AND (diet) no campo de pesquisa, aplicando os filtros de: textos completos grátis, revisões, dos últimos 10 anos, e em adultos, resultando em 8 artigos que serão analisados e revisados.			
<b>RESULTADOS</b>	Seis dos artigos concordam que o consumo de proteína animal, sódio, cálcio e potássio favorecem a formação de cálculo. Além disso, 3 destes 6 artigos ainda ressaltam a importância da Oxalobacter formigenes, bactéria presente na microbiota intestinal, que é capaz de degradar o oxalato e, assim, reduzir a reestruturação do cálculo. Os outros 2 artigos, no entanto, relatam que não há uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a nefrolitíase; sendo que 1 deles ainda alega que nos idosos a restrição de cálcio não é recomendada por conta de sua importância para a saúde óssea e renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Segundo a maior parte dos autores, a dieta tem um papel crucial na prevenção e manejo de cálculos renais, juntamente com medidas terapêuticas, visando reduzir a morbidade associada a essa condição e os custos para o sistema de saúde. Foi evidenciado que a microbiota intestinal desempenha um papel na formação de cálculos, com a disbiose intestinal sendo associada à nefrolitíase. No entanto, ainda há uma discordância por alguns autores de que não existe uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a formação dos cálculos urinários. Dessa forma, fica evidenciada a importância de mais pesquisas sobre as alterações dietéticas na nefrolitíase.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>KorkesF, SilvaliJL, HeilbergIP. Costsforinhospitaltreatmentofurinary lithiasis in the Brazilian public health system. Einstein (Sao Paulo). 2011 Dec;9(4):518-22. English, Portuguese. doi: 10.1590/S1679-45082011GS2143. PMID: 26761257. BurnsZ, KnightJ, FargueS, HolmesR, AssimosD, WoodK. Future treatments for hyperoxaluria. Current Opinion in Urology. 2020 Mar;30(2):171-6. LegayC, KrasniqiT, BourdetA, BonnyO, BochudM. Methodsforthedietary assessment of adult kidney stone formers: a scoping review. J Nephrol. 2022 Apr;35(3):821-830. doi: 10.1007/s40620-022-01259-3. Epub 2022 Feb 15. PMID: 35167058; PMCID: PMC8995246.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14854	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4321219 - ANGELICA MARIA MAZOCA OROZCO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS NO TRATAMENTO DA NEFROLITÍASE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>A nefrolitíase é a terceira doença mais comum do trato urinário e sua fisiopatologia está relacionada à dieta e ao metabolismo de cálcio, ácido úrico, oxalato e cistina, portanto, os pacientes portadores desses cálculos devem seguir orientações dietéticas, incluindo aumento da ingestão de líquidos, restrição da ingestão de sal e de proteína animal, especialmente carne vermelha. Nos casos de agudização do quadro, o tratamento pode ser feito de maneira clínica e/ou cirúrgica, dependendo do tamanho do cálculo, do grau de obstrução, da intensidade da dor e da resposta à analgesia. Vale ressaltar que a descoberta da influência dietética na formação de cálculos renais é recente, assim como a quantidade ideal do consumo de cada alimento. Dessa forma, o estudo é importante para consolidar a literatura com base em evidências científicas e reforçar as recomendações existentes, além de contribuir para descobertas futuras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a influência das alterações dietéticas na formação da nefrolitíase.			
<b>METODOLOGIA</b>	A partir da plataforma PubMed, foram pesquisados os descritores (nephrolithiasis) AND (diet) no campo de pesquisa, aplicando os filtros de: textos completos grátis, revisões, dos últimos 10 anos, e em adultos, resultando em 8 artigos que serão analisados e revisados.			
<b>RESULTADOS</b>	Seis dos artigos concordam que o consumo de proteína animal, sódio, cálcio e potássio favorecem a formação de cálculo. Além disso, 3 destes 6 artigos ainda ressaltam a importância da Oxalobacter formigenes, bactéria presente na microbiota intestinal, que é capaz de degradar o oxalato e, assim, reduzir a reestruturação do cálculo. Os outros 2 artigos, no entanto, relatam que não há uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a nefrolitíase; sendo que 1 deles ainda alega que nos idosos a restrição de cálcio não é recomendada por conta de sua importância para a saúde óssea e renal.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Segundo a maior parte dos autores, a dieta tem um papel crucial na prevenção e manejo de cálculos renais, juntamente com medidas terapêuticas, visando reduzir a morbidade associada a essa condição e os custos para o sistema de saúde. Foi evidenciado que a microbiota intestinal desempenha um papel na formação de cálculos, com a disbiose intestinal sendo associada à nefrolitíase. No entanto, ainda há uma discordância por alguns autores de que não existe uma relação direta entre o nível de cálcio urinário e a formação dos cálculos urinários. Dessa forma, fica evidenciada a importância de mais pesquisas sobre as alterações dietéticas na nefrolitíase.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>KorkesF, SilvaliJL, HeilbergIP. Costsforinhospitaltreatmentofurinary lithiasis in the Brazilian public health system. Einstein (Sao Paulo). 2011 Dec;9(4):518-22. English, Portuguese. doi: 10.1590/S1679-45082011GS2143. PMID: 26761257. BurnsZ, KnightJ, FargueS, HolmesR, AssimosD, WoodK. Future treatments for hyperoxaluria. Current Opinion in Urology. 2020 Mar;30(2):171-6. LegayC, KrasniqiT, BourdetA, BonnyO, BochudM. Methodsforthedietary assessment of adult kidney stone formers: a scoping review. J Nephrol. 2022 Apr;35(3):821-830. doi: 10.1007/s40620-022-01259-3. Epub 2022 Feb 15. PMID: 35167058; PMCID: PMC8995246.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14855	Enfermagem Médico-Cirúrgica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4122453 - THALITA DE SOUZA RAMOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Maria de Freitas Floriano		
<b>TITULO</b>	Conceito de Time de Resposta Rápida entre profissionais da saúde recém-formados			
<b>INTRODUCAO</b>	Times de Resposta Rápida (TRR) são estabelecidos nas instituições de saúde para atender prontamente as emergências no âmbito hospitalar, sendo constituídos por uma equipe multiprofissional especializada <sup>1-2</sup> . A falta de conhecimento de profissionais de saúde recém-formados sobre os protocolos utilizados para os atendimentos de emergência pode levar a deterioração clínica do paciente <sup>3</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar o conhecimento acerca do conceito de TRR entre os profissionais da saúde recém-formados que realizam especialização em urgência e emergência.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo quantitativo, prospectivo e descritivo, realizado com residentes que estavam cursando ou que já haviam cursado os Programas de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência da Universidade Santo Amaro. A coleta dos dados ocorreu de forma eletrônica, com envio de link de formulário eletrônico após abordagem dos residentes em reunião aberta da Comissão de Residência Multiprofissional, anuência da coordenação da Residência Multiprofissional da Universidade Santo Amaro e aprovação do mérito ético (Parecer: 6.231.062). As variáveis estudadas foram conceito de Time de Resposta Rápida (sim ou não), capacitação para Time de Resposta Rápida (sim ou não), idade, categoria profissional, tempo de formação na pós-graduação em residência. Foi realizada análise estática descritiva segundo frequências absoluta e relativa para variáveis categóricas, e média e desvio padrão para variáveis numéricas.			
<b>RESULTADOS</b>	Participaram do estudo 21 residentes, sendo que a média de idade foi de 25,6±7,0 anos, 20% eram assistentes sociais e farmacêuticos, 25% fisioterapeutas e 35% enfermeiros, com tempo médio de formação de 1,3±0,8 anos. Em relação ao conceito de Time de Resposta Rápida 35% dos profissionais não sabiam o seu significado e 75% dos participantes da pesquisa não haviam sido capacitados para atuarem em Times de Resposta Rápida, apesar de estarem ou já ter cursado a residência multiprofissional em Urgência e Emergência.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verificou-se que a maior parte dos profissionais recém-formados possuem conhecimento sobre Times de Resposta Rápida, porém mais da metade deles não possuem capacitação para atuarem com essas equipes, apesar de já terem cursado ou estarem cursando curso de pós-graduação e Urgência e Emergência.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 – Boniatti MM. Advances in performance, more benefits the perspectives of rapid response teams. Rev Bras Ter Intensiva. 2016; 28(3):217-9. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rj/rbti/a/zMRk73ggCRCJwbtkmCc78QG/?format=pdf(#38)lang=pt4">https://www.scielo.br/rj/rbti/a/zMRk73ggCRCJwbtkmCc78QG/?format=pdf(#38)lang=pt4</a> . Acesso: 18 out. 2023. 2 - Queiroz AS, Nogueira LS. Nurses' perception of the quality of the Rapid Response Team. Rev Bras Enferm. 2019;72(Suppl 1):228-34. Disponível em: <a href="http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0168">http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0168</a> . Acesso: 18 out.2023 3 - Rocha HA, Alcântara AC, Rocha SG, Toscano CM. Effectiveness of rapid response teams in reducing intrahospital cardiac arrests and deaths: a systematic review and meta-analysis. Rev Bras Ter Intensiva. 2018;30(3):366-75. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rj/rbti/a/kGmsC5PjhVvQNd3bPStVRN/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/rj/rbti/a/kGmsC5PjhVvQNd3bPStVRN/?lang=pt(#38)format=pdf</a> . Acesso: 18 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14855	Enfermagem Médico-Cirúrgica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4343221 - KIMBERLLYN PEREIRA BARBOSA BARROS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Maria de Freitas Floriano		
<b>TITULO</b>	Conceito de Time de Resposta Rápida entre profissionais da saúde recém-formados			
<b>INTRODUCAO</b>	Times de Resposta Rápida (TRR) são estabelecidos nas instituições de saúde para atender prontamente as emergências no âmbito hospitalar, sendo constituídos por uma equipe multiprofissional especializada <sup>1-2</sup> . A falta de conhecimento de profissionais de saúde recém-formados sobre os protocolos utilizados para os atendimentos de emergência pode levar a deterioração clínica do paciente <sup>3</sup> .			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar o conhecimento acerca do conceito de TRR entre os profissionais da saúde recém-formados que realizam especialização em urgência e emergência.			
<b>METODOLOGIA</b>	Estudo quantitativo, prospectivo e descritivo, realizado com residentes que estavam cursando ou que já haviam cursado os Programas de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência da Universidade Santo Amaro. A coleta dos dados ocorreu de forma eletrônica, com envio de link de formulário eletrônico após abordagem dos residentes em reunião aberta da Comissão de Residência Multiprofissional, anuência da coordenação da Residência Multiprofissional da Universidade Santo Amaro e aprovação do mérito ético (Parecer: 6.231.062). As variáveis estudadas foram conceito de Time de Resposta Rápida (sim ou não), capacitação para Time de Resposta Rápida (sim ou não), idade, categoria profissional, tempo de formação na pós-graduação em residência. Foi realizada análise estática descritiva segundo frequências absoluta e relativa para variáveis categóricas, e média e desvio padrão para variáveis numéricas.			
<b>RESULTADOS</b>	Participaram do estudo 21 residentes, sendo que a média de idade foi de 25,6±7,0 anos, 20% eram assistentes sociais e farmacêuticos, 25% fisioterapeutas e 35% enfermeiros, com tempo médio de formação de 1,3±0,8 anos. Em relação ao conceito de Time de Resposta Rápida 35% dos profissionais não sabiam o seu significado e 75% dos participantes da pesquisa não haviam sido capacitados para atuarem em Times de Resposta Rápida, apesar de estarem ou já ter cursado a residência multiprofissional em Urgência e Emergência.			
<b>CONCLUSOES</b>	Verificou-se que a maior parte dos profissionais recém-formados possuem conhecimento sobre Times de Resposta Rápida, porém mais da metade deles não possuem capacitação para atuarem com essas equipes, apesar de já terem cursado ou estarem cursando curso de pós-graduação e Urgência e Emergência.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 – Boniatti MM. Advances in performance, more benefits the perspectives of rapid response teams. Rev Bras Ter Intensiva. 2016; 28(3):217-9. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rbti/a/zMRk73ggCRCJwbtkmCc78QG/?format=pdf(#38)lang=pt4">https://www.scielo.br/rbti/a/zMRk73ggCRCJwbtkmCc78QG/?format=pdf(#38)lang=pt4</a> . Acesso: 18 out. 2023. 2 - Queiroz AS, Nogueira LS. Nurses' perception of the quality of the Rapid Response Team. Rev Bras Enferm. 2019;72(Suppl 1):228-34. Disponível em: <a href="http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0168">http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0168</a> . Acesso: 18 out.2023 3 - Rocha HA, Alcântara AC, Rocha SG, Toscano CM. Effectiveness of rapid response teams in reducing intrahospital cardiac arrests and deaths: a systematic review and meta-analysis. Rev Bras Ter Intensiva. 2018;30(3):366-75. Disponível em: <a href="https://www.scielo.br/rbti/a/kGmsC5PjhVvQNd3bPStVRN/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/rbti/a/kGmsC5PjhVvQNd3bPStVRN/?lang=pt(#38)format=pdf</a> . Acesso: 18 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14856	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4449631 - JULIANE MONTEIRO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		
<b>TITULO</b>	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DETECÇÃO DA NEOPLASIA MAMÁRIA EM MULHERES O PAPEL DO ENFERMEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA			
<b>INTRODUCAO</b>	O câncer de mama afeta mulheres de todo mundo, tornando-se assim um problema de saúde pública.1 O enfermeiro tem a capacidade e a responsabilidade de criar iniciativas para prevenir o câncer de mama e promover a saúde da população sob sua supervisão 2.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar o papel do enfermeiro acerca da promoção da saúde, prevenção e detecção do câncer de mama, com uma visão integrada, assertiva e humanizada.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada entre 2013 e 2023 em que obteve-se 253 artigos, sendo que, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra final resultou em 4 artigos das bases de dados LILACS e BDEFN, os descritores utilizados foram "Neoplasia mamária" AND "Prevenção" AND "Rastreamento"AND "Enfermagem".			
<b>RESULTADO S</b>	Após a avaliação dos resultados obtidos, o papel do enfermeiro foi categorizado em duas vertentes. A primeira sobre o cuidado de enfermagem em relação ao câncer de mama, centrando-se no contexto da promoção da saúde, e a segunda categoria aborda os desafios e obstáculos enfrentados pelos enfermeiros na promoção da saúde e na luta contra o câncer de mama.1,2,3,4 Na Atenção Primária à Saúde no Brasil, os enfermeiros desempenham um papel crucial na detecção precoce do câncer de mama e na promoção de exames preventivos, apoiados por tecnologia e esforços do INCA e do Ministério da Saúde.2 No entanto, os autores dos artigos apontam deficiências de conhecimento e sobrecarga de tarefas entre os enfermeiros, destacando a necessidade de educação continuada. A atualização profissional é fundamental, especialmente na Atenção Básica, onde os enfermeiros têm autonomia. Além disso, é essencial que compreendam as diretrizes de rastreamento e coletem dados sistematizados para aprimorar a assistência.4 A competição com metas quantitativas e a sobrecarga de trabalho são desafios a serem superados.1,2,3,4 Estratégias como a busca ativa de pacientes ausentes e a promoção da educação em saúde mostram-se eficazes, mas a pandemia da COVID-19 impactou negativamente as visitas domiciliares e as ações de prevenção do câncer de mama.1			
<b>CONCLUSOES</b>	A capacitação do enfermeiro é indispensável para aprimorar o acolhimento, rastreamento, detecção precoce e tratamento no sistema de saúde, especialmente no contexto da neoplasia mamária. Há poucos estudos sobre o papel dos enfermeiros na promoção, prevenção e detecção dessa condição, sugerindo a necessidade de novas pesquisas qualitativas e quantitativas, e envolver gestores e enfermeiros nesta discussão.			
<b>REFERENCIAS</b>	1 – Moura TS, Magalhães PAP, Santos FAF, Silva TA. Percepção dos enfermeiros acerca da detecção precoce e prevenção do câncer de mama na atenção primária à saúde. Catanduva: Cuid.Arte Enfermagem; 2022. 2 – Melo FB, Figueiredo EN, Panobianco MS, Gutiérrez MG, Rosa AS. Detecção precoce do câncer de mama em Unidades Básicas de Saúde. São Paulo: Acta Paul Enferm; 2021;34:eAPE02442. 3 – Ferreira DS, Bernardo FMS, Costa EC, Maciel NS, Costa RL, Carvalho CML. Conhecimento, atitude e prática de enfermeiros na detecção do câncer de mama. Redenção: Escola Anna Nery; 2020. 4 – Santos CS, Araújo ACC, Silva FMR, Quadros KAN, Santos RC, Andrade SN. Conhecimento sobre câncer de mama entre enfermeiros da atenção primária de Divinópolis/MG. Divinópolis: RevistaNursing;2020;23(267).			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14857	Direito Penal	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4088859 - MAYUMI RODRIGUES MIURA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato Watanabe de Moraes		
<b>TITULO</b>	O uso de criptoativos na prática de delitos econômicos			
<b>INTRODUCAO</b>	Os ativos digitais, também conhecidos como criptoativos, é um conceito relativamente novo, que foi aprimorado a partir da tecnologia das criptomoedas e blockchain. A sua ascensão inovou a forma como as transações financeiras são conduzidas, trazendo muitas vantagens e oportunidades. Contudo, devido a sua natureza anônima e à falta de regulamentação em muitas jurisdições, os criptoativos podem ser usados em diversos crimes financeiros.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo busca analisar o uso de criptoativos na prática de delitos econômicos, tem como objetivo investigar esses casos e fornecer uma ampla compreensão dos desafios enfrentados pelas autoridades no combate a tais crimes.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia empregada nesta pesquisa se baseia na análise aprofundada de revistas e livros especializados que abordam os temas de criptoativos e direito penal econômico.			
<b>RESULTADOS</b>	O Bitcoin, o criptoativo mais famoso, foi anunciado em outubro de 2008 e lançado em janeiro de 2009 por Satoshi Nakamoto, um pseudônimo usado pelo criador da moeda. Sua criação tinha como principal objetivo oferecer uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, apresentando uma moeda com operação descentralizada, eliminando a necessidade de intermediação governamental ou bancária. Usando uma criptografia avançada, os detalhes das transações são registrados no blockchain, que é um livro-razão público, no entanto, a identidade dos envolvidos são pseudônimos, o que trás segurança e privacidade. Muitas outras moedas foram desenvolvidas durante o tempo, como Ethereum e Litecoin, cada uma com suas propostas e foco, o crescimento e a evolução do espaço das criptomoedas têm sido notáveis, e as criptomoedas continuam a ser um campo de inovação e exploração. Tendo o conhecimento da natureza descentralizada e pseudônima, o uso de criptoativos para crimes financeiros como Lavagem de dinheiro, Ransomware, Tráfico de drogas e armas, Fraude fiscal, Fraude de ICO (Oferta Inicial de Moedas), Financiamento do terrorismo tem se tornado de ampla utilização, devido a sua capacidade de facilitar transações financeiras e oferecer anonimato aos criminosos, dificultando a identificação e o rastreamento, sem contar com a falta de regulamentação adequada. Os resultados destacam a necessidade de uma abordagem multissetorial para combater o uso de criptoativos em crimes econômicos. A cooperação entre entidades governamentais, instituições financeiras e empresas de tecnologia é essencial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e detecção. Além disso, é crucial promover a conscientização e a educação do público sobre os riscos associados ao uso irresponsável de criptoativos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este estudo demonstrou que o uso de criptoativos na prática de delitos econômicos representa um desafio significativo para as autoridades. É necessário fortalecer os mecanismos de regulamentação e supervisão, além de investir em tecnologias avançadas de análise forense para rastrear e identificar transações suspeitas. A contínua pesquisa e colaboração entre especialistas em criptografia, aplicação da lei e instituições financeiras são essenciais para combater efetivamente essas atividades criminosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARVALHO, André C.; FERNANDES, Andressa Guimarães T. Manual de Criptoativos: Atualizado Conforme a Lei 14.478/2022. (Coleção Ibmecc São Paulo. Série Direito e Resolução de Disputas). São Paulo: Grupo Almedina (Portugal), 2023. CURY, Rogério. Direito Penal Econômico. São Paulo: Grupo Almedina (Portugal), 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14859	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4137205 - SILVIA LEN	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: "Câncer de bexiga", "fator de risco", "Técnicas e procedimentos diagnósticos", "Neoplasias urológicas". Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95. 3. Markowski MC, Boorjian SA, Burton JP, Hahn NM, Ingersoll MA, Maleki Vareki S, et al. The Microbiome and Genitourinary Cancer: A Collaborative Review. European Urology. 2019 Apr;75(4):637–46.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14859	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4312988 - GABRIELLA CUNHA NOVAES SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: "Câncer de bexiga", "fator de risco", "Técnicas e procedimentos diagnósticos", "Neoplasias urológicas". Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95. 3. Markowski MC, Boorjian SA, Burton JP, Hahn NM, Ingersoll MA, Maleki Vareki S, et al. The Microbiome and Genitourinary Cancer: A Collaborative Review. European Urology. 2019 Apr;75(4):637–46.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14859	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4313461 - ISABELLA PERIN MARTINS DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		0 - Comunicação Oral
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: "Câncer de bexiga", "fator de risco", "Técnicas e procedimentos diagnósticos", "Neoplasias urológicas". Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95. 3. Markowski MC, Boorjian SA, Burton JP, Hahn NM, Ingersoll MA, Maleki Vareki S, et al. The Microbiome and Genitourinary Cancer: A Collaborative Review. European Urology. 2019 Apr;75(4):637–46.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14859	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317211 - LARISSA MOUADEB	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: "Câncer de bexiga", "fator de risco", "Técnicas e procedimentos diagnósticos", "Neoplasias urológicas". Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. Medicina. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. European Urology [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95. 3. Markowski MC, Boorjian SA, Burton JP, Hahn NM, Ingersoll MA, Maleki Vareki S, et al. The Microbiome and Genitourinary Cancer: A Collaborative Review. European Urology. 2019 Apr;75(4):637–46.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14859	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4317955 - DANIELLA BIDLOVSKY	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: "Câncer de bexiga", "fator de risco", "Técnicas e procedimentos diagnósticos", "Neoplasias urológicas". Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, conseqüentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. <i>Medicina</i>. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. <i>European Urology</i> [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95. 3. Markowski MC, Boorjian SA, Burton JP, Hahn NM, Ingersoll MA, Maleki Vareki S, et al. The Microbiome and Genitourinary Cancer: A Collaborative Review. <i>European Urology</i>. 2019 Apr;75(4):637–46.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14859	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4889126 - LUANA LAURITO BATISTA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leonardo de Souza Piber		
<b>TITULO</b>	CÂNCER DE BEXIGA: FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O câncer de bexiga é a forma mais comum de neoplasia no trato geniturinário. A incidência desta condição aumenta com a idade, sendo mais comumente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida, e é três vezes mais prevalente em homens. Ainda, a incidência pode variar conforme a localização geográfica, sendo quase três vezes mais prevalente em regiões mais desenvolvidas do que em países em desenvolvimento, devido às disparidades dos hábitos de vida. Cerca de 50% dos casos estão associados ao tabagismo, 20% dos casos estão relacionados à exposição ocupacional a substâncias químicas orgânicas, e o restante a outros fatores de risco diretamente ligados aos hábitos de vida. Aproximadamente 10% dos indivíduos com hematúria microscópica e 25% dos que apresentam hematúria visível têm neoplasia no trato geniturinário, sendo este o sinal clínico mais frequente.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os fatores de risco e compreender as formas de diagnóstico do câncer de bexiga.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed e Scielo contando com os seguintes descritores: "Câncer de bexiga", "fator de risco", "Técnicas e procedimentos diagnósticos", "Neoplasias urológicas". Foram selecionados estudos transversais, coorte prospectiva/retrospectiva e caso controle que contemplassem o tema proposto nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2018 e 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	O tabagismo constitui-se como mais importante fator de risco. A intensidade e duração desse hábito influenciam diretamente na magnitude dos casos, predispondo os fumantes a uma maior taxa de mortalidade. Outros fatores estão relacionados ao consumo de carne vermelha, a exposição a fatores ocupacionais, a fatores dietéticos, ao sexo e microbioma. O sintoma mais comum é a hematúria macroscópica, presente em 80% dos pacientes. Os métodos diagnósticos atualmente utilizados são a cistoscopia, a citologia urinária e alguns métodos de imagem, com destaque para a ultrassonografia. A utilização de biomarcadores urinários para detecção do câncer de bexiga de forma mais precoce e menos invasiva tem sido estudada e pode ser uma alternativa interessante para auxiliar no diagnóstico.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O câncer de bexiga é uma condição multifatorial, tendo como principal fator de risco o tabagismo. Os avanços nos estudos possibilitaram a descoberta de novos métodos diagnósticos e aprimoramento dos já existentes, ampliando o conhecimento sobre a doença e, consequentemente, facilitando o diagnóstico precoce.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. Dobruch J, Oszczud(#38)#322;owski M. Bladder Cancer: Current Challenges and Future Directions. <i>Medicina</i>. 2021 Jul 24;57(8):749. 2. Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. <i>European Urology</i> [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jan 16];74(6):784–95. 3. Markowski MC, Boorjian SA, Burton JP, Hahn NM, Ingersoll MA, Maleki Vareki S, et al. The Microbiome and Genitourinary Cancer: A Collaborative Review. <i>European Urology</i>. 2019 Apr;75(4):637–46.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14860	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3168981 - LUANA LOPES PATENTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Coinfecção por Ancylostoma sp. e Giardia sp. em cão			
<b>INTRODUCAO</b>	As infecções parasitárias são comuns na clínica veterinária. Como exemplos, podem ser citadas a giardiase e a ancilostomose, duas parasitoses acometendo o intestino delgado de cães e que podem ser zoonoses. A giardiase é causada pela Giardia sp., um protozoário monoxeno, cuja forma adulta, chamada de trofozoita, se fixa na parede do intestino causando lesões nas vilosidades e levando à diarreia, desidratação e perda de peso. A ancilostomose é causada pelo Ancylostoma sp., um helminto hematófago, que pode levar à anemia, diarreia e, em casos mais agudos, cansaço e dificuldade respiratória.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar os achados laboratoriais de um caso de coinfecção por Ancylostoma sp. e Giardia sp. em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, macho, Flat Coated Retriever, com 5 meses de idade, com queixa principal de diarreia com hematoquezia. O paciente fora adotado havia duas semanas, e tutor refere vermifugação, vacinação e controle de ectoparasitos atualizados. Referia normorexia com ração superpremium, normodipsia e urina sem alterações. Nega a presença de vermes nas fezes. Ao exame físico, foi observada apenas taquipneia. Foram então solicitados hemograma e coproparasitológico a base das técnicas de Willis (flutuação em solução salina saturada) e Faust (centrifugo-flutuação em sulfato de zinco 33%) para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADOS</b>	No hemograma, constatou-se anemia normocítica e normocrômica, com hematócrito 32% (referência: 37-55%), e eosinofilia em 2831/µL (ref.: 60-1440/µL). No exame coproparasitológico, foram evidenciados ovos de Ancylostoma sp. (+) e cistos e trofozoitos de Giardia sp. (++) Baseado no diagnóstico, foi instituído tratamento com probiótico e antiparasitários, havendo melhora subsequente. Os exames laboratoriais foram fundamentais para o diagnóstico. A anemia pode estar relacionada à somatória de lesões causadas pelos parasitas ao se fixarem na parede do intestino, como hemorragias ocasionadas pela agressão ao epitélio, menor absorção de ferro e, no caso de Ancylostoma sp., pela hematofagia. A anemia normocítica e normocrômica sugere quadro arregenerativo, que pode ser decorrente da inflamação e da menor disponibilidade de ferro. A eosinofilia é comumente relacionada ao combate a infecções parasitárias. A associação de técnicas no exame coproparasitológico aumenta a sensibilidade diagnóstica, tornando o exame mais fidedigno. Deve-se ressaltar que, mesmo sendo alegado que o animal estava com a vermifugação atualizada, foram diagnosticadas duas parasitoses. Hipóteses para tal incluem protocolo inadequado de vermifugação, ausência de efeito terapêutico, ou mesmo o tutor ter dado relato falso ou incorreto.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os exames complementares são necessários para evidenciar fatores que podem não ser detectados apenas com a anamnese e exame físico do paciente, permitindo entender o quadro do paciente e definir a melhor conduta clínica. As parasitoses devem ser consideradas como diagnósticos diferenciais em quadros de diarreia e hematoquezia, devendo ser considerada mesmo em animais supostamente vermifugados quando o histórico do paciente não estiver completamente esclarecido.			
<b>REFERENCIAS</b>	MONTEIRO, SG. Parasitologia na Medicina Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. THRALL, MA. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014. VADEN, SL. Exames Laboratoriais e Procedimentos Diagnósticos em Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Roca, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14860	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Coinfecção por Ancylostoma sp. e Giardia sp. em cão			
<b>INTRODUCA O</b>	As infecções parasitárias são comuns na clínica veterinária. Como exemplos, podem ser citadas a giardiase e a ancilostomose, duas parasitoses acometendo o intestino delgado de cães e que podem ser zoonoses. A giardiase é causada pela Giardia sp., um protozoário monoxeno, cuja forma adulta, chamada de trofozoita, se fixa na parede do intestino causando lesões nas vilosidades e levando à diarreia, desidratação e perda de peso. A ancilostomose é causada pelo Ancylostoma sp., um helminto hematófago, que pode levar à anemia, diarreia e, em casos mais agudos, cansaço e dificuldade respiratória.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar os achados laboratoriais de um caso de coinfecção por Ancylostoma sp. e Giardia sp. em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, macho, Flat Coated Retriever, com 5 meses de idade, com queixa principal de diarreia com hematoquezia. O paciente fora adotado havia duas semanas, e tutor refere vermifugação, vacinação e controle de ectoparasitos atualizados. Referia normorexia com ração superpremium, normodipsia e urina sem alterações. Nega a presença de vermes nas fezes. Ao exame físico, foi observada apenas taquipneia. Foram então solicitados hemograma e coproparasitológico a base das técnicas de Willis (flutuação em solução salina saturada) e Faust (centrifugo-flutuação em sulfato de zinco 33%) para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADO S</b>	No hemograma, constatou-se anemia normocítica e normocrômica, com hematócrito 32% (referência: 37-55%), e eosinofilia em 2831/ $\mu$ L (ref.: 60-1440/ $\mu$ L). No exame coproparasitológico, foram evidenciados ovos de Ancylostoma sp. (+) e cistos e trofozoitos de Giardia sp. (++) Baseado no diagnóstico, foi instituído tratamento com probiótico e antiparasitários, havendo melhora subsequente. Os exames laboratoriais foram fundamentais para o diagnóstico. A anemia pode estar relacionada à somatória de lesões causadas pelos parasitas ao se fixarem na parede do intestino, como hemorragias ocasionadas pela agressão ao epitélio, menor absorção de ferro e, no caso de Ancylostoma sp., pela hematofagia. A anemia normocítica e normocrômica sugere quadro arregenerativo, que pode ser decorrente da inflamação e da menor disponibilidade de ferro. A eosinofilia é comumente relacionada ao combate a infecções parasitárias. A associação de técnicas no exame coproparasitológico aumenta a sensibilidade diagnóstica, tornando o exame mais fidedigno. Deve-se ressaltar que, mesmo sendo alegado que o animal estava com a vermifugação atualizada, foram diagnosticadas duas parasitoses. Hipóteses para tal incluem protocolo inadequado de vermifugação, ausência de efeito terapêutico, ou mesmo o tutor ter dado relato falso ou incorreto.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os exames complementares são necessários para evidenciar fatores que podem não ser detectados apenas com a anamnese e exame físico do paciente, permitindo entender o quadro do paciente e definir a melhor conduta clínica. As parasitoses devem ser consideradas como diagnósticos diferenciais em quadros de diarreia e hematoquezia, devendo ser considerada mesmo em animais supostamente vermifugados quando o histórico do paciente não estiver completamente esclarecido.			
<b>REFERENCIAS</b>	MONTEIRO, SG. Parasitologia na Medicina Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. THRALL, MA. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014. VADEN, SL. Exames Laboratoriais e Procedimentos Diagnósticos em Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Roca, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14860	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4331826 - NATALIA DA CUNHA NOBREGA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Coinfecção por Ancylostoma sp. e Giardia sp. em cão			
<b>INTRODUCAO</b>	As infecções parasitárias são comuns na clínica veterinária. Como exemplos, podem ser citadas a giardiase e a ancilostomose, duas parasitoses acometendo o intestino delgado de cães e que podem ser zoonoses. A giardiase é causada pela Giardia sp., um protozoário monoxeno, cuja forma adulta, chamada de trofozoita, se fixa na parede do intestino causando lesões nas vilosidades e levando à diarreia, desidratação e perda de peso. A ancilostomose é causada pelo Ancylostoma sp., um helminto hematófago, que pode levar à anemia, diarreia e, em casos mais agudos, cansaço e dificuldade respiratória.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar os achados laboratoriais de um caso de coinfecção por Ancylostoma sp. e Giardia sp. em um paciente canino atendido no HOVET-UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, macho, Flat Coated Retriever, com 5 meses de idade, com queixa principal de diarreia com hematoquezia. O paciente fora adotado havia duas semanas, e tutor refere vermifugação, vacinação e controle de ectoparasitos atualizados. Referia normorexia com ração superpremium, normodipsia e urina sem alterações. Nega a presença de vermes nas fezes. Ao exame físico, foi observada apenas taquipneia. Foram então solicitados hemograma e coproparasitológico a base das técnicas de Willis (flutuação em solução salina saturada) e Faust (centrifugo-flutuação em sulfato de zinco 33%) para maiores esclarecimentos.			
<b>RESULTADOS</b>	No hemograma, constatou-se anemia normocítica e normocrômica, com hematócrito 32% (referência: 37-55%), e eosinofilia em 2831/ $\mu$ L (ref.: 60-1440/ $\mu$ L). No exame coproparasitológico, foram evidenciados ovos de Ancylostoma sp. (+) e cistos e trofozoitos de Giardia sp. (++) Baseado no diagnóstico, foi instituído tratamento com probiótico e antiparasitários, havendo melhora subsequente. Os exames laboratoriais foram fundamentais para o diagnóstico. A anemia pode estar relacionada à somatória de lesões causadas pelos parasitas ao se fixarem na parede do intestino, como hemorragias ocasionadas pela agressão ao epitélio, menor absorção de ferro e, no caso de Ancylostoma sp., pela hematofagia. A anemia normocítica e normocrômica sugere quadro arregenerativo, que pode ser decorrente da inflamação e da menor disponibilidade de ferro. A eosinofilia é comumente relacionada ao combate a infecções parasitárias. A associação de técnicas no exame coproparasitológico aumenta a sensibilidade diagnóstica, tornando o exame mais fidedigno. Deve-se ressaltar que, mesmo sendo alegado que o animal estava com a vermifugação atualizada, foram diagnosticadas duas parasitoses. Hipóteses para tal incluem protocolo inadequado de vermifugação, ausência de efeito terapêutico, ou mesmo o tutor ter dado relato falso ou incorreto.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os exames complementares são necessários para evidenciar fatores que podem não ser detectados apenas com a anamnese e exame físico do paciente, permitindo entender o quadro do paciente e definir a melhor conduta clínica. As parasitoses devem ser consideradas como diagnósticos diferenciais em quadros de diarreia e hematoquezia, devendo ser considerada mesmo em animais supostamente vermifugados quando o histórico do paciente não estiver completamente esclarecido.			
<b>REFERENCIAS</b>	MONTEIRO, SG. Parasitologia na Medicina Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. THRALL, MA. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014. VADEN, SL. Exames Laboratoriais e Procedimentos Diagnósticos em Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Roca, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14861	Clinica Veterinária	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2972301 - ISABELLA VIEIRA FIGUEIREDO TOMAZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	Estudo Retrospectivo de 09 equinos diagnosticados com tétano atendidos no HOVET-UNISA de 2013 a 2023			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O tétano é uma enfermidade que expressa uma mortalidade em equinos entre 60 à 80%, longo período de convalescença e alto custo de tratamento, causado pelo Clostridium tetani, bactéria gram positiva produtora de neurotoxinas, com um período de incubação de 3 dias até 3 semanas. A principal forma de prevenção é a imunoprofilaxia. O diagnóstico se baseia em sinais clínicos de espasticidade muscular; dispnéia, trisma mandibular, imobilidade auricular, elevação de cauda; protrusão de terceira pálpebra associados a uma porta de entrada para o agente. O tratamento tem por objetivo neutralizar as toxinas circulantes, suas consequências e eliminar o agente. Utilizando: soro antitetânico, sedativos, tranquilizantes, miorelaxantes, penicilina e terapia de suporte. O prognóstico é reservado dependendo da cepa, quantidade de neurotoxina e estado imunológico do animal.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é descrever as principais características e evolução de nove equinos diagnosticados com tétano atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro entre 2013 e 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	Levantamento retrospectivo dos prontuários médicos de nove equinos com diagnóstico de tétano, atendidos de 2013 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Dentre os sinais clínicos observamos que 78% dos animais apresentavam rigidez muscular, 67% protrusão de terceira pálpebra, 44% cauda em bandeira, 33% trisma mandibular e 55% dos animais apresentavam 3 ou mais sintomas característicos. Evoluíram a óbito 55% dos animais e o tempo de internação variou de 21 à 31 dias nos animais que obtiveram alta. Nenhum dos animais recebeu imunoprofilaxia tetânica e 55% dos animais possuíam ferida prévia. Os animais receberam tratamento de acordo com o recomendado na literatura. Todos os animais estavam com programa de imunoprofilaxia desatualizado. A rigidez muscular e a protrusão da terceira pálpebra foram os sintomas mais observados. A taxa de mortalidade é equivalente a encontrada em outros estudos para animais não vacinados.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Observa-se que a profilaxia da doença é a forma mais eficaz de diminuir a incidência e prejuízos aos criadores, visto que a resposta ao tratamento é variável, com tempo de internação e custos elevados. O prognóstico da doença é reservado e a taxa de mortalidade alta.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>LEIRA, M. H. (#38)#8239;et al. Tétano em um Equino: Relato de Caso. (#38)#8239;Pubvet, Minas Gerais, v. 11, n. 1, 50-54, jan. 2017. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.22256/pubvet.v11n1.50-54">https://doi.org/10.22256/pubvet.v11n1.50-54</a>. Acesso em: 06 out. 2023. SOUZA, R. A. P. R. Tétano em Equinos: Uma Revisão Narrativa. (#38)#8239;PhD Scientific Review, Maranhão, v. 1, n.7, dez. 2021. Disponível em: <a href="http://www.revistaphd.periodikos.com.br/article/10.53497/phdsr1n7-002/pdf/revistaphd-01-07-20.pdf">http://www.revistaphd.periodikos.com.br/article/10.53497/phdsr1n7-002/pdf/revistaphd-01-07-20.pdf</a>. Acesso em: 06 out. 2023. RIBEIRO, M. G. et al. Tetanus in horses: an overview of 70 cases. (#38)#8239;Pesq. Vet. Bras, Botucatu, v. 38(2), 285-293, fev. 2018. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-5441">https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-5441</a>. Acesso em: 06. Out. 2023. MELO, U. P. Clinical findings and response to treatment of 17 cases of tetanus in horses (2012–2021). Brazilian Journal of Veterinary Medicine, v. 44, 2022. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.29374/2527-2179.bjvm005321">https://doi.org/10.29374/2527-2179.bjvm005321</a>. Acesso em: 18 out. 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14861	Clinica Veterinária	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3800504 - THAMIRES ALVES MURTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz	Filipe Aguera Pinheiro	
<b>TITULO</b>	Estudo Retrospectivo de 09 equinos diagnosticados com tétano atendidos no HOVET-UNISA de 2013 a 2023			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O tétano é uma enfermidade que expressa uma mortalidade em equinos entre 60 à 80%, longo período de convalescença e alto custo de tratamento, causado pelo Clostridium tetani, bactéria gram positiva produtora de neurotoxinas, com um período de incubação de 3 dias até 3 semanas. A principal forma de prevenção é a imunoprofilaxia. O diagnóstico se baseia em sinais clínicos de espasticidade muscular; dispnéia, trisma mandibular, imobilidade auricular, elevação de cauda; protrusão de terceira pálpebra associados a uma porta de entrada para o agente. O tratamento tem por objetivo neutralizar as toxinas circulantes, suas consequências e eliminar o agente. Utilizando: soro antitetânico, sedativos, tranquilizantes, miorelaxantes, penicilina e terapia de suporte. O prognóstico é reservado dependendo da cepa, quantidade de neurotoxina e estado imunológico do animal.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é descrever as principais características e evolução de nove equinos diagnosticados com tétano atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro entre 2013 e 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	Levantamento retrospectivo dos prontuários médicos de nove equinos com diagnóstico de tétano, atendidos de 2013 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>	Dentre os sinais clínicos observamos que 78% dos animais apresentavam rigidez muscular, 67% protrusão de terceira pálpebra, 44% cauda em bandeira, 33% trisma mandibular e 55% dos animais apresentavam 3 ou mais sintomas característicos. Evoluíram a óbito 55% dos animais e o tempo de internação variou de 21 à 31 dias nos animais que obtiveram alta. Nenhum dos animais recebeu imunoprofilaxia tetânica e 55% dos animais possuíam ferida prévia. Os animais receberam tratamento de acordo com o recomendado na literatura. Todos os animais estavam com programa de imunoprofilaxia desatualizado. A rigidez muscular e a protrusão da terceira pálpebra foram os sintomas mais observados. A taxa de mortalidade é equivalente a encontrada em outros estudos para animais não vacinados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Observa-se que a profilaxia da doença é a forma mais eficaz de diminuir a incidência e prejuízos aos criadores, visto que a resposta ao tratamento é variável, com tempo de internação e custos elevados. O prognóstico da doença é reservado e a taxa de mortalidade alta.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>LEIRA, M. H. (#38)#8239;et al. Tétano em um Equino: Relato de Caso.(#38)#8239;Pubvet, Minas Gerais, v. 11, n. 1, 50-54, jan. 2017. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.22256/pubvet.v11n1.50-54">https://doi.org/10.22256/pubvet.v11n1.50-54</a>. Acesso em: 06 out. 2023. SOUZA, R. A. P. R. Tétano em Equinos: Uma Revisão Narrativa.(#38)#8239;PhD Scientific Review, Maranhão, v. 1, n.7, dez. 2021. Disponível em: <a href="http://www.revistaphd.periodikos.com.br/article/10.53497/phdsr1n7-002/pdf/revistaphd-01-07-20.pdf">http://www.revistaphd.periodikos.com.br/article/10.53497/phdsr1n7-002/pdf/revistaphd-01-07-20.pdf</a>. Acesso em: 06 out. 2023. RIBEIRO, M. G. et al. Tetanus in horses: an overview of 70 cases.(#38)#8239;Pesq. Vet. Bras, Botucatu, v. 38(2), 285-293, fev. 2018. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-5441">https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-5441</a>. Acesso em: 06. Out. 2023. MELO, U. P. Clinical findings and response to treatment of 17 cases of tetanus in horses (2012–2021). Brazilian Journal of Veterinary Medicine, v. 44, 2022. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.29374/2527-2179.bjvm005321">https://doi.org/10.29374/2527-2179.bjvm005321</a>. Acesso em: 18 out. 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14862	Clinica e Cirurgia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4227841 - GABRIEL DE LUCA OCCULATE SERRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana de Paula Nhanharelli		
<b>TITULO</b>	Relato de caso: dissolução de urólitos de estruvita em um gato, com o uso de DL-metionina.			
<b>INTRODUCAO</b>	A urolitíase de estruvita é rara em gatos e frequentemente associada à dieta com proteínas de baixa digestibilidade ou ingestão de grandes quantidades de alimento por refeição, levando à alcalinização da urina. A redução da supersaturação e acidificação do pH urinário são propostas para a dissolução desse urólito. Ao contrário do que ocorre em cães, a infecção do trato urinário não tem influência direta em sua formação nos gatos. A DL-metionina é um aminoácido essencial, excretado pela via renal e eficaz na acidificação urinária.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o tratamento de urolitíase obstrutiva em um gato, com suspeita de urólitos de estruvita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Relato de um felino de 4 anos, com histórico de quadros recorrentes de doença do trato urinário inferior (DTUIF), hematúria e disúria, com presença de espessamento de bexiga, microlitíases e grande quantidade de sedimento urinário ao exame de ultrassonografia abdominal.			
<b>RESULTADOS</b>	O paciente apresentara urina com densidade de 1,042 (1,030 a 1,050), pH 6,5 (5,0 a 6,0), cristais de estruvita +++ (ausentes), hemácias em grande quantidade (ausentes) e bactérias ++ (ausentes). Azotemia (creatinina 1,7mg/dl; ref: 0,5 a 1,6mg/dl e ureia 91,9mg/dl; ref: 20 a 60mg/dl), sem demais alterações hematológicas. Bexiga espessada (0,48 cm – ref. abaixo de 0,2 cm), grande quantidade de sedimento, diversas microlitíases e dilatação uretral. Alimentação com dieta comercial. Prescrito DL-metionina 0,5mg/gato. Após 15 dias de tratamento, apresentou dissolução dos microcálculos e melhora do espessamento de bexiga e discreto sedimento. Densidade urinária (#62)1,050, pH urinário 5,0, sem azotemia. Suspenso a medicação e prescrito dieta terapêutica para redução da concentração urinária. Urólitos de fosfato amônio magnésiano, também conhecidos como estruvita, sem formam em pH alcalino e com alta concentração de minerais. Comumente associados à dietas com baixa proteína, devido à promoção da alcalinização urinária. Ingestões de grandes quantidades de alimento em poucas refeições em felinos – habituados a hábitos petiscadores – também levam à alcalinização urinária. A redução da saturação urinária é a forma mais segura de dissolução, porém em casos em que troca de dieta não é possível, o uso de acidificantes com a DL-metionina demonstrou-se viáveis para o tratamento.			
<b>CONCLUSOES</b>	A DL-metionina é uma alternativa para dissolução de urólitos de estruvita em gatos, quando não há opção de troca de dieta. Seu principal risco é a acidificação urinária e formação de oxalato de cálcio.			
<b>REFERENCIAS</b>	T. Suzuki, et al. Effects of Dietary Protein and Carbohydrate on Water Balance and Struvite Crystallization in Urine of Cats. Journal of Pet Animal Nutrition . 2003, Vol.6, No.1, p.12. FUNABA, Masayuki et al. Effect of supplementation of dry cat food with D, L-methionine and ammonium chloride on struvite activity product and sediment in urine. Journal of Veterinary Medical Science, v. 63, n. 3, p. 337-339, 2001. LULICH, J. P. et al. ACVIM small animal consensus recommendations on the treatment and prevention of uroliths in dogs and cats. Journal of veterinary internal medicine, v. 30, n. 5, p. 1564-1574, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14862	Clinica e Cirurgia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4848144 - FERNANDA ALMADA BARBOSA ZANIN MOSCA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana de Paula Nhanharelli		
<b>TITULO</b>	Relato de caso: dissolução de urólitos de estruvita em um gato, com o uso de DL-metionina.			
<b>INTRODUCAO</b>	A urolitíase de estruvita é rara em gatos e frequentemente associada à dieta com proteínas de baixa digestibilidade ou ingestão de grandes quantidades de alimento por refeição, levando à alcalinização da urina. A redução da supersaturação e acidificação do pH urinário são propostas para a dissolução desse urólito. Ao contrário do que ocorre em cães, a infecção do trato urinário não tem influência direta em sua formação nos gatos. A DL-metionina é um aminoácido essencial, excretado pela via renal e eficaz na acidificação urinária.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o tratamento de urolitíase obstrutiva em um gato, com suspeita de urólitos de estruvita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Relato de um felino de 4 anos, com histórico de quadros recorrentes de doença do trato urinário inferior (DTUIF), hematúria e disúria, com presença de espessamento de bexiga, microlitíases e grande quantidade de sedimento urinário ao exame de ultrassonografia abdominal.			
<b>RESULTADOS</b>	O paciente apresentara urina com densidade de 1,042 (1,030 a 1,050), pH 6,5 (5,0 a 6,0), cristais de estruvita +++ (ausentes), hemácias em grande quantidade (ausentes) e bactérias ++ (ausentes). Azotemia (creatinina 1,7mg/dl; ref: 0,5 a 1,6mg/dl e ureia 91,9mg/dl; ref: 20 a 60mg/dl), sem demais alterações hematológicas. Bexiga espessada (0,48 cm – ref. abaixo de 0,2 cm), grande quantidade de sedimento, diversas microlitíases e dilatação uretral. Alimentação com dieta comercial. Prescrito DL-metionina 0,5mg/gato. Após 15 dias de tratamento, apresentou dissolução dos microcálculos e melhora do espessamento de bexiga e discreto sedimento. Densidade urinária (#62)1,050, pH urinário 5,0, sem azotemia. Suspenso a medicação e prescrito dieta terapêutica para redução da concentração urinária. Urólitos de fosfato amônio magnésiano, também conhecidos como estruvita, sem formam em pH alcalino e com alta concentração de minerais. Comumente associados à dietas com baixa proteína, devido à promoção da alcalinização urinária. Ingestões de grandes quantidades de alimento em poucas refeições em felinos – habituados a hábitos petiscadores – também levam à alcalinização urinária. A redução da saturação urinária é a forma mais segura de dissolução, porém em casos em que troca de dieta não é possível, o uso de acidificantes com a DL-methionina demonstrou-se viáveis para o tratamento.			
<b>CONCLUSOES</b>	A DL-methionina é uma alternativa para dissolução de urólitos de estruvita em gatos, quando não há opção de troca de dieta. Seu principal risco é a acidificação urinária e formação de oxalato de cálcio.			
<b>REFERENCIAS</b>	T. Suzuki, et al. Effects of Dietary Protein and Carbohydrate on Water Balance and Struvite Crystallization in Urine of Cats. Journal of Pet Animal Nutrition . 2003, Vol.6, No.1, p.12. FUNABA, Masayuki et al. Effect of supplementation of dry cat food with D, L-methionine and ammonium chloride on struvite activity product and sediment in urine. Journal of Veterinary Medical Science, v. 63, n. 3, p. 337-339, 2001. LULICH, J. P. et al. ACVIM small animal consensus recommendations on the treatment and prevention of uroliths in dogs and cats. Journal of veterinary internal medicine, v. 30, n. 5, p. 1564-1574, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14862	Clinica e Cirurgia Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4848179 - LETICIA ROSKOSZ GONZALEZ	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana de Paula Nhanharelli		
<b>TITULO</b>	Relato de caso: dissolução de urólitos de estruvita em um gato, com o uso de DL-metionina.			
<b>INTRODUCAO</b>	A urolitíase de estruvita é rara em gatos e frequentemente associada à dieta com proteínas de baixa digestibilidade ou ingestão de grandes quantidades de alimento por refeição, levando à alcalinização da urina. A redução da supersaturação e acidificação do pH urinário são propostas para a dissolução desse urólito. Ao contrário do que ocorre em cães, a infecção do trato urinário não tem influência direta em sua formação nos gatos. A DL-metionina é um aminoácido essencial, excretado pela via renal e eficaz na acidificação urinária.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar o tratamento de urolitíase obstrutiva em um gato, com suspeita de urólitos de estruvita.			
<b>METODOLOGIA</b>	Relato de um felino de 4 anos, com histórico de quadros recorrentes de doença do trato urinário inferior (DTUIF), hematúria e disúria, com presença de espessamento de bexiga, microlitíases e grande quantidade de sedimento urinário ao exame de ultrassonografia abdominal.			
<b>RESULTADOS</b>	O paciente apresentara urina com densidade de 1,042 (1,030 a 1,050), pH 6,5 (5,0 a 6,0), cristais de estruvita +++ (ausentes), hemácias em grande quantidade (ausentes) e bactérias ++ (ausentes). Azotemia (creatinina 1,7mg/dl; ref: 0,5 a 1,6mg/dl e ureia 91,9mg/dl; ref: 20 a 60mg/dl), sem demais alterações hematológicas. Bexiga espessada (0,48 cm – ref. abaixo de 0,2 cm), grande quantidade de sedimento, diversas microlitíases e dilatação uretral. Alimentação com dieta comercial. Prescrito DL-metionina 0,5mg/gato. Após 15 dias de tratamento, apresentou dissolução dos microcálculos e melhora do espessamento de bexiga e discreto sedimento. Densidade urinária (#62)1,050, pH urinário 5,0, sem azotemia. Suspenso a medicação e prescrito dieta terapêutica para redução da concentração urinária. Urólitos de fosfato amônio magnésiano, também conhecidos como estruvita, sem formam em pH alcalino e com alta concentração de minerais. Comumente associados à dietas com baixa proteína, devido à promoção da alcalinização urinária. Ingestões de grandes quantidades de alimento em poucas refeições em felinos – habituados a hábitos petiscadores – também levam à alcalinização urinária. A redução da saturação urinária é a forma mais segura de dissolução, porém em casos em que troca de dieta não é possível, o uso de acidificantes com a DL-methionina demonstrou-se viáveis para o tratamento.			
<b>CONCLUSOES</b>	A DL-methionina é uma alternativa para dissolução de urólitos de estruvita em gatos, quando não há opção de troca de dieta. Seu principal risco é a acidificação urinária e formação de oxalato de cálcio.			
<b>REFERENCIAS</b>	T. Suzuki, et al. Effects of Dietary Protein and Carbohydrate on Water Balance and Struvite Crystallization in Urine of Cats. Journal of Pet Animal Nutrition . 2003, Vol.6, No.1, p.12. FUNABA, Masayuki et al. Effect of supplementation of dry cat food with D, L-methionine and ammonium chloride on struvite activity product and sediment in urine. Journal of Veterinary Medical Science, v. 63, n. 3, p. 337-339, 2001. LULICH, J. P. et al. ACVIM small animal consensus recommendations on the treatment and prevention of uroliths in dogs and cats. Journal of veterinary internal medicine, v. 30, n. 5, p. 1564-1574, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14863	Serviço Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4563379 - RAFAELLA MOREIRA DA SILVA CORREIA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	O EMPOBRECIMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS NO PERÍODO PANDÊMICO POR COVID 19 E O PAPEL DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, AUXÍLIO BRASIL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O empobrecimento das famílias brasileiras é destacado como um problema social que se intensificou durante a pandemia devido às medidas de isolamento social e à redução das atividades econômicas. Observa que essa questão afeta não apenas pessoas em situação de rua, mas também a população negra, especialmente as mulheres, que foram as mais impactadas. Discute-se também o papel do capitalismo no empobrecimento, apontando a concentração de riqueza nas mãos de poucos indivíduos e empresas como uma das causas da desigualdade. A pandemia aumentou o número de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza. A pesquisa planejada analisará como as famílias empobrecem, levando em consideração as diversas faces do capitalismo, as mudanças no mundo do trabalho e os benefícios de transferência de renda. O autor destaca a importância do programa Auxílio Brasil (anteriormente Bolsa Família) como uma política de combate à pobreza, mas ressalta a necessidade de avaliar sua eficácia e as condicionalidades associadas.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>- Analisar o papel do Auxílio Brasil no combate ao empobrecimento das famílias durante a pandemia; - Contextualizar as mudanças no mundo do trabalho e os conceitos de renda e insegurança alimentar; - Examinar como os benefícios e programas de transferência de renda foram implementados como agentes na superação da pobreza.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de pesquisa qualitativa, com caráter exploratório, com o intuito de analisar e compreender o papel do Auxílio Brasil, maior programa de transferência de renda vigente no nosso país, com vistas a estimular a emancipação das famílias para que alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social, no combate ao empobrecimento das famílias brasileiras. A pesquisa contará com pesquisas bibliográficas, em que utilizaremos artigos científicos, livros, dissertações e documentações oficiais que vão de encontro com o tema supracitado. A abordagem teórica será o materialismo histórico dialético, que permite que olhemos para a sociedade entendendo que a mesma é passível a altas modificações sociais, históricas e culturais.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os resultados parciais apontam que o empobrecimento das famílias brasileiras residentes na Zona Sul de São Paulo durante o período pandêmico é um reflexo direto das consequências socioeconômicas do capitalismo e do impacto da crise sanitária no mercado de trabalho.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>Os dados preliminares apontam que a pandemia do coronavírus trouxe uma série de desafios para as famílias brasileiras, especialmente aquelas que já estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O fechamento de estabelecimentos comerciais, a diminuição da oferta de empregos e a necessidade de isolamento social resultaram em demissões em massa e redução de renda para muitos trabalhadores.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>GERMAN, C. B.; Medeiros, M. R. A.; Programa Bolsa Família, Auxílio Emergencial e Auxílio Brasil: a pobreza como foco. 2022, 47481 p. (Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos) – Universidade Católica de Pelotas, RS. 2022. MONTALI, L.; Família e trabalho na reestruturação produtiva: ausência de políticas de emprego e deterioração das condições de vida. 2000, 71 p. (Revista brasileira de Ciências Sociais) – 2000, v. 15. Epub. 2000. IAMAMOTO, M.V.; Serviço Social em tempo de capital fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão social. 9.ed. São Paulo: Cortez, 2007</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14866	História	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4371739 - RAFAEL ARAUJO SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	RAP EM SALA DE AULA: HISTÓRIA ENTRE RIMAS			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Aprender História pode ser transformador, principalmente quando se observa ou se percebe que tudo é ou pode ser História. A presente pesquisa utiliza como fonte o rap nacional que pode servir como uma opção para se trabalhar em sala ou em outros espaços escolares, utilizando como um material de apoio para se estudar.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Analisar possibilidades de se estudar História em sala de aula, de maneira que a disciplina possa se tornar algo mais interessante ao aluno, eliminando a ideia de que História é decorar nomes, datas e locais. E que determinadas problematizações abordadas podem se transformar em discussões, opiniões e pontos de vista distintos para aquela mesma problematização abordada.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Baseando-se nas letras que o rap fornece junto a livros didáticos analisaremos momentos históricos dos quais são discutidos na disciplina de História no 8º ano.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Tornar a aula mais atrativa ou interessante é um desafio diário do professor, e o uso de determinados recursos pode ser uma boa opção para diferenciar e atrair o aluno. Mas requer preparo e planejamento como em qualquer outra aula, porém, com um certo cuidado pois se trata de usar duas mais ou mais fontes distintas das quais se cruzavam e a informação central pode acabar sendo pouco explorada.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>O rap pode funcionar como fonte da qual colabora para a formação e criação de planejamentos para aulas, principalmente para aquelas que podem ser consideradas menos tradicionais, o que pode significar uma aula com uso de música, ou até mesmo fora da sala de aula sem o uso de lousa explorando novos recursos. Exemplo prático, no livro didático de História produzido pela a Inspire em 2018 na página 97 com título "A elite conspira" e na página 98 com o título "O plano fracassa", são apresentados textos para leitura e pinturas para contemplar aspectos variados sobre a Inconfidência Mineira. Na música América Latina escrita e cantada pelo o Fabio Brazza tem um certo trecho que retrata o mesmo tema "Efeito deletério corrompeu nossa terra/Esvaziou nosso cofre e encheu nosso cemitério/Mas pra cada Joaquim José da Silva Xavier/Ainda existe um Joaquim Silvério". Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, é lembrado até hoje pelo feito e também pelo feriado do dia 21 de abril, data essa que representa a sua morte, e na moeda de 5 centavos é o seu rosto que está gravado. Joaquim Silvério citado foi o responsável em entregar os planos feitos pelos os inconfidentes para a coroa portuguesa, da qual puniu Tiradentes à forca e o esquartejou, como exemplo a não ser seguido.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>AZEVEDO, Gislane; SERIACOPI, Reinaldo. Inspire História. São Paulo: FTD, 2018. Disponível no link: <a href="https://issuu.com/editoraftd/docs/inspire-historia-mp-8_divulgacao_b1a6c0891d6846">https://issuu.com/editoraftd/docs/inspire-historia-mp-8_divulgacao_b1a6c0891d6846</a> FABIO BRAZZA, América Latina, Independente, 2018. 4:15 min. Disponível no link: Fabio Brazza - América Latina (DVD Colírio da Cólera) SANTOS, M. Educação e culturas juvenis: O rap no contexto escolar, Cascavel, PR, 2018. Disponível no link: ARQUIVO FINAL DISSERTAÇÃO Mayara dos Santos.pdf</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14867	Direito Penal	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4012232 - MILENA HAMAGUCHI BONFIM		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato Watanabe de Moraes		
<b>TITULO</b>	O tratamento jurídico penal brasileiro ao tráfico internacional de mulheres para fins sexuais através da promessa de um sonho			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Pouco se fala sobre o quão difícil se torna a vida da mulher que busca melhorar de vida em outro país e são traficadas por acharem que conseguiram a vida ideal, seja em busca de empregos ou encontrando um amor. É imposto que a busca por uma qualidade de vida dá-se através de encontrar a oportunidade que faltava, o desespero de ter um conforto faz com que sejam alvos mais fáceis de serem captadas. Diariamente as mulheres são colocadas em situações precárias por acreditarem que a promessa de melhorar de vida era real, que aquele amor era real, que aquele emprego era real. Foram convencidas de que a vida planejada por elas era real, mas no ato, tudo mudou e foram vítimas de tráfico internacional para fins sexuais. É preciso trazer em pauta a fragilidade na punição desses casos, o que nosso judiciário debate e qual é o foco para que isso diminua a cada ano? Tratados internacionais e políticas públicas estão sendo suficientes?</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O objetivo desse trabalho é trazer ao conhecimento do leitor, a importância de políticas públicas para que diminua a cada ano o tráfico internacional de mulher para fins sexuais através da promessa de um sonho, não há mais espaço em nossa sociedade para continuar comercializando o corpo da mulher. Os homens precisam sempre exercer o poder sobre os corpos das mulheres, não é à toa que os casos de tráfico internacional de mulheres para fins sexuais subiram nos últimos anos, conforme dados de 2021 retirados da OIM, a Agência da ONU para as Migrações.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Este artigo científico, iniciado em agosto de 2023 e segue em produção, com foco em decisões judiciais, tratados internacionais e políticas públicas para diminuir o tráfico internacional de mulheres. Análise de casos concretos em que vítimas foram salvas de seus traficantes através de seus depoimentos pessoais no consulado.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>As pesquisas apontam como mulheres um alvo mais fácil para o tráfico internacional para fins sexuais, na pesquisa de 2021, de 714 vítimas, 688 foram mulheres, aproximadamente 96,36%. O Brasil é o país estudado em que as vítimas são aproximadamente 85,99% e as demais são de outras nacionalidades ou não tiveram suas nacionalidades identificadas.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Diante as informações expostas na pesquisa científica, entende-se o quão frágil estão nossas políticas públicas em relação ao o tráfico internacional de mulheres para fins sexuais. Pouco se fala sobre como essa fragilidade impulsiona aos traficantes internacionais continuar cometendo seus crimes sem a possibilidade de punição. O Brasil se tornou um alvo muito eficaz aos criminosos, o problema é estatal e social.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>ANNONI, Danielle; CANEPARO, Priscila; CARDOSO, Arisa R. Tráfico de Pessoas: uma análise a partir da Convenção de Palermo. (Coleção Universidade Católica de Brasília). São Paulo: Grupo Almedina (Portugal), 2022. RODRIGUES, Thaís de C. Tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, 1ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14868	Serviço Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4400011 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS SERRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Vanessa Lopes de Almeida	Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro	
<b>TITULO</b>	O TRABALHO PRECARIZADO DAS MULHERES PERIFÉRICAS E AS DIFICULDADES DE ACESSO À UNIVERSIDADE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Refletir sobre a participação das mulheres no processo de construção da sociedade, e entender as contradições que envolvem sua força de trabalho. Levando em consideração que as mulheres exercem atividades laborais no ambiente público e são as maiores responsáveis pelo trabalho de manutenção do patriarcado dentro do ambiente privado, entendemos a importância da discussão, onde o foco está em compreender por quais motivos mulheres, com ênfase para as que vivem nas periferias, acessam os cursos universitários de forma tardia, quando o acessam. O tema é relevante para as pesquisas em Serviço Social, uma vez que ao analisar as condições concretas de vida dessas mulheres pode resultar em contribuições importantes para criação de subsídios e políticas públicas que resultem na viabilização do direito a educação superior e seu acesso.			
<b>OBJETIVOS</b>	- Compreender a interceção entre o trabalho precarizado e o trabalho não remunerado das mulheres que vivem na periferia, e quais são os impactos que essa relação pode causar no que diz respeito ao acesso à educação, em especial cursos de formação superior.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, com o objetivo de analisar e entender por qual razão grande parte das mulheres periféricas encontra empecilhos para acessar cursos de graduação ou por qual motivo isso acontece de forma tardia, principalmente quando essa comparação é feita em relação aos homens. Serão utilizados recursos bibliográficos, como livros, artigos, monografias e teses que discutam o assunto e possibilitem reflexão sobre o tema abordado. A pesquisa bibliográfica utilizará fontes constituídas por material já elaborado, composto por artigos científicos e livros de autores marxistas, que utilizam o materialismo histórico dialético em suas análises.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados parciais apontam que principalmente as mulheres periféricas em sua maioria são as responsáveis em prover o sustento de seus lares, sendo assim, acabam exercendo jornadas exaustivas em seu trabalho remunerado, trabalho esse muitas vezes precarizado e realizado de modo informalmente, como é o caso de muitas diaristas, babás e cuidadoras de idosos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os dados preliminares apontam que as mulheres têm ocupado cada vez mais os espaços de trabalho, se dividindo para cumprir todas as tarefas que lhe são impostas, elas tem se afastado cada vez mais dos cursos universitários, isso acaba por contribuir com a manutenção de um sistema cada vez mais desigual. E			
<b>REFERENCIAS</b>	BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: os limites da democracia no Brasil. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2018. FEDERICI, Silvia. O patriarcado do salário: notas sobre Marx, gênero e feminismo. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2021. HOOKS, bell. E eu não sou uma mulher ? Mulheres negras e feminismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14870	História	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577868 - NICOLE PASSOS SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	CURRÍCULO PAULISTA: UMA ANÁLISE DO ESTUDO ÉTNICO-RACIAL NO ENSINO MÉDIO EM HISTÓRIA			
<b>INTRODUCAO</b>	Sobre a vigência do Currículo Paulista em 2019, as mudanças contribuem para o avanço educacional ao uso da tecnologia em aula. No entanto, em sua prática, nas séries do Ensino Médio, especificando a matéria de História, o currículo passa por transições voltadas a necessidade em aprimorar o saber científico, incluindo conhecimentos que carregam a importância social.			
<b>OBJETIVOS</b>	a presente pesquisa busca analisar o documento na matéria de história, tratando com base nos artigos e biografias sobre o tema, de como surgiu a homologação e quais são as visões reais do documento na experiência dos docentes em História. Além do mais, a pesquisa busca contextualizar a visão do saber histórico étnico-racial. Em sua parte final, será exposta a experiência com a Residência Pedagógica da CAPES, no intuito de contextualizar como os projetos são uma opção fundamentada para a participação coletiva, uma vez que o estudo busca destrinchar as vivências particulares como parte do aprendizado histórico.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa foi construída em função das informações mais relevantes, como: Ensino de História no Novo Currículo e o modelo que aborda a questão étnico-racial para os jovens do Estado de São Paulo, assimilando a visão dos docentes. Contaremos com a experiência dos alunos da Escola República do Panamá, na região Sul de São Paulo, onde se obteve o desenvolvimento e do Projeto voltado para o Reconhecimento e Pertencimento Racial na matéria em História.			
<b>RESULTADOS</b>	O documento apresenta a não aprovação das redes públicas em meio a polêmica do MEC e o material 100% digital. Na matéria de História do Ensino Médio, é apresentado objetivos que não condizem com a pluralidade étnica. A profundidade do debate é discutida a medida que encontramos as divergências entre o Currículo Paulista com o docente. O documento demonstra intenção de reformular o antigo currículo no aspecto profissional, inserindo a tecnologia de maneira superficial. O eurocentrismo como referência de aprendizado ainda é priorizado.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base dos fatos apresentados, a resolução obtida parcialmente do Currículo Paulista em História para as séries do Ensino Médio, é possível identificar que os objetivos do documento não corresponde a realidade, visto que, as matérias trabalhadas requerem tempo para aprofundar as temáticas étnicas, o que a cada bimestre letivo, fica impossível de ser contemplado. O documento, seguido pelos docentes, não oferece referência para o aluno compreender a racialização, tampouco, busca trazer o pertencimento, voltando seu interesse para o mercado neoliberal, não conferindo qualidade pedagógica do material.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins de et al. Manifesto: crítica às reformas neoliberais na educação. 1a. ed. Marília: Lutas Anticapital, v. 1, 2021. SOUZA, Bia Dias Barbosa De, e Alessandra David. O Ensino De História No Currículo Paulista: Uma Análise Dos Cadernos Do Professor. História (#38) Ensino 24.1 (2018): 63. TEIXEIRA JÚNIOR, J. C. Por uma afro-cotidianidade na educação escolar. Revista Currículo sem Fronteiras , v. 13, n. 2, p. 307-319, maio/ago. 2013.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14871	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3168981 - LUANA LOPES PATENTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico laboratorial de Mycobacterium sp. em nódulo subcutâneo de paciente canino			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A micobacteriose é uma infecção causada por bacilos-álcool-ácido-resistentes (BAAR) do gênero Mycobacterium sp.. Essa doença pode se apresentar na forma tuberculosa, quando é transmitida pela via respiratória, por aerossóis, causando o que conhecemos como tuberculose. No entanto, pode se apresentar em uma forma não tuberculosa, forma menos agressiva da doença causada por um grupo específico de micobactérias. Essa forma pode ser transmitida por meio de lesões cutâneas, picadas de insetos ou inoculação durante brigas, sendo que seus principais sinais clínicos são nodulações piogranulomatosas, normalmente em região de cabeça, pavilhão auricular e membros, sem demais alterações sistêmicas. Estas nodulações tendem a ser firmes, alopecicas e circunscritas. Essa afecção é normalmente relatada em regiões mais tropicais e, apesar de pouco comuns, podem acometer pequenos animais. O diagnóstico pode ser feito pela evidência de agentes característicos em exames de citopatologia ou histopatologia.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de diagnóstico citológico de Mycobacterium sp. não tuberculosa em um paciente canino atendido no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, fêmea, SRD, 3 anos, castrada, sem acesso à rua e em bom estado geral, porém com queixa de formações em região de dorso e membro pélvico. Foi realizada citologia aspirativa por agulha fina de ambos os nódulos para maiores esclarecimentos. O procedimento é realizada pela punção do nódulo com uma agulha hipodérmica de 22G, realizando movimentos de leque no interior da lesão, seguido pela disposição do material coletado em lâmina de vidro e confecção pela metodologia "Squash". As lâminas foram coradas inicialmente com corante panótico rápido para avaliação microscópica.			
<b>RESULTADO S</b>	À microscopia, foi possível observar moderada celularidade, representada por células inflamatórias, com predomínio de macrófagos epitelioides, seguidos por neutrófilos, plasmócitos e células gigantes multinucleadas. Em maior aumento, notou-se moderada quantidade de imagens negativas de estruturas bacilares dentro do citoplasma de macrófagos. Também se notaram algumas células fusiformes, de citoplasma moderadamente basofílico, núcleo ovalado e nucléolos indistintos, sugerindo presença de fibroblastos reativos. Devido aos achados, instituiu-se a suspeita de micobacteriose, visto que BAAR não coram em colorações convencionais. Dessa forma, as amostras foram submetidas à coloração de Ziehl-Neelsen, a qual confirmou a presença de BAAR fortemente corados de vermelho, em quantidades variáveis, no interior de macrófagos.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Diferentemente da forma tuberculosa, o granuloma leproide canino é uma afecção não tuberculosa e, portanto, menos agressiva. Devido aos poucos relatos em literatura, pode ser considerada uma doença subdiagnosticada e deve ser considerada como um possível diagnóstico diferencial para pacientes que apresentem nodulações com as mesmas características citadas, levando sempre em consideração o histórico e o nicho ambiental onde este paciente está inserido.			
<b>REFERENCIA S</b>	DOLEJAL, C. Micobacteriose disseminada em cão - relato de caso de antroponose, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. JÚNIOR, FAC. et al. Síndrome do granuloma leproide em um cão na cidade de Pelotas: Relato de caso. PUBVET, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 1 - 4, Mar., 2019. RIBEIRO, DSF et al. Granuloma leproide canino em Mineiros região Centro-Oeste do Brasil. Acta Scientiae Veterinariae, [S. l.], jan. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14871	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico laboratorial de Mycobacterium sp. em nódulo subcutâneo de paciente canino			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A micobacteriose é uma infecção causada por bacilos-álcool-ácido-resistentes (BAAR) do gênero Mycobacterium sp.. Essa doença pode se apresentar na forma tuberculosa, quando é transmitida pela via respiratória, por aerossóis, causando o que conhecemos como tuberculose. No entanto, pode se apresentar em uma forma não tuberculosa, forma menos agressiva da doença causada por um grupo específico de micobactérias. Essa forma pode ser transmitida por meio de lesões cutâneas, picadas de insetos ou inoculação durante brigas, sendo que seus principais sinais clínicos são nodulações piogranulomatosas, normalmente em região de cabeça, pavilhão auricular e membros, sem demais alterações sistêmicas. Estas nodulações tendem a ser firmes, alopecicas e circunscritas. Essa afecção é normalmente relatada em regiões mais tropicais e, apesar de pouco comuns, podem acometer pequenos animais. O diagnóstico pode ser feito pela evidênciação de agentes característicos em exames de citopatologia ou histopatologia.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de diagnóstico citológico de Mycobacterium sp. não tuberculosa em um paciente canino atendido no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, fêmea, SRD, 3 anos, castrada, sem acesso à rua e em bom estado geral, porém com queixa de formações em região de dorso e membro pélvico. Foi realizada citologia aspirativa por agulha fina de ambos os nódulos para maiores esclarecimentos. O procedimento é realizada pela punção do nódulo com uma agulha hipodérmica de 22G, realizando movimentos de leque no interior da lesão, seguido pela disposição do material coletado em lâmina de vidro e confecção pela metodologia "Squash". As lâminas foram coradas inicialmente com corante panótico rápido para avaliação microscópica.			
<b>RESULTADO S</b>	À microscopia, foi possível observar moderada celularidade, representada por células inflamatórias, com predomínio de macrófagos epitelioides, seguidos por neutrófilos, plasmócitos e células gigantes multinucleadas. Em maior aumento, notou-se moderada quantidade de imagens negativas de estruturas bacilares dentro do citoplasma de macrófagos. Também se notaram algumas células fusiformes, de citoplasma moderadamente basofílico, núcleo ovalado e nucléolos indistintos, sugerindo presença de fibroblastos reativos. Devido aos achados, instituiu-se a suspeita de micobacteriose, visto que BAAR não coram em colorações convencionais. Dessa forma, as amostras foram submetidas à coloração de Ziehl-Neelsen, a qual confirmou a presença de BAAR fortemente corados de vermelho, em quantidades variáveis, no interior de macrófagos.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Diferentemente da forma tuberculosa, o granuloma leproide canino é uma afecção não tuberculosa e, portanto, menos agressiva. Devido aos poucos relatos em literatura, pode ser considerada uma doença subdiagnosticada e deve ser considerada como um possível diagnóstico diferencial para pacientes que apresentem nodulações com as mesmas características citadas, levando sempre em consideração o histórico e o nicho ambiental onde este paciente está inserido.			
<b>REFERENCIA S</b>	DOLEJAL, C. Micobacteriose disseminada em cão - relato de caso de antropozoonose, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. JÚNIOR, FAC. et al. Síndrome do granuloma leproide em um cão na cidade de Pelotas: Relato de caso. PUBVET, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 1 - 4, Mar., 2019. RIBEIRO, DSF et al. Granuloma leproide canino em Mineiros região Centro-Oeste do Brasil. Acta Scientiae Veterinariae, [S. l.], jan. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14871	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3534634 - GIOVANNA FUNISCHELLO DE SOUSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Diagnóstico laboratorial de Mycobacterium sp. em nódulo subcutâneo de paciente canino			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A micobacteriose é uma infecção causada por bacilos-álcool-ácido-resistentes (BAAR) do gênero Mycobacterium sp.. Essa doença pode se apresentar na forma tuberculosa, quando é transmitida pela via respiratória, por aerossóis, causando o que conhecemos como tuberculose. No entanto, pode se apresentar em uma forma não tuberculosa, forma menos agressiva da doença causada por um grupo específico de micobactérias. Essa forma pode ser transmitida por meio de lesões cutâneas, picadas de insetos ou inoculação durante brigas, sendo que seus principais sinais clínicos são nodulações piogranulomatosas, normalmente em região de cabeça, pavilhão auricular e membros, sem demais alterações sistêmicas. Estas nodulações tendem a ser firmes, alopecicas e circunscritas. Essa afecção é normalmente relatada em regiões mais tropicais e, apesar de pouco comuns, podem acometer pequenos animais. O diagnóstico pode ser feito pela evidência de agentes característicos em exames de citopatologia ou histopatologia.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de diagnóstico citológico de Mycobacterium sp. não tuberculosa em um paciente canino atendido no Hospital Veterinário UNISA.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi atendido um paciente canino, fêmea, SRD, 3 anos, castrada, sem acesso à rua e em bom estado geral, porém com queixa de formações em região de dorso e membro pélvico. Foi realizada citologia aspirativa por agulha fina de ambos os nódulos para maiores esclarecimentos. O procedimento é realizada pela punção do nódulo com uma agulha hipodérmica de 22G, realizando movimentos de leque no interior da lesão, seguido pela disposição do material coletado em lâmina de vidro e confecção pela metodologia "Squash". As lâminas foram coradas inicialmente com corante panótico rápido para avaliação microscópica.			
<b>RESULTADO S</b>	À microscopia, foi possível observar moderada celularidade, representada por células inflamatórias, com predomínio de macrófagos epitelioides, seguidos por neutrófilos, plasmócitos e células gigantes multinucleadas. Em maior aumento, notou-se moderada quantidade de imagens negativas de estruturas bacilares dentro do citoplasma de macrófagos. Também se notaram algumas células fusiformes, de citoplasma moderadamente basofílico, núcleo ovalado e nucléolos indistintos, sugerindo presença de fibroblastos reativos. Devido aos achados, instituiu-se a suspeita de micobacteriose, visto que BAAR não coram em colorações convencionais. Dessa forma, as amostras foram submetidas à coloração de Ziehl-Neelsen, a qual confirmou a presença de BAAR fortemente corados de vermelho, em quantidades variáveis, no interior de macrófagos.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Diferentemente da forma tuberculosa, o granuloma leproide canino é uma afecção não tuberculosa e, portanto, menos agressiva. Devido aos poucos relatos em literatura, pode ser considerada uma doença subdiagnosticada e deve ser considerada como um possível diagnóstico diferencial para pacientes que apresentem nodulações com as mesmas características citadas, levando sempre em consideração o histórico e o nicho ambiental onde este paciente está inserido.			
<b>REFERENCIA S</b>	DOLEJAL, C. Micobacteriose disseminada em cão - relato de caso de antropozoonose, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. JÚNIOR, FAC. et al. Síndrome do granuloma leproide em um cão na cidade de Pelotas: Relato de caso. PUBVET, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 1 - 4, Mar., 2019. RIBEIRO, DSF et al. Granuloma leproide canino em Mineiros região Centro-Oeste do Brasil. Acta Scientiae Veterinariae, [S. l.], jan. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14873	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4290275 - CAMILA DE JESUS SOUSA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa		
<b>TITULO</b>	DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Existem muitas razões que levam as pessoas a abrirem seu próprio negócio, assumindo os riscos que essa ação traz. Quando conseguem obter sucesso em seu negócio, esses empreendedores conquistam independência financeira, além da satisfação de ser dono de seu próprio negócio. Todavia, muitos negócios acabam não alcançando o sucesso, por diversos fatores internos e externos. (CHIAVENATO, 2021) No Brasil, em 2022, as mulheres representavam 45,4% dos empreendedores nascentes; porém, quando analisado o quadro de empreendedores estabelecidos, essa proporção cai para 33,7%. O que revela dificuldades para as empreendedoras sustentarem o seu negócio ao longo do tempo. (SEBRAE, 2023). Essa conclusão é confirmada pelo Relatório do Empreendedorismo Feminino no Brasil (SEBRAE, 2019), que revela uma taxa de conversão de Empreendedoras em Donas de Negócios 40% mais baixa que a de empreendedores masculinos. Enquanto a cada 10 homens empreendedores, 6,5 se tornam donos de negócios; essa proporção é 3,9 a cada 10 para as mulheres empreendedoras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar as dificuldades adicionais que se apresentam no contexto do empreendedorismo feminino.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental. Dados obtidos em pesquisas à internet, de 15/08 a 10/10/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os desafios ao empreendedorismo feminino estão associados às questões de gênero e aos estereótipos acerca do papel da mulher na sociedade. Os dados mostram como principais fatores: Atribuição da responsabilidade pelos cuidados da família e manutenção da casa; acúmulo de responsabilidades, dificuldade de dedicação de tempo à gestão do negócio. Gerou uma queda na proporção de mulheres no empreendedorismo durante a pandemia. Dificuldades de financiamento, recursos mais caros: taxas de juros maiores que empreendedores masculinos: 34,6% a.a. versus 31,1% a.a., apesar de apresentarem taxas de inadimplência menores: 3,7% versus 4,2%. Mulheres chefes de família representam 45% das empreendedoras, empreendem mais por necessidade: 32% dos homens eram empreendedores por necessidade, mulheres representavam 55%. Empreendedorismo por oportunidade apresenta chances maiores de sucesso. Baixa diversificação de negócios: 60% dos negócios em beleza, moda e alimentação, setores culturalmente aceitos para a mulher. Baixo acesso a programas de apoio e investimentos: programas de aceleração com 20% das empreendedoras e 32% para homens; investimentos 22% para mulheres e 29% para homens. Reduz possibilidade de obter escala no negócio.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A desigualdade de gênero cria obstáculos significativos ao empreendedorismo feminino, refletindo o sistema patriarcal e machista ainda predominante na sociedade brasileira. Os papéis e responsabilidades atribuídos à mulher reduzem as condições adequadas para exercer o papel de empreendedora. Também resulta em uma desvalorização de ideias de negócios propostas por mulheres, bem como na redução da credibilidade na sua competência como gestora de negócio. Trata-se de fatores resultantes de questões culturais, que incluem barreiras adicionais à expansão do empreendedorismo feminino.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2021. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Empreendedorismo Feminino no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2019. GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14873	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4325273 - ANA GABRIELLA OLIVEIRA GOMES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa		
<b>TITULO</b>	DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Existem muitas razões que levam as pessoas a abrirem seu próprio negócio, assumindo os riscos que essa ação traz. Quando conseguem obter sucesso em seu negócio, esses empreendedores conquistam independência financeira, além da satisfação de ser dono de seu próprio negócio. Todavia, muitos negócios acabam não alcançando o sucesso, por diversos fatores internos e externos. (CHIAVENATO, 2021) No Brasil, em 2022, as mulheres representavam 45,4% dos empreendedores nascentes; porém, quando analisado o quadro de empreendedores estabelecidos, essa proporção cai para 33,7%. O que revela dificuldades para as empreendedoras sustentarem o seu negócio ao longo do tempo. (SEBRAE, 2023). Essa conclusão é confirmada pelo Relatório do Empreendedorismo Feminino no Brasil (SEBRAE, 2019), que revela uma taxa de conversão de Empreendedoras em Donas de Negócios 40% mais baixa que a de empreendedores masculinos. Enquanto a cada 10 homens empreendedores, 6,5 se tornam donos de negócios; essa proporção é 3,9 a cada 10 para as mulheres empreendedoras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar as dificuldades adicionais que se apresentam no contexto do empreendedorismo feminino.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental. Dados obtidos em pesquisas à internet, de 15/08 a 10/10/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os desafios ao empreendedorismo feminino estão associados às questões de gênero e aos estereótipos acerca do papel da mulher na sociedade. Os dados mostram como principais fatores: Atribuição da responsabilidade pelos cuidados da família e manutenção da casa; acúmulo de responsabilidades, dificuldade de dedicação de tempo à gestão do negócio. Gerou uma queda na proporção de mulheres no empreendedorismo durante a pandemia. Dificuldades de financiamento, recursos mais caros: taxas de juros maiores que empreendedores masculinos: 34,6% a.a. versus 31,1% a.a., apesar de apresentarem taxas de inadimplência menores: 3,7% versus 4,2%. Mulheres chefes de família representam 45% das empreendedoras, empreendem mais por necessidade: 32% dos homens eram empreendedores por necessidade, mulheres representavam 55%. Empreendedorismo por oportunidade apresenta chances maiores de sucesso. Baixa diversificação de negócios: 60% dos negócios em beleza, moda e alimentação, setores culturalmente aceitos para a mulher. Baixo acesso a programas de apoio e investimentos: programas de aceleração com 20% das empreendedoras e 32% para homens; investimentos 22% para mulheres e 29% para homens. Reduz possibilidade de obter escala no negócio.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A desigualdade de gênero cria obstáculos significativos ao empreendedorismo feminino, refletindo o sistema patriarcal e machista ainda predominante na sociedade brasileira. Os papéis e responsabilidades atribuídos à mulher reduzem as condições adequadas para exercer o papel de empreendedora. Também resulta em uma desvalorização de ideias de negócios propostas por mulheres, bem como na redução da credibilidade na sua competência como gestora de negócio. Trata-se de fatores resultantes de questões culturais, que incluem barreiras adicionais à expansão do empreendedorismo feminino.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2021. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Empreendedorismo Feminino no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2019. GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14873	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4390041 - FABRICIO SOARES DE SANTANA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa		
<b>TITULO</b>	DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Existem muitas razões que levam as pessoas a abrirem seu próprio negócio, assumindo os riscos que essa ação traz. Quando conseguem obter sucesso em seu negócio, esses empreendedores conquistam independência financeira, além da satisfação de ser dono de seu próprio negócio. Todavia, muitos negócios acabam não alcançando o sucesso, por diversos fatores internos e externos. (CHIAVENATO, 2021) No Brasil, em 2022, as mulheres representavam 45,4% dos empreendedores nascentes; porém, quando analisado o quadro de empreendedores estabelecidos, essa proporção cai para 33,7%. O que revela dificuldades para as empreendedoras sustentarem o seu negócio ao longo do tempo. (SEBRAE, 2023). Essa conclusão é confirmada pelo Relatório do Empreendedorismo Feminino no Brasil (SEBRAE, 2019), que revela uma taxa de conversão de Empreendedoras em Donas de Negócios 40% mais baixa que a de empreendedores masculinos. Enquanto a cada 10 homens empreendedores, 6,5 se tornam donos de negócios; essa proporção é 3,9 a cada 10 para as mulheres empreendedoras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar as dificuldades adicionais que se apresentam no contexto do empreendedorismo feminino.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental. Dados obtidos em pesquisas à internet, de 15/08 a 10/10/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os desafios ao empreendedorismo feminino estão associados às questões de gênero e aos estereótipos acerca do papel da mulher na sociedade. Os dados mostram como principais fatores: Atribuição da responsabilidade pelos cuidados da família e manutenção da casa; acúmulo de responsabilidades, dificuldade de dedicação de tempo à gestão do negócio. Gerou uma queda na proporção de mulheres no empreendedorismo durante a pandemia. Dificuldades de financiamento, recursos mais caros: taxas de juros maiores que empreendedores masculinos: 34,6% a.a. versus 31,1% a.a., apesar de apresentarem taxas de inadimplência menores: 3,7% versus 4,2%. Mulheres chefes de família representam 45% das empreendedoras, empreendem mais por necessidade: 32% dos homens eram empreendedores por necessidade, mulheres representavam 55%. Empreendedorismo por oportunidade apresenta chances maiores de sucesso. Baixa diversificação de negócios: 60% dos negócios em beleza, moda e alimentação, setores culturalmente aceitos para a mulher. Baixo acesso a programas de apoio e investimentos: programas de aceleração com 20% das empreendedoras e 32% para homens; investimentos 22% para mulheres e 29% para homens. Reduz possibilidade de obter escala no negócio.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A desigualdade de gênero cria obstáculos significativos ao empreendedorismo feminino, refletindo o sistema patriarcal e machista ainda predominante na sociedade brasileira. Os papéis e responsabilidades atribuídos à mulher reduzem as condições adequadas para exercer o papel de empreendedora. Também resulta em uma desvalorização de ideias de negócios propostas por mulheres, bem como na redução da credibilidade na sua competência como gestora de negócio. Trata-se de fatores resultantes de questões culturais, que incluem barreiras adicionais à expansão do empreendedorismo feminino.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2021. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Empreendedorismo Feminino no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2019. GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14873	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4403932 - NAILANE SILVA FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa		
<b>TITULO</b>	DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Existem muitas razões que levam as pessoas a abrirem seu próprio negócio, assumindo os riscos que essa ação traz. Quando conseguem obter sucesso em seu negócio, esses empreendedores conquistam independência financeira, além da satisfação de ser dono de seu próprio negócio. Todavia, muitos negócios acabam não alcançando o sucesso, por diversos fatores internos e externos. (CHIAVENATO, 2021) No Brasil, em 2022, as mulheres representavam 45,4% dos empreendedores nascentes; porém, quando analisado o quadro de empreendedores estabelecidos, essa proporção cai para 33,7%. O que revela dificuldades para as empreendedoras sustentarem o seu negócio ao longo do tempo. (SEBRAE, 2023). Essa conclusão é confirmada pelo Relatório do Empreendedorismo Feminino no Brasil (SEBRAE, 2019), que revela uma taxa de conversão de Empreendedoras em Donas de Negócios 40% mais baixa que a de empreendedores masculinos. Enquanto a cada 10 homens empreendedores, 6,5 se tornam donos de negócios; essa proporção é 3,9 a cada 10 para as mulheres empreendedoras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar as dificuldades adicionais que se apresentam no contexto do empreendedorismo feminino.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental. Dados obtidos em pesquisas à internet, de 15/08 a 10/10/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os desafios ao empreendedorismo feminino estão associados às questões de gênero e aos estereótipos acerca do papel da mulher na sociedade. Os dados mostram como principais fatores: Atribuição da responsabilidade pelos cuidados da família e manutenção da casa; acúmulo de responsabilidades, dificuldade de dedicação de tempo à gestão do negócio. Gerou uma queda na proporção de mulheres no empreendedorismo durante a pandemia. Dificuldades de financiamento, recursos mais caros: taxas de juros maiores que empreendedores masculinos: 34,6% a.a. versus 31,1% a.a., apesar de apresentarem taxas de inadimplência menores: 3,7% versus 4,2%. Mulheres chefes de família representam 45% das empreendedoras, empreendem mais por necessidade: 32% dos homens eram empreendedores por necessidade, mulheres representavam 55%. Empreendedorismo por oportunidade apresenta chances maiores de sucesso. Baixa diversificação de negócios: 60% dos negócios em beleza, moda e alimentação, setores culturalmente aceitos para a mulher. Baixo acesso a programas de apoio e investimentos: programas de aceleração com 20% das empreendedoras e 32% para homens; investimentos 22% para mulheres e 29% para homens. Reduz possibilidade de obter escala no negócio.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A desigualdade de gênero cria obstáculos significativos ao empreendedorismo feminino, refletindo o sistema patriarcal e machista ainda predominante na sociedade brasileira. Os papéis e responsabilidades atribuídos à mulher reduzem as condições adequadas para exercer o papel de empreendedora. Também resulta em uma desvalorização de ideias de negócios propostas por mulheres, bem como na redução da credibilidade na sua competência como gestora de negócio. Trata-se de fatores resultantes de questões culturais, que incluem barreiras adicionais à expansão do empreendedorismo feminino.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2021. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Empreendedorismo Feminino no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2019. GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14873	Administração	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4429176 - DAYANE GUEDES OLIVEIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marcia Maria da Graca Costa		
<b>TITULO</b>	DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Existem muitas razões que levam as pessoas a abrirem seu próprio negócio, assumindo os riscos que essa ação traz. Quando conseguem obter sucesso em seu negócio, esses empreendedores conquistam independência financeira, além da satisfação de ser dono de seu próprio negócio. Todavia, muitos negócios acabam não alcançando o sucesso, por diversos fatores internos e externos. (CHIAVENATO, 2021) No Brasil, em 2022, as mulheres representavam 45,4% dos empreendedores nascentes; porém, quando analisado o quadro de empreendedores estabelecidos, essa proporção cai para 33,7%. O que revela dificuldades para as empreendedoras sustentarem o seu negócio ao longo do tempo. (SEBRAE, 2023). Essa conclusão é confirmada pelo Relatório do Empreendedorismo Feminino no Brasil (SEBRAE, 2019), que revela uma taxa de conversão de Empreendedoras em Donas de Negócios 40% mais baixa que a de empreendedores masculinos. Enquanto a cada 10 homens empreendedores, 6,5 se tornam donos de negócios; essa proporção é 3,9 a cada 10 para as mulheres empreendedoras.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar as dificuldades adicionais que se apresentam no contexto do empreendedorismo feminino.			
<b>METODOLOGIA</b>	Pesquisa qualitativa, descritiva e documental. Dados obtidos em pesquisas à internet, de 15/08 a 10/10/2023.			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os desafios ao empreendedorismo feminino estão associados às questões de gênero e aos estereótipos acerca do papel da mulher na sociedade. Os dados mostram como principais fatores: Atribuição da responsabilidade pelos cuidados da família e manutenção da casa; acúmulo de responsabilidades, dificuldade de dedicação de tempo à gestão do negócio. Gerou uma queda na proporção de mulheres no empreendedorismo durante a pandemia. Dificuldades de financiamento, recursos mais caros: taxas de juros maiores que empreendedores masculinos: 34,6% a.a. versus 31,1% a.a., apesar de apresentarem taxas de inadimplência menores: 3,7% versus 4,2%. Mulheres chefes de família representam 45% das empreendedoras, empreendem mais por necessidade: 32% dos homens eram empreendedores por necessidade, mulheres representavam 55%. Empreendedorismo por oportunidade apresenta chances maiores de sucesso. Baixa diversificação de negócios: 60% dos negócios em beleza, moda e alimentação, setores culturalmente aceitos para a mulher. Baixo acesso a programas de apoio e investimentos: programas de aceleração com 20% das empreendedoras e 32% para homens; investimentos 22% para mulheres e 29% para homens. Reduz possibilidade de obter escala no negócio.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A desigualdade de gênero cria obstáculos significativos ao empreendedorismo feminino, refletindo o sistema patriarcal e machista ainda predominante na sociedade brasileira. Os papéis e responsabilidades atribuídos à mulher reduzem as condições adequadas para exercer o papel de empreendedora. Também resulta em uma desvalorização de ideias de negócios propostas por mulheres, bem como na redução da credibilidade na sua competência como gestora de negócio. Trata-se de fatores resultantes de questões culturais, que incluem barreiras adicionais à expansão do empreendedorismo feminino.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2021. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Empreendedorismo Feminino no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2019. GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil. São Paulo: Sebrae, 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14875	História	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577868 - NICOLE PASSOS SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	CURRÍCULO PAULISTA: UMA ANÁLISE DO ESTUDO ÉTNICO-RACIAL NO ENSINO MÉDIO EM HISTÓRIA			
<b>INTRODUCAO</b>	Sobre a vigência do Currículo Paulista em 2019, as mudanças contribuem para o avanço educacional ao uso da tecnologia em aula. No entanto, em sua prática, nas séries do Ensino Médio, especificando a matéria de História, o currículo passa por transições voltadas a necessidade em aprimorar o saber científico, incluindo conhecimentos que carregam a importância social.			
<b>OBJETIVOS</b>	A presente pesquisa busca analisar o documento na matéria de história, tratando com base nos artigos e biografias sobre o tema, de como surgiu a homologação e quais são as visões reais do documento na experiência dos docentes em História. Além do mais, a pesquisa busca contextualizar a visão do saber histórico étnico-racial. Em sua parte final, será exposta a experiência com a Residência Pedagógica da CAPES, no intuito de contextualizar como os projetos são uma opção fundamentada para a participação coletiva, uma vez que o estudo busca destrinchar as vivências particulares como parte do aprendizado histórico.			
<b>METODOLOGIA</b>	A pesquisa foi construída em função das informações mais relevantes, como: Ensino de História no Novo Currículo e o modelo que aborda a questão étnico-racial para os jovens do Estado de São Paulo, assimilando a visão dos docentes. Contaremos com a experiência dos alunos da Escola República do Panamá, na região Sul de São Paulo, onde se obteve o desenvolvimento e do Projeto voltado para o Reconhecimento e Pertencimento Racial na matéria em História.			
<b>RESULTADOS</b>	O documento apresenta a não aprovação das redes públicas em meio a polêmica do MEC e o material 100% digital. Na matéria de História do Ensino Médio, é apresentado objetivos que não condizem com a pluralidade étnica. A profundidade do debate é discutida a medida que encontramos as divergências entre o Currículo Paulista com o docente. O documento demonstra intenção de reformular o antigo currículo no aspecto profissional, inserindo a tecnologia de maneira superficial. O eurocentrismo como referência de aprendizado ainda é priorizado.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base dos fatos apresentados, a resolução obtida parcialmente do Currículo Paulista em História para as séries do Ensino Médio, é possível identificar que os objetivos do documento não corresponde a realidade, visto que, as matérias trabalhadas requerem tempo para aprofundar as temáticas étnicas, o que a cada bimestre letivo, fica impossível de ser contemplado. O documento, seguido pelos docentes, não oferece referência para o aluno compreender a racialização, tampouco, busca trazer o pertencimento, voltando seu interesse para o mercado neoliberal, não conferindo qualidade pedagógica do material.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins de et al. Manifesto: crítica às reformas neoliberais na educação. 1a. ed. Marília: Lutas Anticapital, v. 1, 2021. SOUZA, Bia Dias Barbosa De, e Alessandra David. O Ensino De História No Currículo Paulista: Uma Análise Dos Cadernos Do Professor. História (#38) Ensino 24.1 (2018): 63. TEIXEIRA JÚNIOR, J. C. Por uma afro-cotidianidade na educação escolar. Revista Currículo sem Fronteiras , v. 13, n. 2, p. 307-319, maio/ago. 2013.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14878	Microbiologia Médica	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4394607 - ANA BEATRIZ MENDES DE OLIVEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>	
Bruno Alonso Miotto		ALINE MARIA DA SILVA, ARIOSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, LAYLA FARAGE MARTINS		
<b>TITULO</b>	Isolamento e caracterização de bacteriófago de E. coli: uma alternativa ao uso de antibióticos na era da resistência.			
<b>INTRODUCAO</b>	A resistência aos antibióticos - capacidade dos microrganismos de evoluir e resistir aos efeitos bactericidas e bacteriostáticos – é considerada um importante fator para a morbidade e mortalidade de pessoas no mundo (LIMMATHUROTSAKUL et al., 2019; ROHWER et al. 2002). Diante do avanço da resistência microbiana e ausente perspectiva do desenvolvimento de novas moléculas antimicrobianas, tem se incentivado a busca por alternativas terapêuticas para o tratamento de infecções bacterianas (WHO; 2019; TACCONELLI et al. 2019). Neste sentido, diversas pesquisas têm apontado o uso de bacteriófagos líticos como uma alternativa promissora à utilização de antibióticos no tratamento de infecções bacterianas em humanos e animais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Caracterizar a biologia de uma bacteriófago lítico ambiental contra Escherichia coli (E. coli) isolada de bovino por meio de múltiplas técnicas laboratoriais.			
<b>METODOLOGIA</b>	O estudo foi realizado a partir do isolamento de um bacteriófago que infecta E. coli, nomeado Escherichia coli_USP_GLX (GLX), obtido a partir de amostra de esgoto localizado nas imediações da Universidade de São Paulo, Campus Butantã. Este fago foi propagado e concentrado em uma solução contendo PEG8000 e NaCl. A caracterização inicial do fago isolado foi realizada através das seguintes técnicas: (1) testes de adsorção e burst size, referentes ao tempo de ligação à bactéria e multiplicação viral; (2) curva de morte bacteriana em contato com o fago em diferentes concentrações e (3) avaliação morfológica por meio de microscopia eletrônica de transmissão (MET); (4) testes de viabilidade em diferentes temperaturas e pHs; (5) Abrangência de hospedeiro com 17 bactérias testadas.			
<b>RESULTADOS</b>	O fago se mostrou viável em pH entre 4 e 9, por uma hora, perdendo sua estabilidade no pH mais ácido após 24 horas. Com relação as temperaturas, o bacteriófago manteve sua estabilidade até 40 C por 1 hora, e até 24 horas à 37º C. O tempo de adsorção foi de 12 minutos e apresenta um burst size elevado, entre 48 e 121 víriões/bactéria. A abrangência de hospedeiro se restringiu a uma E. coli isolada de bezerro. Na microscopia eletrônica apresenta morfologia de podovírus.			
<b>CONCLUSOES</b>	O fago foi caracterizado com sucesso por múltiplas técnicas laboratoriais, mostrando ser um fago lítico e específico contra E. coli de bovino. Análises posteriores podem avaliar se possui potencial para fagoterapia nesses animais.			
<b>REFERENCIAS</b>	LIMMATHUROTSAKUL, D. et al. Improving the estimation of the global burden of antimicrobial resistant infections. The Lancet Infectious Diseases, v. 19, n. 11, p. e392–e398, 2019. ROHWER, F.; EDWARDS, R. The phage proteomic tree: A genome-based taxonomy for phage. Journal of Bacteriology, v. 184, n. 16, p. 4529–4535, 2002. TACCONELLI, E.; PEZZANI, M. D. Public health burden of antimicrobial resistance in Europe. The Lancet Infectious Diseases, v. 19, n. 1, p. 4–6, 2019. WHO. New report calls for urgent action to avert antimicrobial resistance crisis. Disponível em: (#60)https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis(#62). Acesso em: 28 maio. 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14880	Medicina Veterinária	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2979357 - RENATA BOTTURA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Adriana Cortez		
<b>TITULO</b>	GUARDA RESPONSÁVEL COMO FERRAMENTA DE CONTROLE DE ZOOSE			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Com o aumento do número de casos de esporotricose em felinos e humanos no município de São Paulo, doença zoonótica causada pelo fungo do complexo <i>Sporothrix</i> spp., se faz necessário avaliar as estratégias de combate ao agravo. Uma das principais medidas a ser considerada é a manutenção destes animais domiciliados, como preconizado pelo Ministério da Saúde. Para tanto, torna-se vital que a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) seja provocada a refletir sobre os princípios da Guarda Responsável no atual contexto das famílias multiespécies, com vistas a uma eventual mudança de valores, já que nela discute-se temas como vacinação, esterilização, controle de endo e ectoparasitas, zoonoses e demais assuntos relacionados, incluindo a importância da domiciliação dos animais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar um levantamento bibliográfico sobre educação em Guarda Responsável, com a utilização de questionários para verificação de conhecimento prévio pelo público-alvo sobre o tema.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma revisão bibliográfica e as bases de dados utilizadas foram o Google Acadêmico e a Pubmed, no período de 2017 a 2023, usando as palavras chave "guarda responsável", "questionário", "responsible animal ownership", "questionnaire".			
<b>RESULTADOS</b>	Os trabalhos encontrados refletem ações realizadas no ambiente escolar, focando principalmente na conscientização das crianças sobre o tema. Outros, possuem como público-alvo os tutores de animais domésticos (incluindo a aplicação de questionários nos moldes do casa-a-casa), aqueles que frequentam hospitais veterinários das instituições de ensino de Medicina Veterinária, e estudos que envolvem a temática da Guarda Responsável como facilitadora para as atividades que visam ao controle populacional de cães. Também foram encontrados trabalhos realizado com Agentes Comunitários de Saúde e com as condutas do público leigo e médicos veterinários. De modo geral percebe-se, com a aplicação dos questionários, um baixo grau de conhecimento das atividades sobre guarda responsável, independentemente da idade do público-alvo.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Entende-se que para interromper a cadeia de transmissão zoonótica da esporotricose seja necessário a participação ativa do tutor responsável pelo animal, entre outros agentes envolvidos, incluindo os serviços públicos de Saúde, bem como o maior envolvimento da classe veterinária ao assumir uma postura mais proativa na rotina dos seus atendimentos no que concerne a educação em Guarda Responsável.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Nota técnica n60/2023. A respeito das recomendações sobre vigilância da esporotricose animal no Brasil, Brasília, 25 maio 2023. Disponível em: <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-60-2023-cgzv-dedt-svsa-ms/view">https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-60-2023-cgzv-dedt-svsa-ms/view</a> . Acesso em: 19 out. 2023. 2. WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE). Chapter 7.1: Introduction to the recommendations for animal welfare. In: Terrestrial Animal Health Code, Volume 1. Disponível em: <a href="https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/">https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/</a> . Acesso em: 19 Out. 2023. 3. ROSSOW, J.A. et al. A One Health Approach to Combatting <i>Sporothrix</i> brasiliensis: Narrative Review of an Emerging Zoonotic Fungal Pathogen in South America. <i>J Fungi (Basel)</i> , vol. 6, n°4, p. 247, out. 2020. doi: 10.3390/jof6040247.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14881	Educação	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4334086 - NAYRA ALINE BRITO DE SOUZA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	Mulheres na Gestão Educacional: Desafios e Possibilidades			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Historicamente, as mulheres tiveram limitado acesso ao poder e autonomia. Na França, seu ingresso no magistério ocorreu com o advento da sociedade republicana no século XVIII, mas eram restritas ao ensino doméstico e maternidade. Em 1889, o Congresso Internacional de Educação de Paris fortaleceu essa causa, influenciando outros países. No Brasil, o debate surgiu no século XX, à medida que as mulheres ingressavam na indústria. A demanda por educadoras levou a campanhas que enfatizavam sua empatia e instinto maternal. No entanto, persiste a discriminação, principalmente na gestão escolar, onde são vistas como carentes de capacidade racional e autoridade, resultando em sua sub-representação.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O propósito deste documento é evidenciar a trajetória da mulher em relação ao magistério e explorar a feminilização do ensino, sistematizada por uma ideia patriarcal, que consequentemente influencia a ocupação de mulheres em cargos de gestão.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma pesquisa histórica através de artigos e documentos bibliográficos, obras literárias. Os autores foram selecionados de acordo com sua visão sobre o meio educacional, além de especialização em relações de gênero no meio cotidiano e trabalhista. Também foi realizada uma pesquisa de dados da profissão, principalmente no Brasil, para obter uma noção estatística da profissão e ocupação dos espaços, somando questões de gênero.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado da discussão exemplifica os privilégios da masculinidade que foram construídos por meio de um sistema patriarcal, e como isso se desenvolve através desses espaços escolares, influenciando em muitas questões, incluindo a representatividade da mulher em espaços considerados de poder. Toda essa discussão pode influenciar escolhas de carreiras em áreas educacionais. Resumidamente, o protagonismo das mulheres na educação e como é interpretado no senso comum.			
<b>CONCLUSOES</b>	O trabalho, visa dar visibilidade para os cargos de gestão, não distinguindo o gênero do profissional. Mostra que o magistério ultrapassa questões de gênero. Ser professor ou funcionário em áreas de gestão tem a ver com profissionalismo, o desejo de auxiliar o educando a descobrir e desenvolver habilidades e competências, e a busca por aperfeiçoamento pessoal em meio às inovações.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>BEAUVIOR, S. O segundo sexo: Fatos e Mitos, Rio de Janeiro: Ed Nova Fronteiras, 1980. BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. CARVALHO, Marília Pinto de. Vozes masculinas numa profissão feminina. Revista Estudos Feministas. Rio de Janeiro. Vol. 6. No 2. IFCS/UFRJ, 1998. CUNHA, Amélia</p> <p>T. B. Sobre a carreira docente, a feminização do magistério e à docência masculina na construção do gênero e da sexualidade infantil. IX Anped Sul. Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14882	Educação	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4442784 - ALBERT ROQUE GONÇALVES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	Educação Crstã: abrangência, abordagem, aproximações			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A educação formal está associada e intrinsecamente ligada ao ambiente público escolar, não seria contraditório que a educação que ali acontecesse fosse cristã ou ainda de qualquer outra vertente religiosa? Obviamente tal pergunta pressupõe a laicidade do Estado e por consequência, das suas instituições, como é o caso da escola. a educação, como qualquer outra atividade humana não é um processo neutro. Considerá-la assim é reforçar posições político ideológicas consolidadas. Em outras palavras, o professor e até mesmo a escola, estão inseridos em um processo histórico e social que por sua natureza não permitirão que suas práticas sejam neutras, ou seja, serão influenciados pelas filosofias circundantes de seu período, assim como de períodos anteriores e de seus ambientes sociais. Dessa forma, o cristianismo com uma tradição teológica e filosófica milenar, parece ter algo a nos dizer sobre como se dá a educação. Portanto, no termo "educação cristã" não existe contradição, mas quer dizer que existe uma filosofia advinda da tradição e teologia cristã que compete com as demais filosofias que buscam embasar qual seria a melhor concepção e prática pedagógica para se obter o resultado da aprendizagem e plena formação humana.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>A presente pesquisa tem por objetivo principal a conceituação de Educação Cristã, explicitando suas bases filosóficas, pedagógicas e teológicas, isto é, sua cosmovisão, em que se fundamenta a abordagem e concepção de como deve ser e o porquê de ser da sua prática educativa, ou seja, busca-se desenvolver neste trabalho uma Filosofia Cristã da Educação.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para esta pesquisa busca-se fazer uso do método bibliográfico, analisando uma extensa lista de livros, artigos e revistas científicas. Para a definição e explicitação da Filosofia da Educação como disciplina, há uma tentativa de análise de obras relacionadas de autores como Antônio Joaquim Severino, Dermeval Saviani, Cipriano Luckesi e outros. Para a fundamentação teológica, utiliza-se autores como Valdeci da Silva Santos, César Moisés de Carvalho, Igor Miguel e ainda autores clássicos cristãos como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Se espera que esta pesquisa possa chegar ao resultado de definir claramente a Educação Cristã por meio das suas vertentes filosóficas e teológicas, e assim poder contribuir para o debate mais amplo acerca das concepções pedagógicas</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Considerando aquilo que já foi produzido por esta pesquisa, conclui-se que os adeptos desta filosofia educacional, carecem de uma maior conscientização da antropologia filosófica cristã, que tem como modelo de maturação humana o homem chamado Cristo, só assim os resultados pedagógicos esperados serão alcançados, como bem coloca Carvalho (2015, p.42).</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>CARVALHO, César Moisés. Uma Pedagogia Para a Educação Cristã: Noções básicas da ciência da educação a pessoas não especializadas. 1. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2015 SANTOS, Valdeci da Silva. Educação Cristã: Conceituação Teórica e Implicações Práticas. Fides Reformata. São Paulo, Vol. 13, nº2, p.155 - 174, 2008. Disponível em: <a href="https://cpaj.mackenzie.br/fides-reformatata/fides-reformatada-2010-2008/fides-reformatata-13-n2">https://cpaj.mackenzie.br/fides-reformatata/fides-reformatada-2010-2008/fides-reformatata-13-n2</a>. Acesso em 16/10/2023 SEVERINO, Antonio Joaquim. Educação, Ideologia e Contra-Ideologia. São Paulo: EPU, 1986.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14883	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4180194 - RICARDO ENRIQUE ALVES SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Análise da perda de carga em tubulação de uma Estação de Tratamento de Efluente em fábrica de celulose			
<b>INTRODUCAO</b>	Em todas as fases o uso de sistemas hidráulicos é fundamental para a transição dos fluidos, sejam eles apenas transportados ou usados como força motriz no funcionamento de alguns equipamentos existentes no processo de tratamento de efluentes. No contexto mencionado, é fundamental estudar o comportamento hidráulico dos fluidos nas tubulações, pois isso proporciona informações sobre a pressão com a qual o fluido sairá de uma estação de bombeamento e as perdas que ocorrerão ao longo do percurso do fluido.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse estudo é contribuir para o entendimento das perdas de carga em tubulações e acessórios que compõe um sistema hidráulico para limpeza de uma esteira transportadora em uma mesa desaguadora de lodo em uma estação de tratamentos de efluente.			
<b>METODOLOGIA</b>	Serão apresentadas equações matemáticas que regem esses fenômenos que contribuiram para a tomada de decisão na definição do diâmetro da tubulação do recalque do sistema. Foram utilizadas fórmulas matemáticas para calcular as perdas de carga distribuídas e localizadas, com o auxílio dos métodos de Moody-Rouse e Darcy-Weisbach.			
<b>RESULTADOS</b>	Para melhor compreensão dos resultados obtidos foram utilizados dados da bomba centrífuga booster juntamente com os dados dos coeficientes de atrito e rugosidade das tubulações e acessórios do sistema de limpeza da esteira da mesa desaguadora de lodo. Utilizando as informações acima fornecidas pelo memorial de cálculo do projeto e com o uso da Equação de Darcy Weisbach chega-se ao resultado da perda de carga localizada e distribuída do sistema. Com os desfechos consolidados após o cálculo da perda de carga do sistema simulando o aumento do diâmetro da tubulação e acessórios foi confirmado que houve uma diminuição de aproximadamente 61% na perda de carga em relação ao sistema de tubulação projetado inicialmente, caindo de 26 metros de coluna de água para 9.9 metros de coluna de água.			
<b>CONCLUSOES</b>	O dimensionamento adequado evita problemas como baixo rendimento do sistema hidráulico, vazamentos, alta pressão e desgaste prematuro dos equipamentos. Além disso, contribui para a eficiência energética e a sustentabilidade, ao evitar o desperdício de água e energia. Ao investir tempo e recursos no dimensionamento adequado, os resultados são um sistema hidráulico mais confiável, durável e eficiente, que atende às necessidades do usuário de forma eficaz.			
<b>REFERENCIAS</b>	BRUNETTI, F.; Mecânica dos Fluidos. 2. ed. Pearson Prentice Hall, 2008. MUNSON, B.R.; YOUNG, D.F.; Fundamentos da Mecânica dos Fluidos. 7. ed. Edgard Blucher, 2004. PORTO, RODRIGO M.; Hidráulica Básica. 4. ed. EESC-USP, 2006. ROTAVA, O.; Aplicações Práticas em Escoamento de Fluidos: Cálculo de tubulações, válvulas de controle e bombas centrífugas. LTC, 2012.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14884	Doenças Parasitárias de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3878449 - BRUNA DOS SANTOS LEITE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	TÂNIA FREITAS RASO; SOLANGE MARIA GENNARI	
<b>TITULO</b>	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii EM MUTUNS-DE-ALAGOAS (Pauxi mitu) CATIVOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.			
<b>INTRODUCA O</b>	Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório pertencente ao Filo Apicomplexa, apresenta distribuição mundial e tem capacidade de infectar animais endotérmicos, tanto domésticos quanto silvestres, inclusive o homem, caracterizando seu potencial zoonótico. O mutun-de-alagoas (Pauxi mitu) é um dos exemplos de aves mais impactadas pelo desmatamento, tornando-se um dos primeiros casos de extinção na natureza de uma espécie no Brasil. Devido a ação humana, a falta de políticas públicas voltadas para conservação da fauna silvestre e fiscalização insuficiente dos órgãos ambientais, esta espécie foi quase extinta devido a destruição do habitat natural. No entanto, atualmente, a população mantida em cativeiro aumentou e alguns exemplares foram reintroduzidos na natureza em 2019.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo retrospectivo teve como objetivo a pesquisa de anticorpos anti-T. gondii em mutuns-de-alagoas (P. mitu) mantidos em cativeiro no estado de Minas Gerais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram colhidas amostras de sangue de 121 indivíduos, a partir da contenção manual das aves, por punção da veia tibial tarsal. Os soros obtidos foram armazenados em microtubos e mantidos congelados a -20°C até o processamento. Para a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii foi utilizado o Teste de Aglutinação Modificado (MAT (#38)#8805; 5) e as amostras positivas foram diluídas de forma seriada na base dois, até a máxima titulação.			
<b>RESULTADO S</b>	Entre as amostras de soro de 121 mutuns-de-alagoas, 88 (72,7%) eram provenientes do criatório A e 33 (27,3%) do criatório B. Destas, 21 (17,35%) apresentaram anticorpos anti-T. gondii. O criatório B teve a maior porcentagem de aves positivas, com 30,3% (10/33), seguido pelo criatório A com 12,5% (11/88). Os títulos de anticorpos variaram entre 5 e 160, sendo 1:5 (12 aves), 1:10 (duas aves), 1:20 (duas aves), 1:40 (uma ave), 1:80 (três aves) e 1:160 (uma ave).			
<b>CONCLUSOES</b>	O presente trabalho relata pela primeira vez a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii em mutuns-de-alagoas (P. mitu) de cativeiro no estado de Minas Gerais.			
<b>REFERENCIA S</b>	DUBEY, J.P.; DESMONTS, G. Serological responses of equids fed Toxoplasma gondii oocysts. Equine Veterinary Journal, v.19, p.337-339, 1987. GENNARI, S.M.; OGRZEWALSKA, M.; SOARES, H.S.; SARAIVA D.G.; PINTER, A.; LABRUNA, M.B.; DUBEY, J.P. Occurrence Of Toxoplasma gondii Antibodies In Birds From The Atlantic Forest, State of São Paulo, Brazil. Veterinary Parasitology, v. 200, p. 193-197, 2014. DUBEY, J. P. et al. Toxoplasmosis Of Animals And Humans. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14885	Biologia Geral	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4406427 - JOAO BLEINAT DO ROSARIO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Guilherme José da Costa Silva		
<b>TITULO</b>	ANÁLISE DA POLUIÇÃO EM CÔRREGOS DA REGIÃO EXTREMO SUL DE SÃO PAULO_ UM ESTUDO DE CASO NO RIBEIRÃO ITAIM			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O desenvolvimento sustentável tem como pilares o crescimento econômico, justiça social e a preservação ambiental. E o Acesso recursos hídricos de qualidade é um dos principais componentes dos ecossistemas e é essencial para a qualidade de vida das populações humanas. No entanto, o crescimento populacional contínuo, particularmente nas grandes cidades, somado à falta de tratamento adequado de resíduos, resulta na lamentável realidade em que muitos rios, incluindo o Córrego Itaim em São Paulo, Esse córrego no entanto não é estudado quanto aos seus bióticos o que pode oferecer uma ameaça ainda desconhecida às comunidades às suas margens.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo visa à avaliação da qualidade da água do Córrego Itaim, mediante a análise de dados históricos relacionados ao desenvolvimento urbano na região e estudos de amostras biológicas locais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram analisadas doze amostras de água, coletadas em locais estratégicos. Para possibilitar comparações, as coletas foram realizadas em pontos contaminados e preservados do Córrego Itaim a fim de realizar uma análise comparativa de componentes bióticos. As amostras foram submetidas à análise microscópica para identificação dos espécimes. Além disso, os parâmetros de temperatura e pH foram medidos in loco durante a coleta, com um medidor portátil Phmetro.			
<b>RESULTADOS</b>	As amostras coletadas nas áreas afetadas pela poluição refletem um ambiente aquático prejudicado por poluentes e condições desfavoráveis. A os organismos identificados limitam-se a poucos rotíferos, protozoários ciliados, bactérias, euglenas. Em um dos pontos poluídos foram observadas alguns peixes demonstrando certa resiliência da espécie ou o início de recuperação da fauna. O alto número de larvas de chironomídeos também detectada nesse trecho é prova cabal do intenso processo de degradação desse trecho visto que são organismos bioindicadores reconhecidos. Por outro lado, as amostras coletadas em áreas isentas de poluição retratam um ambiente aquático mais saudável e equilibrado, com uma rica biodiversidade de organismos aquáticos. A presença de náuplios, algas filamentosas, rotíferos, ciliados, anelídeos, microalgas e diversas espécies de peixes mostrando que as condições atuais do trecho impactado foi limitante para a ocupação de diversos organismos. Em ambos os cenários, a avaliação ressalta a importância de considerar a ecologia local. Os resultados evidenciam que a poluição tem um impacto significativo na qualidade da água e na biodiversidade. A área não poluída demonstra que, quando as condições ambientais são favoráveis, a vida aquática pode prosperar.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A análise das amostras de água enfatiza a influência da poluição na qualidade do Córrego Itaim, destacando a urgência de ações voltadas para a conservação e reabilitação desse ecossistema. Este estudo sublinha a importância crucial de políticas públicas eficazes, fiscalização rigorosa e conscientização da sociedade para assegurar a proteção desse recurso vital e promover o desenvolvimento sustentável.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	BRUNDTLAND GH. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; 1988. p. 49. OTTAWA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico [Internet]. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; [citado 16 maio 2020]. Disponível em: <a href="https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/qualidade-da-agua/indicadores-de-qualidade">https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/qualidade-da-agua/indicadores-de-qualidade</a> . CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Qualidade das Águas Doces no Estado de São Paulo. Apêndice E - Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de Qualidade. Disponível em: <a href="https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/Appendice-E-Significado-Ambiental-e-Sanit%C3%A1rio-das-Vari%C3%A1veis-de-Qualidade-2016.pdf">https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/Appendice-E-Significado-Ambiental-e-Sanit%C3%A1rio-das-Vari%C3%A1veis-de-Qualidade-2016.pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14886	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4318749 - RAPHAEL BARROSO BUSTAMANTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Dispositivo de enclausuramento para vedações emergenciais em Linhas Vivas			
<b>INTRODUCA O</b>	A vedação temporária de vazamentos on-line de componentes, como válvulas, flanges e tubos, que é realizada enquanto o sistema permanece em operação, oferece uma alternativa ao desligamento não programado da linha para o reparo permanente. Esse reparo temporário é econômico ao evitar a perda de receita resultante do desligamento e pode evitar danos ao componente que requer manutenção extensa e cara para o reparo permanente.			
<b>OBJETIVOS</b>	Determinar as limitações do uso de selantes on-line visando eliminar, temporariamente, vazamentos no processo de fábricas de papel e celulose, e fornecer recomendações para o uso desses materiais e técnicas para reduzir o número de intervenções de manutenção que ocasionam perda de produção e risco à segurança das pessoas e do meio ambiente.			
<b>METODOLOGIA</b>	Análise de tensão para determinar a resistência de um modelo 3D às cargas específicas, como forças, pressões e torques. Essa análise permite ao usuário avaliar o desempenho do modelo em condições de carregamentos variáveis e ajuda a identificar áreas de potencial falha ou deformação excessiva. A análise de tensão no SolidWorks utiliza o método de elementos finitos (MEF) para dividir o modelo em pequenos elementos e determina como esses elementos respondem às cargas aplicadas. Assim, o software pode gerar um mapa de tensões, que mostra a distribuição de tensões no modelo, bem como as deformações que ocorrem em resposta às cargas aplicadas.			
<b>RESULTADO S</b>	A análise por MEF comprova a factibilidade da vedação de vazamentos on-line, isto porque em escala colorimétrica de mapa de calor demonstra não haver fadiga com tensões de cisalhamento ou torção. As características do material são preservadas e mantem as propriedades físico-químicas originais. O principal benefício dessa técnica é poder reparar a tubulação sem a necessidade de despressurizá-la ou de desligar a linha, ou seja, o equipamento não entra em inatividade, mantendo a operação em funcionamento. Essa é a melhor maneira de garantir a maior produtividade e lucratividade do equipamento, mantendo os padrões de saúde e segurança.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O presente estudo permitiu, através da coleta de dados do processo produtivo da empresa e da perda de receita resultante de uma possível parada não programada para manutenção, a análise do reparo temporário com selantes on-line. Técnicas, variedades e as vantagens econômicas, produtivas, lucrativas, ambientais e de segurança foram apresentadas para a aplicação temporária dos dispositivos de enclausuramentos em vedações emergenciais em linhas vivas, reduzindo o número de intervenções e inatividade, mantendo o processo seguro e em operação, não ocasionando perda de produção e nem risco à segurança das pessoas e do meio ambiente.			
<b>REFERENCIA S</b>	ALMEIDA, C. R. Proteção ambiental em plantas industriais. São Paulo: Senac, 2018. KUMAR, P. SOLIDWORKS 2015: A Power Guide for Beginner and Intermediate Users. North Charleston: CADArtifex, 2015. SANTOS, E. R. Segurança em instalações industriais. São Paulo: Atlas, 2020. SILVEIRA, L. A. Prevenção de acidentes em indústrias químicas. Rio de Janeiro: Interciência, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14888	Ciências Humanas	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4406222 - MARIA ELISA PIRES DE CARVALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Olga Maria Lodi Rizzini	Silvia Gonçalves de Almeida	
<b>TITULO</b>	A promoção de inclusão de alunos não alfabetizados no 5º ano do Ensino Fundamental.			
<b>INTRODUCAO</b>	A alfabetização é um processo que costuma acontecer de forma gradual ainda na infância, geralmente inicia-se entre 6 e 7 anos de idade que é quando os alunos começam a aprender as letras e os sons das palavras, esse processo pode variar de acordo com o desenvolvimento individual de cada criança. É importante ressaltar que o processo de alfabetização não deve ser apressado, mais que é necessário que os alunos sejam alfabetizados e letrados. Essa pesquisa procura compreender como promover a inclusão de alunos não alfabetizados no 5º ano do Ensino Fundamental.			
<b>OBJETIVOS</b>	Comparar com experiências educativas pelas dimensões da inclusão de alunos não alfabetizados no 5º ano do Ensino Fundamental, para assegurar o acesso e a permanência de condições na aprendizagem em um ambiente que seja respeitado e socializado.			
<b>METODOLOGIA</b>	Realizamos pesquisa bibliográfica e documental, procurando compreender os desafios, que os professores enfrentam no dia a dia no processo de inclusão de alunos não alfabetizados, que chegam ao 5º ano do Ensino Fundamental sem estar alfabetizado e letrado.			
<b>RESULTADOS</b>	A alfabetização é um processo que acontece gradualmente. Geralmente, inicia-se entre 6 e 7 anos, quando as crianças começam a aprender letras e sons de palavras. Esse processo pode variar de acordo com desenvolvimento individual da criança. Atualmente, ser professor alfabetizador é um desafio em função da necessidade de atenção especial importante nesse processo. Segundo Soares (2005), não basta ler e escrever, é preciso saber fazer uso de ler e escrever, saber responder às exigências da leitura e escrita que a sociedade faz continuamente. Com as práticas educacionais, saber ler e escrever vão muito além da mera decodificação de palavras. A alfabetização envolve processo de aquisição de um conjunto de práticas de leitura e de escrita que capacitam os alunos a compreender, analisar e interpretar textos de uma maneira crítica e eficaz. Mesmo sabendo que cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento, é essencial que os educadores e pais estejam atentos aos sinais de prontidão da criança para alfabetização.			
<b>CONCLUSOES</b>	Tem sido um desafio atuar nos processos de alfabetização e letramento nas séries iniciais, pois esse processo que ocorre ao longo do tempo, e que cada criança tem suas necessidades de aprendizagem e seu próprio desenvolvimento por isso é essencial oferecer apoio, paciência e recursos apropriados para ajudar a todos a se tornarem alfabetizados.			
<b>REFERENCIAS</b>	FERRERO, Emilia. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 1992. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14889	Doenças Infecciosas de Animais	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		2979357 - RENATA BOTTURA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares		FERNANDA FIDELIS GONSALES
<b>TITULO</b>	PANORAMA DA ESPOROTRICOSE FELINA NO ESTADO DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	A esporotricose é uma micose subcutânea ou sistêmica de caráter endêmico, zoonótica e de distribuição mundial, causada por fungos dimórficos pertencentes ao clado clínico patogênico <i>Sporothrix spp.</i> , que infectam seres humanos e animais domésticos e silvestres. Os felinos domésticos são os mais afetados pela doença, desempenhando um papel significativo no ciclo zoonótico devido à sua suscetibilidade e capacidade de transmissão do patógeno. Nos países de clima tropical e subtropical, a doença possui grande importância epidemiológica, especialmente na América do Sul.			
<b>OBJETIVOS</b>	A presente pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento dos casos notificados de esporotricose em felinos e sua distribuição no estado de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A busca de dados foi realizada no período de 2011 a 2023 por meio de pesquisa ativa na literatura científica, bases de dados e informações disponíveis nos sites das diferentes prefeituras dos municípios do estado de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	No período de 2011 a 2021, foram confirmados 1.024 casos de esporotricose felina somente no município de São Paulo. No estado de São Paulo, os municípios de São Paulo, Diadema, Catanduva, Peruibe e Guarulhos têm notificação compulsória para a micose. Os casos de felinos acometidos pela doença, entre 2011 e 2017, concentraram-se principalmente nos municípios de Guarulhos (1.340), Diadema (171), Itaquaquecetuba (59), São José do Rio Preto (36), Caraguatatuba (8) e Arujá (3). Nos anos de 2018 e 2019, em Peruibe, foram diagnosticados 97 casos de esporotricose felina. De 2011 a 2017, nos municípios de Mongaguá, Campinas, Caçapava e São Bernardo do Campo, diagnosticou-se apenas um caso da doença por município. Entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, no município de Salto, foram identificados 21 gatos acometidos. De janeiro a agosto de 2023, o município de Catanduva registrou 75 felinos com a doença.			
<b>CONCLUSOES</b>	A esporotricose ainda é uma zoonose negligenciada e de caráter emergente no Brasil. No estado de São Paulo, em especial, a adoção de melhorias nas políticas públicas de saúde pode mudar o atual quadro epidemiológico da doença. As principais medidas devem focar no aumento do número de unidades de Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), controle populacional de cães e gatos por meio de campanhas de castração, capacitação dos profissionais de saúde, programas educacionais para conscientizar a população sobre a enfermidade, incentivar a guarda responsável, com enfoque na domiciliação dos animais, controle efetivo da vigilância epidemiológica, com ampliação da notificação obrigatória nas demais regiões do estado e do país, além de buscar outras alternativas de tratamentos mais eficazes contra a esporotricose.			
<b>REFERENCIAS</b>	GALATI, L. et al. Esporotricose - gato como fonte de infecção em foco epidêmico familiar em Guarulhos, São Paulo: relato de caso. São Paulo, 2017. GONSALES, F. F. Estudo da esporotricose em gatos domésticos no município de Guarulhos, estado de São Paulo / Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, São Paulo, 2018. MONTENEGRO H. et al. Esporotricose felina por <i>Sporothrix brasiliensis</i> : uma infecção animal emergente em São Paulo, Brasil. Pesquisa Veterinária BMC, v. 269, 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14889	Doenças Infecciosas de Animais	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3968316 - FERNANDA DAVID DE FIGUEIREDO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	FERNANDA FIDELIS GONSALES	
<b>TITULO</b>	PANORAMA DA ESPOROTRICOSE FELINA NO ESTADO DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUCAO</b>	A esporotricose é uma micose subcutânea ou sistêmica de caráter endêmico, zoonótica e de distribuição mundial, causada por fungos dimórficos pertencentes ao clado clínico patogênico <i>Sporothrix spp.</i> , que infectam seres humanos e animais domésticos e silvestres. Os felinos domésticos são os mais afetados pela doença, desempenhando um papel significativo no ciclo zoonótico devido à sua suscetibilidade e capacidade de transmissão do patógeno. Nos países de clima tropical e subtropical, a doença possui grande importância epidemiológica, especialmente na América do Sul.			
<b>OBJETIVOS</b>	A presente pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento dos casos notificados de esporotricose em felinos e sua distribuição no estado de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A busca de dados foi realizada no período de 2011 a 2023 por meio de pesquisa ativa na literatura científica, bases de dados e informações disponíveis nos sites das diferentes prefeituras dos municípios do estado de São Paulo.			
<b>RESULTADOS</b>	No período de 2011 a 2021, foram confirmados 1.024 casos de esporotricose felina somente no município de São Paulo. No estado de São Paulo, os municípios de São Paulo, Diadema, Catanduva, Peruibe e Guarulhos têm notificação compulsória para a micose. Os casos de felinos acometidos pela doença, entre 2011 e 2017, concentraram-se principalmente nos municípios de Guarulhos (1.340), Diadema (171), Itaquaquecetuba (59), São José do Rio Preto (36), Caraguatatuba (8) e Arujá (3). Nos anos de 2018 e 2019, em Peruibe, foram diagnosticados 97 casos de esporotricose felina. De 2011 a 2017, nos municípios de Mongaguá, Campinas, Caçapava e São Bernardo do Campo, diagnosticou-se apenas um caso da doença por município. Entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, no município de Salto, foram identificados 21 gatos acometidos. De janeiro a agosto de 2023, o município de Catanduva registrou 75 felinos com a doença.			
<b>CONCLUSOES</b>	A esporotricose ainda é uma zoonose negligenciada e de caráter emergente no Brasil. No estado de São Paulo, em especial, a adoção de melhorias nas políticas públicas de saúde pode mudar o atual quadro epidemiológico da doença. As principais medidas devem focar no aumento do número de unidades de Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), controle populacional de cães e gatos por meio de campanhas de castração, capacitação dos profissionais de saúde, programas educacionais para conscientizar a população sobre a enfermidade, incentivar a guarda responsável, com enfoque na domiciliação dos animais, controle efetivo da vigilância epidemiológica, com ampliação da notificação obrigatória nas demais regiões do estado e do país, além de buscar outras alternativas de tratamentos mais eficazes contra a esporotricose.			
<b>REFERENCIAS</b>	GALATI, L. et al. Esporotricose - gato como fonte de infecção em foco epidêmico familiar em Guarulhos, São Paulo: relato de caso. São Paulo, 2017. GONSALES, F. F. Estudo da esporotricose em gatos domésticos no município de Guarulhos, estado de São Paulo / Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, São Paulo, 2018. MONTENEGRO H. et al. Esporotricose felina por <i>Sporothrix brasiliensis</i> : uma infecção animal emergente em São Paulo, Brasil. Pesquisa Veterinária BMC, v. 269, 2014.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14890	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4082672 - RUTH DAMARES COBU LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Estudo da prevenção e mitigação contra corrosão externa em plataformas FPSO			
<b>INTRODUCAO</b>	Este projeto aborda de forma específica o mecanismo da corrosão em estruturas, equipamentos e tubulações, construídas em plataformas de perfuração e produção offshore, propondo soluções de proteção externa anticorrosiva com ações básicas com resultados de médio/longo prazo, com ênfase na preservação e proteção obtidos através da aplicação de produtos de alto desempenho e novas tecnologias de películas de revestimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudo das vantagens e ganhos reais da preservação básica anticorrosiva em plataformas FPSO.			
<b>METODOLOGIA</b>	O GE utilizou aplicação de normas para definição dos requisitos de testes e critérios de avaliação utilizando teste de envelhecimento acelerado que é um procedimento padronizado utilizado para avaliar a durabilidade e a resistência de revestimentos anticorrosivos em condições extremas de exposição ambiental. A ISO 12944 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para a proteção de estruturas de aço contra a corrosão através de sistemas de revestimento.			
<b>RESULTADOS</b>	O GE conduziu testes laboratoriais e empíricos in loco de uma plataforma de armazenamento e produção de petróleo FPSO. Os resultados, até o momento parciais, obtidos em laboratório, mostram que a efetividade do processo garante um ganho em vida útil para o ativo e um saving financeiro relevante quando comparado em relação à alternativa de não fazer e chegar ao ponto de substituição ou reparo. Em um exemplo, uma unidade iniciou suas operações em 2014, com uma taxa de corrosão de aproximadamente 0,98 mm/ano, resultando em uma substituição não programada da tubulação em apenas 7,2 anos. Demonstraremos que a vida útil ideal para equipamentos e tubulações é de pelo menos 20 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os testes puderam analisar o comportamento das amostras em condições específicas de serviço ao longo de várias semanas, sendo possível considerar que para cada dia de teste, a resistência equiparada a vida útil da preservação é similar a 30 dias.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>ABNT/NBR 7348:2017 Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento. ABNT/NBR 14643:2001 Corrosão Atmosférica Classificação da Corrosividade de Atmosferas. American Society For Testing And Materials. Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus, West Conshocken, 2007. ISO 9227:2017 Ensaio de corrosão em atmosferas artificiais (ensaio de névoa salina). Representante oficial. International, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="http://www.intercoatings.com.br">http://www.intercoatings.com.br</a> Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Petrobras, 2023. Conteúdo e tecnologias de offshore. Disponível em <a href="https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas">https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas</a>. Acesso em: 27 fevereiro 2023. Representante oficial. Zerust, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zerustbrasil.com.br">https://www.zerustbrasil.com.br</a>. Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Zinga, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zinga.pt/">https://www.zinga.pt/</a>. Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Vinci, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.tintasvinci.com.br">https://www.tintasvinci.com.br</a>. Acesso em: 25 fevereiro 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14890	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4262301 - WALAN ROBERTO DOS SANTOS CHAGAS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Estudo da prevenção e mitigação contra corrosão externa em plataformas FPSO			
<b>INTRODUCAO</b>	Este projeto aborda de forma específica o mecanismo da corrosão em estruturas, equipamentos e tubulações, construídas em plataformas de perfuração e produção offshore, propondo soluções de proteção externa anticorrosiva com ações básicas com resultados de médio/longo prazo, com ênfase na preservação e proteção obtidos através da aplicação de produtos de alto desempenho e novas tecnologias de películas de revestimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudo das vantagens e ganhos reais da preservação básica anticorrosiva em plataformas FPSO.			
<b>METODOLOGIA</b>	O GE utilizou aplicação de normas para definição dos requisitos de testes e critérios de avaliação utilizando teste de envelhecimento acelerado que é um procedimento padronizado utilizado para avaliar a durabilidade e a resistência de revestimentos anticorrosivos em condições extremas de exposição ambiental. A ISO 12944 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para a proteção de estruturas de aço contra a corrosão através de sistemas de revestimento.			
<b>RESULTADOS</b>	O GE conduziu testes laboratoriais e empíricos in loco de uma plataforma de armazenamento e produção de petróleo FPSO. Os resultados, até o momento parciais, obtidos em laboratório, mostram que a efetividade do processo garante um ganho em vida útil para o ativo e um saving financeiro relevante quando comparado em relação à alternativa de não fazer e chegar ao ponto de substituição ou reparo. Em um exemplo, uma unidade iniciou suas operações em 2014, com uma taxa de corrosão de aproximadamente 0,98 mm/ano, resultando em uma substituição não programada da tubulação em apenas 7,2 anos. Demonstraremos que a vida útil ideal para equipamentos e tubulações é de pelo menos 20 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os testes puderam analisar o comportamento das amostras em condições específicas de serviço ao longo de várias semanas, sendo possível considerar que para cada dia de teste, a resistência equiparada a vida útil da preservação é similar a 30 dias.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABNT/NBR 7348:2017 Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento. ABNT/NBR 14643:2001 Corrosão Atmosférica Classificação da Corrosividade de Atmosferas. American Society For Testing And Materials. Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus, West Conshocken, 2007. ISO 9227:2017 Ensaio de corrosão em atmosferas artificiais (ensaio de névoa salina). Representante oficial. International, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="http://www.intercoatings.com.br">http://www.intercoatings.com.br</a> Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Petrobras, 2023. Conteúdo e tecnologias de offshore. Disponível em <a href="https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas">https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas</a> . Acesso em: 27 fevereiro 2023. Representante oficial. Zerust, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zerustbrasil.com.br">https://www.zerustbrasil.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Zinga, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zinga.pt/">https://www.zinga.pt/</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Vinci, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.tintasvinci.com.br">https://www.tintasvinci.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14890	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4310756 - RAIMUNDO RAFAEL BRAGA RODRIGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Estudo da prevenção e mitigação contra corrosão externa em plataformas FPSO			
<b>INTRODUCA O</b>	Este projeto aborda de forma específica o mecanismo da corrosão em estruturas, equipamentos e tubulações, construídas em plataformas de perfuração e produção offshore, propondo soluções de proteção externa anticorrosiva com ações básicas com resultados de médio/longo prazo, com ênfase na preservação e proteção obtidos através da aplicação de produtos de alto desempenho e novas tecnologias de películas de revestimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudo das vantagens e ganhos reais da preservação básica anticorrosiva em plataformas FPSO.			
<b>METODOLOGIA</b>	O GE utilizou aplicação de normas para definição dos requisitos de testes e critérios de avaliação utilizando teste de envelhecimento acelerado que é um procedimento padronizado utilizado para avaliar a durabilidade e a resistência de revestimentos anticorrosivos em condições extremas de exposição ambiental. A ISO 12944 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para a proteção de estruturas de aço contra a corrosão através de sistemas de revestimento.			
<b>RESULTADO S</b>	O GE conduziu testes laboratoriais e empíricos in loco de uma plataforma de armazenamento e produção de petróleo FPSO. Os resultados, até o momento parciais, obtidos em laboratório, mostram que a efetividade do processo garante um ganho em vida útil para o ativo e um saving financeiro relevante quando comparado em relação à alternativa de não fazer e chegar ao ponto de substituição ou reparo. Em um exemplo, uma unidade iniciou suas operações em 2014, com uma taxa de corrosão de aproximadamente 0,98 mm/ano, resultando em uma substituição não programada da tubulação em apenas 7,2 anos. Demonstraremos que a vida útil ideal para equipamentos e tubulações é de pelo menos 20 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os testes puderam analisar o comportamento das amostras em condições específicas de serviço ao longo de várias semanas, sendo possível considerar que para cada dia de teste, a resistência equiparada a vida útil da preservação é similar a 30 dias.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABNT/NBR 7348:2017 Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento. ABNT/NBR 14643:2001 Corrosão Atmosférica Classificação da Corrosividade de Atmosferas. American Society For Testing And Materials. Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus, West Conshocken, 2007. ISO 9227:2017 Ensaio de corrosão em atmosferas artificiais (ensaio de névoa salina). Representante oficial. International, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="http://www.intercoatings.com.br">http://www.intercoatings.com.br</a> Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Petrobras, 2023. Conteúdo e tecnologias de offshore. Disponível em <a href="https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas">https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas</a> . Acesso em: 27 fevereiro 2023 Representante oficial. Zerust, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zerustbrasil.com.br">https://www.zerustbrasil.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Zinga, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zinga.pt/">https://www.zinga.pt/</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Vinci, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.tintasvinci.com.br">https://www.tintasvinci.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14890	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4476433 - SIDNEY ALVIM JUNIOR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Estudo da prevenção e mitigação contra corrosão externa em plataformas FPSO			
<b>INTRODUCA O</b>	Este projeto aborda de forma específica o mecanismo da corrosão em estruturas, equipamentos e tubulações, construídas em plataformas de perfuração e produção offshore, propondo soluções de proteção externa anticorrosiva com ações básicas com resultados de médio/longo prazo, com ênfase na preservação e proteção obtidos através da aplicação de produtos de alto desempenho e novas tecnologias de películas de revestimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudo das vantagens e ganhos reais da preservação básica anticorrosiva em plataformas FPSO.			
<b>METODOLOGIA</b>	O GE utilizou aplicação de normas para definição dos requisitos de testes e critérios de avaliação utilizando teste de envelhecimento acelerado que é um procedimento padronizado utilizado para avaliar a durabilidade e a resistência de revestimentos anticorrosivos em condições extremas de exposição ambiental. A ISO 12944 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para a proteção de estruturas de aço contra a corrosão através de sistemas de revestimento.			
<b>RESULTADO S</b>	O GE conduziu testes laboratoriais e empíricos in loco de uma plataforma de armazenamento e produção de petróleo FPSO. Os resultados, até o momento parciais, obtidos em laboratório, mostram que a efetividade do processo garante um ganho em vida útil para o ativo e um saving financeiro relevante quando comparado em relação à alternativa de não fazer e chegar ao ponto de substituição ou reparo. Em um exemplo, uma unidade iniciou suas operações em 2014, com uma taxa de corrosão de aproximadamente 0,98 mm/ano, resultando em uma substituição não programada da tubulação em apenas 7,2 anos. Demonstraremos que a vida útil ideal para equipamentos e tubulações é de pelo menos 20 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os testes puderam analisar o comportamento das amostras em condições específicas de serviço ao longo de várias semanas, sendo possível considerar que para cada dia de teste, a resistência equiparada a vida útil da preservação é similar a 30 dias.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABNT/NBR 7348:2017 Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento. ABNT/NBR 14643:2001 Corrosão Atmosférica Classificação da Corrosividade de Atmosferas. American Society For Testing And Materials. Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus, West Conshocken, 2007. ISO 9227:2017 Ensaio de corrosão em atmosferas artificiais (ensaio de névoa salina). Representante oficial. International, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="http://www.intercoatings.com.br">http://www.intercoatings.com.br</a> Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Petrobras, 2023. Conteúdo e tecnologias de offshore. Disponível em <a href="https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas">https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas</a> . Acesso em: 27 fevereiro 2023 Representante oficial. Zerust, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zerustbrasil.com.br">https://www.zerustbrasil.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Zinga, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zinga.pt/">https://www.zinga.pt/</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Vinci, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.tintasvinci.com.br">https://www.tintasvinci.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14890	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4528158 - ALISSON PEREIRA FEITOSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Estudo da prevenção e mitigação contra corrosão externa em plataformas FPSO			
<b>INTRODUCA O</b>	Este projeto aborda de forma específica o mecanismo da corrosão em estruturas, equipamentos e tubulações, construídas em plataformas de perfuração e produção offshore, propondo soluções de proteção externa anticorrosiva com ações básicas com resultados de médio/longo prazo, com ênfase na preservação e proteção obtidos através da aplicação de produtos de alto desempenho e novas tecnologias de películas de revestimento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudo das vantagens e ganhos reais da preservação básica anticorrosiva em plataformas FPSO.			
<b>METODOLOGIA</b>	O GE utilizou aplicação de normas para definição dos requisitos de testes e critérios de avaliação utilizando teste de envelhecimento acelerado que é um procedimento padronizado utilizado para avaliar a durabilidade e a resistência de revestimentos anticorrosivos em condições extremas de exposição ambiental. A ISO 12944 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para a proteção de estruturas de aço contra a corrosão através de sistemas de revestimento.			
<b>RESULTADO S</b>	O GE conduziu testes laboratoriais e empíricos in loco de uma plataforma de armazenamento e produção de petróleo FPSO. Os resultados, até o momento parciais, obtidos em laboratório, mostram que a efetividade do processo garante um ganho em vida útil para o ativo e um saving financeiro relevante quando comparado em relação à alternativa de não fazer e chegar ao ponto de substituição ou reparo. Em um exemplo, uma unidade iniciou suas operações em 2014, com uma taxa de corrosão de aproximadamente 0,98 mm/ano, resultando em uma substituição não programada da tubulação em apenas 7,2 anos. Demonstraremos que a vida útil ideal para equipamentos e tubulações é de pelo menos 20 anos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os testes puderam analisar o comportamento das amostras em condições específicas de serviço ao longo de várias semanas, sendo possível considerar que para cada dia de teste, a resistência equiparada a vida útil da preservação é similar a 30 dias.			
<b>REFERENCIA S</b>	ABNT/NBR 7348:2017 Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento. ABNT/NBR 14643:2001 Corrosão Atmosférica Classificação da Corrosividade de Atmosferas. American Society For Testing And Materials. Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus, West Conshocken, 2007. ISO 9227:2017 Ensaio de corrosão em atmosferas artificiais (ensaio de névoa salina). Representante oficial. International, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="http://www.intercoatings.com.br">http://www.intercoatings.com.br</a> Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Petrobras, 2023. Conteúdo e tecnologias de offshore. Disponível em <a href="https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas">https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas</a> . Acesso em: 27 fevereiro 2023 Representante oficial. Zerust, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zerustbrasil.com.br">https://www.zerustbrasil.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Zinga, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.zinga.pt/">https://www.zinga.pt/</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023. Representante oficial. Vinci, 2023. Conteúdo de tecnologias de proteções contra corrosão. Disponível em <a href="https://www.tintasvinci.com.br">https://www.tintasvinci.com.br</a> . Acesso em: 25 fevereiro 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14891	Radiologia de Animais	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4364287 - LÍVIA CAMARGO DE CARVALHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Nathalie Fontana Nagase Loureiro		JAQUELINE FERNANDA MEDEIROS DA SILVA
<b>TITULO</b>	MEGAESÔFAGO EM FELINO: RELATO DE CASO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O megaesôfago é definido por uma dilatação total do esôfago, causado pela perda da função motora esofágica, possuindo origem congênita, adquirida ou idiopática. A sua ocorrência em gatos comparada a cães é considerada rara. Quando congênito, está relacionado a anomalias do anel vascular, e no adquirido pode ser secundário a obstruções esofágicas ou esofagites, devido a corpos estranhos ou medicamentos. Os sintomas relatados são: anorexia, disfagia, tosse, dispneia, retardo do crescimento, perda de peso, desidratação, fraqueza, regurgitação, principalmente pós-prandial e pneumonia. O diagnóstico de megaesôfago é dado pelo exame radiográfico contrastado, esofagograma, contudo os achados no exame radiográfico simples podem indicar presença dessa alteração, sendo caracterizado dilatação do esôfago por gás, retenção de conteúdo alimentar, sinal em faixa da traqueia, deslocamento ventral da traqueia e/ou coração e pneumonia aspirativa. O tratamento clínico indicado é a mudança no manejo alimentar por administração de rações pastosas e fornecimento do alimento e água deverão ser em postura bipedal.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar um caso de megaesôfago em um animal da espécie felina, SRD, macho de 1 ano e 7 meses atendido no Hospital Veterinário Dr. Hato.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão de literatura e relato de caso de felino atendido no Hospital Veterinário Dr Hato com queixa de inapetência, regurgitação pós-prandial frequente, dispneia e emagrecimento progressivo.			
<b>RESULTADOS</b>	O paciente deu entrada no hospital com queixa de inapetência, regurgitações pós-prandial frequentes, dispneia, tosse e emagrecimento. Ao exame físico apresentou desidratação e ausculta pulmonar abafada. Foram realizados ultrassonografia abdominal e radiografia torácica simples, entre outros exames. No exame radiográfico observou-se esôfago dilatado na porção torácica, por conteúdo gasoso, sendo indicado esofagograma, para melhor elucidação. Neste estudo radiográfico, observou-se dilatação do esôfago em porção torácica com lúmen preenchido por acentuada quantidade de contraste em toda extensão, compatível com megaesôfago e ausência de sinais obstrutivos. As alterações radiográficas corroboram com as descritas na literatura, ressaltando a importância do esofagograma para diagnóstico de megaesôfago.			
<b>CONCLUSÕES</b>	O exame radiográfico simples associado ao exame contratado foram fundamentais para identificar megaesôfago, sendo o exame de escolha para auxiliar no diagnóstico dessa alteração, especialmente em animais com regurgitação e inapetência. O sucesso no tratamento e a qualidade de vida do paciente estão diretamente relacionados ao manejo correto do paciente e colaboração do tutor.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>FORBES, D. C.; LEISHMAN, D. E. Megaesophagus in cats. Canadian Veterinary Journal. v.26, n.11, p. 354-356. 1985. Disponível em: (#60)<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1680140/#62">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1680140/#62</a>. Acesso em 07 de ago de 2023. NELSON, R. W.; COUTO, C. G., Distúrbios Cavidade Oral, Faringe e Esôfago. Amsterdam. 5 ed. Elsevier. In: NELSON, R. W.; COUTO, C. G., Medicina interna de pequenos animais. cap.31, pág. 326. 2015. THRALL, D. E., O Esôfago de Cães e Gatos. In: THRALL, D. E., Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 6ª Ed., Elsevier., Rio de Janeiro. 2014. cap. 27. TWEDT, D. C. Afecções do esôfago. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária – Doenças do cão e do gato. 4 Ed. v. 2. São Paulo. Manole. 1997. pág. 1562-1567.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14892	Engenharias	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5213827 - KELLI VITÓRIA OLIVEIRA ALBERTINO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato de Brito Sanchez	Olinda Nogueira Paes Rizzo	
<b>TITULO</b>	Impactos da Inteligência Artificial no desenvolvimento de atividades acadêmicas e profissionais			
<b>INTRODUCAO</b>	O uso da Inteligência Artificial tem inúmeros benefícios no meio acadêmico, porém se for feito uso de forma inadequada e sem informações, pode adquirir consequências tanto no âmbito profissional e estudantil. Atualmente, há muitos casos de estudantes utilizando a ferramenta em casos importantes e vivenciando as consequências.			
<b>OBJETIVOS</b>	Estudar os impactos da inteligência artificial no desenvolvimento das atividades diretas de estudantes e profissionais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Um grande volume de estudantes estão começando a utilizar esta ferramenta (ChatGPT) sem orientação, além da perda das competências escritas, outras competências importantes para a formação, serão afetadas com a utilização excessiva do ChatGPT, como as habilidades de análise crítica e a criatividade.			
<b>RESULTADOS</b>	Atualmente, se verifica situações em que atividades são impactadas, principalmente na elaboração de textos educacionais ou profissionais, entretanto a IA não ameaça atividades especializadas em linguagem e criação de conteúdo. Com o tempo é possível que essas habilidades deixem de ser prioridade na aprendizagem, de forma que a IA, seja uma ferramenta para facilitar a buscas de conteúdo para uma curadoria por parte do aluno ou profissional.			
<b>CONCLUSOES</b>	A utilização de IA é existente a alguns anos, e os impactos foram sempre positivos, porém ao passar dos anos todos que utilizam passaram a ver que os conteúdos nem sempre é de qualidade, e que na maior parte das vezes realmente é preciso verificar mais profundamente as informações recebidas, tanto em (IA como Google, Alexa, ChatGPT, etc).			
<b>REFERENCIAS</b>	LIMA, J. Como o ChatGPT afeta a educação e o desenvolvimento universitário. The Trends Hub, Porto, n. 3, 2023. DOI: 10.34630/tth.vi3.5020. Disponível em: <a href="https://parc.ipp.pt/index.php/trendshub/article/view/5020">https://parc.ipp.pt/index.php/trendshub/article/view/5020</a> . Acesso em: 10 out. 2023. NASCIMENTO, C. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO SUPERIOR: DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL AOS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE. Open Journal Systems. Disponível em: <a href="https://www.editorapublicar.com.br/ojs/index.php/publicacoes/article/view/788/433">https://www.editorapublicar.com.br/ojs/index.php/publicacoes/article/view/788/433</a> SAMPAIO, R. C.; NICOLÁS, M. A.; JUNQUILHO, T. A.; SILVA, L. R. L.; FREITAS, C. S.; TELLES, M.; TEIXEIRA, J. S. ChatGPT and other AIs will change all scientific research: initial reflections on uses and consequences. SciELO Preprints, 2023. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.6686. Disponível em: <a href="https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/6686">https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/6686</a> . Acesso em: 10 oct. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14893	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4435982 - RICARDO DA SILVA RODRIGUES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato de Brito Sanchez	Jose Francisco de Camargo Barros Junior	
<b>TITULO</b>	Implementação de "carrinho" articulado como solução para facilitar o transporte e evitar a quebra de vidros planos durante o transporte			
<b>INTRODUCAO</b>	Em diversos aspectos da rotina de trabalho, o transporte manual de vidros é um item que merece atenção, em especial, em relação à segurança dos colaboradores, além dos prejuízos causados no manejo e eventuais quebras nesse processo. A empresa W/Glass Esquadrias Metálicas enfrentava essa dificuldade ao transportar peças de maior dimensionamento para instalações a longa distância. Assim, buscou-se desenvolver melhorias em um carrinho fixo, já usado pela empresa, para minimizar os riscos de quebra e dirimir acidentes no transporte.			
<b>OBJETIVOS</b>	Melhorar o carrinho, visando facilitar seu manuseio, transportar os materiais com segurança, para minimizar o risco de quebra e dirimir acidentes com os colaboradores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Procedeu-se a diversos procedimentos técnicos no carrinho, como a inserção de um eixo central, a fim de se obter uniformidade na movimentação da peça de vidro, e a adaptação de uma alavanca conectada em um suporte fixo frontal. Desse modo se evitaram acidentes e perdas materiais.			
<b>RESULTADOS</b>	Constatou-se que dois carrinhos são precisos para o transporte, sendo um em cada ponta do vidro. Após o posicionamento da peça em 2 carrinhos, sendo em suas extremidades, fez-se o aperto da trava lateral a fim de pressionar o vidro para ele não se mexer no percurso. Em seguida, o carrinho se estabilizou e pode ficar solto sem ninguém para segurar ou apoiar. Logo após puxar o carrinho, com o apoio da alavanca, em uma calçada com alguns desníveis, notou-se que peça obedecia ao balanço do eixo. Desse modo, as pontas dos vidros estavam protegidas, pois as pontas não sofreram atrito. Usaram-se todas as rodas fixas e após o primeiro teste, foi feita uma troca dos rodízios da frente dos dois carrinhos por modelos móveis, o que facilitou o manuseio no transporte.			
<b>CONCLUSOES</b>	Atendimento às necessidades e expectativas da empresa, obtiveram-se os seguintes resultados: diminuição dos riscos de acidentes e consequentes prejuízos com a quebra de peças; obtenção de melhora significativa no transporte das peças até a instalação; diminuição do trabalho braçal e exaustão do colaborador; facilitação do transporte manual.			
<b>REFERENCIAS</b>	CATÁLOGO AGMAQ. Agmaq. Disponível em: <a href="https://www.agmaq.com.br/catalogo">https://www.agmaq.com.br/catalogo</a> . Acesso em: 27 ago.2023. DICAS DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE VIDRO. GR Gusmão. Disponível em: <a href="https://gusmao.com.br/noticia/dicas-de-manuseio-e-transporte-de-vidro">https://gusmao.com.br/noticia/dicas-de-manuseio-e-transporte-de-vidro</a> . Acesso em: 01 set. 2023 EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA UM MANUSEIO SEGURO DO VIDRO. Vidro Impresso. Disponível em: <a href="https://vidroimpresso.com.br/noticia-setor-vidreiro/confira-quais-sao-os-equipamentos-adequados-para-um-manuseio-seguro-do-vidro">https://vidroimpresso.com.br/noticia-setor-vidreiro/confira-quais-sao-os-equipamentos-adequados-para-um-manuseio-seguro-do-vidro</a> . Acesso em: 02 set. 2023 NORMA ABNT NBR 7199:2016. ABNT. Disponível em: <a href="https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?Q=amkxU3ZPdMVZTHcrZUkzUzlxRG1NRHZITDliaHRHTzNBdVpSMHp4MVBWOD0%3d">https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?Q=amkxU3ZPdMVZTHcrZUkzUzlxRG1NRHZITDliaHRHTzNBdVpSMHp4MVBWOD0%3d</a> . Acesso em: 02 set.2023. SEGURANÇA DO VIDRO EM MOVIMENTO. O Vidroplano. Disponível em: <a href="https://issuu.com/vidroplano/docs/ovidroplano_437_mai09">https://issuu.com/vidroplano/docs/ovidroplano_437_mai09</a> . Acesso em: 02 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14895	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4070160 - NILTON GARCIA JUNIOR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Implementação de qrCode como ferramenta de controle na gestão do processo de envase UHT			
<b>INTRODUCAO</b>	A automação industrial ligada os novos desenvolvimentos tecnológicos, pode ser definida como a utilização de sistemas e tecnologias, com o objetivo de minimizar ou até mesmo eliminar a assistência da atividade humana em um processo, produtivo, industrial ou até mesmo cotidiano. A implementação da automação traz vários benefícios, como o aumento da produtividade e eficiência, em um processo produtivo industrial.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo geral deste trabalho é a implementação de qrCode como ferramenta de controle na gestão do processo de envase U.H.T para acesso aos manuais de procedimentos operacionais e de manutenção.			
<b>METODOLOGIA</b>	O trabalho se desenvolve no Laticínios Tirol, unidade de Ipiranga – PR, que vinha sofrendo por paradas de linha não planejadas e com baixa entrega metas da empresa, e um ponto levantado é a falta de procedimentos operacionais e manuais que de forma física ficam armazenados distante dos equipamentos. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário inicialmente a delimitação do escopo com relação ao tempo de implementação do projeto, custo, e ganhos após a implementação do projeto. Para realização da digitalização, realizou-se o levantamento de todas as variáveis necessárias para o projeto, tais como: tipos de equipamentos presentes na linha de produção que seriam necessários a implementação do qrCode, pontos de instalação, material de impressão e pontos de limpeza da máquina usando produto químico.			
<b>RESULTADOS</b>	O tempo decorrido para implementação e ajustes foi cerca de trinta dias, e após os trinta dias a linha obteve resultados satisfatórios reduzindo as paradas não planejadas. Ganho médio de 10% na eficiência da linha 1 e Ganho médio de 14% na linha 2, o próximo passo é que com o conhecimento adquirido ao longo do curso de engenharia mecânica é buscar mais alternativas para melhorar o processo produtivo e agora começar a trabalhar em cima de outra maior voz de parada não planejada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este estudo delimita-se ao projeto de virtualização dos manuais operacionais e técnicos em forma digital para facilitar o acesso e reduzir o tempo na resolução de problemas e diminuir as paradas não planejadas por falta de conhecimento em procedimentos operacionais. Com a implementação do projeto pode se observar resultados positivos onde o projeto foi também implementado nas duas linhas de envase.			
<b>REFERENCIAS</b>	GROOVER, M. P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. NATALE, F. Automação industrial. 10. ed. São Paulo: Érica, 2008 QR Code para indústrias: conheça benefícios e aplicações. <a href="https://avozdaindustria.com.br/inovacao/qr-code-para-industrias-conheca-beneficios-e-aplicacoes">https://avozdaindustria.com.br/inovacao/qr-code-para-industrias-conheca-beneficios-e-aplicacoes</a> . Acesso em: 29.09.2023. TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14896	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4339231 - WAGNER ALEXANDRE DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Projeto para proteção contra queda livre em porta de elevadores de carga			
<b>INTRODUCAO</b>	A Engenharia Mecânica estabelece os conceitos para a adequada construção de instalações antiqueda visando garantir a segurança das pessoas e mitigar os riscos financeiros oriundos de acidentes. A implementação de rigorosas normas de segurança e o uso dos equipamentos adequados são cruciais para a prevenção da queda livre das portas dos equipamentos de movimentação vertical. O presente trabalho visa contribuir com o aumento da segurança em elevadores com portas do tipo guilhotina, fornecendo detalhamento técnico e processos de instalação para o seu eficaz e seguro funcionamento.			
<b>OBJETIVOS</b>	Apresentar a viabilidade técnica e a adequação de um de sistema mecânico de bloqueio de queda livre de portas do tipo guilhotina em elevadores.			
<b>METODOLOGIA</b>	Analisar a causa raiz de um acidente envolvendo a queda das portas tipo guilhotina de um elevador, de modo a definir o escopo de implementação do projeto com as adequações de segurança necessárias. Levantar as variáveis envolvidas, como cargas de atuação, pontos de possíveis rupturas dos dispositivos de tração, materiais e suas características mecânicas, utilizando os métodos de cálculos tradicionais e realizar a análise dos elementos de segurança propostos através do método dos elementos finitos, para depois construir alguns protótipos para testes, instalá-los no elevador e testá-los.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram desenvolvidos componentes mecânicos de segurança com redundância, de modo que o sistema opere em paralelo ao elemento principal de tração, evitando assim a queda livre da porta de acesso ao elevador. Os testes experimentais foram realizados com sucesso, validando o conceito do sistema de segurança que foi projetado de tal forma que o sistema esteja adequado às normas técnicas vigentes para garantir a segurança operacional do elevador.			
<b>CONCLUSOES</b>	As análises realizadas permitiram a compreensão do problema de segurança do equipamento e as suas vulnerabilidades, de modo que fosse possível desenvolver uma solução técnica viável, de acordo com a NR-12. As análises, dimensionamentos e cálculos levaram trinta dias, a compra de alguns componentes e a fabricação de outros levou quinze dias, para a posterior instalação física, testes finais e liberação para uso. Esse sistema de segurança foi instalado em quatro portas de pavimento e o elevador foi liberado ao uso, normalizando o tráfego de carga entre os andares com segurança.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, J. C.; LIMA, K. F. de; BARBIERI, R. Elementos de máquinas: Projeto de sistemas mecânicos. 2ª edição. São Paulo: Editora Blucher, 2022. ALVES FILHO, A. Elementos Finitos a base da Tecnologia CAE. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR ISO 2408:2009 – Cabos de aço para uso geral — Requisitos mínimos. Rio de Janeiro: ABNT, 2009. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2022. BUDYNAS, R. G.; NISBETH, J. K. Elementos de Máquinas de Shigley. 10ª edição. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2016.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14897	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4260121 - GERSON BERTAZO FILHO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Proposta de automatização em máquina manual para moer cana			
<b>INTRODUCA O</b>	Toda máquina é projetada e construída para realizar uma determinada operação visando substituir ou aliviar o esforço humano. Ao observar a evolução das máquinas com o passar do tempo, podemos perceber uma grande evolução qualitativa e quantitativa, permitindo o aumento da produtividade e da qualidade. Toda produção manual pode ser, de alguma forma, mecanizada, com ou sem automação. A mecanização, na segunda revolução industrial, e a automação, na terceira revolução industrial, permitiram saltos expressivos em produtividade e, conseqüentemente, em lucratividade, produzindo produtos melhores e com maior qualidade, com o menor esforço humano possível.			
<b>OBJETIVOS</b>	Automatizar um moedor de cana manual para eliminar o trabalho braçal e aumentar a produtividade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Analisar os processos de melhoria contínua, manufatura enxuta e automações, e analisar tecnicamente o moedor de cana manual, de modo a propor uma solução de automação de baixo custo que permita a utilização desse moedor com o menor esforço possível.			
<b>RESULTADO S</b>	Foi instalado um motor elétrico de corrente contínua com um botão liga e desliga; foram calculadas e instaladas polias motriz e motora, assegurando o correto alinhamento delas para o correto funcionamento da automação, sem ruído de correia e garantindo a vida útil dela; com proteções de segurança para os elementos móveis, conforme NR-12; com uma chave inversora de rotação caso a cana enrosque e bloqueie o equipamento; e com um botão de parada de emergência. A automação foi eficaz, liberando o operador do esforço manual, aumentando a produtividade e a segurança do equipamento.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Embora o trabalho não apresentasse um objetivo específico para o ganho de produtividade, tal ganho é claramente observado, uma vez que não há mais a parada não programada por cansaço do operador, houve a redução da quantidade de passadas de cana pelo moedor (retrabalho), o risco de contaminação do caldo reduziu, houve a redução do esforço do operador que deixou de moer a cana para apenas alimentar o moedor com cana, além do aumento da segurança do equipamento.			
<b>REFERENCIA S</b>	ALBERTIN, M. R.; PONTES, H. L. J. Gestão de processos e técnicas de produção enxuta. Curitiba: InterSaberes, 2016. ALMEIDA, J. C.; LIMA, K. F. de; BARBIERI, R. Elementos de máquinas: Projeto de sistemas mecânicos. 2ª edição. São Paulo: Editora Blucher, 2022. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2022. BUDYNAS, R. G.; NISBETH, J. K. Elementos de Máquinas de Shigley. 10ª edição. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2016. GIL, A. C. et al. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14898	Engenharia Biomédica	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5213827 - KELLI VITÓRIA OLIVEIRA ALBERTINO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Renato de Brito Sanchez	Sergio Fernandes de Freitas	
<b>TITULO</b>	Visão computacional com Rede Neural Convolucional no processamento digital de mamografias para auxiliar o diagnóstico de Câncer de Mama			
<b>INTRODUCAO</b>	O câncer de mama afeta muitas mulheres no Brasil, representando cerca de 29% dos novos casos. A incidência aumentou nas últimas décadas por diversos fatores: envelhecimento populacional, estilo de vida e diagnóstico precoce. A taxa de mortalidade diminuiu pelo diagnóstico, considerando idade, histórico familiar, predisposição genética, obesidade, consumo excessivo de álcool e terapia de reposição hormonal. A detecção precoce é fundamental para o tratamento bem-sucedido do câncer de mama. O autoexame das mamas e a mamografia são as principais ferramentas de detecção precoce.			
<b>OBJETIVOS</b>	Implementar por visão computacional com rede neural convolucional (RNC) o processamento digital em imagens em mamografia para auxiliar o diagnóstico precoce de Câncer de Mama.			
<b>METODOLOGIA</b>	Implementação da visão computacional por meio da biblioteca OpenCV e o processamento digital com a RNC VGGnet, por algoritmo estruturado em Python, processando digitalmente mamografias. Na aprendizagem de máquina e treinamento dos modelos, detecta nas imagens presença ou tendência de nódulos. Teste com interpretação em amostra de mil imagens nos seguintes bancos de dados: MIAS, CBIS-DDSM e OMI-DB, considerando a comparação de imagens de controle e imagens teste em resultados positivos e negativos.			
<b>RESULTADOS</b>	Para cada mamografia analisou a interpretação de até três milhões de imagens por segundo, elevando a capacidade por processamento com GPU para 30 milhões. Nos testes foi possível detectar, com erro (#60)5% em (#60)3s, nódulos com tamanho: malignos aglomerados (6mm), cânceres não invasivos – DCIS (8mm), câncer de mama em mamografias (11mm) e câncer de mama visível em mamografia (2mm e 3mm). Para continuidade da pesquisa será submetido CEP-UNISA para testes com imagens de pacientes em 2024.			
<b>CONCLUSOES</b>	O algoritmo demonstrou eficiência, será continuado em pesquisa no Departamento de Engenharia UNISA, de forma multidisciplinar com as áreas de saúde. Será implementada interface do usuário para testes nos ambientes de exames. Os testes com pacientes devem treinar a IA para obter maior precisão e redução de tempo na análise de resultados e diagnóstico.			
<b>REFERENCIAS</b>	BERNARDES, Nicole Blanco et al. Câncer de Mama X Diagnóstico/Breast Cancer X Diagnosis. ID on line. Revista de psicologia, v. 13, n. 44, p. 877-885, 2019. DE SOUZA SANT'ANNA, Byanca. APLICAÇÕES EMERGENTES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA RADIOLOGIA. DO NASCIMENTO, Gabrielle Rocha et al. CÂNCER DE MAMA: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE PARA O CONTROLE DE DOENÇA: BREAST CANCER: THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS FOR DISEASE CONTROL. AN INTEGRATIVE REVIEW. Revista de Epidemiologia e Saúde Pública-RESP, v. 1, n. 2, 2023. FALCIONE, Felipe Daineze; DE CARVALHO, José Antonio Dias. DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ESPECIALISTA:: auxílio no diagnóstico precoce de câncer de mama. Brasil Para Todos-Revista Internacional, v. 11, n. 1, 2023. SOARES, Gustavo Roncolato; DO CARMO, Alisson Fernando Coelho. Viabilidade de detecção de câncer de mama através de rede neural convolucional em mamografias. ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498, v. 16, n. 16, 2020. WURZEL, Pedro; MARTINS, Mirkos Ortiz. Classificação de imagens de mamografia com Machine Learning no auxílio de diagnósticos de câncer de mama. Disciplinarum Scientia  Naturais e Tecnológicas, v. 23, n. 2, p. 1-17, 2022.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14900	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4231660 - CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Melhoria no dispositivo de içamento de motobomba submersível em estação elevatória de esgoto por mão francesa			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>O projeto está embasado em apresentar melhoria em sistema de içamento de bomba submersível em Estação Elevatória de Esgoto na empresa Sabesp. A Sabesp possui cerca de 35% das Elevatórias de Esgoto consideradas de pequeno porte, que opera com bomba submersível Q= 120l/s x 15mca, desta forma operam em sua totalidade com bombas que pesam no máximo 250kg. A maneira tradicional para içamento destas bombas nas Elevatória de Esgoto é através de locação de caminhão munck e de 3 a 4 profissionais qualificados para realização desta tarefa. Por esta razão será apresentado melhorias neste sistema de içamento visando menor custo envolvido na operação assim como redução de possíveis acidentes que possam ocorrer durante o içamento. Com base nestas informações o projeto será focado na monovia tipo mão francesa, utilizando talha elétrica com capacidade de içamento de até 0,25 ton.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar e apresentar as melhorias no sistema de içamento proposto, como facilidade na instalação, fabricação, manuseio e operação.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia empregada neste projeto inclui um estudo de material para construção de suporte economicamente viável e que garanta a resistência mecânica para o sistema de içamento de bomba submersível com peso de até 250kg. São analisadas as tabelas de características físico-químicas e mecânicas de aço, assim com aplicado os cálculos de resistência em estruturas metálicas, considerando os módulos de fadiga à torção, ruptura por cisalhamento e tração.			
<b>RESULTADO S</b>	O diferencial do projeto apresentado em relação ao existente no mercado é que o dispositivo proposto, um braço móvel tipo mão francesa para carga até 250kg em peça única de 1,30m x 3,20m, construído com aço de monovia com perfis estruturais W150x13 em material ASTM A 572 Grau 50, e com mecanismo em ângulo de giro de 180(#38)#730;. Este mecanismo pode ser padronizado e atende à várias Estações de Esgoto, pois o suporte fixo em estrutura vertical minimiza custos de aquisição, assim como permite a montagem de talha elétrica.			
<b>CONCLUSOE S</b>	O estudo trouxe contribuição técnica otimizando o sistema de içamento de motobomba submersível de forma eficiente e segura. Após a implementação do sistema de içamento proposto é possível identificar que os colaboradores exercerão menor esforço físico e ergonomia adequada para realização da tarefa além de menos colaboradores para realizar o içamento, reduzindo possíveis riscos de acidentes devido ao local de difícil acesso.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>CRESPO, Patricio Gallegos. Dimensionamento Hidráulico de uma Estação Elevatória de Esgotos. São Paulo: Revista DAE Edição nº: 78, p. 61-66. 1970. NETTO, Azevedo et al. Manual de Hidráulica. 8. ed. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 1998. 670 p. RUDENKO, N.; Máquinas de Elevação e Transporte, Livros Técnicos e científicos, Rio de Janeiro, 1976.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14906	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4758366 - EDUARDO PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Análise de fadiga por Elementos Finitos em dispositivos de içamento de base de concreto na construção de adutora em barragem de mineração			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Usando a computação assistida, especialmente quando a engenharia e a indústria são combinadas, o custo e o tempo de gerenciamento do projeto e todo o processo de desenvolvimento podem ser otimizados. Na presença de pontos fracos, se o protótipo digital não atender às expectativas, o modelo pode ser aprimorado. O problema se origina, pois, devido a um talude próximo ao ponto de montagem de bases civis em uma obra de montagem de uma adutora, impossibilita que um mecânico ou outro profissional tenha acesso a vala para retirar o estropo de amarração (cinta ou cabo de aço) e também existe a exigência de uma norma interna da empresa contratante a não autorização de colocar a mão na carga. Outro fator agravante da atividade é o grande peso das bases construídas que eram de 15,81 toneladas. Com isso foi necessário projetar um dispositivo para realizar o içamento desses blocos de forma que suportasse o peso deles e também que fosse de fácil desmontagem sem grande necessidade de acesso.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo geral deste trabalho é realizar estudo por elementos finitos, verificando as resistências mecânicas do dispositivo de içamento das bases de concreto civil da adutora de água.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi utilizado o software SolidWorks, pois é o software que a empresa possui sua licença de trabalho e aquisição do mesmo junto a empresa fornecedora do software. Ele é um software de desenho de CAD 3D para modelagem de peças e montagens em desenhos 3D e 2D. Oferece uma ampla gama de soluções para cobrir os aspectos envolvidos no processo de desenvolvimento do produto, permitindo criar, projetar, simular, fabricar, publicar e gerenciar os dados do processo de design.			
<b>RESULTADO S</b>	Pode-se verificar no estudo realizado que os materiais escolhidos e dimensionados no método tradicional matemáticos foram bastante assertivos, ou seja, o dispositivo foi muito bem projetado no âmbito de resistência dos materiais empregados. Conforme demonstrado no estudo as tensões encontradas na simulação foram abaixo de 227MPa. Sendo tesões estas calculadas para regime de escoamento da secção líquida. E para tesões de ruptura podemos chegar até 333 MPa que não haverá ruptura da peça. Após o estudo do dispositivo, verifica-se que a equipe de engenharia conseguiu atender as normas e exigências técnicas no dimensionamento do componente de estruturas, onde foi mostrado pelo software que as cargas e esforços não prejudicaram nem deformaram o material.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Com este estudo foi possível verificar como a tecnologia pode ser uma grande aliada a engenharia, como poderosos softwares auxiliam o engenheiro na tomada de decisões e dimensionamento de componentes e equipamentos, de forma rápida e segura. Porém não se pode deixar de ponderar de que os mesmos serão úteis e assertivos desde que as informações de entrada (input) sejam fornecidas de forma correta, ou seja, os conhecimentos da graduação não poderão nunca ser substituídos pois o conhecimento dos conceitos é a base para os projetos.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos Materiais – para entender e gostar. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda – 2015. DOS REIS, S. C; NAVILLE, W. "Caracterização mecânica de compósitos laminados". In: X Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI. Disponível em: (#60)https://bit.ly/3nkRISX(#62). Acesso em: 05 fev. 2023. HIBBELER, R.C. Resistência dos Materiais. 2007. Ed. Pearson ROSSETE, Celso Augusto. Segurança do Trabalho e saúde ocupacional. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14908	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4046455 - JOSE LUIZ CACHATORE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Implementação de esteira transportadora para extração de cavacos de usinagem em tornos convencionais			
<b>INTRODUCAO</b>	Devido ao alto volume de fabricação de peças em metalúrgicas, há resíduos provenientes desse processo denominado "cavacos", em se tratando de usinagem. Visando melhorar a remoção desses resíduos, houve a necessidade de se desenvolver esteiras transportadoras que auxiliassem nessa extração.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este trabalho visa reduzir os esforços dos colaboradores envolvidos nas operações de extração dos cavacos da empresa Valmet Papel, Celulose e Energia Ltda. e aumentar a disponibilidade de mão de obra e máquina para melhora da produtividade.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa descritiva onde todos os torneiros da empresa Valmet foram entrevistados pelo autor sobre a possível melhoria sugerida por este trabalho, a pesquisa foi realizada entre o período de janeiro a julho de 2023. O método utilizado para o dimensionamento da esteira transportadora teve como base o manual de transportadores de correia FAÇO (Fábrica de Aços Paulista), juntamente com cálculos extraídos do livro de elementos de máquinas de Shigley.			
<b>RESULTADOS</b>	No projeto piloto realizado em um dos tornos da empresa Valmet, pôde-se observar uma redução no tempo de remoção dos cavacos e da limpeza da máquina em operação de 45 minutos para 10 minutos, ou seja, uma redução de 77,78% de tempo para a limpeza do torno, tendo em vista que a remoção de cavacos com a esteira é contínua e que cai direto na caçamba de cavacos, que o operador utilizará o tempo somente para deslocar a caçamba para a central de remoção de resíduos e executar a limpeza superficial do torno para o turno seguinte.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com este piloto e testes na empresa foi possível obter dados para resolver a insatisfação dos operadores, inclusive à cerda das discussões, permitir pela gestão discutir a redução da intensidade de esforço físico nas atividades, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores e elevar a disponibilidade de máquinas. Foi possível neste momento prever estudos futuros de melhoria do processo, assim como sanar alguns dos problemas no processo produtivo da empresa associados à ergonomia.			
<b>REFERENCIAS</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6177:Transportadores contínuos - transportadores de correia - terminologia. Rio de Janeiro, 2016. BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. Elementos de maquinas de Shigley. 10. Ed. Porto Alegre: AMGH, 2016 FÁBRICA DE AÇO PAULISTA S. A. Manual de Transportadores de Correias - FAÇO. 4 ed. São Paulo: 2001. 412 p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14909	Educação	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4355369 - ANA MARIA BARBOSA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Silvia Gonçalves de Almeida	Olga Maria Lodi Rizzini	
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA			
<b>INTRODUCA O</b>	Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para a melhoria dos resultados educacionais, a participação da família como parceira da escola é essencial porque contribui para que os alunos desenvolvam e alcancem a aprendizagem de forma integral. Para a formação educacional dos alunos, é preciso estabelecer metas desafiadoras para as duas partes. Para tanto, são essenciais comunicação, diálogo aberto e a participação dos familiares nas reuniões, dentre outras atividades da escola.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender a importância da participação das famílias como parceira da escola.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos e livros relevantes sobre o tema família e escola e pesquisa documental.			
<b>RESULTADO S</b>	Espera-se que a participação da família em projetos realizados pela escola, a interação com a equipe de coordenadores, professores e comunidade escolar fará com que a aprendizagem dos alunos possa acontecer com mais produtividades e qualidade. Compreende-se que a parceria entre família e escola é fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, influenciando no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança, além de contribuir na promoção do bem-estar dos alunos, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para atuarem na sociedade. Szymanski (2011) ressalta que é importante a proposta de parceria que desenvolverá na base dos recursos e possibilidades pessoais e da comunicação e não a partir das dificuldades e limitações. A mediação da comunidade com seus grupos organizados pode ser muito eficiente no fortalecimento dos pais em suas funções. É importante compreender que a participação das famílias no ambiente escolar nos anos iniciais do ensino fundamental ajuda a desenvolver de forma mais completa e significativa favorecendo a aprendizagem.			
<b>CONCLUSOE S</b>	A pesquisa aponta caminhos para que as famílias juntamente com a escola possam encontrar caminhos e estratégias que para ajudar a superar as dificuldades e contribuir para o desenvolvimento das crianças, lembrando que quando família e escola trabalham juntas a aprendizagem dos alunos acontece com maior potencialidade.			
<b>REFERENCIA S</b>	BRASIL. Ministério da Educação. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, base nacional comum curricular. Brasília, 2017. Disponível em: <a href="http://basecomumnacionalcomum.mec.gov.br/">http://basecomumnacionalcomum.mec.gov.br/</a> . Acesso em: 18 de setembro, 2023. SZYMANSKI, Heloisa. A relação família/escola: desafios e perspectivas. Brasília, IBER, 2011.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14911	Serviço Social	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4371551 - ANGRA MARIA DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Henrique Manoel Carvalho Silva		
<b>TITULO</b>	DIREITO AO ABORTO NA PERSPECTIVA DA SAÚDE PÚBLICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A pesquisa aborda a questão do aborto no contexto da legislação brasileira, destacando que, de acordo com a Constituição de 1988, o aborto é considerado crime, exceto em casos de estupro, anencefalia fetal e risco de vida materno. No entanto, as mulheres ainda enfrentam desafios significativos no acesso ao aborto legalizado, e a pesquisa busca identificar essas barreiras. Além disso, procura compreender por que o aborto permanece criminalizado, apesar do grande número de mulheres recorrendo ao aborto inseguro, resultando em riscos à saúde e vida das mulheres.			
<b>OBJETIVOS</b>	Os objetivos da pesquisa incluem identificar os limites relacionados ao acesso ao aborto legalizado no Brasil e investigar as razões por trás da manutenção da criminalização do aborto, considerando o alto número de abortos inseguros e seu impacto na saúde pública. A pesquisa também busca entender as experiências das mulheres que enfrentam essa realidade por meio do uso de documentários e recursos bibliográficos, como livros, artigos, monografias e teses.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia da pesquisa combina a análise de documentários que retratam as experiências das mulheres em relação ao aborto com uma abordagem qualitativa. Além disso, utiliza recursos bibliográficos, como livros, artigos, monografias e teses, para aprofundar o entendimento da questão do aborto no Brasil.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSÕES</b>	A pesquisa visa destacar a complexidade da questão do aborto no Brasil, onde, embora haja disposições legais que permitem o aborto em certos casos, muitas mulheres enfrentam limitações significativas no acesso a serviços seguros de aborto. Isso levanta questões importantes sobre a saúde pública, os direitos reprodutivos das mulheres e a necessidade de reavaliar a legislação relativa ao aborto no país. A pesquisa busca contribuir para a compreensão mais aprofundada desse problema, destacando a importância de abordá-lo de maneira sensível e baseada em evidências.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>DE ALMEIDA, Luiz Carlos. Métodos contraceptivos: uma revisão bibliográfica. 2011. Acesso em: 10 de maio de 2023. Disponível em: <a href="https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-A79HA8/1/monografia_luiz_carlos_de_almeida.pdf">https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-A79HA8/1/monografia_luiz_carlos_de_almeida.pdf</a> NAVES, Bárbara de Sá. O limite da racionalidade Weberiana na positividade do aborto: o corpo feminino e o direito de decidir. Acesso em: 12 de mai, 2023 Disponível em: <a href="https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13403/1/21503102.pdf">https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13403/1/21503102.pdf</a> OLIVEIRA, Carolina Brandão de. O dilema da criminalização do aborto no Brasil: do direito à vida do feto aos direitos reprodutivos da mulher. 2021. Acesso em: 9 jun, 2023. Disponível em: <a href="https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/23549/OLIVEIRA%2C%20Carolina%20Brandão%20de..pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y">https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/23549/OLIVEIRA%2C%20Carolina%20Brandão%20de..pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y</a> GUTTMACHER INSTITUTE, 2018. Abortion Worldwide 2017—Resumo Executivo. Disponível em: (#60) <a href="https://www.guttmacher.org/es/report/aborto-a-nivel-mundial-2017-resumen-ejecutivo">https://www.guttmacher.org/es/report/aborto-a-nivel-mundial-2017-resumen-ejecutivo</a> (#62). Acesso em: 16 jun, 2023. VENTURA, Miriam. DIREITOS REPRODUTIVOS NO BRASIL. Brasília. FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – UNFPA, 2009. Disponível em: (#60) <a href="http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf">http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf</a> (#62). acesso em: 16 jun, 2023.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14912	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4121821 - THIAGO MENDONÇA DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Tabatah Hellen Santos Gomes		
<b>TITULO</b>	Influência do treinamento funcional sobre aspectos da qualidade de vida de idosos			
<b>INTRODUCA O</b>	A fase da terceira idade é caracterizada pela perda de muitas valências físicas e psicológicas, o que por muitas vezes dificulta a locomoção, atividades do dia e a demora do processamento de uma sinapse, acarretada por sedentarismo e má alimentação. Atualmente pesquisas e a mídia vêm demonstrando a importância do exercício físico para diminuir a sarcopenia em idosos e também após a COVID 19 mostrou ser extremamente benéfico para a população que já mantinham uma rotina de treino e boa alimentação, fazendo com que pessoas que tivessem uma boa aptidão física contraíssem o vírus com sintomas mais amenos em comparação com aqueles que eram sedentários e mantinham uma alimentação ruim.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar a influência do treinamento funcional para idosos.			
<b>METODOLOGIA</b>	O presente estudo irá utilizar a revisão na literatura como fonte de avaliação para os seus dados, com a leitura de artigos, sites de ciências, aulas e entre outros tipos de buscas científicas, visando filtrar os assuntos abordados sobre treinamento funcional para qualidade de vida dos idosos. Foram utilizados artigos de 2016 à 2022, sendo esse o mais recente e relevante para a pesquisa.			
<b>RESULTADO S</b>	Idosos que adquirem uma rotina de treinamento funcional e bons hábitos alimentares obtiveram uma melhor qualidade de vida, saúde e independência, comparando com aqueles que não realizaram programas de treinamentos funcionais, além de estar diretamente associada ao regresso da sarcopenia, redução do avanço de doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão e outros, o exercício funcional demonstrou grande ajuda para atividades normais do dia também, como arrumar a casa, se deslocar, realizar tarefas básicas e ser mais independente.			
<b>CONCLUSOES</b>	Idosos que adquirem uma rotina de treinamento funcional e bons hábitos alimentares obtiveram uma melhor qualidade de vida, saúde e independência			
<b>REFERENCIA S</b>	Referências: ARAÚJO, Mariângela Ferraz Rodrigues; RODRIGUES, Tamara Cristina Gomes Ferraz; LIMA, Wilson Pereira. A influência do treinamento funcional na qualidade de vida dos idosos: uma revisão integrativa. e-Scientia, v. 12, n. 1, p. 15-21, 2019. CIOATO, Leonardo et al. Impacto do treinamento funcional na qualidade de vida dos idosos: uma revisão integrativa. Clinical and biomedical research. Porto Alegre, 2020. DA SILVA, Maguino Santos et al. Eletroestimulação e treinamento físico: uma revisão narrativa. Research, Society and Development, v. 9, n. 12, p. e4691211528-e4691211528, 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14913	Educação Física	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		843610 - THAIS REIMBERG DE SOUZA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Ytala Pinheiro Fernandes	Janaina do Nascimento Diogo Longo	
<b>TITULO</b>	O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL			
<b>INTRODUCAO</b>	O papel das tecnologias digitais na formação acadêmica e profissional é cada vez mais relevante. Durante a pandemia de Sars-CoV-2, a COVID-19, ficou evidente a necessidade de os profissionais se adaptarem e evoluírem em relação ao uso dessas ferramentas em suas metodologias e estratégias pedagógicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Refletir sobre a atuação de um profissional de Educação Física em suas aulas práticas no ensino fundamental, em uma escola de referência, localizada no interior do estado do Ceará, durante o período da pandemia.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada foi uma análise qualitativa do relato de experiência dos autores considerando a literatura disponível acerca da intervenção do papel do professor na utilização de tecnologias digitais em meio a pandemia.			
<b>RESULTADO S</b>	Segundo Almeida, na concordância entre os espaços físicos e virtuais, surgem novas formas de expressar pensamentos, impulsionadas por uma diversidade tecnologia. Essas transformações exigem uma postura crítica em relação à tecnologia e ao conhecimento (Almeida, 2018). O processo de trabalho do educador iniciou-se pela preparação de aulas que visavam despertar o interesse e o engajamento dos alunos além do esporte. Considerando as individualidades e dificuldades dos discentes, as aulas foram planejadas de forma dinâmica e em interação com outras disciplinas, como matemática, português, ciências, entre outras. Não existia um plano de educação continuada por parte da escola para esse momento crítico, pois não era o foco da instituição. Cada professor se adaptou e atuou a seu modo, de acordo com suas habilidades e recursos disponíveis. O processo de ensino-aprendizagem é otimizado com a incorporação das tecnologias digitais, uma vez que estas oferecem ferramentas que auxiliam os alunos na abstração de conceitos. Essa integração promove um ambiente propício para o desenvolvimento da criatividade dos estudantes durante o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Essas novas metodologias utilizando as ferramentas tecnológicas digitais, são apoiadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de forma que a inovação na área educacional tenha uma base legal (BNCC, 2017, p. 9). Apesar das circunstâncias, foi um avanço quando novos métodos pedagógicos foram desafiados e aos poucos vivenciados por muitos professores e alunos, apesar dos desafios enfrentados.			
<b>CONCLUSOES</b>	Tendo em vista as situações vivenciadas durante o período pandêmico, foi possível constatar que a crise sanitária evidenciou as insuficiências e potencializou fragilidades pré-existentes no sistema educacional, ao mesmo tempo que também trouxe à tona novos desafios e demandas, dentre os quais a emergente necessidade do emprego das tecnologias digitais nas práticas educativas.			
<b>REFERENCIA S</b>	ALMEIDA, M. E. B. Metodologias ativas para uma educação inovadora. In: Lillian Bacich e José Moran (Org.). desafios da Educação. Penso Editora Ltda, 2018. p.14. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília - DF, 2017, p. 9 – 10 – Disponível em: <a href="http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versa_ofinal_si_te.pdf">http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versa_ofinal_si_te.pdf</a> . Acesso em: 20 nov. 2021. PINTO, Janille Costa; LIMA, Daniela de Jesus. O uso do podcast para a formação continuada dos professores. Revista Encantar - Educação, Cultura e Sociedade – Bom Jesus da Lapa, v. 2, p. 01-12, jan./dez. 2020.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14920	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4376072 - FERNANDA DOS SANTOS GUIMARÃES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginof		
<b>TITULO</b>	Dificuldades de acesso à saúde pública vivenciadas por Homens Transexuais			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A Transexualidade é definida como uma identidade de gênero, na qual uma pessoa não se identifica com seu gênero titulado no momento do nascimento. Dentro deste termo, existem diversas vertentes, onde as pessoas se identificam como: mulher transexual, travesti e homem transexual, sendo este último, a população alvo desta pesquisa. Grande parte deles relatam as barreiras enfrentadas durante o acesso à saúde, ocasionando um alto nível de evasão desses serviços. A importância da Enfermagem nesse processo é imensa, pois lidamos diretamente com os cuidados integrais do paciente. Este trabalho busca evidenciar as dificuldades que os homens transexuais vivenciam no Brasil em relação ao acesso à Saúde Pública, visto que ainda hoje é presente o preconceito e a invisibilidade desta população.			
<b>OBJETIVOS</b>	Ampliar o conhecimento dos leitores sobre o tema abordado, de forma que os problemas existentes na população de homens transexuais no âmbito da Saúde possam ser evitados e conseqüentemente, ocorra a diminuição dos obstáculos ao acesso à Saúde Pública do Brasil por estes homens.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que utilizou as bases de dados Scielo e Medline. Foram utilizados os descritores: Homens Transexuais, dificuldades de acesso e saúde pública.			
<b>RESULTADOS</b>	Após a leitura e análise bibliográfica, pude apresentar a história da Transexualidade, Leis e direitos dos Homens Transexuais, processos disponíveis gratuitamente pelo SUS e principalmente, as dificuldades vivenciadas pela população, relacionadas ao acesso à Saúde Pública no Brasil.			
<b>CONCLUSOES</b>	Foi possível concluir que apesar da existência de diversas leis que apoiam e buscam garantir o respeito, segurança e saúde das pessoas transexuais, ainda hoje, o preconceito se faz presente, até mesmo entre os profissionais da área, prejudicando o qualquer acesso e o atendimento deste público.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. CIASCA, S. V.; HERCOWITZ, A.; JUNIOR, A. L. Saúde LGBTQIA+: práticas de cuidado transdisciplinar. Manole. Santana de Parnaíba – SP, 2021. 2. NEVES, U. Transexualidade não é mais considerada um transtorno mental. Portal PEBMED. Janeiro de 2022. Disponível em: (#60)https://pebmed.com.br/transexualidade-nao-e-mais-considerada-um-transtorno-mental/(#62) 3. OLIVEIRA, J. P.; SPRUNG, L. S. Barreiras para o acesso à saúde pública da população trans no Brasil: uma revisão narrativa. Feminina. 2022. Disponível em: (#60)https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/10/1397893/femina-2022-509-560-567.pdf#:~:text=Os%20principais%20pontos%20levantados%20foram,a%20centraliza%C3%A7%C3%A3o%20regional%20do%20processo(#62)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14921	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4058305 - LUCAS HENRICK DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	CORRELAÇÕES ENTRE USO DE CIGARRO ELETRÔNICO E TABAGISMO CONVENCIONAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As políticas de saúde pública no Brasil e no mundo, nos últimos anos, estão trabalhando de forma intensa contra hábitos tabagistas visto que essa prática é considerada a maior causa de morte evitável no mundo, entretanto a evolução do uso de tabaco se tornou uma preocupação abrangente pois dispositivos como cigarros eletrônicos estão alcançando novos público, se tornando popular na sociedade contemporânea e consequentemente apresentando uma nova ameaça para a saúde pública global.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a possível correlação entre o uso de cigarros eletrônicos com o consumo de cigarros tradicionais, ressaltando os fatores epidemiológicos, sociais e psicológicos que podem estar ligados a essa associação.			
<b>METODOLOGIA</b>	Busca por artigos literários publicadas filtrando entre os anos de 2017 e 2022 no repositório SciELO e restringindo no período entre 2022 e 2023 no repositório PubMed a partir dos descritores "Cigarro Eletrônico", "Vaping (AND) Tobacco Smoking", respectivamente. No Pubmed foram selecionados apenas revisões e meta análises.			
<b>RESULTADOS</b>	O tema discutido, apesar de muito novo, apresenta de forma clara uma relação mútua entre o tabagismo convencional e eletrônico, mostrando a importância de entender sua popularização e perfil epidemiológico de seus usuários, a fim da evolução das medidas públicas contra hábitos tabagistas em prol da diminuição da mortalidade ocasionada por essa prática, e de evitar uma nova crescente do uso de tabaco convencional.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Apesar de ter como intuito inicial o auxílio no cessamento do cigarro convencional, os estudos mostram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar tem influência direta no aumento do risco do tabagismo convencional, sendo um meio de iniciação, que está se popularizando e sendo usado de forma exacerbada principalmente pelo público jovem, incluindo escolares, resultando num futuro problema para a saúde coletiva no futuro.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>BARA, R. P. R. et al. "They're sleek, stylish and sexy:" selling e-cigarettes online. Australian and New Zealand Journal of Public Health. V. 47, p. 1-7, 2022.</p> <p>CAVALCANTE, T. M. et al. Conhecimento e uso de cigarros eletrônicos e percepção de risco no Brasil: resultados de um país com requisitos regulatórios rígidos. Cadernos de Saúde Pública. v. 33, p. 1-11, 2017. HAJAT, C. et al. A scoping review of studies on the health impact of electronic nicotine delivery systems. Internal and Emergency Medicine. V. 17, p. 241-268, 2022. The electronic cigarette: the new cigarette of the 21st century?. Jornal NOTLEY, C. et al. Youth use of e-liquid flavours - a systematic review exploring patterns of use of e- liquid flavours and associations with continued vaping, tobacco smoking uptake or cessation. Society for the Study of Addiction. V. 117, p. 1258-1272, 2022. PISINGER, C.; RASMUSSEN, S. K. B. The Health Effects of Real-World Dual Use of Electronic and Conventional Cigarettes versus the Health Effects of Exclusive Smoking of Conventional Cigarettes: A Systematic Review. International Journal of Environmental Recheart and Publib Health. V. 19, p. 1-23, 2022. BARUFALDI, L. A. et al. Risco de iniciação ao tabagismo com o uso de cigarros eletrônicos: revisão 20 sistemática e meta-análise. Ciência (#38) Saúde Coletiva. v. 25, p. 6089-6103, 2021. HASSANEIN, Z. M. et al. Impact of Smoking and Vaping in Films on Smoking and Vaping Uptake in Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis. Health Education (#38) Behavior. v. 49, p. 1004- 1013, 2022. KIM, M. M. et al. A Systematic Review and Meta-analysis of the Association between E-cigarette Use among Cigarette Smokers and Quit Attempts Made to Abstain from Cigarette Smoking. American Journal of Health Behavior. v. 46, p. 358-375, 2022. KNORST, M. M. et al. Brasileiro de Pneumologia. v. 40, p. 564-573, 2014. MALTA, D. C. et al. Uso de cigarro, narguilé, cigarro eletrônico e outros indicadores do tabaco entre escolares brasileiros: dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2019. Revista Brasileira de Epidemiologia. v. 25, p. 1-14, 2022. MENEZES, A. M. B. et al. Use of electronic cigarettes and hookah in Brazil: a new and emerging landscape. The Covitel study, 2022. Jornal Brasileiro de Pneumologia. v. 49, p. 1-7, 2023. URRUTIA-PEREIRA, M. et al. Prevalence and factors associated with smoking among adolescents. Jornal de Pediatria. v. 93, p. 230-237, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14921	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4206665 - ANDRE DAVID DE BRITO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	CORRELAÇÕES ENTRE USO DE CIGARRO ELETRÔNICO E TABAGISMO CONVENCIONAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As políticas de saúde pública no Brasil e no mundo, nos últimos anos, estão trabalhando de forma intensa contra hábitos tabagistas visto que essa prática é considerada a maior causa de morte evitável no mundo, entretanto a evolução do uso de tabaco se tornou uma preocupação abrangente pois dispositivos como cigarros eletrônicos estão alcançando novos público, se tornando popular na sociedade contemporânea e consequentemente apresentando uma nova ameaça para a saúde pública global.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a possível correlação entre o uso de cigarros eletrônicos com o consumo de cigarros tradicionais, ressaltando os fatores epidemiológicos, sociais e psicológicos que podem estar ligados a essa associação.			
<b>METODOLOGIA</b>	Busca por artigos literários publicadas filtrando entre os anos de 2017 e 2022 no repositório SciELO e restringindo no período entre 2022 e 2023 no repositório PubMed a partir dos descritores "Cigarro Eletrônico", "Vaping (AND) Tobacco Smoking", respectivamente. No Pubmed foram selecionados apenas revisões e meta análises.			
<b>RESULTADOS</b>	O tema discutido, apesar de muito novo, apresenta de forma clara uma relação mútua entre o tabagismo convencional e eletrônico, mostrando a importância de entender sua popularização e perfil epidemiológico de seus usuários, a fim da evolução das medidas públicas contra hábitos tabagistas em prol da diminuição da mortalidade ocasionada por essa prática, e de evitar uma nova crescente do uso de tabaco convencional.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Apesar de ter como intuito inicial o auxílio no cessamento do cigarro convencional, os estudos mostram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar tem influência direta no aumento do risco do tabagismo convencional, sendo um meio de iniciação, que está se popularizando e sendo usado de forma exacerbada principalmente pelo público jovem, incluindo escolares, resultando num futuro problema para a saúde coletiva no futuro.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>BARA, R. P. R. et al. "They're sleek, stylish and sexy:" selling e-cigarettes online. Australian and New Zealand Journal of Public Health. V. 47, p. 1-7, 2022.</p> <p>CAVALCANTE, T. M. et al. Conhecimento e uso de cigarros eletrônicos e percepção de risco no Brasil: resultados de um país com requisitos regulatórios rígidos. Cadernos de Saúde Pública. v. 33, p. 1-11, 2017. HAJAT, C. et al. A scoping review of studies on the health impact of electronic nicotine delivery systems. Internal and Emergency Medicine. V. 17, p. 241-268, 2022. The electronic cigarette: the new cigarette of the 21st century?. Jornal NOTLEY, C. et al. Youth use of e-liquid flavours - a systematic review exploring patterns of use of e- liquid flavours and associations with continued vaping, tobacco smoking uptake or cessation. Society for the Study of Addiction. V. 117, p. 1258-1272, 2022. PISINGER, C.; RASMUSSEN, S. K. B. The Health Effects of Real-World Dual Use of Electronic and Conventional Cigarettes versus the Health Effects of Exclusive Smoking of Conventional Cigarettes: A Systematic Review. International Journal of Environmental Recheart and Publib Health. V. 19, p. 1-23, 2022. BARUFALDI, L. A. et al. Risco de iniciação ao tabagismo com o uso de cigarros eletrônicos: revisão 20 sistemática e meta-análise. Ciência (#38) Saúde Coletiva. v. 25, p. 6089-6103, 2021. HASSANEIN, Z. M. et al. Impact of Smoking and Vaping in Films on Smoking and Vaping Uptake in Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis. Health Education (#38) Behavior. v. 49, p. 1004- 1013, 2022. KIM, M. M. et al. A Systematic Review and Meta-analysis of the Association between E-cigarette Use among Cigarette Smokers and Quit Attempts Made to Abstain from Cigarette Smoking. American Journal of Health Behavior. v. 46, p. 358-375, 2022. KNORST, M. M. et al. Brasileiro de Pneumologia. v. 40, p. 564-573, 2014. MALTA, D. C. et al. Uso de cigarro, narguilé, cigarro eletrônico e outros indicadores do tabaco entre escolares brasileiros: dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2019. Revista Brasileira de Epidemiologia. v. 25, p. 1-14, 2022. MENEZES, A. M. B. et al. Use of electronic cigarettes and hookah in Brazil: a new and emerging landscape. The Covitel study, 2022. Jornal Brasileiro de Pneumologia. v. 49, p. 1-7, 2023. URRUTIA-PEREIRA, M. et al. Prevalence and factors associated with smoking among adolescents. Jornal de Pediatria. v. 93, p. 230-237, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14921	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4207467 - GUILHERME HENRIQUE NOGUEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	CORRELAÇÕES ENTRE USO DE CIGARRO ELETRÔNICO E TABAGISMO CONVENCIONAL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As políticas de saúde pública no Brasil e no mundo, nos últimos anos, estão trabalhando de forma intensa contra hábitos tabagistas visto que essa prática é considerada a maior causa de morte evitável no mundo, entretanto a evolução do uso de tabaco se tornou uma preocupação abrangente pois dispositivos como cigarros eletrônicos estão alcançando novos público, se tornando popular na sociedade contemporânea e consequentemente apresentando uma nova ameaça para a saúde pública global.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar a possível correlação entre o uso de cigarros eletrônicos com o consumo de cigarros tradicionais, ressaltando os fatores epidemiológicos, sociais e psicológicos que podem estar ligados a essa associação.			
<b>METODOLOGIA</b>	Busca por artigos literários publicadas filtrando entre os anos de 2017 e 2022 no repositório SciELO e restringindo no período entre 2022 e 2023 no repositório PubMed a partir dos descritores "Cigarro Eletrônico", "Vaping (AND) Tobacco Smoking", respectivamente. No Pubmed foram selecionados apenas revisões e meta análises.			
<b>RESULTADOS</b>	O tema discutido, apesar de muito novo, apresenta de forma clara uma relação mútua entre o tabagismo convencional e eletrônico, mostrando a importância de entender sua popularização e perfil epidemiológico de seus usuários, a fim da evolução das medidas públicas contra hábitos tabagistas em prol da diminuição da mortalidade ocasionada por essa prática, e de evitar uma nova crescente do uso de tabaco convencional.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Apesar de ter como intuito inicial o auxílio no cessamento do cigarro convencional, os estudos mostram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar tem influência direta no aumento do risco do tabagismo convencional, sendo um meio de iniciação, que está se popularizando e sendo usado de forma exacerbada principalmente pelo público jovem, incluindo escolares, resultando num futuro problema para a saúde coletiva no futuro.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>BARA, R. P. R. et al. "They're sleek, stylish and sexy:" selling e-cigarettes online. Australian and New Zealand Journal of Public Health. V. 47, p. 1-7, 2022.</p> <p>CAVALCANTE, T. M. et al. Conhecimento e uso de cigarros eletrônicos e percepção de risco no Brasil: resultados de um país com requisitos regulatórios rígidos. Cadernos de Saúde Pública. v. 33, p. 1-11, 2017. HAJAT, C. et al. A scoping review of studies on the health impact of electronic nicotine delivery systems. Internal and Emergency Medicine. V. 17, p. 241-268, 2022. The electronic cigarette: the new cigarette of the 21st century?. Jornal NOTLEY, C. et al. Youth use of e-liquid flavours - a systematic review exploring patterns of use of e- liquid flavours and associations with continued vaping, tobacco smoking uptake or cessation. Society for the Study of Addiction. V. 117, p. 1258-1272, 2022. PISINGER, C.; RASMUSSEN, S. K. B. The Health Effects of Real-World Dual Use of Electronic and Conventional Cigarettes versus the Health Effects of Exclusive Smoking of Conventional Cigarettes: A Systematic Review. International Journal of Environmental Recheart and Publib Health. V. 19, p. 1-23, 2022. BARUFALDI, L. A. et al. Risco de iniciação ao tabagismo com o uso de cigarros eletrônicos: revisão 20 sistemática e meta-análise. Ciência (#38) Saúde Coletiva. v. 25, p. 6089-6103, 2021. HASSANEIN, Z. M. et al. Impact of Smoking and Vaping in Films on Smoking and Vaping Uptake in Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis. Health Education (#38) Behavior. v. 49, p. 1004- 1013, 2022. KIM, M. M. et al. A Systematic Review and Meta-analysis of the Association between E-cigarette Use among Cigarette Smokers and Quit Attempts Made to Abstain from Cigarette Smoking. American Journal of Health Behavior. v. 46, p. 358-375, 2022. KNORST, M. M. et al. Brasileiro de Pneumologia. v. 40, p. 564-573, 2014. MALTA, D. C. et al. Uso de cigarro, narguilé, cigarro eletrônico e outros indicadores do tabaco entre escolares brasileiros: dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2019. Revista Brasileira de Epidemiologia. v. 25, p. 1-14, 2022. MENEZES, A. M. B. et al. Use of electronic cigarettes and hookah in Brazil: a new and emerging landscape. The Covitel study, 2022. Jornal Brasileiro de Pneumologia. v. 49, p. 1-7, 2023. URRUTIA-PEREIRA, M. et al. Prevalence and factors associated with smoking among adolescents. Jornal de Pediatria. v. 93, p. 230-237, 2017.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14922	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5070392 - BEATRIZ MARTIN TUFFY		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	PREVENÇÃO DE AMEBÍASE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE			
<b>INTRODUCA O</b>	A amebíase, também conhecida como disenteria amebiana, é uma infecção intestinal causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Esta doença é uma das principais causas de diarreia em países em desenvolvimento e regiões com más condições de saneamento básico. A amebíase é transmitida principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. Ela pode variar de uma infecção assintomática a casos graves, caracterizados por diarreia com sangue, dor abdominal e febre. Se não tratada, a amebíase pode levar a complicações sérias. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para a recuperação completa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O projeto buscou melhorar a saúde pública através da atuação informada e eficiente dos profissionais de saúde e dos seus usuários. Tivemos como foco a diminuição dos casos de amebíase na cidade de Guarulhos e a disseminação de informações aos profissionais de saúde e através desses a sua comunidade. Planejamos também educar a população sobre higiene pessoal, saneamento e consumo de água segura. Estabelecemos sistemas de rastreamento para identificar áreas de alto risco e promover diagnósticos precoces.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem combinou conhecimento teórico promovendo colaboração interdisciplinar para enfrentar a doença de forma integrada. Para que fosse possível alcançar os objetivos, planejamos uma série de abordagens conduzindo campanhas de conscientização sobre a amebíase e seus métodos de tratamento por meio de panfletos específicos para cada público alvo. Além disso, implementamos um sistema para que seja possível avaliar quantidade de casos no território de cada Unidade Básica de Saúde.			
<b>RESULTADO S</b>	Durante o projeto com as campanhas de conscientização, atingimos um total de cinco Unidades Básicas de Saúde dentro do município de Guarulhos. Dentro dessas unidades, alcançamos diretamente 250 usuários da rede com entrega em mãos de panfletos didáticos, porém com a capacitação adequada dos profissionais da atenção primária do Sistema Único de Saúde, esperamos atingir cerca de 8 mil pessoas atendidas nas UBS participantes.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Este projeto representou um esforço significativo na luta contra a amebíase em Guarulhos. Ao combinar conhecimento teórico, colaboração interdisciplinar e abordagens práticas, esperamos realmente ter feito a diferença na população alvo de cada UBS. Ao educar os profissionais de saúde e a comunidade, promover a higiene pessoal e o saneamento, e estabelecer sistemas de rastreamento, incentivamos a atualização constante para a redução dos casos de amebíase. Este foi um passo crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na promoção de uma cidade mais saudável e informada.			
<b>REFERENCIA S</b>	NICOLI, Bruna Moreira et al. AMEBÍASE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E VISÃO EPIDEMIOLÓGICA. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, n. 3, 2018. Escobedo AA, Almirall P, Alfonso M, et al: Treatment of intestinal protozoan infections in children. Arch Dis Child 94(6):478-82, 2009 doi: 10.1136/adc.2008.. Rossignol JF, Kabil SM, El-Gohary Y, et al: Nitazoxanide in the treatment of amoebiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 101(10):1025-31, 2007. doi: 10.1016/j.trstmh.2007.04.001			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14922	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		<b>Orientador Externo</b>		
		5232741 - ANA BEATRIZ CREPALDI DA SILVA		2 - Aprovado
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
		1 - Poster		
<b>TITULO</b>	PREVENÇÃO DE AMEBÍASE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE			
<b>INTRODUCA O</b>	A amebíase, também conhecida como disenteria amebiana, é uma infecção intestinal causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Esta doença é uma das principais causas de diarreia em países em desenvolvimento e regiões com más condições de saneamento básico. A amebíase é transmitida principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. Ela pode variar de uma infecção assintomática a casos graves, caracterizados por diarreia com sangue, dor abdominal e febre. Se não tratada, a amebíase pode levar a complicações sérias. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para a recuperação completa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O projeto buscou melhorar a saúde pública através da atuação informada e eficiente dos profissionais de saúde e dos seus usuários. Tivemos como foco a diminuição dos casos de amebíase na cidade de Guarulhos e a disseminação de informações aos profissionais de saúde e através desses a sua comunidade. Planejamos também educar a população sobre higiene pessoal, saneamento e consumo de água segura. Estabelecemos sistemas de rastreamento para identificar áreas de alto risco e promover diagnósticos precoces.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem combinou conhecimento teórico promovendo colaboração interdisciplinar para enfrentar a doença de forma integrada. Para que fosse possível alcançar os objetivos, planejamos uma série de abordagens conduzindo campanhas de conscientização sobre a amebíase e seus métodos de tratamento por meio de panfletos específicos para cada público alvo. Além disso, implementamos um sistema para que seja possível avaliar quantidade de casos no território de cada Unidade Básica de Saúde.			
<b>RESULTADO S</b>	Durante o projeto com as campanhas de conscientização, atingimos um total de cinco Unidades Básicas de Saúde dentro do município de Guarulhos. Dentro dessas unidades, alcançamos diretamente 250 usuários da rede com entrega em mãos de panfletos didáticos, porém com a capacitação adequada dos profissionais da atenção primária do Sistema Único de Saúde, esperamos atingir cerca de 8 mil pessoas atendidas nas UBS participantes.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Este projeto representou um esforço significativo na luta contra a amebíase em Guarulhos. Ao combinar conhecimento teórico, colaboração interdisciplinar e abordagens práticas, esperamos realmente ter feito a diferença na população alvo de cada UBS. Ao educar os profissionais de saúde e a comunidade, promover a higiene pessoal e o saneamento, e estabelecer sistemas de rastreamento, incentivamos a atualização constante para a redução dos casos de amebíase. Este foi um passo crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na promoção de uma cidade mais saudável e informada.			
<b>REFERENCIA S</b>	NICOLI, Bruna Moreira et al. AMEBÍASE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E VISÃO EPIDEMIOLÓGICA. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, n. 3, 2018. Escobedo AA, Almirall P, Alfonso M, et al: Treatment of intestinal protozoan infections in children. Arch Dis Child 94(6):478-82, 2009 doi: 10.1136/adc.2008.. Rossignol JF, Kabil SM, El-Gohary Y, et al: Nitazoxanide in the treatment of amoebiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 101(10):1025-31, 2007. doi: 10.1016/j.trstmh.2007.04.001			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14922	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233372 - NICOLAS GUIMARÃES REUTERS DE FREITAS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
		<b>Orientador Externo</b>		
				1 - Poster
<b>TITULO</b>	PREVENÇÃO DE AMEBÍASE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A amebíase, também conhecida como disenteria amebiana, é uma infecção intestinal causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Esta doença é uma das principais causas de diarreia em países em desenvolvimento e regiões com más condições de saneamento básico. A amebíase é transmitida principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. Ela pode variar de uma infecção assintomática a casos graves, caracterizados por diarreia com sangue, dor abdominal e febre. Se não tratada, a amebíase pode levar a complicações sérias. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para a recuperação completa.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O projeto buscou melhorar a saúde pública através da atuação informada e eficiente dos profissionais de saúde e dos seus usuários. Tivemos como foco a diminuição dos casos de amebíase na cidade de Guarulhos e a disseminação de informações aos profissionais de saúde e através desses a sua comunidade. Planejamos também educar a população sobre higiene pessoal, saneamento e consumo de água segura. Estabelecemos sistemas de rastreamento para identificar áreas de alto risco e promover diagnósticos precoces.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A abordagem combinou conhecimento teórico promovendo colaboração interdisciplinar para enfrentar a doença de forma integrada. Para que fosse possível alcançar os objetivos, planejamos uma série de abordagens conduzindo campanhas de conscientização sobre a amebíase e seus métodos de tratamento por meio de panfletos específicos para cada público alvo. Além disso, implementamos um sistema para que seja possível avaliar quantidade de casos no território de cada Unidade Básica de Saúde.</p>			
<b>RESULTADO S</b>	<p>Durante o projeto com as campanhas de conscientização, atingimos um total de cinco Unidades Básicas de Saúde dentro do município de Guarulhos. Dentro dessas unidades, alcançamos diretamente 250 usuários da rede com entrega em mãos de panfletos didáticos, porém com a capacitação adequada dos profissionais da atenção primária do Sistema Único de Saúde, esperamos atingir cerca de 8 mil pessoas atendidas nas UBS participantes.</p>			
<b>CONCLUSOE S</b>	<p>Este projeto representou um esforço significativo na luta contra a amebíase em Guarulhos. Ao combinar conhecimento teórico, colaboração interdisciplinar e abordagens práticas, esperamos realmente ter feito a diferença na população alvo de cada UBS. Ao educar os profissionais de saúde e a comunidade, promover a higiene pessoal e o saneamento, e estabelecer sistemas de rastreamento, incentivamos a atualização constante para a redução dos casos de amebíase. Este foi um passo crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na promoção de uma cidade mais saudável e informada.</p>			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>NICOLI, Bruna Moreira et al. AMEBÍASE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E VISÃO EPIDEMIOLÓGICA. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, n. 3, 2018. Escobedo AA, Almirall P, Alfonso M, et al: Treatment of intestinal protozoan infections in children. Arch Dis Child 94(6):478-82, 2.009 doi: 10.1136/adc.2008.. Rossignol JF, Kabil SM, El-Gohary Y, et al: Nitazoxanide in the treatment of amoebiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 101(10):1025-31, 2007. doi: 10.1016/j.trstmh.2007.04.001</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14922	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador Externo</b>
		<b>Orientador 2</b>		
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
<b>TITULO</b>	PREVENÇÃO DE AMEBÍASE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE			
<b>INTRODUCA O</b>	A amebíase, também conhecida como disenteria amebiana, é uma infecção intestinal causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Esta doença é uma das principais causas de diarreia em países em desenvolvimento e regiões com más condições de saneamento básico. A amebíase é transmitida principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. Ela pode variar de uma infecção assintomática a casos graves, caracterizados por diarreia com sangue, dor abdominal e febre. Se não tratada, a amebíase pode levar a complicações sérias. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para a recuperação completa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O projeto buscou melhorar a saúde pública através da atuação informada e eficiente dos profissionais de saúde e dos seus usuários. Tivemos como foco a diminuição dos casos de amebíase na cidade de Guarulhos e a disseminação de informações aos profissionais de saúde e através desses a sua comunidade. Planejamos também educar a população sobre higiene pessoal, saneamento e consumo de água segura. Estabelecemos sistemas de rastreamento para identificar áreas de alto risco e promover diagnósticos precoces.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem combinou conhecimento teórico promovendo colaboração interdisciplinar para enfrentar a doença de forma integrada. Para que fosse possível alcançar os objetivos, planejamos uma série de abordagens conduzindo campanhas de conscientização sobre a amebíase e seus métodos de tratamento por meio de panfletos específicos para cada público alvo. Além disso, implementamos um sistema para que seja possível avaliar quantidade de casos no território de cada Unidade Básica de Saúde.			
<b>RESULTADO S</b>	Durante o projeto com as campanhas de conscientização, atingimos um total de cinco Unidades Básicas de Saúde dentro do município de Guarulhos. Dentro dessas unidades, alcançamos diretamente 250 usuários da rede com entrega em mãos de panfletos didáticos, porém com a capacitação adequada dos profissionais da atenção primária do Sistema Único de Saúde, esperamos atingir cerca de 8 mil pessoas atendidas nas UBS participantes.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Este projeto representou um esforço significativo na luta contra a amebíase em Guarulhos. Ao combinar conhecimento teórico, colaboração interdisciplinar e abordagens práticas, esperamos realmente ter feito a diferença na população alvo de cada UBS. Ao educar os profissionais de saúde e a comunidade, promover a higiene pessoal e o saneamento, e estabelecer sistemas de rastreamento, incentivamos a atualização constante para a redução dos casos de amebíase. Este foi um passo crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na promoção de uma cidade mais saudável e informada.			
<b>REFERENCIA S</b>	NICOLI, Bruna Moreira et al. AMEBÍASE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E VISÃO EPIDEMIOLÓGICA. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, n. 3, 2018. Escobedo AA, Almirall P, Alfonso M, et al: Treatment of intestinal protozoan infections in children. Arch Dis Child 94(6):478-82, 2009 doi: 10.1136/adc.2008. Rossignol JF, Kabil SM, El-Gohary Y, et al: Nitazoxanide in the treatment of amoebiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 101(10):1025-31, 2007. doi: 10.1016/j.trstmh.2007.04.001			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14922	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233674 - GIOVANNA MORENO TIOSSI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	PREVENÇÃO DE AMEBÍASE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE			
<b>INTRODUCA O</b>	A amebíase, também conhecida como disenteria amebiana, é uma infecção intestinal causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Esta doença é uma das principais causas de diarreia em países em desenvolvimento e regiões com más condições de saneamento básico. A amebíase é transmitida principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. Ela pode variar de uma infecção assintomática a casos graves, caracterizados por diarreia com sangue, dor abdominal e febre. Se não tratada, a amebíase pode levar a complicações sérias. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para a recuperação completa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O projeto buscou melhorar a saúde pública através da atuação informada e eficiente dos profissionais de saúde e dos seus usuários. Tivemos como foco a diminuição dos casos de amebíase na cidade de Guarulhos e a disseminação de informações aos profissionais de saúde e através desses a sua comunidade. Planejamos também educar a população sobre higiene pessoal, saneamento e consumo de água segura. Estabelecemos sistemas de rastreamento para identificar áreas de alto risco e promover diagnósticos precoces.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem combinou conhecimento teórico promovendo colaboração interdisciplinar para enfrentar a doença de forma integrada. Para que fosse possível alcançar os objetivos, planejamos uma série de abordagens conduzindo campanhas de conscientização sobre a amebíase e seus métodos de tratamento por meio de panfletos específicos para cada público alvo. Além disso, implementamos um sistema para que seja possível avaliar quantidade de casos no território de cada Unidade Básica de Saúde.			
<b>RESULTADO S</b>	Durante o projeto com as campanhas de conscientização, atingimos um total de cinco Unidades Básicas de Saúde dentro do município de Guarulhos. Dentro dessas unidades, alcançamos diretamente 250 usuários da rede com entrega em mãos de panfletos didáticos, porém com a capacitância adequada dos profissionais da atenção primária do Sistema Único de Saúde, esperamos atingir cerca de 8 mil pessoas atendidas nas UBS participantes.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Este projeto representou um esforço significativo na luta contra a amebíase em Guarulhos. Ao combinar conhecimento teórico, colaboração interdisciplinar e abordagens práticas, esperamos realmente ter feito a diferença na população alvo de cada UBS. Ao educar os profissionais de saúde e a comunidade, promover a higiene pessoal e o saneamento, e estabelecer sistemas de rastreamento, incentivamos a atualização constante para a redução dos casos de amebíase. Este foi um passo crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na promoção de uma cidade mais saudável e informada.			
<b>REFERENCIA S</b>	NICOLI, Bruna Moreira et al. AMEBÍASE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E VISÃO EPIDEMIOLÓGICA. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, n. 3, 2018. Escobedo AA, Almirall P, Alfonso M, et al: Treatment of intestinal protozoan infections in children. Arch Dis Child 94(6):478-82, 2009 doi: 10.1136/adc.2008.. Rossignol JF, Kabil SM, El-Gohary Y, et al: Nitazoxanide in the treatment of amoebiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 101(10):1025-31, 2007. doi: 10.1016/j.trstmh.2007.04.001			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14922	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5244145 - JULIANA PEREIRA GAMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	PREVENÇÃO DE AMEBÍASE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE			
<b>INTRODUCA O</b>	A amebíase, também conhecida como disenteria amebiana, é uma infecção intestinal causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Esta doença é uma das principais causas de diarreia em países em desenvolvimento e regiões com más condições de saneamento básico. A amebíase é transmitida principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. Ela pode variar de uma infecção assintomática a casos graves, caracterizados por diarreia com sangue, dor abdominal e febre. Se não tratada, a amebíase pode levar a complicações sérias. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para a recuperação completa.			
<b>OBJETIVOS</b>	O projeto buscou melhorar a saúde pública através da atuação informada e eficiente dos profissionais de saúde e dos seus usuários. Tivemos como foco a diminuição dos casos de amebíase na cidade de Guarulhos e a disseminação de informações aos profissionais de saúde e através desses a sua comunidade. Planejamos também educar a população sobre higiene pessoal, saneamento e consumo de água segura. Estabelecemos sistemas de rastreamento para identificar áreas de alto risco e promover diagnósticos precoces.			
<b>METODOLOGIA</b>	A abordagem combinou conhecimento teórico promovendo colaboração interdisciplinar para enfrentar a doença de forma integrada. Para que fosse possível alcançar os objetivos, planejamos uma série de abordagens conduzindo campanhas de conscientização sobre a amebíase e seus métodos de tratamento por meio de panfletos específicos para cada público alvo. Além disso, implementamos um sistema para que seja possível avaliar quantidade de casos no território de cada Unidade Básica de Saúde.			
<b>RESULTADO S</b>	Durante o projeto com as campanhas de conscientização, atingimos um total de cinco Unidades Básicas de Saúde dentro do município de Guarulhos. Dentro dessas unidades, alcançamos diretamente 250 usuários da rede com entrega em mãos de panfletos didáticos, porém com a capacitação adequada dos profissionais da atenção primária do Sistema Único de Saúde, esperamos atingir cerca de 8 mil pessoas atendidas nas UBS participantes.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Este projeto representou um esforço significativo na luta contra a amebíase em Guarulhos. Ao combinar conhecimento teórico, colaboração interdisciplinar e abordagens práticas, esperamos realmente ter feito a diferença na população alvo de cada UBS. Ao educar os profissionais de saúde e a comunidade, promover a higiene pessoal e o saneamento, e estabelecer sistemas de rastreamento, incentivamos a atualização constante para a redução dos casos de amebíase. Este foi um passo crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na promoção de uma cidade mais saudável e informada.			
<b>REFERENCIA S</b>	NICOLI, Bruna Moreira et al. AMEBÍASE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E VISÃO EPIDEMIOLÓGICA. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, n. 3, 2018. Escobedo AA, Almirall P, Alfonso M, et al: Treatment of intestinal protozoan infections in children. Arch Dis Child 94(6):478-82, 2009 doi: 10.1136/adc.2008.. Rossignol JF, Kabil SM, El-Gohary Y, et al: Nitazoxanide in the treatment of amoebiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 101(10):1025-31, 2007. doi: 10.1016/j.trstmh.2007.04.001			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14923	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4112750 - EDNEI URSINI BARONI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Tubulação em PVC-U: vantagens em relação ao aço carbono em sistemas de ar condicionado			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O uso da água gelada em sistemas de climatização é um método amplamente utilizado para climatizar ambientes industriais e comerciais. A escolha do material para a condução da água gelada é um fator crucial para o desempenho e a durabilidade do sistema. O PVC-U é um termoplástico que possui maior rigidez do que o PVC comum, alta resistência térmica e de impactos, intempéries e agentes químicos. O aço carbono é um metal que possui boa resistência mecânica, mas é suscetível à corrosão e incrustação, o que prejudica a eficiência do sistema, gerando alto consumo de energia e aumentando a frequência da manutenção.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é realizar análise comparativa entre esses dois materiais, considerando os seguintes critérios: resistência mecânica, térmica e química, perda de carga, condensação, corrosão, custo e instalação.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se como base um edifício comercial de 20 andares e comprimento total das tubulações de 2.000 metros lineares, localizado na cidade de São Paulo. Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para a escolha do material mais adequado para cada situação e para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e duráveis. Para o desenvolvimento deste artigo foi necessário inicialmente identificar as características técnicas entre o PVC-U e o aço carbono.			
<b>RESULTADOS</b>	O PVC-U se mostrou superior em vários aspectos: mais eficiente (menor perda térmica), não sofre corrosão, menor peso na edificação já somado com acessórios. Em relação à viabilidade econômica o produto é mais barato que o aço e os custos de instalação e manutenção são significativamente menores, devido à facilidade de sua instalação e redução dos custos de mão de obra. Ambos os materiais podem ter impactos ambientais na produção e no descarte, porém o PVC-U tem algumas vantagens. É reciclável e tem uma vida útil mais longa que o aço carbono, o que pode reduzir seu impacto ambiental ao longo do tempo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base na análise dos resultados, conclui-se que o PVC-U é uma alternativa viável e vantajosa para o sistema de ar condicionado do edifício em questão. Ele oferece benefícios técnicos, econômicos e ambientais significativos em comparação com o aço carbono.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABNT. NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008. ABNT. NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008. ABNT. NBR 16401-3: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários Parte 3: Qualidade do ar interior. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008. HIDRODEMA. PVC-U SCH80 X AÇO: QUAIS AS VANTAGENS?. Disponível em: <a href="https://hidrodema.com.br/pvc-u-sch80-x-aco-quais-as-vantagens/">https://hidrodema.com.br/pvc-u-sch80-x-aco-quais-as-vantagens/</a> Acesso em: 24 set. 2023a. HIDRODEMA. Home (#62) PVC-U. Disponível em: <a href="https://hidrodema.com.br/informacoes/pvc-u">https://hidrodema.com.br/informacoes/pvc-u</a> Acesso em: 24 set. 2023b. REPLASS. PVC-U SCH 80 X AÇO para condução de água gelada em ar condicionado industrial. Disponível em: <a href="https://www.replass.com.br/post/21/pvc-u-sch-80-x-aco-para-conducao-de-agua-gelada-em-ar-condicionado-industrial">https://www.replass.com.br/post/21/pvc-u-sch-80-x-aco-para-conducao-de-agua-gelada-em-ar-condicionado-industrial</a> . Acesso em: 18 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14923	Engenharia Mecânica	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4573005 - CICERO BEZERRA MARTINS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jose Francisco de Camargo Barros Junior	Renato de Brito Sanchez	
<b>TITULO</b>	Tubulação em PVC-U: vantagens em relação ao aço carbono em sistemas de ar condicionado			
<b>INTRODUÇÃO</b>	O uso da água gelada em sistemas de climatização é um método amplamente utilizado para climatizar ambientes industriais e comerciais. A escolha do material para a condução da água gelada é um fator crucial para o desempenho e a durabilidade do sistema. O PVC-U é um termoplástico que possui maior rigidez do que o PVC comum, alta resistência térmica e de impactos, intempéries e agentes químicos. O aço carbono é um metal que possui boa resistência mecânica, mas é suscetível à corrosão e incrustação, o que prejudica a eficiência do sistema, gerando alto consumo de energia e aumentando a frequência da manutenção.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste trabalho é realizar análise comparativa entre esses dois materiais, considerando os seguintes critérios: resistência mecânica, térmica e química, perda de carga, condensação, corrosão, custo e instalação.			
<b>METODOLOGIA</b>	Utilizou-se como base um edifício comercial de 20 andares e comprimento total das tubulações de 2.000 metros lineares, localizado na cidade de São Paulo. Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para a escolha do material mais adequado para cada situação e para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e duráveis. Para o desenvolvimento deste artigo foi necessário inicialmente identificar as características técnicas entre o PVC-U e o aço carbono.			
<b>RESULTADOS</b>	O PVC-U se mostrou superior em vários aspectos: mais eficiente (menor perda térmica), não sofre corrosão, menor peso na edificação já somado com acessórios. Em relação à viabilidade econômica o produto é mais barato que o aço e os custos de instalação e manutenção são significativamente menores, devido à facilidade de sua instalação e redução dos custos de mão de obra. Ambos os materiais podem ter impactos ambientais na produção e no descarte, porém o PVC-U tem algumas vantagens. É reciclável e tem uma vida útil mais longa que o aço carbono, o que pode reduzir seu impacto ambiental ao longo do tempo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base na análise dos resultados, conclui-se que o PVC-U é uma alternativa viável e vantajosa para o sistema de ar condicionado do edifício em questão. Ele oferece benefícios técnicos, econômicos e ambientais significativos em comparação com o aço carbono.			
<b>REFERENCIAS</b>	ABNT. NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008. ABNT. NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008. ABNT. NBR 16401-3: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários Parte 3: Qualidade do ar interior. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008. HIDRODEMA. PVC-U SCH80 X AÇO: QUAIS AS VANTAGENS?. Disponível em: <a href="https://hidrodema.com.br/pvc-u-sch80-x-aco-quais-as-vantagens/">https://hidrodema.com.br/pvc-u-sch80-x-aco-quais-as-vantagens/</a> Acesso em: 24 set. 2023a. HIDRODEMA. Home (#62) PVC-U. Disponível em: <a href="https://hidrodema.com.br/informacoes/pvc-u">https://hidrodema.com.br/informacoes/pvc-u</a> Acesso em: 24 set. 2023b. REPLASS. PVC-U SCH 80 X AÇO para condução de água gelada em ar condicionado industrial. Disponível em: <a href="https://www.replass.com.br/post/21/pvc-u-sch-80-x-aco-para-conducao-de-agua-gelada-em-ar-condicionado-industrial">https://www.replass.com.br/post/21/pvc-u-sch-80-x-aco-para-conducao-de-agua-gelada-em-ar-condicionado-industrial</a> . Acesso em: 18 set. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14928	Periodontia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4398572 - GUSTAVO AFONSO GENTIL FERREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ricardo Schmitutz Jahn		
<b>TITULO</b>	EXODONTIA E PRESERVAÇÃO ALVEOLAR PRÉVIAS A INSTALAÇÃO DE IMPLANTES COM TÉCNICA SOCKET SHIELDSST			
<b>INTRODUCAO</b>	O fenômeno de reabsorção óssea proveniente de exodontias é fato conhecido e amplamente descrito. Uma alternativa promissora frente a este cenário que impacta a estrutura da tabua óssea alveolar, é a Socket Shield Therapy onde os estudos demonstram consideráveis ganhos nos campos da exodontia minimamente invasiva e na conservação do rebordo alveolar.			
<b>OBJETIVOS</b>	Reunir trabalhos preexistentes na literatura que abordem a temática da SST associadas com implantes imediatos e suas indicações, explicando os cenários onde obtve-se melhores resultados na preservação do osso alveolar através da técnica em detrimento dos procedimentos cirúrgicos convencionais.			
<b>METODOLOGIA</b>	A revisão foi conduzida com bases bibliográficas em humanos e a técnica SST que foram pesquisadas no PubMed. Foram selecionados 6 artigos, publicados entre 2007 a 2018 referentes ao tema proposto, palavras-chave: SST, Preservação de rebordo alveolar, Implante Imediato.			
<b>RESULTADOS</b>	A extração dentária, causa reabsorção na crista alveolar e prejudica concomitantemente a tábua vestibular. Em Salama; et al., (2007) observa-se que a técnica de imersão da raiz mantém o dispositivo de fixação natural do dente no local de um pântico, o que por sua vez permite a preservação completa do osso alveolar e ajuda a criar um resultado estético em múltiplos casos de substituição dentária. Com a intenção de evitar a reabsorção óssea alveolar após a extração e manter o nível das papilas para alcançar um resultado mais previsível e estético, Hürzeler; et al., (2010) testaram uma nova técnica cirúrgica, primeiro em modelos animais, e em seguida em humanos, deixando uma porção radicular vestibular dentro do alvéolo com a colocação imediata do implante. O objetivo era manter um periodonto saudável e uma parede óssea vestibular intacta, este procedimento foi definido como SST. A SST foi utilizada em uma área onde a placa cortical vestibular era fina, mantendo o fragmento radicular aderido ao osso vestibular e a colocação do implante imediato mantendo o contorno do rebordo. Os resultados foram consistentes com a técnica original fornecida por Hürzeler et al. [2] Nenhuma complicação pós-operatória foi observada e a cicatrização ocorreu sem intercorrências. A preservação do segmento radicular para prevenir a reabsorção óssea alveolar foi demonstrada em muitos estudos. [6, 7, 8, 9] Salama et al. relataram a técnica de submersão da raiz, mantendo a raiz submersa na área do pântico para preservar a dimensão do osso alveolar. [3] Por outro lado, Bramanti; et al., (2018) compararam a SST com a técnica convencional e concluíram que a taxa de sobrevivência do implante foi a mesma, todos os implantes sobreviveram, porém, a taxa de reabsorção cristal foi menor nas SST e está também a melhor pontuação estética rosa.			
<b>CONCLUSOES</b>	A SST trás vantagens pelo seu aspecto minimamente invasivo, preserva o osso alveolar e corrobora resultados positivos na estética dos tecidos moles, porém é importante ressaltar que é um procedimento sensível a habilidade do operador e que precisamos de mais estudos clínicos randomizados para recomendar a técnica com mais veemência.			
<b>REFERENCIAS</b>	Hürzeler MB, Zuhr O, Schupbach P, Rebele SF, Emmanouilidis N, Fickl S, et al. The socket-shield technique: a proof-of-principle report. J Clin Periodontol. 2010; 37:855–62. DOI: 10.1111/j.1600-051X.2010.01595. x. Salama M, Ishikawa T, Salama H, Funato A, Garber D. Advantages of the root submersion technique for the development of the pontic site in aesthetic implant therapy. Int J Periodontics Restorative Tooth. 2007; 27:521–7. GLUCKMAN, H.; DU TOIT, J.; SALAMA, M. The socket-shield technique to support the buccofacial tissues at immediate implant placement. Int Dent Afr Ed. 2015 5(3), 6-14. Gluckman H, du Toit J, Salama M. The pontic shield: partial extraction therapy for ridge preservation and pontic site development. Int J Periodont Restor Dent. 2016; 36 (3):417–423. doi: 10.11607/prd.2651.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14928	Periodontia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4411587 - FREDDY KEVIN BENITEZ AGUILAR	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ricardo Schmitutz Jahn		
<b>TITULO</b>	EXODONTIA E PRESERVAÇÃO ALVEOLAR PRÉVIAS A INSTALAÇÃO DE IMPLANTES COM TÉCNICA SOCKET SHIELDSST			
<b>INTRODUCAO</b>	O fenômeno de reabsorção óssea proveniente de exodontias é fato conhecido e amplamente descrito. Uma alternativa promissora frente a este cenário que impacta a estrutura da tabua óssea alveolar, é a Socket Shield Therapy onde os estudos demonstram consideráveis ganhos nos campos da exodontia minimamente invasiva e na conservação do rebordo alveolar.			
<b>OBJETIVOS</b>	Reunir trabalhos preexistentes na literatura que abordem a temática da SST associadas com implantes imediatos e suas indicações, explicando os cenários onde obtve-se melhores resultados na preservação do osso alveolar através da técnica em detrimento dos procedimentos cirúrgicos convencionais.			
<b>METODOLOGIA</b>	A revisão foi conduzida com bases bibliográficas em humanos e a técnica SST que foram pesquisadas no PubMed. Foram selecionados 6 artigos, publicados entre 2007 a 2018 referentes ao tema proposto, palavras-chave: SST, Preservação de rebordo alveolar, Implante Imediato.			
<b>RESULTADOS</b>	A extração dentária, causa reabsorção na crista alveolar e prejudica concomitantemente a tábua vestibular. Em Salama; et al., (2007) observa-se que a técnica de imersão da raiz mantém o dispositivo de fixação natural do dente no local de um pântico, o que por sua vez permite a preservação completa do osso alveolar e ajuda a criar um resultado estético em múltiplos casos de substituição dentária. Com a intenção de evitar a reabsorção óssea alveolar após a extração e manter o nível das papilas para alcançar um resultado mais previsível e estético, Hürzeler; et al., (2010) testaram uma nova técnica cirúrgica, primeiro em modelos animais, e em seguida em humanos, deixando uma porção radicular vestibular dentro do alvéolo com a colocação imediata do implante. O objetivo era manter um periodonto saudável e uma parede óssea vestibular intacta, este procedimento foi definido como SST. A SST foi utilizada em uma área onde a placa cortical vestibular era fina, mantendo o fragmento radicular aderido ao osso vestibular e a colocação do implante imediato mantendo o contorno do rebordo. Os resultados foram consistentes com a técnica original fornecida por Hürzeler et al. [2] Nenhuma complicação pós-operatória foi observada e a cicatrização ocorreu sem intercorrências. A preservação do segmento radicular para prevenir a reabsorção óssea alveolar foi demonstrada em muitos estudos. [6, 7, 8, 9] Salama et al. relataram a técnica de submersão da raiz, mantendo a raiz submersa na área do pântico para preservar a dimensão do osso alveolar. [3] Por outro lado, Bramanti; et al., (2018) compararam a SST com a técnica convencional e concluíram que a taxa de sobrevivência do implante foi a mesma, todos os implantes sobreviveram, porém, a taxa de reabsorção cristal foi menor nas SST e está também a melhor pontuação estética rosa.			
<b>CONCLUSOES</b>	A SST trás vantagens pelo seu aspecto minimamente invasivo, preserva o osso alveolar e corrobora resultados positivos na estética dos tecidos moles, porém é importante ressaltar que é um procedimento sensível a habilidade do operador e que precisamos de mais estudos clínicos randomizados para recomendar a técnica com mais veemência.			
<b>REFERENCIAS</b>	Hürzeler MB, Zuhr O, Schupbach P, Rebele SF, Emmanouilidis N, Fickl S, et al. The socket-shield technique: a proof-of-principle report. J Clin Periodontol. 2010; 37:855–62. DOI: 10.1111/j.1600-051X.2010.01595. x. Salama M, Ishikawa T, Salama H, Funato A, Garber D. Advantages of the root submersion technique for the development of the pontic site in aesthetic implant therapy. Int J Periodontics Restorative Tooth. 2007; 27:521–7. GLUCKMAN, H.; DU TOIT, J.; SALAMA, M. The socket-shield technique to support the buccofacial tissues at immediate implant placement. Int Dent Afr Ed. 2015 5(3), 6-14. Gluckman H, du Toit J, Salama M. The pontic shield: partial extraction therapy for ridge preservation and pontic site development. Int J Periodont Restor Dent. 2016; 36 (3):417–423. doi: 10.11607/prd.2651.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14931	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4617819 - EDUARDA GIAQUINTO HERKENHOFF PINHEIRO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		Claudia Polubriaginof		<b>Orientador Externo</b>
				1 - Poster
<b>TITULO</b>	A microbiota intestinal e o desenvolvimento de depressão em crianças e adolescentes			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A microbiota humana se refere a comunidade microbiana que habita o corpo humano, tendo um papel significativo no desenvolvimento e maturação do sistema imunológico, exercendo assim, efeitos consideráveis no desenvolvimento físico e mental da criança e adolescente. O estilo de vida mudou após a globalização, em que transtornos como ansiedade e depressão aumentaram e a dieta demonstrou ser um dos principais fatores de risco para mortalidade precoce. A partir disso, podemos supor que a disbiose intestinal tem alto risco de desencadear transtornos psiquiátricos. A depressão afeta negativamente o crescimento e desenvolvimento na infância e foi descoberto que em comparação com crianças saudáveis, as com depressão possuem maior riqueza bacteriana e b-diversidade alterada. Gêneros pró inflamatórios como streptococcus foram enriquecidos em relação aos gêneros anti-inflamatórios como Faecalibacterium.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a relação da microbiota intestinal com o desenvolvimento de depressão em crianças e adolescentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conduzimos uma revisão bibliografica de literatura onde foram revisados artigos em inglês e português coletados na base de dados PubMed. Foram utilizados os seguintes descritores: "microbiota", "depressão", "crianças", "adolescentes".			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A via intestino-cérebro é uma rota de comunicação que influencia o funcionamento cognitivo e o humor por meio de mecanismos neurais, metabólicos e imunomediados. A microbiota intestinal exerce um papel crucial nesse eixo, regulando a produção de neurotransmissores e influenciando a sinalização imune do intestino ao cérebro. Distúrbios na flora intestinal têm sido associados ao surgimento de doenças neuropsiquiátricas, incluindo a depressão. Estudos revelaram diferenças na composição bacteriana entre pessoas com depressão e indivíduos saudáveis, sugerindo que um desequilíbrio da microbiota pode ser relevante nesse transtorno. Os adolescentes são particularmente sensíveis ao estresse, e mudanças na microbiota intestinal nessa fase podem afetar o desenvolvimento do cérebro, levando a alterações comportamentais duradouras. O eixo HPA (hipotálamo-pituitária-adrenal), que regula a resposta ao estresse, é influenciado pela microbiota, e a desregulação desse eixo tem sido associada à depressão em crianças e jovens. Estudos de intervenção com probióticos mostraram melhoria nos sintomas depressivos em pacientes, sugerindo que o equilíbrio da microbiota pode ser um alvo terapêutico promissor no tratamento da depressão.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	A literatura confirma uma relação entre a microbiota intestinal com desenvolvimento de depressão em crianças e adolescentes. Entretanto, são necessários maiores estudos para o aprofundamento acerca do impacto da dieta relacionada a microbiota e aspectos da saúde mental.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1- Saeed NK, Al-Beltagi M, Bediwy AS, El-Sawaf Y, Toema O. Gut microbiota in various childhood disorders: Implication and indications. World Journal of Gastroenterology. 2022 May 14;28(18):1875–901. 2- Adak A, Khan MR. An insight into gut microbiota and its functionalities. Cellular and Molecular Life Sciences. 2018 Oct 13;76(3):473–93. 3- Derrien M, Alvarez AS, de Vos WM. The Gut Microbiota in the First Decade of Life. Trends in Microbiology. 2019 Aug; (#38)#8204; 4- Thapa S, Sheu JC, Venkatachalam A, Runge JK, Luna RA, Calarge CA. Gut microbiome in adolescent depression. Journal of Affective Disorders. 2021 Sep;292:500–7</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14931	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4627148 - VICTORIA BARCHI CORDTS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Claudia Polubriaginf		
<b>TITULO</b>	A microbiota intestinal e o desenvolvimento de depressão em crianças e adolescentes			
<b>INTRODUCA O</b>	A microbiota humana se refere a comunidade microbiana que habita o corpo humano, tendo um papel significativo no desenvolvimento e maturação do sistema imunológico, exercendo assim, efeitos consideráveis no desenvolvimento físico e mental da criança e adolescente. O estilo de vida mudou após a globalização, em que transtornos como ansiedade e depressão aumentaram e a dieta demonstrou ser um dos principais fatores de risco para mortalidade precoce. A partir disso, podemos supor que a disbiose intestinal tem alto risco de desencadear transtornos psiquiátricos. A depressão afeta negativamente o crescimento e desenvolvimento na infância e foi descoberto que em comparação com crianças saudáveis, as com depressão possuem maior riqueza bacteriana e b-diversidade alterada. Gêneros pró inflamatórios como streptococcus foram enriquecidos em relação aos gêneros anti-inflamatórios como Faecalibacterium.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar a relação da microbiota intestinal com o desenvolvimento de depressão em crianças e adolescentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conduzimos uma revisão bibliográfica de literatura onde foram revisados artigos em inglês e português coletados na base de dados PubMed. Foram utilizados os seguintes descritores: "microbiota", "depressão", "crianças", "adolescentes".			
<b>RESULTADO S</b>	A via intestino-cérebro é uma rota de comunicação que influencia o funcionamento cognitivo e o humor por meio de mecanismos neurais, metabólicos e imunomediados. A microbiota intestinal exerce um papel crucial nesse eixo, regulando a produção de neurotransmissores e influenciando a sinalização imune do intestino ao cérebro. Distúrbios na flora intestinal têm sido associados ao surgimento de doenças neuropsiquiátricas, incluindo a depressão. Estudos revelaram diferenças na composição bacteriana entre pessoas com depressão e indivíduos saudáveis, sugerindo que um desequilíbrio da microbiota pode ser relevante nesse transtorno. Os adolescentes são particularmente sensíveis ao estresse, e mudanças na microbiota intestinal nessa fase podem afetar o desenvolvimento do cérebro, levando a alterações comportamentais duradouras. O eixo HPA (hipotálamo-pituitária-adrenal), que regula a resposta ao estresse, é influenciado pela microbiota, e a desregulação desse eixo tem sido associada à depressão em crianças e jovens. Estudos de intervenção com probióticos mostraram melhoria nos sintomas depressivos em pacientes, sugerindo que o equilíbrio da microbiota pode ser um alvo terapêutico promissor no tratamento da depressão.			
<b>CONCLUSOES</b>	A literatura confirma uma relação entre a microbiota intestinal com desenvolvimento de depressão em crianças e adolescentes. Entretanto, são necessários maiores estudos para o aprofundamento acerca do impacto da dieta relacionada a microbiota e aspectos da saúde mental.			
<b>REFERENCIA S</b>	1- Saeed NK, Al-Beltagi M, Bediwy AS, El-Sawaf Y, Toema O. Gut microbiota in various childhood disorders: Implication and indications. World Journal of Gastroenterology. 2022 May 14;28(18):1875–901. 2- Adak A, Khan MR. An insight into gut microbiota and its functionalities. Cellular and Molecular Life Sciences. 2018 Oct 13;76(3):473–93. 3- Derrien M, Alvarez AS, de Vos WM. The Gut Microbiota in the First Decade of Life. Trends in Microbiology. 2019 Aug; (#38)#8204; 4- Thapa S, Sheu JC, Venkatchalam A, Runge JK, Luna RA, Calarge CA. Gut microbiome in adolescent depression. Journal of Affective Disorders. 2021 Sep;292:500–7			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14935	Epidemiologia	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4820983 - ANA CLARA ALCANTARA DA SILVA SIQUEIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Clara Rodrigues		
<b>TITULO</b>	Projeto de Extensão da disciplina Medicina, Família e Comunidade: Diagnóstico Situacional da Raiva Humana em Unidade Básica de Saúde			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>A raiva é uma das doenças infecciosas mais antigas, zoonose que acomete mamíferos tanto urbanos( cães) como silvestres (morcegos), além de rurais(bovinos), causada por vírus da família Rhabdoviridae de genoma RNA. É transmitida ao ser humano pela saliva de animal infectado, principalmente a mordedura, mas também através da arranhadura e lambedura. As manifestações clínicas são variadas, com disseminação para diferentes tecidos com destaque para acometimento do Sistema Nervoso Central. O diagnóstico é clínico e laboratorial . Essa infecção tem praticamente 100% de letalidade, pois o tratamento ainda está em processo de definição. No Brasil essa infecção é endêmica, sendo importante a coleta de dados epidemiológicos e recorrente realização de campanhas de vacinação para garantir maior profilaxia da população, esta que ainda não está totalmente ciente sobre essa doença..</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Discutir acerca da raiva humana ao detalhar o ciclo de transmissão, o quadro clínico, epidemiológico, e profilático compilando informações situacionais de ações de educação em saúde sobre tal zoonose na Unidade Básica de Saúde na região Sul de São Paulo, para conscientização.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Projeto de extensão da disciplina de Medicina Família e Comunidade IV realizado durante o estágio em unidade básica de saúde na região sul do município de São Paulo. Analisados dados obtidos durante a visitação que informa o diagnóstico situacional da população e artigos científicos publicados entre os anos 2018 e 2023, nas línguas portuguesa e inglesa; utilizando-se as bases de dados MEDLINE(PubMed) e Scielo através das palavras chaves " raiva humana" e "Brasil". Do total de 223 artigos encontrados, três foram selecionados para essa abordagem</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Utilizados dados obtidos durante o estagio. Após a abordagem dos pacientes sobre conhecimento da raiva humana, realizado educação em saúde elaborando impresso com as orientações necessárias para explicar o que é a doença, transmissão e prevenção. Distribuído e orientado o produto do projeto de extensão. A educação em saúde se faz necessária para orientar a população a respeito desta doença e evitar maiores danos.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>A raiva humana foi escolhida pois durante o estágio foi possível perceber que ainda é pouco conhecida, o que representa um risco maior ainda para a população. Através da distribuição de panfletos com as principais informações sobre a infecção e uma apresentação por meio de conversas com os pacientes presentes na UBS para orientação e conscientização. Essa ação é de extrema relevância para articular a medicina e a sociedade, de modo a levar o conhecimento científico para o âmbito popular e promover a educação em saúde que é ainda pouco difundida sobre a raiva hu</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1. Fooks AR, Banyard AC, Ertl HCJ. New human rabies vaccines in the pipeline. Vaccine [Internet]. 2019 Oct 3;37:A140–5. Available from: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X1831168X">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X1831168X</a> 2. Conceição P, Abreu C. Raiva Humana: Otimização da Prevenção e Caminhos Para a Cura. Acta Médica Portuguesa. 2019 Oct 9;33(13). 3. Liu C, Cahill J. Epidemiology of Rabies and Current US Vaccine Guidelines [Internet]. Available from: <a href="http://rimed.org/rimedicaljournal/2020/08/2020-08-51-vaccine-liu.pdf">http://rimed.org/rimedicaljournal/2020/08/2020-08-51-vaccine-liu.pdf</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14937	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233542 - CAMILA SUSANA MAIDA POMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	CONSTRUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR PARA USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHAs) são ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com microrganismos patogênicos, os quais podem corresponder a bactérias, vírus, protozoários, helmintos e ainda a substâncias tóxicas decorrentes dos mesmos. As doenças de transmissão hídrica e alimentar são um grupo de enfermidades que representam uma preocupação significativa para a saúde pública em todo o Mundo. Estas doenças são causadas pela ingestão de água contaminada ou alimentos que tenham sido contaminados por agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, parasitas e substâncias tóxicas. São um desafio global que afeta tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, impactando a qualidade de vida das pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual em formato de vídeo a ser veiculado por redes sociais, de modo a difundir informações a respeito da profilaxia dos agravos representados pelas doenças de transmissão hídrica e alimentar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração do material técnico em vídeo, foram realizadas buscas bibliográficas nas principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). As informações reunidas serviram de base para a confecção do vídeo a ser difundido aos agentes de saúde vinculados aos territórios das unidades básicas de saúde do município de Guarulhos, para que possam ser utilizados em suas atividades de educação permanente dos usuários do território.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado expresso das informações reunidas e adaptadas a linguagem adequada para o contexto das ações de educação permanente conduzidas por agentes comunitários de saúde, está expresso em: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-1kfKb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-1kfKb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSÕES</b>	É possível conferir que esta abordagem pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que são as doenças transmitidas por água e alimentos, explicitando seus mecanismos de transmissão e quais os patógenos comumente envolvidos, criando canais perenes de divulgação rápida e acessível de informações através do contato estabelecido entre usuários e agentes comunitários de saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#</a> : (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/</a> : (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14937	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5235201 - LARISSA AGOSTINHO FERAZ		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	CONSTRUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR PARA USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHAs) são ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com microrganismos patogênicos, os quais podem corresponder a bactérias, vírus, protozoários, helmintos e ainda a substâncias tóxicas decorrentes dos mesmos. As doenças de transmissão hídrica e alimentar são um grupo de enfermidades que representam uma preocupação significativa para a saúde pública em todo o Mundo. Estas doenças são causadas pela ingestão de água contaminada ou alimentos que tenham sido contaminados por agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, parasitas e substâncias tóxicas. São um desafio global que afeta tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, impactando a qualidade de vida das pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual em formato de vídeo a ser veiculado por redes sociais, de modo a difundir informações a respeito da profilaxia dos agravos representados pelas doenças de transmissão hídrica e alimentar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração do material técnico em vídeo, foram realizadas buscas bibliográficas nas principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). As informações reunidas serviram de base para a confecção do vídeo a ser difundido aos agentes de saúde vinculados aos territórios das unidades básicas de saúde do município de Guarulhos, para que possam ser utilizados em suas atividades de educação permanente dos usuários do território.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado expresso das informações reunidas e adaptadas a linguagem adequada para o contexto das ações de educação permanente conduzidas por agentes comunitários de saúde, está expresso em: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-IfKb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-IfKb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSÕES</b>	É possível conferir que esta abordagem pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que são as doenças transmitidas por água e alimentos, explicitando seus mecanismos de transmissão e quais os patógenos comumente envolvidos, criando canais perenes de divulgação rápida e acessível de informações através do contato estabelecido entre usuários e agentes comunitários de saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#</a> : (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/</a> : (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14937	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5243815 - PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BUFFA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	CONSTRUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR PARA USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHAs) são ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com microrganismos patogênicos, os quais podem corresponder a bactérias, vírus, protozoários, helmintos e ainda a substâncias tóxicas decorrentes dos mesmos. As doenças de transmissão hídrica e alimentar são um grupo de enfermidades que representam uma preocupação significativa para a saúde pública em todo o Mundo. Estas doenças são causadas pela ingestão de água contaminada ou alimentos que tenham sido contaminados por agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, parasitas e substâncias tóxicas. São um desafio global que afeta tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, impactando a qualidade de vida das pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual em formato de vídeo a ser veiculado por redes sociais, de modo a difundir informações a respeito da profilaxia dos agravos representados pelas doenças de transmissão hídrica e alimentar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração do material técnico em vídeo, foram realizadas buscas bibliográficas nas principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). As informações reunidas serviram de base para a confecção do vídeo a ser difundido aos agentes de saúde vinculados aos territórios das unidades básicas de saúde do município de Guarulhos, para que possam ser utilizados em suas atividades de educação permanente dos usuários do território.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado expresso das informações reunidas e adaptadas a linguagem adequada para o contexto das ações de educação permanente conduzidas por agentes comunitários de saúde, está expresso em: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-fkKb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-fkKb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSÕES</b>	É possível conferir que esta abordagem pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que são as doenças transmitidas por água e alimentos, explicitando seus mecanismos de transmissão e quais os patógenos comumente envolvidos, criando canais perenes de divulgação rápida e acessível de informações através do contato estabelecido entre usuários e agentes comunitários de saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14937	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
				<b>Apresentação</b>
		5244218 - FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA MENDES		2 - Aprovado
				1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	CONSTRUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR PARA USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHAs) são ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com microrganismos patogênicos, os quais podem corresponder a bactérias, vírus, protozoários, helmintos e ainda a substâncias tóxicas decorrentes dos mesmos. As doenças de transmissão hídrica e alimentar são um grupo de enfermidades que representam uma preocupação significativa para a saúde pública em todo o Mundo. Estas doenças são causadas pela ingestão de água contaminada ou alimentos que tenham sido contaminados por agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, parasitas e substâncias tóxicas. São um desafio global que afeta tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, impactando a qualidade de vida das pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual em formato de vídeo a ser veiculado por redes sociais, de modo a difundir informações a respeito da profilaxia dos agravos representados pelas doenças de transmissão hídrica e alimentar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para elaboração do material técnico em vídeo, foram realizadas buscas bibliográficas nas principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). As informações reunidas serviram de base para a confecção do vídeo a ser difundido aos agentes de saúde vinculados aos territórios das unidades básicas de saúde do município de Guarulhos, para que possam ser utilizados em suas atividades de educação permanente dos usuários do território.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado exposto das informações reunidas e adaptadas a linguagem adequada para o contexto das ações de educação permanente conduzidas por agentes comunitários de saúde, está exposto em: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-fkKb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM71Y?si=P-fkKb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSÕES</b>	É possível conferir que esta abordagem pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que são as doenças transmitidas por água e alimentos, explicitando seus mecanismos de transmissão e quais os patógenos comumente envolvidos, criando canais perenes de divulgação rápida e acessível de informações através do contato estabelecido entre usuários e agentes comunitários de saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14939	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3168981 - LUANA LOPES PATENTE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Comparação de achados clínico-laboratoriais entre dois pacientes felinos positivos para infecção por vírus da leucemia felina			
<b>INTRODUCAO</b>	A infecção pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV) é uma doença grave de felinos domésticos. O agente etiológico é um gamarretrovírus de distribuição mundial. Ele é facilmente transmitido pelo contato direto entre felinos, integrando-se ao DNA do hospedeiro e se replicando na medula óssea. Manifestações clínicas são altamente variáveis e dependentes da resposta do paciente. Por sua alta prevalência, exames para detectar FeLV são comumente realizados como parte da rotina, sendo possível o diagnóstico em pacientes com queixas clínicas não relacionadas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar dois casos clínicos de pacientes felinos FeLV-positivos apresentando quadros distintos, atendidos no HOVET-UNISA, comparando sintomatologia clínica e achados laboratoriais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos dois gatos (intitulados A e B), não relacionados e em momentos distintos, com infecção por FeLV ainda não diagnosticada. O paciente A apresentou quadro grave de prostração, anorexia, aquesia, mucosas hipocoradas e dispneia aguda. Nega acesso livre a rua. Em hemograma, foram detectadas anemia normocítica e normocrômica intensa (hematócrito 7%; referência: 24-45%) e linfopenia (290/µL; ref: 1.500-7.000/µL). Já, o paciente B chegou alerta, porém com quadro de complexo gengivite-estomatite-felina, levando a anorexia, dificuldade ao mastigar, prostração e leve desidratação. Nega acesso livre a rua. Em hemograma, foi observada apenas hiperproteinemia (8,2g/dL; ref.: 6,0-8,0g/dL). Em ambos os casos, exames para FeLV foram solicitados no dia da consulta, com resultados confirmando a infecção.			
<b>RESULTADOS</b>	A patogenia da infecção pela FeLV é complexa. São descritas quatro formas de evolução da infecção: progressiva, quando há intensa viremia devido à ineficiência do sistema imune; regressiva, quando a resposta imune é eficiente e há controle da replicação viral na circulação; abortiva, quando a viremia é evitada pela resposta imune, porém há anticorpos; ou atípica, quando a replicação é local e restrita a tecidos específicos. Dessa forma, a apresentação clínica pode ser extremamente variável. Os principais sinais clínicos relatados são perda de peso, desidratação, mucosas hipocoradas ou ictericas e linfadenomegalia, porém a doença já foi associada a diversos quadros, inclusive complexo estomatite-gengivite, além de poder ser assintomática. Diversas alterações hematológicas também são relatadas, incluindo anemia e linfopenia secundárias à supressão medular e à destruição imunomediada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato demonstra que a infecção por FeLV pode levar a quadros completamente distintos quanto às apresentações clínicas e laboratoriais. A grande variedade de sinais clínicos se dá pela patogenia complexa associada ao vírus. O tipo de manifestação dependerá de cada animal e sua resposta imune. Portanto, os exames laboratoriais são fortes aliados no diagnóstico da FeLV.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, NR et al. Alterações clínicas e hematológicas em gatos domésticos naturalmente infectados pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV). Revista de Saúde. 2016; 07(1):27-32. GUIMARÃES, NLS. Frequência de diagnóstico de FIV (imunodeficiência Felina) e FeLV (leucemia viral felina) em gatos atendidos no hospital veterinário da UEMA no período De 2019 a 2021. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária). UEMA. 2022. LEVY, J. et al. American Association of Feline Practitioners' feline retrovirus management guidelines. Journal of Feline and Surgery. 2008; 10(3):300-316.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14939	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3277488 - KAREN BELO RAMOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Comparação de achados clínico-laboratoriais entre dois pacientes felinos positivos para infecção por vírus da leucemia felina			
<b>INTRODUCAO</b>	A infecção pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV) é uma doença grave de felinos domésticos. O agente etiológico é um gamarretrovírus de distribuição mundial. Ele é facilmente transmitido pelo contato direto entre felinos, integrando-se ao DNA do hospedeiro e se replicando na medula óssea. Manifestações clínicas são altamente variáveis e dependentes da resposta do paciente. Por sua alta prevalência, exames para detectar FeLV são comumente realizados como parte da rotina, sendo possível o diagnóstico em pacientes com queixas clínicas não relacionadas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar dois casos clínicos de pacientes felinos FeLV-positivos apresentando quadros distintos, atendidos no HOVET-UNISA, comparando sintomatologia clínica e achados laboratoriais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos dois gatos (intitulados A e B), não relacionados e em momentos distintos, com infecção por FeLV ainda não diagnosticada. O paciente A apresentou quadro grave de prostração, anorexia, aquesia, mucosas hipocoradas e dispneia aguda. Nega acesso livre a rua. Em hemograma, foram detectadas anemia normocítica e normocrômica intensa (hematócrito 7%; referência: 24-45%) e linfopenia (290/µL; ref: 1.500-7.000/µL). Já, o paciente B chegou alerta, porém com quadro de complexo gengivite-estomatite-felina, levando a anorexia, dificuldade ao mastigar, prostração e leve desidratação. Nega acesso livre a rua. Em hemograma, foi observada apenas hiperproteinemia (8,2g/dL; ref.: 6,0-8,0g/dL). Em ambos os casos, exames para FeLV foram solicitados no dia da consulta, com resultados confirmando a infecção.			
<b>RESULTADOS</b>	A patogenia da infecção pela FeLV é complexa. São descritas quatro formas de evolução da infecção: progressiva, quando há intensa viremia devido à ineficiência do sistema imune; regressiva, quando a resposta imune é eficiente e há controle da replicação viral na circulação; abortiva, quando a viremia é evitada pela resposta imune, porém há anticorpos; ou atípica, quando a replicação é local e restrita a tecidos específicos. Dessa forma, a apresentação clínica pode ser extremamente variável. Os principais sinais clínicos relatados são perda de peso, desidratação, mucosas hipocoradas ou ictericas e linfadenomegalia, porém a doença já foi associada a diversos quadros, inclusive complexo estomatite-gengivite, além de poder ser assintomática. Diversas alterações hematológicas também são relatadas, incluindo anemia e linfopenia secundárias à supressão medular e à destruição imunomediada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato demonstra que a infecção por FeLV pode levar a quadros completamente distintos quanto às apresentações clínicas e laboratoriais. A grande variedade de sinais clínicos se dá pela patogenia complexa associada ao vírus. O tipo de manifestação dependerá de cada animal e sua resposta imune. Portanto, os exames laboratoriais são fortes aliados no diagnóstico da FeLV.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, NR et al. Alterações clínicas e hematológicas em gatos domésticos naturalmente infectados pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV). Revista de Saúde. 2016; 07(1):27-32. GUIMARÃES, NLS. Frequência de diagnóstico de FIV (imunodeficiência Felina) e FeLV (leucemia viral felina) em gatos atendidos no hospital veterinário da UEMA no período De 2019 a 2021. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária). UEMA. 2022. LEVY, J. et al. American Association of Feline Practitioners' feline retrovirus management guidelines. Journal of Feline and Surgery. 2008; 10(3):300-316.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14939	Patologia Clínica Animal	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4328621 - GIOVANNA LAMESA COSTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Victor Nowosh		
<b>TITULO</b>	Comparação de achados clínico-laboratoriais entre dois pacientes felinos positivos para infecção por vírus da leucemia felina			
<b>INTRODUCAO</b>	A infecção pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV) é uma doença grave de felinos domésticos. O agente etiológico é um gamarretrovírus de distribuição mundial. Ele é facilmente transmitido pelo contato direto entre felinos, integrando-se ao DNA do hospedeiro e se replicando na medula óssea. Manifestações clínicas são altamente variáveis e dependentes da resposta do paciente. Por sua alta prevalência, exames para detectar FeLV são comumente realizados como parte da rotina, sendo possível o diagnóstico em pacientes com queixas clínicas não relacionadas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar dois casos clínicos de pacientes felinos FeLV-positivos apresentando quadros distintos, atendidos no HOVET-UNISA, comparando sintomatologia clínica e achados laboratoriais.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram atendidos dois gatos (intitulados A e B), não relacionados e em momentos distintos, com infecção por FeLV ainda não diagnosticada. O paciente A apresentou quadro grave de prostração, anorexia, aquesia, mucosas hipocoradas e dispneia aguda. Nega acesso livre a rua. Em hemograma, foram detectadas anemia normocítica e normocrômica intensa (hematócrito 7%; referência: 24-45%) e linfopenia (290/µL; ref: 1.500-7.000/µL). Já, o paciente B chegou alerta, porém com quadro de complexo gengivite-estomatite-felina, levando a anorexia, dificuldade ao mastigar, prostração e leve desidratação. Nega acesso livre a rua. Em hemograma, foi observada apenas hiperproteinemia (8,2g/dL; ref.: 6,0-8,0g/dL). Em ambos os casos, exames para FeLV foram solicitados no dia da consulta, com resultados confirmando a infecção.			
<b>RESULTADOS</b>	A patogenia da infecção pela FeLV é complexa. São descritas quatro formas de evolução da infecção: progressiva, quando há intensa viremia devido à ineficiência do sistema imune; regressiva, quando a resposta imune é eficiente e há controle da replicação viral na circulação; abortiva, quando a viremia é evitada pela resposta imune, porém há anticorpos; ou atípica, quando a replicação é local e restrita a tecidos específicos. Dessa forma, a apresentação clínica pode ser extremamente variável. Os principais sinais clínicos relatados são perda de peso, desidratação, mucosas hipocoradas ou ictericas e linfadenomegalia, porém a doença já foi associada a diversos quadros, inclusive complexo estomatite-gengivite, além de poder ser assintomática. Diversas alterações hematológicas também são relatadas, incluindo anemia e linfopenia secundárias à supressão medular e à destruição imunomediada.			
<b>CONCLUSOES</b>	Este relato demonstra que a infecção por FeLV pode levar a quadros completamente distintos quanto às apresentações clínicas e laboratoriais. A grande variedade de sinais clínicos se dá pela patogenia complexa associada ao vírus. O tipo de manifestação dependerá de cada animal e sua resposta imune. Portanto, os exames laboratoriais são fortes aliados no diagnóstico da FeLV.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, NR et al. Alterações clínicas e hematológicas em gatos domésticos naturalmente infectados pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV). Revista de Saúde. 2016; 07(1):27-32. GUIMARÃES, NLS. Frequência de diagnóstico de FIV (imunodeficiência Felina) e FeLV (leucemia viral felina) em gatos atendidos no hospital veterinário da UEMA no período De 2019 a 2021. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária). UEMA. 2022. LEVY, J. et al. American Association of Feline Practitioners' feline retrovirus management guidelines. Journal of Feline and Surgery. 2008; 10(3):300-316.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14940	História	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4303512 - EDUARDA ALICE DOS SANTOS CORREIA LEITE	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	RACISMO ESTRUTURAL: Suas raízes históricas e manifestações contemporâneas.			
<b>INTRODUCA O</b>	O racismo estrutural está presente em diversas sociedades do mundo, inclusive no Brasil. Em contexto nacional, este tipo de discriminação se manifesta de forma sistemática e generalizada, impactando a vida de diversos grupos raciais e étnicos de maneira negativa. A estrutura deste artigo está dividida, e cada uma das partes irá abordar diferentes aspectos do racismo estrutural no Brasil. Inicialmente, será feito uma revisão histórica, buscando as raízes da discriminação racial no país, desde o período colonial até os dias atuais. Em seguida, a explicação e a compreensão do racismo estrutural, investigando suas características, meios de perpetuação e resistência. Na terceira parte, o foco será as consequências do racismo estrutural, tanto para as vítimas, quanto para a sociedade em geral. Será possível também avaliar os impactos sociais, econômicos e políticos do racismo estrutural, apontando as desigualdades raciais que são perpetuadas em diferentes áreas da vida cotidiana brasileira.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como objetivo analisar o racismo estrutural no Brasil, tomando como base uma revisão bibliográfica de estudos realizados por pesquisadores brasileiros. A proposta, dentre outras, é discutir as principais características dessa discriminação, suas origens históricas e suas consequências sociais, econômicas e políticas. Ao investigar o racismo estrutural no Brasil, pretende-se contribuir para a compreensão e sensibilização da sociedade sobre essa problemática.			
<b>METODOLOGIA</b>	A metodologia utilizada consistiu na busca de artigos científicos, livros, notícias em jornais online e músicas (pesquisa bibliográfica). Foram escolhidas obras que abordam o tema do racismo estrutural com base na sua relevância, precisão teórica e coerência para o tema.			
<b>RESULTADO S</b>	Compreendendo que o racismo está enraizado nas estruturas sociais, é possível constatar que a estrutura da sociedade se construiu e organizou suas esferas de poder com base na manutenção e normalização da discriminação racial. Assim, até nos dias atuais mantendo o negro a margem da sociedade, carregados de estereótipos e preconceitos.			
<b>CONCLUSOE S</b>	De acordo com os dados apresentados no decorrer do artigo, é possível identificar a base do racismo estrutural e assim, entender os fundamentos do racismo estrutural, como ele se manifesta, consequências para a sociedade e por fim, identificar formas de combater esse crime tornando-se responsável por não repetir erros e desenvolver engajamentos no combate às desigualdades raciais.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. GUIMARÃES, Antônio Sergio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2018. RIBEIRO, Djamila. Pequeno Manual Antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14943	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4616715 - LETICIA MORONI DE SOUSA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		
<b>TITULO</b>	A importância do enfermeiro na Síndrome HELLP			
<b>INTRODUCAO</b>	A Síndrome HELLP é uma condição clínica grave que pode afetar mulheres grávidas e puérperas. É caracterizada por complicações, e podendo causar danos ao fígado, devido à diminuição de plaquetas e anemia hemolítica. A atuação do enfermeiro na Síndrome HELLP é de grande importância, desempenhando um papel fundamental na detecção precoce, na prestação de cuidados de qualidade e no suporte emocional a mulher, sua família e rede de apoio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender como os enfermeiros desempenham o papel na detecção e nos cuidados nas mulheres com Síndrome HELLP durante seu ciclo gravídico puerperal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa realizada a partir da pergunta "Qual a importância do enfermeiro na Síndrome HELLP?". A estratégia utilizada foi a PICO: P (participantes): enfermagem obstétrica; I (intervenção): aprimoramento no conteúdo em detecção e tratamento da Síndrome de HELLP; C (controle): relevância sobre o tema; e O (resultado): ausência da definição da importância do conteúdo descrito na literatura. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed, Scielo, Lilacs, no período de 2022 a 2023, por meio dos descritores relacionados a Atuação do Enfermeiro as Pacientes Portadoras de Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação, Síndromes Hipertensivas e Fatores de Risco Associados à Gestação e Enfermagem Obstétrica. As limitações apresentadas na busca foram a escassez de estudos que abordem o tema em questão. A partir dos descritores foram encontrados 27 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos originais disponíveis na íntegra em inglês, português e espanhol. Cada artigo foi avaliado por dois revisores. Após a extração de dados houve a exclusão inicial de 12 artigos, pois não se enquadravam no objetivo ou eram duplicados. Em segunda análise foi realizada a leitura na íntegra de 15 artigos e selecionados 5 que se aplicam ao tema e objetivo do estudo em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise descritiva nos permitiu uma visão geral das principais características dos casos clínicos, correlacionando com o panorama das práticas dos enfermeiros. Os resultados permitiu avaliar se atuação do enfermeiro está de acordo com as melhores práticas descritas na literatura ou se há desproporção significativas que merecem atenção. Primeiramente, realizam identificação precoce ao monitorar sinais vitais assim como identificar os sintomas, permitindo atendimento ágil, impactando diretamente o resultado final. Além disso, oferecem cuidados de alta qualidade, como administração de medicamentos e procedimentos necessários conforme protocolos. O suporte emocional é outra faceta importante, aliviando o estresse emocional, isto sendo vital para o bem-estar psicológico.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os enfermeiros atuam na assistência na Síndrome HELLP enfrentam a falta de conhecimento para ações específicas e assertivas. É crucial que práticas sejam embasadas pela ciência e, portanto, é essencial o acesso a informações de alta qualidade que impulsionem o desenvolvimento profissional e garantir a segurança do binômio.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Ferreira MBG, Silveira CF, Silva SR, Souza DJ, Ruiz MT. Nursing care for women with pre-eclampsia and/or eclampsia: integrative review. Rev Esc Enferm. 2016;50(2):324-34. Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S008062342016_000200324(#38)ing=en">http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S008062342016_000200324(#38)ing=en</a> . 2. Scielo. Perfil de risco gestacional materno no serviço de pré-natal de maternidade pública do Nordeste do Brasil. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0100-72032012000300002">https://doi.org/10.1590/S0100-72032012000300002</a> . Acesso em: 13/10/2023. 3. Araújo IFM, Santos PA dos, Santos PA dos et al. SÍNDROMES HIPERTENSIVAS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À GESTAÇÃO. Publicado 15/10/2017. Disponível em <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-33219">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-33219</a> . Acesso em 13/10/2023 4. Brito KKG, Moura JRP, Sousa MJet al. The prevalence of hypertensive syndromes particular of pregnancy (GHS). Disponível em <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ii-762245">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ii-762245</a> . Acesso em 13/10/2023 5. ATUAÇÃO do enfermeiro a pacientes portadoras de síndrome hipertensiva específica da gestação / Nursing's action against patients with specific hypertensive management syndrome. Portal Regional da BVS Informação e Conhecimento para a Saúde português espanhol english français. [s. l.], 2020. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio_1095878">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio_1095878</a> . Acesso em: 12 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14943	Enfermagem	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4762134 - PALOMA SOUZA LEITE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		
<b>TITULO</b>	A importância do enfermeiro na Síndrome HELLP			
<b>INTRODUCAO</b>	A Síndrome HELLP é uma condição clínica grave que pode afetar mulheres grávidas e puérperas. É caracterizada por complicações, e podendo causar danos ao fígado, devido à diminuição de plaquetas e anemia hemolítica. A atuação do enfermeiro na Síndrome HELLP é de grande importância, desempenhando um papel fundamental na detecção precoce, na prestação de cuidados de qualidade e no suporte emocional a mulher, sua família e rede de apoio.			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender como os enfermeiros desempenham o papel na detecção e nos cuidados nas mulheres com Síndrome HELLP durante seu ciclo gravídico puerperal.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão integrativa realizada a partir da pergunta "Qual a importância do enfermeiro na Síndrome HELLP?". A estratégia utilizada foi a PICO: P (participantes): enfermagem obstétrica; I (intervenção): aprimoramento no conteúdo em detecção e tratamento da Síndrome de HELLP; C (controle): relevância sobre o tema; e O (resultado): ausência da definição da importância do conteúdo descrito na literatura. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed, Scielo, Lilacs, no período de 2022 a 2023, por meio dos descritores relacionados a Atuação do Enfermeiro as Pacientes Portadoras de Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação, Síndromes Hipertensivas e Fatores de Risco Associados à Gestação e Enfermagem Obstétrica. As limitações apresentadas na busca foram a escassez de estudos que abordem o tema em questão. A partir dos descritores foram encontrados 27 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos originais disponíveis na íntegra em inglês, português e espanhol. Cada artigo foi avaliado por dois revisores. Após a extração de dados houve a exclusão inicial de 12 artigos, pois não se enquadravam no objetivo ou eram duplicados. Em segunda análise foi realizada a leitura na íntegra de 15 artigos e selecionados 5 que se aplicam ao tema e objetivo do estudo em questão.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise descritiva nos permitiu uma visão geral das principais características dos casos clínicos, correlacionando com o panorama das práticas dos enfermeiros. Os resultados permitiu avaliar se atuação do enfermeiro está de acordo com as melhores práticas descritas na literatura ou se há desproporção significativas que merecem atenção. Primeiramente, realizam identificação precoce ao monitorar sinais vitais assim como identificar os sintomas, permitindo atendimento ágil, impactando diretamente o resultado final. Além disso, oferecem cuidados de alta qualidade, como administração de medicamentos e procedimentos necessários conforme protocolos. O suporte emocional é outra faceta importante, aliviando o estresse emocional, isto sendo vital para o bem-estar psicológico.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os enfermeiros atuam na assistência na Síndrome HELLP enfrentam a falta de conhecimento para ações específicas e assertivas. É crucial que práticas sejam embasadas pela ciência e, portanto, é essencial o acesso a informações de alta qualidade que impulsionem o desenvolvimento profissional e garantir a segurança do binômio.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Ferreira MBG, Silveira CF, Silva SR, Souza DJ, Ruiz MT. Nursing care for women with pre-eclampsia and/or eclampsia: integrative review. Rev Esc Enferm. 2016;50(2):324-34. Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S008062342016_000200324(#38)ing=en">http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S008062342016_000200324(#38)ing=en</a> . 2. Scielo. Perfil de risco gestacional materno no serviço de pré-natal de maternidade pública do Nordeste do Brasil. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1590/S0100-72032012000300002">https://doi.org/10.1590/S0100-72032012000300002</a> . Acesso em: 13/10/2023. 3. Araújo IFM, Santos PA dos, Santos PA dos et al. SÍNDROMES HIPERTENSIVAS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À GESTAÇÃO. Publicado 15/10/2017. Disponível em <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-33219">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-33219</a> . Acesso em 13/10/2023 4. Brito KKG, Moura JRP, Sousa MJet al. The prevalence of hypertensive syndromes particular of pregnancy (GHS). Disponível em <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ii-762245">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ii-762245</a> . Acesso em 13/10/2023 5. ATUAÇÃO do enfermeiro a pacientes portadoras de síndrome hipertensiva específica da gestação / Nursing's action against patients with specific hypertensive management syndrome. Portal Regional da BVS Informação e Conhecimento para a Saúde português espanhol english français. [s. l.], 2020. Disponível em: <a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio_1095878">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio_1095878</a> . Acesso em: 12 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14946	Criação de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4119304 - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Andrea Roberto Bueno Ribeiro		JOÃO CARLOS SHIMADA BORGES
<b>TITULO</b>	HISTOLOGIA DE TECIDOS DE TILÁPIA-DO-NILO ( <i>Oreochromis niloticus</i> ) SUBMETIDAS A DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGEM			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A aquicultura é uma atividade econômica que vem ganhando destaque no Brasil – principalmente com a piscicultura (PEIXE BR, 2023). Concomitantemente, o debate a respeito da criação de animais tendo como base o bem-estar da espécie também cresceu de forma significativa e positiva, levantando a necessidade de os produtores adequarem-se a nova demanda existente (LAMBERT et al., 2022; PEDRAZZANI et al., 2023). Neste sentido, a criação de peixes em tanque rede, muito utilizada na piscicultura atual e com alto potencial econômico, desperta questionamentos em relação à sustentabilidade e ao bem-estar dos animais.			
<b>OBJETIVOS</b>	Assim, este projeto tem como objetivo investigar possíveis alterações histológicas nas brânquias, fígado e intestino, relacionadas às condições de estresse em Tilápias-do-Nilo criadas em diferentes densidades de estocagem (T1:100 e T3:300 peixes/m3) em tanques rede.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram realizadas análises histológicas dos arcos branquiais, fígado e seguimentos do intestino anterior de 20 exemplares de <i>O.niloticus</i> manejados em diferentes densidades (T1: 100 peixes/m3 e T2:300 peixes/m3). Este projeto é parte do estudo de mestrado desenvolvido por Almeida (2018). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para uso de Animais em ensino e pesquisa protocolo CEUA/FMU no. 8600101118.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi verificada na análise microscópica das brânquias, presença de alterações de vasos sanguíneos (aneurisma) na lamela secundária, nos peixes cultivados em maior densidade. Essa alteração não foi constatada nos animais do grupo controle. O intestino anterior apresenta maior quantidade vacúolos nos enterócitos e poucas células caliciformes (secretoras de muco) na porção posterior, isso permite deduzir que ocorre intenso absorção no intestino anterior. A borda em escova indica a presença de microvilosidades íntegras. No fígados observou-se uma intensa vacuolização citoplasmática, nos grupos dos animais provenientes do cultivo de maior densidade, podendo indicar processos degenerativos decorrentes de problemas metabólicos (PACHECO; SANTOS, 2002).			
<b>CONCLUSOES</b>	Os resultados obtidos sugerem um possível efeito do adensamento de cultivo, que estão identificados nas alterações teciduais nas brânquias, uma vez que, esses órgãos formam a interface imediata com o meio ambiente.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, G. J. Avaliação de diferentes densidades de estocagem na criação de tilápia do Nilo ( <i>Oreochromis niloticus</i> ), em tanques-rede: aspectos zootécnicos, ambientais e bem-estar animal. Dissertação (Mestrado em Aquicultura) - Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU, São Paulo, 2018. LAMBERT H.; Cornish A.; Elwin A.; D’Cruze N. A. Kettle of Fish: A Review of the Scientific Literature for Evidence of Fish Sentience. <i>Animals</i> . 2022; 12(9):1182. <a href="https://doi.org/10.3390/ani12091182">https://doi.org/10.3390/ani12091182</a> . PACHECO M.; SANTOS, M.A. (2002). Biotransformation, genotoxic and histopathological effects of environmental contaminants in European eel ( <i>Anguilla anguilla</i> L.). <i>Ecotox Environ Safe</i> . 53:331–47 PEDRAZZANI, A. S.; Quintiliano, M. H.; Bolfé, F.; Sans, E. C. D. O.; Molento, C. F. M. (2020). Tilapia on-farm welfare assessment protocol for semi-intensive production systems. <i>Frontiers in Veterinary Science</i> , 991. PEIXEBR. São Paulo, 2023. Disponível em: (#60) <a href="https://anuariodapeixebr.com.br/#62">https://anuariodapeixebr.com.br/#62</a> . Acesso em: 12 out. 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14947	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		1325809 - ELLEN CRISTINA DE SOUSA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Sueli Goncalves dos Santos		
<b>TITULO</b>	LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES NA SEMANA DA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A parada cardiorrespiratória (PCR), é considerada séria questão de saúde pública, principalmente devido à frequência de eventos que ocorrem em ambiente extra hospitalar, isto é, em espaços não estruturados para o auxílio de vítimas dos eventos. Portanto, é de extrema importância a instrução e o treinamento das técnicas de reanimação cardiopulmonar, para que os profissionais de saúde possam reconhecer o momento e a forma correta de agir em uma situação de PCR. Durante essa situação, é utilizada uma sequência de passos simplificados no atendimento, chamado de Suporte Básico de Vida (SBV).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência da Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência (LAEEU) no contexto da semana da enfermagem, e sua contribuição para a capacitação dos estudantes de enfermagem no atendimento de SBV, conforme diretrizes da American Heart Association (AHA 2020). <sup>2</sup>			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência dos 19 integrantes da LAEEU que trabalharam na 26ª Semana de Enfermagem na Universidade de Santo Amaro e análise do conteúdo das respostas dos entrevistados, após obtenção do consentimento informado pelos participantes. A literatura específica para embasar o planejamento das atividades foram as diretrizes da AHA 2020. <sup>2</sup>			
<b>RESULTADOS</b>	O evento incluiu palestras sobre SBV, com ênfase em RCP pré-hospitalar e intra-hospitalar, para os graduandos de enfermagem no período matutino e noturno. No período vespertino, os alunos tiveram uma oficina prática de RCP, em manequins disponibilizados pelo laboratório, todos encontros tiveram três horas de duração cada. As atividades ocorreram em horários previamente agendados e divulgados em diferentes meios de comunicação. Os conteúdos foram ministrados por professores e profissionais da área da saúde e com expertise na temática. O tema SBV, é de suma importância para o aluno de enfermagem, uma vez que o conhecimento sobre o manejo de um paciente em PCR é algo rotineiro na prática da enfermagem e também uma realidade em ambiente extra hospitalar. <sup>3</sup> Constatou-se, ainda, que, estando aptos para reconhecer previamente os sinais de PCR, assim como deflagrar ações protocolares conforme diretrizes da AHA, os alunos de enfermagem, mesmo nos anos iniciais de curso, podem influenciar no aumento da sobrevida do paciente acometido por PCR e na diminuição de suas sequelas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A realização destas palestras e treinamento, serviu de grande relevância para aprimorar a capacidade dos participantes da liga e discentes de enfermagem, em reconhecer a PCR, e, ainda, a execução de cada habilidade pertinente ao SBV e suas devidas correções.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Vargas, Larissa Jardim, et al. "Monitoria de urgência e emergência: Um relato de experiência de discentes de medicina Urgency and emergency monitoring: An experience report of medicine discent." Brazilian Journal of Health Review 4.6 (2021): 23847-23854. 2. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/48HK">https://ishort.ink/48HK</a> 3. Conselho Federal de Enfermagem [internet]. Cofen atualiza resolução sobre atendimento no Suporte Básico de Vida. Brasil: 2023. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/N4JV">https://ishort.ink/N4JV</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14947	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3780554 - ELISANGELA BEZERRA LOURENCO AZEVEDO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Sueli Goncalves dos Santos		
<b>TITULO</b>	LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES NA SEMANA DA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A parada cardiorrespiratória (PCR), é considerada séria questão de saúde pública, principalmente devido à frequência de eventos que ocorrem em ambiente extra hospitalar, isto é, em espaços não estruturados para o auxílio de vítimas dos eventos. Portanto, é de extrema importância a instrução e o treinamento das técnicas de reanimação cardiopulmonar, para que os profissionais de saúde possam reconhecer o momento e a forma correta de agir em uma situação de PCR. Durante essa situação, é utilizada uma sequência de passos simplificados no atendimento, chamado de Suporte Básico de Vida (SBV).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência da Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência (LAEEU) no contexto da semana da enfermagem, e sua contribuição para a capacitação dos estudantes de enfermagem no atendimento de SBV, conforme diretrizes da American Heart Association (AHA 2020). <sup>2</sup>			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência dos 19 integrantes da LAEEU que trabalharam na 26ª Semana de Enfermagem na Universidade de Santo Amaro e análise do conteúdo das respostas dos entrevistados, após obtenção do consentimento informado pelos participantes. A literatura específica para embasar o planejamento das atividades foram as diretrizes da AHA 2020. <sup>2</sup>			
<b>RESULTADOS</b>	O evento incluiu palestras sobre SBV, com ênfase em RCP pré-hospitalar e intra-hospitalar, para os graduandos de enfermagem no período matutino e noturno. No período vespertino, os alunos tiveram uma oficina prática de RCP, em manequins disponibilizados pelo laboratório, todos encontros tiveram três horas de duração cada. As atividades ocorreram em horários previamente agendados e divulgados em diferentes meios de comunicação. Os conteúdos foram ministrados por professores e profissionais da área da saúde e com expertise na temática. O tema SBV, é de suma importância para o aluno de enfermagem, uma vez que o conhecimento sobre o manejo de um paciente em PCR é algo rotineiro na prática da enfermagem e também uma realidade em ambiente extra hospitalar. <sup>3</sup> Constatou-se, ainda, que, estando aptos para reconhecer previamente os sinais de PCR, assim como deflagrar ações protocolares conforme diretrizes da AHA, os alunos de enfermagem, mesmo nos anos iniciais de curso, podem influenciar no aumento da sobrevida do paciente acometido por PCR e na diminuição de suas sequelas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A realização destas palestras e treinamento, serviu de grande relevância para aprimorar a capacidade dos participantes da liga e discentes de enfermagem, em reconhecer a PCR, e, ainda, a execução de cada habilidade pertinente ao SBV e suas devidas correções.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Vargas, Larissa Jardim, et al. "Monitoria de urgência e emergência: Um relato de experiência de discentes de medicina Urgency and emergency monitoring: An experience report of medicine discent's." Brazilian Journal of Health Review 4.6 (2021): 23847-23854. 2. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/48HK">https://ishort.ink/48HK</a> 3. Conselho Federal de Enfermagem [internet]. Cofen atualiza resolução sobre atendimento no Suporte Básico de Vida. Brasil: 2023. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/N4JV">https://ishort.ink/N4JV</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14947	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4408705 - ESTELA SOUZA ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Sueli Goncalves dos Santos		
<b>TITULO</b>	LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES NA SEMANA DA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A parada cardiorrespiratória (PCR), é considerada séria questão de saúde pública, principalmente devido à frequência de eventos que ocorrem em ambiente extra hospitalar, isto é, em espaços não estruturados para o auxílio de vítimas dos eventos. Portanto, é de extrema importância a instrução e o treinamento das técnicas de reanimação cardiopulmonar, para que os profissionais de saúde possam reconhecer o momento e a forma correta de agir em uma situação de PCR. Durante essa situação, é utilizada uma sequência de passos simplificados no atendimento, chamado de Suporte Básico de Vida (SBV).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência da Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência (LAEEU) no contexto da semana da enfermagem, e sua contribuição para a capacitação dos estudantes de enfermagem no atendimento de SBV, conforme diretrizes da American Heart Association (AHA 2020). <sup>2</sup>			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência dos 19 integrantes da LAEEU que trabalharam na 26ª Semana de Enfermagem na Universidade de Santo Amaro e análise do conteúdo das respostas dos entrevistados, após obtenção do consentimento informado pelos participantes. A literatura específica para embasar o planejamento das atividades foram as diretrizes da AHA 2020. <sup>2</sup>			
<b>RESULTADOS</b>	O evento incluiu palestras sobre SBV, com ênfase em RCP pré-hospitalar e intra-hospitalar, para os graduandos de enfermagem no período matutino e noturno. No período vespertino, os alunos tiveram uma oficina prática de RCP, em manequins disponibilizados pelo laboratório, todos encontros tiveram três horas de duração cada. As atividades ocorreram em horários previamente agendados e divulgados em diferentes meios de comunicação. Os conteúdos foram ministrados por professores e profissionais da área da saúde e com expertise na temática. O tema SBV, é de suma importância para o aluno de enfermagem, uma vez que o conhecimento sobre o manejo de um paciente em PCR é algo rotineiro na prática da enfermagem e também uma realidade em ambiente extra hospitalar. <sup>3</sup> Constatou-se, ainda, que, estando aptos para reconhecer previamente os sinais de PCR, assim como deflagrar ações protocolares conforme diretrizes da AHA, os alunos de enfermagem, mesmo nos anos iniciais de curso, podem influenciar no aumento da sobrevida do paciente acometido por PCR e na diminuição de suas sequelas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A realização destas palestras e treinamento, serviu de grande relevância para aprimorar a capacidade dos participantes da liga e discentes de enfermagem, em reconhecer a PCR, e, ainda, a execução de cada habilidade pertinente ao SBV e suas devidas correções.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Vargas, Larissa Jardim, et al. "Monitoria de urgência e emergência: Um relato de experiência de discentes de medicina Urgency and emergency monitoring: An experience report of medicine discent." Brazilian Journal of Health Review 4.6 (2021): 23847-23854. 2. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/48HK">https://ishort.ink/48HK</a> 3. Conselho Federal de Enfermagem [internet]. Cofen atualiza resolução sobre atendimento no Suporte Básico de Vida. Brasil: 2023. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/N4JV">https://ishort.ink/N4JV</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14947	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4577396 - INGRID RIBEIRO GONÇALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Sueli Goncalves dos Santos		
<b>TITULO</b>	LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES NA SEMANA DA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A parada cardiopulmonar (PCR), é considerada séria questão de saúde pública, principalmente devido à frequência de eventos que ocorrem em ambiente extra hospitalar, isto é, em espaços não estruturados para o auxílio de vítimas dos eventos. Portanto, é de extrema importância a instrução e o treinamento das técnicas de reanimação cardiopulmonar, para que os profissionais de saúde possam reconhecer o momento e a forma correta de agir em uma situação de PCR. Durante essa situação, é utilizada uma sequência de passos simplificados no atendimento, chamado de Suporte Básico de Vida (SBV).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência da Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência (LAEEU) no contexto da semana da enfermagem, e sua contribuição para a capacitação dos estudantes de enfermagem no atendimento de SBV, conforme diretrizes da American Heart Association (AHA 2020). <sup>2</sup>			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência dos 19 integrantes da LAEEU que trabalharam na 26ª Semana de Enfermagem na Universidade de Santo Amaro e análise do conteúdo das respostas dos entrevistados, após obtenção do consentimento informado pelos participantes. A literatura específica para embasar o planejamento das atividades foram as diretrizes da AHA 2020. <sup>2</sup>			
<b>RESULTADOS</b>	O evento incluiu palestras sobre SBV, com ênfase em RCP pré-hospitalar e intra-hospitalar, para os graduandos de enfermagem no período matutino e noturno. No período vespertino, os alunos tiveram uma oficina prática de RCP, em manequins disponibilizados pelo laboratório, todos encontros tiveram três horas de duração cada. As atividades ocorreram em horários previamente agendados e divulgados em diferentes meios de comunicação. Os conteúdos foram ministrados por professores e profissionais da área da saúde e com expertise na temática. O tema SBV, é de suma importância para o aluno de enfermagem, uma vez que o conhecimento sobre o manejo de um paciente em PCR é algo rotineiro na prática da enfermagem e também uma realidade em ambiente extra hospitalar. <sup>3</sup> Constatou-se, ainda, que, estando aptos para reconhecer previamente os sinais de PCR, assim como deflagrar ações protocolares conforme diretrizes da AHA, os alunos de enfermagem, mesmo nos anos iniciais de curso, podem influenciar no aumento da sobrevivência do paciente acometido por PCR e na diminuição de suas sequelas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A realização destas palestras e treinamento, serviu de grande relevância para aprimorar a capacidade dos participantes da liga e discentes de enfermagem, em reconhecer a PCR, e, ainda, a execução de cada habilidade pertinente ao SBV e suas devidas correções.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Vargas, Larissa Jardim, et al. "Monitoria de urgência e emergência: Um relato de experiência de discentes de medicina Urgency and emergency monitoring: An experience report of medicine discent." Brazilian Journal of Health Review 4.6 (2021): 23847-23854. 2. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/48HK">https://ishort.ink/48HK</a> 3. Conselho Federal de Enfermagem [internet]. Cofen atualiza resolução sobre atendimento no Suporte Básico de Vida. Brasil: 2023. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/N4JV">https://ishort.ink/N4JV</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14947	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4625579 - CLEIZE DE SOUZA BAZANI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Sueli Goncalves dos Santos		
<b>TITULO</b>	LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES NA SEMANA DA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A parada cardiorrespiratória (PCR), é considerada séria questão de saúde pública, principalmente devido à frequência de eventos que ocorrem em ambiente extra hospitalar, isto é, em espaços não estruturados para o auxílio de vítimas dos eventos. Portanto, é de extrema importância a instrução e o treinamento das técnicas de reanimação cardiopulmonar, para que os profissionais de saúde possam reconhecer o momento e a forma correta de agir em uma situação de PCR. Durante essa situação, é utilizada uma sequência de passos simplificados no atendimento, chamado de Suporte Básico de Vida (SBV).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência da Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência (LAEEU) no contexto da semana da enfermagem, e sua contribuição para a capacitação dos estudantes de enfermagem no atendimento de SBV, conforme diretrizes da American Heart Association (AHA 2020). <sup>2</sup>			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência dos 19 integrantes da LAEEU que trabalharam na 26ª Semana de Enfermagem na Universidade de Santo Amaro e análise do conteúdo das respostas dos entrevistados, após obtenção do consentimento informado pelos participantes. A literatura específica para embasar o planejamento das atividades foram as diretrizes da AHA 2020. <sup>2</sup>			
<b>RESULTADOS</b>	O evento incluiu palestras sobre SBV, com ênfase em RCP pré-hospitalar e intra-hospitalar, para os graduandos de enfermagem no período matutino e noturno. No período vespertino, os alunos tiveram uma oficina prática de RCP, em manequins disponibilizados pelo laboratório, todos encontros tiveram três horas de duração cada. As atividades ocorreram em horários previamente agendados e divulgados em diferentes meios de comunicação. Os conteúdos foram ministrados por professores e profissionais da área da saúde e com expertise na temática. O tema SBV, é de suma importância para o aluno de enfermagem, uma vez que o conhecimento sobre o manejo de um paciente em PCR é algo rotineiro na prática da enfermagem e também uma realidade em ambiente extra hospitalar. <sup>3</sup> Constatou-se, ainda, que, estando aptos para reconhecer previamente os sinais de PCR, assim como deflagrar ações protocolares conforme diretrizes da AHA, os alunos de enfermagem, mesmo nos anos iniciais de curso, podem influenciar no aumento da sobrevida do paciente acometido por PCR e na diminuição de suas sequelas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A realização destas palestras e treinamento, serviu de grande relevância para aprimorar a capacidade dos participantes da liga e discentes de enfermagem, em reconhecer a PCR, e, ainda, a execução de cada habilidade pertinente ao SBV e suas devidas correções.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Vargas, Larissa Jardim, et al. "Monitoria de urgência e emergência: Um relato de experiência de discentes de medicina Urgency and emergency monitoring: An experience report of medicine discent's." Brazilian Journal of Health Review 4.6 (2021): 23847-23854. 2. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/48HK">https://ishort.ink/48HK</a> 3. Conselho Federal de Enfermagem [internet]. Cofen atualiza resolução sobre atendimento no Suporte Básico de Vida. Brasil: 2023. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/N4JV">https://ishort.ink/N4JV</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14947	Ciências da Saúde	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4986695 - MÁRCIA CRISTINA MALTA JORDÃO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Sueli Goncalves dos Santos		
<b>TITULO</b>	LIGA ACADÊMICA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES NA SEMANA DA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A parada cardiopulmonar (PCR), é considerada séria questão de saúde pública, principalmente devido à frequência de eventos que ocorrem em ambiente extra hospitalar, isto é, em espaços não estruturados para o auxílio de vítimas dos eventos. Portanto, é de extrema importância a instrução e o treinamento das técnicas de reanimação cardiopulmonar, para que os profissionais de saúde possam reconhecer o momento e a forma correta de agir em uma situação de PCR. Durante essa situação, é utilizada uma sequência de passos simplificados no atendimento, chamado de Suporte Básico de Vida (SBV).			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar a experiência da Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência (LAEEU) no contexto da semana da enfermagem, e sua contribuição para a capacitação dos estudantes de enfermagem no atendimento de SBV, conforme diretrizes da American Heart Association (AHA 2020). <sup>2</sup>			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um relato de experiência dos 19 integrantes da LAEEU que trabalharam na 26ª Semana de Enfermagem na Universidade de Santo Amaro e análise do conteúdo das respostas dos entrevistados, após obtenção do consentimento informado pelos participantes. A literatura específica para embasar o planejamento das atividades foram as diretrizes da AHA 2020. <sup>2</sup>			
<b>RESULTADOS</b>	O evento incluiu palestras sobre SBV, com ênfase em RCP pré-hospitalar e intra-hospitalar, para os graduandos de enfermagem no período matutino e noturno. No período vespertino, os alunos tiveram uma oficina prática de RCP, em manequins disponibilizados pelo laboratório, todos encontros tiveram três horas de duração cada. As atividades ocorreram em horários previamente agendados e divulgados em diferentes meios de comunicação. Os conteúdos foram ministrados por professores e profissionais da área da saúde e com expertise na temática. O tema SBV, é de suma importância para o aluno de enfermagem, uma vez que o conhecimento sobre o manejo de um paciente em PCR é algo rotineiro na prática da enfermagem e também uma realidade em ambiente extra hospitalar. <sup>3</sup> Constatou-se, ainda, que, estando aptos para reconhecer previamente os sinais de PCR, assim como deflagrar ações protocolares conforme diretrizes da AHA, os alunos de enfermagem, mesmo nos anos iniciais de curso, podem influenciar no aumento da sobrevivência do paciente acometido por PCR e na diminuição de suas sequelas.			
<b>CONCLUSÕES</b>	A realização destas palestras e treinamento, serviu de grande relevância para aprimorar a capacidade dos participantes da liga e discentes de enfermagem, em reconhecer a PCR, e, ainda, a execução de cada habilidade pertinente ao SBV e suas devidas correções.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	1. Vargas, Larissa Jardim, et al. "Monitoria de urgência e emergência: Um relato de experiência de discentes de medicina Urgency and emergency monitoring: An experience report of medicine discent's." Brazilian Journal of Health Review 4.6 (2021): 23847-23854. 2. American Heart Association. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. Texas: American Heart Association, 2020, 32 p. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/48HK">https://ishort.ink/48HK</a> 3. Conselho Federal de Enfermagem [internet]. Cofen atualiza resolução sobre atendimento no Suporte Básico de Vida. Brasil: 2023. Disponível em: <a href="https://ishort.ink/N4JV">https://ishort.ink/N4JV</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14949	Medicina	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4618971 - BEATRIZ MITSUIUQUI JOAO		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Myllene Bossolani Galloro		
<b>TITULO</b>	O impacto da reposição do GH na função tireoidiana de pacientes com DGH: uma revisão de literatura			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O sistema neuroendócrino atua no desenvolvimento da estatura dos indivíduos desde o momento da concepção até a idade adulta, principalmente por meio do hormônio do crescimento (GH), sintetizado e secretado em nível hipotalâmico - hipofisário. Uma vez lançado na corrente sanguínea ele passa a atuar em conjunto ao fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1) - proteína sintetizada pelo fígado, capaz de exercer função sobre os receptores de insulina, além de apresentar como seus principais produtos o próprio GH, hormônios tireoidianos, hormônios sexuais e a insulina. Em cerca de 3 a 5% da população pediátrica e apenas em 0,01% da população adulta, pode-se diagnosticar um quadro sintomático conhecido como Deficiência de GH (DGH), em que a falta do hormônio acarreta em alterações como baixa estatura, aumento de gordura subcutânea, volume corporal reduzido, atraso na dentição, hipodesenvolvimento ósseo e hipoglicemia. O tratamento desse quadro é feito pela administração diária de GH sintético. Todavia, a reposição hormonal pode acabar interferindo nos níveis de outros hormônios sintetizados em nível hipotalâmico - hipofisário e, conseqüentemente interferir no produto final como na tiroxina (T4) e na tri-iodotironina (T3).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar o impacto da reposição de GH em pacientes com DGH nos níveis séricos dos hormônios tireoidianos: T3, T4 e T3 reverso; e possível desenvolvimento de hipotireoidismo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada revisão sistemática de literatura disponível nas plataformas Scielo e PubMed, de artigos publicados entre 2013 a 2023 nas línguas ingles, português e espanhol.			
<b>RESULTADO S</b>	Em nível cerebral acredita-se que exista uma supressão do eixo hipotalâmico-hipofisário-tireoidiano em pacientes diagnosticados com DGH, de modo que com o início do tratamento de reposição ocorra um aumento do tônus somatostatinérgico, até então suprimido, com conseqüente redução dos níveis séricos de T4, uma vez que o mesmo passa a ter sua conversão para forma de T3 aumentada. A conversão periférica de T4 para a forma hormonal ativa resulta em redução da concentração sérica de T3 reverso (T3r) inativo, elevação da concentração de T3 e conseqüentemente aumento da relação T3/T4. Na maioria dos pacientes, alterações dos níveis de hormônios tireoidianos, principalmente a redução dos níveis de T3 plasmáticos são transitórias, com retorno espontâneo aos níveis séricos adequados, uma vez finalizado o tratamento de reposição de GH. Entretanto, em alguns casos essas alterações são permanentes, sendo necessária reposição contínua de hormônios tireoidianos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Embora seja necessária em pacientes com DGH, a reposição do hormônio de crescimento pode alterar os níveis séricos de T3, T4 e T3 reverso, geralmente de forma transitória. Entretanto, faz-se necessário o acompanhamento dessas alterações pois, caso sejam permanentes, acarretarão na necessidade de reposição dos hormônios da tireóide.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Endocrinologia. I. Vilar, Lucio. II. Kater, Claudio E. Acessado em 1 de junho de 2023 Carlos E. Martinelli Júnior, Carla R.P. Oliveira and Alan V. de O. Brito et al. Diagnóstico da Deficiência de Hormônio de Crescimento, a Rigor de IGF-1. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia (#38) Metabologia. 2002. Vol. 46(1):27-33. Jallad RS, Bronstein MD. Deficiência de GH na vida adulta: como diagnosticar e quando tratar?. Arq Bras Endocrinol Metab. 2008Jul;52(5):861-71. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0004-27302008000500019">https://doi.org/10.1590/S0004-27302008000500019</a> Abucham J, Vieira TCA, Barbosa ER, Ribeiro RS, Martins MRA. Terapia de reposição hormonal no hipopituitarismo. Arq Bras Endocrinol Metab. 2003 Aug;47(4):492-508. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0004-27302003000400021">https://doi.org/10.1590/S0004-27302003000400021</a> Portes ES, Jorge AA de L, Martinelli Jr. CE. Tratamento com hormônio de crescimento: aspectos moleculares, clínicos e terapêuticos. Arq Bras Endocrinol Metab [Internet]. 2008 Jul;52(5):715-6. Available from: <a href="https://doi.org/10.1590/S0004-27302008000500001">https://doi.org/10.1590/S0004-27302008000500001</a> Profka E, Rodari G, Giacchetti F and Giavoli C (2021) GH Deficiency and Replacement Therapy in Hypopituitarism: Insight Into the Relationships With Other Hypothalamic-Pituitary Axes. Front. Endocrinol. 12:678778. doi: 10.3389/fendo.2021.678778 Kucharska AM, Witkowska-S(#38)#281;dek E, Rumi(#38)#324;ska M, Pyr(#38)#380;ak B. Thyroid Hormone Changes Related to Growth Hormone Therapy in Growth Hormone Deficient Patients. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(22):5354. <a href="https://doi.org/10.3390/jcm10225354">https://doi.org/10.3390/jcm10225354</a> Hussain MA, Schmitz O, Jørgensen JO, Christiansen JS, Weeke J, Schmid C, et al. Insulin-Like Growth Factor I Alters Peripheral Thyroid Hormone Metabolism in Humans: Comparison With Growth Hormone. Eur J Endocrinol (1996) 134:563-7. doi: 10.1530/eje.0.1340563 // Oliveira JH, Barbosa ER, Kasamatsu T, Abucham J. Evidence for Thyroid Hormone as a Positive Regulator of Serum Thyrotropin Bioactivity. J Clin Endocrinol Metab (2007) 92(8):3108-13. doi: 10.1210/jc.2006-2217 Portes ES, Oliveira JH, MacCagnan P, Abucham J. Changes in Serum Thyroid Hormones Levels and Their Mechanisms During Longterm Growth Hormone (GH) Replacement Therapy in GH Deficient Children. Clin Endocrinol (2000) 53:183-9. doi: 10.1046/j.1365-2265.2000.01071.x Johannsson, G, Ragnarsson, O. Growth hormone deficiency in adults with hypopituitarism—What are the risks and can they be eliminated by therapy? J Intern Med. 2021; 290: 1180–1193. Porter BA, Refetoff S, Rosenfeld RL, De Groat LJ, Lang US, Stark O. Abnormal Thyroxine Metabolism in Hyper Somatotrophic Dwarfism and Inhibition of Responsiveness to TRH During GH Therapy. Pediatrics (1973) 51:668e74. Sato T, Suzuki Y, Ishiguro K, Masuyama T. Enhanced Peripheral Conversion of Thyroxine to Triiodothyronine During hGH Therapy in GH Deficient Children. J Clin Endocrinol Metab (1977) 45:324-9. doi: 10.1210/jcem-45-2-324 Rezvani I, DiGeorge AM, Dowshen SA, Bourdony CJ. Action of Human Growth Hormone (hGH) on Extrathyroidal Conversion of Thyroxine (T4) to Triiodothyronine (T3) in Children With Hypothyroidism. Pediatr Res (1981) 15:6-9. doi: 10.1203/00006450-198101000-00002 Grunfeld C, Sherman BM, Cavalleri RR. The Acute Effects of Human Growth Hormone Administration on Thyroid Function in Normal Men. J Clin Endocrinol Metab (1988) 67:1111-4. doi: 10.1210/jcem-67-5-1111 Wyatt DT, Gesundheit N, Sherman B. Changes in Thyroid Hormones Levels During Growth Hormone Therapy in Initially Euthyroid Patients: Lack of Need for Thyroxine Supplementation. J Clin Endocrinol Metab (1988) 68:3493-7. doi: 10.1210/jcem.68.10.5202 Jørgensen JO, Pedersen SA, Laurberg P, Weeke J, Skakkebaek NE, Christiansen JS. Effects of Growth Hormone Therapy on Thyroid Function of Growth Hormone Deficient Adults With and Without Concomitant Thyroxine-Substituted Central Hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab(1989) 69:1127-31. doi: 10.1210/jcem-69-6-1127</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14950	Saúde Publica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4820991 - INGRID BORTOLUCCI		2 - Aprovado
		<b>Apresentação</b>		1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana Izabel Polydoro		VANESSA - ASSISTENTE SOCIAL UBS SÉRGIO CHADDAD
<b>TITULO</b>	Análise dos diferentes tipos de violências contra o idoso no Brasil entre os anos de 2018 e 2022.			
<b>INTRODUCA O</b>	Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) <sup>1</sup> conceitua violência como o uso de força física ou poder, tanto na ameaça quanto na prática, resultando em sofrimento, dano psicológico ou morte. Nesse contexto, a violência contra idosos abrange aspectos financeiros, físicos, psicológicos/morais, negligência ou abandono, e se transformou em uma questão de saúde pública <sup>2</sup> . No Brasil, o Ministério da Saúde implementou iniciativas como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) para prevenir e monitorar tais ocorrências. Contudo, apesar dessas ações, a violência contra idosos continua a crescer, ressaltando a importância da análise epidemiológica deste fenômeno.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os diferentes tipos de violência contra idosos no Brasil entre 2018 e 2022. Propor explicações para as variações quantitativas observadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzida uma pesquisa transversal, descritiva e com abordagem quantitativa, utilizando dados do TABNET vinculado ao DATASUS. Foram examinadas as ocorrências de violência física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono e sexual entre os anos de 2018 e 2022, envolvendo indivíduos com 60 anos ou mais (idosos).			
<b>RESULTADO S</b>	Identificou-se um total de 133.185 notificações de violência contra idosos no período de 2018 a 2022. Dentre esses registros, 63.787 casos foram de violência física (47,89%), 27.516 de violência psicológica/moral (20,65%), 6.355 de violência financeira (4,77%), 33.207 de negligência/abandono (24,93%) e 2.320 de violência sexual (1,74%). O ano de 2022 apresentou o maior número de notificações, representando 24,57% do total (32.733 casos). Vale destacar que a literatura evidencia a prevalência da violência física contra idosos no Brasil <sup>2</sup> , e há estudos que corroboram o aumento quantitativo da violência contra essa população no período analisado <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os dados revelam um crescimento nos casos, com o ápice em 2022. No entanto, este estudo possui algumas limitações, como a subnotificação e a incapacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Portanto, é imperativo a implementação de políticas que promovam a saúde e previnam a violência, bem como a adoção de medidas mais rigorosas na detecção e intervenção em casos de violência contra idosos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1- World Health Organization. Global consultation on violence and health. Violence: a public health priority. Geneva: WHO; 1996 (document WHO/EHA/ SPI.POA.2). 2- Machado DR, Kimura M, Duarte YAO, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil [Violence perpetrated against the elderly and health-related quality of life: a populational study in the city of São Paulo, Brazil]. Cien Saude Colet. 2020 Mar;25(3):1119-1128. Portuguese. doi: 10.1590/1413-81232020253.19232018. Epub 2018 Jul 30. PMID: 32159679. 3- Santos AMR dos, Sá GG de M, Brito AAO de, Nolêto J dos S, Oliveira RKC de. Violência contra o idoso durante a pandemia COVID-19: revisão de escopo. Acta paul enferm [Internet]. 2021;34:eAPE000336. Available from: <a href="https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336">https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14950	Saúde Publica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4826264 - JOÃO CARLOS ANTUNES DE FIGUEIREDO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana Izabel Polydoro	VANESSA - ASSISTENTE SOCIAL UBS SÉRGIO CHADDAD	
<b>TITULO</b>	Análise dos diferentes tipos de violências contra o idoso no Brasil entre os anos de 2018 e 2022.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS)<sup>1</sup> conceitua violência como o uso de força física ou poder, tanto na ameaça quanto na prática, resultando em sofrimento, dano psicológico ou morte. Nesse contexto, a violência contra idosos abrange aspectos financeiros, físicos, psicológicos/morais, negligência ou abandono, e se transformou em uma questão de saúde pública<sup>2</sup>. No Brasil, o Ministério da Saúde implementou iniciativas como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) para prevenir e monitorar tais ocorrências. Contudo, apesar dessas ações, a violência contra idosos continua a crescer, ressaltando a importância da análise epidemiológica deste fenômeno.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os diferentes tipos de violência contra idosos no Brasil entre 2018 e 2022 Propor explicações para as variações quantitativas observadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzida uma pesquisa transversal, descritiva e com abordagem quantitativa, utilizando dados do TABNET vinculado ao DATASUS. Foram examinadas as ocorrências de violência física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono e sexual entre os anos de 2018 e 2022, envolvendo indivíduos com 60 anos ou mais (idosos).			
<b>RESULTADO S</b>	Identificou-se um total de 133.185 notificações de violência contra idosos no período de 2018 a 2022. Dentre esses registros, 63.787 casos foram de violência física (47,89%), 27.516 de violência psicológica/moral (20,65%), 6.355 de violência financeira (4,77%), 33.207 de negligência/abandono (24,93%) e 2.320 de violência sexual (1,74%). O ano de 2022 apresentou o maior número de notificações, representando 24,57% do total (32.733 casos). Vale destacar que a literatura evidencia a prevalência da violência física contra idosos no Brasil <sup>3</sup> , e há estudos que corroboram o aumento quantitativo da violência contra essa população no período analisado <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os dados revelam um crescimento nos casos, com o ápice em 2022. No entanto, este estudo possui algumas limitações, como a subnotificação e a incapacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Portanto, é imperativo a implementação de políticas que promovam a saúde e previnam a violência, bem como a adoção de medidas mais rigorosas na detecção e intervenção em casos de violência contra idosos.			
<b>REFERENCIA S</b>	<p>1- World Health Organization. Global consultation on violence and health. Violence: a public health priority. Geneva: WHO; 1996 (document WHO/EHA/ SPI.POA.2). 2- Machado DR, Kimura M, Duarte YAO, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil [Violence perpetrated against the elderly and health-related quality of life: a populational study in the city of São Paulo, Brazil]. Cien Saude Colet. 2020 Mar;25(3):1119-1128. Portuguese. doi: 10.1590/1413-81232020253.19232018. Epub 2018 Jul 30. PMID: 32159679. 3- Santos AMR dos, Sá GG de M, Brito AAO de, Nolêto J dos S, Oliveira RKC de. Violência contra o idoso durante a pandemia COVID-19: revisão de escopo. Acta paul enferm [Internet]. 2021;34:eAPE000336. Available from: <a href="https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336">https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14950	Saúde Publica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4830741 - BRENDA SILVESTRE NUNES		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana Izabel Polydoro		VANESSA - ASSISTENTE SOCIAL UBS SÉRGIO CHADDAD
<b>TITULO</b>	Análise dos diferentes tipos de violências contra o idoso no Brasil entre os anos de 2018 e 2022.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS)<sup>1</sup> conceitua violência como o uso de força física ou poder, tanto na ameaça quanto na prática, resultando em sofrimento, dano psicológico ou morte. Nesse contexto, a violência contra idosos abrange aspectos financeiros, físicos, psicológicos/morais, negligência ou abandono, e se transformou em uma questão de saúde pública<sup>2</sup>. No Brasil, o Ministério da Saúde implementou iniciativas como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) para prevenir e monitorar tais ocorrências. Contudo, apesar dessas ações, a violência contra idosos continua a crescer, ressaltando a importância da análise epidemiológica deste fenômeno.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os diferentes tipos de violência contra idosos no Brasil entre 2018 e 2022 Propor explicações para as variações quantitativas observadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzida uma pesquisa transversal, descritiva e com abordagem quantitativa, utilizando dados do TABNET vinculado ao DATASUS. Foram examinadas as ocorrências de violência física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono e sexual entre os anos de 2018 e 2022, envolvendo indivíduos com 60 anos ou mais (idosos).			
<b>RESULTADOS</b>	Identificou-se um total de 133.185 notificações de violência contra idosos no período de 2018 a 2022. Dentre esses registros, 63.787 casos foram de violência física (47,89%), 27.516 de violência psicológica/moral (20,65%), 6.355 de violência financeira (4,77%), 33.207 de negligência/abandono (24,93%) e 2.320 de violência sexual (1,74%). O ano de 2022 apresentou o maior número de notificações, representando 24,57% do total (32.733 casos). Vale destacar que a literatura evidencia a prevalência da violência física contra idosos no Brasil <sup>3</sup> , e há estudos que corroboram o aumento quantitativo da violência contra essa população no período analisado <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOES</b>	Os dados revelam um crescimento nos casos, com o ápice em 2022. No entanto, este estudo possui algumas limitações, como a subnotificação e a incapacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Portanto, é imperativo a implementação de políticas que promovam a saúde e previnam a violência, bem como a adoção de medidas mais rigorosas na detecção e intervenção em casos de violência contra idosos.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1- World Health Organization. Global consultation on violence and health. Violence: a public health priority. Geneva: WHO; 1996 (document WHO/EHA/ SPI.POA.2). 2- Machado DR, Kimura M, Duarte YAO, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil [Violence perpetrated against the elderly and health-related quality of life: a populational study in the city of São Paulo, Brazil]. Cien Saude Colet. 2020 Mar;25(3):1119-1128. Portuguese. doi: 10.1590/1413-81232020253.19232018. Epub 2018 Jul 30. PMID: 32159679. 3- Santos AMR dos, Sá GG de M, Brito AAO de, Nolêto J dos S, Oliveira RKC de. Violência contra o idoso durante a pandemia COVID-19: revisão de escopo. Acta paul enferm [Internet]. 2021;34:eAPE000336. Available from: <a href="https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336">https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14950	Saúde Publica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4831292 - LAURA BEATRIZ NOGUEIRA DE BARROS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana Izabel Polydoro		VANESSA - ASSISTENTE SOCIAL UBS SÉRGIO CHADDAD
<b>TITULO</b>	Análise dos diferentes tipos de violências contra o idoso no Brasil entre os anos de 2018 e 2022.			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS)<sup>1</sup> conceitua violência como o uso de força física ou poder, tanto na ameaça quanto na prática, resultando em sofrimento, dano psicológico ou morte. Nesse contexto, a violência contra idosos abrange aspectos financeiros, físicos, psicológicos/morais, negligência ou abandono, e se transformou em uma questão de saúde pública<sup>2</sup>. No Brasil, o Ministério da Saúde implementou iniciativas como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) para prevenir e monitorar tais ocorrências. Contudo, apesar dessas ações, a violência contra idosos continua a crescer, ressaltando a importância da análise epidemiológica deste fenômeno.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os diferentes tipos de violência contra idosos no Brasil entre 2018 e 2022 Propor explicações para as variações quantitativas observadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzida uma pesquisa transversal, descritiva e com abordagem quantitativa, utilizando dados do TABNET vinculado ao DATASUS. Foram examinadas as ocorrências de violência física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono e sexual entre os anos de 2018 e 2022, envolvendo indivíduos com 60 anos ou mais (idosos).			
<b>RESULTADOS</b>	Identificou-se um total de 133.185 notificações de violência contra idosos no período de 2018 a 2022. Dentre esses registros, 63.787 casos foram de violência física (47,89%), 27.516 de violência psicológica/moral (20,65%), 6.355 de violência financeira (4,77%), 33.207 de negligência/abandono (24,93%) e 2.320 de violência sexual (1,74%). O ano de 2022 apresentou o maior número de notificações, representando 24,57% do total (32.733 casos). Vale destacar que a literatura evidencia a prevalência da violência física contra idosos no Brasil <sup>3</sup> , e há estudos que corroboram o aumento quantitativo da violência contra essa população no período analisado <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOES</b>	Os dados revelam um crescimento nos casos, com o ápice em 2022. No entanto, este estudo possui algumas limitações, como a subnotificação e a incapacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Portanto, é imperativo a implementação de políticas que promovam a saúde e previnam a violência, bem como a adoção de medidas mais rigorosas na detecção e intervenção em casos de violência contra idosos.			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1- World Health Organization. Global consultation on violence and health. Violence: a public health priority. Geneva: WHO; 1996 (document WHO/EHA/ SPI.POA.2). 2- Machado DR, Kimura M, Duarte YAO, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil [Violence perpetrated against the elderly and health-related quality of life: a populational study in the city of São Paulo, Brazil]. Cien Saude Colet. 2020 Mar;25(3):1119-1128. Portuguese. doi: 10.1590/1413-81232020253.19232018. Epub 2018 Jul 30. PMID: 32159679. 3- Santos AMR dos, Sá GG de M, Brito AAO de, Nolêto J dos S, Oliveira RKC de. Violência contra o idoso durante a pandemia COVID-19: revisão de escopo. Acta paul enferm [Internet]. 2021;34:eAPE000336. Available from: <a href="https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336">https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336</a></p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade	
2023	14950	Saúde Publica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares	
		Autor		Status	Apresentação
		4832604 - LAIZA PERES FERREIRA		2 - Aprovado	1 - Poster
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo	
		Juliana Izabel Polydoro		VANESSA - ASSISTENTE SOCIAL UBS SÉRGIO CHADDAD	
<b>TITULO</b>	Análise dos diferentes tipos de violências contra o idoso no Brasil entre os anos de 2018 e 2022.				
<b>INTRODUCAO</b>	<p>Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS)<sup>1</sup> conceitua violência como o uso de força física ou poder, tanto na ameaça quanto na prática, resultando em sofrimento, dano psicológico ou morte. Nesse contexto, a violência contra idosos abrange aspectos financeiros, físicos, psicológicos/morais, negligência ou abandono, e se transformou em uma questão de saúde pública<sup>2</sup>. No Brasil, o Ministério da Saúde implementou iniciativas como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) para prevenir e monitorar tais ocorrências. Contudo, apesar dessas ações, a violência contra idosos continua a crescer, ressaltando a importância da análise epidemiológica deste fenômeno.</p>				
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os diferentes tipos de violência contra idosos no Brasil entre 2018 e 2022. Propor explicações para as variações quantitativas observadas.				
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzida uma pesquisa transversal, descritiva e com abordagem quantitativa, utilizando dados do TABNET vinculado ao DATASUS. Foram examinadas as ocorrências de violência física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono e sexual entre os anos de 2018 e 2022, envolvendo indivíduos com 60 anos ou mais (idosos).				
<b>RESULTADOS</b>	Identificou-se um total de 133.185 notificações de violência contra idosos no período de 2018 a 2022. Dentre esses registros, 63.787 casos foram de violência física (47,89%), 27.516 de violência psicológica/moral (20,65%), 6.355 de violência financeira (4,77%), 33.207 de negligência/abandono (24,93%) e 2.320 de violência sexual (1,74%). O ano de 2022 apresentou o maior número de notificações, representando 24,57% do total (32.733 casos). Vale destacar que a literatura evidencia a prevalência da violência física contra idosos no Brasil <sup>3</sup> , e há estudos que corroboram o aumento quantitativo da violência contra essa população no período analisado <sup>3</sup> .				
<b>CONCLUSOES</b>	Os dados revelam um crescimento nos casos, com o ápice em 2022. No entanto, este estudo possui algumas limitações, como a subnotificação e a incapacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Portanto, é imperativo a implementação de políticas que promovam a saúde e previnam a violência, bem como a adoção de medidas mais rigorosas na detecção e intervenção em casos de violência contra idosos.				
<b>REFERENCIAS</b>	<p>1- World Health Organization. Global consultation on violence and health. Violence: a public health priority. Geneva: WHO; 1996 (document WHO/EHA/ SPI.POA.2).  2- Machado DR, Kimura M, Duarte YAO, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil [Violence perpetrated against the elderly and health-related quality of life: a populational study in the city of São Paulo, Brazil]. Cien Saude Colet. 2020 Mar;25(3):1119-1128. Portuguese. doi: 10.1590/1413-81232020253.19232018. Epub 2018 Jul 30. PMID: 32159679.  3- Santos AMR dos, Sá GG de M, Brito AAO de, Nolêto J dos S, Oliveira RKC de. Violência contra o idoso durante a pandemia COVID-19: revisão de escopo. Acta paul enferm [Internet]. 2021;34:eAPE000336. Available from: <a href="https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336">https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336</a></p>				

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14950	Saúde Publica	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4834887 - BIANCA TOMITA FAN	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Juliana Izabel Polydoro	VANESSA - ASSISTENTE SOCIAL UBS SÉRGIO CHADDAD	
<b>TITULO</b>	Análise dos diferentes tipos de violências contra o idoso no Brasil entre os anos de 2018 e 2022.			
<b>INTRODUCA O</b>	Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) <sup>1</sup> conceitua violência como o uso de força física ou poder, tanto na ameaça quanto na prática, resultando em sofrimento, dano psicológico ou morte. Nesse contexto, a violência contra idosos abrange aspectos financeiros, físicos, psicológicos/morais, negligência ou abandono, e se transformou em uma questão de saúde pública <sup>2</sup> . No Brasil, o Ministério da Saúde implementou iniciativas como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) para prevenir e monitorar tais ocorrências. Contudo, apesar dessas ações, a violência contra idosos continua a crescer, ressaltando a importância da análise epidemiológica deste fenômeno.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os diferentes tipos de violência contra idosos no Brasil entre 2018 e 2022. Propor explicações para as variações quantitativas observadas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzida uma pesquisa transversal, descritiva e com abordagem quantitativa, utilizando dados do TABNET vinculado ao DATASUS. Foram examinadas as ocorrências de violência física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono e sexual entre os anos de 2018 e 2022, envolvendo indivíduos com 60 anos ou mais (idosos).			
<b>RESULTADO S</b>	Identificou-se um total de 133.185 notificações de violência contra idosos no período de 2018 a 2022. Dentre esses registros, 63.787 casos foram de violência física (47,89%), 27.516 de violência psicológica/moral (20,65%), 6.355 de violência financeira (4,77%), 33.207 de negligência/abandono (24,93%) e 2.320 de violência sexual (1,74%). O ano de 2022 apresentou o maior número de notificações, representando 24,57% do total (32.733 casos). Vale destacar que a literatura evidencia a prevalência da violência física contra idosos no Brasil <sup>2</sup> , e há estudos que corroboram o aumento quantitativo da violência contra essa população no período analisado <sup>3</sup> .			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os dados revelam um crescimento nos casos, com o ápice em 2022. No entanto, este estudo possui algumas limitações, como a subnotificação e a incapacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Portanto, é imperativo a implementação de políticas que promovam a saúde e previnam a violência, bem como a adoção de medidas mais rigorosas na detecção e intervenção em casos de violência contra idosos.			
<b>REFERENCIA S</b>	1- World Health Organization. Global consultation on violence and health. Violence: a public health priority. Geneva: WHO; 1996 (document WHO/EHA/ SPI.POA.2). 2- Machado DR, Kimura M, Duarte YAO, Lebrão ML. Violência contra idosos e qualidade de vida relacionada à saúde: estudo populacional no município de São Paulo, Brasil [Violence perpetrated against the elderly and health-related quality of life: a populational study in the city of São Paulo, Brazil]. Cien Saude Colet. 2020 Mar;25(3):1119-1128. Portuguese. doi: 10.1590/1413-81232020253.19232018. Epub 2018 Jul 30. PMID: 32159679. 3- Santos AMR dos, Sá GG de M, Brito AAO de, Nolêto J dos S, Oliveira RKC de. Violência contra o idoso durante a pandemia COVID-19: revisão de escopo. Acta paul enferm [Internet]. 2021;34:eAPE000336. Available from: <a href="https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336">https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AR00336</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14951	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3445607 - NOELLA KHONDE KIAMBU		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Edialy Cancian Tetemann		
<b>TITULO</b>	Sistemas de Saúde comparados Brasil e República Democrática do Congo (RDC).			
<b>INTRODUCAO</b>	Segundo o relatório de IDH de 2015, o Brasil ocupa o 75º e a Republica Democrática do Congo (RDC) a 176ª posição1. A RDC é o país mais pobre do mundo com 60% da sua população vivendo com menos de 1,25 dólares por dia2. e ainda enfrentam grandes iniquidades para garantir uma atenção à saúde a toda sua população.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é comparar os sistemas de saúde (SS) do Brasil e da RDC.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão integrativa da literatura com os descritores: sistemas de saúde, Health system, Sistema Único de Saúde e Democratic Republic of Congo, foram selecionados documentos e artigos que abordavam o contexto histórico, financiamento e organização do SSna base de dados PubMed.			
<b>RESULTADOS</b>	Em relação ao contexto histórico da evolução das políticas públicas de saúde, se faz necessário pontuar que os dois países têm diferenças extremas em seu processo de (re)democratização. No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS), criado a partir da Constituição Federal de 1988, é resultado da reforma sanitária, que na VIII Conferência Nacional de Saúde clamavam pelo direito à saúde como um direito de cidadania e universal3. Na (RDC) o (SS) foi adaptado após a última Constituição em 2005 do país, que teve sua democratização antecedido por extensos e intensos períodos de conflitos e golpes que tiveram impacto no sistema de saúde da RDC2. Com relação à sua organização, o SS da RDC é constituído em três níveis: central, intermediário e periférico. O primeiro diz respeito a serviços gerais e fiscalização, o nível intermediário oferece apoio técnico e logístico para as zonas de saúde e a zona periférica constitui o nível operacional2. No Brasil o SUS é dividido por níveis de atenção, são eles: atenção primária, secundária e terciária, onde cada um deles se refere ao nível de complexidade do sistema4. Quanto ao financiamento no Brasil cada ente federativo tem sua parcela de contribuição através dos impostos gerados. Os municípios aplicam 12% dos impostos e os estados 15% para o setor saúde, já para a união o valor deve ser o do ano anterior mais a variação percentual do PIB. A RDC destinou em 2001 apenas 1% do orçamento do estado na saúde e ainda conta com ajudas externas para o combate de doenças endêmicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	O Brasil e a RDC possuem contextos históricos bem diferentes no que diz respeito à evolução das políticas de saúde, financiamento e organização. Além reafirmam o compromisso de saúde para todos participando da pactuação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da OMS, e se esforçam dentro de seus sistemas de saúde para atingir as metas propostas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- United Nations Development Programme. Relatório de Desenvolvimento Humano 2015. 2- OMS. Document de Stratégie de Renforcement du Systeme de Santé. 2006, Government of the Democratic Republic of Congo, Kinshasa. 3- Moraes JRM, Santos MLWD Brasil e Cuba: Sistemas De Saúde sob a Análise Comparada. Economia e Políticas Públicas, v. 3, n. 1/2015. 4- Mendes, EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.549 p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14951	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4065352 - LUANA CRISTINA GOMES DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Edialy Cancian Tetemann		
<b>TITULO</b>	Sistemas de Saúde comparados Brasil e República Democrática do Congo (RDC).			
<b>INTRODUCAO</b>	Segundo o relatório de IDH de 2015, o Brasil ocupa o 75º e a Republica Democrática do Congo (RDC) a 176ª posição1. A RDC é o país mais pobre do mundo com 60% da sua população vivendo com menos de 1,25 dólares por dia2. e ainda enfrentam grandes iniquidades para garantir uma atenção à saúde a toda sua população.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo é comparar os sistemas de saúde (SS) do Brasil e da RDC.			
<b>METODOLOGIA</b>	Revisão integrativa da literatura com os descritores: sistemas de saúde, Health system, Sistema Único de Saúde e Democratic Republic of Congo, foram selecionados documentos e artigos que abordavam o contexto histórico, financiamento e organização do SSna base de dados PubMed.			
<b>RESULTADOS</b>	Em relação ao contexto histórico da evolução das políticas públicas de saúde, se faz necessário pontuar que os dois países têm diferenças extremas em seu processo de (re)democratização. No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS), criado a partir da Constituição Federal de 1988, é resultado da reforma sanitária, que na VIII Conferência Nacional de Saúde clamavam pelo direito à saúde como um direito de cidadania e universal3. Na (RDC) o (SS) foi adaptado após a última Constituição em 2005 do país, que teve sua democratização antecedido por extensos e intensos períodos de conflitos e golpes que tiveram impacto no sistema de saúde da RDC2. Com relação à sua organização, o SS da RDC é constituído em três níveis: central, intermediário e periférico. O primeiro diz respeito a serviços gerais e fiscalização, o nível intermediário oferece apoio técnico e logístico para as zonas de saúde e a zona periférica constitui o nível operacional2. No Brasil o SUS é dividido por níveis de atenção, são eles: atenção primária, secundária e terciária, onde cada um deles se refere ao nível de complexidade do sistema4. Quanto ao financiamento no Brasil cada ente federativo tem sua parcela de contribuição através dos impostos gerados. Os municípios aplicam 12% dos impostos e os estados 15% para o setor saúde, já para a união o valor deve ser o do ano anterior mais a variação percentual do PIB. A RDC destinou em 2001 apenas 1% do orçamento do estado na saúde e ainda conta com ajudas externas para o combate de doenças endêmicas.			
<b>CONCLUSOES</b>	O Brasil e a RDC possuem contextos históricos bem diferentes no que diz respeito à evolução das políticas de saúde, financiamento e organização. Além reafirmam o compromisso de saúde para todos participando da pactuação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da OMS, e se esforçam dentro de seus sistemas de saúde para atingir as metas propostas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1- United Nations Development Programme. Relatório de Desenvolvimento Humano 2015. 2- OMS. Document de Stratégie de Renforcement du Systeme de Santé. 2006, Government of the Democratic Republic of Congo, Kinshasa. 3- Moraes JRM, Santos MLWD Brasil e Cuba: Sistemas De Saúde sob a Análise Comparada. Economia e Políticas Públicas, v. 3, n. 1/2015. 4- Mendes, EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.549 p.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14953	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4335864 - JOSUÉ DIAS BARRAGAN	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rubens dos Santos Branquinho		
<b>TITULO</b>	ESPORTE e FORMAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
<b>INTRODUCAO</b>	O esporte ao longo do seu desenvolvimento histórico guiou-se por premissas relacionadas à formação do caráter individual orientando-se por, entre outros aspectos, pelo desenvolvimento do denominado "Jogo Limpo", "Fair Play", "Espírito Olímpico". A dimensão do esporte classificada como educacional pressupõe que desenvolvimento do mesmo tem com função principal a formação humana, aqui entendida como a oportunização de elementos voltados a socialização positiva aos indivíduos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo desenvolveu-se em função do objetivo de descrever e analisar as características de entendimento do esporte e de seu processo de ensino enquanto elementos potencializadores de referências positivas a formação humana de crianças e adolescentes.			
<b>METODOLOGIA</b>	O método de pesquisa escolhido para o desenvolvimento deste estudo se trata da revisão de literatura do tipo integrativa sendo selecionados como elementos de análise para este estudo 12 artigos científicos recrutados em base de dados Base como Pubmed/ Medline, Scielo e Bireme. A seleção dos artigos teve como critério a publicação em língua portuguesa, se tratar de artigos publicados na última década e não se constituírem em revisões sistemáticas, partindo-se dos descritores esporte educacional, formação humana e inclusão social.			
<b>RESULTADOS</b>	A análise dos estudos aqui selecionados relacionados ao esporte em sua vertente educacional denota a necessidade de adequá-lo à algumas premissas sendo estas a necessidade de minimizar elementos vinculados a hipercompetitividade, característica comum ao esporte desenvolvido sob a condição de esporte performance. Outro aspecto importante apontado pelos autores com vistas à caracterização do esporte educacional se trata da necessidade de em sua metodologia associá-lo a uma prática promotora de valores como cooperação, solidariedade e respeito às individualidades. Destaca-se também entre os autores consultados a necessidade de evitar-se a seleção e a exclusão daqueles menos aptos a esta prática.			
<b>CONCLUSOES</b>	Tendo em vista a referencias consultadas observa-se a necessidade de adequação de objetivos e metodologias na condução do esporte desenvolvido sob a vertente educacional e de inclusão social sobretudo, quando a referência principal observada pela sociedade em relação ao esporte, esporte performance, caracteriza-se pela hipercompetitividade e exclusão dos considerados menos aptos.			
<b>REFERENCIAS</b>	AZEVEDO, M. A. O.; GOMES FILHO, A. Competitividade e inclusão social por meio do esporte. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, v. 33, n. 3, p. 589-603, jul./set. 2011 FREITAS, G. S. et al. O esporte para o desenvolvimento e a paz. Movimento, v. 28, e28045, 2022. VIANNA, J. A.; LOVISOLO, H. R. A inclusão social através do esporte: a percepção dos educadores Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v.25, n.2, p.285-96, abr./jun. 2011			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14954	Educação Física	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4339193 - ERIC GUILHERME PEREIRA CAMPOS FERREIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rubens dos Santos Branquinho		
<b>TITULO</b>	ESPECIFICIDADES DA NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A natação em águas abertas pela sua características peculiares sempre assumiu um papel de destaque frente as competições aquáticas sobretudo em função das características do meio em que desenvolve. A natural comparação entre a natação de águas abertas e a desenvolvida em piscinas sobre condições uniformes estabelecidas pela Federação Internacional de Natação (FINA) de temperatura, profundidades e delimitação de raias, transforma a competição de natação aí desenvolvida em um esporte com especificidades impares.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este estudo desenvolveu-se sob a premissa de caracterizar as especificidades da natação em águas abertas sendo estas relacionadas a técnica dos nados, às questões táticas assumidas durante as provas e os aspectos relacionados ao treinamento para esta modalidade de natação.			
<b>METODOLOGIA</b>	O método de pesquisa escolhido para o desenvolvimento deste estudo se trata da revisão de literatura do tipo integrativa sendo selecionados como elementos de análise para este estudo 12 artigos científicos recrutados em base de dados Base como Pubmed/ Medline, Scielo e Bireme. A seleção dos artigos teve como critério a publicação em língua portuguesa, se tratar de artigos publicados na última década e não se constituírem em revisões sistemáticas, partindo-se dos descritores: esporte educacional, formação humana, inclusão social.			
<b>RESULTADOS</b>	Os resultados destacam com relação a questão técnica que a forma predominante de nado desenvolvida é o nado crawl, com adequações neste no que diz respeito a orientação do nadador às referências escolhidas. Desta forma preconiza-se um posicionamento do corpo mais inclinado de modo a permitir uma melhor orientação em relação ao percurso a ser desenvolvido. Com relação aos aspectos táticos observou-se entre os autores consultados o aspecto de procurar-se minimizar o arrasto proporcionado pela água com um posicionamento mais horizontal do corpo. Com relação aos aspectos fisiológicos destaca-se entre os autores consultados a ênfase que deve ser dada ao ambiente de águas abertas onde o corpo pode experimentar: hiperventilação, suspensão da respiração, aumento na circulação de hormônios ligados ao estresse, aumento da pressão arterial (PA).			
<b>CONCLUSÕES</b>	A partir dos autores consultados denota-se a necessidade da atenção à especificidades natação em águas abertas no que diz respeito a seus aspectos técnicos, táticos e de preparação física uma vez que mesmo se tratando da mesma habilidades quando comparada a natação em piscinas o desenvolvimento desta em ambientes aberto determina condições diferenciadas em relação aos diversos aspectos relacionados ao treinamento nesta modalidade de natação.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	CAPUTO, F.; LUCAS, R. D.; GRECO, C. C.; DENADAI, B. S. Características da braçada em diferentes distâncias no estilo crawl e correlações com a performance. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Brasília, v.8, n.3, p.7-13, 2000. DI MASI, F. Mortes na natação de águas abertas, por quê? Revista de Educação Física / J Physical Education, 88, 2, p. 818-822, 2019. APOLINÁRIO, M.R.; OLIVEIRA, T.A.C.; MARQUES, M.T.; CORRÊA, U.C.; FREUDENHEIM, A.M. Efeito da modificação dos ritmos de pernada na braçada do nado crawl. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, São Paulo, v.10, n.1, p.11-8, 2011.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14960	Enfermagem Obstétrica	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5209951 - CAROLINE LOPES BURCH DA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jaqueline Sousa Leite		
<b>TITULO</b>	A preparação dos profissionais de enfermagem para o enfrentamento de diagnósticos de perdas gestacionais inevitáveis: revisão narrativa			
<b>INTRODUCAO</b>	A representação da maternidade na sociedade é vislumbrada como sinônimo de sucesso. Porém, existem situações de intercorrências durante a gravidez que vão contra essa imagem social da maternidade - de nascimento e vida. A perda gestacional contraria a ordem natural da vida e da morte, tanto para os profissionais de saúde quanto para os familiares, para os pais e principalmente para a mãe (SILVA; 2022). A perda gestacional, ocorrida espontaneamente durante qualquer etapa da gestação (ante parto) e do trabalho de parto (intraparto), representa um grave problema de saúde pública (NONATO et al, 2023). Nos países em desenvolvimento, esse cenário é agravado pela dificuldade de acesso a serviços de saúde, baixa qualidade do cuidado e subnotificações (NONATO et al, 2023). Diante disso, neste trabalho buscamos discutir sobre o preparo dos profissionais de enfermagem diante de diagnósticos de perda gestacional inevitável.			
<b>OBJETIVOS</b>	Identificar as dificuldades dos profissionais de enfermagem na assistência a gestações diagnosticadas como perda gestacional inevitável.			
<b>METODOLOGIA</b>	A busca inicial das revisões foi realizada em duas fases: pesquisa em bases de dados e busca manual a partir das referências encontradas nos itens selecionados. Utilizaram-se as bases de dados US National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Definidos os operadores booleanos, construíram-se três chaves de busca: Em inglês (fetal loss OR fetal death) AND (mourning) AND (intrauterine), (maternal assistance OR maternal care). Em português: (perda fetal OR óbito fetal) AND (luto) AND (intrauterino); (assistência materna OR cuidados maternos) AND (enfermagem). Os critérios de exclusão foram por data, apenas materiais de 2020 a 2023 foram filtrados, além da filtragem por coerência de título e resumo.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram encontrados um total de 214 resultados na base de dados Google Scholar, após eliminação por título e resumo, resultarem em apenas 54 resultados. Na base de dados BVS - LILACS, chegamos ao resultado de 9 artigos, desses relacionados com o tema de fato, apenas 2 artigos. Na base de dados PubMed obtivemos 154 resultados e por fim 5 resultados após restrição de data. Foi observado que diante dessa situação, as/os profissionais expressam sensação de impotência, evidenciam sofrimento da equipe de saúde e indicam as convergências entre os aspectos profissional e pessoal. O sentimento de medo e o mecanismo de negação colocam à prova as próprias condutas e evidenciam as dificuldades da/do profissional quando está diante da mulher que passa por essa situação. Os relatos indicam que as resistências em lidar com as situações de perda gestacional também se relacionam com a falta de contato com a temática nos processos de formação em saúde, seja na dimensão acadêmica, seja na dimensão profissional.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apesar das limitações, os resultados encontrados trazem importantes contribuições para para saúde. Evidencia-se necessidade de construção de estratégias fundamentadas no acolhimento e na qualificação do cuidado. Evidencia-se a necessidade de novas pesquisas que analisem as percepções e experiências de mulheres e famílias que atravessam o luto decorrente da perda fetal intrauterina nos diferentes níveis de atenção à saúde.			
<b>REFERENCIAS</b>	SILVA, Shirley Lopes. A vivência do luto frente à perda gestacional na maternidade: uma revisão integrativa. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem)-Instituto de Enfermagem, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2022. Disponível em: (#60)https://pantheon.ufjf.br/handle/11422/20061(#62) Acessado em 20/10/2023 FILHA, Francinalma Soares Sousa Carvalho et al. Óbitos fetais e neonatais: análise do perfil sociodemográfico e clínico obstétrico de genitoras. Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, v. 9, n. 28, p. 92-102, 2019. GESTEIRA, S. M. A., Barbosa, V. L., (#38) Endo, P. C. (2006). O luto no processo de aborto provocado. Acta Paulista de Enfermagem. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-21002006000400016(#38)lng=pt(#38)tlng=pt - Acesso em 18/10/2023 MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 72, DE 11 DE JANEIRO DE 2010. Estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: (#60)https://bvsm.sau.gov.br/bvsm/saudelegis/gm/2010/prt0072_11_01_2010.html(#62) Acesso em 18/10/2023 TEODÓZIO, Andressa Milczarck et al. Particularidades do luto materno decorrente de perda gestacional: Estudo qualitativo. Revista Subjetividades, v. 20, n. 2, p. 1-14, 2020. Disponível em: (#60)https://pantheon.ufjf.br/handle/11422/20061(#62) Acesso em 18/10/2023 VESCOVI, Gabriela; LEVANDOWSKI, Daniela Centenaro. Percepção Sobre o Cuidado à Perda Gestacional: Estudo Qualitativo com Casais Brasileiros. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 43, p. e252071, 2023. Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/pcp/aj7KK37YQJMJHJqCdkYfmw/#62) Acessado em 20/10/2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14961	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4623002 - GUILHERME PIRES ALVES IQUEUTI		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Orlando Contrucci Filho		
<b>TITULO</b>	Infecções pós cirúrgicas e aspectos assistências: revisão narrativa			
<b>INTRODUCAO</b>	<p>O pós-operatório é a fase da cirurgia, no qual o enfermo se depara com os desafios associados a sua recuperação, onde um dos principais riscos enfrentados pelos pacientes é a infecção. Geralmente as infecções no pós-operatório são comuns em procedimentos que envolvem incisões na pele e nos tecidos. A prevenção dessas infecções deve ser uma prioridade para os profissionais da saúde e devem ser adotadas medidas para evitá-las como uso de antibióticos profiláticos, higienização adequada do local, uso de técnicas assépticas, remoção de drenos e cateteres no tempo correto e monitoramento cuidadoso. No entanto, deve-se levar em conta, fatores voltados ao tipo de cirurgia, sua duração, potencial de contaminação, o estado de saúde do paciente e as decisões tomadas pela equipe médica, além de saber como abordar cada quadro e estabelecer prevenção contra infecções no pós-operatório.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender possíveis potencializadores de infecções pós-cirúrgicas nas cirurgias de modo geral.			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Trata-se de uma revisão narrativa, com vasta busca de artigos, na base de dados eletrônica PubMed, limitando a busca entre artigos publicados entre 2020 e 2023. Foram incluídos: revisões sistemáticas com e sem metanálise, revisões narrativas de literatura, estudo randomizado, estudos de coorte e estudos de caso-controle. Por fim, os dados foram analisados de forma descritiva.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>A partir da leitura dos artigos selecionados, observa-se uma baixa adesão às medidas preventivas por parte dos profissionais médicos cirurgiões, além da dificuldade na aceitação e no cumprimento das diretrizes e protocolos hospitalares de controle de infecção, uso frequente de antibióticos no tratamento de infecções pré-operatórias, desnutrição, o cuidado com a microbiota intestinal e cirurgias gerais de emergência, fazendo com que o pós-operatório seja uma fase cheia de desafios, tanto para o paciente quanto para a equipe de assistência.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Pelo exposto, observa-se que o período de pós-operatório é uma fase complexa da cirurgia e que está intimamente ligada aos cuidados humanos e adversidades ocorridas nos momentos pré e perioperatórios.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>- FoschiD, YakushkinaA, CammarataF, LampertiG, ColomboF, RimoldiS, et al. Surgical site infections caused by multi-drug resistant organisms: a case-control study in general surgery. Updates Surg. 2022 Oct. PubMed. 2023 Jul 19. - Badia JM, Amillo Zaragüeta M, Rubio-Pérez I, Espin-Basany E, González Sánchez C, Balibrea JM. What have we learned from the surveys of the AEC, AIEP and the Observatory of Infection in Surgery? Compliance with postoperative infection prevention measures and comparison with the AEC recommendations. Cir Esp (Engl Ed). 2022 Jul. PubMed. 2023 Jul 19. - Payá-Llorente C, Martínez-López E, Sebastián-Tomás JC, Santarrufina-Martínez S, de'Angelis N, Martínez-Pérez A. The impact of age and comorbidity on the postoperative outcomes after emergency surgical management of complicated intra-abdominal infections. Sci Rep. 2020 Jan 31. PubMed. 2023 Jul 19. - Kandasami P, Yita T, Chi XS, Chern WK, Muhammad Naim R, Afifah Afiah MD, et al. Emergency general surgery in a public hospital in Malaysia. Med J Malaysia. 2020 Sep. PubMed. 2023 Jul 19.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14962	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	1 - Mostra de Pós-graduação Especialização	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4905652 - MARIA ALINE MELO BRAGA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		MONIQUE SOARES LUZ COSTA
<b>TITULO</b>	Implantação do protocolo de posição prona na unidade de terapia intensiva pediátrica.			
<b>INTRODUCAO</b>	A síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico (pARDS) é caracterizada por lesão inflamatória pulmonar que cursa com hipoxemia grave e alteração da mecânica pulmonar. Hoje, existem recomendações de estratégias coadjuvantes no tratamento da pARDS, como por exemplo a posição prona, que consiste em manter o paciente em decúbito ventral e o principal benefício é a melhora da oxigenação. Quanto ao tempo de aplicação, não há um consenso, ficando a critério de cada instituição a criação do protocolo a ser utilizado. A realização da manobra de prona possui alguns riscos para o paciente, sendo de extrema importância uma equipe treinada e capacitada para realizá-la.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar conhecimento pré e pós treinamento da equipe multiprofissional que atua na Unidade de Terapia Intensiva Pediatrica (UTIP) sobre utilização da posição prona em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma pesquisa prospectiva, aplicada, quantitativa, analítica e longitudinal na UTIP do HGG, com os profissionais de saúde atuantes dos períodos manhã, tarde e noite, totalizando 58 participantes, sendo 11 médicos, 13 fisioterapeutas, 14 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem, onde foi aplicado um questionário com 12 afirmativas pré e pós treinamento sobre a posição prona e cuidados necessários, além da elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP). Posteriormente, os dados foram analisados usando teste de quiquadrado (x2), comparando respostas pré e pós treinamento.			
<b>RESULTADOS</b>	Foi aplicado o teste de quiquadrado (x2) em cada questão entre as equipes para o questionário pré e pós treinamento. As questões que apontaram diferenças significantes no pré e pós treinamento envolvem aspectos relacionados ao tempo indicado ao uso da posição em relação à resolução ou desfecho do quadro e o numero de pessoas necessárias para colocação do paciente na posição indicada. De modo geral pode-se afirmar que a técnica da posição prona é conhecida pela equipe assistencial mas que alguns pontos ainda geram duvida, justificando a necessidade de um protocolo alinhado para sua aplicação.			
<b>CONCLUSOES</b>	Apesar do conhecimento prévio e experiencia da equipe da UTIP sobre a posição prona, é possível observar que não há total clareza sobre o assunto, sendo necessária uma educação continuada para elucidação e atualização sobre procedimentos sejam eles rotineiros ou não.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Gattinoni L, et al. Prone Positioning in Acute Respiratory Distress Syndrome. Semin Respir Crit Care Med. 2019 Feb;40(1):94-100. doi: 10.1055/s-0039-1685180. Epub 2019 May 6. PMID: 31060091. 2. Rotta AT, Kunrath CLB, Wiryawan B. O manejo da síndrome do desconforto respiratório agudo. J Pediatría (Rio J) 2003; Vol. 79(Supl.2):S149-S160. 3. Randolph AG. Management of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome in children. Crit Care Med. 2009 Aug;37(8):2448-54. Doi: 10.1097/CCM.0b013e3181aee5dd. PMID: 19531940. 4. Curley MA, et al. Effect of prone positioning on clinical outcomes in children with acute lung injury: a randomized controlled trial. JAMA. 2005 Jul 13;294(2):229-37. doi: 10.1001/jama.294.2.229. PMID: 16014597; PMCID: PMC1237036.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14963	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		4830563 - MARIANNA CARVALHO DA SILVEIRA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Cobertura da Vacina Papilomavírus humano (HPV) no município de São Paulo entre os anos de 2014 e 2023.			
<b>INTRODUCAO</b>	O papiloma vírus humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível geralmente assintomática, que acomete ambos os sexos e esta relacionado à contato sexual oral e genital. Seu principal indicador é presença de verrugas mas, alguns tipos de HPV são cancerígenos. A vacina contra o HPV é utilizada no sistema público de saúde com foco principalmente em indivíduos que não iniciaram a vida sexual. A imunização começou em 2014, apenas para meninas e, a partir de 2017, passou a aplicada também em meninos, nas faixa etárias de nove a 14 anos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a cobertura vacinal por HPV em meninas e meninos, no município de São Paulo, entre os anos de 2014 e 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, utilizando dados secundários disponíveis no Programa Nacional de Imunizações, por meio do aplicativo Tabnet/DATASUS, referentes ao município de São Paulo. A coleta dos dados abrangeu dados dos anos de 2014 a junho de 2023. As variáveis observadas forma frequência de aplicação, sexo e idade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados mostram que, no primeiro ano da campanha de vacinação (2014), a adesão foi baixa, provavelmente em função da falta de informação e medo sobre a vacina, principalmente por ela ocorrer a parti dos 9 anos e remeter a doença associada a vida sexual ativa. A partir de 2015 a adesão gradualmente aumento. Em 2017 foi ampliada aos meninos e, inicialmente teve uma boa aderência, superior as doses aplicada nas meninas. Isso pode ter ocorrido pela comprovação da eficácia da vacina demonstrada em meninas que tomaram o imunizante em anos anteriores. Após a criação da segunda campanha em 2017 as aplicações em meninas aumentaram, demonstrando o êxito da campanha para ambos os gêneros. Por fim, em relação à pandemia, em 2020 o numero de doses aplicadas diminuiu significativamente, tal como ocorreu com todas as vacinas, mas com aumento gradativo a partir de 2021.			
<b>CONCLUSOES</b>	Observa-se que a cobertura vacinal contra o HPV, iniciada em 2014 para as meninas e em 2017 para meninos dentro do Programa Nacional de Imunização, passou por um período inicial de conscientização e disseminação dos benefícios e segurança e, atualmente, tem uma abrangência razoável em ambos os sexo. Há necessidade de aumentar essa cobertura para atingir as metas propostas pela OMS e vencer preconceitos relacionados a idade de aplicação e relação com vida sexual ativa.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 120 p. 2. Organização Pan-Americana da Saúde. Metodologia para o cálculo de cobertura da vacina contra o HPV na Região das Américas. Washington, DC: OPAS; 2019. 18 p. 3. Siu JY, Lee A, Chan PKS. Schoolteachers' experiences of implementing school-based vaccination programs against human papillomavirus in a Chinese community: a qualitative study. BMC Public Health 2019; 19(1): 1514. <a href="https://doi.org/10.1186/s12889-019-7878-7">https://doi.org/10.1186/s12889-019-7878-7</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14963	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4835590 - ALICE MACEDO COLUCCI	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Cobertura da Vacina Papilomavírus humano (HPV) no município de São Paulo entre os anos de 2014 e 2023.			
<b>INTRODUCAO</b>	O papiloma vírus humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível geralmente assintomática, que acomete ambos os sexos e esta relacionado à contato sexual oral e genital. Seu principal indicador é presença de verrugas mas, alguns tipos de HPV são cancerígenos. A vacina contra o HPV é utilizada no sistema público de saúde com foco principalmente em indivíduos que não iniciaram a vida sexual. A imunização começou em 2014, apenas para meninas e, a partir de 2017, passou a aplicada também em meninos, nas faixa etárias de nove a 14 anos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a cobertura vacinal por HPV em meninas e meninos, no município de São Paulo, entre os anos de 2014 e 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, utilizando dados secundários disponíveis no Programa Nacional de Imunizações, por meio do aplicativo Tabnet/DATASUS, referentes ao município de São Paulo. A coleta dos dados abrangeu dados dos anos de 2014 a junho de 2023. As variáveis observadas forma frequência de aplicação, sexo e idade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados mostram que, no primeiro ano da campanha de vacinação (2014), a adesão foi baixa, provavelmente em função da falta de informação e medo sobre a vacina, principalmente por ela ocorrer a parti dos 9 anos e remeter a doença associada a vida sexual ativa. A partir de 2015 a adesão gradualmente aumento. Em 2017 foi ampliada aos meninos e, inicialmente teve uma boa aderência, superior as doses aplicada nas meninas. Isso pode ter ocorrido pela comprovação da eficácia da vacina demonstrada em meninas que tomaram o imunizante em anos anteriores. Após a criação da segunda campanha em 2017 as aplicações em meninas aumentaram, demonstrando o êxito da campanha para ambos os gêneros. Por fim, em relação à pandemia, em 2020 o numero de doses aplicadas diminuiu significativamente, tal como ocorreu com todas as vacinas, mas com aumento gradativo a partir de 2021.			
<b>CONCLUSOES</b>	Observa-se que a cobertura vacinal contra o HPV, iniciada em 2014 para as meninas e em 2017 para meninos dentro do Programa Nacional de Imunização, passou por um período inicial de conscientização e disseminação dos benefícios e segurança e, atualmente, tem uma abrangência razoável em ambos os sexo. Há necessidade de aumentar essa cobertura para atingir as metas propostas pela OMS e vencer preconceitos relacionados a idade de aplicação e relação com vida sexual ativa.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 120 p. 2. Organização Pan-Americana da Saúde. Metodologia para o cálculo de cobertura da vacina contra o HPV na Região das Américas. Washington, DC: OPAS; 2019. 18 p 3. Siu JY, Lee A, Chan PKS. Schoolteachers' experiences of implementing school-based vaccination programs against human papillomavirus in a Chinese community: a qualitative study. BMC Public Health 2019; 19(1): 1514. <a href="https://doi.org/10.1186/s12889-019-7878-7">https://doi.org/10.1186/s12889-019-7878-7</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14963	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4835701 - RAQUEL DOS SANTOS LIMA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Debora Driemeyer Wilbert		
<b>TITULO</b>	Cobertura da Vacina Papilomavírus humano (HPV) no município de São Paulo entre os anos de 2014 e 2023.			
<b>INTRODUCAO</b>	O papiloma vírus humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível geralmente assintomática, que acomete ambos os sexos e esta relacionado à contato sexual oral e genital. Seu principal indicador é presença de verrugas mas, alguns tipos de HPV são cancerígenos. A vacina contra o HPV é utilizada no sistema público de saúde com foco principalmente em indivíduos que não iniciaram a vida sexual. A imunização começou em 2014, apenas para meninas e, a partir de 2017, passou a aplicada também em meninos, nas faixa etárias de nove a 14 anos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a cobertura vacinal por HPV em meninas e meninos, no município de São Paulo, entre os anos de 2014 e 2023.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, utilizando dados secundários disponíveis no Programa Nacional de Imunizações, por meio do aplicativo Tabnet/DATASUS, referentes ao município de São Paulo. A coleta dos dados abrangeu dados dos anos de 2014 a junho de 2023. As variáveis observadas forma frequência de aplicação, sexo e idade.			
<b>RESULTADOS</b>	Os dados mostram que, no primeiro ano da campanha de vacinação (2014), a adesão foi baixa, provavelmente em função da falta de informação e medo sobre a vacina, principalmente por ela ocorrer a parti dos 9 anos e remeter a doença associada a vida sexual ativa. A partir de 2015 a adesão gradualmente aumento. Em 2017 foi ampliada aos meninos e, inicialmente teve uma boa aderência, superior as doses aplicada nas meninas. Isso pode ter ocorrido pela comprovação da eficácia da vacina demonstrada em meninas que tomaram o imunizante em anos anteriores. Após a criação da segunda campanha em 2017 as aplicações em meninas aumentaram, demonstrando o êxito da campanha para ambos os gêneros. Por fim, em relação à pandemia, em 2020 o numero de doses aplicadas diminuiu significativamente, tal como ocorreu com todas as vacinas, mas com aumento gradativo a partir de 2021.			
<b>CONCLUSOES</b>	Observa-se que a cobertura vacinal contra o HPV, iniciada em 2014 para as meninas e em 2017 para meninos dentro do Programa Nacional de Imunização, passou por um período inicial de conscientização e disseminação dos benefícios e segurança e, atualmente, tem uma abrangência razoável em ambos os sexo. Há necessidade de aumentar essa cobertura para atingir as metas propostas pela OMS e vencer preconceitos relacionados a idade de aplicação e relação com vida sexual ativa.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 120 p. 2. Organização Pan-Americana da Saúde. Metodologia para o cálculo de cobertura da vacina contra o HPV na Região das Américas. Washington, DC: OPAS; 2019. 18 p 3. Siu JY, Lee A, Chan PKS. Schoolteachers' experiences of implementing school-based vaccination programs against human papillomavirus in a Chinese community: a qualitative study. BMC Public Health 2019; 19(1): 1514. <a href="https://doi.org/10.1186/s12889-019-7878-7">https://doi.org/10.1186/s12889-019-7878-7</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14964	Clinica Veterinária	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135628 - EDUARDO MARTINS BORGES SILVA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Edilson Isídio da Silva Junior		
<b>TITULO</b>	Casuística das principais Dermatopatias Fúngicas atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro – Levantamento de Casos			
<b>INTRODUCAO</b>	Sabe-se que os agente fúngicos são importantes agentes causadores de doenças infectocontagiosas em ambos cães e gatos domésticos. (Gambale et al, 1987). Dentre as micoses superficiais as dermatofitoses e malassezioses Apresentam posto de grande importância na clínica de pequenos animais, uma vez que produzem sinais clínicos facilmente identificáveis aos olhos de tutores e podem ameaçar a saúde destes. Dentre as micoses profundas, citemos a esporotricose e criptococose, tendo em vista o caráter agressivo dessas zoonoses sobretudo em pacientes imunocomprometidos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Realizar o levantamento de dados dos registros de atendimento de cães e gatos domésticos do serviço veterinário do HOVET UNISA (hospitalescola veterinário) que apresentaram doenças fúngicas entre os anos de 2017 e 2022			
<b>METODOLOGIA</b>	Neste estudo foram recolhidos e compilados dados dos registros de atendimento de cães e gatos domésticos do serviço veterinário do HOVET UNISA (hospitalescola veterinário) que apresentaram doenças fúngicas entre os anos de 2017 e 2022. Os dados compilados incluem idade, raça, sexo, sinais clínicos, lesões e alterações identificadas, diagnóstico, agente etiológico, doenças secundárias e tratamento utilizado. Foram selecionados os casos cujo diagnóstico fora confirmado por pelo menos um método diagnóstico.			
<b>RESULTADOS</b>	Dentre felinos e caninos domésticos atendidos no HOVET-UNISA nos anos de 2017 até 2022 somam-se 443 casos atendidos de natureza fúngica. Otite fúngica é a doença predominante, seguida de malasseziose cutânea, dermatofitose, esporotricose, não há verificação de nenhum caso de criptococose nos registros. Quando comparados, nota-se que houve uma quantia consideravelmente superior de casos de doenças fúngicas na população de caninos domésticos, com exceção da esporotricose, que predomina em felinos. Ao comparar com um estudo publicado por Larsson e colaboradores verifica-se que realmente a Malassezia pachydermatis representa a espécie mais frequente com (43,5%) e a dermatofitose aparece em segundo lugar nas doenças observadas.			
<b>CONCLUSOES</b>	Há poucos estudos publicados avaliando a ocorrência de doenças fungicas, esses estudos são extremamente importantes para se avaliar o aumento de doenças de caráter zoonótico e aumento de infecções por fungos ambientais. O estudo demonsntrou que dentre os principais agentes encontrados os dermatófitos eesporotricose aparecem de maneira relevante na casuística.			
<b>REFERENCIAS</b>	Moriello Ka, Coyner K, Paterson S, Mignon B. Diagnosis And Treatment Of Dermatophytosis In Dogs And Cats.: Clinical Consensus Guidelines Of The World Association For Veterinary Dermatology. Vet Dermatol. 2017 Jun;28(3):266-E68. Doi: 10.1111/Vde.12440. Pmid: 28516493. Gambale, W., Correa, B., Paula, C. R., Purchio, A., (#38) Larsson, C. E. (1987). Ocorrência De Fungos Em Lesões Superficiais De Cães Na Cidade De São Paulo, Brasil. Revista Da Faculdade De Medicina Veterinária E Zootecnia Da Universidade De São Paulo, 24(2), 187-192. Disponível Em (#60)Https://Doi.Org/10.11606/Issn.2318-3659.V24i2p187-192.(#62). Frymus, T., Gruffydd-Jones, T., Pennisi, M. G., Addie, D., Belák, S., Boucraut-Baralon, C., ... Horzinek, M. C. (2013). Dermatophytosis In Cats. Journal Of Feline Medicine And Surgery, 15(7), 598–604. Doi:10.1177/1098612x13489222 PENNISI, M. G. et al. Cryptococcosis in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 15, n. 7, p. 611–618, 27 jun. 2013			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14965	Ciências da Saúde	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4517491 - SHIRLEY SANTOS FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marco Antonio Amadeu		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO VOLEIBOL NA SOCIALIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>O Voleibol – também conhecido como vôlei – tem caracterizado um lugar de valor no fluxograma de Educação Física dos estudantes (BOJIKIAN, 1999). Segundo Bojikian (1999), além das escolas, dos clubes e condomínios realizam um grande trabalho de transmissão do Voleibol entre as crianças. O autor acrescenta que a melhoria do nível técnico e físico dos jogadores nas categorias principais, assim como a aderência de um maior número de futuros atletas depende absolutamente do ensino massificado, planejado e qualificado deste jogo para as crianças. O vôlei como conteúdo se presta como um novo tipo de movimento que possa: preencher o tempo livre das crianças, enriquecer o acervo de sua memória motora, promover discussões sobre a variedade de movimentos possíveis para o corpo, ser utilizado para recreação, possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos teóricos sobre os seus aspectos técnicos e táticos, relacionados às ações de jogos infantis. (CAMPOS, 2006).</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>Definir os aspectos relevantes nas aulas de voleibol no contexto escolar nos anos iniciais do ensino fundamental; Pesquisar sobre o processo do voleibol nas atividades físicas no contexto escolar; Proporcionar uma reflexão sobre a prática do no cenário escolar analisando a dualidade existente na escola em relação a esta modalidade seja através das ações desenvolvidas em uma aula de Educação Física seja durante a aplicação deste desporto nas turmas de treinamento da escola.</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>A metodologia utilizada neste trabalho foi através de revisão bibliográfica, realizada entre abril e junho de 2017, realizada uma consulta em livros e artigos científicos encontrados em sites como: Scielo, Lilacs, Pub Med e Google Acadêmico. A busca de dados foi realizada a partir da utilização das terminologias cadastradas, o que permite o uso da terminologia comum em português. Sobre a pesquisa bibliográfica, trata-se de um levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de revistas, de livros, de publicações avulsas e de imprensa escrita.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Os benefícios do voleibol no contexto escolar nos anos iniciais, são o desenvolvimento motor na percepção de lateralidade tempo e espaço e a promoção da saúde dos indivíduos, pois, ao ser aplicado na escola, tal prática vai além desse benefício visto que este esporte viabiliza o desenvolvimento de inúmeros aspectos relacionados ao desenvolvimento, ao crescimento, à cultura corporal, a questões de sociabilidade, à afetividade, à cooperação, a aptidões físicas e à formação do cidadão.</p>			
<b>CONCLUSÕES</b>	<p>O voleibol nos anos iniciais deve promover uma aprendizagem significativa para os alunos sobre a importância da sua prática e o que esta contribui para a vida do indivíduo. É preciso que os alunos compreendam sua importância formando cidadãos participativos que desenvolvam o respeito a regras, que aprendam a ganhar e perder e a viver em sociedade com respeito, cooperação e afetividade.</p>			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>BARROSO, A.L.R. (#38) DARIDO, S.C. Voleibol Escolar: uma proposta de ensino nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal do conteúdo. Rev. bras. Educ. Fis. Esport., São Paulo, v.24, n.2, p.179-94, abr./jun. 2010. BOJIKIAN, J. C. M. Ensinar Voleibol. São Paulo: Phorte, 1999. CAMPOS, L.A.S. Voleibol "da" escola. Jundiaí: Fontoura, 2006.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14966	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4396359 - LARISSA DA SILVA ALVES	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Paula Ribeiro		TATIANE SILVA DE SOUZA
<b>TITULO</b>	Efeito da Atrite Reumatóide sobre o Apoio dos Pés durante a Marcha			
<b>INTRODUCAO</b>	A Artrite reumatóide (AR) é uma doença que envolve pequenas e grandes articulações em quadros de sinovites inflamatórias persistentes e crônicas. Esse quadro inflamatório e de deformidades articulares levam a significantes limitações funcionais, em especial o andar (marcha). Porém, poucos estudos mostraram os padrões de mudanças da marcha em pacientes com AR.			
<b>OBJETIVOS</b>	Investigar o efeito da artrite reumatóide sobre a distribuição da carga plantar do apoio dos pés durante a marcha.			
<b>METODOLOGIA</b>	Métodos: Foi conduzido um estudo transversal, no qual 20 idosas foram avaliadas e divididas em dois grupos: artrite reumatóide diagnosticada pelo médico (GAR, n=10) e grupo controle, sem a doença (GC, n=10). Serão avaliados: a intensidade da dor verificado pela Escala Visual Analógica, o risco de quedas pelo questionário Falls Risk Awareness Questionnaire-FRAQ-Brasil, bem como o padrão de marcha pela plataforma de pressão para avaliar a sobrecarga de apoio dos pés. Análise Estatística: Foi aplicado o teste t student independente, considerando um nível de significância de 5%.			
<b>RESULTADOS</b>	Resultados: As idosas com AR apresentaram piora na dor (p=0,002) e menor percepção do risco de quedas quando comparado as idosas com controle (p=0,001). Além disso, as idosas com AR mostraram um aumento significativo da força máxima sobre o calcânhar medial (p=0,045) e lateral (p=0,043) e também do pico de pressão (p=0,042; p=0,039, respectivamente) quando comparado as idosas do grupo controle, levando a maior limitação funcional do andar.			
<b>CONCLUSOES</b>	Conclusão: A AR em idosas leva a maior intensidade de dor e pior percepção do risco de quedas em relação as idosas controle, bem como maior sobrecarga no calcânhar (medial e lateral) levando a limitação do andar, os quais devem ser uma prioridade a assistência clínica dessas idosas para minimizar os efeitos deletérios da AR.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Weiss RJ, Wretenberg P, Stark A, Palmblad K, Larsson P, Gröndal L, Broström E. Gait pattern in rheumatoid arthritis. Gait Posture. 2008 Aug;28(2):229-34. 2. Gröndal L, Tengstrand B, Nordmark B, Wretenberg P, Stark A. The foot: still the most important reason for walking incapacity in rheumatoid arthritis: distribution of symptomatic joints in 1,000 RA patients. Acta Orthop. 2008 Apr;79(2):257-61. 3. Riskowski J, Dufour AB, Hannan MT. Arthritis, foot pain and shoe wear: current musculoskeletal research on feet. Curr Opin Rheumatol. 2011 Mar;23(2):148-55.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14968	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		1225731 - RENATA ESTEVAM ARTAGOITIA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Paula Ribeiro		GABRIELA HARUMI ANTÔNIO
<b>TITULO</b>	Efeito Terapêutico do Treino de Equilíbrio e Marcha com Calçado e Palmilha associado a Educação em Neurociência da Dor de Idosas com Osteoartrite de Joelho: ensaio clínico randomizado			
<b>INTRODUCAO</b>	A osteoartrite (OA) é a afecção mais frequente do sistema musculoesquelético, o que contribui para incapacidade funcional de aproximadamente 15% da população mundial.			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito terapêutico do programa de treino de equilíbrio e marcha associado ao feedback visual com uso do calçado minimalista e a palmilha ortopédica em relação a condição descalça combinado a educação em dor crônica sobre os aspectos da dor, funcionalidade e parâmetros biomecânicos da marcha de idosas com OA de joelho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Ensaio clínico, no qual 20 idosas com OA de joelho e 10 idosas controle foram randomizadas e alocadas para o grupo de intervenção com calçado minimalista (GIC, n=10) ou para o grupo com palmilha ortopédica (GIP, n=10) e 10 mulheres idosas controle, sem doença (GC, n=15), todas combinada a educação em neurociência da dor. A intervenção foi um programa de exercícios para treino de resistência muscular, equilíbrio e a marcha na esteira com velocidade de moderado a avançado. O CIC realizou a intervenção com o uso de um calçado flexível e o GIP com o calçado associado a palmilha ortopédica. O programa de intervenção teve duração de quatro meses consecutivos, duas vezes na semana, com duração de 40 minutos cada sessão. Os desfechos primários foram: a dor pela Escala Visual Analógica, o domínio de dor e funcionalidade pelo questionário WOMAC e algo-funcional de Lequesne. Os desfechos secundários foram: o desempenho físico pelo Timed Get Up and Go Test, a percepção do risco de quedas pelo questionário FRAQ-Brasil e a carga plantar sobre o calcanhar durante a marcha por meio de uma plataforma de pressão			
<b>RESULTADO S</b>	As idosas com OA de joelho e treino de intervenção com uso do calçado associado a palmilha ortopédica e educação em neurociência em dor (GIP) apresentaram redução da dor no joelho (p=0,001) e aumento do desempenho físico-funcional (WOMAC p=0,012; Lequesne p=0,023 e TUG p=0,012) e da percepção do risco de quedas (FRAQ p=0,012) quando comparado ao grupo das idosas com calçado minimalista apenas combinada a educação em neurociência em dor (GIC) e idosas controle (GC). Além disso, ambas intervenções, com calçado minimalista ou palmilha ortopédica combinada a educação em neurociência em dor, mostraram a redução da carga plantar sobre o calcanhar (p(#60)0,001) em relação as idosas controle. Fato este, que mostra a importância do programa de intervenção para reduzir a dor e as limitações funcionais advindas da doença			
<b>CONCLUSOES</b>	As idosas com OA de joelho, que realizaram um programa de intervenção por 6 meses consecutivos com o uso do calçado associado a palmilha ortopédica combinada a educação em neurociência em dor, mostraram uma redução da intensidade de dor no joelho, aumento do desempenho físico-funcional e redução da carga plantar sobre o calcanhar durante a marcha.			
<b>REFERENCIAS</b>	1.Sacco IC, et al. Arthritis Care Res. 2012;64(3):368-74. 2.Bennell KL, et al. Arthritis Rheum. 2013;65(3):701-9. 3.Shakoor N, et al. Arthritis Rheum. 2013;65(5):1282-9.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14969	Medicina	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4894049 - LUCAS SILVA MANTOVANELLI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Paula Ribeiro		
<b>TITULO</b>	Perfil imunológico e inflamatório, desempenho funcional e parâmetros biomecânicos da marcha de idosos praticantes de exercício físico regular após quarta dose da vacina contra a COVID-19			
<b>INTRODUCAO</b>	A pandemia COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, responsável por desencadear infecções respiratórias, trouxe grande impacto público para a saúde os idosos, além das consequências advindas do isolamento social que causou impacto na vida das pessoas.			
<b>OBJETIVOS</b>	Verificar o efeito do retorno da prática regular de exercício físico sobre a resposta a quarta dose da vacina contra COVID-19 no sistema imunológico e modulação inflamatória, bem como no desempenho físico-funcional e parâmetros biomecânicos da marcha de idosos ao longo de nove meses			
<b>METODOLOGIA</b>	Design: estudo de coorte prospectivo. Um total de 15 idosos imunizados para a COVID-19 completando a 4ª dose de vacinação para a doença foram recrutados para avaliação, entre janeiro a dezembro de 2022. Os idosos foram avaliados em três momentos distintos: 1) durante a pandemia, pré vacinação contra COVID-19; 2) após um mês da vacinação contra-COVID-19 e retorno da prática de exercício físico regular (contínuo), e; 3) após 9 meses da vacinação contra-COVID-19 e retorno da prática de exercício físico regular, sendo as variáveis físico-funcionais somente em dois momentos (1 e 3). Foram avaliadas marcadores imunológicos (IgA e IgG) e inflamatórios por coleta de saliva e sangue. As variáveis físico-funcionais: FRAQ-Brasil - risco de queda e testes físicos: Step Test e teste floor transfer, equilíbrio pelo Timed Get Up-TUG. Para apreensão manual utilizou-se o instrumento Jamar. Para avaliação biomecânica da marcha utilizou-se a plataforma de pressão			
<b>RESULTADO S</b>	Os idosos apresentaram maior imunidade ao vírus da COVID-19, com um aumento significativo da IgA e redução da IgG, bem como dos marcadores inflamatórios: IP-10 (pg/mL), IL-10 (pg/mL) e 12p70 (pg/mL) após 30 dias e 9 meses após a 4ª. dose da vacinação contra-COVID-19 e retorno a prática de exercício físico regular quando comparados ao período pré-vacinação. Na modulação inflamatória pode-se observar diferenças na equação entre IL-6 / IL 10 (pg/mL) com redução após 9 meses da vacinação e retorno a prática do exercício regular. Em relação a funcionalidade, houve uma melhora significativa dos idosos, com menor tempo de realização do Step test e Floor transfert. Já o TUG, FRAQ e força de apreensão manual, não houve diferenças estatísticas entre os momentos avaliados. Na avaliação da marcha houve uma redução da carga plantar sobre o antepé após 9 meses da 4ª. dose da vacinação contra-COVID-19 e retorno a prática de exercício físico regular.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Idosos no retorno da prática regular de exercício físico sobre a resposta a 4ª. dose da vacina contra COVID-19 levou a uma melhora do sistema imunológico e da resposta antiinflamatória e da modulação inflamatória, bem como no aumento do desempenho físico-funcional e redução das taxas de carga na marcha ao longo de nove meses.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Roschel et al. J Am Geriatr Soc. 2020 Jun;68(6):1126-1128. doi: 10.1111/jgs.16550. 2. Chtourou et al. Front Psychol. 2020 Aug 19;11:1708. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01708.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14970	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3885607 - MEIRE MARIA JULIÃO CAMPOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero no Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A arrecadação de receitas por meio da tributação e a sua aplicação mediante gastos públicos e do fornecimento de bens e serviços são as duas pontas da política fiscal. Não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível ignorando-se as disparidades socioeconômicas entre grupos racializados e homens e mulheres. Assim, é necessário que a dimensão racial e de gênero sejam consideradas no debate da política tributária e da justiça fiscal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar como o sistema tributário nacional contribui para a desigualdade de gênero e raça.			
<b>METODOLOGIA</b>	A presente pesquisa se baseia no método bibliográfico.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho, qual seja, da relação indissociável entre raça e gênero e sua dimensão estrutural (Almeida, 2021; Santos, 2023). É nesse sentido que aponta Bottega (2023). Com base em dados coletados a partir da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela Receita Federal, a autora constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras. Por outro lado, analisando o decil mais rico, verificou-se que essa camada da população é integrada por 30% de pessoas negras, dentre os quais apenas 10% são mulheres. Conforme Bottega, essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais, para Menezes (2023) o sistema tributário também apresenta outras distorções relativas à questão de gênero, como a tributação de produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado, corroborando para este cenário de disparidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário contribui para a manutenção das desigualdades que conformam o sexismo e o racismo estrutural. Diante disso, é essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça, revelando-se fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para a superação de desigualdades do sistema patriarcal e racista. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar papel importante na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silví Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. Belo Horizonte: Letramento, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14970	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4376749 - CRISTIANE ABRANCHES OKUBO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero no Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A arrecadação de receitas por meio da tributação e a sua aplicação mediante gastos públicos e do fornecimento de bens e serviços são as duas pontas da política fiscal. Não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível ignorando-se as disparidades socioeconômicas entre grupos racializados e homens e mulheres. Assim, é necessário que a dimensão racial e de gênero sejam consideradas no debate da política tributária e da justiça fiscal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar como o sistema tributário nacional contribui para a desigualdade de gênero e raça.			
<b>METODOLOGIA</b>	A presente pesquisa se baseia no método bibliográfico.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho, qual seja, da relação indissociável entre raça e gênero e sua dimensão estrutural (Almeida, 2021; Santos, 2023). É nesse sentido que aponta Bottega (2023). Com base em dados coletados a partir da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela Receita Federal, a autora constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras. Por outro lado, analisando o decil mais rico, verificou-se que essa camada da população é integrada por 30% de pessoas negras, dentre os quais apenas 10% são mulheres. Conforme Bottega, essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais, para Menezes (2023) o sistema tributário também apresenta outras distorções relativas à questão de gênero, como a tributação de produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado, corroborando para este cenário de disparidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário contribui para a manutenção das desigualdades que conformam o sexismo e o racismo estrutural. Diante disso, é essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça, revelando-se fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para a superação de desigualdades do sistema patriarcal e racista. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar papel importante na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvío Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. Belo Horizonte: Letramento, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14970	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4389093 - WALTER MARINHO DE ARAUJO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero no Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A arrecadação de receitas por meio da tributação e a sua aplicação mediante gastos públicos e do fornecimento de bens e serviços são as duas pontas da política fiscal. Não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível ignorando-se as disparidades socioeconômicas entre grupos racializados e homens e mulheres. Assim, é necessário que a dimensão racial e de gênero sejam consideradas no debate da política tributária e da justiça fiscal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar como o sistema tributário nacional contribui para a desigualdade de gênero e raça.			
<b>METODOLOGIA</b>	A presente pesquisa se baseia no método bibliográfico.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho, qual seja, da relação indissociável entre raça e gênero e sua dimensão estrutural (Almeida, 2021; Santos, 2023). É nesse sentido que aponta Bottega (2023). Com base em dados coletados a partir da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela Receita Federal, a autora constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras. Por outro lado, analisando o decil mais rico, verificou-se que essa camada da população é integrada por 30% de pessoas negras, dentre os quais apenas 10% são mulheres. Conforme Bottega, essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais, para Menezes (2023) o sistema tributário também apresenta outras distorções relativas à questão de gênero, como a tributação de produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado, corroborando para este cenário de disparidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário contribui para a manutenção das desigualdades que conformam o sexismo e o racismo estrutural. Diante disso, é essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça, revelando-se fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para a superação de desigualdades do sistema patriarcal e racista. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar papel importante na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. Belo Horizonte: Letramento, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14970	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5031885 - SUELY REGINA LIMA SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero no Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A arrecadação de receitas por meio da tributação e a sua aplicação mediante gastos públicos e do fornecimento de bens e serviços são as duas pontas da política fiscal. Não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível ignorando-se as disparidades socioeconômicas entre grupos racializados e homens e mulheres. Assim, é necessário que a dimensão racial e de gênero sejam consideradas no debate da política tributária e da justiça fiscal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar como o sistema tributário nacional contribui para a desigualdade de gênero e raça.			
<b>METODOLOGIA</b>	A presente pesquisa se baseia no método bibliográfico.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho, qual seja, da relação indissociável entre raça e gênero e sua dimensão estrutural (Almeida, 2021; Santos, 2023). É nesse sentido que aponta Bottega (2023). Com base em dados coletados a partir da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela Receita Federal, a autora constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras. Por outro lado, analisando o decil mais rico, verificou-se que essa camada da população é integrada por 30% de pessoas negras, dentre os quais apenas 10% são mulheres. Conforme Bottega, essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais, para Menezes (2023) o sistema tributário também apresenta outras distorções relativas à questão de gênero, como a tributação de produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado, corroborando para este cenário de disparidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário contribui para a manutenção das desigualdades que conformam o sexismo e o racismo estrutural. Diante disso, é essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça, revelando-se fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para a superação de desigualdades do sistema patriarcal e racista. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar papel importante na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvío Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. Belo Horizonte: Letramento, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14970	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5070139 - MAYSA FILGUEIRA HOFFMANN	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero no Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A arrecadação de receitas por meio da tributação e a sua aplicação mediante gastos públicos e do fornecimento de bens e serviços são as duas pontas da política fiscal. Não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível ignorando-se as disparidades socioeconômicas entre grupos racializados e homens e mulheres. Assim, é necessário que a dimensão racial e de gênero sejam consideradas no debate da política tributária e da justiça fiscal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar como o sistema tributário nacional contribui para a desigualdade de gênero e raça.			
<b>METODOLOGIA</b>	A presente pesquisa se baseia no método bibliográfico.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fincar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho, qual seja, da relação indissociável entre raça e gênero e sua dimensão estrutural (Almeida, 2021; Santos, 2023). É nesse sentido que aponta Bottega (2023). Com base em dados coletados a partir da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela Receita Federal, a autora constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras. Por outro lado, analisando o decil mais rico, verificou-se que essa camada da população é integrada por 30% de pessoas negras, dentre os quais apenas 10% são mulheres. Conforme Bottega, essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais, para Menezes (2023) o sistema tributário também apresenta outras distorções relativas à questão de gênero, como a tributação de produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado, corroborando para este cenário de disparidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário contribui para a manutenção das desigualdades que conformam o sexismo e o racismo estrutural. Diante disso, é essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça, revelando-se fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para a superação de desigualdades do sistema patriarcal e racista. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar papel importante na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvío Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. Belo Horizonte: Letramento, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14970	Direito Tributário	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5115272 - MARIANA SOUSA SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Leticia Galan Garducci	Andre Luis Ulrich Pinto	
<b>TITULO</b>	Tributação e desigualdade de raça e gênero no Brasil			
<b>INTRODUCAO</b>	A arrecadação de receitas por meio da tributação e a sua aplicação mediante gastos públicos e do fornecimento de bens e serviços são as duas pontas da política fiscal. Não há como falar em justiça fiscal e orçamento sensível ignorando-se as disparidades socioeconômicas entre grupos racializados e homens e mulheres. Assim, é necessário que a dimensão racial e de gênero sejam consideradas no debate da política tributária e da justiça fiscal.			
<b>OBJETIVOS</b>	Esta pesquisa busca explorar como o sistema tributário nacional contribui para a desigualdade de gênero e raça.			
<b>METODOLOGIA</b>	A presente pesquisa se baseia no método bibliográfico.			
<b>RESULTADOS</b>	De início, cabe fixar a premissa sobre a qual se baseia o presente trabalho, qual seja, da relação indissociável entre raça e gênero e sua dimensão estrutural (Almeida, 2021; Santos, 2023). É nesse sentido que aponta Bottega (2023). Com base em dados coletados a partir da Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE e dos Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física disponibilizados pela Receita Federal, a autora constatou que a sociedade brasileira está composta da seguinte forma: 22,58% são homens brancos, 27,56% são homens negros, 23,26% são mulheres brancas e 26,6% são mulheres negras. Apesar deste aparente equilíbrio entre os quatro grupos, as mulheres representam 60,7% do décimo inferior da renda, sendo que 42% do decil mais pobre é composto por mulheres negras. Por outro lado, analisando o decil mais rico, verificou-se que essa camada da população é integrada por 30% de pessoas negras, dentre os quais apenas 10% são mulheres. Conforme Bottega, essa desigualdade é agravada pela estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, que onera demasiadamente a parcela mais pobre da sociedade. Ademais, para Menezes (2023) o sistema tributário também apresenta outras distorções relativas à questão de gênero, como a tributação de produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho de cuidado, corroborando para este cenário de disparidades.			
<b>CONCLUSOES</b>	O sistema tributário contribui para a manutenção das desigualdades que conformam o sexismo e o racismo estrutural. Diante disso, é essencial que o sistema tributário seja reformulado com atenção à equidade de gênero e raça, revelando-se fundamental a produção de pesquisas que provoquem reflexões de como os tributos poderiam ser utilizados para a superação de desigualdades do sistema patriarcal e racista. Políticas fiscais sensíveis a essas questões podem desempenhar papel importante na redução das desigualdades e na promoção da equidade e, conseqüentemente, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.			
<b>REFERENCIAS</b>	ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021. BOTTEGA, Ana. Quanto fica para as mulheres negras: uma análise da distribuição de renda no Brasil. Nota de política econômica, n. 018. Disponível em:(#60) <a href="https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62">https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/#62</a> . Acesso em 12 out. 2023. MENEZES, Luiza Machado de O. Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. Belo Horizonte: Letramento, 2023.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14971	Enfermagem	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4315278 - LEONARDO RODRIGUES DE PAULA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marli Reinado Barbosa		
<b>TITULO</b>	A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DE LIDERANÇA DO ENFERMEIRO ENFRETE OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Para realizar uma boa liderança é necessário ter a capacidade de alinhar todos os membros de sua equipe e guiá-los para no fim alcançar os objetivos impostos, utilizando-se das melhores estratégias, mantendo uma visão de ser inovador e motivador. No contexto clínico, é caracterizada pela influência constante da equipe, criando assim um laço de confiança para que possa adquirir uma melhora do cuidado prestado ao paciente. Assim, um bom líder é capaz de criar empatia, construir confiança e ambientes de trabalho mais saudáveis que promovam a segurança do paciente e excelência no atendimento. Os departamentos de urgência e emergência sendo necessário uma equipe qualificada, com comunicação e capacidade de tomar decisões assertivas, uma vez que irá prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade para pacientes graves. Esse conceito de saúde contribui para direcionar a intervenção e resposta as necessidades particulares de cada usuário.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Descrever a importância do papel de liderança do enfermeiro frente os serviços de urgência e emergência.			
<b>METODOLOGIA</b>	Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foi feito um levantamento na base de dados da BVS, SciELO e Google Acadêmico. Foram coletados artigos entre os anos 2014 a 2023.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSÕES</b>	Pode-se concluir que, nitidamente se vê essa importância do enfermeiro como líder, principalmente quando se refere a serviço de alta complexidade, pois, é necessário o enfermeiro tomar a frente de sua equipe no momento de urgência e emergência. E mesmo assim sendo observado essa necessidade, não se vê a preparação correta desses profissionais a frente de suas equipes.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	<p>1. FREIRE, G. V. et al. Liderança do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência: revisão integrativa / Nursing leadership in urgency and emergency services: integrative review. Brazilian Journal of Health Review, v. 2, n. 3, p. 2029–2041, 21 mar. 2019. 2. ERIVELTON, D. et al. LIDERANÇA DO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. [s.l: s.n.]. Disponível em: (#60)https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conbracis/2020/TRABALHO_EV135_MD1_SA_ID265_29052020104528.pdf(#62). (#38)#8204;3. SILVA, D. S. et al. A liderança do enfermeiro no contexto dos serviços de urgência e emergência. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 16, n. 1, 31 mar. 2014.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14972	Medicina Veterinária Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135768 - STEPHANIE RODRIGUES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA; SOLANGE MARIA GENNARI	
<b>TITULO</b>	SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii EM GATOS DOMICILIADOS ATENDIDOS EM HOSPITAIS VETERINÁRIOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A toxoplasmose é uma zoonose, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que possui grande importância em saúde pública devido à alta prevalência e capacidade de infectar diversas espécies de vertebrados homeotérmicos, inclusive o homem. Os felídeos são os hospedeiros definitivos do parasita, no qual parte do ciclo biológico ocorre no intestino, produzindo oocistos que são eliminados para o ambiente por meio das fezes do animal infectado.			
<b>OBJETIVOS</b>	Tendo em vista que os dados de soroprevalência, nas diversas espécies domésticas e em humanos, são utilizados para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento à toxoplasmose, o presente estudo teve como objetivo determinar a soroprevalência de anticorpos anti-T. gondii em gatos domiciliados atendidos em Hospitais Veterinários Públicos de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A detecção de anticorpos foi realizada pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) com ponto de corte de 16.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram obtidas 804 amostras e destas 61 (7,6%) foram positivas para presença de anticorpos anti-T.gondii, sendo 7,8% (20/256) do Tatuapé, 5,9% (12/202) de Osasco, 10,2% (19/187) de Jurubatuba e 6,3% (10/159) da Casa Verde. Do total de amostras analisadas, 7,49% (32/427) dos machos e 7,69% (29/377) das fêmeas foram positivas. As amostras positivas foram tituladas de maneira seriada na base dois, até a máxima diluição reagente. Os títulos de anticorpos IgG dos gatos analisados foram 32 (5 animais), 64 (6 animais), 128 (12 animais), 256 (8 animais) e (#62) 512 (30 animais). Não foram observadas diferenças entre os títulos de anticorpos anti-T. gondii em relação ao sexo dos animais analisados.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados do presente estudo indicam a presença de gatos infectados por T. gondii na cidade de São Paulo e região metropolitana, sobretudo na população de felinos domésticos adultos de ambos os sexos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Camargo, M.E., 1964. Improved technique of indirect immunofluorescence for serological diagnosis of toxoplasmosis. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 6:117-118. Dubey J.P. et al. All about toxoplasmosis in cats: the last decade. Veterinary Parasitology. 2020; 263:109-145. DUBEY, J. P. Toxoplasmosis Of Animals And Humans. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14972	Medicina Veterinária Preventiva	7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4693949 - ANA CAROLINA TEIXEIRA IBELLI	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA; SOLANGE MARIA GENNARI	
<b>TITULO</b>	SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii EM GATOS DOMICILIADOS ATENDIDOS EM HOSPITAIS VETERINÁRIOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO.			
<b>INTRODUÇÃO</b>	A toxoplasmose é uma zoonose, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que possui grande importância em saúde pública devido à alta prevalência e capacidade de infectar diversas espécies de vertebrados homeotérmicos, inclusive o homem. Os felídeos são os hospedeiros definitivos do parasita, no qual parte do ciclo biológico ocorre no intestino, produzindo oocistos que são eliminados para o ambiente por meio das fezes do animal infectado.			
<b>OBJETIVOS</b>	Tendo em vista que os dados de soroprevalência, nas diversas espécies domésticas e em humanos, são utilizados para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento à toxoplasmose, o presente estudo teve como objetivo determinar a soroprevalência de anticorpos anti-T. gondii em gatos domiciliados atendidos em Hospitais Veterinários Públicos de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A detecção de anticorpos foi realizada pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) com ponto de corte de 16.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram obtidas 804 amostras e destas 61 (7,6%) foram positivas para presença de anticorpos anti-T.gondii, sendo 7,8% (20/256) do Tatuapé, 5,9% (12/202) de Osasco, 10,2% (19/187) de Jurubatuba e 6,3% (10/159) da Casa Verde. Do total de amostras analisadas, 7,49% (32/427) dos machos e 7,69% (29/377) das fêmeas foram positivas. As amostras positivas foram tituladas de maneira seriada na base dois, até a máxima diluição reagente. Os títulos de anticorpos IgG dos gatos analisados foram 32 (5 animais), 64 (6 animais), 128 (12 animais), 256 (8 animais) e (#62) 512 (30 animais). Não foram observadas diferenças entre os títulos de anticorpos anti-T. gondii em relação ao sexo dos animais analisados.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os resultados do presente estudo indicam a presença de gatos infectados por T. gondii na cidade de São Paulo e região metropolitana, sobretudo na população de felinos domésticos adultos de ambos os sexos.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Camargo, M.E., 1964. Improved technique of indirect immunofluorescence for serological diagnosis of toxoplasmosis. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 6:117-118. Dubey J.P. et al. All about toxoplasmosis in cats: the last decade. Veterinary Parasitology. 2020; 283:109-145. DUBEY, J. P. Toxoplasmosis Of Animals And Humans. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2021.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14973	Doenças Parasitárias de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4135768 - STEPHANIE RODRIGUES DOS SANTOS	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares		HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA; SOLANGE MARIA GENNARI
<b>TITULO</b>	SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Neospora caninum EM FELINOS DOMICILIADOS ATENDIDOS EM HOSPITAIS VETERINÁRIOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório pertencente ao filo Apicomplexa, causador da neosporose. Os hospedeiros definitivos (HD) incluem cães domésticos e algumas espécies de canídeos selvagens, como o coitoe, o lobo cinzento e o dingo australiano. Diversos animais homeotérmicos podem atuar como hospedeiros intermediários (HI), sendo os bovinos os de maior importância, devido a ocorrência de abortos repetitivos. O ciclo biológico é heteroxeno, consistindo em dois modos distintos de reprodução, assexuada e sexuada, que ocorrem, respectivamente nos hospedeiros HI e HD.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi determinar a soroprevalência de anticorpos anti-N. caninum em felinos domiciliados atendidos em Hospitais Veterinários Públicos do município de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A detecção de anticorpos foi realizada pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), com ponto de corte de 1:50.			
<b>RESULTADOS</b>	Entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram obtidas 804 amostras de soro de gatos levados para atendimento nos Hospitais Veterinários Públicos da grande São Paulo, sendo: 256 (31,8%) no Tatuapé (Zona Leste); 202 (25,1%) em Osasco (Zona Oeste), 187 (23,3) em Jurubatuba (Zona Sul) e 159 (19,8) na Casa Verde (Zona Norte). Do total de amostras, 427 (53,11%) eram de machos e 377 (46,89%) de fêmeas. A idade dos animais variou de três meses a 22 anos, sendo estratificada nos intervalos 0-12 meses (77 gatos), 1-2 anos (203 gatos), 3-10 anos (365 gatos) e (#62)10 anos (159 gatos). Esta é a pesquisa com o maior número de felinos domésticos já testados no Brasil para anticorpos anti-N.caninum, sendo todas negativas. O resultado deste estudo corrobora com pesquisas anteriores, mostrando que a prevalência de anticorpos da classe IgG para N. caninum é rara em gatos domésticos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Embora as formas de transmissão do protozoário entre felídeos sejam desconhecidas, sabe-se que os gatos podem ser infectados e desenvolver neosporose.			
<b>REFERENCIAS</b>	Camargo ME. Introdução às técnicas de imunofluorescência. Rev Bras Patol Clin. 1974;10:143-71. Dubey JP, Lindsay DS, Lipscomb TP. Neosporosis in cats. Vet Pathol. 1990;27(5):335-9. Feitosa TF, Vilela VLR, Dantas ES, Souto DVO, Pena HFJ, Athayde ACR, Azevêdo SS. Toxoplasma gondii and Neospora caninum in domestic cats from the Brazilian semi-arid: seroprevalence and risk factors. Arq Bras Med Vet Zootec. 2014;66(4):1060-6.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14973	Doenças Parasitárias de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4238982 - BEATRIZ DOS SANTOS NEVES KAHWAGE	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares		HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA; SOLANGE MARIA GENNARI
<b>TITULO</b>	SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Neospora caninum EM FELINOS DOMICILIADOS ATENDIDOS EM HOSPITAIS VETERINÁRIOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório pertencente ao filo Apicomplexa, causador da neosporose. Os hospedeiros definitivos (HD) incluem cães domésticos e algumas espécies de canídeos selvagens, como o coitoe, o lobo cinzento e o dingo australiano. Diversos animais homeotérmicos podem atuar como hospedeiros intermediários (HI), sendo os bovinos os de maior importância, devido a ocorrência de abortos repetitivos. O ciclo biológico é heteroxeno, consistindo em dois modos distintos de reprodução, assexuada e sexuada, que ocorrem, respectivamente nos hospedeiros HI e HD.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi determinar a soroprevalência de anticorpos anti-N. caninum em felinos domiciliados atendidos em Hospitais Veterinários Públicos do município de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A detecção de anticorpos foi realizada pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), com ponto de corte de 1:50.			
<b>RESULTADOS</b>	Entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram obtidas 804 amostras de soro de gatos levados para atendimento nos Hospitais Veterinários Públicos da grande São Paulo, sendo: 256 (31,8%) no Tatuapé (Zona Leste); 202 (25,1%) em Osasco (Zona Oeste), 187 (23,3) em Jurubatuba (Zona Sul) e 159 (19,8) na Casa Verde (Zona Norte). Do total de amostras, 427 (53,11%) eram de machos e 377 (46,89%) de fêmeas. A idade dos animais variou de três meses a 22 anos, sendo estratificada nos intervalos 0-12 meses (77 gatos), 1-2 anos (203 gatos), 3-10 anos (365 gatos) e (#62)10 anos (159 gatos). Esta é a pesquisa com o maior número de felinos domésticos já testados no Brasil para anticorpos anti-N.caninum, sendo todas negativas. O resultado deste estudo corrobora com pesquisas anteriores, mostrando que a prevalência de anticorpos da classe IgG para N. caninum é rara em gatos domésticos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Embora as formas de transmissão do protozoário entre felídeos sejam desconhecidas, sabe-se que os gatos podem ser infectados e desenvolver neosporose.			
<b>REFERENCIAS</b>	Camargo ME. Introdução às técnicas de imunofluorescência. Rev Bras Patol Clin. 1974;10:143-71. Dubey JP, Lindsay DS, Lipscomb TP. Neosporosis in cats. Vet Pathol. 1990;27(5):335-9. Feitosa TF, Vilela VLR, Dantas ES, Souto DVO, Pena HFJ, Athayde ACR, Azevêdo SS. Toxoplasma gondii and Neospora caninum in domestic cats from the Brazilian semi-arid: seroprevalence and risk factors. Arq Bras Med Vet Zootec. 2014;66(4):1060-6.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14973	Doenças Parasitárias de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4894103 - CAMYLLA SILVA PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Herbert Sousa Soares	HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA; SOLANGE MARIA GENNARI	
<b>TITULO</b>	SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Neospora caninum EM FELINOS DOMICILIADOS ATENDIDOS EM HOSPITAIS VETERINÁRIOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório pertencente ao filo Apicomplexa, causador da neosporose. Os hospedeiros definitivos (HD) incluem cães domésticos e algumas espécies de canídeos selvagens, como o coiote, o lobo cinzento e o dingó australiano. Diversos animais homeotérmicos podem atuar como hospedeiros intermediários (HI), sendo os bovinos os de maior importância, devido a ocorrência de abortos repetitivos. O ciclo biológico é heteroxeno, consistindo em dois modos distintos de reprodução, assexuada e sexuada, que ocorrem, respectivamente nos hospedeiros HI e HD.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo deste estudo foi determinar a soroprevalência de anticorpos anti-N. caninum em felinos domiciliados atendidos em Hospitais Veterinários Públicos do município de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	A detecção de anticorpos foi realizada pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), com ponto de corte de 1:50.			
<b>RESULTADOS</b>	Entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram obtidas 804 amostras de soro de gatos levados para atendimento nos Hospitais Veterinários Públicos da grande São Paulo, sendo: 256 (31,8%) no Tatuapé (Zona Leste); 202 (25,1%) em Osasco (Zona Oeste), 187 (23,3) em Jurubatuba (Zona Sul) e 159 (19,8) na Casa Verde (Zona Norte). Do total de amostras, 427 (53,11%) eram de machos e 377 (46,89%) de fêmeas. A idade dos animais variou de três meses a 22 anos, sendo estratificada nos intervalos 0-12 meses (77 gatos), 1-2 anos (203 gatos), 3-10 anos (365 gatos) e (>10) 10 anos (159 gatos). Esta é a pesquisa com o maior número de felinos domésticos já testados no Brasil para anticorpos anti-N.caninum, sendo todas negativas. O resultado deste estudo corrobora com pesquisas anteriores, mostrando que a prevalência de anticorpos da classe IgG para N. caninum é rara em gatos domésticos.			
<b>CONCLUSOES</b>	Embora as formas de transmissão do protozoário entre felídeos sejam desconhecidas, sabe-se que os gatos podem ser infectados e desenvolver neosporose.			
<b>REFERENCIAS</b>	Camargo ME. Introdução às técnicas de imunofluorescência. Rev Bras Patol Clin. 1974;10:143-71. Dubey JP, Lindsay DS, Lipscomb TP. Neosporosis in cats. Vet Pathol. 1990;27(5):335-9. Feitosa TF, Vilela VLR, Dantas ES, Souto DVO, Pena HFJ, Athayde ACR, Azevêdo SS. Toxoplasma gondii and Neospora caninum in domestic cats from the Brazilian semi-arid: seroprevalence and risk factors. Arq Bras Med Vet Zootec. 2014;66(4):1060-6.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14974	Doenças Parasitárias de Animais	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4020332 - JADE GONÇALVES DE ALMEIDA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>		<b>Orientador Externo</b>
Herbert Sousa Soares		JACIARA DE OLIVEIRA JORGE COSTA, ISABELLA PEREIRA PESENATO, SOLANGE MARIA GENNARI, GIOVANNA STEFANI NOSBERTO CASTELLI		
<b>TITULO</b>	OCORRÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii EM ROEDORES E MARSUPIAIS DA RESERVA DE MATA ATLÂNTICA LEGADO DAS ÁGUAS, SÃO PAULO, BRASIL			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório, causador da toxoplasmose, de distribuição cosmopolita que acomete diversas espécies de animais homeotérmicos, domésticos e silvestres, inclusive o homem. Os roedores e marsupiais são hospedeiros intermediários de T. gondii e quando predados por felídeos, os hospedeiros definitivos, podem ser fonte de infecção para estes. O Legado das Águas é a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, possuindo uma área 31 mil hectares e integra, junto com parques estaduais e outras áreas de proteção ambiental, um corredor de mata atlântica que vai do estado do Rio de Janeiro ao Paraná.			
<b>OBJETIVOS</b>	A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a ocorrência de anticorpos anti-T. gondii em roedores e marsupiais da Reserva de Mata Atlântica Legado das Águas na região do estado de São Paulo.			
<b>METODOLOGIA</b>	Entre os anos de 2018 e 2022, foram colhidas amostras de sangue de 197 pequenos mamíferos terrestres, sendo 160 roedores (68 Euryoryzomys russatus, 51 Holochilus sp., 12 Oxymycterus sp., sete Oligoryzomys sp., cinco Nectomys sp., quatro Brucepattersonius sp., três Thaptomys nigrita, dois Akodon sp., dois Rhipidomys sp., dois Sooretamys angouya, um Guerlinguetus brasiliensis, um Hylaeamys sp., um Kannabateomys sp. e um Phyllomys sp.) e 37 marsupiais (17 Didelphis aurita, 16 Metachirus nudicaudatus; dois Marmosa sp., um Marmosops sp. e um Monodelphis sp.). Os soros obtidos foram armazenados em microtubos e mantidos congelados a -20°C até o processamento. Para a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii foi utilizado o Teste de Aglutinação Modificado (MAT (#38)#8805; 25) e as amostras positivas foram diluídas, de forma seriada na base dois, até a máxima titulação positiva.			
<b>RESULTADOS</b>	Do total de roedores amostrados, um indivíduo de Holochilus sp. foi positivo (título 25) e dentre os marsupiais três foram positivos, sendo dois D. aurita (títulos 100 e 400) e um M. nudicaudatus (título 50). No Brasil, poucos estudos foram realizados para ampliar o conhecimento sobre a participação de roedores e marsupiais na cadeia epidemiológica da toxoplasmose, ressaltando a importância do presente estudo, com foco nessas espécies para melhor entender o ciclo silvestre desta importante zoonose.			
<b>CONCLUSOES</b>	A ocorrência de anticorpos anti-T. gondii é baixa nas espécies amostradas, sendo relatada, pela primeira vez, a infecção do roedor Holochilus sp. e do marsupial M. nudicaudatus no bioma Mata Atlântica do estado de São Paulo.			
<b>REFERENCIAS</b>	SIQUEIRA, D.B., et al. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in wild marsupials and rodents from the Atlantic forest of Pernambuco state, northeastern region, Brazil. The Journal of Parasitology, 99(6): 1140-1143, 2013. GENNARI, S.M. et al. Toxoplasma gondii antibodies in wild rodents and marsupials from the Atlantic Forest, state of São Paulo, Brazil. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, v. 24, n. 3, p. 379-382, 2015. DUBEY, J. P. Toxoplasmosis of animal and humans. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2022.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14975	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4839781 - GABRIELLE NUNES DE LIMA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Recrutamento e Seleção: Importância do processo de recrutar e selecionar nas organizações			
<b>INTRODUCAO</b>	Recrutamento e seleção (R(#38)S) é um braço importante de recursos humanos, pois, através dele é realizado a atração e seleção do candidato que atende aos requisitos e a cultura da empresa. Por meio R(#38)S as organizações podem ter os melhores colaboradores, reduzindo a perda de talentos e melhorando o clima organizacional. Acredita-se que seja fundamental para o crescimento da empresa no mercado, já que, ao escolher os melhores talentos, é assegurado a efetividade dos processos.			
<b>OBJETIVOS</b>	O principal objetivo do projeto é apresentar a necessidade das empresas possuírem um time qualificado para área de recrutamento e seleção influenciando em contratações mais assertivas de candidatos alinhados com a cultura e políticas da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	O projeto foi fundamentado com pesquisas bibliográficas e artigos da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	As organizações não investem no setor de recrutamento e seleção o que ocasiona rotatividade de colaboradores uma vez que não são competentes para o cargo. Na maioria das empresas quando não há um processo de recrutamento e seleção adequado isso resulta em uma série de problemas para a empresa, como altos custos na contratação, impactos financeiros por demissões e péssimos resultados operacionais. Chiavenato (2009, p.192) "O processo seletivo precisa ser eficiente e eficaz, a eficiência consiste em fazer corretamente as coisas: saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimentos que sejam válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade, contar com um mínimo de custos operacionais, envolver as gerências e suas equipes no processo de escolher os candidatos...". Uma equipe de recrutamento e seleção qualificada mostra a preocupação da organização com os processos de integração de novos colaboradores que tenham a cultura compatível a empresa. O portal G1 (2020) cita que "Os recursos humanos é um departamento responsável pelo desempenho dos funcionários desde a admissão, entrevistas e monitoramento, conhecendo todos que integram a empresa e com o que trabalham". Portanto, quando a empresa é reconhecida no mercado de trabalho, demonstra que o seu processo com o capital humano é eficiente, apresentando maiores vantagens para os colaboradores que almejem estar naquela organização pelos seus benefícios, cultura, clima organizacional, oportunidade de crescimento e por suas capacitações.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos relatos supracitados, subte-se a importância do processo que o recrutamento e seleção possui, pois, influência diretamente nos resultados da empresa, sendo o primeiro passo para contratar pessoas capacitadas e ter uma equipe qualificada para gerir os outros setores da empresa com eficiência, obtendo uma cultura mais adequada com a atualidade conseguindo realizar processos mais didáticos na hora de recrutar e selecionar um novo colaborador.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Manoeel, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 Série Empreender: Por que investir em Gestão de Pessoas. G1. 2020. Disponível em: <a href="https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml">https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml</a> . Acesso em: 24/08/2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14975	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4863593 - GRAZIELA DA SILVA PEREIRA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Recrutamento e Seleção: Importância do processo de recrutar e selecionar nas organizações			
<b>INTRODUCAO</b>	Recrutamento e seleção (R(#38)S) é um braço importante de recursos humanos, pois, através dele é realizado a atração e seleção do candidato que atende aos requisitos e a cultura da empresa. Por meio R(#38)S as organizações podem ter os melhores colaboradores, reduzindo a perda de talentos e melhorando o clima organizacional. Acredita-se que seja fundamental para o crescimento da empresa no mercado, já que, ao escolher os melhores talentos, é assegurado a efetividade dos processos.			
<b>OBJETIVOS</b>	O principal objetivo do projeto é apresentar a necessidade das empresas possuírem um time qualificado para área de recrutamento e seleção influenciando em contratações mais assertivas de candidatos alinhados com a cultura e políticas da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	O projeto foi fundamentado com pesquisas bibliográficas e artigos da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	As organizações não investem no setor de recrutamento e seleção o que ocasiona rotatividade de colaboradores uma vez que não são competentes para o cargo. Na maioria das empresas quando não há um processo de recrutamento e seleção adequado isso resulta em uma série de problemas para a empresa, como altos custos na contratação, impactos financeiros por demissões e péssimos resultados operacionais. Chiavenato (2009, p.192) "O processo seletivo precisa ser eficiente e eficaz, a eficiência consiste em fazer corretamente as coisas: saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimentos que sejam válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade, contar com um mínimo de custos operacionais, envolver as gerências e suas equipes no processo de escolher os candidatos...". Uma equipe de recrutamento e seleção qualificada mostra a preocupação da organização com os processos de integração de novos colaboradores que tenham a cultura compatível a empresa. O portal G1 (2020) cita que "Os recursos humanos é um departamento responsável pelo desempenho dos funcionários desde a admissão, entrevistas e monitoramento, conhecendo todos que integram a empresa e com o que trabalham". Portanto, quando a empresa é reconhecida no mercado de trabalho, demonstra que o seu processo com o capital humano é eficiente, apresentando maiores vantagens para os colaboradores que almejem estar naquela organização pelos seus benefícios, cultura, clima organizacional, oportunidade de crescimento e por suas capacitações.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos relatos supracitados, subte-se a importância do processo que o recrutamento e seleção possui, pois, influência diretamente nos resultados da empresa, sendo o primeiro passo para contratar pessoas capacitadas e ter uma equipe qualificada para gerir os outros setores da empresa com eficiência, obtendo uma cultura mais adequada com a atualidade conseguindo realizar processos mais didáticos na hora de recrutar e selecionar um novo colaborador.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Manoel, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 Série Empreender: Por que investir em Gestão de Pessoas. G1. 2020. Disponível em: <a href="https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml">https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml</a> . Acesso em: 24/08/2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14975	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4865138 - ANANDA PEREIRA DE SOUZA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Recrutamento e Seleção: Importância do processo de recrutar e selecionar nas organizações			
<b>INTRODUCAO</b>	Recrutamento e seleção (R(#38)S) é um braço importante de recursos humanos, pois, através dele é realizado a atração e seleção do candidato que atende aos requisitos e a cultura da empresa. Por meio R(#38)S as organizações podem ter os melhores colaboradores, reduzindo a perda de talentos e melhorando o clima organizacional. Acredita-se que seja fundamental para o crescimento da empresa no mercado, já que, ao escolher os melhores talentos, é assegurado a efetividade dos processos.			
<b>OBJETIVOS</b>	O principal objetivo do projeto é apresentar a necessidade das empresas possuírem um time qualificado para área de recrutamento e seleção influenciando em contratações mais assertivas de candidatos alinhados com a cultura e políticas da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	O projeto foi fundamentado com pesquisas bibliográficas e artigos da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	As organizações não investem no setor de recrutamento e seleção o que ocasiona rotatividade de colaboradores uma vez que não são competentes para o cargo. Na maioria das empresas quando não há um processo de recrutamento e seleção adequado isso resulta em uma série de problemas para a empresa, como altos custos na contratação, impactos financeiros por demissões e péssimos resultados operacionais. Chiavenato (2009, p.192) "O processo seletivo precisa ser eficiente e eficaz, a eficiência consiste em fazer corretamente as coisas: saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimentos que sejam válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade, contar com um mínimo de custos operacionais, envolver as gerências e suas equipes no processo de escolher os candidatos...". Uma equipe de recrutamento e seleção qualificada mostra a preocupação da organização com os processos de integração de novos colaboradores que tenham a cultura compatível a empresa. O portal G1 (2020) cita que "Os recursos humanos é um departamento responsável pelo desempenho dos funcionários desde a admissão, entrevistas e monitoramento, conhecendo todos que integram a empresa e com o que trabalham". Portanto, quando a empresa é reconhecida no mercado de trabalho, demonstra que o seu processo com o capital humano é eficiente, apresentando maiores vantagens para os colaboradores que almejem estar naquela organização pelos seus benefícios, cultura, clima organizacional, oportunidade de crescimento e por suas capacitações.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos relatos supracitados, subte-se a importância do processo que o recrutamento e seleção possui, pois, influência diretamente nos resultados da empresa, sendo o primeiro passo para contratar pessoas capacitadas e ter uma equipe qualificada para gerir os outros setores da empresa com eficiência, obtendo uma cultura mais adequada com a atualidade conseguindo realizar processos mais didáticos na hora de recrutar e selecionar um novo colaborador.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Manoel, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 Série Empreender: Por que investir em Gestão de Pessoas. G1. 2020. Disponível em: <a href="https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml">https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml</a> . Acesso em: 24/08/2023.			

Ano	Cód.	Area	Tipo	Modalidade
2023	14975	Administração de Recursos Humanos	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4906063 - MARIA VITORIA DO NASCIMENTO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Rosilene Andrea Santos Alvarenga		
<b>TITULO</b>	Recrutamento e Seleção: Importância do processo de recrutar e selecionar nas organizações			
<b>INTRODUCAO</b>	Recrutamento e seleção (R(#38)S) é um braço importante de recursos humanos, pois, através dele é realizado a atração e seleção do candidato que atende aos requisitos e a cultura da empresa. Por meio R(#38)S as organizações podem ter os melhores colaboradores, reduzindo a perda de talentos e melhorando o clima organizacional. Acredita-se que seja fundamental para o crescimento da empresa no mercado, já que, ao escolher os melhores talentos, é assegurado a efetividade dos processos.			
<b>OBJETIVOS</b>	O principal objetivo do projeto é apresentar a necessidade das empresas possuírem um time qualificado para área de recrutamento e seleção influenciando em contratações mais assertivas de candidatos alinhados com a cultura e políticas da empresa.			
<b>METODOLOGIA</b>	O projeto foi fundamentado com pesquisas bibliográficas e artigos da área de recursos humanos.			
<b>RESULTADOS</b>	As organizações não investem no setor de recrutamento e seleção o que ocasiona rotatividade de colaboradores uma vez que não são competentes para o cargo. Na maioria das empresas quando não há um processo de recrutamento e seleção adequado isso resulta em uma série de problemas para a empresa, como altos custos na contratação, impactos financeiros por demissões e péssimos resultados operacionais. Chiavenato (2009, p.192) "O processo seletivo precisa ser eficiente e eficaz, a eficiência consiste em fazer corretamente as coisas: saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimentos que sejam válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade, contar com um mínimo de custos operacionais, envolver as gerências e suas equipes no processo de escolher os candidatos...". Uma equipe de recrutamento e seleção qualificada mostra a preocupação da organização com os processos de integração de novos colaboradores que tenham a cultura compatível a empresa. O portal G1 (2020) cita que "Os recursos humanos é um departamento responsável pelo desempenho dos funcionários desde a admissão, entrevistas e monitoramento, conhecendo todos que integram a empresa e com o que trabalham". Portanto, quando a empresa é reconhecida no mercado de trabalho, demonstra que o seu processo com o capital humano é eficiente, apresentando maiores vantagens para os colaboradores que almejem estar naquela organização pelos seus benefícios, cultura, clima organizacional, oportunidade de crescimento e por suas capacitações.			
<b>CONCLUSOES</b>	Diante dos relatos supracitados, subteende-se a importância do processo que o recrutamento e seleção possui, pois, influência diretamente nos resultados da empresa, sendo o primeiro passo para contratar pessoas capacitadas e ter uma equipe qualificada para gerir os outros setores da empresa com eficiência, obtendo uma cultura mais adequada com a atualidade conseguindo realizar processos mais didáticos na hora de recrutar e selecionar um novo colaborador.			
<b>REFERENCIAS</b>	CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Manoeel, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas – 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999 Série Empreender: Por que investir em Gestão de Pessoas. G1. 2020. Disponível em: <a href="https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml">https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/09/25/serie-empreender-por-que-investir-em-gestao-de-pessoas.ghtml</a> . Acesso em: 24/08/2023.			

Ano	Cód. ...	Area	Tipo	Modalidade
2023	14976	Educação	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		3543897 - FERNANDO CRISPIM DE SOUZA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Diogo dos Santos Brauna		
<b>TITULO</b>	A evasão escolar no Ensino de Jovens e Adultos e suas consequências sociais			
<b>INTRODUCA O</b>	A evasão escolar no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é um desafio que compromete a estruturação educacional e social de uma parcela da população brasileira a qual restringe oportunidades a adultos que desejam ascender socialmente. Este problema traz consigo complexidades que fogem ao contexto da sala de aula e encontra raízes em fatores econômicos, sociais e pessoais, sendo tais questões profundas, nas quais os afetam em setores da sociedade civil, como exemplo o mercado de trabalho, participações civis e em seu desenvolvimento crítico perante a sociedade.			
<b>OBJETIVOS</b>	Este artigo tem como objetivo explorar as causas da evasão no EJA e examinar/apresentar suas consequências sociais, com fim de destacar a importância de oportunidades educacionais acessíveis e eficazes para jovens e adultos.			
<b>METODOLOGIA</b>	Será realizada pesquisa de dados bibliográficos e documentais quantitativos/qualitativos, onde analisaremos os dados estatísticos, demográficos, econômicos e sociais. A pesquisa também examinará as práticas políticas e educacionais vigentes dentro do período estabelecido no estudo, como intuito de que por meio desta abordagem entendamos as consequências geradas pela evasão escolar no EJA e suas principais causas.			
<b>RESULTADOS</b>	Como resultados parciais, a pesquisa identificou até o presente momento uma ausência significativa de estudos sobre os desafios do EJA na atualidade, em especial os que se referem a dinâmica social para além da necessidade do trabalho, sobretudo, nas periferias.			
<b>CONCLUSOES</b>	Com base nas pesquisas realizadas para a elaboração deste artigo, podemos compreender que os frutos de uma evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos podem ser danosos não somente ao contexto do indivíduo, este violados de seus direitos, mas também a sociedade que o contextualiza e não atua devidamente para o exercício deste dever constitucional, uma vez que seu custo torna se maior do que se não garantido, tanto em números econômicos como sociais. Cumpre ainda esclarecer que, esta condição estrutural provém de negligências meio a vulnerabilidade do sujeito e que não conta com os devidos incentivos necessários como a flexibilização, base curricular contextual ao seu "mundo" considerando assim os perfis de cada estudantes.			
<b>REFERENCIA S</b>	FRENANDES, Ana Paula Cunha dos Santos. Evasão na EJA: um desafio histórico. Universidade do Estado do Pará, Belém, fevereiro, 2019. Disponível no link: <a href="https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/990/1904">https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/990/1904</a> FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários a prática educativa. 37.ed.São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível no link: <a href="https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5019418/mod_resource/content/1/Pedagogia%20da%20Autonomia%20-%20livro%20completo.pdf">https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5019418/mod_resource/content/1/Pedagogia%20da%20Autonomia%20-%20livro%20completo.pdf</a> PATTO, Maria Helena souza. A produção do fracasso escolar: Histórias de submissão e rebeldia. 5.ed. São Paulo: Instituto de Psicologia - USP, 2022. Disponível no link: <a href="https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/932/844/3069">https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/932/844/3069</a> BARROS, R. P. et al. Consequências da Violação do Direito à Educação. Rio de Janeiro: INSPER, 2021. Disponível no link: <a href="https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/Consequ%C3%82ncias-da-Violac%C3%A7%C3%A3o-do-Direito-%C3%80-Educac%C3%A7%C3%A3o.pdf">https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2022/03/Consequ%C3%82ncias-da-Violac%C3%A7%C3%A3o-do-Direito-%C3%80-Educac%C3%A7%C3%A3o.pdf</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Titulo	Modalidade
2023	14977	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4356900 - MATHEUS EFFORI SILVA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao	Saulo dos Santos Gil	DANILO SALES BOCALINI (UFES)
<b>TITULO</b>	Repercussões do Treinamento Resistido Tradicional sobre a Pressão Arterial de Indivíduos Hipertensos e Medicamentados			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Não são novidades os benefícios que o exercício físico exerce sobre os diversos sistemas fisiológicos, contudo, do ponto de vista das adaptações relativas ao treinamento resistido sobre indivíduos hipertensos, recentes estudos têm surgido, mostrando que esse modelo de exercício também pode ser eficiente, assim como os exercícios aeróbios. Contudo, há uma ausência de estudos quando se diz respeito à periodização sem variação das cargas de trabalho ao longo dos micro e mesociclos. A este respeito, o conhecimento adquirido, sobretudo através de mecanismos, seja na prevenção, tratamento ou reabilitação, tanto da doença cardiovascular quanto de desordens no estilo de vida, torna-se relevante quando se pensa em manutenção da intensidade de exercício.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O objetivo do estudo foi analisar a influência do Treinamento Resistido Tradicional (TT), ajustado a cada mesociclo, sobre indivíduos sedentários hipertensos, homens e mulheres, que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que participavam do programa de extensão da Unisa (PAEC).</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para tanto, 7 indivíduos, sendo 4 homens e 4 mulheres, escolhidos de forma randomizada, foram submetidos ao TT resistido entre 8 e 12 semanas. O TT foi composto por 18 exercícios divididos em 3 dias semanais (treinos A, B e C), com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalos de 60 segundos de descanso entre as séries e exercícios, e com 60% de 1 repetição máxima (1 RM). Nas duas semanas que antecederam o início do treinamento, os 18 exercícios que fizeram parte do protocolo foram realizados para adaptação e aprendizado dos movimentos, além da realização dos testes de 1 RM para os ajustes mensais (mesociclo) das cargas. Assim, os seguintes parâmetros foram analisados: composição corporal, massa corporal semanal, pressão arterial sistêmica e frequência cardíaca (FC) pré e pós sessão de treino.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Não houve diferenças significativas nos valores antropométricos e na FC após o término do protocolo que cada participante conseguiu concluir, porém, houve significativo aumento da força no teste de 1RM (de 597,18 para 832,62kg), redução de 2,71 e 1,2mmHg na PA sistólica e diastólica, respectivamente, além do efeito hipotensor agudo ocorrido em várias sessões e de forma individual.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Podemos concluir que o TT realizado 3 vezes na semana foi capaz de aumentar a força muscular em todos os participantes, e exerceu maior resposta hipotensora, de forma aguda e crônica, nos indivíduos que apresentavam valores mais elevados da PA, mesmo medicamentados.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Cornelissen, VA; Smart, NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb 1;2(1): e004473. Fagard RH; Cornelissen VA. Effect of exercise on blood pressure control in hypertensive patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb;14(1):12-7. Moraes, MR; Bacurau, RF; Casarini, DE; Jara, ZP; Ronchi, FA; Almeida, SS; Higa, EM; Pudo, MA; Rosa, TS; Haro, AS; Barros, CC; Pesquero, JB; Würtele, M; Araujo, RC. Chronic conventional resistance exercise reduces blood pressure in stage 1 hypertensive men. J Strength Cond Res. 2012 Apr;26(4):1122-9.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14977	Educação Física	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4363795 - ROBERT GASTALDE CASERTA	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Mauro Sergio Perilhao	Saulo dos Santos Gil	DANILO SALES BOCALINI (UFES)
<b>TITULO</b>	Repercussões do Treinamento Resistido Tradicional sobre a Pressão Arterial de Indivíduos Hipertensos e Medicamentados			
<b>INTRODUÇÃO</b>	<p>Não são novidades os benefícios que o exercício físico exerce sobre os diversos sistemas fisiológicos, contudo, do ponto de vista das adaptações relativas ao treinamento resistido sobre indivíduos hipertensos, recentes estudos têm surgido, mostrando que esse modelo de exercício também pode ser eficiente, assim como os exercícios aeróbios. Contudo, há uma ausência de estudos quando se diz respeito à periodização sem variação das cargas de trabalho ao longo dos micro e mesociclos. A este respeito, o conhecimento adquirido, sobretudo através de mecanismos, seja na prevenção, tratamento ou reabilitação, tanto da doença cardiovascular quanto de desordens no estilo de vida, torna-se relevante quando se pensa em manutenção da intensidade de exercício.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	<p>O objetivo do estudo foi analisar a influência do Treinamento Resistido Tradicional (TT), ajustado a cada mesociclo, sobre indivíduos sedentários hipertensos, homens e mulheres, que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e que participavam do programa de extensão da Unisa (PAEC).</p>			
<b>METODOLOGIA</b>	<p>Para tanto, 7 indivíduos, sendo 4 homens e 4 mulheres, escolhidos de forma randomizada, foram submetidos ao TT resistido entre 8 e 12 semanas. O TT foi composto por 18 exercícios divididos em 3 dias semanais (treinos A, B e C), com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalos de 60 segundos de descanso entre as séries e exercícios, e com 60% de 1 repetição máxima (1 RM). Nas duas semanas que antecederam o início do treinamento, os 18 exercícios que fizeram parte do protocolo foram realizados para adaptação e aprendizado dos movimentos, além da realização dos testes de 1 RM para os ajustes mensais (mesociclo) das cargas. Assim, os seguintes parâmetros foram analisados: composição corporal, massa corporal semanal, pressão arterial sistêmica e frequência cardíaca (FC) pré e pós sessão de treino.</p>			
<b>RESULTADOS</b>	<p>Não houve diferenças significativas nos valores antropométricos e na FC após o término do protocolo que cada participante conseguiu concluir, porém, houve significativo aumento da força no teste de 1RM (de 597,18 para 832,62kg), redução de 2,71 e 1,2mmHg na PA sistólica e diastólica, respectivamente, além do efeito hipotensor agudo ocorrido em várias sessões e de forma individual.</p>			
<b>CONCLUSOES</b>	<p>Podemos concluir que o TT realizado 3 vezes na semana foi capaz de aumentar a força muscular em todos os participantes, e exerceu maior resposta hipotensora, de forma aguda e crônica, nos indivíduos que apresentavam valores mais elevados da PA, mesmo medicamentados.</p>			
<b>REFERENCIAS</b>	<p>Cornelissen, VA; Smart, NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb 1;2(1): e004473. Fagard RH; Cornelissen VA. Effect of exercise on blood pressure control in hypertensive patients. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb;14(1):12-7. Moraes, MR; Bacurau, RF; Casarini, DE; Jara, ZP; Ronchi, FA; Almeida, SS; Higa, EM; Pudo, MA; Rosa, TS; Haro, AS; Barros, CC; Pesquero, JB; Würtele, M; Araujo, RC. Chronic conventional resistance exercise reduces blood pressure in stage 1 hypertensive men. J Strength Cond Res. 2012 Apr;26(4):1122-9.</p>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14978	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233542 - CAMILA SUSANA MAIDA POMA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Desafios e Estratégias no Controle de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar			
<b>INTRODUCAO</b>	As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) são todas as ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com micro-organismos patogênicos (infeciosos, toxigenicos ou infestantes) podendo ser bactéria, vírus, parasitas e substâncias tóxicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual para a população. O material audiovisual deverá conter informações claras sobre o que é DTHA, formas de transmissão, tratamento, cuidados e prevenção. O material tem objetivo informar a população sobre as doenças e como combatê-las. O material escolhido foi o vídeo, por conter uma linguagem clara e objetiva, além de ser facilmente disseminado através de WhatsApp, redes sociais, Facebook, dentre outros.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para produção do material técnico e vídeo foi feito um levantamento bibliográfico através das principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). O vídeo é explicativo e visa informar a população do município de Guarulhos sobre todos os aspectos da DTHA. O material produzido será entregue aos agentes de saúde vinculados às UBS, para que seja transmitido para toda a população, através dos agentes comunitários de saúde, como uma linha de transmissão.			
<b>RESULTADOS</b>	Com o vídeo informativo sobre a Doença de Transmissão hídrica e alimentar (DTHA), podemos contribuir significativamente para a conscientização da população e a prevenção da doença da seguinte maneira: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSOES</b>	O vídeo pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que é a DTHA, como ela é transmitida e quais são os patógenos comuns envolvidos. Isso ajuda as pessoas a entenderem os riscos através de um vídeo informativo que pode destacar boas práticas de higiene na preparação, armazenamento e manuseio de alimentos, capacitando as pessoas a tomar medidas preventivas em suas cozinhas. Informar sobre surtos recentes de DTHA e como eles são investigados e controlados pode aumentar a conscientização sobre a seriedade do problema.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14978	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5235201 - LARISSA AGOSTINHO FERRAZ		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Desafios e Estratégias no Controle de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar			
<b>INTRODUCAO</b>	As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) são todas as ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com micro-organismos patogênicos (infeciosos, toxigenicos ou infestantes) podendo ser bactéria, vírus, parasitas e substâncias tóxicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual para a população. O material audiovisual deverá conter informações claras sobre o que é DTHA, formas de transmissão, tratamento, cuidados e prevenção. O material tem objetivo informar a população sobre as doenças e como combatê-las. O material escolhido foi o vídeo, por conter uma linguagem clara e objetiva, além de ser facilmente disseminado através de WhatsApp, redes sociais, Facebook, dentre outros.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para produção do material técnico e vídeo foi feito um levantamento bibliográfico através das principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). O vídeo é explicativo e visa informar a população do município de Guarulhos sobre todos os aspectos da DTHA. O material produzido será entregue aos agentes de saúde vinculados às UBS, para que seja transmitido para toda a população, através dos agentes comunitários de saúde, como uma linha de transmissão.			
<b>RESULTADOS</b>	Com o vídeo informativo sobre a Doença de Transmissão hídrica e alimentar (DTHA), podemos contribuir significativamente para a conscientização da população e a prevenção da doença da seguinte maneira: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSOES</b>	O vídeo pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que é a DTHA, como ela é transmitida e quais são os patógenos comuns envolvidos. Isso ajuda as pessoas a entenderem os riscos através de um vídeo informativo que pode destacar boas práticas de higiene na preparação, armazenamento e manuseio de alimentos, capacitando as pessoas a tomar medidas preventivas em suas cozinhas. Informar sobre surtos recentes de DTHA e como eles são investigados e controlados pode aumentar a conscientização sobre a seriedade do problema.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14978	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5243815 - PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BUFFA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Desafios e Estratégias no Controle de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar			
<b>INTRODUCAO</b>	As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) são todas as ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com micro-organismos patogênicos (infeciosos, toxigênicos ou infestantes) podendo ser bactéria, vírus, parasitas e substâncias tóxicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual para a população. O material audiovisual deverá conter informações claras sobre o que é DTHA, formas de transmissão, tratamento, cuidados e prevenção. O material tem objetivo informar a população sobre as doenças e como combatê-las. O material escolhido foi o vídeo, por conter uma linguagem clara e objetiva, além de ser facilmente disseminado através de WhatsApp, redes sociais, Facebook, dentre outros.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para produção do material técnico e vídeo foi feito um levantamento bibliográfico através das principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). O vídeo é explicativo e visa informar a população do município de Guarulhos sobre todos os aspectos da DTHA. O material produzido será entregue aos agentes de saúde vinculados às UBS, para que seja transmitido para toda a população, através dos agentes comunitários de saúde, como uma linha de transmissão.			
<b>RESULTADOS</b>	Com o vídeo informativo sobre a Doença de Transmissão hídrica e alimentar (DTHA), podemos contribuir significativamente para a conscientização da população e a prevenção da doença da seguinte maneira: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSOES</b>	O vídeo pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que é a DTHA, como ela é transmitida e quais são os patógenos comuns envolvidos. Isso ajuda as pessoas a entenderem os riscos através de um vídeo informativo que pode destacar boas práticas de higiene na preparação, armazenamento e manuseio de alimentos, capacitando as pessoas a tomar medidas preventivas em suas cozinhas. Informar sobre surtos recentes de DTHA e como eles são investigados e controlados pode aumentar a conscientização sobre a seriedade do problema.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#</a> : (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/</a> : (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14978	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5244218 - FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA MENDES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	Desafios e Estratégias no Controle de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar			
<b>INTRODUCAO</b>	As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) são todas as ocorrências clínicas consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com micro-organismos patogênicos (infecciosos, toxigênicos ou infestantes) podendo ser bactéria, vírus, parasitas e substâncias tóxicas.			
<b>OBJETIVOS</b>	O objetivo desse trabalho é a produção de um material audiovisual para a população. O material audiovisual deverá conter informações claras sobre o que é DTHA, formas de transmissão, tratamento, cuidados e prevenção. O material tem objetivo informar a população sobre as doenças e como combatê-las. O material escolhido foi o vídeo, por conter uma linguagem clara e objetiva, além de ser facilmente disseminado através de WhatsApp, redes sociais, Facebook, dentre outros.			
<b>METODOLOGIA</b>	Para produção do material técnico e vídeo foi feito um levantamento bibliográfico através das principais plataformas de pesquisa científica (Google Academic, Scielo e PubMed). O vídeo é explicativo e visa informar a população do município de Guarulhos sobre todos os aspectos da DTHA. O material produzido será entregue aos agentes de saúde vinculados às UBS, para que seja transmitido para toda a população, através dos agentes comunitários de saúde, como uma linha de transmissão.			
<b>RESULTADOS</b>	Com o vídeo informativo sobre a Doença de Transmissão hídrica e alimentar (DTHA), podemos contribuir significativamente para a conscientização da população e a prevenção da doença da seguinte maneira: <a href="https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh">https://youtu.be/bGJ-p6TM7tY?si=P-fkfb-vF1GGeOh</a>			
<b>CONCLUSOES</b>	O vídeo pode fornecer informações claras e acessíveis sobre o que é a DTHA, como ela é transmitida e quais são os patógenos comuns envolvidos. Isso ajuda as pessoas a entenderem os riscos através de um vídeo informativo que pode destacar boas práticas de higiene na preparação, armazenamento e manuseio de alimentos, capacitando as pessoas a tomar medidas preventivas em suas cozinhas. Informar sobre surtos recentes de DTHA e como eles são investigados e controlados pode aumentar a conscientização sobre a seriedade do problema.			
<b>REFERENCIAS</b>	<a href="https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:">https://www.gov.br/saude/pt-pr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha#:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/">https://sanityconsultoria.com/dtha-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar/:</a> (acessado em 18/10/2023) <a href="https://www.cevs.rs.gov.br/lacen">https://www.cevs.rs.gov.br/lacen</a> (acessado em 18/10/2023)			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14979	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5232856 - RODOLFO FERNANDES DA SILVA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
<b>TITULO</b>	LEPTOSPIROSE EM GUARULHOS - SP			
<b>INTRODUCAO</b>	Leptospirose uma doença infecciosa grave e se negligenciada pode afetar milhares de pessoas em todo o mundo. Ela pode se espalhar para os humanos principalmente através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados. Os sintomas vão desde febre e cefaleias musculares até complicações mais graves, como insuficiência renal e hepática, a leptospirose é uma ameaça à saúde pública, ela merece investigação cuidadosa, onde as condições ambientais e sociais podem contribuir para a propagação da doença dos moradores de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Educar e orientar grupos-alvo nas unidades básicas de saúde Desenvolver conhecimento e aumentar a conscientização sobre a leptospirose e seus riscos e prevenção, para adotar comportamentos relacionados à saúde com o intuito de facilitar mudanças positivas em suas vidas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conscientização da população através de vídeo no youtube, contatos pessoais em UBS localizadas em áreas de risco de enchentes, por meio de palestras e interações diretas, visando uma melhor disseminação das informações.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado positivo é a adesão das pessoas às práticas de promoção da saúde, especialmente nas zonas periurbanas onde são mais susceptíveis à doença. A sensibilização e a educação para a saúde são ferramentas poderosas para reduzir os riscos para a saúde pública e este trabalho tem potencial para aumento da sensibilização e aderência de comportamentos saudáveis entre a população-alvo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Fica evidente que o conhecimento como meio de melhoria na prevenção sobre a doença é indispensável para conseguir combater essa enfermidade, pois terá a função de instruir a população e de realizar o controle da leptospirose em humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	REFERÊNCIA: Livro: Microbiologia 3ª Edição – Flavio Alterthum Livro: Tratado de Infectologia – Veronese Lemos, A.D.S. D., (#38) Lins, R. S. (2023). Doenças infecciosas na emergência: diagnóstico e tratamento. Editora Manole. <a href="https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232">https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232</a> Bibliografia: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose</a> Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009- no prelo. <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14979	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5233780 - MARIAH GIULIA BADARACO DE ALMEIDA		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	LEPTOSPIROSE EM GUARULHOS - SP			
<b>INTRODUCAO</b>	Leptospirose uma doença infecciosa grave e se negligenciada pode afetar milhares de pessoas em todo o mundo. Ela pode se espalhar para os humanos principalmente através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados. Os sintomas vão desde febre e cefaleias musculares até complicações mais graves, como insuficiência renal e hepática, a leptospirose é uma ameaça à saúde pública, ela merece investigação cuidadosa, onde as condições ambientais e sociais podem contribuir para a propagação da doença dos moradores de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Educar e orientar grupos-alvo nas unidades básicas de saúde Desenvolver conhecimento e aumentar a conscientização sobre a leptospirose e seus riscos e prevenção, para adotar comportamentos relacionados à saúde com o intuito de facilitar mudanças positivas em suas vidas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conscientização da população através de vídeo no youtube, contatos pessoais em UBS localizadas em áreas de risco de enchentes, por meio de palestras e interações diretas, visando uma melhor disseminação das informações.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado positivo é a adesão das pessoas às práticas de promoção da saúde, especialmente nas zonas periurbanas onde são mais susceptíveis à doença. A sensibilização e a educação para a saúde são ferramentas poderosas para reduzir os riscos para a saúde pública e este trabalho tem potencial para aumento da sensibilização e aderência de comportamentos saudáveis entre a população-alvo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Fica evidente que o conhecimento como meio de melhoria na prevenção sobre a doença é indispensável para conseguir combater essa enfermidade, pois terá a função de instruir a população e de realizar o controle da leptospirose em humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	REFERÊNCIA: Livro: Microbiologia 3ª Edição – Flavio Alterthum Livro: Tratado de Infectologia – Veronese Lemos, A.D.S. D., (#38) Lins, R. S. (2023). Doenças infecciosas na emergência: diagnóstico e tratamento. Editora Manole. <a href="https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232">https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232</a> Bibliografia: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose</a> Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009- no prelo. <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14979	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		<b>Orientador 1</b>		<b>Orientador 2</b>
		<b>Orientador Externo</b>		
		5237467 - ALEX PEREIRA MACENA DA SILVA		2 - Aprovado
		Fabio Fernandes Roxo		Daniella Pereira Fagundes de França
<b>TITULO</b>	LEPTOSPIROSE EM GUARULHOS - SP			
<b>INTRODUCAO</b>	Leptospirose uma doença infecciosa grave e se negligenciada pode afetar milhares de pessoas em todo o mundo. Ela pode se espalhar para os humanos principalmente através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados. Os sintomas vão desde febre e cefaleias musculares até complicações mais graves, como insuficiência renal e hepática, a leptospirose é uma ameaça à saúde pública, ela merece investigação cuidadosa, onde as condições ambientais e sociais podem contribuir para a propagação da doença dos moradores de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Educar e orientar grupos-alvo nas unidades básicas de saúde Desenvolver conhecimento e aumentar a conscientização sobre a leptospirose e seus riscos e prevenção, para adotar comportamentos relacionados à saúde com o intuito de facilitar mudanças positivas em suas vidas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conscientização da população através de vídeo no youtube, contatos pessoais em UBS localizadas em áreas de risco de enchentes, por meio de palestras e interações diretas, visando uma melhor disseminação das informações.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado positivo é a adesão das pessoas às práticas de promoção da saúde, especialmente nas zonas periurbanas onde são mais susceptíveis à doença. A sensibilização e a educação para a saúde são ferramentas poderosas para reduzir os riscos para a saúde pública e este trabalho tem potencial para aumento da sensibilização e aderência de comportamentos saudáveis entre a população-alvo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Fica evidente que o conhecimento como meio de melhoria na prevenção sobre a doença é indispensável para conseguir combater essa enfermidade, pois terá a função de instruir a população e de realizar o controle da leptospirose em humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	REFERÊNCIA: Livro: Microbiologia 3ª Edição – Flavio Alterthum Livro: Tratado de Infectologia – Veronese Lemos, A.D.S. D., (#38) Lins, R. S. (2023). Doenças infecciosas na emergência: diagnóstico e tratamento. Editora Manole. <a href="https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232">https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232</a> Bibliografia: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose</a> Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009- no prelo. <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14979	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5243611 - ELISABETE QUIRINO DINIZ		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	LEPTOSPIROSE EM GUARULHOS - SP			
<b>INTRODUCAO</b>	Leptospirose uma doença infecciosa grave e se negligenciada pode afetar milhares de pessoas em todo o mundo. Ela pode se espalhar para os humanos principalmente através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados. Os sintomas vão desde febre e cefaleias musculares até complicações mais graves, como insuficiência renal e hepática, a leptospirose é uma ameaça à saúde pública, ela merece investigação cuidadosa, onde as condições ambientais e sociais podem contribuir para a propagação da doença dos moradores de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Educar e orientar grupos-alvo nas unidades básicas de saúde Desenvolver conhecimento e aumentar a conscientização sobre a leptospirose e seus riscos e prevenção, para adotar comportamentos relacionados à saúde com o intuito de facilitar mudanças positivas em suas vidas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conscientização da população através de vídeo no youtube, contatos pessoais em UBS localizadas em áreas de risco de enchentes, por meio de palestras e interações diretas, visando uma melhor disseminação das informações.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado positivo é a adesão das pessoas às práticas de promoção da saúde, especialmente nas zonas periurbanas onde são mais susceptíveis à doença. A sensibilização e a educação para a saúde são ferramentas poderosas para reduzir os riscos para a saúde pública e este trabalho tem potencial para aumento da sensibilização e aderência de comportamentos saudáveis entre a população-alvo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Fica evidente que o conhecimento como meio de melhoria na prevenção sobre a doença é indispensável para conseguir combater essa enfermidade, pois terá a função de instruir a população e de realizar o controle da leptospirose em humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	REFERÊNCIA: Livro: Microbiologia 3ª Edição – Flavio Alterthum Livro: Tratado de Infectologia – Veronese Lemos, A.D.S. D., (#38) Lins, R. S. (2023). Doenças infecciosas na emergência: diagnóstico e tratamento. Editora Manole. <a href="https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232">https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232</a> Bibliografia: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose</a> Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009- no prelo. <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14979	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		5243742 - TEREZA MIDORI SUGIMOTO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	LEPTOSPIROSE EM GUARULHOS - SP			
<b>INTRODUCAO</b>	Leptospirose uma doença infecciosa grave e se negligenciada pode afetar milhares de pessoas em todo o mundo. Ela pode se espalhar para os humanos principalmente através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados. Os sintomas vão desde febre e cefaleias musculares até complicações mais graves, como insuficiência renal e hepática, a leptospirose é uma ameaça à saúde pública, ela merece investigação cuidadosa, onde as condições ambientais e sociais podem contribuir para a propagação da doença dos moradores de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Educar e orientar grupos-alvo nas unidades básicas de saúde Desenvolver conhecimento e aumentar a conscientização sobre a leptospirose e seus riscos e prevenção, para adotar comportamentos relacionados à saúde com o intuito de facilitar mudanças positivas em suas vidas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conscientização da população através de vídeo no youtube, contatos pessoais em UBS localizadas em áreas de risco de enchentes, por meio de palestras e interações diretas, visando uma melhor disseminação das informações.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado positivo é a adesão das pessoas às práticas de promoção da saúde, especialmente nas zonas periurbanas onde são mais susceptíveis à doença. A sensibilização e a educação para a saúde são ferramentas poderosas para reduzir os riscos para a saúde pública e este trabalho tem potencial para aumento da sensibilização e aderência de comportamentos saudáveis entre a população-alvo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Fica evidente que o conhecimento como meio de melhoria na prevenção sobre a doença é indispensável para conseguir combater essa enfermidade, pois terá a função de instruir a população e de realizar o controle da leptospirose em humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	REFERÊNCIA: Livro: Microbiologia 3ª Edição – Flavio Alterthum Livro: Tratado de Infectologia – Veronese Lemos, A.D.S. D., (#38) Lins, R. S. (2023). Doenças infecciosas na emergência: diagnóstico e tratamento. Editora Manole. <a href="https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232">https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232</a> Bibliografia: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose</a> Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009- no prelo. <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade">https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14979	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5243939 - VALQUIRIA GOMES DE MATTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	LEPTOSPIROSE EM GUARULHOS - SP			
<b>INTRODUCAO</b>	Leptospirose uma doença infecciosa grave e se negligenciada pode afetar milhares de pessoas em todo o mundo. Ela pode se espalhar para os humanos principalmente através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados. Os sintomas vão desde febre e cefaleias musculares até complicações mais graves, como insuficiência renal e hepática, a leptospirose é uma ameaça à saúde pública, ela merece investigação cuidadosa, onde as condições ambientais e sociais podem contribuir para a propagação da doença dos moradores de Guarulhos.			
<b>OBJETIVOS</b>	Educar e orientar grupos-alvo nas unidades básicas de saúde Desenvolver conhecimento e aumentar a conscientização sobre a leptospirose e seus riscos e prevenção, para adotar comportamentos relacionados à saúde com o intuito de facilitar mudanças positivas em suas vidas.			
<b>METODOLOGIA</b>	Conscientização da população através de vídeo no youtube, contatos pessoais em UBS localizadas em áreas de risco de enchentes, por meio de palestras e interações diretas, visando uma melhor disseminação das informações.			
<b>RESULTADOS</b>	O resultado positivo é a adesão das pessoas às práticas de promoção da saúde, especialmente nas zonas periurbanas onde são mais susceptíveis à doença. A sensibilização e a educação para a saúde são ferramentas poderosas para reduzir os riscos para a saúde pública e este trabalho tem potencial para aumento da sensibilização e aderência de comportamentos saudáveis entre a população-alvo.			
<b>CONCLUSOES</b>	Fica evidente que o conhecimento como meio de melhoria na prevenção sobre a doença é indispensável para conseguir combater essa enfermidade, pois terá a função de instruir a população e de realizar o controle da leptospirose em humanos.			
<b>REFERENCIAS</b>	REFERÊNCIA: Livro: Microbiologia 3ª Edição – Flavio Alterthum Livro: Tratado de Infectologia – Veronese Lemos, A.D.S. D., (#38) Lins, R. S. (2023). Doenças infecciosas na emergência: diagnóstico e tratamento. Editora Manole. <a href="https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232">https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555763232</a> Bibliografia: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/articulo/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose">https://www.guarulhos.sp.gov.br/articulo/medicos-e-enfermeiros-de-guarulhos-participam-de-capitacao-sobre-leptospirose</a> Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009- no prelo. <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/articulo/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade">https://www.guarulhos.sp.gov.br/articulo/prefeitura-vistoria-areas-atingidas-por-alagamentos-em-cumbica-e-no-jardim-nova-cidade</a> .			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14980	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
				<b>Apresentação</b>
		3436985 - GLAUCIA SOUZA RAMOS JUNQUEIRA FRANCO		2 - Aprovado
				1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM FOCO EM MEDIDAS DE PREVENÇÃO À DENGUE NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Nos últimos anos, os dados epidemiológicos em relação à dengue informam, ainda é um tema de saúde pública que precisa de atenção. Sendo assim, o número de óbitos acende a alerta para a prevenção em Guarulhos e reforça a importância de ações para o combate aos criadouros do mosquito. Segundo dados, do Portal da Prefeitura, de 1º de janeiro até a data de 18 de maio, foram confirmados 942 casos em Guarulhos e dentro desses, 1 óbito. Com isso, percebe-se que é um tema relevante e que precisa ser considerado nas agendas e campanhas que devem ser realizadas junto às comunidades.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os dados epidemiológicos referentes à dengue no município de Guarulhos e com isso, produzir material didático impresso, para a distribuição nas UBS e escolas do município de Guarulhos. Além disso, como objetivo principal, em iniciativas futuras do trabalho, pretendemos somar junto às políticas públicas, com a elaboração de mais instrumentos norteadores de Campanhas de Prevenção à Dengue.			
<b>METODOLOGIA</b>	A coleta de dados epidemiológicos, foi feita através de informações fornecidos pela Prefeitura de Guarulhos e também de artigos científicos. Após a coleta de dados, elaboramos questionários diagnósticos e materiais impressos que serão distribuídos para a UBS do JOVAIA e um Colégio da rede pública de Ensino. A estimativa é que mais de 5.000 famílias sejam impactadas positivamente por essa ação.			
<b>RESULTADOS</b>	De primeira instância foram produzidos os questionários diagnósticos, e um Informativo direcionado para o público da UBS. Em seguida, foram elaborados os Planos de aulas e materiais para as aulas teóricas e práticas e materiais impressos, esses que serão utilizados no Colégio da rede pública de ensino de Guarulhos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os dados epidemiológicos informam que a Dengue ainda é um problema grave, evidenciando que é de grande importância continuar o trabalho de prevenção, de inúmeras formas, e uma delas é através de materiais impressos. Para que mais famílias possam ser orientadas e que essa conscientização possa ir além da UBS, e também além da sala de aula.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Elmec AM, Bataiero MO, Cruz MGB. Saneamento do meio, arboviroses e as estratégias de Vigilância Sanitária para combate aos vetores no Estado de São Paulo. BEPA 2016; 13(153-154):63-68 Faria, M. T. da S., Ribeiro, N. R. de S., Dias, A. P., Gomes, U. A. F., (#38) Moura, P. M. (2023). Saúde e saneamento: uma avaliação das políticas públicas de prevenção, controle e contingência das arboviroses no Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 28(6), 1767- 1776. <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022">https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022</a> . Lima E.C, Vilasbôas ALQ. Implantação das ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue na Bahia, Brasil. Cad Saude Publica 2011; 27(8):1507-1519.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14980	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5060788 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA RAMOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM FOCO EM MEDIDAS DE PREVENÇÃO À DENGUE NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Nos últimos anos, os dados epidemiológicos em relação à dengue informam, ainda é um tema de saúde pública que precisa de atenção. Sendo assim, o número de óbitos acende a alerta para a prevenção em Guarulhos e reforça a importância de ações para o combate aos criadouros do mosquito. Segundo dados, do Portal da Prefeitura, de 1º de janeiro até a data de 18 de maio, foram confirmados 942 casos em Guarulhos e dentro desses, 1 óbito. Com isso, percebe-se que é um tema relevante e que precisa ser considerado nas agendas e campanhas que devem ser realizadas junto às comunidades.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os dados epidemiológicos referentes à dengue no município de Guarulhos e com isso, produzir material didático impresso, para a distribuição nas UBS e escolas do município de Guarulhos. Além disso, como objetivo principal, em iniciativas futuras do trabalho, pretendemos somar junto às políticas públicas, com a elaboração de mais instrumentos norteadores de Campanhas de Prevenção à Dengue.			
<b>METODOLOGIA</b>	A coleta de dados epidemiológicos, foi feita através de informações fornecidos pela Prefeitura de Guarulhos e também de artigos científicos. Após a coleta de dados, elaboramos questionários diagnósticos e materiais impressos que serão distribuídos para a UBS do JOVAIA e um Colégio da rede pública de Ensino. A estimativa é que mais de 5.000 famílias sejam impactadas positivamente por essa ação.			
<b>RESULTADOS</b>	De primeira instância foram produzidos os questionários diagnósticos, e um Informativo direcionado para o público da UBS. Em seguida, foram elaborados os Planos de aulas e materiais para as aulas teóricas e práticas e materiais impressos, esses que serão utilizados no Colégio da rede pública de ensino de Guarulhos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os dados epidemiológicos informam que à Dengue ainda é um problema grave, evidenciando que é de grande importância continuar o trabalho de prevenção, de inúmeras formas, e uma delas é através de materiais impressos. Para que mais famílias possam ser orientadas e que essa conscientização possa ir além da UBS, e também além da sala de aula.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Elmec AM, Bataiero MO, Cruz MGB. Saneamento do meio, arboviroses e as estratégias de Vigilância Sanitária para combate aos vetores no Estado de São Paulo. BEPA 2016; 13(153-154):63-68 Faria, M. T. da S., Ribeiro, N. R. de S., Dias, A. P., Gomes, U. A. F., (#38) Moura, P. M. (2023). Saúde e saneamento: uma avaliação das políticas públicas de prevenção, controle e contingência das arboviroses no Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 28(6), 1767- 1776. <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022">https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022</a> . Lima E.C, Vilasbôas ALQ. Implantação das ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue na Bahia, Brasil. Cad Saude Publica 2011; 27(8):1507-1519.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14980	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		Autor		Status
		5243122 - TATIANE BISPO ALVES		2 - Aprovado
		Orientador 1	Orientador 2	Orientador Externo
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
TITULO	EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM FOCO EM MEDIDAS DE PREVENÇÃO À DENGUE NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
INTRODUÇÃO	Nos últimos anos, os dados epidemiológicos em relação à dengue informam, ainda é um tema de saúde pública que precisa de atenção. Sendo assim, o número de óbitos acende a alerta para a prevenção em Guarulhos e reforça a importância de ações para o combate aos criadouros do mosquito. Segundo dados, do Portal da Prefeitura, de 1º de janeiro até a data de 18 de maio, foram confirmados 942 casos em Guarulhos e dentro desses, 1 óbito. Com isso, percebe-se que é um tema relevante e que precisa ser considerado nas agendas e campanhas que devem ser realizadas junto às comunidades.			
OBJETIVOS	Analisar os dados epidemiológicos referentes à dengue no município de Guarulhos e com isso, produzir material didático impresso, para a distribuição nas UBS e escolas do município de Guarulhos. Além disso, como objetivo principal, em iniciativas futuras do trabalho, pretendemos somar junto às políticas públicas, com a elaboração de mais instrumentos norteadores de Campanhas de Prevenção à Dengue.			
METODOLOGIA	A coleta de dados epidemiológicos, foi feita através de informações fornecidos pela Prefeitura de Guarulhos e também de artigos científicos. Após a coleta de dados, elaboramos questionários diagnósticos e materiais impressos que serão distribuídos para a UBS do JOVAIA e um Colégio da rede pública de Ensino. A estimativa é que mais de 5.000 famílias sejam impactadas positivamente por essa ação.			
RESULTADOS	De primeira instância foram produzidos os questionários diagnósticos, e um Informativo direcionado para o público da UBS. Em seguida, foram elaborados os Planos de aulas e materiais para as aulas teóricas e práticas e materiais impressos, esses que serão utilizados no Colégio da rede pública de ensino de Guarulhos.			
CONCLUSÕES	Os dados epidemiológicos informam que à Dengue ainda é um problema grave, evidenciando que é de grande importância continuar o trabalho de prevenção, de inúmeras formas, e uma delas é através de materiais impressos. Para que mais famílias possam ser orientadas e que essa conscientização possa ir além da UBS, e também além da sala de aula.			
REFERÊNCIAS	Elmec AM, Bataiero MO, Cruz MGB. Saneamento do meio, arboviroses e as estratégias de Vigilância Sanitária para combate aos vetores no Estado de São Paulo. BEPA 2016; 13(153-154):63-68 Faria, M. T. da S., Ribeiro, N. R. de S., Dias, A. P., Gomes, U. A. F., (#38) Moura, P. M. (2023). Saúde e saneamento: uma avaliação das políticas públicas de prevenção, controle e contingência das arboviroses no Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 28(6), 1767- 1776. <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022">https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022</a> . Lima E.C, Vilasbôas ALQ. Implantação das ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue na Bahia, Brasil. Cad Saude Publica 2011; 27(8):1507-1519.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14980	Medicina	3 - Extensão	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		5244234 - ARTHUR COSMOS PEREZ		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Fabio Fernandes Roxo	Daniella Pereira Fagundes de França	
<b>TITULO</b>	EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM FOCO EM MEDIDAS DE PREVENÇÃO À DENGUE NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Nos últimos anos, os dados epidemiológicos em relação à dengue informam, ainda é um tema de saúde pública que precisa de atenção. Sendo assim, o número de óbitos acende a alerta para a prevenção em Guarulhos e reforça a importância de ações para o combate aos criadouros do mosquito. Segundo dados, do Portal da Prefeitura, de 1º de janeiro até a data de 18 de maio, foram confirmados 942 casos em Guarulhos e dentro desses, 1 óbito. Com isso, percebe-se que é um tema relevante e que precisa ser considerado nas agendas e campanhas que devem ser realizadas junto às comunidades.			
<b>OBJETIVOS</b>	Analisar os dados epidemiológicos referentes à dengue no município de Guarulhos e com isso, produzir material didático impresso, para a distribuição nas UBS e escolas do município de Guarulhos. Além disso, como objetivo principal, em iniciativas futuras do trabalho, pretendemos somar junto às políticas públicas, com a elaboração de mais instrumentos norteadores de Campanhas de Prevenção à Dengue.			
<b>METODOLOGIA</b>	A coleta de dados epidemiológicos, foi feita através de informações fornecidos pela Prefeitura de Guarulhos e também de artigos científicos. Após a coleta de dados, elaboramos questionários diagnósticos e materiais impressos que serão distribuídos para a UBS do JOVAIA e um Colégio da rede pública de Ensino. A estimativa é que mais de 5.000 famílias sejam impactadas positivamente por essa ação.			
<b>RESULTADOS</b>	De primeira instância foram produzidos os questionários diagnósticos, e um Informativo direcionado para o público da UBS. Em seguida, foram elaborados os Planos de aulas e materiais para as aulas teóricas e práticas e materiais impressos, esses que serão utilizados no Colégio da rede pública de ensino de Guarulhos.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Os dados epidemiológicos informam que à Dengue ainda é um problema grave, evidenciando que é de grande importância continuar o trabalho de prevenção, de inúmeras formas, e uma delas é através de materiais impressos. Para que mais famílias possam ser orientadas e que essa conscientização possa ir além da UBS, e também além da sala de aula.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	Elmec AM, Bataiero MO, Cruz MGB. Saneamento do meio, arboviroses e as estratégias de Vigilância Sanitária para combate aos vetores no Estado de São Paulo. BEPA 2016; 13(153-154):63-68 Faria, M. T. da S., Ribeiro, N. R. de S., Dias, A. P., Gomes, U. A. F., (#38) Moura, P. M. (2023). Saúde e saneamento: uma avaliação das políticas públicas de prevenção, controle e contingência das arboviroses no Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 28(6), 1767- 1776. <a href="https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022">https://doi.org/10.1590/1413-81232023286.07622022</a> . Lima E.C, Vilasbôas ALQ. Implantação das ações intersetoriais de mobilização social para o controle da dengue na Bahia, Brasil. Cad Saude Publica 2011; 27(8):1507-1519.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14982	História do Brasil República	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4361628 - ANDRE DA SILVA LEMOS	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Jussara Parada Amed		
<b>TITULO</b>	Revolra da Vacina, conflitos políticos e suas fraturas sociais.			
<b>INTRODUCA O</b>	<p>A intenção deste trabalho é compreender os conflitos políticos e suas fraturas sociais no final século. XIX ao início século XX através dos partidos políticos e suas estratégias além de seus interesses partidários em 1904 no Rio de Janeiro no evento que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Neste momento quem presidia o Brasil era o Presidente Rodrigues Alves, na prefeitura, Pereira Passos e como responsável pela aérea da saúde o médico Oswaldo Cruz. A abertura dos portos promoveu a aproximação do Brasil com outras nações europeias, e não apenas com Portugal. Essa diversidade de negociações de produtos europeus não poderia ser rompida, mas as doenças como febre amarela, cachumba, sarampo e a varíola, ceifavam vidas na Capital Federal, deixando uma péssima visão aos estrangeiros que aqui chegavam. Desse modo, foi implantado pelo governo Federal e Estadual as campanhas de vacinação e a modernização da Cidade do Rio de Janeiro com a construção de bulevares, lojas, portos, ruas largas, numa clara referência das cidades modernas europeias, e num claro propósito de retirar do novo centro da cidade a população mais pobre e cortiços.</p>			
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender os conflitos políticos e suas fraturas sociais no final do Século XIX e início do século XX no Rio de Janeiro.			
<b>METODOLOGIA</b>	A comparação e a análise dos partidos políticos brasileiros quando o Brasil iniciava a sua República; análise do historiador José Murilo de Carvalho e Nicolau Sevcenko, quanto as perspectivas de cada um destes autores.			
<b>RESULTADO S</b>	No final do segundo reinado foi analisado dois partidos: liberal e conservador: Os conservadores defendiam um governo imperial forte e centralizado, enquanto os liberais lutavam por uma descentralização, concedendo certa autonomia às províncias. Conservadorismo e liberalismo são duas correntes de pensamentos que estão ligadas historicamente, resultando um ajuste das elites brasileiras à modernidade a partir da exclusão social daqueles que viviam e habitavam na principais cidade do país.			
<b>CONCLUSOE S</b>	Os artigos pesquisados nos mostraram que durante final século XIX e início do XX os envolvidos nos cargos políticos historicamente agiam de acordo com os interesses da elite brasileira. A abertura dos portos na era das transformações econômicas e da busca pelo poder, propiciou à países "novos" adotarem estratégia capitalista para atingirem seus objetivos. Desse modo, independente das circunstâncias era necessário atingir os respectivos proposito. No entanto, havia no caminho cidades e povos, bairros e comunidades que seriam devastados de forma cruel e insana. Porém, a campanha de imunização, se tornou um mecanismo para dispersar essa população que ficava em torno centro da cidade Rio de Janeiro e próximo aos portos: local de chegada dos europeus e de a entrada de produtos ingleses. Nesse sentido, esse estudo analisou conflitos políticos e sociais devido a misérias de muitos e regalias de poucos.			
<b>REFERENCIAS</b>	CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados, SP: Cia das Letras 1998. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros; MG: Editora UFMG, 2008. SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina, SP: Ed. Brasiliense, 1987.			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14983	Ciências da Saúde	8 - Trabalhos científicos	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>		<b>Status</b>
		3711293 - GISELE SAMPAIO SANTOS		2 - Aprovado
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Marli Reinado Barbosa		
<b>TITULO</b>	Ação do Plasma Rico em Plaquetas no tratamento na Dor em Joelho			
<b>INTRODUCAO</b>	O plasma Rico em Plaquetas (PRP) é uma das opções em terapia regenerativa, existe um potencial benefício, tanto no tratamento de lesões agudas como no tratamento de lesões crônico-degenerativas. Ainda não se sabe exatamente quais são todos os mecanismos de ação do Plasma Rico em Plaquetas (PRP), mas estudos de laboratórios mostram que as altas concentrações de fatores de crescimento conseguidas com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) podem regular a ação de metaloproteinases e ativar mecanismos regeneradores da matriz, tais como a síntese do colágeno e dos proteoglicanos, assim, acelerar o processo de cicatrização dos tecidos assim, como atenuante dar dor.			
<b>OBJETIVOS</b>	Relatar as fases de tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) em pacientes com dores no joelho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Como metodologia de pesquisa a revisão de literatura, com abordagem qualitativa e quantitativa. Foram definidos como critério de inclusão: objeto de estudo (essência e natureza); idioma (português/Brasil); Acesso (disponível eletronicamente); Integralidade (artigos em sua totalidade); Artigos indexados nas bases de dados consultadas eletronicamente. Como critérios de exclusão foram escolhidos: artigos que não possuíam disponibilidade do texto na íntegra; estudos duplicados e os que não preenchiam os critérios de inclusão.			
<b>RESULTADOS</b>				
<b>CONCLUSOES</b>	Pode-se notar que o tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) pode ser bastante promissor, mais até o momento faltam boas evidências científicas para respaldar esse tratamento, e apesar de se tratar de um procedimento que ainda carece de melhores evidências, por outro lado o procedimento é extremamente seguro e com baixíssimo risco de complicações.			
<b>REFERENCIAS</b>	GUERREIRO, J.P.F.; DANIELI, M.V.; QUEIROZ, A.O.; DEFFUNE, E.; FERREIRA, R.R. Plasma rico em Plaquetas (PRP) aplicado na artroplastia total do joelho. Disponível em: (#60) <a href="https://www.scielo.br/j/rbort/a/6KW3pqSdhCZmQQMdkRKOqfGC/?lang=pt(#38)format=pdf">https://www.scielo.br/j/rbort/a/6KW3pqSdhCZmQQMdkRKOqfGC/?lang=pt(#38)format=pdf</a> : Acesso: 20 de ago de 2023. SCHNEIDE, K.V.M.; SILVA, R.B.B. Plasma rico em plaquetas (PRP): classificação, mecanismos de ação e métodos de obtenção. Disponível em: <a href="https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/3184/1908">https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/3184/1908</a> Acesso: 21 de ago de 2023			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14993	Ciências Biológicas	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4405081 - ARTHUR VANNI LOPES	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
				DR. BRUNO VIANA NAVARRO
<b>TITULO</b>	CARACTERIZAÇÃO TRANSCRICIONAL DA VIA DA TREALOSE-6-FOSFATO AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR			
<b>INTRODUÇÃO</b>	Ao longo do desenvolvimento das plantas, diferentes sinais de açúcar são gerados nos órgãos fonte e dreno em resposta ao metabolismo de carbono. Dentre estes, a trealose-6-fosfato (Tre6P) destaca-se como um regulador dos níveis de sacarose. A superexpressão em cana-de-açúcar dos genes trealose-6-fosfato sintase (TPS) e trealose-6-fosfato fosfatase (TPP) de <i>Escherichia coli</i> levou, respectivamente, a redução e ao aumento dos níveis de sacarose nas plantas transgênicas, demonstrando que a manipulação do metabolismo de Tre6P tem o potencial de modificar o acúmulo de açúcares nesta espécie.			
<b>OBJETIVOS</b>	Determinar as diferenças de expressão entre sequências da via da biossíntese de trealose em cana-de-açúcar, para prospecção de novas estratégias que futuramente possam levar ao aumento no acúmulo de sacarose nesta cultivar.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foram recuperadas sequências nucleotídicas e proteicas no banco de dados de cana-de-açúcar (variedade SP80-3280) Target Amplicon Seq (TAS), em que foi avaliado o desenvolvimento das folhas e colmos à campo ao longo de 1, 3, 6 e 12 meses de cultivo. Avaliamos as estruturas proteicas e seus respectivos domínios, foram também geradas árvores filogenéticas para os alvos TPS, TPP e TRE. Foram obtidos iniciadores específicos para os alvos analisados e a expressão gênica destes foi avaliada via RT-qPCR. Os níveis de expressão obtidos foram contrastados contra o TAS para a validação do banco.			
<b>RESULTADOS</b>	Foram obtidos 42 sequências da via da Tre6P. Assim retiramos sequências redundantes entre elas por um alinhamento par-a-par sobrando 27 sequências. Avaliamos também os valores de expressão destas alvos em bancos de transcriptoma de cana-de-açúcar e uma TPS I se sobressaiu perante as outras. Vimos os respectivos domínios das sequências proteicas sendo que para TPS possuíam domínios do tipo glicosiltransferase família 20 e Trealose fosfatase, TPP Trealose fosfatase e para TRE, o domínio trealase. Árvores filogenéticas destes três alvos seguiram a topologia esperada. Dentre as 27 sequências, 8 foram selecionadas para fazer RT-qPCR. TPS I obtiveram maiores valores de expressão de folha e colmo entre (6 e 12 meses). Estes alvos possuem uma alta correlação com os valores encontrados no TAS. Para TPS classe II o maior valor de expressão de folha foi no mês 3 e em colmo no mês 12, para TPP valores variados e TRE o colmo são expressivamente maiores.			
<b>CONCLUSÕES</b>	Este projeto demonstrou resultados que reforçam a importância de estudar os alvos da via da Tre6P. Foram obtidos valores de expressão em Folha e colmo da cana ao longo do seu desenvolvimento a campo, o que contribui para a elucidação do mecanismo de regulação fonte-dreno.			
<b>REFERÊNCIAS</b>	DE OLIVEIRA et al. (2022) Bioinformatic analyses to uncover genes involved in trehalose metabolism in the polyploid sugarcane. <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-022-11508-x">https://doi.org/10.1038/s41598-022-11508-x</a> FIGUEROA e LUNN (2016). A tale of two sugars: trehalose 6-phosphate and sucrose. <a href="https://doi.org/10.1104/pp.16.00417">https://doi.org/10.1104/pp.16.00417</a> DE SOUZA, et al. (2018). Diurnal variation in gas exchange and nonstructural carbohydrates throughout sugarcane development. <a href="https://doi.org/10.1071/FP17268">https://doi.org/10.1071/FP17268</a>			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14994	Odontologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4378792 - JENNIFER CAROLINA COSME CAMARGO	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA CASOS DE NECROSE INDUZIDA POR USO DE BISFOSFONATOS			
<b>INTRODUCAO</b>	Os bisfosfonatos são fármacos com alta afinidade pela hidroxiapatita comumente usados em doenças ósseas, influenciando seu metabolismo através da inibição da ação de osteoclastos e, consequentemente dos osteoblastos, deixando o paciente suscetível a osteonecrose.			
<b>OBJETIVOS</b>	Apontar métodos de diagnóstico convenientes ao cirurgião dentista para casos de osteonecrose por Bisfosfonatos, sua classificação, prevenção e abordagem odontológica			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema, através das plataformas: google acadêmico, pubmed e scielo, dos artigos obtidos, 6 foram selecionados para compor este trabalho, com as palavras-chave: Osteonecrose, Bisfosfonatos e Diagnóstico.			
<b>RESULTADOS</b>	A Osteonecrose induzida por Bisfosfonatos é uma condição de etiologia multifatorial e pode ocorrer em pacientes que fazem uso de Bisfosfonatos e foram expostos a traumas ou processos infecciosos. Quanto a prevenção dessa patologia, há controvérsias sobre a abordagem clínica segura para esses pacientes. Procedimentos cirúrgicos que envolvem remodelação óssea representam um grande risco ao paciente, que pode variar de acordo com a via de administração do medicamento, sendo que a via intravenosa apresenta maior risco de desenvolver a patologia. Além disso, deve ser realizada uma adequação do meio bucal antes do paciente iniciar o tratamento com essa medicação, a fim de reduzir os riscos futuros de osteonecrose dos maxilares associada ao uso de Bisfosfonatos. O diagnóstico é pautado pelo exame clínico do paciente. No exame físico, podem apresentar exposição óssea necrótica, que permanecem assintomáticas por anos, porém, quando apresenta dor, esta é descrita como profunda, na região de exposição óssea. Outros sinais são: mobilidade dentária, aumento de volume tecidual, eritema, ulceração, drenagem de secreções, osteomielites, fraturas patológicas, e fistulas sinusais. Exames complementares, tais como radiografia panorâmica (ortopantomografia) não indica a lesão em seus estágios mais iniciais. Entretanto, a ressonância magnética é mais sensível para identificar a osteonecrose, mesmo nos primeiros estágios. Os achados radiográficos que podem indicar a presença de Osteonecrose induzida por Bisfosfonatos variam entre: osteólise, erosão cortical, esclerose focal ou difusa, espessamentos do canal alveolar inferior, da lâmina dura ou da linha oblíqua externa da mandíbula, além de atividade alveolar persistente. Esses pacientes podem ser classificados de acordo com o grau de lesão necrótica, sendo de estágio 0 o paciente que apresenta alterações radiográficas porém sem alterações clínicas, já o estágio 1 apresenta exposição óssea porém assintomática e sem sinais de inflamação, o estágio 2 apresenta exposição óssea acompanhada de dor e inflamação porém sem drenagem ou secreção purulenta, por último o estágio 3 apresenta exposição óssea acompanhada de inflamação e dor além de poder existir exposição óssea além do processo alveolar com fratura patológica, fistula extraoral, comunicação oral ou buconasal.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os pacientes devem ser orientados a procurar um cirurgião-dentista antes de iniciar o tratamento com o bifosfonato. Já os profissionais devem estar aptos a identificar as sintomatologias dessa patologia e não negligenciar uma boa anamnese, sabendo requisitar exames complementares onde a primeira escolha é a ressonância magnética, a fim de iniciar o tratamento o mais breve possível evitando condutas mais invasivas e buscando um bom prognóstico para os pacientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Moraes S.L.C. Mattos R.P. Santos R.G. Afonso A.M.P Duarte B.G. Zanetta-Barbosa D. Oliveira M.T.F Riscos e complicações para os ossos da face decorrentes do uso de bisfosfonatos 2013/ Rev. Bras.odontol. Rio de Janeiro, v.70,n.2,p.114-9jul./dez.2013 2. Mario H Abu-Id, Patrick H Warnke, Joachim Gottschalk, Ingo Springer, Jörg Wiltfang, Yahya Acil, Paul A J Russo, Thomas Kreusch/High and low risk factors for bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw. J Craniomaxillofac. Surg. 2008 Mar;36(2):95-103. doi: 10.1016/j.jcms.2007.06.008. Epub 2008 Jan 30 3. Santos P.S.S , Oliveira M.A., Felix V.B / Osteonecrose maxilofacial induzida por bisfosfonatos em indivíduos com osteoporose 2011/ Rev Bras Ortop. 2011;46(5):495-99 4. Sales K, Conceição L. A atuação do cirurgião-dentista frente à osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos: uma revisão de literatura. Original Article. J Business Techn. 2020;14(2): 99-110 5. Brozski. M. A, Traina. A. A, Deboni. M. C. Z, Marques. M. M, Maria da Graça Nacério. M. G. Osteonecrose maxilar associada a uso de bisfosfonatos 2012 Rev Bras Reumatol 2012;52(2):260 6.Silva. M. A. Osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos CESPU Instituto Universitário de Ciências da Saúde Gandra, 27 de setembro de 202			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	14994	Odontologia	10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4403291 - LUCAS DE SOUZA FERREIRA	2 - Aprovado	1 - Poster
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Camilla Vieira Esteves dos Santos		
<b>TITULO</b>	MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA CASOS DE NECROSE INDUZIDA POR USO DE BISFOSFONATOS			
<b>INTRODUCAO</b>	Os bisfosfonatos são fármacos com alta afinidade pela hidroxiapatita comumente usados em doenças ósseas, influenciando seu metabolismo através da inibição da ação de osteoclastos e, consequentemente dos osteoblastos, deixando o paciente suscetível a osteonecrose.			
<b>OBJETIVOS</b>	Apontar métodos de diagnóstico convenientes ao cirurgião dentista para casos de osteonecrose por Bisfosfonatos, sua classificação, prevenção e abordagem odontológica			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema, através das plataformas: google acadêmico, pubmed e scielo, dos artigos obtidos, 6 foram selecionados para compor este trabalho, com as palavras-chave: Osteonecrose, Bisfosfonatos e Diagnóstico.			
<b>RESULTADOS</b>	A Osteonecrose induzida por Bisfosfonatos é uma condição de etiologia multifatorial e pode ocorrer em pacientes que fazem uso de Bisfosfonatos e foram expostos a traumas ou processos infecciosos. Quanto a prevenção dessa patologia, há controvérsias sobre a abordagem clínica segura para esses pacientes. Procedimentos cirúrgicos que envolvem remodelação óssea representam um grande risco ao paciente, que pode variar de acordo com a via de administração do medicamento, sendo que a via intravenosa apresenta maior risco de desenvolver a patologia. Além disso, deve ser realizada uma adequação do meio bucal antes do paciente iniciar o tratamento com essa medicação, a fim de reduzir os riscos futuros de osteonecrose dos maxilares associada ao uso de Bisfosfonatos. O diagnóstico é pautado pelo exame clínico do paciente. No exame físico, podem apresentar exposição óssea necrótica, que permanecem assintomáticas por anos, porém, quando apresenta dor, esta é descrita como profunda, na região de exposição óssea. Outros sinais são: mobilidade dentária, aumento de volume tecidual, eritema, ulceração, drenagem de secreções, osteomielites, fraturas patológicas, e fistulas sinusais. Exames complementares, tais como radiografia panorâmica (ortopantomografia) não indica a lesão em seus estágios mais iniciais. Entretanto, a ressonância magnética é mais sensível para identificar a osteonecrose, mesmo nos primeiros estágios. Os achados radiográficos que podem indicar a presença de Osteonecrose induzida por Bisfosfonatos variam entre: osteólise, erosão cortical, esclerose focal ou difusa, espessamentos do canal alveolar inferior, da lâmina dura ou da linha oblíqua externa da mandíbula, além de atividade alveolar persistente. Esses pacientes podem ser classificados de acordo com o grau de lesão necrótica, sendo de estágio 0 o paciente que apresenta alterações radiográficas porém sem alterações clínicas, já o estágio 1 apresenta exposição óssea porém assintomática e sem sinais de inflamação, o estágio 2 apresenta exposição óssea acompanhada de dor e inflamação porém sem drenagem ou secreção purulenta, por último o estágio 3 apresenta exposição óssea acompanhada de inflamação e dor além de poder existir exposição óssea além do processo alveolar com fratura patológica, fistula extraoral, comunicação oral ou buconasal.			
<b>CONCLUSOES</b>	Os pacientes devem ser orientados a procurar um cirurgião-dentista antes de iniciar o tratamento com o bifosfonato. Já os profissionais devem estar aptos a identificar as sintomatologias dessa patologia e não negligenciar uma boa anamnese, sabendo requisitar exames complementares onde a primeira escolha é a ressonância magnética, a fim de iniciar o tratamento o mais breve possível evitando condutas mais invasivas e buscando um bom prognóstico para os pacientes.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Moraes S.L.C. Mattos R.P. Santos R.G. Afonso A.M.P Duarte B.G. Zanetta-Barbosa D. Oliveira M.T.F Riscos e complicações para os ossos da face decorrentes do uso de bisfosfonatos 2013/ Rev. Bras.odontol. Rio de Janeiro, v.70,n.2,p.114-9jul./dez.2013 2. Mario H Abu-Id, Patrick H Warnke, Joachim Gottschalk, Ingo Springer, Jörg Wiltfang, Yahya Acil, Paul A J Russo, Thomas Kreusch/High and low risk factors for bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw. J Craniomaxillofac. Surg. 2008 Mar;36(2):95-103. doi: 10.1016/j.jcms.2007.06.008. Epub 2008 Jan 30 3. Santos P.S.S , Oliveira M.A., Felix V.B / Osteonecrose maxilofacial induzida por bisfosfonatos em indivíduos com osteoporose 2011/ Rev Bras Ortop. 2011;46(5):495-99 4. Sales K, Conceição L. A atuação do cirurgião-dentista frente à osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos: uma revisão de literatura. Original Article. J Business Techn. 2020;14(2): 99-110 5. Brozski. M. A, Traina. A. A, Deboni. M. C. Z, Marques. M. M, Maria da Graça Nacério. M. G. Osteonecrose maxilar associada a uso de bisfosfonatos 2012 Rev Bras Reumatol 2012;52(2):260 6.Silva. M. A. Osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos CESPU Instituto Universitário de Ciências da Saúde Gandra, 27 de setembro de 202			

Ano	Cód. Trabalho	Area	Tipo	Modalidade
2023	15007	Fisioterapia e Terapia Ocupacional	9 - Iniciação Científica (bolsa CNPq, UNISA, outras)	0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares
		<b>Autor</b>	<b>Status</b>	<b>Apresentação</b>
		4672925 - GABRIELA HARUMI ANTONIO	2 - Aprovado	0 - Comunicação Oral
		<b>Orientador 1</b>	<b>Orientador 2</b>	<b>Orientador Externo</b>
		Ana Paula Ribeiro		RENATA ESTEVAM ARTOGOITIA
<b>TITULO</b>	Efeito do calçado minimalista e palmilha ortopédica sobre a dor e desempenho físico-funcional de idosas com Osteoartrite de Joelho: ensaio clínico randomizado			
<b>INTRODUCAO</b>	A osteoartrite (OA) é a afecção mais frequente do sistema musculoesquelético, o que contribui para incapacidade funcional de aproximadamente 15% da população mundial. O estresse mecânico é uma das principais causas de seu surgimento e progressão da OA, principalmente em articulações expostas à constante sobrecarga e movimentação, como o joelho. Recentes estudos demonstraram, de forma aguda, que o uso de um calçado minimalista, bem como a palmilha podem reduzir a sobrecarga articular dos joelhos de idosas com OA			
<b>OBJETIVOS</b>	Avaliar o efeito do uso do calçado minimalista e da palmilha ortopédica sobre os aspectos da dor e desempenho físico de idosas com OA de joelho.			
<b>METODOLOGIA</b>	Foi conduzido um ensaio clínico controlado, randomizado e com avaliador cego, no qual 20 idosas com OA de joelho (graus 2 ou 3) e 10 idosas controle foram randomizadas e alocadas para o grupo de intervenção com calçado minimalista (GIC, n=10) ou para o grupo com calçado minimalista combinado a palmilha ortopédica (GIP, n=10) e 10 idosas controle, sem doença (GC, n=10). A intervenção foi um programa de exercícios de resistência muscular dos membros inferiores, treino de equilíbrio reativo e proativo e treino de marcha na esteira com velocidade de moderado a avançado. O CIC realizou a intervenção com o uso de um calçado flexível e sem salto da marca Moleca® e o GIP com o calçado associado a palmilha ortopédica. O programa de intervenção teve duração de quatro meses consecutivos, duas vezes na semana, com duração de 40 minutos cada sessão, seguidos de reavaliação após o final da intervenção. Os desfechos primários foram: a intensidade da dor verificado pela Escala Visual Analógica, o domínio de dor pelo questionário WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis). Os desfechos secundários foram: o desempenho físico-funcional pelo questionário algo-funcional de Lequesne e o WOMAC, a percepção de quedas pelo questionário Falls Risk Awareness Questionnaire-FRAQ-Brasil e o Timed Up (#38) Go Test (TUG).			
<b>RESULTADOS</b>	As idosas com OA de joelho e treino de intervenção com uso do calçado minimalista combinado a palmilha ortopédica (GIP) apresentaram redução da dor no joelho (p=0,001) e aumento do desempenho físico-funcional (WOMAC p=0,012; Lequesne p=0,023 e TUG p=0,012) e da percepção do risco de quedas (FRAQ p=0,012) quando comparado ao grupo das idosas com calçado minimalista apenas (GIC) e idosas controle (GC). Fato este, que mostra a importância do programa de intervenção para reduzir a dor e as limitações funcionais advindas da doença.			
<b>CONCLUSOES</b>	As idosas com OA de joelho, que realizaram um programa de intervenção por 4 meses consecutivos com o uso do calçado minimalista combinado a palmilha ortopédica, mostraram uma redução da intensidade de dor no joelho e aumento do desempenho físico-funcional em relação as idosas que utilizaram somente o calçado e as idosas controle. Fato este, o qual mostra a eficácia do programa de intervenção para minimizar o impacto da doença nas idosas.			
<b>REFERENCIAS</b>	1. Miyaguchi M, Kobayashi A, Kadoya Y, Ohashi H, Yamano Y, Takaoka K. Biochemical change in joint fluid after isometric quadriceps exercise for patients with osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2003;11(4):252-9. 2. Hortobágyi T, Garry J, Holbert D, Devita P. Aberrations in the control of quadriceps muscle force in patients with knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2004;51(4):562-9. 3. Jan MH, Lin CH, Lin YF, Lin JJ, Lin DH. Effects of weight-bearing versus nonweight-bearing exercise on function, walking speed, and position sense in participants with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2009;90(6):897-904.			

